

醫方類聚卷之一百六十四

解毒門 四

聖濟總錄 二

乳石發口舌瘡爛

乳石發口舌瘡爛者以食飲不時穀氣不足

石性暴烈其熱乘於心脾也脾主口心主舌

熱積而瘡瘡甚而爛復不得食則熱極可知

解之之劑不可緩也

治乳石發體熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛



不能食梔子人湯方

梔子人一枚黃芩去黑心人黃剉炒各三兩豉二合

右四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入

香豉壹合煎至八分去滓食前溫服

治乳石發動口中傷爛舌強而燥不得食味者為食少穀氣不足藥氣積在胃脘故也宜

香豉湯方

豉半升蒸麩

甘草炙剉各半兩黃蘗去麤皮蜜炙剉麥

門冬去心焙各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服日再

治乳石發頭項煩痛胸脇脹滿寒熱手足逆冷或口生瘡爛或乾嘔惡聞食氣上氣欲絕

前胡湯方

前胡去蘆頭芍藥 大黃剉炒甘草炙黃芩去黑心

心各二兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半棗五枚擘破煎至八分去滓溫服日再若氣

實者加茯苓去黑皮二兩胸滿塞者加枳
殼去瓢麩炒壹兩吐逆胃中冷者加乾姜
炮二兩口燥者加麥門冬去心焙二兩增
減以意量之

治乳石發食飲失度口中發瘡漱黃芩湯方

黃芩去黑心石膏碎五兩甘草炙升麻各二兩

右四味羅擣篩每服五錢匕水壹盞半煎
至八分去滓放冷用漱口一日十偏喉咽
有瘡稍稍嚥之

治乳石發動口舌生瘡鈎霜散方

鈎霜研白礬燒黃蘗去麤皮蜜炙各壹兩麝香研壹兩

右四味搗研為散每用半錢匕摻瘡上有
涎即吐之

治乳石發口瘡黃蘗湯方

黃蘗去麤皮蜜炙二兩龍膽壹兩黃連去須升麻壹兩

右四味羅擣篩每服五錢匕水壹盞半煎
至八分去滓時時含嚥

治乳石發動口舌生瘡龍腦散方

龍腦半錢 鈎霜 滑石各壹分

右三味各研為細末和勻每用壹字摻瘡上此涎差

治乳石發腹內胸中悉有瘡升麻湯方

升麻壹兩 烏梅十枚 去核炒 黃芩去黑心 黃連去須

栝樓根 甘草炙各一兩

右六味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓細細含嚥日三四服

治乳石發動口舌生瘡連頰腫痛升麻散方

升麻 防風去 甘草炙各半兩 雞腸草叁分 芎藭

大青各壹分

右六味擣羅為散每先於瘡腫處針出惡血搵湯漱後用藥半錢匕貼瘡上口三

治乳石發動口舌生瘡浮萍丸方

乾浮萍草 升麻 黃藥 鈎丹少研各半兩

右四味擣研為末鍊蜜丸如雞頭實大每服壹丸含化嚥津

乳石發身體腫

石發而身體腫者以食飲過溫不能勞動致熱氣稽壅於肌肉不得宣散故也亦有外感風濕內有停水與石勢相薄其氣滯塞致浮腫者然食飲過溫不自勞動其為腫也但體熱虛腫而已若風濕停水而發腫則必心中煩滿小便澀不可不辨也

治乳石發熱腫初覺壅宜服升麻湯方

升麻 大黃剉碎 黃芩去黑心 枳實去瓢 芍藥去黑心

藥各二兩 甘草炙 當歸切焙各一兩

右七味籠搗篩每服三錢匕以水壹盞煎至七分去滓溫服

治乳石熱腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 淡竹葉壹握切碎 白朮 升麻炙

枳實去瓢 人參 梔子仁各壹兩 大黃剉炒二兩

黃芩去黑心三兩

右九味籠搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服

治鍾乳發寒熱胸中壅塞而腫手足煩疼生
麥門冬湯方

生麥門冬去心焙壹兩 豉微少一合

右二味麤搗篩每服三錢匕水壹盞葱白
三莖拍碎同煎至六分去滓空心溫服

治乳石發熱堅腫芍藥湯方

芍藥 枳實去瓤麩炒 大黃剉炒 升麻各二兩 當歸

切焙一兩

右五味各搗篩每服三錢匕水壹大盞煎

至七分去滓溫服空心食前日午各壹服

治服石人水氣內積面目𩚑膝腫鞭小便澀

木通湯方

木通剉 桑根白皮炙剉各半兩 桔梗剉炒 赤芍藥

各三分 葶藶子隔紙炒 白茅根微炒各壹兩

右六味各搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至七分去滓空腹溫服日再

治服石人風濕外搏水飲內停身面微腫小

便澀紫蘇子丸方

紫蘇子微炒壹合半 陳橘皮去白焙 杏仁去皮尖

赤茯苓去黑皮 防已兩一 葶藶隔紙炒三分

右六味擣羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十五丸加至三十九空心用桑白皮赤小豆煎湯下日再

治服石入水氣內積面腫赤茯苓散方

赤茯苓去黑皮 牽牛子炒各一兩半 枳殼去瓢炒 陳

橘皮去白炒 甘草炙各三分

右五味擣羅為散每服二錢匕如茶點服

不拘時

治乳石發動上攻頭面浮腫消石湯方

消石 葶藶 防風去 黃連大須炒 大黃炒

甘草炙 枳殼去瓢 地榆炒 羌活去蘆

龍骨代赭 桑根白皮炒 梔子去毛

黃芩去黑心 石葦去毛

右一十五味各半兩 煎至八分去滓溫服

治乳石發熱初欲作腫石鷲子淋洗方

石鷺子

七枚

右壹味麤擣篩以水三升煮取二升頻淋洗癰腫處以差爲度

治乳石發動周體患腫不能回轉者爲久坐不行又飲酒藥氣滯在皮膚之內血脉不通也右宜飲酒冷水洗自勞卽差若不能行者遣人扶持強行使支節調暢乃止亦不得過度使反發熱儻反熱者還當洗之治乳石發動四肢面目浮腫者爲飲食溫久

不自勞力藥與正氣相隔也右但飲熱酒冷食自勞及洗浴卽差

治乳石發動腹背熱如手如杯如盤許大者

方

右但以冷石隨熱處熨之

治乳石發上氣喘嗽

乳石之發如火炎上熱氣騰湧熏蒸胃膈入於肺中氣壅不散使人胸滿短氣上喘欬嗽不得安卧

治乳石發肺脹氣急呀嗽喘麓不得安卧紫苑湯方

紫苑去苗土一兩半 甘草炙半 赤茯苓去黑皮 檳榔判五 葶藶子紙上炒 壹兩

右五味麓搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓空心溫服

治乳石發熱衝頭面口乾喘嗽麥門冬湯方

牛麥門冬焙 麥麩去根 石膏碎各 葛根判 兩

右四味麓搗篩每服五錢匕水一盞半入

葱白三莖切同煎至一盞去滓入生地黃

汁二合更煎三兩沸食後分溫二服日再

治乳石發上氣肺熱呀嗽多涕唾貝母湯方

貝母去心 壹兩 麥門冬去心 杏人湯浸去皮 二十 生薑切 石膏碎各 黃芩去黑心 甘草判 壹兩 五味子 白木判各 淡竹葉壹

右膏土味麓搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓下蜜二錢攪勻空心溫服

若取利入芒消壹字湯成下

治乳石上氣呀嗽不得卧卧即氣絕葶藶丸

方

葶藶子紙上微炒半兩芸臺子揀淨馬兜零判紫苑

去苗人參各壹兩杏人湯去皮尖雙皂莢酥炙

去黑皮并白前炙甘草炙防已各壹兩

右壹十味搗羅為末鍊蜜和搗令熟丸如

梧桐子大空心米飲下二十九

治乳石發定肺氣止喘嗽天門冬煎方

天門冬去心絞汁貳兩生地黃絞汁四兩生薑去皮絞汁二兩

杏人湯去皮尖雙人白蜜二兩牛酥三兩百部

款冬花去苗紫苑去苗麻黃去根節別升升麻

三甘草炙二兩

右壹十二味將後六味各搗為末先以水

五盞煎麻黃末三錢匕去沫下五藥末五

錢匕煎至四盞絞去滓澄濾於銅器中以

微火煎至三盞次下天門冬汁地黃汁各

二合更煎減至二盞下薑汁二合更煎減

至壹盞下杏仁膏酥蜜等各半合攪令勻
稠置不津器中每服取半雞子殼許含化
嚥津日四五服

治乳石發熱喘嗽方

鼓二合

右以水三盞漬取汁分溫三服早辰日午
哺時各壹服服訖臥少時

乳石發嘔逆

石性勇悍凡服食過度將適失化而又脾胃

不和穀不能勝則其氣上攻所以發嘔逆也
治乳石發動熱氣上攻脾胃不和嘔逆食不
下茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

黃耆

剉

枇杷

葉

拭去毛微炙各三分

前胡

去蘆頭

枳殼

去瓢炒

大黃

蘆根

剉各壹兩

麥門冬

去心焙壹分

甘草

炙剉半兩

右壹十味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半

入生姜五片青竹茹壹分煎至八分去滓

食後臨臥溫服

治乳石發結熱癖心下腫胸中痞塞嘔逆不止
鴈肪湯方

鴈肪壹具先煮過當歸切焙大黃剉桂去麤皮芍

藥一兩人參半石膏碎甘草剉各二兩桃人

二拾枚湯浸去皮尖雙人炒研

右九味除鴈肪外籠擣篩先將鴈肪以水七盞煎取汁五盞去鴈肪每服用汁二盞藥末四錢七更入桃人七枚棗壹枚拍碎煎至一盞去滓入芒消少許更煎三兩沸

空心溫服日午再服若熱盛者日四服如無鴈以白鴨代之如無白鴨以烏雞代之
治乳石發嘔服藥不效三黃湯方

鼓參合新解裏線纏作袋子梔子人枳實去顛甘

草剉胡頭去蘆大黃剉各壹兩

右六味除鼓外籠擣篩每服四錢匕水二盞和鼓袋子同煮至壹盞後入芒消壹錢匕再煎壹二沸去滓空心溫服

治乳石發動虛熱痰飲嘔逆飲食不下枳樓

根湯方

栝樓根

麥門冬

去心

人參

甘草

炙黃

苓

去黑心

半夏

湯洗七遍去滑

蘆根

剉各一兩

前胡

去頭

分

右八味咬咀如麻豆每服五錢匕水壹盞

半入牛薑五片煎至八分去滓溫服不拘

時候

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參

白朮

栝樓根

甘草

炙剉各

黃

苓

去黑心

右五味麤擣篩每四錢匕水二盞煎至壹

盞去滓分溫二服早晚食前各一

治乳石發熱乾嘔煩熱半夏湯方

半夏

湯洗去滑切焙

白薇

炒

乾薑

炮

甘草

炙

各半

右四味麤擣篩每服三錢匕若酒一盞煎

至五分去滓溫服

治乳石發動煩悶嘔逆人參湯方

人參 甘草 炙 麥門冬 去心 黃芩 去黑蘆

根 去土 栝樓 剉炒各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓空心溫服

治乳石發嘔不止食不下薤白飲方

豉 微炒 陳橘皮 湯浸去白 麥門冬 去心 焙

粟米 半合

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞入薤

白二莖拍碎煎至壹盞去滓溫服早晚各

壹

治乳石發動乾嘔枳殼湯方

枳殼 去瓢麩 梔子仁 七枚 豉 微炒 大黃 剉沙

右四味麤搗篩每服四錢匕水二盞煎至

壹盞去滓溫服空心晚後各壹強壯者加

大黃一兩

治乳石發嘔不息方

薤白 壹握

右 味碎切以水三盞煎至一盞去滓溫

服

治乳石發嘔逆咽喉中傷清血出者此因胃
温及食熱所致方右以冷水飲之或以冷石
熨咽喉即差

治乳石發胸脅滿氣上逆此因失飢不食藥
氣上衝所致方右速與冷水洗之或以冷
飯食之即差

治石發霍亂轉筋

乳石發霍亂轉筋者以服食失度陰陽不和

清濁相干也蓋服石之人府藏多熱熱即引
飲及其飢飽食又過多水穀既傷腸胃不納
下為泄利上為吐逆又為腹脹吐利不止寒
氣益甚則為轉筋食飲藥劑當調以温和使
石熱平息氣道下降則病可愈
治乳石發霍亂轉筋不止香茱湯方

香茱

三分木瓜

乾者去瓢

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙熟各一兩

桂

去麤皮半兩

右六味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半入

生薑半分切煎取八分去滓溫服不計時
候

治乳石發霍亂吐利轉筋木瓜湯方

木瓜 大者壹枚 去瓢薄切 倉粳米 壹合

右二味以水二盞煎取一盞去滓時時溫

服壹合

治乳石發霍亂吐利不止及轉筋糯米飲方

糯米 淘淨 壹合

右壹味細研以少許清水攪如乳狀頓服

立止

治乳石發霍亂轉筋及心腹痛高良薑湯方

高良薑 剉半兩 去麤皮 木瓜 乾者去 穰二兩

右三味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞煎

取七分去滓溫服不計時

治乳石發霍亂吐利轉筋棠梨木瓜湯方

棠梨枝 壹握 木瓜 大者壹枚 去穰

右二味細剉分四服每服以水壹盞入生

薑五片煎取七分去滓熱服不計時

類聚

卅六

治發石發轉筋不止不下氣急桑葉飲方

桑葉切二兩

右壹味以水五盞煎至壹盞半去滓分溫

二服早晚各一

治乳石發吐利轉筋氣急高良薑飲方

高良薑兩

右壹味麤搗篩每服三錢匕以酒壹盞煎

至六分去滓溫服早晚食前各一亦療暴

腹痛惡血氣急

治乳石發霍亂轉筋氣急木瓜飲方

木瓜壹枚去皮子切焙乾

右壹味剉如麻豆大每服三錢匕以水壹

盞半煎至八分去滓溫服飲盡更作無木

瓜只以枝葉并根代之

治乳石吐利不止轉筋入腹欲死方

生薑半兩切

右壹味以酒壹盞煎五七沸去滓頓服之

治乳石發動霍亂疝痛不可忍方

類聚

卅七

類聚本草

食茱萸 海淨炒 香二兩

右壹味以酒三盞煎至壹盞半分為二服
得下利即差 空腹食前各一

治乳石發霍亂轉筋入腹方

雞屎白 兩半

右壹味搗羅為末每服二錢匕 空腹以溫

水半盞調頓服之良

乳石發痞結羸瘦

陰氣積於下陽氣盛於上升降不時則成痞

結羸瘦况服乳石者飲食不節將適失度熱
氣熾於上陰陽隔而不通水穀之氣不能潤
養肌體則肌肉枯燥胃膈痞塞腸胃脹滿久
則正氣衰微日益羸瘦固其宜也治法當升
降痞隔調適陰陽如此則痞者通石勢息也
治乳石熱盛虛弱痞結羸瘦調順陰陽去熱
益氣黃耆湯方

黃耆 判人參 生乾地黄 焙 甘草 炙 白芍

藥 各二兩 桂 去麤皮 黃芩 去黑心 赤茯苓 去黑皮 各壹兩

升麻三兩

右力味麤擣篩每服五錢匕水一盞半

三枚擘破生姜三片同煎數沸次下竹葉

七片更煎三二沸去滓取一盞空心温服

日再

治乳石發後虛熱羸乏胸膈痞滯心腹脹滿

或腰脚痛腎瀝當歸湯方

當歸焙切甘草炙芎藭 遠志去心麥門冬去心

芍藥 赤茯苓去黑皮生乾地黄焙四兩

黃芩去黑心桂去麤皮五味子三兩

右豈十壹味麤擣篩每五錢匕先以水五

盞入白羊腎壹隻去筋膜切煎至三盞去

腎下藥入生姜壹棗大拍碎大棗三枚擘

破更煎至二盞去滓分温二服空心食前

治乳石發體黃瘦不能飲食心腹痛結起居

腰背忽痛者卧半夏湯方

半夏湯浸七遍焙黃芩去黑心土瓜根各二兩赤茯苓

苓去黑皮桂去麤皮枳殼去瓢白朮各壹兩

類聚本草

卷之

右七味麤擣篩每服五錢七水二盞生姜壹棗大拍碎煎至一盞去滓空心溫服日

再
治乳石發動因服冷藥太過致心膈痞滿腹內疼痛不思飲食日漸羸瘦積實湯方

枳實麤炒赤芍藥 青橘皮湯浸去白焙 常歸切炒

大腹皮各三分 前胡去蘆頭 白朮半兩

右七味麤擣篩每服五錢七水壹盞生姜壹棗大拍碎棗二枚擘煎至八分去滓溫

服不拘時

治乳石發動心膈痞滿喘息微促腹脇妨悶疼痛大腹湯方

大腹皮壹兩 木香 枳殼去瓢麤炒 赤芍藥

甘草炙剉各半兩 前胡去蘆頭 陳橘皮湯浸去白

茯苓去黑皮各三分

右八味麤擣篩每服三錢七水壹盞生薑一棗大拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治乳石發動心膈痞滿腹內妨痛不思飲食

類聚本草

卷之

桔梗湯方

桔梗判枳實炒白朮各二兩梔子八兩甘草

炙判半兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半生薑壹棗大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治口石發心腹脹滿

乳石發心腹脹滿者以飲食居處皆犯溫燥石勢壅遏不得宣通故府藏之間熱氣相搏

而心腹脹滿也又有腹脹欲斷衣帶者亦以寢處之溫失食失洗不時動役之過但能冷食冷洗當風而立則脹滿自消

治乳石發心腹脹滿導氣丸方

黃芩四兩牽牛兩右壹味擣羅為末用生姜自然汁煮麪糊

和丸梧桐子大每服五十丸生薑湯下

治乳石發大熱心腹滿脹石膏湯方

石膏各三兩大青兩黃芩去黑心升麻芍藥

各二兩

右五味龍擣篩每用五錢匕水壹盞半煎

至壹盞去滓分溫二服如腹痛加續斷二

兩

治乳石發腹脹頭痛先有癖實不消或飲酒

食肉所致時苦心急痛者黃芩湯方

黃芩去黑心甘草炙大黃剉炒各二兩麥門冬去心

焙一梔子四十枚

右五味龍擣篩每服五錢匕壹壹盞半煎

至七分去滓下芒消壹錢匕再煎三兩沸

溫服早晨晚後各壹服

治乳石發動上氣熱實心腹滿小便赤大便

不利痞逆衝胸口焦燥目赤痛大黃湯方

大黃剉炒黃芩去黑心黃連去須甘草炙麥

門冬去心焙

右五味龍擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓內芒消壹錢匕再煎三兩沸

溫服早晨近晚各壹通利即愈

治乳石發動心胸痞脹熱毒萎蕤湯方

萎蕤 去黑心 黃芩 去黑心 升麻 乾薑 炮 茈胡 去

各壹兩半 芍藥 黃連 去須各一兩 石膏 四兩 梔子人

七

右九味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

姜壹分拍碎并豉少許同煎至六分去滓

下芒消半字令沸溫服如人行十里許再

服日二快利即止

治乳石發內有虛熱胸腹痞滿外風濕不解

肌肉拘急香豉湯方

豉 二枚 梔子人 十四枚 葱白 一握 黃芩 去黑心

右四味除葱豉外麤搗篩每服先以水三

盞煮葱豉至壹盞半下藥四錢匕更煎至

八分去滓溫服

治乳石發內熱結不除或已飲酒冷食澡洗

猶不解或腹脹頭痛眼目疼或先有癰實不

消或連飲不食或時作心痛甘草湯方

甘草 炙 黃芩 去黑心 大黃 剉炒各

類聚本草

卷之三

右三味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服早晨晚後各壹服

治乳石發心腹脹痛冷熱相搏桔梗湯方

桔梗剉炒甘草炙白朮剉枳實去瓢炒梔子剉

人各二兩

右五味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服早晨晚後各壹服

治乳石發心痛脹滿飲熱酒不解葱豉酒方

葱豉握切豉九合綿裹

右二味以水三盞煎至二盞去滓分三服

熱飲之早晨日午近晚各一水盞中煎

治乳石發動腹脹欲裂者為久坐下熱及衣

溫失食所致右宜數冷食冷飲洗當風取

冷須更即愈

治乳石發下利

乳石之性剛猛氣多炎上理之傷溫則火轉

為熾內煎脾肺苦熱遂成其渴飲水過多則

凌腸胃胃得水則吐腸得水則寒而腸雖寒

火炎不滅水漸流下而為行潦遂變下痢胃
氣虛冷水穀不消在陽則益熱不食在陰則
腸鳴而洩也

治乳石發動煩熱腹痛變為下痢不欲飲食

地榆散方

地榆壹兩木香兩半萎蕤三分當歸三分黃芩三分

分三右五味搗篩為散每服四錢匕水壹中蒸

煎至六分去滓溫服不計時候

治乳石發動解散已經快利熱尚不退兼痢
不斷黃連湯方

黃連升一白梁米升二

右二味水五升煮取二升分三服壹日盡

治乳石發下痢梔子人湯方

梔子人二拾甘草炙令赤色人參二兩黃連二兩

去須在四味籠擣篩每服四錢匕用水二盞煎

至壹盞去滓溫服早晨日午晚後食前各

壹

治乳石癩下痢香鼓飲方

鼓和葱白

壹握

乾薑

炮裂搗末一兩

甘草

微炙剉

兩

合

煎水

至二盞

去滓

下碎葱

一合

各

右四味

先以水三盞入甘草乾姜二味末

各二錢

匕煎水至二盞去滓下碎葱一合

鼓壹合

更煎至一盞去滓分爲三服

早晨

午時

日晚各一

治乳石癩下痢黃連湯方

黃連

去須一兩

鼓

五合

烏梅

拾枚

右三味剉碎以水三盞入童子小便壹盞

雞白三盞拍碎同煎至二盞去滓分溫三

服空心日午晚後各壹

治乳石癩夾時行兼有客熱下血痢止血破

棺起死黃連湯方

黃連

微炙剉二兩

黃連

去須二兩

乾薑

炮裂一兩

石榴皮

阿膠

炙令燥二兩

芍藥

二兩

梔子

拾五

右七味

釐搗篩每服四錢匕以水二盞煎

至壹盞去滓溫服日再

治乳石發散已經快利熱尚不退兼痢不斷

梁米湯方

梁米一合黃連去須剉碎三兩

右二味麤擣篩以水四盞煎至一盞半分

三服去滓食前溫服一日令盡

治乳石發赤白痢黃連湯方

黃連去須綿裹一兩蜜一合童子小便二盞

右三味以水二盞與小便漬藥一宿煎至

一盞半去滓分爲二服弱人三服早晨日

午晚後溫服

治乳石發赤白痢兼熱煩悶梔子湯方

梔子人枚拾薤白切壹握豉壹合

右三味以水三盞煎至一盞半去滓分溫

二服弱人卽分爲三服食前服

治乳石不痢及常服壓石方

豉三兩

右壹味炒令黃香候冷擣篩爲末每服二

至壹盞去滓溫服日再

治乳石發散已經快利熱尚不退兼痢不斷

梁米湯方

梁米合一黃連

去須剉碎三兩

右二味麤擣篩以水四盞煎至一盞半分

三服去滓食前溫服一日令盡

治乳石發白痢黃連湯方

黃連

去須綿裹一兩

蜜合一童子小便二盞

右三味以水二盞與小便漬藥一宿煎至

一盞半去滓分為二服弱人三服早晨日

午晚後溫服

治乳石發赤白痢兼熱煩悶梔子湯方

梔子人

拾枚薤白

切壹握

豉壹合

右三味以水三盞煎至一盞半去滓分溫

二服弱人即分為三服食前服

治乳石不痢及常服壓石方

鼓

三兩

右壹味炒令黃香候冷擣篩為末每服二

錢匕以冷水調下

解乳石痢方

紫筆茶二兩

石壹味搗羅為末每服三錢匕以水壹盞

煎至七分和滓服之早晨日午晚後食前

各一

解石痢方右淡煮真好芥濃汁服二三盞重

者三服輕者一二服差

乳石發淋瀝

乳石發動小便淋瀝者石勢踰腎熱氣所致

也蓋腎主水而惡燥水行小腸入胞為洩便

腎氣和平則洩便順流腎氣宿虛復因石熱

將熾過度虛熱相搏則洩便數而澀且痛也

數為虛澀為熱澀甚而痛故為淋瀝

治乳石發動患淋積年或數日輒發滑石散

方桑白皮煨馬兜鈴各一分

滑石二兩冬葵子壹兩赤茯苓去黑皮芍藥黃

芩去黑心蒲黃微炒芒消各壹兩半瞿麥穗壹兩石韋

去毛壹湯浸去白陳橘皮焙壹兩

右帶十味搗羅為散每服二錢匕煎後方

桑白皮飲調服空心食前日二服漸加至

三服取利為度

下前藥桑白皮飲方

桑根白皮剉壹兩木通剉二兩白茅根剉二百兩

合二兩甘草炙滑石各壹兩

右六味細剉如麻豆大每服五錢匕水三

盞煎至二盞去滓每用半盞調前散如口

壹卽食前更服此飲

治乳石發動淋瀝滑石木通湯方

滑石五兩木通剉三兩石韋去毛瞿麥穗各二兩冬葵

子合五兩

右五味羅搗篩每五錢匕水三盞入茆根

少許剉碎同煎至壹盞半去滓更下芒消

少許煎三兩沸分溫二服空心壹服如兩

食次再服微利為度

治乳石發動熱結小便淋澀小腹痛大黃湯

方

大黃判炒芍藥 赤茯苓去黑皮大麻人半升

別研每服旋入壹合

右四味除麻人外麤搗篩每服五錢匕水

三盞入麻人壹合同煎至壹盞半去滓分

溫二服空心壹服日午再服

治乳石發動熱結小便淋澀小腹痛螺蛸湯

方

桑螵蛸炙黃二拾枚黃芩去黑心一兩

右二味細判每服五錢匕水二盞煎至青

盞去滓分作三服空心溫服日午再服

治乳石發動熱淋澀痛車前湯方

車前草去根葵根削洗令淨切片木通判

兩右三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎

至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎壹兩

沸溫服日再取利為度

治乳石發動血淋不止雞蘇湯方

雞蘇子

...

...

...

...

...

雞蘇

壹握去根剉暴

石膏

碎二兩

竹葉

壹握切 蜀葵子

別為末 葵子 為末每服壹兩旋入一錢

右五味除葵子外餘搗篩每服二錢匕水

壹盞半煎至壹盞去滓下葵子末壹錢匕

更煎至八分溫服日二

治乳石發卒患淋方

船底青苔

二塊如鴨子大

右壹味以水三盞煎至壹盞半去滓分溫

二服空心日午各壹

治乳石發熱淋茅根湯方

白茅根

淨洗剉暴乾半斤

右壹味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至

壹盞去滓溫服食前日二

治乳石不淋狀如碎砂石下者方

車前子

壹升翕囊盛

右壹味以水五盞煎至二盞經宿勿食頓

服之須臾砂石自下四盞水煎半煎

治乳石發熱小便數少如淋葵子湯方

冬葵子

棟丘合如無子切
陳根壹兩亦得

在壹味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半煎

至八分去滓溫服日三

乳石發大小便不通

乳石發大小便不通以石勢乘於大小腸故也蓋石氣慄悍方其將適得宜飲食有節則慄悍之氣沉潛而不作將適失宜食飲不節沉潛者於是騰躍而四達乘於腸間則津液內燥而為結澀此大小便所以不通也

治乳石發熱四體煩滿脉至急數大小便不

通升麻湯方

升麻三兩黃蘗微炙

碎

黃連去須

芍藥各壹兩

甘草

炙令

黃芩去黑心

白鴨屎

淡竹葉切各

梔

二兩

子拾四枚

右九味除竹葉鴨屎外麤擣篩先以水三

升煮竹葉鴨屎去滓至壹升半每服取壹

盞入藥四錢匕煎至七分去滓溫服早晨

日午晚後各壹若上氣加杏仁五合石膏

三兩

治乳石發動氣上不得食嘔逆大小便不通
氣滿煩悶折熱下氣前胡湯方

前胡去蘆黃芩去黑心甘草炙令微赤赤茯苓去黑

皮各湯浸退皮尖炒枳殼去瓢麩炒

二兩杏仁令黃四十枚大黃判炒令香梔子十枚

右八味麤擣篩每服五錢匕水三盞入生

薑壹分拍碎同煎至壹盞半去滓分溫三

服早晨日午晚食前各壹服訖如利多喫

酢飯止之不可頻服隔三兩日即更服

治乳石發動煩熱身體微腫不能食飲小便

不利茯苓飲方

赤茯苓去黑皮白朮炒令香甘草炙令赤栝樓

根判人參桂去蘆黃芩去黑心枳殼

去瓢麩炒令

右入味麤擣篩每五錢匕水三盞煎至壹

盞半去滓分溫二服空心日晚食前各壹

治乳石發動上氣熱實不解心腹滿悶大小

便不涌口燥目赤者芒消湯方

芒消 黃連去青 芩去黑 甘草炙令赤 各壹兩 梔

子人 大黃剉炒各半兩

石六味 龍擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服日二早晨日晚各一

治乳石發動大小腸壅滯臍腹妨悶赤茯苓

散方

赤茯苓去黑皮 木通剉各三分 葵子半兩 惡實炒 枳

殼去瓢 大黃剉碎微炒各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕煎紫蘇湯

調下如人行十里再服以利為度

治乳石發動致人虛勞下焦有熱骨節煩疼

肌急內痞小便不利大便澀難口乾舌燥氣

乏少力折石敗熟大麻人飲方

大麻人五合 絞取汁 豉三合 以麻

右二味以水四盞將麻人研爛絞取汁并

豉袋子與水同煎至二盞去滓分為四服

早晨日午晚食前各一夜更壹服

治乳石發動大小腸壅滯不通枳實湯方

枳實去麩炒令黃 前胡去蘆頭 檳榔剉木通 剉各

甘草炙牛 大黃壹兩半

右六味麩搗篩每服三錢匕木壹盞入生

薑半分煎取六分去滓不計時候溫服

治乳石發熱口乾小便澀方

萎蕤兩

右一味搗碎每服三錢匕水壹盞煎取七

分去滓溫服但得微利即差

治乳石發熱口乾小便澀方

甘蔗削去皮

右壹味嚼嚙汁如口痛不能嚼者取汁飲

之先曾利即勿服

治乳石發熱體氣昏濁不痛不痒小便赤澀

方

生茅根斤

右壹味搗令爛以新布絞汁細細飲之

治乳石發虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急

小便不利大便數少吸吸少氣折石敗熱方

大麻子三合

合

右壹味研令極爛以水三盞煮至壹盞半
分二服早晨日午各壹

治乳石發動大便難腹中堅脹者爲積久腹
中有乾糞不去方右宜銷酥及蜜并石膏
末和服令滋潤腹中卽下若不下更服大
黃朴消等下之便差

服乳石備飲食常法

服乳石者莫急於將適將適之法莫先於飲
食有所宜者有所常忌慎者有不可不預
備則防其疾之將然者今特敘之服乳石
之人所宜飲食方右取豬脂并猪肉可一
月三五度食之佳以小牛頭蹄及白羊頭
蹄豬肉作薑豉隨意食之果實宜食梨柿
等凡欲服熱羊肉麩食之類宜先食三五
匙冷飯卽不妨熱食訖仍速以冷飯壓之
行步釋散乃善服石人有性喜麩嗜酢水

能禁慎者宜食冷淡糠酢白沸紫麩及水
 糝餅卽無妨冷韭羹大補時時宜食之又
 服石人雖可飲酒而不宜多飲酒多則失
 食味失食味則不能食不能食則令人虛
 熱虛熱則令石數發惡寒况又損石力謂
 酒能壓石令人風虛腰脚弱若能飲又能
 食大佳

又服石忌慎方右凡服石飲食切忌熱麩白
 酒陳臭酢醬雞犬殺羊牛肉鮑魚鮑臭魚

補血羹冷酒有灰酒蕎麥小豆胡麻動作
 切忌乘飢灸灼熱湯沐浴夏月空腹忿恚
 及過市入喪家并哭泣衝熱忍飢登甚
 穢廁親不潔婦人蔬菜忌芸薑胡荽荏菹
 枸杞芥菜人蒜果實忌梅杏桃李藥物忌
 烏頭附子天雄蒼耳等悉宜消息以取安
 平卽服石將慎至難不能將息不若勿服
 蓋背拆腦裂發乳體腫之疾往往因此得
 之故耳

眼乳石後將慎紫麩食方右取烏豆不拘多
少煮取濃汁代水和麩依常法作麩食還
向此豆汁中熟煮乾則添豆汁勿加水候
熟入猪羊菜豆等臠食之和山芋作麩尤
佳外亦菜人謂果實皆能作麩食
又水模餅方右作餅欲上鑿時以水塗模生
餅上表裏燂之切勿食胡餅燒餅等大壅
熱故也此餅以山芋汁和以空即念志
又宜食麩餅方右取麩拌如常餅法細切如

小豆大以麩於簸中拌令如丸煮極熟乾
漉出置冷水中又漉出置盤中以粉再拌
麩圓內鑊中煮令極熟乘熱任以五味汁
及諸肉臠食之大涼補腰脚於藥無犯
又方右取新大麥爲麩和肉汁及作餅食甚
良又大麥熟蒸爲餅和黑豆相拌食良憂
日冒熱遠行食晚失飢石必發動宜作大
麥餅將行飢卽食之壓石瘵飢甚妙藥食
治乳石發動寒慄顛掉不自支持者爲食少

藥氣溢於肌膚五藏失序百脉搖動與正
 氣相競方在宜強飲熱酒以和其脉藥食
 以定其藏強行以調其關節強洗以宜其
 藥滯大藥燥熱飲酒黑豆麻升食其發
 又式乳石發動諸藥不治者肉骨及消消身其
 乳石發動各有方劑以對病證固有疾勢異
 常諸藥所不能治者迺別敘備用之法來世
 治乳石發動諸藥不効宜服萎蕤酒方其料
 萎蕤大升麻小薺芩升人蔘各三兩大黃剉

二黃芩去黑葛根剉紫草去蘆犀角鎊各
 兩心梔子人芒消各二銀屑二兩豬脂臘月
 兩露蜂房五甘草炙剉大豆浸一宿暴乾
 右壹十六味除豬脂銀屑外擣羅為細末
 以無灰酒二升密封漬經一宿次將豬脂
 用好酒壹升鍊開以銀屑相和研入前藥
 酒內更浸壹宿每服取酒壹二盞飲之
 治乳石發動諸藥不治單服豆豉酒方
 醇酒壹升五合五

右二味同煮沸熱澄清旋飲壹盞

治乳石發諸藥療不差方

消石明白者壹塊如杏子大

右一味不拘時逐旋含化嚙津

治一切石發胡豆汁方

胡豆升半

右壹味以水五盞與胡豆同研生絹絞取

汁每服半盞不拘時服

治乳石發大麥麩方

大麥搗去皮淨以水淘七遍漉出蒸令香熟焙乾令更炒香壹升

右一味搗羅為細麩每服三錢匕化蜜水

治調服早晨日午晚後各一

治乳石熱氣結滯經年數發胡荽飲方

胡荽五月九日採預收陰乾半斤春夏採葉秋冬採根

右一味以水七升煮取壹升半去滓每服

壹盞不計時候日三

治乳石發動日乾寒熱似鬼為病諸藥不治者麥門冬丸方

香麥門冬

八分去心五分

犀角屑

黃芩

各四分

分萎蕤

兩四分

梔子

兩四分

升麻

兩四分

夫青

甘草

各三分

苦參

六分

右膏十二味搗為末鍊蜜為丸如梧桐子

大每服十五丸至二十丸食後蜜水送下

日三以意加減

治乳石發熱困諸藥不効者方

豬脂

五合成鍊者

芒消

四分

葱白

五合切

鼓心

三合

右四味以水三升煮葱鼓取壹升半濾去

滓下豬脂芒消二味再煎一沸分五服以

差為度

治丹石發方

河中石

壹兩四分

右壹味燒令通赤投於童子小便一盞內

候溫去石飲之

治膏切丹石發方

寒水石

壹塊

右壹味如杏子許大含之以差為度

治壹切丹石發方有人含之以盡飲之

黃連去須二兩

右壹味搗羅為細末以水三盞浸經一宿
漉去滓每服半盞時時飲之

治壹切石發方並治外發重下小兒一盞內

牛冬瓜去皮研爛四兩

右壹味以水五升煮至三升去滓分溫三
服早晚日午近晚各壹

治乳石發枸杞煮汁方再煮一盞分五服

枸杞白皮半斤剉碎

右壹味以水五升煮取三升空心任意飲

之

治乳石發煮薺苳汁方取薺苳水出薺苳水

薺苳半斤細剉

右壹味以水五升煮取三升空心飲之

治諸乳石散發不可忍欲下之方取乳石散

肥豬肉二斤葱白薤白各四兩

右三味切壹處蒸令熟空心食盡良未少

項再食

醫方大成

解砒毒用井花水調水粉

醫方集成南北經驗良方同

經驗良方

治鼠莽草毒右枯蓮房殼帶梗陰乾川時咬

咀煎米二三椀灌之如無或川荷葉中心

帶或用藕節煎湯壹椀溫冷灌之毒即散

三味中隨其物使用之係陳元壽云新塗

承天宮傳法師傳甚驗

又方江豆花研水吞下如無花紅豆江豆亦

可

解砒毒伏龍肝為末清油調二錢多下

解巴豆毒其證瀉瀉兩臉赤五心熱刺不止

諸藥不效用芭蕉根葉研取自然汁服痢

連而安山藥散

解鼠莽草毒玉簪花根研取自然汁半盞灌

之如此再煮服

神仙解毒圓江湖蔡道人傳此老年八十餘

無生活計專貨此藥字致禮而得此方

青靛花壹斤新大黃 山豆根 自然銅各一

斤黃藥壹斤白藥壹斤貫眾壹斤楮實子即谷山

枝子壹斤山茨菇 黃連各十兩朴硝三錢滑石

七芭蕉自然汗壹斤鈎光石壹斤自然汗壹斤

右為極細末糯米糊前芭蕉汁和藥壹

二千杵多則妙陰乾不使見日不然拆去

耳料可作壹千五百九却用鈎光石打光

不然青練光亦可九如龍眼大五諸般骨

鯁井水磨下壹丸作勢壹吞即下荅腮癩

腫咽喉飛颺麻油調水磨化下、酒毒腸

風下血薄荷湯水磨化下木赤眼腫痛井

水磨下針蠶蠱毒用黃連水磨下 蛇犬

蜂螫蜈蚣毒用水磨塗傷處誤吞竹木

棘刺井水磨下 解諸般惡毒用新汲水

磨下此藥收得年深愈見神效蔡道後云

合添白色新磚厠坑浸壹年愈久妙無則

廁窖底磚亦可水洗淨並用火燒細碾五

斤為末同前藥為丸

治中砒毒生麻油壹盞飲之不能飲者灌之

立可起死忌雞鵝肉數日又濃煎豆豉

湯灌之立解

治索粉片粉積右紫蘇濃煎汁加杏仁肥和

散

治糝糞為積右麩末即酒餅藥為末加少木香末

鹽湯調服口有酒香食積去矣

治中竇毒同菰毒用左纏藤本草名忍冬取枝梗

前汁服又治癰疽腫毒尤妙或傅或服

治河豚魚毒白礬末湯點服河豚能殺人服

此毒自消累用效

治中鱧蟹蝦蟇毒五味子生為末壹二錢井

水調下

中砒霜毒其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲

吐不吐面口青黑四肢逆冷命在須臾黑

鈇四兩磨水壹碗灌之如無前藥用青藍

兩握細研以井水調一碗灌之又無青藍

用清麻油二升許灌服其毒即解又無清
油掘地用水作漿濃喫壹二椀其土黃色
者佳

烟霞聖效方

食魚中毒煎橘皮湯服之即差

食諸魚肉中毒以蘆根煎湯服之即差

食獸肉中毒以豉五合杏仁數枚嚼出汁再

服即差

食牛羊肉中毒煎甘草湯飲之即差

山居四要同

飲水中不記物中毒腹脹煩悶者以苦酒煮
苦參壹升服之即差

食蠡中毒者煎紫蘇湯及瓜汁服之即差

吳氏集驗辨毒

解毒二劑謝水與粥

黃白散治驢涎馬汗中毒物

白礬

二錢

飛黃丹

三錢炒

紫色

右為末塗患處如絲油調

百足散解食著蛇餘毒腹中痛不可忍

赤足蜈蚣壹條甘草

右等分爲末冷水調壹錢

生薑散解附子川烏草烏半夏毒

黃生薑壹分大豆壹分煮熟

右等分二味搗水與服

桔梗湯解野葛毒

桔梗甘草

右等分濃煎湯冷服

犀角飲治諸毒或喉閉邪氣惡毒入腹

雄黃壹分麝香少許

右煎犀角汁研服

水銀散解五金毒癩眼赤心躁

水銀一分輕粉壹分甘草末壹錢

右用茶清點服

伐陰湯解菌簞毒

縮砂壹分枳壹分生薑半兩甘草壹錢

右咬咀作膏服水二盞煎壹盞服

神水解巴豆毒止瀉凡服巴豆瀉赤脚立新

蘇波水中瀉即止

山居四要

解飲食毒

昔鱸魚鯉魚忌荆芥地漿解之

蟹忌红柿主吐血生藕汁解之

誤食桐油用熱酒解之乾柿及甘草亦可

凡中蠶毒連服地漿水解之

食魚膾過多成虫痕大黃汁陳皮末調煎湯

服之

諸果毒燒猪骨爲末水調服

食菜中毒用雞糞燒爲末水調服或煎甘草

汁或葛根汁飲之

又方用梅花瓣子末水調之或柳杏子煎

炙弄瓦味子自熬末水調之

中河豚魚毒青黛水藍青搗汁或槐花末三

食錢煎汲水解之齊白三兩餘煎出隨汁

凡中魚毒煎桶皮湯或黑豆汁或大黃朴硝

煎薑根汁皆可解之

誤食合口花椒服醋解之

又方煉猪脂油壹兩每服壹匙火湯水調下
食狗肉中毒者以杏仁三兩為泥熱湯調作
中三服

食馬肝中毒者水浸絞絞汁解之

凡中馬肉毒搗蘆葦汁解之或嚼杏仁或飲

好酒皆可

食雞子毒醇醋解之

中鴨肉毒煮秫米汁解之

中蟹毒以冬瓜汁或生藕汁或乾蒜汁蘆根

食汁或紫蘇湯解之

食馬肉心悶者飲清酒解之

食猪肉毒飲大黃汁或杏仁汁杜確汁解之

解諸食毒搗韭汁服

中鳩鳥毒生匾豆末溫水下

又方葛粉水調下又生螺汁解之

食諸般肉過傷者燒其骨水調服或蕪荖汁

生韭汁解之

凡解諸般毒先以香油灌之令吐即解

中諸肉毒壁土木壹錢服木蘭洲及蘇合

又方燒白匾豆末可解

凡飲食後心煩悶不知中何毒者急煎苦參

汁飲之令吐

又方煮犀角湯飲之或以苦酒或好酒煮飲

食之

食麪後當食蘆服解麪毒不宜食麪濕蓋麪

之毒在湯也

中砒毒寒水石菜豆粉末以藍根研水調下

衛生易簡方或單用菜豆糲小服

中丹藥毒服四物湯香蘇散各一貼和煎服

之或萱草根或瓜萇根研汁飲之

中附子毒黑豆菜豆濃煎湯飲之

中諸藥毒川生姜甘草黑豆淡竹葉等分水

煎連服

急救仙方

解百毒及諸食應于毒

甘草二兩

水三盞煎減半去滓停冷每服半盞細細

飲之未效更服或吐無害 壹方加大豆

同煎尤驗

解百毒及閩廣挑生金蠶蠱毒之

甘草長七寸四十九莖浸廁坑中四十九日

淨洗為末密圓瓶收遇中毒時口中嚼化

即解衛生易簡方同

解砒毒青黛甘草烏豆煮水三碗服木醋下

又濃煎豆豉湯灌下

又川錫器粗石上磨水服錫丸磨水尤妙

單用楊梅皮煎湯二三碗服可

解諸藥毒死此証只要心間煖不妨乃是熱

物犯之州防風壹味衛生易簡方一二兩搗冷水與

服

一方白扁豆花搗水服衛生易簡方同

又方豆粉調水米糖調水生姜搗水服皆可

衛生易簡方但不

解鼠莽毒木藍根搗水數碗服即染澱青根

又方烏柏根搗水服之安 鏡面草豈味搗

自然汁小酒一盞許清油對停攪勻服之

卽下毒物三五次以肉粥補不可遲

解巴豆毒煮黃連汁飲之

解蒙汗毒飲冷水卽安

解附子川烏天雄毒煮大小黑豆汁飲之

解斑猫毒煮大小黑豆汁飲之玉簪花根搗

水亦能解諸毒

解食野菌毒甘草節不拘多少用麻油壹盞

煎一次衛生易簡方勿令黑冷服油卽解

神仙解毒丸方

青黛 自然銅 野茨菇田內生者 貫衆 川

芎 麈粉壁土 黃連 桃根去皮用骨

兵郎 赤小豆 菘豆 新磚 新瓦

磚瓦須用新出者經水者先置廁中浸二

七又於流水中浸二七晒乾別研以上十

三味各二兩仲 甘草節壹兩仲

右研爲末訖用錫器磨水和藥却用糯米粉煮落湯糍擣和爲丸煮糍時以在水中浮爲度搗三千杵每丸加彈子大磨水服壽域神方

藥毒部

誤中砒霜毒黑鉛四兩磨水一碗灌服卽解其毒如無黑鉛只用單方青搗兩握研細以井花水調壹碗灌服如無青搗只用麻油二升許灌服其毒卽解

壹方掘地坑入大糞汁絞地漿澄清壹碗冷飲立效

解諸藥毒白扁豆生晒乾爲末新汲水調服二錢未效再作一服

中蕪菌毒兼河豚毒用陳壁土湯泡澄清冷飲之煎蘆根湯飲之嚼橄欖三五枚解之又掘地坑用水攪汁冷飲之立效中椒毒凡椒閉口者殺人不可服用大蒜搗水冷飲之葵汁豉汁煮桑根汁皆可只飲

冷水亦可

服藥過劑煩悶及中毒刮東壁土少少以水一二升和飲之妙

壹方於屋雷下作坑方二尺深三尺以水七盞灌坑中以物揚之令沫出取一盞飲之未解更作

壹方持取藍汁服數盞無藍只洗青絹取汁亦可

治服石藥過劑者白鴨屎末和水調之妙

壹方用大黃三兩芒硝二兩生地黃汁五盞煮取三盞分三服得下便愈

藥中有巴豆下利不止用乾姜黃連爲末服方寸匕瘥

一方煮豆汁壹盞服之妙

中藜蘆毒用雄黃葱汁並可解之
中巴豆毒川黃連小豆藿汁大豆汁並可解之
之甘草湯亦解之

中食毒部

肉有箭毒搗韭汁服二三盞各連取以少水
和之藍汁亦可服

食竹雞竹雞中半夏毒用生姜搗汁折齒而
灌之卽活

治食鬱肉謂在密器中縮者及漏脯茅屋汁
露脯爲漏此並有毒燒人屎末酒服方寸

匕又煎大豆汁一沸飲汁數盞解諸毒

治食魚中毒濃煮橘皮飲汁冬瓜汁亦妙

治食菌遇毒絞人屎汁飲壹盞卽活服諸吐

利丸亦佳又掘地作漿水服二三盞甚妙

金石毒部

凡服金石有燥熱者皆以冷水洗數百遍熱
有所衝水漬布巾隨以搭之妙

若心腹內有諸一切疾痛違常煩悶昏恍者
急解之定冷熱取溫酒壹二鍾漸漸稍進
覺小寬更進冷食其心痛者最急若肉冷
口已禁但折齒下熱酒妙

若腹內有結堅熱癖使衆疾者急下之梔子

十四枚豉五合水二碗煮取一碗頓服之
熱已甚發瘡者加黃芩二兩甚妙

食金已死者取雞屎半升淋得一升飲之日
三服

壹方吞水銀二兩卽裏金出少者一兩只吞
壹服一兩三度服之扶坐與之令入腹卽
活

壹方煮大豆汁多飲如無大豆豉亦佳
治服丹石之人有熱瘡疼痛不可忍者用紙

環圍腫處中心填砂石令薄用匙抄新水
淋之覺其不熱卽止

衛生易簡方

中諸毒物

治開剝驢馬涎毒入肉害人甚大用赤檉條
卽赤荆火炙津出以津汁塗之卽差

又方用月經衣燒灰爲末溫酒調服無時

治中箭毒交廣俚人以焦銅作箭鏃傷皮卽
死及蛇毒射肉潰塗箭鏃被傷卽宜便飲

屎汁亦宜塗傅余者難救

治誤飲饌中毒未審何毒用貝子壹枚含口內卽自吐出毒

治食牛羊肉中毒用甘草濃煮汁服壹二升當愈

治誤食諸毒草并百物毒用板藍根四兩貫衆青黛甘草各壹兩爲末蜜丸如桐子大以青黛別爲衣如稍覺精神恍惚惡心卽是誤中諸毒急用此藥十五丸爛嚼新汲

水下

治凡中毒及蛇蟲咬傷急服此藥則毒氣不聚用好青黛雄黃等分爲末新汲水調二錢服
又方用白菟豆青黛甘草等分巴豆壹邊去殼不去油同爲末以沙糖壹大塊水化開調壹大盞飲之毒隨利去却服五苓散之類

治中砒毒煩燥心腹絞痛頭旋欲吐不吐面

青黑四肢冷川青藍壹握細研井花水壹
椀揉汁灌之

又方用麻油一椀灌下

又方用地漿濃服二三椀

又方用楊梅皮煎湯二三椀服

治中諸藥毒用四物湯香蘇散各壹貼和煎

服或萱草根研汁飲之

治中烏頭巴豆毒用甘草煎湯入腹卽定

治中砒毒及巴豆毒門藍根沙糖相和搗水

服或更加少薄荷汁尤妙

治中砒毒鼠莽毒用金綿重樓磨水服或川

烏柏根搗水亦好

治中諸毒用黃連甘草節水壹椀煎服

治中烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志防風

棗肉飴糖並能解之

治食馬肝牛肉中毒用人乳和豉汁服之神

效

治食自死烏獸肝中毒用頭巾垢一錢匕沸

湯化服之

治壹切草藥毒用白藹豆生嚼及煎湯服

治食諸毒肉吐血不止痿黃甚者用葱子壹

升洗煮使破取汁停冷服半升日夜各壹

服血定止

治食水芥中毒川飭粳米杏仁乳餅煮粥食

壹二碗日三服吐出蛟子有兩頭

治藥毒上攻川蜂房甘草等分麩炒黃去麩

為末水二椀煎膏椀臨臥溫頓服明日取

下惡物

治百藥毒用甘草薺芫藍汁藍實大小豆汁

治射菌毒用藍汁豆汁竹瀝大麻子汁六畜

血用商州蚯蚓糞藕芰汁服

治野葛毒用雞子清葛根汁甘草汁猪膏若

命已死口噤者以大竹筒盛冷水注兩脇及

臍上暖輒易之須臾口開藥入口便活用

薺芫汁解之

薺芫汁解之

治癰疽疔毒川猪膏大豆汁或拉藍汁服

治蕘毒用薺芫甘草汁犀角蟹汁服

治食諸肉馬肝漏脯中毒用生韭汁韭根燒

末頭垢燒猪骨末燒犬屎酒服鼓汁亦佳

治食金銀毒用鴨血雞子汁服水銀數兩即

出小淋雞屎汁服

治食諸魚中毒用橘皮汁大豆汁馬鞭草汁

蘆葦根汁大黃汁煮朴硝汁及鮫魚皮燒

末調服

治百毒及食諸物中毒用甘草二兩生剉細

水三盞煎減半去滓停冷每服半盞細細

飲之未效更服或吐無妨壹方加大豆同

煎尤驗

備預百要方

食毒方

凡解毒之藥必須停冷然後服之如當危急

服湯熱則不能解毒

凡諸食毒煮黑豆飲汁

又甘草解百藥毒麤剉二兩水二椀煎至減半飲之

又濃者薺苳飲汁

又考藍汁飲之
又諸食毒用黃龍湯及犀角煮汁飲之
又飲馬尿

又燒人糞為末酒服方寸匕
野芋毒掘地作坑攪水令濁飲之
又食牛肉中毒方狼牙灰水服

又齋深燒灰水服壹錢

諸因食毒方藥末酒服二合

又鼓作汁服之亦可

又三尺下土新汲水和服之

又煮取上清服

水陸肉毒方盧根搗取汁及煮服之壹盞差

為度露地者殺人

又牛馬肉毒方飲人乳

又狗肉毒方杏仁二兩去皮尖雙人細研熟

又湯三椀攪和冷分三服又尖雙入喉和服

又燒猪骨灰水下之并

醬肉及漏脯中毒方凡肉在密器中經宿者

水為醬肉茅屋漏滴沾脯者為漏脯並有大

毒并

又生薤汁服之并

六畜肝毒方用豉煮汁溫服單服猪亦良

食蟹中毒方食冬瓜飲汁加妙

又生藕汁及紫蘇汁服良

食魚中毒方煮橘皮湯飲之

又大豆煎服之

又食膾不消方持生姜收汁小與水和服

又葱蒜姜芥生醬作齏音齊服壹小盞音

菌毒方地上生者謂之地瘡木上生者謂之

木瘡地上者上醬解木上者白木湯梨葉

食湯並解之喫生瓜解之無生者研實入水

服

又赤小豆煮飲音

藥聖藥

卷三

又水腫消腫

及風濕骨痛

治一切瘡毒

治一切瘡毒

酒病門

目錄

論非難題

千金方

聖惠方

治飲酒大醉不解諸方

治飲酒中毒諸方

治惡酒諸方

治飲酒腹滿不消諸方

草薺散 高良薑散 訶梨勒散 益

類聚類書

卷三

效身集

智守散
高良薑
益

治飲酒後諸病諸方

大全本草

瑄粹錄

治酒毒方

東垣試効方

論酒客病并治法

葛花解醒湯

御藥院方

益皮丸

澹軒方

酒渴

酒毒

吐酒

酒後吐血

肘後方

治卒飲酒大醉諸病方

居家必用

類聚

白豆蔻丸

必用全書

香橙湯

法製香藥

醉鄉寶屑

拔粹方

百杯丸

酒病門

袖珍方

菴脾丸 葛花散 丁沉丸 沉香丸
烏梅丸 和氣丸 縮砂丸 鵬砂丸

消酒藥

壽親養老書

醉鄉寶屑

經進八仙散 丁香餅子 石膏湯 蘿

蔔菜

吳氏集驗方

諸湯

類聚

卷

韻姜湯 八神湯 椒梅湯 消暑湯

育神湯 四奇湯

事林廣記

解酒毒

壽域神方

酒積部

衛生易簡方

酒病

御醫撮要

白乳湯 草豆蔻湯 沉香湯 金露湯

玉液湯 龍腦湯 參苓湯 生姜湯

餘藥無名者散見本方

禁忌

導引

類聚

卷

雜

類

酒病門一
直指方
酒家有病勿用温藥
有人飲酒過多因酒作病胸膈不快其氣捫
隔服無數二陳湯竟無寸效由是不喜飲食
後以調氣散投之致發大熱自後只用薄荷
煎雞蘇圓麻人圓日就痊愈乃知胸膈閉隔
熱在上焦使然耳又有人酷好飲酒復感寒
邪服不換金正氣散以致內熱愈熾煩渴且

酒病門一

直指方

酒家有病勿用温藥

有人飲酒過多因酒作病胸膈不快其氣捫
隔服無數二陳湯竟無寸效由是不喜飲食
後以調氣散投之致發大熱自後只用薄荷
煎雞蘇圓麻人圓日就痊愈乃知胸膈閉隔
熱在上焦使然耳又有人酷好飲酒復感寒
邪服不換金正氣散以致內熱愈熾煩渴且

悶汗出如雨身體怯寒續後以小柴胡湯加枳殼白芍藥解之柴胡黃芩退熱枳殼寬中芍藥調榮止汗頓然痊愈然則酒家抱病其可妄以溫藥嘗試豈中乎

傷冷酒

戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野有以煮酒饋予者適村落無

湯器冷飲數升便覺在脇下悶漸痛結硬至今不化鍼灸磨藥殊不得力戴人診其兩手脈俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二三升色如煮酒香氣不變後服和脾散去濕藥五七日百脈沖和始知鍼灸無功增苦楚矣

壽親養老書

戒夜飲說

酒古禮也奉祭祀會賓親製藥餌禮有不可

缺者用之有時飲之有度豈可以爲常而不
知節哉禮經賓主百拜而酒三行者蓋重其
道而不容輕故爾豈令人浮沉於其中乎予
家祖父處世養生惟務淡薄皆享年八九十
上下予自幼年性喜恬退今又七十餘矣飲
酒至壹二盞纔夜卽睡明早卽起居常旣罕
病且康健亦自知節戒之功然也人生天地
間貧賤者多貴而富豈易得哉倘能戒夜飲
順陰陽正寤寐保精氣使一身神識安寧百

邪不侵安享天年豈不幸歟好生君子審而

察之

此序見陳氏經驗方不記何人所作

臞仙活人心

養生之法

酒雖可以陶情性通血脉自然招風敗腎爛
腸腐脇莫過於此飽食之後尤宜戒之飲酒
不宜麓及速恐傷破肺肺爲五臟之華蓋尤
不可傷當酒未醒大渴之際不可喫水及啜
茶多被酒引入腎臟爲停毒之水遂令腰脚

重墜勝脫冷痛兼水腫消渴攣臂之疾大抵
茶之為物四時皆不可多喫令人下焦虛冷
唯飽食後喫壹兩盞不妨蓋能消食故也飢
則尤宜忌之

千金方

治酒醉中酒恐爛五臟方以湯著槽中漬之

冷復易夏亦用湯備預百要方同○肘後方大醉

恐腹腸爛作湯於大器中以漬之冷復易

又方搗茱萸根汁飲壹二升

又方凡醉不得安卧不動必須使人搖轉不

作特忌當風席地及水洗飲水交接肘後方備

預百要方同

治飲酒頭痛方竹茹五兩以水八升煮取五

升去滓令冷內破雞子五枚攪勻更煮三

沸飲二升肘後方使盡瘥○聖惠方治當

風飲酒頭痛方竹茹五兩右以水五大盞

煮取三盞去滓令冷內雞子清五枚攪令

勻更煮二沸分為三度飲之

治飲酒腹滿不消方煮塩湯以竹筒灌大孔中

治飲酒中毒方煮大豆三沸飲汁三升○聖

惠方右煮黑豆汁温服一小盞三服差瑣

碎錄煮大黑豆一升取汁三二升服立吐

即愈事林廣記同朱氏集驗方飲酒中毒經日

不醒者用黑豆壹升煮取汁右每服壹小

盞温服不過三服備預白要方煮黑即愈

今人所謂中酒也

又方酒漬乾椹汁服之聖惠方每服一小盞三服即差○壽

親養老書解酒乾桑椹二合用壹升浸壹

時久取酒旋飲之即解大寒凝海惟酒不

冰酒大熱不可多飲邵康節詩又云斟有

淺深存燮理飲無多少繫經綸在老人斟

酌間何如耳

治病酒方合宜昔藥以水二大盞煮以少

葱白各壹升○肘後方各未升不獨式效常合意

右二味以水四升煮取壹升頓服○肘後

方水二升煮收壹升頓服壽域神方衛生易簡方同聖

惠方治酒醉備預百要方經宿不醒方豉壹合葱

白切壹合右件藥以水二大盞煮取壹盞

去滓涓涓飲之

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲

酒不已酒入百脉心氣虛令人錯謬失常方

芍藥八人參壹白薇壹栝樓根壹枳實壹

知母各貳兩甘草壹兩生地黃八兩酸棗人半升茯

神三兩外壹作茯苓

右十味咬咀以水壹斗煮取三升分三服

○聖惠方人參散方人參壹兩去蘆頭赤芍藥

兩壹蘇蘇根壹兩白薇壹兩枳實壹兩炒壹兩麩壹兩知母壹兩

伏神二兩生乾地黄二兩酸棗人壹兩甘草壹兩

到右件藥持麓羅為散每服五錢以水壹

大盞煎至五分去滓溫溫頻服

治連明飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻人壹兩黃芩二兩用黃蘗後

右二味為末蜜和丸含之千金翼用○聖

惠方大麻入三兩黃芩二兩右件藥搗羅為

末鍊蜜和丸如半棗大不計時候含壹丸

燕津備預百要方麻入黃芩蜜和含之

治酒醉不醒方飲葛根汁壹斗二升取醒止

○肘後方大醉酒連日煩毒不堪方生葛

根汁壹二升乾葛煮飲亦得壽親養老書

解酒葛根細剉作麤末每服三錢水壹盞

煎去滓溫服衛生易簡方治酒毒川野葛

根切作片細嚼或煎湯服亦止渴解大熱

飲酒令人不醉方

栢子人各二兩麻子人各二兩

右二味治下篩為壹服進酒三倍○聖惠

方栢子仁壹兩大麻子人一兩右件藥搗篩為

散以小壹大盞煎至六分去滓放溫都為

服比常時乃進酒三倍肘後方欲使難

醉醉則不損人方搗栢子人麻子人各二

合壹服之乃以飲酒多二倍

又方御藥院方葛花散小豆花各等分

右二味合為末服御藥院方飲服三方寸匕百要

服速醒填碎錄服飲時仍進聖惠方欲葛

根汁芹汁及枇杷葉飲聖惠方並能倍酒

○聖惠方右件藥搗細羅為散每服三錢

以溫酒調服之肘後方欲使難醉醉則不

損人方葛花并小豆花子末為散服三二

匕又時進葛根飲枇杷葉飲并以雜者乾

蒲麻子等皆使飲而不病人胡麻亦煞酒

先食搗壹匕後則飲酒亦倍衛生易簡方

治酒病及飲酒不醉用赤小豆花曷花為

末服方寸匕終日不醉

又方九月九日菊花為末臨飲服方寸匕御藥

院方同○聖惠方九月九日收菊花搗末臨

飲酒時先以水調下二錢肘後方治酒醉

不醒九月九日真菊花末飲服方寸匕運

玄樞壽域

又方小豆花葉陰乾百日為末服之御藥院

○聖惠方小豆花葉陰乾搗羅為末每服

水調下二錢

又方五月五日取井中倒生草枝陰乾為末

酒服之聖惠方酒調二錢服之

飲酒令無酒氣方乾蔓菁根二枚聖惠方備預百

要方三三徧蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健噴方聖惠方備預百要方噴怒不醒空井中倒生

草燒灰聖惠方百要方細研水調二錢飲之勿令知

又方取其人牀上塵和酒飲之聖惠方同

斷酒方

柳花 臘月鼠頭灰

右二味等分為末黃昏時酒服壹杯聖惠方水

調三錢與服

又方酒七升聖惠方五升著瓶中熟朱砂半兩著

酒中急塞瓶口安著猪圈中任猪搖動經

七日取酒盡飲肘後方同

又方正月壹口酒五升聖惠方二升淋碓頭擣一

下聖惠方取飲之後肘方壽域神方同

又方故氈中葶耳子七枚燒作灰黃昏時暖

壹杯酒聖惠方此下有呪言與病狂人飲入在其中四字

也勿令知之後不喜飲酒也

又方白猪乳汁壹升飲之永不飲酒聖惠方同

又方刮馬汗和酒與飲終身不飲

又方虎屎中骨燒末和酒與飲聖惠方同

又方鷓鴣屎燒灰水服方寸匕聖惠方同

永斷

又方取毛鷹壹過吐毛水煮去毛頓服

又方故紡車絃燒灰和酒與服聖惠方同

又方驢駒衣燒灰酒飲方寸匕肘後方同○醫林

方驢駒衣用水洗淨又用酒浸晝宿取出

窻乾燒灰為細末每服三四錢溫酒調下

待三二日見酒惡心嘔逆為效

又方自死蟬螬乾搗末和酒與飲聖惠方一錢永

世間酒名即嘔神驗

又方酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

又方酒漬汗靴替壹宿平旦空腹與飲即吐

不喜見酒

又方白狗乳汁酒服之聖惠方同

又方臘月馬腦聖惠方和酒服之

聖惠方容中內小外劍游末州之

世治飲酒大醉不解諸方

凡飲酒過多酒毒漬於腸胃流溢經絡使而
脉充滿令人煩亂嘔吐無度乃至累日不醒
往往有腹背穴穿者是酒熱毒氣所為故飲
酒須搖其身以消散也
治酒醉不醒方右以菘菜子二合細研以井

華水壹大盞調之分為二服肘後方同

解酒毒或醉昏悶煩渴要易醒宜服此方壽親

養老書名

枳子皮一兩洗焙乾。肘後方養老書二兩

右搗細羅為散遇酒醉不醒抄三錢以水
壹中盞煎三五沸或入少塩花如茶旋呷
未効更服

治飲酒中毒諸方

夫酒性有毒人飲之有不能便消令人煩毒

悶亂是也 凡人為之昏不識物今人限書

治飲酒大醉中毒方

枳椇子樹枝 三兩 剉

右每服壹兩以水壹大盞煎至五分去滓

溫服

又方右用乾葛花半兩為末煎作湯細呷之

瑣碎 ○壽親養老書解酒葛花一兩搗為

散沸湯點壹大錢匕不拘時亦可煎服

治惡酒諸方

夫酒者水穀之精也其氣慄悍而有火毒入

於腸胃則張氣逆上滿於胸內焦巢氏病於

肝膽故令肝浮膽橫而狂悖變怒失於常性

故云惡酒也

治惡酒噴怒不醒方右以雞子清二枚生吞

之

又方右搗甘蔗取汁每服壹小盞

又方右搗生葛根取汁每服壹小盞

治飲酒腹滿不消諸方

夫酒性宜通而不停聚者故醉而復醒隨血
脈流散故也人有榮衛否澀痰水停積者因
復飲酒不至大醉大吐故酒與痰相搏不能
消散故令腹滿不消也

治飲酒過度嘔逆不止心腹脹滿宜服草荳
蔻散方

草荳蔻 十枚 去皮 高良薑 三分 剉 人參 壹兩半 去蘆頭 白
茯苓 二兩 去白瓢焙 青橘皮 三分 湯浸
右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓點少塩攪勻
不計時候服之

治飲酒後脾虛心腹脹滿不能消化頭疼心
悶宜服高良薑散方

高良薑 壹兩 去蘆頭 人參 壹兩 去蘆頭 草荳蔻 三分 去皮 白
木 半兩 湯浸 沉香 三分 乾紫蘇 兩半 陳橘皮 半兩 湯浸 去白瓢焙
右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治飲酒後痰滯心膈不利腹脇脹滿宜服訶

梨勒散方

訶梨勒皮壹兩 草荳蔻半兩 人參半兩 去皮 桔

梗半兩 去蘆頭 乾木瓜兩 桂心兩 甘草兩 微赤

木香壹分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分煎至六分去滓微温細呷

之

治飲酒過多腹脹滿不消心下痞急妨悶宜

服益智子散方

益智子三分 縮沙三分 香茱三分 草荳蔻三分

去皮 丁香兩 乾木瓜三分 陳橘皮半兩 湯浸

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹中

蓋入生姜半分煎至六分去滓微温細呷

之

治飲酒大醉心悶腹脹吐逆喘急宜服此方

草荳蔻三分 丁香兩 小豆半兩 人參半兩 去蘆頭

木香兩 高良姜兩 陳橘皮半兩 湯浸 檳

榔兩

右作藥搗篩爲散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服
治飲酒後諸病諸方
夫酒性有毒而復大熱飲之過多故毒熱之
氣滲溢經絡浸漬腑臟而生諸病也或煩毒
壯熱而似傷寒或酒漸惡寒有同溫瘧或吐
利不安或嘔逆煩悶隨藏氣虛實而生病焉
病候非壹故云諸病也

凡大醉不得安卧必須使人搖動不住恐酒
毒腐其腸宜服此方右以生茅根搗絞取
汁每服一小盞頻服之

治連日飲酒喉咽爛舌上生瘡方右以蔓菁
菜二棗以少米熟煮去滓放冷內雞子清
三枚調勻飲之二三盞無雞子亦可單飲
之

又方右取水巾螺蚌蚶以葱豉椒姜煮如常
食法飲汁壹二盞卽解

又方右擣生葛根汁及葛藤和絞汁飲之無
濕者乾者煎服亦佳乾蒲煎服之亦佳
大全本草

圖經白素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣
名曰酒風治之以澤瀉朮各十分麋銜五
分合以二指撮爲後飯後飯者飯後藥先
謂之後飯

經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處則
下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小

蠻得此方效

楊梅主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲
又酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱
瑣碎錄

治酒毒方

去酒毒細嚼葶藶澄茄爲妙

又方附子天南星並各四錢用生薑八片水
二盞煎八分壹盞服之大驗

又方乾葛廿松菜豆末蛤粉大解酒毒

又酒毒遍身黃腫者左靈脂壹兩為末入麝

香少許負如豆大煉霞聖効方簡奇方每

又十員米飲下經驗良方此

又有人患酒積纔飲即腹痛百藥無效壹日

行速而渴路傍買生葛食忽不痛後食數

日除根是知葛能敗酒也

又方甘蔗去皮去節截作段子擘作兩片川

小布袋盛之就橙上開槽用板壓之出漿

大解酒渴

中酒方用蜜浸烏梅多啖乃醒

又方食巴欖能醒酒

又方煮赤小豆汁熱飲○衛生易簡方治酒

病用赤小豆煮汁熱飲即愈久服令人枯

燥粉去油污衣甚妙菓食明目

治酒厥忽暈倒以生薑汁灌之即甦○澹軒

方酒厥頭旋倒不知莫教誤作別科醫生

姜多搗自然汁溫灌喉中立起之

治叶酒方先服養脾貧一占即不吐

又方食銀杏亦不吐酒一古酒不吐

又方桑樹止木耳以新瓦焙乾為末糯米飲

調下酒後飲時不吐又方煎黃耆建中湯冷飲自後吐酒必希問

壹服之則終身不吐酒介四日

東垣試效方治酒後吐酒

論酒客病并治

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若

傷之則止當發散汗出則愈矣此最妙法也

其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何

酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸人熱

之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元氣

受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已

傷元氣而復重瀉之況亦損腎水真陰及有

形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈

弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消

亡七神何依斯人長命雖不即死而虛損之

病成矣金匱要略云酒疸下之久久為黑疸

慎不可犯此戒不若令止下分清其濕常以

葛花解醒湯注之引命藥不唱及而盡其

葛花解醒湯拔粹方治飲酒太過嘔吐痰逆

飲食減少 小便不利

白朮半兩 砂仁半兩 乾生薑二錢 葛花半兩 白茯苓

苓壹錢 木香半錢 陳皮去白壹錢半 青皮去剝三錢 東

垣辨或拔粹方 猪苓去黑皮壹錢半 人參去蘆壹錢半

白朮二錢 澤瀉二錢 神麴炒黃二錢

右為極細末秤和勻每服二錢匕辨或蘭

寶鑑拔粹 白湯調下但得微汗酒病去矣
此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此
方氣味辛粹偶因酒病服之則不能損元
氣何者敵酒病故也勿頻服之損人天年
御藥院方

益皮丸飲酒不醉又益脾胃

葛花二兩 小豆花壹兩 菜豆花半兩 木香一分

右為細末白蜜為丸如梧桐子大煎紅花

湯下十丸或夜飲津液下五丸不醉大妙

澹軒方

酒渴

酒渴多多要覓漿生收桑葉煮為湯祇如熟
益永時時飲屏去樽罍便不妨

酒毒

解酒葛花小豆花二花為末服亦佳不然細
嚼牛根葛也好細嚼華澄茄

吐酒

吐酒桑間木耳奇焙於瓦上細研之糯湯調

服三錢許杏仁多餐也自宜

酒後吐血

酒後吐血似狂瀾酒毒薰蒸腸胃間有藥能
安煎一服理中湯下養正丹

肘後方

治卒飲酒大醉諸病方

飲後下痢不止煮龜骨飲之亦可末服

飲酒積熱滋發黃方雞子七枚苦酒漬之封

密器中內井底二宿當取各吞二枚枚漸

盡愈 壽域神方同

大醉酒連日煩毒不堪方蔓菁菜并少米熟煮去滓冷之便飲則大良

居家必用 治飲酒過多

白豆蔻九治飲酒過多

白豆蔻仁 縮砂仁 乾葛 橘紅 甘

草 炙各壹兩 蜜曲律 二兩如無以葛花代之

右為細末用生蜜為丸如雞頭大如甚醉可用酒或白湯化壹二圓服之立醒

必用全書

香橙湯寬中快氣消酒

大橙子 三片子去核切作 檀香末 半兩 生姜 兩

切半片子連皮用 甘草末 二兩

右二件用淨砂盆內研爛如泥次入白檀末甘草末並和作餅子焙乾碾為細末每用一錢鹽少許沸湯點服 必用之書同

法製香藥

醉鄉寶屑解醒寬中化痰

陳皮四兩 縮砂仁四兩 紅豆壹兩 粉草二兩 生

姜壹斤 丁香壹錢 葛根三兩 白荳蔻仁四錢

到壹兩 巴豆十四粒 鐵線穿皮 鹽壹兩

右件用水二椀煮耗乾為度去巴豆眼乾

細嚼居家必用白湯下必用之

拔粹方

百杯丸治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾飲食不進日漸肌瘦如飲酒者先收此藥百杯不醉亦無諸痰

生姜壹斤 去皮切片子紅皮 三兩去 廣

茂炮 乾姜三兩 益智仁二拾 丁香五拾 甘

草二錢 京三稜炮 三拾 縮砂仁三拾 木香

茴香炒 各壹錢 白荳蔻仁三十

右為細末煉蜜為丸每一兩作五丸朱砂為衣生薑湯下細嚼無時

醫方類聚卷之一百六十四

醫方類聚卷之一百六十四

醫方類聚卷之一百六十四

醫方類聚

卷之

一百

六十四

醫方類聚

卷之

一百

六十四

