

增補病機沙篆目次

雲間李中梓士材父原本

吳門尤乘生淵增較新鐫

上卷

中風類中

中寒

中暑中熱

中氣中食

虛勞

欬嗽吐血

傳尸療症

痰喘

噎膈反胃

呃逆

嘔吐噦

霍亂

脹滿

水腫

瘡

痢

泄瀉

厥逆

下卷

頭痛

眩暈

心痛

腹痛

腰痛

顛狂

瘡癰

怔忡驚悸恐

健忘

不得寐

不得食

自汗益汗

痿痺

肩背臂膊痛

脇痛

脚氣

遺精

赤白濁

消渴

赤白帶

痴


癩痕

積聚痞痺

淋癃

前陰諸疾

後陰諸疾



病機沙叢卷上

雲間李中梓士材父著述

吳門尤乘生洲父增補

中風

風之爲言中也肥人氣居於表中氣必虛土不生金金氣漸薄肝無所畏風木乃淫復來乘土中氣益敗乘其中虛外邪襲之則爲真中西北方風高往往有之若但因中虛不犯外邪則爲類中東南方柔弱往往有之

內經曰風者百病之長又曰風者善行而數變故客於厥

則爲厲風客於藏府之俞則爲偏風風氣循風府而上則爲脳風自腦戶而合於太陽則爲目風飲酒見風汗出則爲漏風入房汗出當風則爲內風入於腸胃則爲腸風外客腠理則爲泄風

正風邪風各不相同經云正風者從一方來卽合時之正者也其中人也淺合而自去邪風者冲後來者也謂之虛邪賊風其中人也深不能自去

經曰暴病卒死皆屬於火東垣以卒然昏仆責之氣虛蓋火卽氣氣卽火同物而異名者也當卒仆之時以竹瀝薑

汁灌蘇合香丸或三生飲加入參竹瀝薑汁灌之加抉口
不開進藥且緩以細辛皂角爲末吹鼻取嚏卽甦無嚏者
不治

痰涎壅盛者宜與吐之用牙皂四枚明礬一兩各爲細末
和勻輕者五分重者三錢溫水調灌此名稀涎散服之不
大嘔吐但微微令涎自口角流出卽醒或橘紅一斤煎湯
數碗多灌取吐○口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎
絕聲如鼾者肺絕此虛極而陽脫也五症不全見者速以
大劑參芪朮附并急灸臍下閔元氣海可救十中之一

髮直吐沫搖頭上擗面赤如粧汗出如珠皆死症矣

經曰虛邪偏客於身者其入深營衛稍衰則真氣去邪氣獨留發爲偏枯又曰身偏不用爲痛言不變志不亂病在分腠之間益其不足損其有餘乃可復也卽中府症名曰辨之爲病也身無痛處但四肢不收志亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也卽中藏症外有六經形症則以小續命湯加減及疎風湯治之小續命亦麻黃桂枝之變麻桂二湯施於溫熱之症必致殺人不可執也後列

太陽經無汗惡寒者麻黃防風杏仁甘草有汗惡風者郝

枝防風芍藥甘草陽明經無汗身熱不惡寒者白芷石臺
知母甘草有汗身熱不惡風者葛根桂枝黃芩甘草如在
太陰經則無汗身涼乾薑附子麻黃防風少陰經則有汗
無熱桂枝附子甘草麻黃杏仁防風若無此四經之症或
在少陽厥陰柴胡防風羌活甘草連翹如上症真中者分
表裏施治而在裏者則便渺四隔宜三化湯枳實厚朴羌
活大黃若表裏俱見者先與解表而後攻裏若外邪已解
內邪已除而語言蹇澁半身不遂未能卽愈以六君子湯
加羌防歸地芍藥秦艽久服之營衛自和卽古所云大

藥是也再加麻黃卽一旬之微汗加大黃卽一旬之微利
如望春大寒之後加半夏人參柴胡木通迎而奪少陽之
氣也如望夏穀雨之後加石膏知母黃芩迎而奪陽明之
氣也如季夏濕土主令加防己白朮茯苓勝脾土之濕也
如望秋天暑之後加厚朴藿香官桂迎而奪太陰之氣也
望冬霜降之後加桂附當歸勝少陰之寒也

治風之法不過解表攻裏行中道三法盡矣然風氣不齊
稟賦各別七情異起六氣殊傷活法處治不可膠執也
古人用平黃丸至寶丹活命金丹晶類皆辛
一癲爲斬

關奪門之將原爲中藏之閉症設也半黃入脾治肉鹿醫
入腎治骨水片入肝治筋此惟邪氣深入者乃爲出矣若
施之于中府氣虛脫絕之症反掌殺人如人旣入井而又
下石安得不立斃乎

類中之症其卒倒偏枯語言蹇澁痰涎壅盛背與真中風
相類故曰類中但無六經形症爲異耳此惟中氣虛憊故
虛風內煽所致東垣主虛誠爲合論河間主火丹溪主痰
其言各殊而不知其虛也故無根之火發焉惟其虛也故
逆上之痰生焉東垣舉其本河間丹溪道其標似異而實

同也心火涼膈散肝火小柴胡湯水虛火炎六味地黃湯
類中之卒倒偏枯症類雖有多種總由真氣不周充血液
因而逆泣也參芪君之歸地佐之更以秦交茯神竹瀝人
乳薑汁梨汁最爲穩當

凡治中風須分陰陽陰中者其色青或黑或白痰喘昏迷
弦冒多汗甚者手足厥冷陽中者面赤唇焦牙關緊急上
視強直掉眩煩渴

凡人大指次指麻木不仁三年之內必患中風須預防之
宜慎起居節飲食遠房幃調性情更以十全大補湯加姜

活久久服之經歲不輟則潛移默導弭災却疾矣若用古法天麻丸愈風丹開其玄府漏其真液適足以招風取中耳預防云乎哉

口禁不開足陽明額頰之脈偏急則口禁不能開肝風乘胃故也皂角乳香黃芪防風煎湯薰之須大作湯液如蒸如霧乃得力耳再以南星水片爲細夫擦其牙根或藜蘆鬱金爲末搐鼻或明礬一兩飛鹽五錢研匀擦牙又可將錢許綿裹安牙盡處又法甘草五寸截作五段麻油浸透火炙挾口令咬之約人行十里許又換一截從此灌藥爲

便

口眼喎邪耳鼻常靜故風息焉口鼻常動故風生焉風搖則血液衰耗無以榮筋故筋脈拘急口日爲僻皆急不能卒視人參黃芪當歸白芍升麻秦艽葛根防風鈎藤紅花蘇木水煎和酒服外用桂枝三兩酒煎濃汁以故布浸之乘熱左盃揭右右盃揭左再以乳香二兩皂角一兩拌勻燒烟薰之

語言蹇澀經曰足太陰之脈貫舌本散舌下病則舌強又足少陰之正直者係舌本又曰內奪而厥則爲瘡瘍又腎

厥之氣不上循喉挾舌本則不能言用地黃飲子地黃
甘草芩葛茱黃同桂枝附子荅芍麥冬五味伏苓菖蒲遠
志石斛脾土不足痰涎壅盛言蹇澀者六君子湯加南星
木香乾葛枳實遠志竹茹挾熱者山楂連芩花粉荅薄

四肢不舉其脈緩大有力者土太過也平胃五芩散主之

其脈細小無力者土不及也補中益氣湯主之隨症加減
身體疼痛挾濕熱者當歸拈痛湯羌防升葛知茯草猪澤

茵陳及苦參人參二朮當歸并湯名拈痛有奇勲挾寒者
鐵彈丸乳沒各一兩烏頭泡去皮靈脂酒淘淨加射荅荷

宜挾虛者十全大補湯加秦艽身重氣虛也補中八味治之周身盡痛者蠲痺湯歸芍薑黃與羌活甘草黃芪薑棗煎身重之症時師止知燥濕而不知補虛按素問示從容論篇歷言肝虛腎虛脾虛皆令人体重煩冤是以身重乃虛症也不止于濕可盡耳

痰涎壅塞星香二陳爲主益治痰以順氣爲先挾虛者加參芪竹瀝挾寒者桂附薑汁養正丹鎮安元氣下墜痰涎實者星香湯送下虛者六君子湯送下

遺尿不禁脾虛下陷者補中益氣湯加益智腎虛不能收

攝者地黃飲子合參麥散

善飢多食風木太過凌虛中州脾土受攻求助於食法當
瀉肝安脾則復其常矣青皮芍藥木胡山枝人參白朮甘
草茯苓更當隨時審症而爲之變通也

神氣昏冒痰涎逆衝於上心下被障故昏不知人此係中
藏而非中府閉症而非脫症宜牛黃丸清心肺等治之大
參麥冬茯神胆星山藥白朮甘草羚羊角犀角雄黃朱砂
牛黃冰射金箔大棗打膏加蜜爲丸或至聖保命丹管仲
一兩生地七錢大黃五錢青黛板藍根各三錢朱砂雄黃

同鬱金薄荷各一錢五分。珍珠冰片各一錢五分。射一錢。
煉蜜丸。金箔爲衣。煎方宜六君子湯加南星。木香菖蒲遠
志肉。竹瀝薑汁服之。又有厥逆昏迷因醉飽過度而得者。日食中莫作中風中氣治之。

外治急救涎潮方。凡男婦卒然。口倒。涎潮於心。不省人事。
當時卽扶入室中。令其正坐。用好醋斤許。碎入炭火中。熏
之。令其氣入口鼻。其涎自歸。經其人漸醒。切不可用薑湯
及滴水入口。如水一入。逆其痰涎。永繫於心。成痼疾矣。

史國公酒方。治左癱右瘓。四肢頑麻。骨節痠疼。一切寒濕
風氣。及腎虛足膝無力。並宜服之。當歸。羌活。虎脰骨。防風。

鱉甲、秦艽、萆薢、牛膝、桂仲、蚕砂各二兩、枸杞一兩、白芍根八兩、無灰酒一斗、絹袋盛藥入酒浸十日、重湯煮三番、又竇五日服之無間、頗收效驗。

中寒之症相似、中風比之傷寒更爲深重、身體強直、或口禁戰慄、甚則厥逆無知、先以薑汁好酒或加水射灌之、如輕用麻黃、蒼朮、枳朴、薑桂或薑汁湯重則薑叶湯并以艾灸丹田冗、腹中痛加木香、筋急加木瓜、凡中寒之人先宜與溫水、若遽與熱水及近火卽死。

中氣七情所傷氣逆痰潮卒然昏仆與中風相類但中風

身溫多痰涎脈浮應人迎中氣身冷無痰涎脈沉應氣口
以氣藥治風則可風藥治氣則不可急以蘇合丸灌之候
甦用八味順氣散白芷茯苓人參甘草青皮陳皮烏藥白
芷加香附薑棗或木香調氣散有痰者星香散如其人本
虛痰氣上逆閑格不通宜養正丹水銀朱砂鉛硫四味等
分用鐵器熔鉛入水銀以柳木杵和勻次下朱砂再和勻
不見星入硫急研成汁有焰用醋灑之候冷細研糯米糊
丸如棗豆大若作中風治之誤矣經曰無故而瘖脈不至
者不治自己謂氣暴逆也氣復自愈當與厥症互看如因

風寒者。藿香正氣散。白芷。茯苓。紫蘇。腹皮。霍香。厚朴。白朮。半夏。陳皮。桔梗。甘草。薑棗煎服。

中暑因在暑月。其症卒暴面垢。冷汗出手足微冷。昏暈或吐或瀉或喘或滿以來復丹治之。硝石同硫一兩爲末。入磁器內微火熔柳條攬用火不可太旺。恐傷藥力。再研極細。名曰二氣丹。加太陰玄精石水飛五靈脂水飛青皮。橘紅各二兩。先用青皮。橘紅。靈脂爲末。次入玄精及二氣末。好醋打糊爲丸如豌豆大。每服三十九。或蘇合丸用白朮。犀角木香。附櫟香。沉香。朱砂。水飛訶子。煨去皮射香。丁

香單撥安息用酒熬膏龍腦熏陸香另研蘇合油各一兩
右除安息膏蘇合油煉蜜和劑其餘共爲末丸如芥子大
以蠟固匱用時取出湯調灌之卽甦稍甦再以香薰扁豆
厚朴陳皮煎服此症外陽而內陰故用辛溫取其通竅也
中熱僵什勿與涼水及涼物如寒氣一逼卽死須安置於
近日暖處取路上熟土放其脣上作窩令人溺尿於中或
用大蒜研爛同熟土爲湯去查灌之或將日晒熟瓦熨其
人心腹及脣下勞役動作之人多得之

中暑靜而逸者得之陰症也頭疼惡寒拘急肢節痛煩心

無汗無大熱宜天順散乾薑甘艸杏仁厚朴香薷動而得
之爲中熱陽症也身熱煩躁惡熱大渴多汗無氣以動宜
蒼朮白虎湯蒼朮石膏知母甘草粳米虛人以補中益氣
湯爲主虛人有房勞者禁香薷

中暑忽然不省人事宜灸百會中脘三里脾俞合谷人中
陰谷三陰交斟酌用或針亦可

冒暑大熱霍亂吐瀉百勞委中合谷曲池三里十宣等穴
酌選針灸

左右癱瘓痺厥偏枯半身不遂筋掣痰泄針用肩頸合谷

曲池 環跳 風市 足三里 絶骨 昆崙 陽陵泉

中風痰涎壅盛聲如牽鋸服藥不下者宜灸關元 丹田 二穴多灸之爲妙

忽然中風不知人事宜以十宣穴出血卽醒

乃十指頭
端井穴

預防中風灸法用風池 百會 曲池 合谷 肩頸 風市 足三里 痛骨環跳 已上等穴灸之大妙

天麻風針法灸法及服藥方法另有專書秘本

虛勞

黃帝曰。陽虛生外寒。不知其由然也。岐伯曰。陽受氣於上焦。以溫皮肉。分肉之間。寒氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留於外。故寒慄。

帝曰。陰虛生內熱。奈何。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下腕不通。胃氣熱。熱氣薰胸中。故內熱。

帝曰。陽盛生外熱。奈何。岐伯曰。上焦不通利。則皮膚痏客。腠理秘塞。立府不通。衛氣不得泄。越故外熱。

帝曰。陰盛生內寒。奈何。岐伯曰。厥氣上逆。寒氣積于胸中。

而不瀉不瀉則溫氣去寒氣獨留則血凝泣凝泣則脈不通其脈盛大以濇故中寒

夫人之生也陰血爲營陽氣爲衛二者運行而無壅滯病安從生若力用不休則龍雷二火逆僭至高故勞字從火曲運神機則心勞而爲虛汗怔忡縱情房室則腎勞而爲骨蒸遺泄恣睢善怒則肝勞而爲痛痺拘攣形冷悲哀則肺勞而爲上氣喘嗽動作傷形思慮傷意則脾勞而爲少食多痰形羸神倦故勞者必至於虛虛者必因於勞

古稱五勞七傷六極二十三蒸症狀繁多令人眩惑但能

明先天後天根本之治無不痊安。簡而不繁約而無泥者也。大人之虛非氣卽血。五藏六府莫能外焉。然血之源頭在乎腎。蓋水爲天一之元而人資之以爲始者也。故曰先天氣之源頭在乎脾。蓋土爲萬物之母而人資之以爲生者。故曰後天二藏安和則百脈受調。一藏虛傷則干病競起至哉斯言可爲後學司命之指南也。

土爲金母而金爲主氣之官故肺氣受傷者必先求助於脾家。水爲木母而木爲藏血之地故肝血受傷者必由借資於腎府。

虛勞之症扶脾保肺兩不可缺然脾之性喜溫喜燥而溫燥之劑不利於保肺肺之爲性喜涼喜潤而涼潤之劑不利於扶脾兩者並列而論脾有生肺之能肺無扶脾之力故曰土壯而生金勿拘拘於保肺○瀉火之亢以全陰氣壯水之主以鎮陽光法當並行然瀉火之品多寒而損陽氣非不之劑多平而養陰血兩者並列而論苦寒過投將有敗胃之憂甘平恆用却無傷中之患故曰水盛而火自熄勿亟亟於寒涼○症如煩渴喘呼脈則數大有力當潤肺爲主而扶脾佐之症如食少善泄脉則細數無力當扶

脾爲主而保肺佐之甚則保肺之劑不利於脾當塞主之
却宜補土之母庶可與其回春全在明辨其症之何如變
通以治之可也

春夏之令主生長秋冬之令主肅殺人皆知之殊不知藥
之溫者行天地發育之德藥之寒者象天地肅殺之刑如
四物加知柏舉世奉爲滋陰上品降火神丹不知秋冬之
氣非所以生萬物者也涼血之藥常暯滯非痰多食少者
所宜涼血之藥常滋潤必至滑泄腸鳴况知柏苦寒苦先
入心久而增氣反能助火至于滑泄敗胃所不待言丹溪

云實火可瀉虛火可補試問勞症之火屬之虛乎屬之寔乎瀉之可乎昔有云畏知柏如鳩毒恐伐吾命根耳如病初起而相火正隆或燥渴而右尺滑大亦暫投之却無妨也若久用之則斷乎不可○或問血主濡潤四物湯豈非濡潤而爲血虛乎○答曰血虛而燥用四物以濡之未嘗非合劑也但恐用之久而多則在上有泥膈奪食之憂則在下有滑腸泄瀉之患目土氣之令鮮發育之功也○或問氣有餘便是火補氣之藥能無助火乎古云正氣與邪氣原不兩立猶低昂然一勝則一負正氣旺則

邪氣無所容。如滿座皆君子。一小人白。無容身之地。

或問人參補氣至王好古言其肺熱傷肺。至節齋謂虛勞症服參者必死。天下皆稱人參有毒。視參如蝎。其說是否。答曰。肺家本經有火。右寸大而有力。東垣謂熱鬱在肺者勿用。若肺虛而虛火乘之。肺已被傷。苟非人參。何以救之乎。故好古之說猶爲近理。節齋之言膠柱鼓瑟。千古之罪人也。至謂人參有毒。庸俗多有是言。不知誰爲作俑。真堪噴飯。

或問血虛自應補血。專以氣藥爲主。得無在乎。答曰。血虛

應投血藥乃爲正法。但專用多用中州有礙。至於以氣藥爲主。似乎相左。不知素問云無陽則陰無以生。仲景曰身熱亡血。身涼脈凝血虛。並加人參。蓋血脫者須益氣爲血。不自生。須得陽和之藥。乃生陽生而陰長也。若只用血藥。則血無由而生矣。東垣云。人參甘溫補脾。脾氣旺則四藏之氣皆旺。精自生而形自盛也。白飛霞云。人參多服回元氣於無何有之鄉。凡病後氣虛及肺虛喘嗽者。並宜用之。若氣虛有火。宜與麥冬同服。楊起云。人參功載本草。人所共知。古方治肺寒以溫肺湯。肺熱以清肺湯。中滿分消湯。

血虛養營湯皆用人參庸醫每謂人參不可輕用誠哉庸也自本經以至諸家諱三言之以氣藥有生血之功血藥無益氣之理可謂詳切著明奈何人不悟耶

人有先後兩天補腎補脾法當並行然以甘寒補腎恐妨胃氣以辛溫快脾恐妨腎水須衡其緩急而爲之施治或滋腎而佐以沉香砂仁快脾雜以山藥五味機用不可不活也脾具坤順之德而有乾健之運故游溢精氣上輸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行則水源從此沃矣且脾不下陷則精氣固而二便調伊少陰奉之得以

全閉蟄封藏之本故脾安則腎愈安矣此許學士所以補腎不如補脾之說也腎兼水火水不挾肝上浮而陵卑監火能益土善運而奉精微故腎安而脾愈安矣此孫思邈所以有補脾不若補腎之說也此兩說者皆有見於根本重地亟用堤防特爲虛勞家設一大炬也

五藏之熱各自不同○肺熱者輕手卽得略重全無肺主皮毛也日西尤甚其症喘欬灑淅善寢善悲缺盆痛胸中痛肩背痛臂痛脣右脹痛小便頻數皮膚痛及麻木實則

夢兵戈虛則夢田野實則瀉之桑皮葶藶只壳蘇于防風

之屬虛則補之人參黃芪麥冬五味茯苓山藥百合紫苑
之屬形寒飲冷則傷肺溫之以乾薑款花木香豆蔻之屬
涼之以沙參元參知母貝母黃芩山梔花粉兜鈴之屬○
心熱者微按之皮毛之下肌肉之上乃得加力按之則全
不熱心主血脉也日中尤甚其症煩心心痛堂中熱而噦
善忘善笑善驚不寐築二然動舌破消渴口舌心胸間汗
實則夢驚憂怖恐虛則夢烟火焰火虛則補以丹參圓眼
茯神麥冬當歸山藥實則瀉以黃連憂愁思慮則傷心溫
之以桂心益智菖蒲柏子仁涼之以犀角牛黃竹葉朱砂

連翹○脾熱者輕手固不熱重按亦不熱熱在不輕不重
之間脾土主肌肉也遇夜尤甚其症怠惰嗜臥四肢不收
無氣以動泄瀉便秘面黃舌強痛口甘吐逆不噴食不化
食捨心善味善飢善噫當臍痛腹脹腸鳴肉痛足腫實則
夢歡歌快樂虛則夢飲食相爭飲食勞倦思慮則傷脾虛
則以人參黃芪白朮茯苓甘草山藥扁豆苡米陳皮補之
實則以苦朮厚朴只實山楂青皮兵郎大黃芒硝瀉之畱
附子桂溫之元明粉石膏滑石黃芩涼之○肝熱者按至
肌肉之下筋骨之上乃得肝主筋也寅卯時尤甚其症多

怒多驚便難轉筋掣急四肢困熱滿悶筋痠不能起頭痛
耳聾頰腫面青目痛兩脇痛小腹痛嘔逆作酸羗疝胃疼
善瘧實則夢山林大樹虛則夢細草苔蘚阿膠山藥棗仁
木瓜補之青皮芍藥柴胡龍胆青代黃連木通瀉之心則
傷肝木香肉桂吳茱萸溫之甘菊車前山梔柴胡黃芩涼
之○腎熱者輕手捫之不熱重按至骨乃熱亥子時尤甚
腎主骨也其症腰膝脊俱痛耳鳴遺泄二便不調骨痠不
能起眇中清目昏面黑口乾咯血飢不欲食腹大脛腫脣
股後痛小腹氣逆下腫腸澼陰下濕痒手指青黑厥逆足

下熱嗜卧坐而欲起善怒四肢不收實則夢腰脊解軟虛
則夢泄及渡水恐懼地黃枸杞桑螵蛸龜板山藥山萸牛
膝桂仲五味子補之澤瀉知母瀉之肉桂附子補骨脂肉
蓴蓉鹿膠沉香溫之知母黃柏丹皮骨皮涼之強力坐濕
則傷腎腎傷須重補之骨碎補補骨脂虎胫骨何首烏地
黃之屬○經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月
其傳爲風消其傳爲息責者死不治三陽爲病癸寒執下
爲瘡腫及爲痿厥腨痛其傳爲索罩其傳爲頽疝一陽發
病少氣善欬善泄其傳爲膈二陽謂足陽明胃子陽明大腸也二陽之病發于心脾心

在上焦病則不利故不得隱脾在中焦病則脹滿故不得曲肱心爲主血之元脾爲運化之府若在女子必不月矣不日經水不下也傳日久傳變也言上病日久則本必乘虛而克賊之脾上日虧而肌肉日見消削故名風消心病日久則傳于肺金受火邪則息氣不利而奔迫故名息責脾土虛而受木克心火盛而克肺金皆不治之症矣○三陽謂手太陽小腸足太陽膀胱也爲病不發于他藏自爲寒熱也小腸爲丙火膀胱爲壬水故耳水病則凝結火病則糜爛故下爲瘡腫也無力爲痠逆冷爲厥膿足腹也痞瘦疼也其傳爲索墨墨腎丸也索引丸而痛也頽疝者頑大而不疼也○一陽謂手少陽三焦足少陽胆也二經病發皆是火火盛則少氣金虛則咳作大腸燥金亦失其令故反泄也傳爲心掣心引而動也膈塞也上焦不行下脘不通鬲塞于中故名膈也

經曰春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從

之而上也

下氣身半以下之氣上爭者陽搏陰激也身半以下之氣亦引而上爭不能復謂不能復歸其經也溢下者陰精之氣湧溢泄出而上

因中部氣衰從之而上乘其虛故奪也

中虛陽氣衰不能

滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也

四肢諸陽

之本衰則俱衰故合于足爲寒厥也

岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主爲胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營其四肢也陰五藏之陰陽四支之陽精氣竭五藏之陰氣竭也此人必數醉飽以入房氣聚於脾不得散酒氣與穀氣相搏熱盛於中故熱偏於身內熱而溺赤也夫酒氣盛而漂

悍腎氣自衰陽氣獨勝故手足爲之熱也

脾肾強暴也
腎氣陰氣也

岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也

邪寒

其寒從飲食入胃由肺脈上至於肺則肺寒肺寒

則外內合邪因而客之則爲肺欬

所云形寒飲冷則傷肺也

五藏各以

其時受病非其時各傳以與之

如春肝用事則肝先受邪若是寒邪則傳以與肺

肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血其心欬之狀欬則心

痛喉中介如便狀甚則咽腫喉痺而肝欬之狀欬則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾欬之狀欬則右

胠下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇腎欬之狀

欬則腰背相引而痛甚則欬涎○五藏之欬久乃移于六
府脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔嘔甚則長虫出
肝咳不已則胆受之胆咳之狀咳嘔胆汁肺咳不已則大
腸受之大腸喎狀咳而遺矢心咳不已則小腸受之_{欬狀}欬而
失氣氣與欬俱失腎咳不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而
遺溺○久歟不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲
食飲此皆聚于胃關于肺使人多涕唾而浮腫氣逆也
三焦者人身上下中元氣之所在其氣卽火故名三焦久
咳不已則傷其元氣而邪受之故咳而腹滿不欲食所以
然者三焦火衰不能生胃土也土虛則三焦虛邪皆入于
胃而萬物歸上之象屬於肺者言關係于肺也土虛而不

能制水故多涕吐肺衰則不能施降下之令故面目浮腫而氣逆也

張仲景曰五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食凡食傷寒傷欲傷房室傷飢傷勞傷經絡營衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛天黃驥虫丸主之大黃驥虫桃仁乾漆蠅虫水蛭蟻螬以破瘀地黃芍藥以潤其乾燥甘艸緩中黃芩杏仁利肺益肺主行營衛陰陽者也肺氣利則乾血去而營衛行營衛行則肌肉充而虛勞補矣○按虛勞發熱未有不由於七情之內傷者人之起居飲食之間一失其節即有所傷何況拂逆心志鬱結暴怒豈無血畜耶

故以滋潤之品治乾枯以噉血之物行死血死血既去病根已剗而後可從事於滋補仲景爲醫方之祖不可不繹其言也

活法機要云虛損之疾有寒有熱皆因虛而感也○感寒則損陽陽虛則陰盛故損自上而下一損損於肺故皮聚而毛落二損損於心故血脈虛衰不能營養藏府女人則月水不行三損損於胃故飲食不爲肌膚治之宜以辛甘淡○感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上一損損於腎故骨痿不能起于牀二損損于肝故筋緩不能自收持

三損損於脾故飲食不能消化也。接心肺損則色弊。肝腎
損則形痿。脾胃損則穀不化也。如肺損而皮聚毛落者宜
益其氣。四君子湯。心肺俱損皮聚毛落而血脉虛耗宜益
氣和血。八珍湯。心肺胃俱損飲食不爲肌膚。十全大補湯。
腎損骨痿者宜益精。金匱丸。肝損筋緩宜緩中平膝丸。肝
腎脾俱損益精緩中消穀。溫腎丸。陽盛陰虛腎肝不足宜
八味丸。瘦弱困倦未辨陰陽。夏月宜六味丸。春秋宜加減
八味丸。冬月八味丸。肺熱鼻乾紫苑二冬。烏梅等皮膚熱
舌白吐血乘皮石恙。肌膚熱昏寐嗜臥丹皮。骨皮氣熱喘

促鼻。草人參。黃芩。枝子。大腸熱。右鼻孔乾痛苦。硝大黃等。
脈熱。吐血。經絡脈溢緩急不調。生地。當歸。心熱。舌乾。生地。
黃連。血熱發焦。地黃。當帰。桂心。童便。小腸熱。下唇焦木通。
赤茯。生地。脾熱。上下唇俱焦。芍藥。木瓜。苦參。胃熱。食無味。
而幅。煩躁不安。芍藥。口熱。舌下痛。石膏。竹葉。大黃。芒硝。葛根。
梗米。肝熱。眼黑。川芎。生地。前胡。筋熱。甲。焦。生地。黃。川芎。
胆熱。眼白失色。柴胡。栝萎。三焦熱。乍寒乍熱。煨石。羔竹葉。
腎熱。兩耳焦石羔。知母。生地。元參。腦熱。頭眩。悶暈。羌活。防
氣。荆芥。地黃。薄荷。苦菊。髓熱。骨髓中沸熱。二冬。鱉甲。生地。

骨皮元參知母當歸骨熟薑黑腰痛足冷痙蟲蝕藏骨皮
鱉甲生地當歸肉熟取細跌腫藏府俱熱石膏黃柏胞熱
小便黃赤生地滑石木通茯苓燈草膀胱熱左耳焦澤瀉
茯苓滑石○玄珠云一水既虧不勝五火虛症蜂起當先
和解微下次則調補若邪氣未除便行補劑邪入經絡良
可歎也惟無邪無積之人按脈無力者方可補之。

陳藏器諸虛用藥例

虛勞頭痛身熱枸杞萎蕤虛而欲吐人參萎蕤虛而不寧
人參茯神虛而多夢龍荳人參圓眼虛而多熱地黃甘艸

牡蠣地膚子虛而冷川芎當歸乾薑虛而損巴戟蕷客鍾
乳虛而大熱天冬黃芩虛而多忘遠志茯神虛而口乾麥
冬知母虛而吸吸柏子仁胡麻覆盆子虛而驚惕龍齒沙
參小草若兼冷紫石英小艸虛而多氣兼微欬五味大棗
虛而客熱沙參龍齒天冬虛而腰間不利杜仲狗脊磁石
陳皮虛而便失龍骨桑螵蛸虛而溺白厚朴虛而小便不
利人參柴苓澤瀉髓竭地黃阿膠當歸枸杞肺虛二門冬
五味心虛人參茯神菖蒲圓眼丹參棗仁當歸肝虛川芎

天麻當歸脾虛白朮白芍山藥益智腎虛熟地丹皮遠志
胆虛細辛地榆棗仁神昏朱砂茯神

五藏雖皆有勞心腎爲多心主血腎主精精竭血枯則勞成矣惟宜滋養培補調心益腎雄附之性峻烈內之精血何堪當此雖云壯火適足以發其虛陽然又不可因其熱而純用寒涼以傷胃氣若過用熱藥者猶釜下無火而進火也過用寒藥者猶釜中無水而反害之宜十全大補湯養榮湯建中湯皆可選用如左尺獨虛者六味丸壯水之主以制陽光右尺不足者八味丸益

火之元以消陰翳

丹溪之論勞瘵主乎陰虛未嘗非也。陰虛之熱以其在午後子前。謬云朝涼暮熱也。陰虛則汗從寐時盜出也。陰虛無以制火。則火氣逆上。喘嗽而吐痰也。陰虛則脈浮大或沉虛也。四物湯加黃柏知母。主之以四物補血。血爲陰。又以如柏降火理固然也。不知後人以此槩施。多致大枉。不察變通而累丹溪也。蓋川芎上竄非火炎者所宜。地黃膩滯非痰多食少者所宜。知母易於滑腸。黃柏易於敗胃。暫投猶可。久用必傷。予今製一主方。以苡米茯苓扶胃且切。

降下之功以桔梗陳皮行氣且有健脾之力麥冬五味保肺而有滋化之原骨皮丹皮除蒸而無寒涼之害痰喘以桑支川貝止血以童便藕汁泄瀉以山藥蓮肉燥結以人乳梨汁此以甘涼之品行降收之令爲初病者設也若久病而百脈空虛火亢炎非甘溫之品不能復其真元宜異攻散是也非濡潤之物不能滋其枯朽地黃丸是也○若少氣懶言目昏面白宜生脉散及甘桔湯頻二啜之若病久而結痰成積腹脇常熱惟頭面手足於寅卯時乍涼宜六君子湯加薑汁竹瀝送滾痰丸三錢先以湯潤丸令

其易化可分兩三次服不得頓而過多○有面色不衰肌膚不瘦外若無病內寔虛傷俗名桃花症須察其現在何症何藏受傷而後治之○勞症久嗽咽痛失音此乃下傳上也不嗽不痛溺濁脫精此乃上傳下也皆非吉兆○形色尪羸陽事不禁脈細無根脈數無倫死在旦夕矣、

吐血分五藏○悲憂所致欬嗽吐血者出於肺二冬二母甘桔主之○思慮所致痰涎帶血者出於脾石斛生地黃丹皮甘艸陳皮茯苓黃芪葛根主之○因驚所致而吐血者出於心丹參生地麥冬當歸山藥茯神主之○因怒脈

致而吐血者出於肝柴胡芍藥山楂生地丹皮當歸沉香
棗仁主之因房勞而咯血者出於腎生地丹皮黃柏知母
阿膠遠志茯苓主之因中氣失調邪熱在中而嘔血者出
於胃犀角地黃丹皮甘草元明粉主之

陽經之血色鮮紅陰經之血色猪肝○血本屬陰靜而定
者其常也其行則潛如水之流而在下者亦常也上行外
出其變也七情妄動形體疲勞陽火相迫以致妄行脈洪
口渴便結者宜行涼藥若使氣虛挾寒陰陽不相爲守血
亦妄行必有虛冷之狀蓋陽虛則陰亦走也宜理中湯加

木香烏藥若飲食傷胃上逆吐衄宜理中加香附砂仁山
楂神曲調之

內經論凡寒暑燥火六氣之变皆能失血各當求責若不
察其所因例以寒折變乃生矣

吐血之初多宜大黃下之夫血以下行爲順上行爲遂蓋
因曲爲直也然又曰亡血虛家切禁下之何也宜下者
下於畜妄之初禁下者禁於亡失之後不可不明辨也
積勞吐血及久病之餘吐而多且不止者並以獨參湯主
之血脫補氣之去也如血從九竅齊出亦脫也以髮灰生

薌汁人參湯調服止之或血溢及觸破破傷遂如泉湧惟用十全大補湯頻頻多服

血症既久古人多以胃藥收功加烏藥沉香大棗此虛家神劑也○氣有餘便是火血隨氣上補水則火自降順氣則血不升生地牛膝丹皮補水之藥也橘紅蘇子沉香順氣之藥也童便者濁陰歸下竅兼有行血之能藕汁者達血使無滯更有止瀉之力○脉來沉實腹痛中滿必有瘀畜紅花桃仁赤芍玄胡當歸蓬朮降香之屬

○怒傷肝木則血菀於上令人薄厥沉香木香丹皮青皮

芍藥之屬○勞傷心神以麥冬棗仁柏仁蓮心茯神遠志
丹參竹葉之屬○飲酒所傷以葛根白蔻砂仁側柏葉茅
花之屬○房勞所傷以地黃牛膝枸杞杜仲人參之屬○
血中有火生地丹皮芩連之屬○血中有寒色黯脈遲宜
八味丸理中湯之屬

止血分治 煙者涼之以山枝灰黃連灰血灰瘀者行之
以大黃灰靈脂灰漆灰血灰寒者溫之乾薑灰血灰滑者
濇之棕間灰荷葉灰虛者補之地黃灰當帰灰髮灰之類
藥性不同三七鬱金行血中之氣花蕊石能化瘀爲水側

柏葉涼血中之熱大小薊行血中之滞茅根導之不行百草霜取其黑色以制其紅而止之也

傳戶勞者鬼作蟲而爲祟者也凡人之元氣虛衰或因弔喪問疾登塚入廟邪崇乘虛憲依爲患漸至生蟲蟲在身中食人府藏五日一退方具猖獗神氣昏悶無處不疚其退則還穴睡五日如蠶之眠也病則乍靜治之候其退睡時可也一月之中上旬十日蟲頭向上中旬十日蟲頭向內下旬十日蟲頭向下須在上旬治之易爲力也中下二旬治之無功先食人脂膏故蟲色白皮聚毛落肺受侵傷

七十日後食人血肉蟲色黃赤肌肉損壞枯索脛羸百二十日後血肉食盡蟲色紫黑食人精髓腎敗骨瘦諸蟲日久遍身生毛毛色五采傳之三人卽自能飛狀如禽獸品類甚多出入自如隱現莫測大抵至食精髓雖有良法亦不能治經云六十日治十得七八八十日治十得三四過此以往焉保生全惟當搜逐爲後日人除害耳

傳尸之症沉沉默默無一而可經年累月漸就羸困至於死亡又傳旁人乃至滅門又傳他姓慘毒之禍聞者駭心辨驗之法須用乳香焚熏病者之手令其微掌以帛覆之

熏之良久手指生毛長至寸許白而黃者可治紅者則難
青黑者死若熏之良久無毛者非傳尸也乃是尋常虛勞
之症○又法用燒安息香令烟出與病人吸之嗽不止者
乃傳尸也如不嗽非傳尸也嗽不甚者亦非也

驅蟲方室女頂門活髮洗去油垢一兩紙燃燒存性川芎
五錢當歸五錢木香桃仁各三錢安息香雄黃各一錢全
蝎二枚大黑魚頭一枚醋炙右爲末分作四服每服以井
水一大碗於淨室中煎至七分入降香末五分燒北斗符
人藥月初五更空腹向北仰天呴曰 療神療神害我生

人吾奉 帝敕服藥保身急二如律令呪五遍面北服藥
異東面吸生氣入口腹中燒降香置床下午時又如前服
藥念呪生氣卽太陽真氣也

北斗

敕

乙卯

用黃紙

一方將新筆一枝净水研

朱砂書此符書時亦須念前呪

俟乾將火焚于湯藥中面北念呪

服之服畢向東吸太陽氣入口腹

右依法服之厚蓋取汙汙中有細蟲以軟綿拭之卽用
火焚其絹如大便用淨桶盛之急鉗取蟲烈火煅過取
灰收人罐內以雄黃末蓋上再用瓦油盞含口铁線紮
定泥固封好埋于遠僻絕人行處深三尺爲度

療蟲爲患最易傳染人能謹戒七情嚴避六氣常遠房室
節飲酒食蟲不可得而染也若縱欲恣情精血內耗邪崇
外入凡覺元氣稍虛或飢餓時勿近療疾之家及衣服器
皿而皆能染觸之或有頑病思男男病思女一見其面隨
卽染傷不可不知也

治療之法固本爲先驅蟲爲次安息阿魏蘇合沉香水射
犀角朱砂雄黃皆有祛邪伐惡之能更須以天靈蓋助之
蓋尸氣淹纏得枯骨導之使鬼氣飛越於是乎瘥舛則以
虎牙狸骨水獺穿山甲全蝎蜈蚣皆猛厲之品可以奪尸

蟲之魄要之先以苦蹄血餘散之於根本之地爲要

○驅蟲灸法用鬼眼穴令病人舉手向上略轉後些則腰間有兩陷可見卽鬼眼也以筆點記於六月癸亥日亥時灸此穴七壯勿令人及病人先知乃靈其外肺俞二穴同膏肓二穴亦能祛蟲

虛勞吐血及咳逆上氣灸上腕肺俞如年壯

鼻血不止急于項后髮際兩筋間宛二中灸三壯立止蓋血由此而上入腦注鼻也灸之則截其路卽啞門穴也

咳嗽針肺俞列缺太淵痰多屬濕者取豐隆穴氣逆作喘

取三里降氣一灸舟車七壯

夫人但知血熱妄行不知血寒亦吐乃陰乘於陽名心肺

二經嘔吐者灸用三陰交心俞鬲俞少商神門

冷嗽補合谷鴻三陰交

寒嗽久不愈灸取膏肓脉俞天突三里

肺瘡吐血膿炎取膻中肺俞支溝大陵

欬嗽紅痰列缺百勞肺俞中腕足三里針灸皆可

痰喘

痰火上壅喘嗽發熱足反冷者眼消痰降火藥必死宜量

其輕重用人參一兩少則三五錢佐以桂附煎湯候冷飲之立愈韓懋所謂假對假真對真也然此實由腎中真水不足火不受制而炎上桂附火類也下咽之初借其冷意暫解鬱熱及至下焦熱性始發從其窟宅而招之同氣相求火必下降自然之理也苟非人參君之則不能奏功或問寒因熱用熱因寒用何謂也寒熱和而平氣寒熱離而爲病氣因用者則是寒熱過脈處也

喘主肺鬱痰與氣搏肺竅壅塞或脾胃氣虛金失所養故呼吸不相續而爲喘也又寒主遲緩熱主急數寒則息遲

氣凝熱則息數氣急故喘

丹溪曰喘急者氣爲火鬱而有積痰于脾胃也。

程玠曰痰嗽者嗽便有痰出勞嗽者益汗面赤火嗽者乍進乍退寒嗽者鼻塞聲重。

治渴必須益血益血卽津液所化津液既少其血必虛故須益血凡吐血之後多必發渴故渴病生於血虛也。

針法見前



噎膈反胃

補論

噎膈反胃多因於內傷憂鬱失志及恣意酒食縱情勞欲以致陽氣內結陰血內枯而成也經曰三陽結謂之膈三陽者手太陽小腸手陽明大腸足太陽膀胱也蓋小腸熱結則小水短少而火氣不洩大腸熱結則大便不利而鬱熱難除膀胱熱結則津液不行而道路蹇澁三陽並結則前後之氣不行下既不行邪火上逆火上逆則煎液生痰痰涎生則往來之氣愈阻而嘔逆噎膈之症起矣且也重傷之以七情更感之以六氣或不戒炙焯肥厚之物或妄

投辛香燥熱之劑遂致邪火愈熾津液愈結病情愈深豈易療哉須分上中下三焦以治之夫咽嗌梗塞氣不順利水飲可行食物難入其槁在吸門名之曰膈其或食下則胃脘痛作煩悶不安須臾吐出食出而安其槁在竇門名之曰噎二者屬上焦其或食雖可下良久復出其槁在於幽門名曰反胃此屬中焦其或朝食暮吐暮食朝吐所出完穀小便赤大便鞭或如羊矢其槁在闌門亦名翻胃此屬下焦然壯者猶或可治當用透膈疎氣化痰清火健胃和脾之劑經又曰噎膈多生於血乾反胃亦生於脾弱東

垣曰。脾陰也。血亦陰也。陰主靜。內外兩靜。則府藏之火。何
陰而生。金水二藏有養。陰血自生。腸胃津液傳化合宜。何
噎膈之有哉。

夫張雞峰之論噎膈也。其言曰。此症是神思間病。治須內
觀。靜養乃始得。旨蓋百病之因多兼六淫而成。噎膈則惟
以七情所致。由於飲食者亦間有之。治之之法。非無開胃
止吐。養陰潤燥之方。然病在神思。所謂心病。還須心藥也。
內養者。外之對此症向來事。外忘內。未嘗收攝。此心或爲
利鎖。名韁。或爲酒沉色困。以致五藏空虛。氣無所主。食不

能入。入亦反出。若不垂簾返照及怡裏偷閒。濃中着淡。何由屏絕諸魔。然以眼觀內。則眼雖閉而神或外馳。以心觀內。則心有定而眼可不閉。夫是之謂內觀靜者。動之對此症。素因多動少靜。不能恬逸。此心非見誘于大喜大怒。而致傷神。傷肝開被牽于勞思過恐。而遂傷脾傷腎。以致五火叢起。血無由生。胃脘乾枯。大腸結燥。今當一切排遣。物過不留。務期安養休息。故強制其形。卽地僻山深。祇稱迹隱。寧靜其志。雖車轟馬驟。亦自心清。夫是之謂靜養。能此二者。則腑自通而食飲進逆自順。而嘔吐止。燥者自潤而

陰血生結者自開而二便利其亦賢於蛇腹鼠杵頭糠之類遠矣

噎者飲食入咽阻滯不通梗塞難下皆咽喉閉塞之貌由於悲思過度憂怒不節則氣機凝阻清濁相干違其運行之常乃成噎塞張雞峰所云噎是神思間病當靜覶內養以寧其心志心君泰然則五火退聽營衛安和矣

噎則必兼塞症故東垣云堵塞咽喉陽氣不得上升者名曰塞五藏之所生陰也血也陰氣不得下降者曰噎六府之所生陽也氣也夫噎塞於胸膈之間令諸經不行口張

日暉氣悶欲絕當先用辛甘氣味升陽之藥引胃氣以治其本參芪升柴當歸益智草豆蔻之類加通塞之藥以治其標木香麥芽青皮陳皮之類寒月陰盛加吳茱萸以瀉陰寒之氣暑月陽盛加青皮陳皮益智黃柏散寒氣泄陰火之上逆經曰清濁相干亂於胸中是爲大悞氣不宣通最爲急症不急治之諸變生矣噎與塞皆由陰中伏陽而作也

夏三月陽氣在內陰氣在內噎症值此時天助正氣而挫其邪氣不治自愈如不愈者陰氣極甚正氣不伸耳所以

四君子湯送利膈丸木香枳壳各七錢五分天黃厚朴各
三兩大參當歸甘草霍香枳實各一兩其爲細末水和丸
前湯送三錢每飲食入胃復吐涎沫如雞子白者蓋脾主
涎脾虛不能約束津液故涎沫自出非用大參白朮益智
等不能攝也

冬三月陰氣在外陽氣內藏外助陽氣不得發汗內消陰
火勿令泄瀉此閉藏固密之大要也吳茱萸主之同益智
草蔻陳皮黃芪人參升麻當歸甘草青皮木香牛夏麥芽
澤瀉薑黃等爲末蒸餅丸生薑湯送三錢

古人指噎塞爲津液乾枯故水液可行乾物難進爲病在上焦是矣愚謂若果津液枯涸何以湯飲繼下涎卽上涌乎明係咽膈之間交通之氣不得相入皆衝脈上行逆氣所爲也惟氣逆故水液不得居潤下之常隨其逆上之氣湧耳若以爲乾枯而用潤劑豈不反益其邪乎貴深原其故擬立一主方而隨症加減在圓機者通變也七情所傷當多用辛以橫行而散半夏白蔻益智陳皮生薑之類然中氣旣傷徒與散泄邪未得除正反受困必須調養中宮以全資生之本參芪朮艸之類不可也喉中如有物不

下者痰氣也俗云梅核膈加調子昆布膈間作痛必是痰血歸尾桃仁韭汁童便甚者宜加大黃微利之

噎而聲不出者竹茹五味子生薑挾寒脈沉遲者桂附挾熱脈洪數者黃連木通噎而白沫大出糞如羊矢此二症爲不治矣如飲食方下痰涎聚住不得入者雖人而涎沫隨出者先以來復丹控去其痰方見中暑門更以半夏茯苓枳

壳竹瀝元明粉牙皂枯礬少許生薑汁爲丸治之如大便燥結糞如羊矢自製開關利膈丸人參當歸木香兵郎只壳大黃爲末水泛丸服并用人乳或牛羊乳梨注松子仁

厥之脈緊而芤緊爲寒芤爲虛虛寒相搏脈爲陰結而遲其人則病噎膈

反胃附嘔吐噦

反胃者真火衰微胃寒脾弱不能消穀朝食則暮吐暮食則朝吐設飲食入胃既抵於胃之下脘復反而出者理中湯甚者加附子若脈數爲邪熱不殺穀乃火性土炎多升少降與異攻散加黃連生地當歸沉香此症至口吐白沫糞如羊矢爲危極矣必須養氣以培其陽益血以滋其陰則金無畏火之炎腎有生水之漸脾胃健旺飲食消磨矣

咽喉閉塞胸膈滿悶暫用香砂枳朴以開滯疎結然破氣
太過中氣因而不運當真攻散加香砂使氣旺則能健運
反胃氣逆久閉不開攻補兼施小青龍丸漸次加之其扁
自透宜入參利膈丸木香兵郎枳實厚朴生地當歸大黃
人參甘艸爲末水泛丸用然服通利之品過多血液益加
耗竭其結更倍宜用杏仁去皮尖四兩炒遼松仁四兩壯
豬脂熬淨一鍾白蜜四兩熔蜜錢橘柚四兩同打和成丸
不時嚼食大妙再以人乳進之更妙

嘔吐與噦皆屬於胃但以氣血多少爲異耳嘔者陽明也

陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也○吐者太陽也大
陽多血少氣故有物無聲乃血病也○嘯音者少陽也少陽
多氣少血故有聲無物乃氣病也三者皆因脾虛有火或
出客寒犯胃傷食停痰逆氣瘀血亦有之耳因火與痰爲
多治之以氣逆者辛散爲主生薑半夏茯苓陳皮客寒者
藿香丁香痰火者竹茹蘆根竹瀝生薑之類詳其所因不
可溷也

邪在上腕之陽則氣停而水積故飲之清濁溷亂而爲痰
爲飲爲涎爲垂變而爲嘔○邪在下腕之陰則血滯而穀

不消故食之清濁不分爲噎塞爲痞滿爲痛爲脹變而爲吐邪在中腕之氣交者一腕之嘔與吐俱見矣

胃膈熱甚則嘔火氣炎上之象嘔從氣病法天之陽動而有聲與飲俱出猶雷震必兩注也吐從血病法地之陰靜而無聲與食俱出象萬物之於地也嘔吐則氣血俱病法飲食之氣交而飲食皆出然上腕非不吐食也設陽中之陰亦病則食入卽吐非若中腕之食已而吐下腕之食久而吐也下腕非不嘔也設陰中之陽亦病則吐與嘔齊作然嘔少於吐不若上腕之嘔多於吐也上腕之食入卽吐

生薑半夏湯 薑半等分 中腕之食已卽吐 橘半湯 陳皮薑半等分 下腕食久而吐爲反胃 脰沉而無力 理中湯 脰滑而實 生夏生薑大黃湯 下之

仲景治嘔穀不得下 半夏一升 生薑八兩 茯苓四兩 半夏
生薑之辛但治上焦氣壅裹實若胃虛者惟宜益胃推蕩
穀氣而已用參朮忌用辛瀉故服 小半夏湯 不愈者必用
大半夏湯立愈是卽甘瀉水也 半夏三升 人參三兩 白蜜
一升 水一斗三升 和蜜揚二百四十遍 煮藥取三升 分三
次服 寒吐者喜熟惡冷肢冷脈細而滑用理中湯水冷服

之冷遇冷相人不致吐出如用理中湯到日卽吐去白水
本草之壅加沉香木香下香立吐熱吐者喜冷惡熱煩渴
小便赤澀脈洪而數二陳湯加梔連竹茹蘆根汁薑汁怒
中飲食作_火滿膈脹二陳加青皮木香砂仁荳蔻薑藥
中腕素有痰積遇寒卽發丁香豆蔻砂仁乾薑半夏陳皮
加白芥子汁薑汁各半杯許

痰滿胸喉粥藥入口卽吐先以薑湯送下養正丹俟藥可
進則以三陳湯加枳實砂仁桔梗厚朴薑汁服之虛者加
人參本因中寒用熱藥太過以致嘔逆二陳加白蔻沉香

因七情而得者理中加木香沉香烏藥主之

陰虛而龍雷之火亢道宜理中加薑汁炒熟地兵榔黃柏沉香導之使下如中氣久傷倉廩空虛因而嘔吐宜焦米人參神麴陳皮薑棗調和胃氣與其自止

漏氣者身熱臂痛食入則先嘔而後瀉此上焦傷風閉其腠理經氣失道邪氣內着麥門冬湯麥冬人參蘆根竹茹陳皮白朮茯苓甘艸萎蕤生薑陳倉米主之

走哺者下焦實熱一便不通氣逆嘔吐人參湯人參白朮

茯苓陳皮石膏知母猪苓萎蕤蘆根汁主之

食已暴吐脈浮而洪此上焦火逆也宜桔梗枳壳厚朴陳皮木香半夏白朮茯苓氣降則火自清吐漸止加用八參芍藥補之下閉上嘔亦因火在上焦宜以桔梗陳皮水香大黃微利之

乾呕宜橘紅湯橘紅一味煎湯入薑汁甘蕨汁細細呷之惡心心中央央欲吐不吐多屬胃虛宜半夏陳皮白朮茯苓生薑主之仲景云欲吐不吐者不可下又云用大黃治食已卽吐何也曰欲吐者病在上因而越之可也逆之使下則必憤亂而益甚若既吐矣當吐折之使其下行故用

大黃丹溪云 凡病吐者切不可下近於固矣

歲之爲症方書僅言其屬火乃一端耳亦有胃寒胃熱傷食停痰逆氣瘀血人當消息而治因火與痰爲多

嘔苦邪在胆經胆木上乘於胃土則逆而嘔胆汁故苦也宜吳茱萸連黃芩茯苓生薑主之

吐酸內經云諸嘔吐酸皆屬於熱東垣又以爲寒何也若胃中濕氣鬱而成積則濕中生熱故從木化而味酸法當消之若久而不化則肝木日盛胃土日衰經云木飲貲金當平之辛爲肺金之味故辛可勝酸辛則必熱辛以制東

方之實熱以扶中土之衰倘濁氣不降而日以寒藥投之
非其治矣

大抵吐酸一症宿食滯於胃脘平胃散加香砂麴查若停
飲所致著半茯陳最宜嘔清水而渴欲飲水水入卽吐名
曰水逆以五苓散主之赤石脂搗末服方寸七漸添至三
七服盡一効終身不吐痰水亦可無終身泄瀉之症

吐涎沫六君子湯加益智生薑或以半夏乾薑等分爲散
吐膿仲景云嘔家雖有膿膿不必治膿盡自愈或地黃湯
開元瘧黃芪三錢白朮三錢葵根一兩主之

嘔蟲吐蛻爲胃中冷理中湯加川椒黃連兵郎烏梅蛻見苦則安見椒則伏見酸則不咬也

火衰不能生土而反胃者其脈沉遲八味丸減熟地加砂仁沉香瘀血阻膈而反胃者抵當丸以湯作丸如芥子大每服三錢去枕仰卧細細嚥之有蟲聚而反胃者宜兵郎雄黃牽牛大黃丸服調治得宜反胃新愈切不可便與粥飯每日用入參一兩陳皮三錢焦倉米三錢煎湯細呷之後可小試陳米飲及糜粥如倉廩未固驟貯米穀往往敗事多致不救

嘔者陰氣不得下降也。膈者陽氣不得上行也。飲食有不下有吐有不吐故與反胃不同。杵頭糠人參末柿霜石蓮子末元明粉各等分以舌舐食如血稿者用生熟地黃麥門冬當歸萎蕤倉米煎膏入韭汁人乳或牛乳桃仁泥蘆根汁和勻細呷緩緩噙化。

膈嘔服藥無効者用巧婦窠燒灰爲末每服三錢溫酒調下服完此一窠未必痊

嘔症有瘀血者王宇泰立代抵當丸用大黃醋炒四兩朴硝二兩桃仁六十粒炒歸尾生地山甲炙各一兩桂五錢

爲末蜜丸上焦膈者如芥子大臨卧就枕仰以津嚥下錢
許中下焦膈者空心服

噎膈灸法

心俞

思噎

天府

勞噎

膈氣

氣噎

膻中

食噎

乳根各七壯○五噎五膈食飲不下並灸膻中中脘內關

食倉三里膏肓六穴

反胃吐食灸用脾俞鬲俞中脘氣海下脘三里

命門火衰不能熟腐水穀朝食暮吐暮食朝吐須灸腎俞

肩井命門中脘關元食關各七壯

關格

關者陰盛之極故關閉而溲不得通也格者陽盛之極故格拒而食不得入也經曰上下不通暴憂之病也又曰傳化不行上下不井良醫弗爲身半以上陽氣常在則燕爲主病身半以下陰氣常在則寒爲主病忽然生逆二便不通甚則煩亂身冷無脈此氣閉也與天承氣湯則便通吐止脈和矣脈虛人倦人參茯苓半夏陳皮甘艸生薑水煎入水射少許服脈沉細肢冷參附加水射爲末糊丸每服十九脈數有熱五苓散加枝子大黃厚朴只壳兵郎木通

陳皮生薑水煎入冰射少許服

又法皂角燒存性爲末米湯送或猪脂二兩煮食

呃逆刺鼻取嚏卽止遇大驚亦止

傷寒汗吐下後與瀉利日久或大病後氣呃中氣虛也虛而熱者人參竹茹陳皮甘艸生薑大棗虛而寒者人參白朮甘艸乾薑附子丁香柿蒂大便閉脈沉數者調胃承氣呃而心下悸者半夏陳皮茯苓甘草南星木香竹瀝薑汁丁香柿蒂煎服久病虛人見之爲危火呃水煎乾柿湯加老生薑服呃呃連聲爲寔可治呃間半時再呃爲虛難治

肺脈散大者死

霍亂

霍亂者心腹脹痛嘔吐泄瀉憎寒壯熱頭疼眩暈先心痛則發吐先腹痛則發瀉心腹俱痛吐瀉并作或手足冷或自汗甚則轉筋入腹則死多因中氣不足或內傷七情外感六氣或傷於飲食往往發於夏秋陽熱迫於外陰寒伏於內使人陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽否隔上下奔迫治之之法滲脾胃之濕散諸邪之氣然脾胃有虛有實感邪有陰有陽宜消息施治

內經云太陰所致爲霍亂又曰土鬱之發民病霍亂又歲
土不及風乃大行民病霍亂又足太陰之經厥氣上逆則
霍亂自巢氏病原乃曰霍亂由清濁相干亂于腸胃因飲
食而發者心腹絞痛因風寒而發者身體疼痛因於心者
但心腹痛而已如是而內經之旨不復問矣

劉河間專主火熱張子和則以風溼三氣合爲病邪蓋
土濕爲風木所克又爲炎暑鬱蒸致嘔吐者暑熱之變也
泄瀉者上濕之變也轉筋者風木之變也合衆論而參治
庶爲活法安可執一說以誤人耶

羅謙甫於墻陰掘地約二三尺深取土入新汲水攬之澄
清名曰地漿服之則氣和而吐瀉自止若多食涼水瓜果
所致宜霍香木香厚朴陳皮蘇葉生薑若四肢重着骨節
煩疼因於濕也二朮朴陳茯澤車前若七情鬱結宜烏藥
香附木香只壳厚朴陳皮蘇子若手足厥逆氣少神清者
寒也四逆湯加食鹽如轉筋者風木克脾土也平胃散加
木瓜如身熱煩渴氣粗口燥面垢者暑也香茹黃連厚朴
陳皮甘草生薑煎好澄冷服如食滯者腹痛不可近香砂
二朮枳實荳蔻在上者吐之食鹽湯在下者加大黃下之

通用藿香杏仁厚朴半夏茯苓甘草陳皮生薑復卷
用蘇合香丸以通其塞次進藿香正氣散加木香煎吞
來復丹若瀉甚則勿用來復丹若瀉而不吐胸悶濃鹽湯
探吐如已吐未吐並可用正氣散或間進蘇合香丸如吐
而不瀉心腹大痛頻欲登圓苦于不通宜木香只壳桔梗
煎服若膈而不下來復丹引導下行吐瀉不止元氣耗散
病勢危篤或米粒不入或口渴喜冷或惡寒戰掉手足逆
冷或發熱煩躁揭去衣被此內虛陰盛不可以其喜冷去
被爲執宜附子理中湯甚則四逆湯並須冷服霍亂已透

而餘吐餘瀉未止腹有餘痛宜一味扁荳葉煎服如胸痛
甚因吐不透橘紅鹽各一兩煎服大吐瀉後虛煩而渴津
液枯竭人參麥冬花粉乾葛甘艸茯苓煎服乾霍亂飛鹽
四五錢調童便服此良法也遲則難救所謂乾霍亂者心
腹脹痛煩躁憤亂不吐不瀉是也俗名攬腸沙此土鬱不
發泄火熱內藏陰陽不和皆爲火極之故或云方論皆言
宿食與寒氣相搏何以獨指火乎曰悶亂煩痛故經云諸
躁狂越皆屬於火者乎又卒暴之病亦屬於火者乎但攻
之太過則反悍格須反佐以治然后火可散耳古法有用


鹽煎童便非第用其降火亦兼取其行血故妙

姪孕霍亂先吐或腹痛吐瀉是因於熱也頭疼體痛發熱
是挾風若風犯皮膚則氣不通而風熱上冲必爲頭疼若
風入脾胃則瀉利嘔吐甚則手足逆冷姪婦患此多致損
胎薛立齋云如內傷飲食外感風寒藿香正氣散若只因
食滯平胃散若陽氣虛寒手足逆冷溫補爲急理中湯
產後霍亂府藏虛損飲食不消感胃風冷所致若熱而欲
飲水者五苓散若寒而不欲飲水者理中湯虛冷者理中
加附子或來復丹

凡霍亂初起及新愈不可便與穀氣每致殺人如吐瀉已
多元氣困極審無邪在須水飲補養脈洪大者吉如脈見
微細而舌卷囊縮者不治

霍亂之後陽氣已絕或遺尿或氣乏不語或汙出如珠或
躁欲入水或四肢不收皆爲死症

霍亂欲死灸法肘尖七壯取令病人端坐父手平胸肘后
突出尖骨罅中是穴用指甲按切酥麻爲真背後灼艾
針法將委中出血又洗以水將手拍兩腿彎立止



脹滿

黃帝曰心腹滿旦食則不能暮食此名何病岐伯曰名爲
鼓脹夫鼓之爲脹其中空無物外皮綳急取譬而氣虛滿
者乃爲切當又曰厥氣則下營衛留止寒氣逆上真邪相
攻兩氣相搏乃合爲脹也

脈要精微論曰胃脈實氣有餘則脹○本神篇曰脾氣實
則腹脹徑洩不利○陰陽應象論曰濁氣在上則主脹脹
此內經論實症有三也

師傳篇曰足太陰之別虛則脹滿按公孫穴道○太陰陽明論

曰飲食起居失節入五藏則膩滿秘塞此內經論虛症有二也

經脈篇曰胃中寒則脹滿○異法定論曰藏寒生滿病○風論曰胃風鬲塞不通腹善脹失衣則脹○六元正紀論曰太陰所至爲畜滿此內經論寒症有四也

至真要論曰少陰之司天少陰之勝復○少陽之司天少陽之勝復○又曰熱勝則腫○又諸腹脹滿皆屬於熱此內經論熱症有四也

脹有五藏六府經曰心脹者煩心短氣臥不安肺脹者虛

滿而喘欬肝脹者助下滿而痛引於脰脾脹者善噦四肢
煩惱體重不能勝衣臥不安腎脹者腹滿引皆中央然腰
髀痛胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難大腸
脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則飧泄不化小腸脹
者小腹脹引腰而痛膀胱脹者小腹滿而氣癃三焦脹
者氣滿於皮膚中碌碌而不堅脛脹肋下痛脹口苦善
大息然藏府雖各有脹而無不本於肺脾腎三藏者肺屬
金主氣脾屬土主逆化腎屬水主五液故五氣所化之液
咸本於腎五液所行之氣咸本於肺轉輸於金水一家以

制水而生金者咸本於脾是以腫脹之症無不由此三者
但陰陽虛實治法各殊○先脹於內後發於外多實先腫
於外後甚於裏者多虛○小便黃赤大便猶結者多實小
水清白大便稀溏者多虛○脈滑數有力者多實○形色
紅黃氣息粗長者多實○容顏枯槁音聲短促者多虛
已上諸症不可不辨

實熱論治濁陰由下竅不病之常也膏粱酒客濕熱內鬱
陰火上冲濁陰不降三焦不通二便不利脹乃生焉經乃
所云中滿者瀉之於內又曰下之則脹已又曰治平權衡

去菀陳莝開鬼門潔淨府宣五陽巨氣乃平如硝黃實桂
去宛陳莝之劑也猪澤通俠丑戟羌遂潔淨府之劑也桂
附薑吳官布五陽之劑也然孰有重輕寔有大小及致痛
之由此當明辨隨症施治○仲景云腹滿不足不當下之
腹滿發熱飲食如故者下之

虛寒論治脾爲太陰司地道陰水之化脾陰太過違天道
陽火之化蓋無陽不能運行三焦熟腐水穀乃爲脹滿治
宜辛熱分消湯黃芪吳萸厚朴草蔻黃柏益智木香半夏
升麻人參茯苓當歸黃連澤瀉麻黃乾薑附子畢澄茹附

子理中湯金匱腎氣丸皆可用之

治脹三法陰從下逆上而盛於中者先抑之而後調其中此血不足而火亢之症○陽從上降下而盛於中者先舉之則調其中此氣不足而陽陷之症○邪從外入內而盛於中者先治其外而調其內此六氣成脹也霍香正氣散藿香腹皮紫蘇白芷厚朴桔梗陳皮半夏茯苓甘艸加生薑燈心前般如七情成脹沉香降氣散沉香烏藥香附砂仁甘草加食鹽或木香調氣散木香霍香砂仁豆蔻甘艸加生薑煎服如飲食傷成脹者石砂調中湯二陳平胃與

香砂枳寃青皮山楂神曲如畜血成脹者青紫角見小水
仍利代抵當丸桃仁蓬朮大黃生地當歸甘草各一錢
經斷而後腫脹血結胞門病發於下血分丸椒仁甘遂續
隨子附子吳萸郁李黑丑靈脂元胡歸尾各五錢芫花一
錢蜈青十枚去頭翅膀足米炒盤釐十枚胆礬砒各一錢石
膏二錢爲末糊丸芡寃大陳皮湯送一丸

腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相搏瘻肉乃生小如雞卵
大如懷妊月事以時下宜氣藥調之氣服方雞內金大雄
雞者炙五錢真沉香八錢砂仁一兩爲末薑湯送下薑音尋

石瘕者生於胞中寒氣客於子門惡血留止日以益大月
事不以時下宜血藥行之

血脹方蓬朮元胡鬱金五靈脂

黑丑牛膝穿山甲肉桂爲末醋糊丸酒送下

女人屬氣分脹者先病脹而後經水斷心胸堅大病發於
上宜治氣分枳壳陳皮桔梗木香兵郎香附烏藥砂仁白
朮倉朮牛夏茯苓紫蘇官桂生薑煎服爲末亦可

脹病必喘喘則必脹二症相因但先脹而後喘治在脾先

喘而後服治在肺治脾用蒼白朮厚朴枳實腹皮砂仁木

香沉香治肺用桑皮厚歷白蔻枳壳蘇子桔梗陳皮如利

小便用木通車前猪苓茯苓通艸防已澤瀉名潔淨也如
欲發汗用麻黃羌活葛根防風紫蘇名開鬼門也如人強
能食少年初病其脈有力者可暫投硝黃遂戟與商陸芫
花等亦宜酌用

脹起於旬日之間忽然因七情六氣而成者實也當疎利
爲主已上諸法可用

脹起於經年累月先腫於外後脹於內小便淡黃大便不
結色澤枯槁神倦懶言脈細無力虛寒症也人參白朮茯
苓甘艸陳皮以補脾也黃芪桔梗苡仁山藥以補肺也沉

香木香砂仁陳香圓以理氣也。五苓散以利小便升柴以開鬼門。如虛盛多寒者桂附薑吳俱宜審用。人參白朮須大劑類投。方能有救。金匱腎氣丸是乃切要之方。至於以白芍於土中瀉木。忍冬能和緩下氣。赤豆木瓜利水。與下氣交長片腦雞金寬膨與溫中並用。牙皂角燒灰爲末。假神曲糊爲丸。取利甚捷。雞屎白炒熟袋盛浸酒須空腹而飲。下水大奇。青蛙入猪肚中烹爲佳餚。野雞和椒茴末炒作餛飩。皆海藏之仙方。屢用之而屢效。

脈實大浮者易治。沉細微小者難痊。身熱脈大。腹脹爲

通腹脹便血脈大爲逆發熱不休寒熱如瘧皆不治或腹
大肢冷泄瀉三症並見不及一時死若脹則上嘔而喘歟
下而泄瀉脈微或大爲逆不治

腹脹多是氣虛不歛用辛散之品反甚宜以酸收之芍
五味之屬少佐益智以其能收攝三焦元氣也朝寬暮急
以當歸爲主暮寬朝急以人參爲主朝暮俱急二味並用
按之有痛處乃瘀血也加行血藥經云濁氣在上則生脹
脹又云下之則脹已謂宜以沉降之品引濁氣之在上者
而下之非通利大府之謂也凡腫脹初起痰多發喘小便

不行服濟生腎氣丸無不效

脾胃氣虛心腹脹滿灸法取太白足三里水分氣海又法先灸中脘七壯引胃中生發之氣上行陽道兼服東垣术香順氣湯使濁陰降而脹平矣

虛勞浮腫針太冲腎俞補之小腹脹滿三陰交三里內庭
箕張石門氣海內庭雙脹合谷曲池支溝氣海三陰交
一切水腫針水溝灸用水分氣海天樞

水腫

臍腹四肢悉腫者爲水但腹滿四肢不甚腫爲脹滿也先頭足腫後腹大者水也先腹大後四肢腫者脹滿也皮厚色蒼或一身盡腫或自上而下者多屬氣皮薄色白或自下而上者多屬水水本畏土因土虛不能制水則寒水侮所不勝及乘脾土泛濫爲邪其始初起必從陰分漸次而升夫水雖受制於脾而實主於腎腎本水藏而元氣寓焉若腎中陽虛則命門火衰既不能自制陰寒又不能溫養脾土陰陽不得其正則化而爲邪然氣卽火也陰卽水也

氣之與水本爲同類但在化與不化耳故陽旺則化而精能爲氣陽衰則不能化而水卽爲邪火盛水虧則病燥水盛火虧則病濕故火不能化則陰不從陽而陰氣皆化爲水所以水腫之症多屬陽虛丹溪乃云清濁相混壅塞爲熱熱留爲濕濕熱相生遂成脹滿治宜補脾又須養金以制水使脾無賊邪之患滋水以制火使肺得清化之權其意以制火爲主誠制火固可保金衡不虞其害土乎以此治熱猶可以此治陽虛而氣不化者豈不反助陰邪哉必富察其果係寔邪則直以清火滋陰爲極易凡挾於虛須

促溫補俾可還元或虛實未明寧先斤治虛之法若治而
不瘳不妨易轍猶無大害猶藥未到病未痊仍須詳察若
以治有餘之法誤治虛人則真氣復傷雖施合劑不能起
矣或從清利暫見平復終不補元雖目前稍愈久必危亡
可不謹哉

切手指按其腹隨手而滿者水也
如門而不起腹色不变者脹滿也

盧砥醫鏡治水腫以肺金盛而生水水溢妄行氣閉机壅
必導腎水以決去之肺乃腎之母其氣清肅果由肺盛生
水則將奉行降令通調水道下輸膀胱水精四布五經並
行尙安得有水腫哉肺盛生水之說斷無是理

腎氣不化多因四氣相乘或濕熱盛而傷之或胃氣下陷而傷之或心火下乘而侮之或燥金歛澀之風水鼓激之與夫恣情閨房勞役應酬六氣七情皆足以損腎

胃之關不惟因腎氣不化而後閉卽胃之病而關亦自閉矣水之聚不待腎水而後成卽所飲之水而亦自聚矣胃主中焦爲水穀之海胃和則升降出納之氣行水穀各從其道輸泄焉胃不和則出納之机滯水穀之液皆能畜積而爲水也經曰胃所生病大腹水腫膝臍腫痛又曰五穀之津液因陰陽不和則氣道不通四海閉塞三焦不瀉津

液不化水穀并於腸胃之中留於下焦不能滲入膀胱則
下焦水溢而爲水腫又曰腎者牝藏也地氣上升則屬於
腎而生水液也故曰至陰如勇力勞甚則腎汙出腎汙也
而遇於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府
行於皮裏傳於附腫本之於腎名曰風水由是推之而水
溢之病未有不因腎虛所致設使不顧其虛輒攻其水乃
重虛其陰也經云肝腎脈并浮爲風水蓋肝腎同處下焦
腎屬陰主靜其脈常沉肝屬陽主動其脈常浮二藏俱有
相火動於腎者猶龍火之出於海動於肝者猶雷火之出

於澤龍起而火隨風發而水湧今水之從風猶言腎脈本沉因從肝化而與之俱浮冲景有石水風水之分腎肝之脈并沉爲石水宜海蛤丸海蛤蝦防已各七錢五分陳皮郁李仁去皮炒各五錢赤茯桑皮草歷隔紙焙一兩爲末蜜丸米飲下○腎肝之脈并浮爲風水身重汗出惡風宜防已黃芪湯防已一兩黃芪一兩三錢白朮七錢甘艸炙一錢薑棗煎服○自汗出無大熱惡風一身悉腫越婢湯麻黃六兩石膏八兩甘草一兩生薑三兩大棗十五枚擘

水六升煎服

水腫陰陽之辨 阳水者偏身腫煩渴小便赤澀大便多
閉輕則用四磨五苓重則用疏鑿飲子 險水者偏身腫
不煩渴大便自調或溏瀉小便雖少而不赤澀用寃脾飲
或小便如常有時赤有時不赤晚則微赤卽無赤澀者亦
屬陰也未可遽用補劑先用木香香附易藥茯苓猪苓次
用復元丹附子木香茴香川椒厚朴獨活兵郎白朮陳皮
茱萸桂心澤瀉肉荳有一身惟面及足俱腫早則面甚晚
則足甚面腫爲風足腫爲水須察其大小便通閉別其陰
陽而治之○有耳內瘡瘍以致耳腫及面與上半身甚者

羌活自芷升麻防風蘇葉下半身甚者五苓散加木通二

朮○人病後腫明係脾虛不能通調水道補中益氣湯送

六味丸○腎水不足虛火燥金不生小便者六味丸兼與

補中益氣湯互用久服自効誤與疎氣行水將有性命之

憂亟與金匱腎氣丸尙有可救者

行水法赤豆同大蒜煮粥以豆鼓啖之冬瓜日日可吃用

鯉魚重角許以上者和冬瓜蔥白作羹食青頭鴨白鴨俱

可作羹全赤豆粥空腹時食○目窠微腫如臥蚕者水也

足腫甚者水也頸脈動者及痰咳喘者亦水也

脈沉主水水病脈浮者死洪大者生細微者死○五傷者
死唇黑肝傷缺盆平心傷臍突脾傷背心平肺
傷足心平腎傷七忌魚肉雞麪羊酒鹽不忌必甚

九種水病根源症治一青水先從兩脇腫起根在肝大
戟主之二赤水先從右根起根在心亭立主之三黃
水從腰腹起根在脾日遂主之四白水從足腫起根在
肺桑皮主之五黑水從外腎起根在腎連翹主之六
綠水從面頰起根在外腎芫花主之七風水從四肢起
根在膀胱高本主之八高水從少腹腫起根在小腸巴

霜主之 丸氣水或盛或衰根在三焦赤豆主之 右丸
種藥等分主某經者倍之爲末蜜丸赤茯苓湯送下錢許
日三服忌鹽醬一月又忌魚肉蝦蟹羊雞鵝麪及一切毒
物生冷房室憂勞醉飽

開鬼門 麻黃羌活防風柴胡牛蒡忍冬葛白柳枝芩朮荆
芥蘇葉梗并可煎湯浴洗

潔淨府木通澤瀉香茹甘草燈心冬葵子蜀葵子海金沙
草立防已海藻昆布茯苓赤豆猪苓青蛙海蛤綠頭鴨
白螺鯉魚白魚盧魚卿魚已上俱用秋石代鹹煮食或

加田螺二個滾酒內煮食

云菟陳莖商陸全赤梗米煮飯日常食之甚効又用甘遂
芫花續隨子牽牛同大麥麴作麴吃

老絲爪巴豆拌炒又同冬米炒去豆米爲末丸服

大戟煎湯服巴豆同杏仁炒去豆食郁李仁酒食
四十九粒或爲末和麴作餅吃

宣布五陽附子肉桂乾薑吳萸黃白雄雞并同赤豆煮食
其外戌肉亦可食

血腫成水紅花劉寄奴澤蘭益母紫荊

水脹方 翔雞矢八合炒微黑好酒三碗煎取汁五更熱
服於辰巳二時行二三次二日有皺紋起於足再服妙
此素問方也

禹餘糧丸治水腫聖劑 蛇含石三兩鐵鎚盛燒紅醋淬
研極細禹餘糧三兩針砂五兩淘淨炒醋二碗同禹糧
入銚煮乾連銚燒紅傾地上出火氣研細聽用以羌活
木香茯苓川芎牛膝桂心白蔻大茴蓬朮青皮附子乾
薑三稜白蒺藜當歸各五錢爲末入前三味拌勻蒸餅
丸梧子大空心滾水下三十丸虛人亦可用不傷元氣

所大忌者獨鹹味耳。一毫入口病發更甚。只去小便不去大便。每日三服。更以溫補前方助之。真神方也。

外治方 大戟芫花甘遂海藻等分爲末。醋調和麪少許攢於綿帛上貼腫處。口咬甘草不過兩三時水即下矣。鋪臍左 好輕粉二錢巴豆四兩生硫黃一錢研匀成餅先以新綿鋪臍上次鋪藥餅外以帛緊束之。如人行十里許即下水。待行三五度即去藥。以溫粥補之一餅可治十人。

灸法

甲脫 二七壯在臍上四寸上下一寸居岐骨與臍

之分中又灸水分穴如年壯在臍上一寸禁刺刺之則
水盡卽死又法用神闕以鹹填滿臍中著艾灸如年壯
或二七日

瘡

大風寒暑濕四氣皆能客而爲瘡或客於腸胃之外或客於營氣之舍或客於脊骨之間或客於五藏之募原淺深不同故先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒不熱或但熱不寒往往夏傷風暑秋涼東之寒熱爲瘡淺者病在三陽一日一發深者病在三陰間日一發或三日一發病愈深則發愈遲陳無擇曰內傷七情外感六氣皆能鬱而成瘀著而成瘡內外所傷之邪皆客於營氣之舍故發有常期夫營衛之舍猶人之傳舍也營衛日

行一周歷十二經之界分內薄之邪與日行之衛氣相會
則癰發離則癰止其發也不惟脈外之衛虛是陽明與營
俱行者亦虛陽明虛則天眞因木穀而充者亦虛故癰發
之際且勿服藥恐反傷胃氣與天眞之氣也必俟陰陽併
極而退其營衛天眞營衛離而復集過此邪客之然后治
之或當其未發迎而奪之有外邪者必須汗解若是虛人
先以人參白朮實之胃氣然后取汗須至足乃佳取汗而
不必汗藥但開通經鬱則邪自散汗自透矣

發於子後午前是陽分受病其病易愈發于午後寅前陰

分受病其病難愈別陰陽氣血察形色衰旺以治之形壯
色澤者病在氣分則通經開鬱以取其汗色稍淡者必先
補而取之挾痰者必先實其胃方與劫劑形弱色枯者不
可取汗亦不可劫但養正氣微與和解形壯色黑者病在
血分須行其阻滯色枯者補血調氣至于取汗不得汙理
血而瘡不痊則當更與精思詳切深中病情方收十全之
効○寒瘡先寒後熱用紫蘇羌活細辛白芷生薑以散
太陽之邪○溫瘡先熱後寒體重痛嘔逆張滿胃苓湯
二朮厚朴茯苓猪苓澤瀉陳皮甘草加羌活紫蘇煎服○

癰瘡 但熱不寒者肺素有熱發於盛暑用知母石膏煨

人參麥冬甘草發於秋涼之候柴胡陳皮黃芩半夏甘艸

蕈棗 ○ **牝瘡** 但寒無熱者陽虛陰盛也桂枝羌活柴胡

紫蘇木香生薑○**食瘡** 飢不能食食卽脹滿嘔吐腹痛

二朮兵郎草葛豆蔻山查青皮香附砂仁神麴麥芽之類

瘡瘍 嶺南嵐嶂之毒發時述悶涎聚於脾血瘀於心兵

郎草葛柴胡半夏黃芩大黃木香蕈棗○**癰瘡** 素虛不

足久瘡成癰參芪苓朮歸芍地草首易鱉甲葛根烏梅○

瘡母 邪伏少陽結塊於肋參朮芩艸蓬半青陳肉桂

鱉甲○時行鬼瘡

蒼朴甘陳桃仁水香升麻雄黃○三

日瘡

木於三陰不足參朮芎歸柴芍首烏烏梅陳皮薑

汁發於子午卯酉爲少陰瘡加丹參圓肉寅甲巳亥日爲
厥陰瘡加丹皮木香辰戌丑未日爲太陰瘡加白豆蔻茯
苓然三陰受病皆謂之溫瘡發於處暑后冬至前此傷之
重遠而深者也三陽受病皆謂之暴瘡發在夏至后處暑
前此傷之淺者近而暴也

瘡分南北 東南瀕海海風無常多食魚鹽人多停飲故
多風瘡及食瘡烏頭艸薢陳皮半夏爲宜 西北高曠寒

則水水地裂熟則爍石流金人多中寒伏暑故多暑瘧與
寒瘧杳茹柴胡常山草果兵郎等爲宜審知胸中有飲陳
皮鹽湯吐之若不吐便可抑之兵郎青皮只實瘧家多宿
痰惟常山吐之利之大有奇功次以女黃佐之大瀉數行
其病若失大凡寒热乍已之時胸中滿悶不退皆痰涎之
故也若衄血或便血婦人或月候適來皆是血症劑中加
元胡索桃仁蓬朮挾水者逐水挾血者攻血隨症施治木
有不效者也若病不甚而用常山不取其吐利當以醋久
炒之雖用一二錢毫不吐也世有畏之如蟬蓋未明其性

耳瘡發已多徧治無功意非外邪亦無內滯惟用人參生
薑各一兩煎湯發時五更服必止甚者連進三服無不愈
者如在貧者白朮可代夜發加當歸無不奏功

瘡母者頑痰挾血挾食結爲癥瘕用小柴胡湯加鱉甲五
錢莪朮三錢五分俱以醋製服之必驗

瘡久不癒必有留滯須加鱉甲消之

截瘡之法種三不同內經論刺最詳乃至用藥攻邪存正
調營衛之偏和陰陽之逆是矣今以兵郎去痰穿山甲透
經絡常山破瘀癰用此截瘡如精兵據其險要萬無不截

之理如本無痰涎止於暑結營分貴在鱉甲香茹生薑而前藥爲無益有損也若元氣虛極止宜補正如常山山甲皆爲戈矛矣○傷寒有往來寒熱如瘡并虛損有往來寒熱如瘡謂之如瘡非直瘡也傷寒之寒熱也始則必惡風惡寒發熱頭疼體痛自太陽傳至少陽半表半裏故往來寒熱也○虛損勞病之寒熱也其初必五心煩熱喫嗽倦怠微二日久陽虛生外寒陰虛生內熱故寒熱時作也卽痰飲癩疝積聚停食暑濕燥火癌疽瘍毒亦皆有寒熱之候豈得盡謂之瘡乎須細問其病原有何病因投治無誤


大凡寒熱有常期者癰也無常期者雜症也。在太陽經者謂之風癰治多汗之。在陽明經者謂之熱癰治多下之。在少陽經者謂之風熱癰治多和之。

常山截癰丸常山酒浸一宿炒透爲末烏梅肉爲丸每服二錢發日五更用一加兵郎山甲鱉甲醋炙爲末烏梅肉爲丸每服三錢薑湯下。

外治方蛇退塞耳或生牛夏塞鼻男左女右立止。

針法間使穴在手掌下臂上三寸兩筋間是

瘧疾久不止百勞問使后谿足三里針之



痢

痢症起於夏秋濕熱鬱蒸因乎天也生冷停滯由乎人也當炎暑之令不能保攝脾胃多食瓜果肥甘土氣受傷無以制濕濕蒸熱壅以致怫逆氣不宣通因而腸胃反窒裡急后重小便赤澑宜以苦寒之藥燥濕滌熱佐之以辛溫便能開鬱運氣故行血則便膿自愈調氣則後重自除狀虛寃寒熱淺深新久之不同未可以一例治也

心者血之主也肺者氣之主也凝滯則傷氣鬱熱則傷血氣血既病則心肺亦病矣而小腸心之合也大腸肺之合

也二經皆出納水穀轉輸糟粕之官也而胃又爲大小腸之總司也肺移病于大腸則氣凝泣而成白痢心移病于小腸則血凝泣而成赤痢大小腸俱病則赤白互下胃主傳濕熱於大小腸痢色兼黃至於色之黑者分爲二經如焦熱之黑者此熱極反兼勝已之化也如黑漆之黑者此瘀血凝久而然也

治痢從腸胃此籠統之說也不知在腸胃者乃屬標病其所感之邪與所受之經乃本病也若腸胃自感而病亦當分邪正或正氣先虛而受邪或邪氣干犯而致虛則以先

者爲本後者爲標

積有新舊舊積者氣血食痰所化也新積者舊積已去未
幾復生者也然舊積宜下新積禁下其故何也蓋腸胃之
熟腐水穀轉輸糟粕皆是管衛酒陳於六府之功今腸胃
有邪則管衛運行之常度因之阻滯不能施化故衛氣鬱
而不舒營血注而不行於是飲食結瘀停于胃糟粕留于
腸與所鬱之氣血相雜而成滯下之症矣必當下之以通
其壅塞既下之後升降仍不行清濁仍不分則衛氣復鬱
管血復注又成新積烏可復下乎但理衛氣以開通腠理

和營血以調順陰陽則升降合節積雖不治而自化矣然
舊積亦有不可下者或先因腸胃之虛不能轉輸其食積
必當先補正氣狀后下之庶無失耳世俗惟守數方初則
行之久則濶之豈知攻邪却病之品但能耗氣損血用之
不已氣散血亡五藏損而死期至矣其固濶之方又足以
增其氣血之壅滯變爲腫脹變爲喘嗽如此死者醫殺之
耳丹溪云滯下逼迫正合承氣症但氣口脈虛平昔胃傷
寒忽兩三日辛苦遂與參朮歸芍陳甘補劑兩日後胃氣
稍復方與承氣苟不先補而遽攻之難免後患乎戴復菴

云氣滯成積故治痢以順氣爲先又須當養胃故曰無飽死痢疾也

痢初發時裏急後重頻欲登圊及去而所下無多繼則腹急皆濕熱凝滯之故也宜藿香正氣散加木香只壳黃連砂仁或加檀香乳香射香水片血色紫黯屢服涼藥所下愈多當作冷痢宜理中湯加木香肉蔻如純下血而色鮮紅者此心家伏熱也犀角屑一錢硃砂二錢牛黃三錢人參三錢丸如麻子大麴糊拌每用一錢燈心圓眼湯下仲景云小腸有寒其人下重便血以乾薑燒黑存性磁碗

合放地上出火氣取爲末每服一錢米飲調下

裏急而至固反不能卽出者氣滯也疎通爲主裏急而頻見汚衣者氣脫也補濇爲主

後重而至圊稍減者火迫也黃連爲主後重至圊而轉增者下陷也升麻爲主○積如膠凍或如臭涕此爲冷痢先用木香沉香豆蔻砂仁厚朴次用理中湯加木香○冒暑而成自汗發熱面垢嘔渴腹痛小便不通香茹飲加黃連或五苓散霍香正氣散加香茹香連○老人深秋患痢呢逆者黃柏末陳米飲爲丸人參白朮茯苓甘艸湯送下

冷痢不能食肉蔻陳米爲末米飲調服入秋而痢白豆蔻
厚朴自不可缺肺經之氣鬱於大腸桔梗蘇子爲君以痢
藥佐之○脹滿惡食腹痛者實也木香黃連芍藥只壳兵
郎只實厚朴煩渴喜冷飲脈堅大滑數熱也芩連爲君○
濕熱二朮二芩芩連氣滯木香霍香只壳厚朴只寃蘇子
陳皮砂仁豆蔻兵郎和血則便膿自愈四物可用久而虛
滑者補中益氣加肉蔻诃子朮五味新起而寃且滯滯者
兵黃丸色焦黑者兵黃加香連芩芍如漆之黑者婦尾赤
芍桃仁大黃只寃朮硝厚朴裏急不快者香連兵寃芍婦

裏急汚衣參朮訶蔻烏味甘桔後重得解轉甚參芪朮草
升柴後重得解卽減芩連香砂兵黃虛坐努責久圍不解
血虛也帰地芍紅口腹怕冷脈沉細寒也理中加香蔻○
肝氣逆上吳萸黃連木香青皮白芍噤口痢食到便吐上
焦火逆也黃連木香茯苓桔梗只壳陳皮半夏菖蒲生姜
噤口虛者陳米三錢蓮肉五錢人參一錢煎好入薑汁少
許細二呷之如吐出再呷但得一呷下咽便開

久瀉無度腹痛者禹餘糧五錢赤石脂白朮各三錢訶子
肉蔻各一錢五分腹痛芍藥甘艸湯甲巳化土此仲景方

也挾虛者建中湯然古人以建中治病不間赤白新久用之皆効

一方治腹痛神妙黃連只壳等分槐花一兩浸水拌上三味炒乾去槐花只用二味煎好入乳香沒藥各八分服

久虛大滑服藥不効者大斷下丸龍骨枯礬赤石脂薑附
訶蔻爲末醋糊丸米飲下卽因用澁味亦須倍以砂陳以
利其氣恐太涩則腸胃不利反作痛也灸天樞氣海大能
止瀉○病在中州脾土只須薑蔻理之若病在腎家以赤
石脂禹餘糧補骨脂北五味方有功也

大孔作痛亦有寒熱之分挾熱者兵郎茯苓香連挾寒者
以炒鹹熨之或枳實爲末炒熟熨之內服人參乾薑甘艸
陳皮當歸作湯用

脫肛一症最难用藥熱則肛門閉寒則肛門脫磁石爲末
食前米飲下二錢外用鐵綉湯洗之

屢止屢發名曰休息痢多因用涩止太早或不能節飲食
戒嗜好所以時作時止宜四君子或補中益氣加香連或
肉蔻審無積滯惟見虛滑椿根皮三錢粟壳二錢參朮各
一兩木香梗米各二錢煎服有五更及于前甚者屬腎補

骨脂山藥北五味龍骨丸服午後甚者屬脾吳茱萸肉蔻
白朮甘艸丸服○蟻虫痢其形極細腸虛則生從穀道出
或作痒者內服桃仁蕪荑槐子雄黃丸外用苦參黃連桃
仁青葙子雄黃爲末艾汁丸如小指大棉裹納肛門中
先瀉後痢者脾傳腎爲賊邪難愈先痢而後瀉者腎傳脾
爲徵邪易治虛則補脾土虛甚則當補土母是也

久痢已成壞症○變態百出勿論其脈勿論其症只宜以
參附芪朮香砂補脾健胃常有得生者
參附芪朮香砂補脾健胃常有得生者
痢后變成痛風○周身流注皆屬虛致調攝失宜也補中

益氣加羌獨寄生虎骨松節或加乳沒蒼柏桃仁紫威煎
服○死症下純血者死如屋漏水者死大孔如竹筒者死
唇若塗硃者死發熱不休者死如魚腦如豬肝半死半生
脈法 沉小微細者吉 洪大滑數者凶 脈大爲未止
微弱爲欲止身雖發熱不死

針灸法久痢不止中脘脾俞天樞足三里三陰交
裏急後重下脘天樞照海

虛寒久瀉閏元中極天樞三陰交

附氣痢方牛乳半斤草蓀三錢同煎減半空心頓服良

水鴻

經曰春傷於風夏爲飧泄又曰春傷於風邪氣留連乃爲洞泄難經云濕多成五泄一曰胃泄色黃食不化輕者香砂枳朴重者枳朴硝黃二曰脾泄腹脹注泄食卽嘔吐理中湯加肉蔻诃子升麻三曰大腸泄食已窘迫大便色白腸鳴切痛附薑朮草四曰小腸泄溲濇而便膿血小腹作痛朴壳兵芍芩通大黃五曰大瘕泄裏急後重數至圊而不能便莖中痛芍歸朴壳芩兵木香大黃東垣云胃氣和平飲食入胃精氣輸於脾土上歸於肺而後行營衛也飲

食一傷起居不時損其胃氣則上升清華之氣反下降而爲飧泄矣久則太陰傳少陰而爲瘕寒冷之物傷中膜滿而脹傳爲飧泄宜溫熱以消導之濕熱之物傷中下膾者宜苦寒以內疎之風邪下啗升舉之濕氣內盛者分利之裡急者下之後重者稍之腹痛者和之洞泄腸鳴脈細微者溫之收之膿血稠粘每至周而不能便脈洪大有力者下之涼之大抵治病宜求其所因察何氣之勝取相制之藥治之因其所利而利之以乎爲期此治法也。

瀉利久不止及暴下者皆太陰受病不可少白朮甘草芍

聖人之法若四時下利者前方中春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然鏡更詳外症或虛實寒熱之殊爲主倘自汗手足厥冷氣微雖盛夏必投薑桂或煩熱躁渴脈寔卽隆冬亦用硝黃是在智者之通變耳

戴復菴云水瀉而腹不痛者濕也六君子湯加平胃散飲食入胃輒下完穀者氣虛也補中益氣湯亦有風邪入胃清陽在下升陽除濕湯腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者火也香連甘芍通滑洞泄多下清水胃苓湯或多或少者痰也平胃散加牛夏腹痛而瀉瀉后痛減者食積也平胃

加杏芽卜麵塘泄者汚積粘垢濕熱也栗芩湯胃苓湯
鶩泄者所下皆澄澈清冷小便清白濕兼寒也理中湯加
附子瀦泄者體重軟弱瀦下多水濕自甚也補中合除瀦
滑泄者久卜不能禁濕甚氣脫也補中加荳蔻赤石脂止
瀦之飧泄卽洞泄也水穀不化濕兼風也升陽除濕湯或
平胃散加羌防治之

東垣云夏間溼雨陰寒時行瀦利予一日體重肢冷瀦利
小便秘塞思其治法經云諸泄小便不利先分利之又云
治濕不利小便非其治也必用淡滲以利之是其法也噫

聖人之法布在方策其不盡者可以意求乎若年已五十
上者降氣多而升氣少得淡滲之品是降而又降更益其
陰而重竭其陽必用升陽補氣之劑同升柴羌獨甘防用
之所謂濕寒之勝以風平之又曰下者舉之是因曲而爲
直也若不達升降之道一槩施治安得取效乎

瀉有寒熱寒則脈遲身冷不獨溲清白或綿綿腹痛附子
理中湯加肉蔻仲景云下利不止與理中而和益甚夫理
中惟理中焦此利下焦故加附子及赤石脂禹臯丸治之
藥與食入口卽瀉者直腸瀉也不治熱則脈大自便少

六一散或胃苓湯加黃連瀉而脈滑堅者天承氣湯

凡泄瀉津液既去口中必渴小便自少不可便作熱論須以脈參之○伏暑瀉玉龍丸硝硫芩滑四味爲末水丸服盛暑通於外陰冷傷其中連理湯治之氣虛瀉者四君子加升柴訶蔻傷食瀉必嚘氣如敗邪治中湯加香砂枳朮查菜再煨所傷之物存性爲末調服傷酒瀉葛知鮮醒瀉傷麪食瀉必用卜子翹芽苦朴痰瀉二陳湯加海石神曲青代竹瀝姜汁丸服

五更時瀉屬腎虛必用補骨脂茱萸肉五味山藥茴香茯

苓肉桂治之其瀉已愈至明年届期復發者有種七ノ用
主信故耳香砂枳朮丸加蓬稜虛者倍自朮加人參

灸法大瀉氣脫不知人事口眼俱閉呼吸欲絕急灸氣海
如年壯大進人參附子稍緩則不及救矣又法加灸天樞

泄瀉水穀不分灸水分七壯此穴能分水穀利小便也

久痢體重滑泄不止用止瀉諸藥不効宜灸天樞氣海二

穴卽止

水漬入胃名曰溢飲滑泄不止渴而飲水水下又泄泄又
大渴此無藥症宜急灸大椎

腸鳴不已時上冲心灸神闕

裡急後重灸下脘天樞照海

下利手足厥冷無用者急灸天樞灸海灸之不溫脈亦不

至及微喘者死

厥有八症

陽氣衰乏者陰必湊之令人五指至膝上皆寒名曰寒厥
是寒氣逆于上也宜六物附子湯主之附子肉桂防己
甘草白朮茯苓陰退則陽進故陰氣衰于下則陽往湊之
故令人足下熱也熱甚則循三陰經而上逆謂之熱厥宜
大補丸主之黃柏一兩炒褐色爲末作丸肝藏血而主怒
怒則火起于肝載血上行故令血菀于上是血氣亂于胞
中相薄而厥逆也謂之薄厥宜蒲黃湯主之蒲黃一兩炒
褐色清酒十大杯熱沃之溫服諸動屬陽故煩勞則擾乎

陽而陽氣張大陽氣張大則勞火亢矣火炎則水乾故令
精絕是以遷延辟積至于夏月內外皆热水益虧而火益
亢孤陽厥逆如煎如熬故曰煎厥宜人參圓木丸主之人
參二兩天麥二冬生熟二地各四兩爲末蜜丸桐子大五
戶之氣暴注于人亂人陰陽血氣上有絕陽之絡下有破
陰之紐形氣相離不相順接故令暴厥如死名曰尸厥宜
二十四味流氣飲及蘇合香丸主之流氣飲丁香肉桂草
蔻麥冬赤茯木通棗卽枳壳厚朴木瓜青皮陳皮大腹皮
木香蓬莪朮人參白朮甘草白芷紫蘇香附菖蒲半夏製

霍吞 藕合丸 沉香青木香烏犀角香附子丁香硃砂白术

诃梨勒白檀香射香草揆龍腦安息香蘇合香各二兩薰
陸香一兩爲末蜜丸聽用寒痰迷悶四肢逆冷名曰痰厥
宜薑附湯主之胃寒卽吐蛻蟲名曰蛻厥宜理中湯加炒

川椒五粒枳郎五分吞烏梅丸薑附湯乾薑生附子煎服

烏梅丸

三十箇去核

人參細辛黃柏附子

包

桂枝各六錢

乾薑

一兩炮

當歸蜀椒

爭名四兩

爲末蜜丸

理中湯

人參甘艸白

朮乾薑水煎送烏梅丸氣爲人身之陽一有怫鬱則陽氣
不能四達故令手足厥冷與中風相似但風中身溫氣中

身冷耳名曰氣厥宜八味順氣散主之白芷台烏藥青皮
陳皮人參白朮茯苓甘艸水煎服

針法四肢厥逆脈伏宜用圓利針針復溜穴針至骨處候
回陽脈出針

灸法 氣海 腎俞 肝俞