

農曆家慶

新東華書店
新華書店
新華書店
新華書店
新華書店
新華書店

贈閱



（民國三十九年九月八日）

歌曆陽用改

改用陽曆真方便，二十四節最好算；
每月兩節日期定，最多相差一兩天；
上半年是六廿一，下半年是八廿三；
諸君熟記這幾句，舊式皇曆不用翻。

陽曆二十四節日期表

大雪	立冬	寒露	白露	立秋	小暑	芒種	立夏	清明	驚蟄	立春	小寒
十二月七日	十一月八日	十月九日	九月八日	八月九日	七月七日	六月六日	五月五日	四月五日	三月五日	二月五日	一月六日
冬月節		九月節	八月節	七月節	六月節	五月節	四月節	三月節	二月節	正月節	臘月節
冬至		小雪	霜降	秋分	處暑	大暑	夏至	小滿	谷雨	春分	雨水
十二月廿二日	十一月廿二日	十月廿三日	九月廿四日	八月廿三日	七月廿三日	六月中	五月廿二日	四月廿二日	三月廿二日	二月中	正月中
冬月中		十月中	九月中	八月中	七月中	六月中	五月中	四月中	三月中	二月中	臘月中

陽曆二十四節歌

一月小寒接大雪，秧歌鑼鼓賀新年。
 二月立春和雨水，勤拾糞土早種田。
 三月驚蟄又春分，早晚麥叢午耕田；
 清明谷雨四月天，種完蒜株播谷棉；
 五月立夏望小滿，黍稷玉米不算晚；
 芒種夏至六月到，割麥動草不宜緩；
 七月小暑大暑連，秋完地瓜緊修繩；
 立秋處暑在八月，高粱玉米漸熟全；
 九月白露又秋分，種下麥子收豆田；
 十月寒露霜降臨，花生地瓜也收完；
 冬月立冬見小雪，湖淨場光好支前；
 大雪冬至一歲完，反攻勝利過新年。

年九四九一

大曆一陽

期星

陰

太陽正卦

節

小寒

交九

不

久

大寒

冰上

行

走

元月

歲次庚寅

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	初	六	初
十六日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	初九	初八	初七
											初六	初六	初六

藥兔子，藥老雁

「治光腳又了，兔子遍地跑。」土信或信精拌在驛地瓜絲裏，越天冷地凍，撒在麥地內，很容易把兔子藥死。山嶺地區，兔子最多，為害最重。全莊子齊聯合下藥，收效更大。從抗戰期間起，縣裏多採用此法，收效極大。

「

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

地

凍

人

老

雁

天

冷

雞吃了可以擰凍

防治雞癟

防治雞瘟
改造雞巢以外，要防雞長瘟病，喂食時可拌上些蒜汁；使它消清血，可以防備雞瘟病。生疫病的雞，刺破翅膀底下紫血腺，放放血，再噴上些
蒜汁，就能治好。用火油和白麵，圓成像花生仁大的丸子，喂上兩三個，就能治好。如果莊裏有雞瘟，把雞關在院裏，或是白天送到莊外，都是些辦法。連死的雞頂好不吃。要吃的，也要把雞毛燒掉，雞糞、鷄腸、剖洗的水，全要深埋。頂忌把這些拿去河裏洗，或是隨便亂丟，最容易傳染。

防治牛瘟
「牛瘟流行，防治並重。」耕牛很易長瘟，沒病的應加預防。已染病的耕

防治牛瘟　急治療！

“牛瘟流行，防治並重。”耕牛很容易長瘟，沒病的應加強預防，已染病的要及時治療。用兩劑藥燙搗燙，加上十子來燙雞蛋清，搗勻灌上，可以預防牛瘟。已經病了的，全身打針，肚子脹飽，腿痺的時候，可用菟絲兩盤搗燙；合上豆腐汁一小盆，香油一錢，擦各處，若痊愈，一同塗上。

「土地回了家，好好地耕打。」「吃不窮，穿不窮，打算不到一世窮。」全年翻幾遍地，撒多少糞，種幾畝棉，栽多少樹……先看考慮，再全家討論，並具體分工，以資督導之。安邦樂告，毛澤東同志批評說：

「土地回了家，好好地耕打。」「吃不窮，穿不窮，打算不到一輩。」全年耕幾塊地，賣多少糞，種幾畝棉，栽多少樹……先看考慮，再全家討論，並具體分工，以後隨時檢查，按期總結。並進行開家庭會議獎勵。

農

詩

只要下工夫，一畝頂十畝。
人靠地長，地靠人長。

人不虧地皮，地不虧肚皮。

門前要有陳茶合
家裏主客要說。

28	27	26	25	24	23	22	21	20	18	17	16	15	14	
一 初 一	日 册 日	六 五 四 三 二 一 廿二日	廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日	廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日	〔雨水〕	五 四 三 二 一 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日	三 二 一 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日	二 一 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日	一 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日	十七 廿日 廿一日 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日	十六 廿日 廿一日 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日	十五 廿日 廿一日 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日	十四 廿日 廿一日 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日	
疏河排水和包堰存土	整好水溝排雨水，包起地堰存泥土。	山嶺斜坡地，應整水溝，預備排水，包扎地堰，保存泥土，省得雨水亂流，冲壞了莊稼，帶走泥土。石頭多的地裏，更應收拾乾淨，不要捲在地裏。	改造澇泉地	莒南縣時儉有四畝澇泉地，雨一大了，連種都賠了。前年雇了架子頭，扒了條尺半寬，二尺來深的水溝，旁邊又扒了六條小溝，填上石子，蓋上土半多深的土，種上麥子，三畝打了百三十多斤。水都打地底下流出，再也不犯澇了。有澇泉地的，可用這種辦法來改造。	治療樹瘋病	『棗樹用鋸拉，瘋病可少發。』棗樹容易發生瘋病，尤長一級二級的可鋸的太深和鋸對子口。刀砍斧剁也同樣有效。	種春大麥和春豌豆	去年沒種上麥子的地，或開着的場圃，可種上春大麥和春豌豆，青黃不接的時候，可以接口。	養馬尾松苗法	養馬尾松苗，最簡單的辦法，在未出九前（據楊林村民錢平鵝等馬尾松在山坡砂土地內，照行距一尺（市尺）刨成約一二寸深的溝，將選的繁實種子播上，然後蓋成小堆（如種瓜法同），聽其自然發芽，但在芽將出的時候，須分數次將堆平好，因土芽易發出，過密可間拔間拔（不間拔也可），到第三、四年夏秋兩季，耙出栽在山上就行了。此法係莒寧縣楊莊區楊林村及附近各村用的辦法。	不上糞，瞎胡混。	要做不如多上糞。	要想莊稼強，糞肥不能缺。	盛天蘿蕷相。

疏河排水和包堰存土
流，冲壞了莊稼，帶走泥土。石

「整好水溝排雨水，包起地堰存泥土。」山嶺斜坡地，應修整水溝，預備排水，包扎地堰，保存泥土，省得雨水亂

改造湧泉地
子，蓋上尺半多深
了。有湧泉地的，可

莒南縣時後有四畝澆泉地，雨一大了，連種都賒了。前年順了泉子頭，扒了條半寬，二尺來深的水溝，旁邊又扒了六條小溝，填上石

治棗樹瘋病
可鋸的太深和鋸對

紫樹用鋸拉，癒病可少效。紫樹容易發生病蟲，尤長一蟲，齧的嫩枝葉，不長果子。可用鋸在樹皮上淺鋸若干，能減少這種病。但不

種春大麥和春豌豆

去年沒種上麥子的地，或閒着的場園，可種上春大麥和春豌豆，青黃不接的時候，可以接口。

養馬尾松苗法 養馬尾松苗法

最簡單的辦法，在未出九前（據楊林村民談，遇局松出來不帶殼殼，出九種就帶種殼，易被鳥類啄食），發芽，但在芽將出的時候，須分數次將壟平好，因土也可），到第三、四年夏秋兩間，起出栽在田土地行，用的辦法。

卷之三

不上糞，睡胡混。

資藏如攢糧，攢糧如攢金。

要想壯筋強骨，無往不利。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	廿一日	廿一日	廿一日	廿一日	廿一日	十八日	十六日
初一	初二	初三	初四	廿九日	廿八日	廿七日	廿六日	廿五日	廿四日	廿三日	廿二日	廿一日	十九日	十八日	十七日	十六日
芝麻油，鴉下肚裏面的胎黃，然後吃奶，可以少招病。	接生牛犢　去年六月配的母牛，到今年三月間，就要生小牛。臨生的時候，屋子裏牛，鼻孔裏有層粘膜，要很快的給他除掉，晚了會害死。在小牛吃奶以前，先灌上一湯匙	養地瓜苗　瓜種。一畝地瓜頂三畝別的莊稼，栽地瓜是頂好的增加生產辦法。養苗法有三種：一、地瓜苗養在屋裏火炕上最省事；二、把炕盤在屋外向陽地方養也行；三、在向陽地方刨坑，鋪牲口糞，蓋上土養地瓜苗出地瓜更多。膠東農場有一年試驗結果是：第一種苗每墩十一兩，第二種是十五兩，第三種二十兩，差不多多一倍。	種早黃瓜　黃瓜韭菜兩頭鮮，所以黃瓜早種，才能多賣錢。莒南縣沙旺頭村的羣衆，種的黃瓜，下來的很早。他們的方法：用乾牛糞和上細土，把黃瓜種在花盆裏，養出苗，清明節後，栽在園裏，夜晚用泥盆蓋着，避免霜害，白天揭開。四十八天就能吃黃瓜。	種地蛋　要想吃飽飯，多多種地蛋。【地蛋又叫地豆子，一年可種兩次，春季一切地蛋種的時候，每塊至少要有一個芽，不要切的塊太小，太小了，苗長的不旺。在未切地蛋種以前，最好放在冷水中泡兩點鐘，從水裏拿出來就切，切好要燒上燒灰，不但可以消毒，還可以防止地蛋的水流出來。切完後，最好就種，若切好放了五天以上，就不會出芽了。】	「春分」											

植樹的方法：起樹苗時不要傷了根。若是小樹毛根多就容易栽活。沙地高地栽時宜稍深一二寸。低地粘土要與原來深度相同。沙灘栽樹，坑內應先填上些土。碱地坑內應填粘土，才能栽活。

種早黃瓜

種早黃瓜 黃瓜韭菜兩頭鮮，所以黃瓜早種，才能多賣錢。莒南縣沙旺頭村的農
種在花盆裏，養出苗，清明節後，栽在園裏，夜晚用泥盆蓋着，避免霜害，白天揭開。四十

種地蛋

【要想吃飽飯，多多種地蛋。】地蛋又叫地豆子，一年可種兩次，春季一畝可產兩三千斤，是頂好的度荒食物。

切地蛋種的時候，每塊至少要有一個芽，不要切的塊太小，太小了，苗長的不旺。在未切地蛋種以前，最好放在冷水中泡兩點鐘，從水裏拿出來就切，切好要撒上燒灰，不但可以消毒，還可以防止地蛋的水流出來。切完後，最好就種，若切好放了五天以上，就不會出芽了。

養地瓜苗

「地瓜要長好，養苗必須早。」驚蟄後就作準備，春分前後定要養上地瓜種。一畝地瓜頂三畝畝的莊稼，栽地瓜是頂好的增加生產辦法。養苗有三種：一、地瓜苗養在屋裏火炕上最省事；二、把爐盤在屋外向陽地方養也行；三、在向陽地方刨坑，鋪牲口糞，蓋上土養地瓜苗出地瓜更多。膠東農場有一年試驗結果是：第一種苗每畝十一兩，第二種是十五兩，第三種二十兩，差不多多一倍。

接生牛犢

接生牛犢 去年六月配的母牛，到今年二月間，就要生小牛。臨生的時候，屋子裏應當鋪上些軟草，把門窗關好，勿透強光，使母牛安靜。剛生下來的小牛，鼻孔裏有層粘膜，要很快的給他除掉，晚了常會悶死。在小牛吃奶以前，先灌上一湯匙芝麻油，瀉下肚裏面的胎黃，然後吃奶，可以少招病。

小月四
陽曆

陰曆
日月
大天

節
令
谷雨
清明
斷霜

癸卯年

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
四	三	二	一	日	六	五	四	三	初九	初八	初七	初六	初五
十七日	十六日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	初十	初九	初八	初七	初六

鋤頭遍麥子

「麥子鋤兩遍，多打豫旱多出穗。」前年省府大店農業指導所，麥收總結，鋤的麥子，比沒鋤的每畝多收二升半，每斗又重七斤半。清明前後，鋤頭遍，開花以前鋤二遍。如果能多鋤，當然更好。

養春蠶

「清明蛾子谷雨蠶。」清明前後，山廟出蛾以後，應仔細挑選，不好的蛾子，大量剔出不要，使配對的都是健壯沒病的蛾子。不應只圖賺錢，把不健壯的病蟲賣給人家。當地或就近有縣級指揮所或合作社出的蛾子，多是用鏡子檢查過，質量較好，可以盡量購用。

畦藍苗

「誰要想創錢，多種幾分藍。」藍苗在清明後就要畦。方法和畦菸苗、苗子栽。清明天暖的旱的地區，可在清明前幾天畦苗。

留心打步婧

秋天下的蝗卵，這時就要孵化成步婧，七八天蛻皮一次，四五十天就變成飛蝗，便不好捕捉了。一發現步婧，應立刻組織起來，集體圍打。平地要用碌碡滾壓。一般要挖溝包圍蛹羣，再在包圍圈內，挖成許多各種形式的溝，向裏圍趕，集中打死。溝的深淺，要看步婧的大小，才孵化出時，半尺深寬；要長熟時，須二尺多深寬。步婧常向着太陽活動，因趕時，要順着這個方向。

耩林、谷

「清明耩秫谷雨花，谷子播種到初夏。」清明節後，開始耩秫谷，到谷雨節前後，接着耩谷子。無論耩秫或谷子，在耩以前，都應當浸種；能

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	19	18	17	16	15
六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	二	廿一日	廿一日	廿一日	十八日
初三	初二	初一	四月一日	卅日	廿九日	廿八日	廿六日	廿五日	廿四日	廿三日	廿二日	廿二日	廿二日	十九日
減少林林的鳥籠和谷子的捨杆病（白髮病）。浸的方法：用兩瓢開水，一瓢冷水，分成半開水，把種子放進去，攪均勻了，撈去水上的穢子，停兩袋鹽的時間；把沉的撈出來晾乾，就可以播。有些地區，先種谷子後種林林。														
種 棉 花														
藥 地 下 蟲														
種 蔬 菜														
孵 雞														

「清明早，立夏遲，谷雨種棉正當時。」種棉花的前兩天，把種發了一點，能使苗出的早還旺盛，也能減少棉花的病蟲害。燙的方法：把燒開了的水，倒在盆裏，再倒上棉花種，趕快用木棍子攪勻，先上點涼水，到水不燙手為止，撈去漂起來的秕穀子，再浸一兩點鐘，去淨了水，撈上燒灰，當天種行，放一兩天種也行。膠東、魯中南要每人種一分，渤海每人要種三、四分。

「一翻三不收，接連連到了秋」。這幾年各地的春苗，往往被蟲子咬壞，在整地以前，應預備好殺蟲藥如土信、信精、黑樂、硫酸石灰等，每畝三、四兩，撒在整好的谷子上，整地時施上，防止蟲苗。

「豐年要當歉年過，省得糧盡多挨餓。」樹木發的嫩芽，都有不少營養的臭椿頭、桺柳葉、桺柳種，只要煮熟浸淨，都可以充飢。

種 蔬 菜 分；不但榆樹、楊樹、柳樹、洋槐的葉子，浸洗淨了可以吃，就是那有種洋蔥，長的好，費本少，用處大，可提倡種。

種 蔬 菜 一般的一溝溝種，需要比豆子濃些。好地、多肥、澆水的地，多作成寬畦漫種，沒播不行，可以多出蔬，間苗時能發開雞蛋就行。膠東來的小雞，應餵用水泡過的小米，加上點木炭末，雞吃下去，吸收肚裏的毒氣，可少招病。小雞不要給它水喝，喝了水，光下痢，用嫩菜葉代替水最好。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	20	19	18	17	16	15
二	一	日	六	五	四	三	日	一	廿二日	四	二	二	一	日	十八日
初四	初三	初二	初一	五月	卅日	廿九日	廿八日	廿七日	廿六日	廿五日	廿四日	廿一日	廿一日	廿日	十九日
在枝上的位置，俗說『桃南杏北梨東西，石榴藏在枝葉裏』。	果樹蔬果	改造糞汪	刮牆皮和拆炕土	照蛾子	注意拿暗撞子	拿地蠶	地蠶真可惡，白天藏在土裏，黑夜出來鬧禍。才出蟄的地蠶食量很大，一天能禦害很多莊稼。見了被咬壞的莊稼，在根下土裏一扒，很容易扒出，早起地蠶還沒鑽到地裏，更容易捉到。	易拔淨。							
辦法是桃子不留梢上的，梨留每朵花靠外邊的，蘋果留花朵當中的一個，還要注重各種果子	辦法是桃子不留梢上的，梨留每朵花靠外邊的，蘋果留花朵當中的一個，還要注重各種果子	常除糞費事，糞也渥不好，下地不愛長，還容易招蟲。並且天井裏的水，打糞汪裏流出去，把糞勁帶走，極不合算。應把糞汪酌量加大、挖深，用石灰砌好。汪旁另開水溝，不用水時，使水從旁溝流出去。	秋柴，包米秧裏的鐵心虫，都要出蟻產卵生虫子。聯合全村全區，在出法，作的越普遍，收效越大。	秋柴，包米秧裏的鐵心虫，都要出蟻產卵生虫子。聯合全村全區，在出法，作的越普遍，收效越大。	家裏土，地裏虎，一牆皮、炕土上地，勁頭很大，並能防止鍛苗，趁天長日暖，應盡量弄了上地。如不馬上使用，應該用土培起來，被雨水淋，就沒有勁頭。	家裏土，地裏虎，一牆皮、炕土上地，勁頭很大，並能防止鍛苗，趁天長日暖，應盡量弄了上地。如不馬上使用，應該用土培起來，被雨水淋，就沒有勁頭。	要想莊稼長的強，必須改造舊糞汪。舊式糞汪，多半太小太淺，時	要想莊稼長的強，必須改造舊糞汪。舊式糞汪，多半太小太淺，時	一家北村就拿千多斤，莘汪區用一元錢一兩辦法收買，幾天工夫收買了三千多兩，保住了春播和麥苗。	一家北村就拿千多斤，莘汪區用一元錢一兩辦法收買，幾天工夫收買了三千多兩，保住了春播和麥苗。	前年沂南岸堤區小裕莊，春田苗子一般被曉蟻吃了十之三四，這的吃了十之六七。在『拿一個虫子，救一株莊稼』的號召下，只因	拿地蠶	地蠶真可惡，白天藏在土裏，黑夜出來鬧禍。才出蟄的地蠶食量很大，一天能禦害很多莊稼。見了被咬壞的莊稼，在根下土裏一扒，很容易扒出，早起地蠶還沒鑽到地裏，更容易捉到。		

節芒種夏至麥上場
家家戶戶一齊忙

書由攢集

「消除害虫保青苗，灑藥下地耕作好。」打死的步蟾，拿的踏獅子，可以培在土裏，埋了下地，頭頭很大，一斤能頂兩斤大黃。

選麥種

麥子成熟時，到地裏摘穗子。一株的，穗子大，並完全成熟的，剪下來，
孤另打捆，單獨作種。自己挑選麥穗不好，可以到別人家地裏選。

消除鑽心虫

鑽心虫咬壞的稻苗，發現了就要掐下來燒掉，別讓它再咬旁的稻苗。剩下的稻苗，可以再發，不少有長食。前年苦南大吉南門裏一家農戶，

生長的指了，秋天打

乘了船在船上，可以平穩，不必怕船翻。而且這兩處都是有船家的，一上船，就有人幫忙，你無須自己好勞，別人家却多被讚美，少打許多轉。

消滅蠶虫子

用半斤煙葉，泡水一、二斤，用小瓶裝着，把揩了蠅虫的藥或成藥到裏面，就可以全個藥好。煙頭也行，不過要少加點水。

有煙或煙太濃的時

候，可用「棉油乳劑」酒或洗。棉油乳劑的製法：用二兩洗衣肥皂，再兌上三十來斤河水，攪均勻；再把二兩橘子油，慢慢的滴進去。要

一面擦一面揩，最後水面上不見油花，完全成了掌聲。加上點肥皂水，撓一撓，用的方法，和用煙水一樣。

棉葉上的花蓋子和蕩屨子，不但不禍害棉花，牠還吃螢虫子的卵和螢虫子，應當保護它。

拿土蠶蛾

小滿芒種以後，土蠶大半變成蛾子，要注重搜捕消除，免得它產卵出蟲，再害莊稼。

大月曆						
七陽						
陰月六七						
期星						
14	13	12	11	10	9	8
〔小暑〕				6	5	4
四	三	二	一	日	六	五
十九日	十八日	十七日	十六日	十四日	十二日	十一日

節令 小暑快入伏
大暑中伏天

總結麥收

麥收以後，要按組按戶總結，究竟誰家麥子怎樣種的才長的好，打的多？那個組勞動力怎樣分配才能幹得好，做得快？誰家如何防止了烏麥？誰家怎樣對付了疸病？統統找出典型，得出結論，提高自己，推動別人。

整理變工組 割麥、種豆、秧地瓜，都是很緊張的活絡，變工組容易鬧意見，甚至拆夥、垮台。在這個時候，要及時檢討，抓緊整理，免得意見越深，

沒法收拾。

棉花打萌條

棉花苗條子長的旺，骨節直，向上長，又粗又大；結果枝向外長，骨節彎曲，長的細慢，很容易認出來，隨時留心，把萌條打淨，免得多耗了棉花的養分。

拔槍桿和烏霉

『槍桿、烏霉拔個遍，來年地裏就少見。』槍桿上的黃粉，烏霉上的黑灰，都會使明年的高粱、穀子還長這些病，應該一見面就拔，使它的灰、粉不能成熟，沒法傳播；還可少竭地，多打糧。

澆草淨糞

『青草澆麥糞，越長越有勁。』大前年臨洮桃園區的生產助理葛樹恩，用七車青草澆好的糞上地，種了二畝三級的麥子，第二年打了七百七十多斤。若用蓼科、葎柳、菟葵條、貓眼科子澆糞，不只長麥好，還能藥地裏虫子，防止餓苗。但有腥烏麥和線虫病的麥糠絕對不能澆糞，也不能喂牲口。打場後的爛土，淘麥的水，統統不能倒在天井或糞坑裏。

31	30	29	28	27	26	25	24	22	2	20	19	18	17	16	15
日	六	五	四	三	二	一	廿九日	廿八日	廿七日	廿六日	廿五日	廿三日	廿一日	廿日	廿九日
初六	初五	初四	初三	初二	初一	册日	月初一	大暑	五	四	三	二	一	日	六五

溫 蔴 早種的蔴，已散放蔴灰，下部葉子落淨，蔴梗黃綠，地這頭可以望到那頭，俗說『透了亮』，就可以割了下水澆了。因為天熱，一天一夜，澆到蔴皮發滑，表面顯出些螞蚱眼似的小泡，就是火候到了，要馬上撈出來，晒乾了抽剝使用。

割 藥

早種的薑，已可成熟，葉子厚脆發亮，起豆窩，早晨發出種香氣，少數割第一次，割整的好，還可割第三次。第二次的薑要留種。

捕 豆 虫 蛾

蟻在土裏的豆虫，經廿多天蛹期，七月間出蛾，每個母蛾能生二三百個卵，要組織捕拿。拿下的蛾子，用水洗淨，可以炒了吃。

拿 稻 苞 虫

七月底八月初，稻苞虫就第一次發現。可以用兩板對摺；也可用竹片縛虫，俗說『氣不憤』，專吃苞虫。還有種細腰，黑頭，二分多長的黃色蟲子，拖了半分多長的尾巴，專在苞虫肚裏產卵，使它生蟲，都對我們有好處，應該保護。去年莒南十字路一帶，在半數以上的稻苞菜裏發現這種虫子，結果沒用捉，苞虫消滅了。

消 滅 仔 蟬

仔蟬也叫『五色虫』，又叫『綿虫』，頭麥出一次，到七、八月又出第二次。因為繁殖生長快，為害重，以前多迷信為神虫。如果發現仔蟬，應該組織男女老小一齊下手拿。沒虫的穀地，在四面挖一鍵來深寬的溝，仔蟬跑進去時就打死，不讓它爬上莊稼。歷城有個劉化銅，有一年，見仔蟬很多，他迷信是神虫，到泰安去許願，趕回來時，穀子全被吃光，別人家盡力出拿的却都救了出來。沒秀穗的穀子，招了仔蟬，可用簸箕平推，穀葉上仔蟬，大部推到簸箕裏去。已秀穗的穀子，可把簸箕橫繞上根木棍，一手拿簸箕上木棍，提了簸箕，靠近穀穗，一手另拿一本棍輕輕敲擊穗，穀不受傷，虫子落入簸箕，仔蟬爬過來時掉進溝去，爬不出來，可以弄死。

大月八陽						
曆陰月小小七閏						
星期						
14	13	12	11	10	9	8
日	六	五	四	三	二	一
廿九日	十八日	十七日	十六日	十三日	十二日	十一日

令節 立秋 谷不熟
處暑 動刀 驚

打棉花頭

「立秋後，把頭丟。」立秋前後，好地的棉花，應即把頭心打去，不讓它再向上長，好把勁都使在棉桃上；也能早拾完花，免得多長不開的秋桃。

地薄、葉少、密種的棉花，可以不打頭，免得多費了事，也起不了多大作用。

種秋菜

「中伏蘿白，未伏芥，立秋前後大白菜。」大白菜種早了蟲子多，晚了長不好，應在立秋前後三兩日種完。蕓苔等類蔬菜，也應在這時一齊下種。白菜出來以後，應分三次間苗，七八個葉再定苗。苗葉縮縮多毛，顏色淡綠，稍帶圓形，短柄，中肋寬，生長平常的是好的。葉尖向外下垂，葉片表面平滑，沒皺縮和毛苔，顏色淡綠，長的特別旺盛的都是變種，不可留。

種麥時好用。

搜集殺蟲藥物

蝴蝶花、映山紅、苦桔皮，都可以殺蘿蔔、白菜上的蟲子，要預先搜集，晒乾備用。山蘇麥、百倍子根，都很有效，如果當地沒有，可由合作社外地販入。芫花條、山荊種子、烏頭等可以下在地裏預防駒苗，要趁空隙集下。

修堰開溝

有障礙的河流，要及時疏通。已經冲壞或不堅牢的堤壩，要加以修補。淤塞的水溝及排不出的積水，要趕緊挖掘新溝，或疏通舊道，免得澇災。

莊稼。沖壞的地壩，必須隨時再築，省得損壞田地。

疏河補堤

「始螟到處找蟲吃，成千萬的害蟲被它們吃掉，青蛙和蛤蟆是吃莊稼

保護青蛙蛤蟆

31	30	29	28	27	26	25	24		22	21	20	19	18	17	16	15
三	二	一	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	廿二日	廿一日
初八																

田間選種

「田間來選種，明年好收成。」穀子、秫米到成熟的時候，就應單獨保存做種。地頭、地邊、糞堆、扶脊頂長的好不作數，選種時應選擇不要。保存時，要速速保存，可不生蟲，也不會脫粒，晒乾吊起來就是。

換取麥種

「沒有好麥種，難得好收成。」麥前沒選下好麥種的，要把自己的麥子換別人多選的麥種。連多年麥種，到別處換換可種，病害可以減少，生長可以旺盛。「麥喜生土」，一樣的地，却可以多打糧。海鹽大的地方，可以換「氣死露」、「露麥」、「火麥」、「禿頭麥」等麥種來種。

趕收春田

「搶種搶收，莫落人後。」處暑前後，就要割玉米，收黍稷，割早稻。接着，晚稻、秫米都要收獲。「八分熟，十分收」，不要延遲，免受災害。

早耕麥地

「冬耕無曉，秋耕無早。」早耕的秋地，乾的慢，秋天無雨，就誤不了種麥。地裏雜草還沒成種，翻在地裏，可當肥料。耕晚了不爛，草種不成熟，易荒豆地，雜草也礙事。牛犢缺的，先把牲口用鋤鋤起來，耙上幾遍，也可起早耕的作用。

注意化蝗蟲

春天蝗蟲下的子，八月間再出步蛹，如果天旱，更容易猖狂，必須隨時注意，一旦發現，應馬上報告政府，好組織力量捕打，不使成災。因為這時草都長起來，特別是蠶桑地高，如渤海沿海，魯南湖濱附近，要十分注意。

人的好朋友，要很好保護。膠東有的地方，把蛤蟆養在菜園裏吃蟲。

早運麥糞 「趁空早運糞，種麥多省勁。」山高湖遠的麥糞，應及早運到地頭堆起，用泥浸好，用時勻開就是，省得種麥時忙不及；也省得堆在街上，水沖雨淋，丟失費勁，又不潔淨。

「田間來選種，明年好收成。」穀子、玉米到成熟的時候，就應單獨保存做種。地頭、地邊、糞堆、扶脊頂長的好不作數，選種時應選擇不要。保存時，要速速保存，可不生蟲，也不會脫粒，晒乾吊起來就是。

「沒有好麥種，難得好收成。」麥前沒選下好麥種的，要把自己的麥子換別人多選的麥種。連多年麥種，到別處換換可種，病害可以減少，生長可以旺盛。「麥喜生土」，一樣的地，却可以多打糧。海鹽大的地方，可以換「氣死露」、「露麥」、「火麥」、「禿頭麥」等麥種來種。

「搶種搶收，莫落人後。」處暑前後，就要割玉米，收黍稷，割早稻。接着，晚稻、秫米都要收獲。「八分熟，十分收」，不要延遲，免受災害。

「冬耕無曉，秋耕無早。」早耕的秋地，乾的慢，秋天無雨，就誤不了種麥。地裏雜草還沒成種，翻在地裏，可當肥料。耕晚了不爛，草種不成熟，易荒豆地，雜草也礙事。牛犢缺的，先把牲口用鋤鋤起來，耙上幾遍，也可起早耕的作用。

春天蝗蟲下的子，八月間再出步蛹，如果天旱，更容易猖狂，必須隨時注意，一旦發現，應馬上報告政府，好組織力量捕打，不使成災。

因為這時草都長起來，特別是蠶桑地高，如渤海沿海，魯南湖濱附近，要十分注意。

九月
小曆

陰月
小大

令
秋 分 前 後 無 生 田

配音節

年

月

日

星

期

初

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

三十

廿一

廿二

廿三

廿四

廿五

廿六

廿七

廿八

廿九

30	29	28	27	26	25	24		21	20	19	18	17	16	15		
五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	廿七日	廿六日	廿五日	廿四日	廿三日
初九	初八	初七	初六	初五	初四	初一	九月	廿九日								

農
諺

防除烏麥和爛麥

麥戶裏都有很多病蟲，越上鋪蓋，或是和麥種隔離，絕不可和麥種一起播上，免得傳染。如果不施有病蟲的蓋當更好。爛麥（裏面一包白紙的）用鹽水漂淨，就可以下種。大麥的烏麥，只須三成二的開水燙一下，就可大大減少，真燙好了，也可以完全沒有。浸好的麥種，還能早出，不易被雨浸住，長的旺盛。沿海麥過重的地方，要換種禿頭麥子種，長的輕，打的多。

用藥殺虫防蝕麥苗

土借、信精，二兩到四兩，拌在兩盤熟的谷子裏，隨種播上，可以防除地裏害麥苗的蟲子。羌利、山荊種、馬尾松針、柏樹葉、樟榔葉、胡麻葉等碎拌在麥子地，也可防除一部分。用臘月猪板脂油、柏油、煤油、豆油等類一、二兩，撒十來斤麥種，可以驅除麥姑等害蟲，保護麥苗。

「麥到夏至，谷立秋，黃豆割在分前後。」黃豆熟時，到地裏邊落青葉，豆莢成熟，又沒燒炸，並莢子多鼓的，不是雜種的豆棵，拔了單獨晒打，保存了生種。年年選來，不只可以不炸，狗皮豆子也會減少，產量也會增多。實在做不到地裏選種，割到場上以後，照上面標準來選，也可以生種，只是不如地裏選種效力大。

收麥如救火，參加變工組。
大麥不過芒種，小麥不過夏至。
麥到芒種，谷到秋，
寒露才把豆子收。
麥熟砍高粱，
寒露打完場。
打麥割麥。
小麥上了場，
麥熟發了黃。

不過立冬，一般是『秋分』，『寒露』之間，真為適當。

防除烏麥和爛麥

烏麥戶的麥種頂好不用。要用的話，必須把很潔凈水，把烏麥漂

去，再用清水洗淨，或是更用少許冷水的開水浸過再用。一般烏

麥戶裏都有很多病蟲，越上鋪蓋，或是和麥種隔離，絕不可和麥種一起播上，免得傳染。如果不施有病蟲的蓋當更好。爛麥（裏面一包白紙的）用鹽水漂淨，就可以下種。大麥的烏麥，只須三成二的開水燙一下，就可大大減少，真燙好了，也可以完全沒有。浸好的

麥種，還能早出，不易被雨浸住，長的旺盛。沿海麥過重的地方，要換種禿頭麥子種，長的輕，打的多。

用藥殺虫防蝕麥苗

土借、信精，二兩到四兩，拌在兩盤熟的谷子裏，隨種播

上，可以防除地裏害麥苗的蟲子。羌利、山荊種、馬尾松

針、柏樹葉、樟榔葉、胡麻葉等碎拌在麥子地，也可防除一部分。用臘月猪板脂油、柏

油、煤油、豆油等類一、二兩，撒十來斤麥種，可以驅除麥姑等害蟲，保護麥苗。

選黃豆種

「麥到夏至，谷立秋，黃豆割在分前後。」黃豆熟時，到地裏邊落青葉，豆莢成熟，又沒燒炸，並莢子多鼓的，不是雜種的豆棵，拔了單獨

晒打，保存了生種。年年選來，不只可以不炸，狗皮豆子也會減少，產量也會增多。實在做不到地裏選種，割到場上以後，照上面標準來選，也可以生種，只是不如地裏選種效力大。

收麥如救火，參加變工組。

大麥不過芒種，小麥不過夏至。

麥到芒種，谷到秋，

寒露才把豆子收。

麥熟砍高粱，

寒露打完場。

打麥割麥。

小麥上了場，

麥熟發了黃。

大月曆
十陽

期星
陰曆
八九月
大小

令節
霜降
寒露
天漸冷
百草枯

『豐年要當歉年過，遇到歉年不挨餓。』十月寒露以後的地瓜秧，已生長完全，剪下尺多長的頭來，用快刀切

細，好天一天就可以晒乾。保存了冬天煮豆沫子吃，可以當飯；也可以當菜，又合口，養分又多。濱海一帶，普遍切晒，值得別地學習。實在秋忙沒空，一把一把的地瓜頭晒了起來，冬天吃時泡開再切，也是辦法，只是難晒些。地瓜葉在下霜以前摘了下來，晒乾了保存冬天吃，也很好。有地方用鹽醃起來，冬裏下麵當青頭，更好。

刨地瓜頭和晒地瓜葉

霜降一到，嚴霜即來，要馬上割地瓜秧，刨地瓜。秧子割晚了，容易被霜打毀。地瓜不早刨，會遭冰凍、腐爛。刨地瓜頭好揀好天。刨起來在地裏晒上半天，再下窖保存，不容易壞。

選地瓜種

刨地瓜時，要在地裏選種，揀沒被蟲鑽，沒破外皮，筋少，光潔，皮色新鮮，長的匀和，每墩兩三個的留了作種。有爛地瓜，有飛地瓜的都不要。作種的地瓜，要仔細放在窖子底下，頂面再放上吃的地瓜。要是放在家裏，或放在鍋屋，容易發散水分、糠穢；也容易生芽過早。

晒冬菜

『冬天多吃菜，省下糧食春天賣。』秋後的芥菜、苦菜、薺菜，往往長得又嫩又肥，挖了來家，鮮吃固好，把它晒乾了保存起來，冬天吃更好，應大量採晒。其他如蘿蔔葉，醃菜葉，被霜打過的莧菜葉，蕎豆葉，杏樹葉等，摘了晒乾，都是很好的冬菜。特別種白菜多的地方，弄下的許多菜葉，應全部晒乾保存，不可隨便丟棄。芋頭等葉，也應晒乾大量保存。冬裏吃不了還可以多年保存備荒。霜降前有工夫把芋

31	30	29	28	27	26	25	霜降	23	22	21	20	19	18	17	16	15
一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六
初 十 九	初 八	初 七	初 六	初 五	初 四	初 三	初 二	初 一	廿 日	廿 九 日	廿 八 日	廿 七 日	廿 六 日	廿 五 日	廿 四 日	

頭葉連梗採下，去掉葉片，用針錐把它一絲絲的搜開，極易晒乾，保存便利，冬裏吃最好。

拔棉柴

頭葉連梗採下，去掉葉片，用針錐把它一絲絲的搜開，極易晒乾，保存便利，冬裏吃最好。拔棉柴 嘘後的棉葉，大部掉淨，棉桃亦大部開完，應早些拔掉棉柴，倒出地來，好預備冬耕。也免得葉梗、小枝、爛桃上的虫卵、病菌，一齊落到地裏，來年再禍害棉花。「滿湖棉花拔個淨，來年少招病和蟲。」就是這個道理。即使還有沒有開完的桃子，拔了棉柴以後，在向陽處曬着，乾了自然裂開，一次可以拾完。放在地裏不拔，多次拾花，倒要費工夫。青桃被凍，更難開裂，也可以把棉秸拔下晒着爲好。

採樹種

採樹種。樹種都成熟，採收要及時。栗子、榛子等硬壳種子，收後要埋在地裏。中國槐、杜梨等帶果肉的種子，應在水裏泡爛，搓去果肉，洗淨後，乾保存。馬尾松要早點採，晚了就爆落地下。洋槐、皂莢種子易生蛆蟲，可拌上熟石灰粉來防止。

配
筆

『三五一百五，小羊離了母。』母羊交配後一百五六十天就可以生小羊，這時配的羊，明年天暖草發時下羊，正是時候。

卷之三

三

雅
一
四

卷之三

卷之三

留皮

四
遍

卷之三

四

卷三

三

卷三

胡桃結果十八年

泥得好了還不褪色。介紹幾種土法：一、用稻草、柳子等東西，都可以煮水，用污泥泥土，可不
泥出來連泥三、四次，就很青。二、荳子、豆葉等煮水，可不泥，一連泥半天，擰淨乾，再浸再洗，一連
煮一會兒，就成竹青色，也不用泥。

十一月
小月曆

陰月
小月曆

立了冬，地要凍，好冬耕
小雪不封地，不過三五日

冬耕

「兒子要親生，田地要冬耕。」「親生的兒子貼皮沾骨，冬耕的土地倒

越好，即使不能一次深下去，也可一年年逐漸深耕。「冬耕深一寸，春天省堆糞。」冬耕越深，這月正是冬耕的好時候。冬耕後的地，本來可以不起，使土能摺雪，並可能多凍死害蟲，和雜草野菜，多風化土壤，但雨雪少，土性過緊的老湖土，必須耙開坷垃，免得水份蒸發過多，春乾耙不開。太薄的嶺地與河沙地，不可冬耕，免得颳起細土，冲走養分。嚴重的地也不宜冬耕。

修壩和開渠

「多修壩，多開渠，免得水沖與沙淤。」伏雨傷水的地，容易泛濫的河，秋收完了，應組織力量來修壩、開渠，防止水災。

挖豆蟲和掘蝗卵

蟻在地裏的豆蟲，不過二三指深，找土鬆的地方，很容易挖到子、包餃子都還好吃，並且很滋補。賣也很值錢，約三斤可換一斤豬肉，大量挖撈，它蟻在鬆土和向陽地方，使明年不能再吃黃豆，更是件大事。下在土裏的蝗虫卵，也不過一二寸深，多的地方，要勤員挖掘，省得明年再出步蛹。挖出的蝗卵，可以炒了吃，也可以喂雞，滋補很大。蝗卵多產在邊邊、石縫、地堰、草坡、沒耕的豆地、稻地等高旱地方。

誘殺蝼蛄

沒種麥的地裏，散亂的挖上幾條，裝來寬深的溝，讓碎草落葉自然匯聚，蝼蛄喜歡藏在裏面，可以隨時挖出來打殺。

拾穀楂

『滿湖穀楂拾個淨，來年少招鑽心蟲。』秋後的鑽心蟲，多鑽在穀楂裏過冬，拾淨這些穀楂當柴燒，可以消滅很多的鑽心蟲。

搞副業

搞副業，誰要想發財，推粉打油一齊來。」推粉可以賺錢，可以喂豬，喂牲口，並能攢很多的糞；再如打油、做豆腐、編席、紡織、打草鞋……都是莊戶人家冬季極好的副業。冬裏空閒，每人可作一兩樣副業，並要早下手來搞。全莊，全變工組，能通湊本錢，有計劃的集體或分工來搞更好。

積攢春華

『冬天積下來年糞，莫待來年曬胡泥。』積糞是長期工作，要早打諾，到用糞時嫌少就晚了。『掃糞籬，糞堆長。』每天把天井裏的雞鵝糞，連碎土爛草一起掃到糞窩裏去，是積糞頂普通的辦法。『要想莊稼長，糞筐不離傍。』『無事少趕集，有空多拾糞。』背糞箕拾糞，是積糞的另一辦法。『要龍虎丘不如要素土。』糞窩內墊土，可以吸收水分和糞勁，漚成好糞。積糞不墊土是不中の。儘上沙地多的，更應多墊整土，效力特大。『要有大糞堆，天天保存灰。』燒的草灰、柴灰，配合糞長莊稼特別好，必須好好保存，不使風颶雨濕，免得勁頭減少。每天鍋灶底下填上兩級乾土燒着，和灰一起扒出來單獨保存使用更好。人尿的勁也很大，一點不應丟掉，明春最好一畝地多上一車子糞。

收蘿蔔，窖白菜

立冬蘿蔔，小雪菜。『立冬時天如暖和，蘿蔔當然還長，但一反天，容易凍壞，還是早收為好。白菜雖說凍些，小雪前後也應看天氣下窖，免得凍壞。蘿蔔、白菜下窖以前，應先晒幾日，才不容易壞。

土法染色

先把紅高粱帽放在鍋裏，添上水煮的有了色，再把布放入裏它，煮後晒乾，乾了又煮，反來覆去煮三四回，色就深而不褪了，如加上乾槐花椿

樹葉能鮮亮點

先把紅高粱帽放在鍋裏，添上水煮的有了色，再把布放入煮它，煮後晾乾，乾了又煮，反來覆去煮三四回，色就深而不褪了，如加上乾槐花椿

大月二十
陽曆

陰曆十一
月
小

令
冬
至
一
九
天

農曆

期

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
廿五日	廿四日	廿三日	廿一日	廿一日	廿日	十九日	十八日	十七日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日
己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未	己未

學習文化

「文化學習好，才能作主人。」土地回家以後，大家在經濟上是已經翻身，還得抓緊空閒時間，積極上參學，學習認字，算賬，學習作莊稼辦法，學習做人的道理，組織讀報組，辦好本莊的黑板報。

總結全年生產

「日子待要好，還得回頭找。」按照全年與家計劃，總結全年生產工作，找出經驗教訓，提高自己，幫助大家，使將來生產搞得更好。貞好開全組全家會議，一組組，一家家的民主討論，共同總結。

選舉勞模

「互助組，變工隊，英雄模範看是誰？」根據生產總結，看誰勞動積極？誰生產成績好？誰進步快？討論出一組一家的勞動模範；在全村大會上提出競選條件，進行競選，最後選出全村勞模，好參加區縣勞模大會。

開生產展覽會

「家家挑，戶戶選，誰家生產最出眼！」各組各戶，把自己生產頂的生產品，加上詳細說明，妥當保存，送到村農倉上展覽，經全村比較，討論，挑出頂好的生產品，必須：成績好，還要找出好的原因來，好讓別人也能學。

保護林木

無論公私山林樹木，未經管理機關及林主同意，任何機關，部隊，團體及人民，均不得採伐。必須採伐時，公有林得由管理機關指定採伐辦法，私有林須得林主同意，且均須公平恰價，不可強行採伐。凡不遵守政府法令及封山造林，擅自砍伐採取林木，或縱放牲畜損壞林木者，要他賠償損失。故意破壞更要加重處罰。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	〔冬至〕	21	20	19	18	17	16	15
六	五	四	三	二	一	日	六	五	初四	初三	初二	一	日	六	五	四
十二日	十一日	初十	初九	初八	初七	初六	初五	初四	廿九日	廿八日	廿七日	廿六日	廿五日	廿四日	廿三日	廿二日

出糞糞土

糞糞的土，必須冬除出來，上凍以後，趁天冷地硬，搬運村中，够全年使用。免得農忙時沒有工夫搬，且地裏有了莊稼，也沒地方出土。何況冬裏除出來的土，經過冰凍、風吹及日曬，土粒鬆散，養分變多，吸收力大，施肥省事，好處多着呢！特別是嶺地土缺的地方，冬天除不出土，搬不下土，全年不用想積更多的糞。

養羊積糞

羊糞尿不只長莊稼勁頭大，還可以驅除地下的害蟲，防止立不住苗。三、五頭羊，可頂一頭驢，養羊是很好積糞辦法，特別是喂不起牲口，喂不起猪的，更應買羊養活。本錢多，草多的，可多買；少的可以少買，多少隨便，總比養牛，養驢方便。春天以後，可以合夥雇人放牧，連喂養都用不着了。平原草少，沒有羊羣的地方，可以把羊送到山裏有羊羣的村莊放牧。

保護耕牛

『冬耕難了，耕牛莫少。』草料雖貴，耕牛也不能出賣，冬天賣了，春天就不易買到，更容易因物價昂貴，再買不起耕牛。何況冬天養牛，雖說得費草料，但也積了尿糞，第二年種地有了本錢，非同小費。夥養牛喂養困難的，政府可以予以貸款幫助。養活一頭牛少繳公糧十五斤，公草二十二斤半。

古銅色

(一) 先把紅高粱樹葉放在鍋裏，煮的有了色，再把布放在鍋裏煮後，再用青泥砸，砸後用清水洗，洗後再砸，反覆兩三回。

(二) 桑根三份，高粱穗三份，布。

(三) 用穀草灰，或三碗黑豆楷灰，用開水浸揉。

(四) 用黑豆皮先煮開，一會把布放入。

(五) 電池的黑泥研成細末，開水浸揉後淨水洗。

歌序順節四十二

冬 立 夏 立
雪 處 濡 雨
雪 露 忙 蒼
冬 分 夏 春
小 寒 二 清
大 霜 暑 穀
寒 至 連 天

山東省政府關於保護及獎勵培植林木暫行辦法

一、為保護與獎勵培植林木，特制定本辦法。

二、依據土地法大綱第九條乙項之規定，對下列山林、封山等須收歸各級政府分別管理。

甲、大山林由省政府直接管理，或委託各行政公署管理之。

乙、凡屬縣範圍內原有之縣公林及數村共有之。「封山」「公林」，應由縣政府管理之。

丙、凡屬一村範圍內原有之「封山」「森林」及社地廟地之林木，由村政府管理之。

丁、各重要河道（如黃河）及各公路鐵路兩側，為鞏固堤岸及路基所種植之樹木，由各河務局公路局及鐵路局管理之。

三、凡已劃歸各級政府管理之森林、山場，須由各該管理機關將森林山場情況面積四界及管理辦法呈報上級政府備案，並出示佈告嚴加保護，屬於羣衆私有者亦予以法令保護。

四、公有林須建立一定之管理組織，擬具管理辦法切實負責保護與培植，按時播種栽植修理採伐，羣衆分得之山林政府獎勵與扶持其發展。

五、公有林地封山只准造林，不准開荒；如必須開荒時，公有林地須經省府或行政公署批准。

六、未確定所有權之荒山、河灘，羣衆自願造林植樹者由縣以上政府或主管機關登記批准，所造林木歸羣衆所有，但地權仍歸政府所有。

七、邊閑團體所種之樹木如在私人地內者屬於該土地所有者所有如在公地未向當地政府聲明備案者歸公有公地已分給羣衆者所種之樹木亦隨地轉移。

八、無論公私山林樹木未經管理機關及林主同意，任何機關部隊團體及人民均不得採伐林木；如必須採伐時，公有林得由管理

九、機關指定採伐辦法，私有林須商得林主同意，公私林均須公平給價不得強行採伐，違者依法懲辦。

十、為防止火災毀壞林木，嚴禁燃燒野草，故意放火成災者，依法追究。

十一、封山造林時須劃出一定山場，便利羣衆牧放牲畜。

十二、在公地或私有土地內造林，其佔用土地未滿一年者，可免除負擔，苗圃保育林（如防風林等），所佔之土地免除負擔。

十三、凡保護林木培植育苗及介紹經驗推廣羣衆造林有顯著成績者，政府應予以獎勵。

十四、在不抵觸本辦法原則下，各地區得自訂管理辦法及護林公約。

十五、本辦法由山東省政府公佈施行之。

山東省政府關於保護與獎勵耕畜繁殖暫行辦法

第一條，為保護與獎勵耕畜繁殖，特製定本辦法。

第二條，凡農民飼養之耕畜（牛、馬、驥、驢），政府一律保護其飼養戶之所有權及使用權，他人不得侵犯。

第三條，凡從事繁殖與飼養耕畜之農戶，均可享受如下獎勵辦法：

（一）凡從事農業耕作之牛、馬、驥、驢，不分大小，每頭全年減徵公糧十五斤，公草二十二斤半，但每戶減數不得超過二頭。

（二）凡飼養種畜為配種者，除同樣減徵公糧公草外，得酌免差役。

（三）凡帶駒帶犢之母畜，產前兩個月產後一個月得免除差役。

（四）凡幼畜在兩個牙以前者，得免除差役。四個牙以前者，得免除重差遠差。

（五）凡專為繁殖飼養牲畜之牧場或養牛合作社，政府可予以特別貸款之優待。

（六）為獎勵農民飼養耕畜，政府應按時發放耕畜貸款，如在冬春兩季，飼養戶缺乏草料時，政府亦可酌予貸款扶助。

（七）凡對繁殖與飼養耕畜有豐富經驗並有顯著成績者，政府予以名譽或物質之獎勵。

第四條，凡飼養戶所負擔公糧不足應減數者，以減至不負擔為限。

第五條，飼養戶之減徵公糧公草辦法，僅限於能施行徵種辦法之地區。

第六條，凡專為治療耕畜疾病之獸醫，經羣衆公認對預防治療耕畜疾病有顯著成績者，由縣以上政府給以名譽或物質之獎勵。

第七條，凡專為治療耕畜疾病之獸醫，經羣衆公認對預防治療耕畜疾病有顯著成績者，由縣以上政府處理，按其情節輕重，沒收其所販耕畜或科以罰金。

第八條，凡耕畜（牛、馬、驥、驢）一律嚴禁宰殺，違者酌予處罰，如因舊老殘疾不能耕田必須宰殺者，得經本村農會討論，呈報區政府查驗批准，方許宰殺。對故意製造傷疾金圖宰殺耕畜從中謀利者，經查實後交區以上政府懲處。

第九條，凡給軍工烈屬及榮譽軍人代耕之耕畜，均須經羣衆討論，合理計工，全村負擔。

第十條，本辦法自公佈之日起施行之。凡本府及各行政公署所頒發之有關保護及繁殖飼養牲畜之各種辦法與本辦法有抵觸者，一律作廢，均依照本辦法辦理。

227759