

醫方類聚卷之一百三十一

脹滿門

玉機微義

調理之劑

局方紫沉通氣湯治三焦氣滯不能宣通腹

脹便澀

濟生紫蘇干湯

按此三方手足太陰之劑也

五因大半夏湯

此方治三焦氣滯不能宣通腹脹滿門

方見諸

本方見

此方治三焦氣滯不能宣通腹脹滿門

方見時



禹餘糧丸治中滿氣脹喘滿及水氣脹

蛇含石三兩煨三兩真針砂五兩禹餘糧三兩同上

三物為生其次量木香兩牛膝兩蓬朮兩

人虛實入下項藥白蒺藜兩桂心兩川芎兩白豆蔻兩茴香兩

炒三稜兩羌活兩茯苓兩乾姜兩青皮兩

陳皮兩附子兩炮當歸各半

右為末拌勻以湯浸蒸餅去水搗勻丸如

梧子大每五十丸空心溫酒下

按此治寒脹消積藥也氣血之劑陰陽之

氣下陷者可用故存之與前方並足太陰

例

東垣木香順氣湯方見南北

按此足太陽陽明厥陰藥也

木香塌氣丸方見拔中滿分消湯方見東垣

按此二方治寒脹之劑也

廣茂潰堅湯中滿分消丸方並見東垣

按此並治熱脹之劑也又濕熱之藥

攻下之劑

三因七物厚朴湯 方見金匱方

按此治熱之劑陽明例藥也

簡易是齋推氣丸 方見得效方

楊氏消脹丸

木香 黑牽牛 蘿蔔子 炒檳榔

右等分爲末水糊丸梧子大每三十丸

宜明肉豆蔻丸治食痼腹脹如鼓不食者病

可下

肉豆蔻 檳榔 輕粉 各壹錢 黑牽牛 壹兩半服

頭末

右爲末糊爲丸如棗豆大每服十丸至二

三十丸煎連翹湯下食後日三服

按此並氣分藥也

鷄屎醴散治心腹脹滿且食不能暮食致令

胃逆鼓脹證

大黃 桃仁 雞屎醴 乾者分 紫朮末 薑入

取右爲末每壹二錢水煎入姜食前服

東按此而分藥也

東垣沉香海金沙丸治一切積聚脾濕腫脹

肚大青筋羸瘦二錢水煎六錢食前服

海金沙半錢沉香二錢輕粉壹錢牽牛末壹兩

右為末獨蒜如泥為丸如梧子大每三十

丸煎白沸燈心通草湯下量虛實與服

海金沙散治脾濕太過腹脹如鼓方見諸濕門

按此二方治濕之劑也

沉香交泰丸方見諸濕門

按此分清之劑也氣血之藥

三花神佑丸治一切腫病大腹實脹喘滿方見諸濕門

按此治濕熱之藥也

治積聚之劑

澹寮三稜煎方見諸濕門

塌腫神應丸治諸蟲毒腹脹方見積聚門

按此並治積聚導氣散鬱之劑也又能入

血分

謹按已上攻治諸方皆有輕重所宜之製

謹按已上攻治諸方皆有輕重所宜之製

宜對證選用不得少差致有實實虛虛之失也發明曰禁服論云約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與氣俱未滿而知約之可以爲工不可以爲天下師此聖人所以退太過而進不及以平爲期也大凡氣味者有毒無毒固宜常制矣是以大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九餘以穀肉菓菜食養盡之至如君一臣

二奇之制也君二臣四耦之制也近而奇耦制小其服遠而奇耦制大其服大則數少小則數矣多則九之少則二之補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄下不以耦汗不以奇隨其邪之所在高下淺深輕重虛實影響無間萬舉萬全是謂中行故可爲師也假如病大而湯劑小則邪氣少屈而藥力已乏欲不復治其可得乎猶一椀之水救一車薪之

火竟不能滅是謂不及故不可爲師而可  
以爲工矣小而湯劑大則邪服已盡而藥  
有餘力欲不傷正何所容哉猶火炎崑岡  
玉石俱焚莫之能止是謂太過此又不可  
以爲工是乃粗醫也三者之論惟中而已  
過與不及皆爲偏廢然而太過尤甚於不  
及何以明之蓋失之於姑息邪復勝正者  
止於勞而無益猶可勉而適中或失於苛  
暴則正氣被傷因而羸瘠者有之危殆者

有之滅亡者有之非徒無益而又害之此  
所謂尤甚也可不戒哉嘗者仲景之書於  
承氣條下攻裏則曰若更衣止後服於桂  
枝湯後發表乃云漿漿微汗益佳不可令  
如水淋漓本乎軒岐之微旨有所得耳

壽域神方

鼓脹部

治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脈來  
浮遲而弱此名寒脹用附子炮去皮臍厚

朴薑汁製炒各等分咬咀每服四錢水二  
盞薑七片棗二枚煎八分去滓溫服不拘  
時少加木香尤妙

大人小兒過食雜果傷脾令人腹脹滿氣急  
以肉桂壹兩射香另研壹錢爲末飯丸如  
菘豆大大人服十五丸小兒七丸食前白  
湯下

一方以赤小豆樟柳根等分用猪肚子壹箇  
裝前二味在內用箴封口於瓦罐內煮爛

取去前藥熱喫五七箇立效

治腫脹丹房奇術不能服藥自去水以真水

水銀粉二錢巴豆肉研去油四兩生硫黃壹

錢同研成餅先以新絲壹片鋪臍上次以

小藥餅當臍掩之外用帛縛如煎行三五里

自然瀉下惡水待之三五度除去藥以溫

粥補之凡患者隔日取水壹餘可救本主

余入神効

心腹脹用蕪菁子一合水一升和研取汁壹

小蓋頓服少頃得利或吐腹中自寬或得汗

愈衛生易簡方同

腹內氣脹滿者用枳榔為末每服二錢水煎

食前服衛生易簡方同

小腹膨滿川秦艽三兩木二升煎壹升分三

服不拘時衛生易簡方此云溫服即通

水腫氣鼓用商陸根熬粥不拘時服忌赤

殺人

腹內氣脹滿喘息不得卧者用葶藶一升炒

紫色酒浸七日研爛每服三匙溫酒無時

調服大効衛生易簡方同

鼓脹身乾黑瘦多渴煩悶用馬鞭草細剉晒

乾勿見火以酒或水同煮至味出去粗溫

服不拘時以六月中旬雷鳴時採有効衛生易簡方同

易簡方同

鼓脹心腹痞滿用大黃桃仁雞屎乾者等分

為末每服壹錢生薑湯衛生易簡方水煎

調下食後臨卧服

鼓脹氣滿用苦丁香為末棗肉丸如梧桐子  
大每服三十九空心棗湯下三服必愈  
易簡方同

水脹腹滿用草麻子細研水服壯人五粒  
易簡方同

腹滿不能食  
衛生易簡方用獨蒜煨熟去皮

絲裏內谷道中冷即易

關膈脹滿大小便不通亦用獨蒜如前法氣  
即通  
衛生易簡方同

身體腫滿氣急卧不得者用郁李仁一合為

末和麵作餅食之大便即通便安  
衛生易簡方同

治一切無名腫毒惡瘡推積滯除腹痛醫門

第一方用木香沉香乳香各半錢為末將

巴豆去皮油二錢棗二箇去皮搗成膏和

藥收之每服壹丸如棗豆太涼水送下如

欲過三行先喫涼水三口然後用涼水送

下如欲五行六行依數喫水

衛生易簡方

類聚百五  
九  
脹滿

治肚腹脹滿用烏頭一介棗三枚杏仁七粒  
去皮尖俱生用以木石臼中搗爛丸如桐  
子大壯人五七丸小兒二三丸陳皮湯下  
治喜怒哀思胸腹滿腸鳴走氣嘔吐不食用  
半夏湯洗七次粳米各二錢乾姜炮甘草  
二錢半大附子一枚炮去皮細剉每服四  
錢水一盞棗二枚煎七分食前服  
水脅脹滿短氣痰逆或吐涎沫用桔梗炒

半夏湯洗姜製陳皮去白各壹錢枳實麩  
炒半錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘  
時

治三焦不調胸滿腹脹冷氣衝注刺痛用赤

茯苓人參陳皮去白桔梗炒等分爲末每  
服三錢水一盞半生姜五片煎八分去滓

不拘時服

治痢後肚腹滿悶用蒼朮四兩米泔浸炒陳  
皮去白青皮去瓢各一兩末香三錢爲末

醋糊丸如桐子大每服二十丸空心溫酒  
下小兒三五丸米飲下四兩米泔漿炒  
治心腹痞滿膨脹用黃芩去蘆皮大黃去蘆  
皮酒浸半日紙裏煨各二兩滑石碾細飛  
過四兩牽牛壹斤炒香取頭末四兩共爲  
細末滴水丸如桐子大每服五七十丸臨  
卧溫湯下 若濕熱腰痛水濕腫加甘遂  
若遍身走疰疼痛加白芥子 若痰熱腫  
痛加朴硝 若結滯關節不通腸胃秘澀

加郁李仁 若腰腿沉重加樟柳根已上  
各加一兩

金匱鉤玄

鼓脹 又名單鼓

大補中氣行濕此乃脾虛之甚必須遠音樂  
斷厚味大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼  
朮之類 有血虛者四物行血木脈實人  
壯盛者或可用攻藥便用收拾白朮爲主  
厚朴治腹脹因其味辛以散其氣在中

焦者

備預百要方

腹脹滿方桃人

壹兩去皮

杵碎以水壹升著

米作粥空心食之

大脹滿導引

巢氏病源

腹脹候

養生方導引法云蹲坐住心捲兩手發心向

下左右手搖臂遞互欹身盡膊勢捲頭築

肚兩手衝脉至臍下來去三七漸去腹脹  
肚急悶食不消化

又云腹中苦脹有寒以口呼出氣三十過止

又云若腹中滿食飲苦飽端坐生腰以口內

氣數十滿吐之以便為故不便復為之有

寒氣腹中不安亦行之

又云端坐生腰口內氣數十除腹滿食飲過

飽寒熱腹中痛病

又云兩手向身側一向偏相極勢發頂足氣

散下欲似爛物解散手掌指直舒左右相  
皆然去來三七始正身前後轉動膊腰七  
去腹肚脹膀胱腰脊臂冷血脉急強悸也  
又云苦腹內滿飲食善飽端坐生腰以口內  
氣數十以便爲故不便復爲  
云脾主土暖如人肉如始得發汗去風冷  
邪氣若腹內有氣脹先須暖足摩上下並  
氣海不限遍數多爲佳始得左回右轉立  
北和氣如用腰身內一日一十三法迴轉

三百六十骨節動脈搖筋氣血布澤二十  
四氣和潤藏府均調和氣用頭動搖振手  
氣向上心氣向下分明知去來莫闕平手  
欹腰轉身摩氣蹙迴動盡心氣放散送至  
湧泉一一不失氣之行度用之有益不解  
用者欵如氣亂

養心腹服候

養生方導引法云伸右脛屈左膝內壓之五  
息引脾去心腹寒熱胃臆邪脹依經爲之

引脾中熱氣出去腹中寒熱胃臆中邪氣  
脹滿久行無有寒熱時節之所中傷名爲  
眞人之方

用芥子煎服

煎服一不夫服之存思其文得益不損

煎服一不夫服之存思其文得益不損

煎服一不夫服之存思其文得益不損

煎服一不夫服之存思其文得益不損

煎服一不夫服之存思其文得益不損

黃疸門

目錄

論

金匱方

茵陳蒿湯 消石礬石散 梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯 猪膏髮煎 茵陳五苓

散 大黃消石湯 小半夏湯 柴胡湯

小建中湯 芫花湯 麻黃醇酒湯

千金月令 瓜蒂散 赤小豆散 白散

聖惠方

治急黃諸方

龍膽散 犀角散 赤小豆散 白鮮皮

散 丁香散 瓜蒂散 瀉黃散

治陰黃諸方 小半夏散 柴胡散

茵陳散 黃大黃散 小半夏散 茵陳散

治內黃諸方 藥下散 麻子大黃散

梔子散 茵陳散

治勞黃諸方

龜膽散 秦艽散 鼈甲散

治黃汗諸方

黃耆散 黃芩散

治黃病小便淋瀝諸方

茅根散 木通散 蘧麥散 茵陳散

治黃疸諸方

茵陳散 瓜根散 茵陳丸 藜蘆散

麻黃湯 瓜蒂吹鼻散

治酒疸諸方

艾湯 梔子散 牛膽丸

艾蒿 治穀疸諸方

治黑疸諸方

赤小豆散 茵陳丸

茵刺 治風疸諸方 茵刺丸 蔡蓋州

牛黃散 犀角散

治女勞疸諸方 茵刺丸

滑石散 黃蘗丸 茵刺丸

肝黃證候

柴胡散 犀角散

心黃證候

生地黃飲子 馬牙消散

脾黃證候

土瓜根散

肺黃證候

菝葜散

不香腎黃證候

附子散

車前膽黃證候

類聚百三十一

十六

車前子散證候

腦黃證候

石膏散證候

疔疔行黃證候

癩黃證候

半夏散證候

胃黃證候

人參散證候

鬼黃證候

丹砂散證候

秦艽疔黃證候

犀角散證候

走馬黃證候

菴淋立黃證候

黑黃證候

體黃證候

葫蘆湯證候

柴心勞黃證候

類聚百三十一

類聚百三

廿七

柴胡散黃芩

獨活散黃芩

食黃證候

茅根散黃芩

火黃證候

陰黃證候

秦艽散黃芩

氣黃證候

煨黃證候

生地黃散黃芩

山髓黃證候

地骨皮散黃芩

房黃證候

鹿茸散黃芩

血黃證候

羚羊角散黃芩

憂黃證候

憂黃證候

秦艽散

驚黃證候

犀角散

花黃證候

知母散

癩黃證候

恒山散

水黃證候

蛇黃證候

羚羊角散

鷓黃證候

鷓黃

鷓黃證候

半夏蚰蜒黃證候

半夏散

谷黃疸門二

大全本草

三因方

林林黃汗證治

類聚百三

桂枝加黃耆五兩湯 黃耆苦酒湯

三黃疽證治

人谷疽證治

谷疽圓門紅圓子

酒疽證治

半夏湯 二石散 白朮湯 當歸白朮

湯 人參飲 如神散

女勞疽證治

滑石石膏散

雜勞疽證治

茵陳梔子圓 五苓散 礬石滑石散

苦參散 小半夏湯 養榮湯

是齋醫方

米酒疽

直指方

五疽證治

薑蜜湯 桂枝黃耆湯 珠珀散 一精

飲茵陳湯 五苓散 黃酒蒸黃連圓

藥集百三

卷八

山茵陳散  
甘露飲  
黃連阿膠圓  
胡甘草湯  
生髮方  
紅圓子  
辰砂妙  
香散  
酒蒸黃連圓  
六物飲  
土瓜方  
小兒絲子圓  
四君子湯  
解熱方

朱氏集驗方

五疸評

黃芪散

嚴氏濟生方

五疸

茵陳散  
葛根湯  
茵陳湯  
加減五苓

湯  
秦光飲子

黎宜明論

為胃買疽證

主胃熱

茯苓加減湯

圓得効方

戒飲諸疽

艾煎丸  
麻黃酒  
五苓散  
茵陳湯

養榮湯

破麻餅

入參消

草餅

茵陳丸

艾煎丸

苦參餅

不膏餅

真妙校香

斷毒

茵陳丸

艾煎丸

無忌

一帝

真妙校香

斷毒

茵陳丸

艾煎丸

礬石滑石散 梔子圓 苦酒湯 桂枝  
 加黃耆湯 茵陳散 小半夏湯 苦參  
 圓 龍腦圓 紅圓子 葛根湯 酒蒸  
 黃連圓 六物飲 人參散 真砂妙香  
 散 土瓜方 如神散 石膏散 一清  
 飲 真膠飲 養榮湯 苦參散 無忌  
 紫金圓  
 澹軒方  
 黃疸

肘後方

治卒發黃疸諸黃病

猪苓散 木薑 金黃散

衛生寶鑑

黃疸 黃疸 茵陳湯

黃連散 欬喘鼻瓜蒂散

醫食勞疴黃

膽礬丸 下棗礬丸 五疳丸 茯苓滲濕

湯 綠獸膏 熱濕中丸

類聚百三

三五

殺疽治驗

茯苓梔子茵陳湯

醫方大成

黃蘗五疽

黃耆散

南北經驗方

當歸白朮湯 金黃丸

袖珍方

茵陳散

經驗良方

疽病

梔子蘗葉湯

施圓端効方

犀角茯苓九 葶藶九 茵陳九

山居四要

急救仙方

新効方

大温中丸 小温中丸

六玉機微義

黃疸

桂枝加黃耆湯 麻黃連翹赤小豆湯

茵陳五苓散 茵陳茯苓湯 梔子大黃

湯 大黃消石湯 消石礬石散 半夏

湯 茵陳蒿湯 茵陳大黃湯 抵當湯

小柴胡加梔子湯 梔子栝皮湯 茯苓

滲濕湯 小半夏湯 茵陳橘皮湯 小

茵陳湯 茵陳四逆湯 茵陳附子湯

茵陳茱萸湯 苦參散 當歸白朮湯

小建中湯 養榮湯 紅丸子 棗礬丸

取黃水法

瓜葉散 如神散

衛生易簡方

五疸

金匱鈎玄

五疸

餘藥無名者散見本方

類聚百五  
類聚百五

三十四

鍼灸

金匱方  
正氣  
金匱方  
正氣  
類聚百五  
類聚百五

黃疸門

金匱方

黃疸病脉證并治

寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中  
風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跌陽脉  
緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即  
為滿尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒  
相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下  
流不便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃

類聚百五

三十四

名曰黃疸額上黑微汗出手足中熱薄暮卽  
 發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀  
 不治心中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒  
 疸而陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭  
 眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故  
 所以然者脈遲故也夫病酒黃疸心中小便  
 不利其候心中熱足下熱是其證也酒黃  
 疸者或無熱請言了腹滿欲吐鼻燥其脈浮  
 者先吐之沉弦者先下之酒疸心中熱欲

嘔者吐之愈酒疸下之久久爲黑疸目青  
 面黑心中如噉蒜齏狀人使正黑皮膚爪之  
 不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之  
 師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發  
 時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從濕得  
 之一身尽發熱而黃肚熱熱在裏當下之  
 脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃腹滿  
 舌痿黃燥不得睡屬黃家  
舌痿疑黃疸之病  
 常以十八日爲期治之十日以上瘥反極爲

難治 疽而渴者其疽難治疽而不渴者其  
疽可治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒  
而發熱也  
巢氏病源 黃病諸候

黃病候

黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後  
壯熱口裏有血當下之法如狍肝狀其人少  
腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及頂  
強腰背急卽是患黃多人便澁但令得小便

快卽不慮死不用大便多多卽心腹脹不存  
此由寒濕在表則熱畜於脾胃腠理不開瘀  
熱與宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不通  
故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌  
無脈口鼻冷氣並不可治也

犯黃候

有得黃病已差而將息失宜飲食過度犯觸  
禁忌致病發胃名爲犯黃候

辨黃候

氣水飲停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿痛而身發黃名爲癖黃

### 噤黃候

心脾二藏有瘀熱所爲心主於舌脾之絡脉出於舌下若身而發黃舌下大脉起青黑色舌噤強不能語名爲噤黃也

### 五色黃候

凡人著黃五種黃皆同其人至困冥漠不知東西者看其左手脉名手肝脉兩筋中其脉

如有如無又看近手屈肘前臂上當有三歧脉中央者名爲手肝脉兩廂者名歧脉看時若肝脉全無兩廂壞其人十死一生難可救濟若中央脉近掌三指道有如不絕其人必不死脉經三日漸徹至手掌必得汗汗罷必愈婦人患黃看右手脉眼青黃視其瞳子青脉亦青面色青者是其由脾移熱於肝肝色青也其人身熱而發黃赤視其眼赤高視心腹脹滿脉赤便是此由脾移熱於心心色赤

故其人身熱而發赤黃不可治治之難差其  
人身熱發黃白視其舌下白垢生者是此由  
脾移熱於肺肺色白也其人身熱發黑黃視  
其脣黑眼黃舌下脉黑者是此由脾移熱於  
腎腎色黑也故其身熱而發黃也

風黃候

凡人先患風濕復遇冷氣相搏則舉身疼痛  
發熱而體黃也

因黃發血候

此由脾胃大熱熱傷於心心主於血熱氣盛  
故發黃而動熱故因名為發血

因黃發痢候

此由瘀熱在於脾胃因而發黃挾毒即下痢  
故名為發痢

黃熱因黃發痔候

此病由熱傷於心主血熱盛則血隨大便而  
下名為血痔

黃因黃發癰候

黃因黃發癰候

夫黃病皆是大熱所為熱盛之時必服冷藥  
冷藥多則動舊癖

因黃發病後小便澀兼石淋候  
黃病後小便澀兼石淋發黃疸此皆由蓄熱  
所為熱流小腸小便澀少而痛下物如沙石  
也

因黃發吐候

黃病吐下之後胃氣虛冷其人宿病有寒飲  
故發吐

言黃疸候

夫此疸者壹曰胃疸二曰心疸三曰腎疸四  
曰腸疸五曰膏疸六曰舌疸七曰體疸八曰  
肉疸九曰肌疸凡諸疸病皆由飲食過度醉  
酒勞傷脾胃有瘀熱所致其病身面皆發黃  
但立名不同耳

醫家胞疸候小對不厭此為惡瘵

胞疸之病舉腸有熱流於胞內故大便溲  
如藥汁此為胞疸將如黃汗黃疸不厭酒疸

濕疸候

濕疸病者脾胃有熱與濕氣相搏故病苦身體疼而目黃小便不利此為濕疸

聖惠方

治三十六種黃證候點烙論并方

夫諸黃者其黃皆因傷寒為本五藏互有所傷熱氣相侵致使病人精神恍惚六腑不和七神無主情意改變或起坐睡卧不安或狂言妄語忽喜忽悲或寒或熱或即多言或即

不語多饒喜笑妄見鬼神四肢沉重扶舉不行或即潛身便走氣力倍加如此狀候並是五藏熱極閉塞不通療不及時甚損人命或有鼻衄不止口内生瘡或有小便不利大便不通有此狀證速宜點烙及依後方治療必得痊平也

三因方  
其黃五疸敘論  
立名與黃汗黃疸谷疸酒疸  
古方敘五種黃病者即黃汗黃疸谷疸酒疸

女勞疸是也觀別錄則不止於斯然疸與黃其實一病古今立名異耳黃汗者以胃爲脾表屬陽明陽明蓄熱喜自汗汗出因入水中熱必鬱故汗黃也黃疸者比由暴熱用冷水洗浴熱留胃中所以與諸疸不同故用黃字目之又云因食生黃芘氣上薰所致人或疑其不然古賢豈妄論也必有之矣谷疸者由失肌發熱大食傷胃氣衝鬱所致酒疸者以酒能發百脉熱由大醉當風入水所致女

勞疸者由大熱交接竟入水水流濕入于脾因腎氣虛勝以所勝尅入致腎氣上行故有額黑身黃之證世謂脾腎病者卽此證也其間兼渴與腹脹者前難治發於陰必嘔發於陽則振寒面微熱雖本於胃氣鬱發土色土行然發於脾則爲肉疸發於腎則爲黑疸若論所因外則風寒暑濕內則喜怒憂驚酒食房勞三因悉備世醫獨麗於傷寒論中不亦濫矣學者宜識之

神巧萬全方

諸黃方論

發黃之病經言數種有卒然發黃心滿氣喘者名爲急黃但頭痛而不發熱者名爲陰黃先心腹脹滿氣急然後發黃者名爲內黃額上黑微汗出手足熱薄暮發膀胱急小便自利者名爲勞黃身體浮腫汗水染衣黃如藥汁脉沉不渴狀似風水者名爲汗黃大抵黃病皆由寒濕在表熱在脾胃腠理不開瘀熱

與宿穀相搏而成也其病大便多澁但令大小便快則佳爾若病者口中自血當下如猪肝狀凡黃病寸口近掌無脉且鼻氣冷者並不可治由人臉大食胃虛薰汗泄澁此其類也

赤黃疽病候 物澤宜引之 澁澁赤宜下之 燥疽病與黃大約黃同而經言有黃疽有酒疽有穀疽有黑疽有風疽黃疽之病由酒食過度熱併脾胃復爲風濕所搏而成也其候渴者難治不渴者易治發於陰部其人必嘔發

於陽部必振寒而發熱酒疸之病本虛勞之  
人穀食少進飲酒過度脾胃生熱或因大醉  
當風入水所致也其候身日盡黃心中懊悶  
足脛腫滿小便黃澁而發赤斑若心中欲嘔  
者宜吐之脈浮者宜吐之沉絃者宜下之穀  
疸之病由人飢大食胃氣薰行所致也其候  
食畢卽頭眩心忪怫鬱不安其脈反遲黑疸  
之病由諸疸久不愈而變成之其候額上黑  
足下熱大便黑是也風疸之候好臥而心振

面虛黑色本由風氣與熱搏於藏府小便或  
黃或赤是也

直指方

### 五疸論

濕與熱鬱蒸於脾面目肢體爲之發黃此卽  
疸也疸之名有五發熱不渴身腫而汗汗如  
黃漿汁者曰黃汗此胃中蓄熱汗出浴水得  
之已食如飢但欲安臥小便如黃漿汁者曰  
黃疸此酒麪炙博蘊熱痰滯得之食則腹滿

佛鬱眩暈心忪而不自安者曰穀疸此失飢  
大嚼遽飽衝脾得之其或飲酒常多進食常  
少醞熱入水大醉當風以致心中懊疼足脛  
腫滿是之謂酒疸大勞淫慾大熱交接在席  
未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急是  
之謂色疸五者雖不同其爲黃則一自本自  
根未有非熱非濕而能致病者也濕也熱也  
又豈無輕重之別乎濕氣勝則如薰黃而晦  
熱氣勝則如橘黃而明蓋脾主肌肉土色尚

黃濕熱內蒸或重或輕不容揜於外矣自其  
濕熱瘀而傷血此又爲血證發黃何以明之  
疸證之黃小便不利血證之黃則小便自利  
耳况夫脾受濕熱鬱而不行亦多有腹脹之  
候治法綱領大要疏導濕熱於大小便之中  
人徒見茵陳湯五苓散黃連圓三黃圓輩隨  
試輒效則目之以尋常不思單陽無陰病勢  
已極疸而不渴猶不用工疸而復渴其或腹  
澗全濟者鮮甚則寸口無脉鼻出冷氣與夫

形如煙熏搖頭直視爲心絕環口黧黑油汗  
發黃爲脾絕此皆倉扁所望而驚者也孰謂  
黑疸之能有廖乎  
人脾與腎俱病爲黑疸色疸壹名女勞身黃  
額黑疸脉緩大順弦急而堅逆已食如飢  
胃熱消穀熱性體而小汗衣冬汗熱熱之  
嚴氏濟生方更不用血氣之類  
五疸論治  
古方論有黃疸有疸病命名不同其實一也

詳觀他書黃疸有三十六種疸有五種三十六  
種黃者聖惠方載之備矣五疸之證感之者  
多不容不詳具五疸者黃汗黃疸穀疸酒疸  
女勞疸是也黃汗之狀身體俱腫汗出不渴  
狀如風水汗出染衣黃如藥汁其脉自沉此  
由脾胃有熱汗出入水浴水入汗空中故汗  
帶也黃疸之狀食已即飢身體面目爪甲牙  
齒及小便悉黃欲安卧或身體多赤多青皆  
見者必發寒熱此由酒食過度臟腑熱極水

穀相并積於脾胃復爲風濕所搏結滯不散  
熱氣鬱蒸所爲也人抵發於陰部其人必嘔  
發於陽部必振寒而發熱穀疸之狀食畢卽  
頭眩心中怫鬱不安而發黃此由大飢大食  
胃氣衝蒸所致也酒疸之狀身目發黃心中  
懊痛足脛滿小便黃面發赤斑此由飲酒多  
進穀少胃內生熱因大醉當風入水所致也  
女疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小  
便不利此由大勞大熱不能保攝房後入水

所致也其間多渴而腹脹者其病難療又有  
時氣傷風傷寒伏暑亦令人發黃五疸口淡  
怔忡耳鳴脚弱微寒發熱小便白濁當作虛  
證治不可妄投涼劑愈傷血氣臨病之際不  
可不辨明也

十形三療

黃疸  
蔡寨成家一童子年十五歲病疸一年面黃  
如金遍身浮腫乏力惟食菹與焦物戴人以

茶調散吐之涌涎一盂臨晚又以舟車丸七  
八十粒通經散三錢下四五行待六七日又  
以舟車丸瀆川散下四五行塩與焦物見而  
惡之面色變經後再以茶調散涌之出痰二  
升方能愈矣

又一男子作贅偶病疽善食而瘦四肢不舉  
面黃無力其婦翁欲棄之其女亦不肯曰我  
已生二子矣更適他乎婦翁本農者召婿亦  
欲作勞見其病甚每日辱詬人教之餌膽礬

丸三稜丸了不關涉鍼灸祈禳百無一濟戴  
人見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一  
斗又以泄水丸通經散下四五行不止戴  
人命以冰水一盂飲之立止次服平胃散等  
間服檳榔丸五七日黃退力生蓋脾疽之證  
濕熱與宿穀相搏故也俗謂之食勞黃  
又朱葛周黃劉三家各有僕病黃疽戴人曰  
僕役之職飲食寒熱風暑濕寒尋常觸冒也  
恐難調攝虛費治功其三家留僕於戴人所

從其飲餌其一僕不離主人熱役三人同服  
苦散以涌之又服三花神祐丸下之五日之  
間果二僕愈而一僕不愈竟如其言效人口

### 黃病

蔡寨一女病黃遍身浮腫面如金色困乏無力不思飲餌惟喜食生物灰裁之屬先以苦劑蒸餅爲丸涌痰一梳又以舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨食散氣不數日肌肉如初

### 病發黃

安喜趙君玉爲省椽日病發遍身黃往問醫者醫云君乃陽明證公等與麻知幾皆受訓於張戴人是商議喫大黃者難與論病君玉不悅歸自揣無別病乃取三花神祐丸八十粒服之不動君玉乃誤曰予之濕熱盛矣此藥尙不動以舟車丸溶川散作齊大下壹斗糞多結者一夕黃退君玉由此益信戴人之言

拔粹方

黃疸證

寸口脉浮而緩跌陽脉緊而數穀氣不消濁氣下流小便不通熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名女勞疸腹如小狀則不治心下懊懜而熱不能食則欲吐名曰酒疸夫酒黃疸者必小便不利心中熱足下熱欲吐鼻燥脉浮者先吐之沉弦者先下之飲嘔

者吐之即愈

夫黃疸病發熱煩喘胃滿口燥者或因火劫其汗或從濕得之熱在裏當下之

醫方大成

五疸

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過五疸一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸是也黃汗之證身體俱腫汗出不渴狀如風水汗出染衣黃如藥汁此

由脾胃有熱喜自汗汗出入水中洗浴故汗  
秘熱結其汗黃也黃疸之證食已卽飢遍身  
皮膚及爪甲面目小便俱黃卧時身體又帶  
赤帶青者必發寒熱此由酒食過度臟腑熱  
極水穀相併積於脾胃復爲風濕所搏結滯  
不散熱氣薰蒸所致若發於陰部其人必嘔  
發於陽部必振寒而後熱穀疸之證食畢卽  
頭眩心中怫鬱不安而遍體發黃此由脾胃  
有熱人飢過爲飲食所傷胃氣衝蒸所致也

酒疸之證身目發黃心中懊痛足脛滿小便  
黃面發赤斑此由飢中飲酒大醉當風入水  
所致女勞疸者其證身目皆黃發熱惡寒小  
腹滿急小便不利此由過於勞傷又於極熱  
之中房事之後入水所致如多渴而腹脹者  
難治大槩五種之病多是脾胃經有熱而後  
發黃治法各當究其所因分利爲先解毒次  
之又有時氣傷寒傷風伏暑解散未盡亦令  
人發黃如疸狀口淡怔忡耳鳴脚弱微寒

微熱小便白濁又當作虛證治之不可妄投

涼藥愈傷血氣臨病之際辨之可也

永類鈐方

雜病五疸

脾胃經有熱所致當求所因分利為先解毒  
次之外因六淫已見傷寒發黃中其內因則  
口淡怔忡耳鳴脚弱微寒微熱小便白濁此  
為虛証不宜過用涼藥有渴難治不渴可治

脉

病證

治

食已即飢  
身目齒俱

小柴胡湯加茵陳茯苓

黃小便黃

苓枳實加少朴消

大

黃疸

或起或臥

熱實脉大而數加

身體青赤

黃柏大黃白朮山

發寒熱風

梔白朮根濟生

濕熱氣蒸

茵陳散

鬱

千金方東引桃根細

者煎空心服

遲

穀疸

食已頭眩

小柴胡略加谷芽枳

心中拂鬱

實厚朴山梔大黃

不安飢飽

所致胃氣

蒸忡

身目黃心

中懊懣足

脛滿尿黃

面赤斑酒

過胃熱醉

臥當風水

濟生殼疽元

小柴胡加茵陳豆豉

大黃黃連葛粉

脉微數面目青黑大

便黑三因白朮散

脉弦濇三因當歸

白朮散

浮先吐

之沉弦

先下之

酒疽

濕處得之

濟生五苓散 葛根湯

黃發惡寒發熱

小柴胡加伏苓茵陳

小腹痛滿

羌活髮灰乳香湯

急小便利

濟生滑石散秦芫

女勞疽

大勞事

飲子

入水所病不

濟生黃芪散時行瘧

黃汗

脾胃熱汗出入手不渴汗

熱在裏 濟生茵

沉

出染衣

陳湯又苦瓜丁香  
豆大深吸鼻中出  
黃水差

玉機微義

黃疸

附發黃

諸經敘黃疸脉證

內經曰溺黃赤安臥者黃疸

要略曰寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺

痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行

尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏

食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小

便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰

穀黃額上黑微汗出手足中熱薄暮即發勝

胱急小便不利名曰女勞疸 腹如水狀心

中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸多不

治

脉經曰脉沉渴欲飲水小便不利者皆發黃

凡黃候其寸口脉近掌無脉口鼻冷並不可

治

論五

陳無擇云古方敘五種黃者其實一病立名異耳如黃汗者以胃爲脾表屬陽明陽明蓄熱喜自汗汗出因入水中熱必鬱故汗黃也其候身體腫發發不渴狀如風水汁出染衣色正黃如栢汁黃疸者由暴熱用冷水洗浴熱留胃中所致其候身而眼悉黃如金色小便如黃蘗汁穀疸者夫由飢發熱大食傷胃氣衝鬱所致

其使食則腹滿眩暈穀氣不消 云云見前

酒疸由大醉常風入水所致唯酒變證最多熱毒流于清氣道中則眼黃鼻雖

女勞疸由大熱交接竟入水水流濕入于脾因腎氣虛甚以所勝剋入致腎氣上行故有額黑身黃之證其間兼渴與腹脹者並難治發於陰必嘔發於陽則振寒面微熱雖本於胃氣鬱發土色上行然發於脾則爲內疸發於腎則爲黑疸若論所因外則風寒暑濕內

則喜怒憂驚酒食房勞三因悉備世醫獨嚴  
於傷寒論中不亦濫矣  
按已上五疸與前要略所具不同宜兼考  
之陳氏治例未能以盡其變推其病體究  
治大抵已上五疸形証已具無所隱兼證  
者黃汗黃疸穀疸誠以元氣脾胃之氣爲  
主而治之形氣穀氣稍實者則可得而復  
矣酒疸則元氣胃氣殊已傷甚形氣孤危  
穀氣與藥雜進能有斷厚味而守藥得復

生者則幾希矣女勞疸則陰陽之氣虛竭  
甚者爲難治陳云世醫獨嚴於傷寒而不  
及此此則亦非傷寒家法所可髣髴施也  
論傷寒陽證發黃

保命集云凡發黃有六有畜盜發黃邪熱傳  
於太陽之本小便先淋而黃其人暴狂內有  
血也爲太陽發黃本病也濕熱發黃太陰併  
陽明之本爲小便不利風濕熱發黃併少陽  
也寒濕發黃太陰併少陽也結育發黃下之

早附太陽也痞氣發黃附太陰也凡六者各  
隨脉證標本而治之大抵發黃從太陰陽明  
而論脾胃皆土也故見黃色當從其脾病色  
黃土氣化濕非濕毒何能發黃也

論陰證發黃

韓祗和云病人三五日服下藥太過虛其脾  
胃亡其津液渴飲水漿脾土爲陰濕加之與  
邪熱相會發黃此陰黃也當以溫藥治之如  
兩手脉沉細遲肢體逆冷皮膚有粟起或嘔

吐舌上有胎遍身發黃煩躁欲於泥水中卧  
小便赤少皆陰候也故陰黃多以熱湯溫之  
或湯漬布搭其胃腹或以湯盛瓢中坐於臍  
下熨之其病愈者曾治趙顯宗病傷寒至六  
七日因服下藥太過致發黃其脉沉細遲無  
力皮膚涼發躁欲於泥中卧喘嘔小便赤濇  
先投茵陳橘皮湯喘嘔止次服小茵陳湯半  
劑脉微出不欲於泥中臥次日又服茵陳附  
子湯半劑四肢發熱小便三三升當日中大

汗而愈似此治愈者不一二錄凡傷寒病黃每遇太陽或太陰司天歲若下之太過往往變成陰黃蓋辰戌太陽寒水司天水來犯土丑未太陰濕土司天土氣不足即脾胃虛弱亦水來侵犯多變此證也

按已上論傷寒陰陽二證發黃殆無餘蘊大抵本形氣虛實受證不同用藥有汗下溫之禁非若雜病之比也我丹溪先生謂發黃如會麴相似濕熱有微甚及兼熱兼

寒瘀血所因不同故治例不可不分

論內傷發黃

略例云內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒之病在黃非傷寒壞之而得只用建中理中大便中足矣不必用茵陳一也蓋黃者按此言內傷不足故宜補益惟其有餘新病必須消導之久病從穀疸施治可也小辨論發黃治例武重臨而得治法難知云色如熏黃乃濕病也一身盡痛黧色

如橘子黃乃黃病也一身不痛乾黃燥也  
 小便自利四肢不沉重渴而引飲者梔子蘗  
 皮湯濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不  
 欲飲者大茵陳湯若大便自利而黃者茵  
 陳梔子黃連三物湯往來寒熱一身盡黃者  
 小茈加梔子湯此湯與之而後只以中  
 按一身盡痛而黃者濕勝在表也不痛者  
 病在裏也乾燥者熱勝也故後證皆有表  
 裏之分殊東垣云傷寒當汗不汗即生黃

邪在表者宜急汗之在表之裏宜滲利之  
 在半表裏宜和解之在裏者宜急下之若  
 已上諸證及略例云男黃小便自利常與  
 虛勞小建中湯若黃色不變欲自利腹滿  
 而喘不可除熱除熱必噦小半夏湯皆不  
 必拘於茵陳也

金匱方

穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安  
 久久發黃為穀疸茵陳蒿湯主之

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 ○衛生寶實 大黃二兩

○寶鑑拔粹方三兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升實鑑三味

吹咀水壹斗二升內二味煮取三升去滓

煮茵陳減壹半分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正

赤一宿腹減黃從小便去也○拔粹方右

三味吹咀水煎去滓溫服小便利則愈聖

惠方治穀疸及黃疸茵陳散方茵陳二兩 川

大黃一兩到碎微炒 梔子三分 右件藥搗麤羅為

散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓

溫服肘後方穀疸者食畢頭旋心怫鬱不

安而發黃由失飢大食胃氣衝燠所致治

之方茵陳四兩水一斗煮取六升去滓內

大黃二兩梔子七枚煮取二升分三服溺

去黃汁差壽域神方同 經驗良方治諸般疸病

面目身體發黃茵陳三兩 山梔子七箇 大黃二兩

右以水五盞先煎茵陳至二盞半却入大

黃梔子煎至膏蓋半去滓分作二服空心服當利小便如皂角汁及黃赤色其黃隨小便出也未愈再服

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溇此女勞之病非水也腹滿者難治三因方其脈滑消石礬石散主之

硝石礬石散方

硝石 礬石 燒等分○三因方并煨汁盡

右二味為散以大麥粥汁衛生寶鑑和服

方寸匕日三服玉機微義和服二錢病隨

大小便去小便正黃大便正黑是候也○

三因方右為末每服二大錢大麥汁調下

日三重衣覆取汗病隨大小便出大便黑

小便黃是效肘後方女勞疸者身目皆黃

發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱

交接交接後入水所致治之方消石礬石

等分末以大麥粥飲服方寸七日三令小汗出小便當去黃汁也

酒黃疸心中懊懣或熱痛梔子大黃湯主之

梔子大黃湯方衛生寶鑑名梔子枳實鼓大黃湯拔粹方名梔子枳實大

黃湯用後方酒疸者心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤斑黃黑由大醉當風入水所致

梔子十四枚○寶鑑拔粹方大黃兩枳實五

○寶鑑炙拔粹方鼓乙升○寶鑑拔粹方

右寶鑑十枚以水六升煮取二升寶鑑分

溫三服玉機微○拔粹方右咬咀水煎去

滓溫服聖惠方治酒疸心懊痛足脛滿小

便黃面發赤斑大黃散方備預百要方虛

進穀少則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃小便黃面發赤斑若下之變為

黑疸面目黑大便亦黑手足川大黃二兩

不仁欲吐者當吐之則愈枳實梔子人兩鼓

全方三兩炒枳實炒微黃梔子人兩鼓

三右件藥擣篩為散每服四錢以水一大

盞煎至五分去滓溫服日四五服

諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加黃耆湯主之方見水腫門

諸黃猪膏髮煎主之

猪膏髮煎方

猪膏斤牛亂髮如鷄子大三枚○衛生

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服簡易

方臨服攪去髮病從小便出○聖惠方治女勞疸

身目俱黃惡寒發熱小腹滿急小便艱難

肘後方此下云由大勞大熱交接後入水所致亂髮如鷄子大

猪脂斤半右件藥同於鑊內以微火煎令髮

消盡不計時候以溫水調下半雞子殼以

小便利為度肘後方煎令消盡分二服

黃疸病茵陳五苓散主之膏本云茵陳湯及五苓散並主之

茵陳五苓散方

茵陳蒿末分十五五苓散五分方見

右二物和先食飲方寸匕日三服衛生寶鑑拔粹

同方○朱氏集驗方治傷寒後發黃五苓散

加山茵陳煎服經驗良方治疸病生料五

苓散每服加茵陳壹錢方見傷寒門

黃疸腹滿小便不利而赤自汁出此為表和

裏實當下之宜大黃消石湯

大黃消石湯方衛生寶鑑名大黃黃連梔子消石湯拔粹方名大黃黃蘗

梔子消石湯

大黃 黃蘗 消石 各四兩 梔子 十五枚○拔粹方摩

破寶鑑十

右寶鑑四味以水六升煮取二升去滓內

消拔粹方內更煮取壹升頓服玉機微義同

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可

除執執除必噦噦者小半夏湯主之方見咳

諸黃腹痛而嘔者宜柴胡湯必小柴胡湯方見嘔吐門

男子黃小便自利當與虛勞小建中湯方見諸虛

門

芡帶湯治諸黃方見傷寒門

千金麻黃醇酒湯治黃疸

麻黃三兩○肘後方宜把衛生易簡方宜握去節

右壹味以美清酒五升煮取二升半易簡方半

升頓服盡肘後方可盡服汗出差冬月用酒春月用

水煮之○三因方麻黃醇酒治傷寒瘀血

不解鬱發於表發為黃疸其脉浮緊者以

汗解麻黃三兩右壹味以醇酒得效方五

升煮取二升每服一盞溫服汗出愈秋冬

用酒煮春夏用水煮得效方春夏秋水

千金月令

治急黃方右搗萱草根汁服之○聖惠方治

黃疸精神昏亂不食言語倒錯方右以萱

草根搗取汁一小盞服之日三四服如無

取苜蓿根汁亦得

又方右取瓜蒂壹枚碎之以少水絞取汁滴

鼻中清水出差

急黃變黑色方右取土瓜根汁服壹升當小

便黃水即差不出更服○聖惠方治黑疸

多死宜急治方生土瓜根壹斤右搗絞取汁

六合頓服當有黃水隨小便出如未出即

更服肘後方若變成疸者多死急治之方

土苽根搗取汁頓服壹升至三服須病汗

當小便去不令更服之衛生易簡方治黑

疸黃變黑者多死用土瓜根五兩水三升  
煮壹升去滓頓服重者晚更壹服若生者  
壹升搗絞汁頓飲尤好小隨小便出

療酒黃方右取小麥三升搗和少水取汁服  
五合

療黃疸方皮膚眼睛如金色小便赤並主之

茵陳 子芩 各四分 黃瓜萹 秦艽 升麻

名六分 梔子 五枚

右以水二升煎取八合食後良久分三服

類兩劑即愈

又方右取小麥搗取汁服一合○衛生易簡

方用小麥搗水絞汁服壹合頓服甚驗

又方右取生蔓菁子未熟水調下方寸匕日

三服○肘後方治黃疸蕪菁子五升搗篩

服方寸匕日三先後十日愈之衛生易簡

方治急黃疸及內黃腹結不通搗蕪菁子

和水服少頃當瀉一切惡物沙石草髮並

出

又方右取秦膠五兩以乳三升煮取一升去滓內芒消壹兩分再服

聖惠方治急黃諸方

夫急黃者由脾胃有熱穀氣鬱蒸因為熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在須臾故云急黃有得病但身體面目發黃初不知是黃死後乃身面俱黃者是也其候初得黃病但發熱心顫者是急黃也

治急黃煩躁渴欲飲水面目如金色龍膽散方

龍膽壹兩去木通壹兩土瓜根壹兩石膏二兩

犀角屑壹兩梔子人壹兩川大黃壹兩碎微炒茅根壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治急黃心膈煩躁眼目赤痛犀角散方

犀角屑兩茵陳兩黃芩兩梔子人兩川升

麻一兩 川芒消二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壺中蒸入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

治急黃身如金色赤小豆散方

赤小豆壹分 丁香壹分 黍米壹分 瓜蒂半兩 薰陸香

錢青布五寸 麝香細研

右件藥搗細羅為散都研令勻每服不計時候以清粥飲調下壹錢若用少許吹鼻

中當下黃水即效備預百要方此下云但瓜蒂小豆二物亦可

治急黃頭目四肢煩熱疼痛小便赤大便難

心躁不得睡白鮮皮散方

白鮮皮半兩 川升麻半兩 川朴消二兩 茵陳黃

芩半兩 梔子半兩 大青半兩 川大黃二兩 葛

根半兩 右件藥搗細羅為散每服以新汲水調服

三錢須臾當利壹兩行如人行十里未利

即再服神巧萬全方同

類聚百

治急黃宜服丁香散吐之方

丁香七粒瓜蒂七粒赤小豆七粒人許七里未

右件藥搗細羅為散以雞子清壹枚相和

用新汲水調頓服當吐利即效未應即再

服神功萬全方同○衛生易簡方治陰黃黃疸暴

急黃用瓜蒂丁香赤小豆各七枚為末吹

鼻中壹黑豆許少時黃水出差

治急黃心脾煩悶方○備預百要方急黃狂

走煩燥方黃水神效

秦艽一兩牛乳壹大

右件藥相和煎至六分去滓溫溫頓服

治急黃心上堅硬渴欲飲水喘麤眼黃但有

一候則宜服此瓜蒂散吐之方

瓜蒂壹合赤小豆壹合

右件藥搗細羅為散每服以煖漿水調下

二錢須臾當吐如人行五里未吐即再服

若病輕者吹鼻中二三豆粒大當鼻中黃

水大出即效

治急黃及心黃狂走煩躁不解方

生雞子二枚去白川朴消半兩

右件藥相和熟調頓服之效

治急黃方右取蔓菁子油一合服之効如無

油則取蔓菁子壹合和水研服之亦効○

備預百要方急黃身如金色方蔓菁子一

合和油服之和水亦可

治陰黃諸方

夫陰黃者為陽氣伏陰氣盛熱毒加之故身

而盡黃但頭痛而不發熱名為陰黃也

治陰黃身體面目俱黃小便如豉汁色茵陳

散方

茵陳二兩白鮮皮壹兩菰蘆根壹兩黃芩兩梔子

人兩赤芍藥兩木香壹兩柴胡二兩枳殼兩

黃壹兩去穢黃連去鬚川朴消二兩土瓜根二兩

青兩川大黃二兩碎微炒芎藭根二兩

右件藥搗瓮羅為散每服五錢以水一大

盞入豉五十粒煎至五分去滓溫服如人

行十里再服以利一兩行為度即便煮稀葱豉粥食之

治陰黃小便不利而赤身汗出者表和裏實也宜下之大黃散方

川大黃

二兩到微炒

黃藥

壹兩到

梔子仁

消二甘草

青兩炙微赤到

木通

壹兩到

右件藥持麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓溫服如人行十里再服

以利為度

神巧萬全方同

治陰黃小便色不變欲自利而不利腹滿而

喘者心噦噦者宜服小半夏散方

半夏

青兩湯洗七徧去滑

人參

二兩去藁頭

葛根

二兩到

右件藥持麤羅為散每服四錢以水壹升

煎入生薑半分煎至六分去滓不計時候

常溫服良而悉黃大便澀小便澀者宜

治陰黃吐方

赤小豆

二匕到

丁香

二匕到

麝香

一錢到

瓜蒂

二匕到

青布灰

二錢到

右件藥搗細羅爲散每服以溫水調下壹錢日四五服若取少許吹鼻中卽出黃水爲效

治陰黃身面悉黃大便澁小便如梔子汁宜

服此方

茵陳二兩柴胡壹兩梔子壹兩龍膽三分

枳殼壹兩黃芩壹兩川升麻壹兩川大黃壹兩

二兩到碎微炒

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以溫粥飲下三十九日三四服以利爲度

又方秦艽壹兩梔子壹兩茵陳壹兩檳榔壹兩

陸一分陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙甜葶藶壹兩隔紙炒令紫色

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以溫水下二十九日三四服

治陰黃眼睛黃汗染衣涕唾黃色方

川大黃五兩餅下蒸一炊時取出曝乾

右件藥搗細羅爲散每服以溫水調下壹

錢日三四服常要大小便微利為效

治內黃諸方

夫內黃者由熱毒之氣在於脾胃與穀氣相搏熱蒸在內不得宣散先心腹脹滿氣急然後身而悉黃名為內黃也

治內黃徧身黃如橘色心肋滿急梔子散方

梔子人壹兩黃芩壹兩柴胡壹兩川升麻壹兩龍

膽半兩去去川大黃壹兩到到菝葜根壹兩川芒

消壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治內黃身而眼悉黃如金色小便濃如黃藥

汁衆醫不能療茵陳散方

茵陳二兩黃芩壹兩梔子人壹兩川升麻三兩○

全方兩川大黃壹兩到到龍膽壹兩去去枳殼壹兩

麩炒微秦艽壹兩去去苗苗

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治內黃身體面目皆黃宜服此方

川大黃二兩剉碎黃芩二兩剉碎

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

水調下二錢

又方柳枝二兩剉

右以水壹大盞半煎至八分去滓不計時

候分溫二服

又方川大黃一兩剉

右以水壹大盞煎至六分去滓不計時候

溫服

又方黃蘗一枚大者

右以新汲水壹大盞半浸黃蘗淘絞取

汁下蜜半合入川朴消三分細研攪令勻

分為三方神功萬全服類服之效

治勞黃諸方

夫勞黃者由脾藏中風風與痰熱相搏故令

身體發黃額上黑微汗出手足熱薄暮發勝

眊急四肢煩小便自利名為勞黃也

治勞黃額上汗出手足中熱四肢煩疼薄暮

寒熱小便自利龍膽散方

龍膽三分去甘草三分炙牡蠣一兩燒麥

門冬三分去柴胡三分去川升麻三分犀角屑三分

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至五分去滓入生地黃汁半合不計時

候溫服

治勞黃心脾熱壅皮肉面目悉黃宜服秦艽

散方

秦艽半斤麻犀角屑半斤黃芩三分柴胡一大赤

芍藥半斤茵陳兩壹麥門冬壹兩去川大黃二兩

微炒

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓溫服日三四服以利為

度

治勞黃手足煩熱肢節疼痛小腹拘急時有

虛汗鼈甲散方

鼈甲壹兩半塗醋炙柴胡三分茵陳三分地

骨皮三分亦芍藥三分黃耆三分梔子一分人參三分

門冬三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

治心熱勞黃口乾舌澁皮肉面目俱黃上氣

喘急宜服此方

黑豆宣升淨揀以水四升煎取膏升去豆生地黄汁五合麥門

冬汁三合蜜三兩生藕汁三合菰蘆根汁三合

右件藥并豆汁以微火煎如膏於瓷合中

盛每服一茶匙不計時候服

治黃汗諸方

夫黃汗之為病身體洪腫汗出不渴狀如風

水汗出染衣黃如藥汁其脉自沉此由脾胃

有熱汗出而入水中若浴水入汗孔中得成

黃汗病也

治黃汗病身體重汗出而不渴其汗沾衣黃

如藥染黃耆散方

黃耆二兩赤芍藥二兩茵陳二兩石膏四兩麥門

冬壹兩 豉二兩

右件藥搗篩為散每服半兩以水壹大盞

入竹葉十四片煎至五分去滓溫服神功萬全

方日四五服

治黃汗出身體重熱不退大小便不利宜服

此方

茵陳壹兩 赤芍藥壹兩 甘草壹兩 木通二兩

赤茯苓壹兩 黃耆壹兩 川大黃二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

煎至五分去滓溫服如人行十里再服以大小便通利為度

治脾藏痰熱不散心神煩亂小便赤澁或汗

出如藥汁宜服此方

甘草壹兩 梔子人兩 黃蘗壹兩 白木壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日四五服

又方茵陳二兩 川大黃壹兩 梔子人壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日四五服

又方梔子壹兩 藟藟子壹兩 炒 苦參壹兩

右件藥搗羅為末以醋漬鷄子黃白二枚用和藥末凡如梧桐子大每服以溫水下三十九日四五服○肘後方疽病有五種謂黃疽穀疽酒疽女疽勞疽也黃汁者身體四肢微腫胃滿不得汗汗出如黃藥汁由大汗出卒入水所致方梔子十五枚栝藟子三枚苦參三分搗末以苦酒漬雞子

二枚令軟合黃白以和藥搗凡如梧子大

每服十九日五六除熱不吐下即自消也

又方黃雌雞壹隻 去毛爪淨洗 生地黃壹斤 細切用後方

右以地黃內雞腹中繫定置於銅器中蒸

令極熟絞取汁分為五服不計時候溫服

肘後方取汁再服之

又方生芋根切二

右以猪肉半斤合作羹盡食之

又方柞樹皮二兩燒灰

右細研為末每服以新汲水調下二錢日

四五服○肘後方柞樹皮燒末服方寸匕

日三服壽域神方米湯調服方寸匕日三服

治黃病小便淋澁諸方

夫黃病小便淋澁者此由積熱在於心臧流於小腸則令小便澁少下物如砂而多疼痛也

治心脾熱壅皮肉面目悉黃煩躁小便赤澁

茅根散方

茅根二兩剉秦艽壹兩去苗犀角屑三分麥門冬二兩

去心川大黃一兩半剉碎微炒黃芩壹兩赤芍藥三分川

朴消一兩

右件藥時麤羅為散每服四錢以水壹盞煎至六分去滓溫服如人行十里再服以利為度

治心臧黃結熱面目四肢通黃乾嘔大便不通小便赤澁腹痛心煩木通散方

木通壹兩 川大黃壹兩 枳殼半兩 枳殼半兩 枳殼半兩

去黃芩半兩 赤芍藥壹兩 前胡壹兩 白朮三兩

梔子人二分 甘草半兩 半夏三分 湯洗七分

右件藥搗羅為散每服五錢以水壹大

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服以大小便疎利為度

治黃病小便赤澁心神煩悶蘧麥散方

蘧麥壹兩 茵陳兩 川大黃壹兩 黃芩兩

梔子人壹兩 麥門冬壹兩 枳殼半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候服以小便利為

度

治黃病腹脹滿小便澁而赤少宜服此方

川大黃二兩 川朴消兩 梔子人兩 黃藥

冬葵子兩 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服且四五服以利為度

治黃病心下攢堅小便赤黃不利疼痛茵陳

蘧麥散方

散方

茵陳青前胡三分去木通壹兩赤茯苓三分

椒目壹分赤芍藥三分知母四分白朮一分

右件藥詩細羅為散每服以粥飲調下二

錢日四五服

治黃疸諸方

夫黃疸之為病者酒食過度藏腑熱極水穀相并積於脾胃復為風濕所搏結滯不散熱氣鬱蒸所為也故食已即如飢其身體面目

爪甲牙齒及小便盡黃而欲安卧或身脉多赤多青皆見者必發寒熱此皆疸也得而渴者其病難療而不渴者其病易治發於陰部其人必嘔發於陽部必振寒而熱發也治黃疸心神煩躁小便赤大便難不得安卧茵陳散方

茵陳兩犀角屑半兩升麻一分梔子三分

草三分黃芩兩川朴消兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服以大小便利為度

治黃疸身目皆黃皮膚如麴塵色宜服此方

梔子人一兩石膏三兩川大黃壹兩碎微炒菰蘆乾者

甘草壹兩微赤剉木通一兩茵陳兩枳實兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入葱白七寸煎至五分去滓不計時候溫

服

治黃疸其小便自利白如泔色此狀得之因

酒過傷宜服土瓜根散方

土瓜根壹兩白石脂兩桂心兩菰蘆根壹兩兔

絲子一兩酒浸一日牡蠣壹兩燒為粉

右件藥搗細羅為散每服煮大麥粥飲調

下二錢日三四服神巧萬全方同

治黃疸心膈躁熱小便赤澁方

茅根三握豬肉壹斤細切

右件藥先以水三大盞煎茅根至二盞去

滓入肉合作羹盡壹服愈

又方赤小豆壹百粒秫米壹百粒雞糞壹兩微炒

右件藥搗細羅為散每服以新汲水調下

一錢日三四服

治黃疸身面悉黃小便如濃梔子汁茵陳丸方

茵陳二兩黃芩壹兩枳殼壹兩微炒黃芩川大黃

壹兩半剉半川升麻一兩碎微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以清粥飲下三十九日三四服

治黃疸大小便難喘息促宜服此方

川大黃二兩剉半甜葶藶二兩隔紙炒令紫色

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以粥飲下二十九日三四服喘慢即

藥止○衛生易簡方治五般疸用大黃葶

藶等分為末煉蜜丸如桐子大每服十丸

食前冷水下日三服

治黃疸耳目悉黃食飲不消胃中脹熱此腸間有燥糞宜服此方

右煎鍊猪脂五兩每服抄大半匙以葱白湯調頻頻服之以通利為度

治黃疸熱毒結在胃膈上壅煩悶目赤口乾宜服藜蘆散吐之方

藜蘆 言兩炮令小變色

右搗細羅為散每服以溫水調下半錢以

吐為效 肘後方衛生易簡方

治黃疸有多時不差者令人煩悶不食四肢俱痛方

茵陳 五兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓溫服日三四服

治黃疸內傷積熱毒發出於皮膚宜服麻黃

湯發汗方 用茵陳一斤麻黃一斤

麻黃 壹兩去根節搗碎

右以水一大盞煎至五分去滓溫服以淨

出為效如人行十里汗未出即再服

治黃疸熱毒在內悶亂坐臥不安方右燒亂

髮灰細研不計時候以新汲水調下二錢  
 ○肘後方治黃疸方燒亂髮服一錢七日  
 三服秘方此治黃疸壽域神方治黃腫身  
 體四肢微腫胸滿不得汗汗出如黃蘗汁  
 由大汗出因水所致燒亂髮灰為末滾白  
 湯調一錢七日三服

治黃疸大渴煩悶方

苦瓠白瓠及子

三兩炒  
令微黃

右搗細羅為散不計時候以溫粥飲調下

一錢

治黃疸百藥不差宜服此方驢頭壹枚煮熟

以薑薑噉之并隨多少飲汁即效

肘後方同

治黃疸毒氣鬱蒸面目盡黃寒熱發歇方右

取小麥苗

備預百方大麥

要擣絞取汁飲半盞晝

夜五七度飲之愈無小麥穰麥苗亦得○

肘後方擣生麥苗水和絞取汁服三升以

小麥勝大麥壹服六七合日三四此酒疸

也壽域神方治黃腫身體四肢微腫胸滿

不得汗汗出如黃藥汁由大汗出因水所

致方簡牛易簡取小麥苗杵絞取汁飲六七

合晝夜飲之易簡方晝夜三四次飲之三四日愈

治黃疸面目爪甲皆黃心膈躁悶宜用瓜蒂

吹鼻散方○備預白要方氣病毒熱通貫藏

腑深入骨髓間或為黃疸赤白黑疸馬齒等

病喘急不緩方

瓜蒂二七枚赤小豆二七粒秫米二七粒○白

味炒丁香二七枚○  
熟要方無

右件藥搗細羅為散取如豆大內鼻中痛

搯之須臾當出黃汁或從口中出升餘則

愈若病重者如一豆不差即復內鼻中即

效

治黃疸面目盡黃昏重不能眠卧方

苦葫蘆蘆如彈子大

右以童子小便三合浸之壹炊時取兩酸

棗許汁分內兩鼻中須臾當滴黃水為效

○壽域神方治黃腫身體四肢微腫胸滿

不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出因水所

致衛生易簡方治黃疸用苦瓠穰如大棗許以童子

小便二合浸之三兩食頃取苦瓠穰二片

易簡方浸半日取兩酸棗許分內兩鼻中病人深吸氣

及黃水出

治酒疸諸方

夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生

熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛

足脛滿小便黃面發赤斑若下之久久變為

黑疸面目黑心中如噉蒜齏狀大便正黑皮

膚手足不仁其脉浮弱故知之酒疸也心中

欲嘔者當吐之則愈其小便不利後當心熱

及足下熱是其證也脉浮宜吐之沉弦宜下

之

治酒疸艾湯方

生艾葉

握無生者用乾者亦得

麻黃

一兩去根節

川大黃

三分剉

黑豆

壹合

右件藥都細剉和勻每服半兩以清酒一

大盞煎至半盞去滓溫服日四五服

治酒疸心中懊痛梔子散方

梔子人壹兩 豉二合 川大黃壹兩 碎微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日四五服

治酒疸心懊痛足脛滿小便黃面發赤斑黃

黑由大醉當風入水所致宜服此方

黃耆二兩 木蘭皮壹兩

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調下二

錢日四五服肘後方壽域神方酒

治心下堅而小便赤澁是酒疸之候宜服此

方

赤茯苓壹兩 茵陳壹兩 枳實壹兩 微黃 甘草三分

剉杏仁三分 湯浸去皮尖 白朮兩 半夏三分

湯洗七前 胡蘆頭去 川大黃一兩 剉當歸

分三 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵

如梧桐子大每服以粥飲下二十九

命如梧桐子大每服以粥飲下二十九

治酒疸徧身黃翹塵出牛膽丸方

牛膽青一枚川大黃一兩剉碎微炒芫花半兩醋炒乾

微炒瓜蒂壹兩

右件藥搗羅為末以清酒立升漬膏宿煮

減去中濾去滓內牛膽微火煎令稠丸如

梧桐子大每服以溫水下五丸得吐利為

度

治穀疸諸方

夫穀疸之狀食畢即頭眩心忪怫鬱不安而

發黃由大飢大食胃氣衝熏所致陽明病脉

遲食難因飽飲則發煩目眩者必小便此欲

為穀疸雖下之其腹必滿其脉遲者是也

治穀疸唇口先黃腹脹氣急宜服此方

鬱金壹兩牛膽壹枚麝香半錢

右件藥搗細羅為散不計時候以新汲水

調下半錢

治穀疸食畢即頭眩心怫鬱不安而發黃由

失飢後大食胃氣衝熏所致宜服此方嚴氏濟生

方名穀  
疽圓

苦參三兩龍膽壹兩去牛膽壹枚

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以生麥門冬汁下十九日三四服○

濟生方右為細末用牛膽汁入少煉蜜為

圓如梧桐子大每服五十圓空心食前熟

水或生薑甘草煎湯送下衛生易紅圓子

方見和亦可服醫方大成集或南北經驗

劑肩方方補珍方承類鈞方與濟生方肘後方苦參三兩龍膽一合末牛膽

丸如梧子以生麥汁服五丸日三服

治黑疽諸方

夫黑疽之狀若小腹滿身體盡黃額上反黑  
足下熱大便黑是也夫黃疽酒疽女勞疽久  
久多變為黑疽也

治黑疽身體及大便正黑赤小豆散方

赤小豆五十枚赤茯苓壹分瓜蒂壹錢雄黃半錢

細研甘草半兩炙女萎一分瓜蒂壹錢雄黃半錢

右件藥四味搗細羅為散每服以水一大

盡煮小豆茯苓至五分去滓空心調下散藥一錢須臾當吐則愈如人行三二里未吐即再服

治黑疽身體間黑小便赤澁茵陳丸方

茵陳壹兩枳殼壹兩微黃去白木壹兩半夏三分湯洗  
七徧去滑神赤茯苓壹兩甘遂壹分煨當  
巧萬全焙歸三分杏人三分湯浸去皮尖木通一兩川  
椒三分去目以閉川大黃三分剉剉甜葶藶  
青兩隔紙炒令紫色

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫水下十丸

治風疽諸方

夫風疽者由風氣巢氏病源作濕在於腑藏與熱氣

相薄便發於黃小便或赤或黃巢源或白好固

而心振而虛黑名為風疽也

治風疽心脾風熱面色虛黑身體皆黃小便

赤澁宜服牛黃散方

牛黃壹分犀角屑三分防風三分去去菰藶根

壹分湯浸去皮尖白鮮皮二分神巧一分  
 可杏人雙人麩炒微黃  
 全方秦艽三分川大黃壹兩甘草半兩  
 三分赤麥門冬壹兩去心梔子人半兩  
 右件藥擣細羅為散研入牛黃令勻每服  
 不計時候以竹葉湯調下壹錢金銀湯下  
 亦得

治風疽藏腑風熱相搏心神不安多卧少起

小便赤澁犀角散方

犀角屑壹兩去鬚赤芍藥三分茵陳壹兩白

鮮皮三分土瓜根三分梔子人三分柴胡三分菰  
 蘆根三分川大黃壹兩半到川芒消二兩于芩  
 三分貝齒二十枚燒分貝齒令赤細研  
 右件藥擣細羅為散每服不計時候煎茅  
 根湯調下二錢以利為度  
 治風疽小便或黃酒洒而寒好臥不欲動宜  
 服此方

艾壹兩於銅器中煎如膏取擣汁川大黃壹兩到黃  
 連壹兩去鬚苦參壹兩凝水石壹兩菰蘆根壹兩甜

葶藶

壹兩隔紙炒令紫色

右件藥搗羅為末以艾煎和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下二十九○三因方艾煎圓治因傷風痰熱不解發於風疽舉身皆黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱生艾三月採一束搗膏○得効方二月採大黃蒸黃連炒栝樓根凝水石苦參葶藶各等分右為末以艾膏和得所丸如梧子大初服六七丸漸加至二十

丸有熱加苦參渴加栝樓根小便澁加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃所加並倍之

治女勞疸諸方

夫女勞疸之候身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利由大勞大熱不能保攝房後入水所致也治女勞疸身目俱黃惡寒發熱小腹滿急小便艱難滑石散方

滑石 一兩半 ○醫方大成集成南北經白

礬 一兩燒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以大

麥粥飲調下二錢小便出黃水為度 嚴氏

同方 ○衛生易簡方用滑石錢半枯白礬壹

錢以大麥粥飲調下以小便利出黃水為

度

又方白礬 半兩燒 消石 半兩

右件藥細研為散每服不計時候以大麥

粥飲調下三錢令微汗出小便利為度

肝黃證候

肝黃者面色青四肢拘急口舌乾燥言語蹇

澁頭目不利爪甲青色若背上浮腫腹脇脹

滿者難治烙肝俞二穴中管穴足陽明二穴

絕骨二穴及兩臂間手背後

治肝黃柴胡散方

柴胡 壹兩 甘草 半兩炙 決明子 半兩 車前子

兩 羚羊角屑 半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至五分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

治肝黃面色青黃筋脉拘急口乾心躁小便不利言語或澁犀角散方

犀角屑叁分 梔子人三分 黃芩叁分 羚羊角屑叁分

川升麻叁分 柴胡壹兩 龍膽半兩 法半兩 止草半兩

炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時

候濕服

黃心黃證候

心黃者目赤舌生瘡心悶喘急多言無度或笑或嗔微汗出口乾舌短起臥不安神思恍惚小便赤難心下脹滿狀如心風悲哭手亂捨物者難治烙心俞二穴小腸俞二穴天窓穴百會穴承漿穴上管穴關元穴下廉二穴

治心黃生地黃飲子方

生地黄二兩淡竹葉三十片大麥半合甘草半兩  
赤 灸微

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹中盞  
入生薑半分煎至七分去滓不計時候溫  
時服小兒亦服心不煩 煎小兒 煎小兒 煎小兒  
治心黃心神恍惚口乾煩悶馬牙消散方思  
馬牙消一兩朱砂壹兩龍齒兩犀角屑兩  
黃芩壹兩甘草壹兩微赤剉  
右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候

以生地黄汁調下二錢神巧萬二穴用全方同

又方雞子清二枚鹽半兩麻油壹合

右件藥相和令勻頓服之以吐利為度

脾黃證候

脾黃者徧身如金色眼目俱黃唇口生瘡或  
冷或詠有時吐逆不能下食大便澁若臍凸  
者難治烙脾俞二穴次烙胃管陰陪二穴丹  
田穴魂舍二穴足陽明二穴  
治脾黃土瓜根散方

土瓜根半兩 蘇軾根兩 甘草半兩 枳殼兩

麩炒微黃去瓢

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹小盞

煎至五分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

肺黃證候

肺黃者眼目白色頭面微腫鼻衄不止多涕

增寒徧身生赤粟子壯熱腹脹胃滿上氣若

粟子紫黑色及腫者難治烙肺俞二穴大腸

俞二穴天窻穴手陽明二穴下廉二穴丹田

穴承山二穴及手足心背心兩乳頭上貳寸

治肺黃蘇軾散方

蘇軾膏枝乾者 柴胡半兩 甘草半兩 欬冬花微赤剉

蘆根半兩 貝母半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服神巧萬全方同

又方瓜蒂七枚

右搗羅為末每取一字各吹鼻中當下黃

水為效  
腎黃證候

腎黃者面色青黃腰背疼痛耳中颼颼百般  
聲響脚膝無力多唾嘔逆不能下食悲而不  
樂若兩脚浮腫齒黑如大豆者難治烙腎俞  
二穴膀胱俞二穴章門貳穴魂舍貳穴百會  
穴三里貳穴及兩足心

治腎黃附子散方

附子壹分炮裂去皮臍 乾薑壹分炮裂 生乾地黃兩

○神巧萬全方壹兩

右件藥搗篩為散分為三服每服以水一  
大盞煎至五分去滓不計時候溫服

又方萵苣子壹合細研

右以水一大盞煎至五分去滓不計時候

溫服

又方蔓菁子壹合

右研令極爛入熱湯一小盞攪去滓不計

時候溫服

膽黃證候

膽黃者面色青黃多驚少臥悲泣不定嗔怒無恒舌上生瘡唇口乾燥若喘麤不止者難治烙膽俞貳穴上管穴風池穴下廉貳穴心俞貳穴肝俞貳穴伏兔貳穴去刺不情也治膽黃車前子散方

車前子

半兩

秦艽

半兩

甘草

半兩炙

犀角屑

兩半

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

煎至五分去滓入生地黃汁半合不計時

候溫服

腦黃證候

腦黃者由熱邪在於骨髓而腦為髓海故熱氣從骨髓流入於腦則令身體發黃頭疼眉疼烙百會穴天窓穴風府穴治腦黃石膏散方

石膏

二兩

秦艽

壹兩

犀角屑

兩 梔子

兩 甘草

草

半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方梔子八兩

青

菘蘆根

兩

川人黃

青

兩到碎微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

行黃證候

行黃者由瘀熱在脾藏但肉微黃而身不甚熱其人頭痛心煩不癢行立也烙脾俞二穴上管穴百會穴

治行黃宜服此方

黃芩

壹兩

麥門冬

壹兩

犀角屑

壹兩

菘蘆根

兩

梔子八兩

壹兩

甘草

半兩炙

微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

癖黃證候

癖黃者由飲水停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散脇下滿痛而身體發黃烙胃俞二穴上管穴胃管穴

治癖黃半夏散方

半夏一兩湯洗前胡七分湯洗蘆頭七分湯洗檳榔一分杏仁一分

雙人麩炒微黃川大黃壹兩剉枳殼兩半

黃去瓢

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

又方芫花半兩醋拌桃人半兩湯浸去皮尖

川大黃壹兩剉

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

胃黃者吐逆下利心腹氣脹或時煩悶不能

飲食四肢無力若唇口面目舌根黑者難治

烙胃俞二穴上管穴太衝二穴

治胃黃人參散方

人參壹兩黃芩壹兩赤茯苓壹兩菰蘆壹兩

甘草壹兩枳殼壹兩

殼壹兩微黃去瓢

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞煎至五分去滓不計時候溫服

鬼黃證候

鬼黃者面色或青或黑徧身皆黃狂語多驚皮膚乾枯舌根寒澁心中恍惚常見鬼神或自強言詐作惺惺苦鼻中灰色舌黑毀裂衣裳者難治烙心俞二穴百會穴巨闕穴章門二穴下廉二穴明堂穴神庭穴治鬼黃丹砂散方

朱砂半馬牙消壹鐵粉半

右件藥同細研如粉不計時候磨犀角水調下壹錢

疔黃證候

疔黃者是鬼黃變入疔黃也面目徧身俱黃言語失錯心神狂亂詐疔黠如不患人若不盥漱即口舌乾燥氣喘者難治先烙心俞貳穴肺俞貳穴次烙脊前兩邊

治疔黃犀角散方

犀角屑壹兩 麥門冬一兩 白鮮皮壹兩 葳蕤兩

黃芩兩 川大黃壹兩 碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蓋煎至五分去滓入生地黃汁壹合不計

時候溫服變入後

### 走馬黃證候

走馬黃者眼目黃赤煩亂狂言起卧不安氣力強壯唯愛嗔怒努目高聲打罵他人猶如癩醉若癩逆者難治烙肝俞貳穴百會穴風

府穴關元穴腎俞貳穴下廉貳穴上管穴中管穴次烙手足心

### 治走馬黃方

小麥兩 竹葉壹握 生薑半兩

右以水壹大盞半煎至八分去滓入馬糞汁壹合攪勻分為貳服如人行三貳里服盡

### 立黃證候

立黃者兩脚疼痛眼目黃澁小便色赤淋瘞

不利心下有氣塊者難治烙上管穴心俞貳  
穴關元穴下廉貳穴次舌下黑脉

治立黃方

茅根

五兩白朮

半兩

右件藥搗篩爲散每服五錢以水壹大盞  
煎至五分去滓不計時候溫服

黑黃證候

黑黃者面色或黃或黑眼目青色腰脊拘急  
口中兩頰有黑脉出口角者難治烙百會穴

及舌下黑脉口角兩傍玉泉穴絕骨貳穴足  
陽明穴章門貳穴次烙心俞貳穴

章門體黃證候

體黃者身黃面赤脚膝疼悶身上不熱心中  
煩躁腹中微微有氣飲食或進或退好蓋衣  
被又欲冷處眠臥烙百會背心及心下壹寸  
至二寸三寸四寸五寸

治體黃宜用蒟藿湯浴之方

蒟藿

斤半柳枝

斤半桃枝

斤半黃蘆木

兩五

右件藥細判以水三斗煎至貳斗去滓入  
白礬末壹兩攪令勻溫溫浴之

二勞黃證候

勞黃者四肢無力骨節煩疼或時吐逆不能  
下食鼻中乾燥身熱疼悶漸覺羸瘦寒熱不  
定若喘息氣麓者難治烙心俞貳穴玉枕穴  
章門二穴百會勞宮貳穴曲骨穴

治勞黃柴胡散方

柴胡壹兩茵陳半兩犀角屑半兩麥門冬壹兩  
去心

鼈甲二兩塗醋炙甘草半兩炙  
微黃大裙襪 微赤判

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞  
煎至六分去滓不計時候溫服

脊禁黃證候

脊禁黃者腰背急硬口噤不言喘息氣羸眼  
中出血心神恍惚狀如中風烙百會心俞二  
穴上管穴肝俞二穴承漿穴魂舍二穴氣海  
穴下廉二穴絕骨二穴次烙鼻柱及大椎骨

治脊禁黃獨活散方

獨活壹兩麻黃壹兩去根節犀角半兩秦艽半兩

桑根白皮半兩甘草半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

食黃證候

食黃者聞食氣吐逆心腹脹滿身體疼痛喘  
息氣麤食飲不下或時虛汗腸中結燥亦似  
心黃夢見神鬼烙章門二穴關元穴脾俞二

穴上管穴中管穴

治食黃腹中結燥茅根散方

茅根壹兩甘草壹分川大黃壹兩

右件藥搗篩為散分為五服每服以水一

大盞煎至五分去滓溫服如人行五七里

再服以利為度

又方商陸壹兩菰蘆根壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以葱白湯

調下一錢

火黃證候

火黃者徧身如火色兩腋下  
有赤點子狀如粟米或如麥麩  
其點子紫色多黑色少者可  
治黑色多紫色少者難治  
烙百會穴天窻穴及背脊兩傍

治火黃方右取生菰蘆根搗絞取汁不計時候服半中盞

陰黃證候

陰黃者身如熟杏愛向闇臥不欲聞人言語

四肢不收頭旋目痛上氣痰飲心腹脹滿面色青黃脚膝浮腫小便不利烙腎俞二穴氣海穴胃管穴陰陪二穴

治陰黃秦艽散

秦艽壹兩旋復花半兩赤茯苓半兩甘草半兩

赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以牛乳壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

氣黃證候

氣黃者上氣心悶腹脇脹痛兩脚冷疼睡臥不安小便淋澁狀似脾黃烙氣海穴肺俞二穴足

治氣黃方

苦葫蘆子人壹兩 酸炒

右搗細羅為散不計時候以溫水調下壹錢以得吐為度

溫黃證候

溫黃者頭痛口苦舌根乾黑喘息不調鼻中

血出心神煩亂作帳望之聲小便赤色如紅花汁若眼不能開者難治烙耳尖上五分及耳前五分頭兩角太陽穴百會穴玉枕穴心俞二穴足陽明二穴及手足心

治溫黃生地黃散方

生乾地黃壹兩犀角屑壹兩黃芩壹分竹茹壹分麥

門冬二分 去心

石件藥搗篩為散以水二大盞煎至一大盞去滓分為二服如人行五里再服

髓黃證候

髓黃者身體赤黃四肢不舉肌肉戰掉鼻中  
出血兩脚疼悶一手專安額上身不壯熱愛  
冷處臥烙下廉二穴百會穴肺俞一穴接脊  
穴絕骨二穴

治髓黃地骨散方

地骨皮壹兩柴胡壹兩人參壹兩去苗去苗羚羊角  
屑一兩甘草壹兩微赤壹兩右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至五分去滓入生地黃汁半合不計時  
候溫服

房黃證候

房黃者眼赤身黃骨髓煩疼頭目昏痛多饒  
睡臥體虛無力夜多夢泄神思不安腰脚痠  
疼小便黃赤烙腎俞二穴膀胱俞二穴足三  
里二穴關元穴氣海穴

治房黃鹿茸散方

鹿茸壹兩去毛去毛熟乾地黃壹兩山茱萸壹兩

味子兩一黃耆壹兩牡蠣壹兩燒為粉

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下二錢

血黃證候

血黃者頭痛心悶眼運欲倒胃膈熱壅鼻衄

不止咽喉乾燥舌上生瘡若身熱如火頭面

腫者難治烙心俞二穴百會穴足陽明二穴

下廉二穴及手足心

治血黃羚羊角散方

羚羊角屑一兩黃芩一兩梔子人兩麥門冬壹兩

夫川升麻壹兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水中蒸

煎至五分去滓入生地黃汁半合不計時

候溫服

憂黃證候

憂黃者面色青黃手足疼痛多吐涎沫欬嗽

不止兼唾膿血肌膚消瘦行步欲倒狀同勞

黃烙背心次烙膽俞二穴心俞二穴

治憂黃秦苧散方

命二穴

秦苧

去苧兩

柴胡

壹兩

鼈甲

壹兩

塗醋炙黃

者

半兩杏仁

半兩雙人

麩炒微黃

黃芩

半兩尾

角屑

兩半甘草

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至五分去滓入生地黄汁壹合不計時

候溫服

驚黃證候

驚黃者面色青黃心多驚悸口舌乾燥不肯

眠臥臥即多言語狂亂身體壯熱烙風池二

穴後烙天窻穴心俞二穴

治驚黃犀角散方

犀角屑

兩半

白鮮皮

兩半

麥門冬

兩半

沙參

兩半

去蘆茵陳

兩半

升麻

兩半

朴消

兩半

甘草

兩半

炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水 中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

花黃證候

花黃者面色似紅花頭目疼重寒熱如瘧恒  
多脚冷早起即輕午後發重進退不定狀同  
神祟烙百會穴手陽明二穴關元穴足陽明  
二穴

治花黃知母散方

知母壹地骨皮兩柴胡壹兩石膏兩梔子

人膏

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
煎至五分去滓入生地黄汁壹合不計時

候温服

瘧黃證候

瘧黃者面色萎黃增寒壯熱頭痛不止口乾  
多渴四肢羸瘦不能飲食或好或惡進退不  
定烙肺俞二穴百會穴風府穴天窻穴太陽  
二穴玉枕穴及耳尖上五分

治瘧黃恒山散方

恒山壹兩茵陳兩赤茯苓壹兩知母壹兩鼈甲壹兩  
塗醋炙令微甘草半兩炙黃頭裙襖微赤剉

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞  
入豉四十九粒煎至六分去滓不計時候  
溫服

水黃證候

水黃者身面青黃脚膝浮腫心腹脹滿上氣  
煩悶語聲不出烙關元穴伏兔穴下管穴足  
三里二穴山二穴百會穴及背心

治水黃方

川大黃

半兩剉碎微炒甘遂一錢煨

右件藥搗碎都以水盞大盞煎至六分去  
滓分爲二服如人行五七里再服得利卽  
住服

蛇黃證候

蛇黃者腰背反張口苦舌縮咬嚼衣裳伏地  
似隱不多言語難蓋衣被少開眼目或時叫  
喚心神不定烙手心背心足陽明二穴及氣  
海穴

治蛇黃羚羊角散方

羚羊角屑壹兩 麥門冬壹兩 沙參壹兩 秦

芄半兩 茵陳兩 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中

分去滓不計時候溫服

治鷓鴣黃證候

鷓鴣黃者十指青綠舌上生黑點唇口青黑身

如黃銅烙下廉及足心胷前當心

治鷓鴣黃方

蘆根壹兩 生乾地黄壹兩 茵陳半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞煎至五分去滓不計時候溫服

雞黃證候

雞黃者徧身爪甲並青黃多語夢寐或見鬼神時自言笑烙風池二穴及鼻柱下三分手掌後橫文三寸及足心

治雞黃方

生地黄五兩 小雌雞壹隻 毛羽

右件藥都以水五升煮至壹升半去滓分

為三服一日服盡

蚰蜒黃證候

蚰蜒黃者喉中似噎喘息不調四肢疼痛言  
語不正水米難下若頰內有青脉出口角手  
足亂動冷者難治烙手足心及口角內青脉  
尖頭及眉前

治蚰蜒黃半夏散方

半夏壹兩湯洗射干壹兩升麻壹兩犀角屑  
甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服

三十六黃點烙應用俞穴處見針灸經

醫方類聚卷之一百三十一