

醫方便蒙下

敬恕堂張訂



中華民國卅三年閏四月上澣

醫方方便蒙

下卷

古彭張宗震訂讀



醫方便蒙卷五目錄

婦女科

經行

崩漏

五帶

經常

月經

常之

月經異

胎前

約忌

惡阻

子瘡

子懸

子癩

子鳴

子嗽

胎墜

胎動

胎不長

妊傷寒

子腫

子煩

漏胎

妊跛脚

臨產

小產

產後

乳不行

乳自湧

乳癰

吹乳

乳巖

妬乳

乳懸

陰腫

陰痛

陰癢

陰瘡

陰挺

陰痔

陰冷

陰吹

交出血

熱入室

血分腫

水分腫

夢鬼交



梅核氣

血風瘡

臙瘡

足跟

回乳



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫方便蒙卷之五

婦科

經行經閉證治

一月一行自古同。不用施治自和平。四五十日名落後十日半月。躓前名三月五月全無信。非是受孕即閉經。氣凝血聚癥瘕起。施治之期須用攻。淡黃紫黑色不正。虛實寒熱漫調停。受孕經閉設疑是。加減逍遙兩收功。若是認透是經閉。自製開鬱湯最靈。

婦人之病與男子治同。惟行經胎產崩漏淋帶不相同耳。故另立婦人科以分辨之。經胎產崩漏淋帶不相同。女子十四則天癸至。四十九則天癸盡。天者先天之氣。癸者壬癸之水。天癸者即經血來期也。一月一行是其常也。二七至七七盡者。乃天地之常理也。有十五六而至者。四十以後而盡者。不能一律而然也。



有十乾血八而絕不至者此本無血將成蒸熱虛勞之證
 名血之行一月一童至如月盈則虧若二十七八一行三
 經二三日一人二行皆為五日調必拘拘一月也三十五六
 有血勝之亦不為不調趙前後非血熱即氣虛不能收攝也
 日行亦不一行名落後非血熱即氣虛也皆為不調也
 有十四日半月一月行行名落後非血熱即氣虛也皆為不調也
 有兩月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
 若熱腹痛蒸熱兩月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
 痛為聚成塊名曰癥瘕者則結聚成癥者氣凝比之經閉久
 血攻治時醫不活也然身無熱體無恙為可辨即以順氣安
 更難閉者每身無熱體無恙為可辨即以順氣安
 認為經閉者每身無熱體無恙為可辨即以順氣安
 氣鬱血不活也然身無熱體無恙為可辨即以順氣安
 胎為主淡者氣虛也血色紫者血熱也血色黑者血熱極
 也俗醫不識以紫黑為寒者此懶讀書道聽塗說之極
 流耳不調黃水或行如黑豆汁者乃血之不化也以上
 均屬不調壯要桃紅銀紅為正色也血自和氣寒血滯
 自隨氣轉凡調經必先通氣又微熱血亦熱氣寒血滯
 血氣壯要桃紅銀紅為正色也血自和氣寒血滯



亦寒。經行如期。身無熱而腹無痛。原不醫治。至於躓前。落後。紫黑。黃水。黑豆。汁等。此皆不調之症。必用藥調。之。若經閉。蒸熱。腹痛。以攻之。必用藥以通之。血聚成塊。癥。但經閉。受孕。雖有脉。滑。濇。之分。肌熱。腹痛。之別。然而。變化。不齊。每有。相反。莫如。加味。逍遙。散。通。經。安。胎。兩。無。所。忌。若。胎。切。記。之。劑。必然。墜。胎。切。記。之。劑。

加味逍遙散

經閉可以通經受孕可安胎乃婦科經脉之平方更能退熱

逍遙散開氣血凝經血方聚熱自成柴苓白朮薄荷草歸
芍活血在調經

柴胡 當歸 枳芍 薄荷 甘草 白朮 茯苓

柴胡 疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古

加減法



鬱悶香附心熱芩氣虛黃耆養陰參釵前血熱加生地氣
虛黃芪建功勲落後血瘀行不利腹痛紅花並桃仁落後
氣虛無腹痛加上黃芪與党參方中柴胡須少用恐生外
發散將功分黃水豆汁胃濕熱猪苓澤瀉同黃芩利濕清
熱色宜正再加紅花並丹參熱蒸地骨須當用有塊鱉甲
正宜吞氣氣朮苓莫可減血凝丹紅須要遵

香附 平 黃芩 平 黃芪 平 丹參 平 生地 平 紅花 平 桃仁

党參 平 柴胡 平 猪苓 平 澤瀉 平 鱉甲 平 丹皮 平 骨皮 平

氣滯鬱悶加香附以通氣心內熱加黃芩以清熱釵前
血熱加生地以涼血釵前氣虛者加黃芪以補氣釵前
落後血虛者臨行則腹痛不利者加紅花桃仁落後血
虛者步而無腹疼者加黃芪以補氣旺自能生血再加
以養陰血而方中柴胡須去二錢恐生發散反無功也
黃水豆汁者胃有濕熱血不化也加猪苓澤瀉以利濕



加黃芩以清熱。加紅花丹參以正其色。蒸熱盛者。加地骨皮以退蒸。有塊者。加荳蔻甲軟。堅消塊。並退熱。氣虛者。方中白朮茯苓。莫減亦不可多用。不過每樣。以補之。血凝腹痛者。加丹皮。紅花。下以活血。丹皮紅花破血。傷胎。少用。些許。又可活血安胎。

自製開鬱湯 詳血瘀門

四物湯 詳血虛門 加減法

加減法

血虛丹皮地骨蒿經閉紅花高桃仁高閉甚蒲黃寒元脂

血聚三稜莪朮消

血虛生熱者。加丹皮。地骨皮。辛青蒿。以退熱。經閉不通者。加紅花。桃仁。以開之。閉甚者。再加蒲黃。血寒凝結而腹痛者。以破之。血熱則妄行。血寒則經閉。血聚塊而成癥瘕者。加三稜。莪朮。以破之。

有塊蒸熱用鱉甲胡連同用效堪誇。三稜莪朮二味解五

靈性熱配無差。



有塊必蒸熱再加以驚甲卒胡黃胡二味其熱退甚必須
我術辛熱助火凡有塊必熱若見二味消塊更甚
驚甲胡連亦消塊之要藥也
甲胡連亦消塊之要藥也

崩漏證治

婦人何故有漏崩只因勞傷任與衝淋漓不斷為之漏忽

然大下以崩名加味膠艾皆能治血虛熟地血熱生

忽然大下為之崩俗名血山崩也即此證非大傷氣血
即血熱也滲滲不斷為之漏此亦血熱所致者多而或
是微傷者崩輕重漏輕均非易治待至血盡則死矣急
用加味膠艾湯以塞之

加味膠艾湯 治崩漏 即膠艾四物湯也

加味膠艾湯 熟地 榆陳棕灰崩漏第一良

大熟地 當歸 川芎 杭芍 阿膠 蒲黃炒

血熱換生地

當歸 川芎

杭芍 阿膠

蒲黃炒

陳棕灰 艾葉 地榆灰 水煎服



崩者血分受傷也。故用四物湯以養血。加膠艾棕榆以塞血耳。
婦人懷孕見紅者。胎必墜也。服此或救。十中之一二。孕婦見紅。胎必受傷。可知不能許之。必救。

五帶證治

婦人帶下有幾因。古人却有五色分。總由肝經濕熱致柴。

苓十服建功勳。還有單方是丸藥。燥濕清熱是椿根。

帶名白帶。言其下如白涕也。此因肝腎濕熱。使飲食之精汁不能化血。則帶久之。則血乾。血乾則內蒸成勞矣。古人雖有五色之分。亦不必拘拘。

自製柴苓散 專治白帶之症

自製柴苓散。將白帶管。馮草丹。紅草。柴苓。地骨選。

柴胡 子 地骨皮 子 猪苓 子 澤瀉 子 草解 子 丹參 子

紅花 子 甘草 子 水煎服。必須十餘服後。方能见功也。



帶乃肝經濕熱。故用柴胡、疎肝、地骨皮、清熱、猪苓、澤瀉、萆薢、以利濕。濕去則精汁自變。復加丹參、紅花、以正其色。古書每用辛燥之劑，助熱耗血，每用無功。反成蒸熱，以速勞症。予故自製此方，每用甚效。

椿根皮丸 治帶甚效

椿根皮 切片晒干為面，麪糊為丸。每服一錢，白水送。其味苦寒，性澁燥濕清熱。

婦科經常經異之變 錄明醫指掌

婦人天癸有常，經血滿衝，任迎月行，不及期來，知是熱過期，血少自分明。若或色淡，因痰滯熱極多，來紫黑，形氣滯未行，先作痛，虛時行過腹中疼，去多不住，加涼血來少無疼，大補榮經，閉要推虛，實候血枯，氣膈熱痰，凭

夫經者常也。然衝任二脉為經脉之海，血氣之行，內循經絡，內榮藏府，氣血調適，運行不息。一月之間，衝任血

溢而行經云月事以時下此常經也其或太過不及或
 多或少或紫或淡則失其常候而調之復令其氣以
 寒熱之初斯無病者必審其因而調之復令其氣以
 復其初云男女天癸既至不調十年無血不出新血未
 按褚氏思男子合亦不調則舊血不閉成勞者
 踰十年入骨或變而為腫冠氏云室女經閉多因脾
 或由潰積想在骨或變而為腫冠氏云室女經閉多因脾
 多由積想在骨或變而為腫冠氏云室女經閉多因脾
 胃傷損不可便作經閉血凝因飲食勞倦損傷脾胃少
 此症便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少
 食惡食泄瀉疼痛或誤服汗下攻剋之藥傷其脾胃少
 致血少而不用行者只宜補脾胃用白朮為君茯苓
 芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等
 藥脾旺則能生血而經行矣又有飲食停滯致損脾
 胃者亦宜消食補脾而作痛者血氣俱虛也八珍湯
 宜行血過期而行血不足也四物湯加黃芪陳皮
 調而色淡黃者血少四物湯加黃芪陳皮
 再加艾阿膠血氣受傷或生育多而瘦弱閉經不行
 四物湯加艾阿膠血氣受傷或生育多而瘦弱閉經不行
 經水不來及期來者紫黑者丹溪云紫黑熱極從火化故
 附經水不來及期來者紫黑者丹溪云紫黑熱極從火化故




也經水來必多或作痛。四物湯加黃芩黃連黃柏。經水不止者。此血熱也。用三柏倍香。主之。黃芩黃連黃柏。因而多日必漸昏星。閉是氣。痰多佔住。血海地。因而多日必漸昏星。閉是氣。肥人經閉。是痰膈導。疾。因而多日必漸昏星。閉是氣。滯四物湯加陳香檳。只壳香附。桃仁。紅花。經水過期。色淡痰也。二陳湯加川芎。當歸。貝母。天花粉。臨行。腹。痛氣滯血實也。四物湯加玄胡索。蓬朮。只壳。木香。桃仁。

附香
月經之常錄金鑑

月經三旬時一下。兩月為並。三居經。一年一至為避。年一

生不至孕暗經

女子陰類也。水血為主。其血上應太陰。下應海潮。月有盈虧。潮有朝夕。月經一旬。一行者。其常也。或先或後。乃水月信也。然亦有兩月一。行。者。三月一。行。謂之。育月者。有一年。此所謂之。不同。而亦非病。不至。而依。然。有。孕。



月經異常

經期吐血或衄血上溢妄行曰逆經受孕行經曰垢胎受

胎下血漏胎名

婦女月經一月一下此其常也若經而吐血衄血上溢妄行者是謂逆經有受孕之後月月行經而產子者是謂垢胎有受孕數月其血忽下而胎不損者是為漏胎此皆月經之異常也

又有避年之名一月一行身無熱而體無恙脉仍通透不

可以經閉攻之此亦恒有之經却不得乎受孕

起又及至此抄錄他書以為備考以後仍是黃先生的解釋

胎前證治

婦人經有孕經不行不問脉之瀉滑通但以肌膚無熱者

便當順氣將熱清



蛇蛭水蛭与
 蛇虫烏头附
 子配天雄野
 蜀水銀并巴
 豆牛膝薏苡
 与蜈蚣三棱
 代赭芫花射
 雌雄牙硝芒
 胡丹皮桂槐
 化牽牛皂角
 同丰夏南星

婦人有孕。經即不行。不問脉之滑濇。只以肌膚無熱者。便是受經。為因血瘀。經閉。必發熱也。婦人有孕。胎氣盛。必質而內熱。故順氣清熱。便是安胎。內熱者。自覺心熱。與經鬱。肌熱不同也。

孕婦忌服之藥

溫熱動血胎必傷。川烏肉桂合丁香。更有一味是附子。米

片射香與硫黃

川烏 肉桂 丁香 附子 冰片 射香 硫黃

牽牛動血善攻水。大戟芫花並甘遂。巴豆性烈最為上。大

黃芒硝葶藶隨

牽牛 大戟 芫花 甘遂 巴豆 大黃 芒硝

葶藶

破血桃仁蒲紅花乾漆五靈元胡查三稜莪朮益母草丹



与通炸瞿麦
干姜桃仁通
脚爪地胆茅
根莫用好

皮蘇木神麥芽

桃仁 蒲黃 紅花 乾漆 五靈 元胡 山查

神曲 麥芽 三稜 莪朮 蘇木 丹皮 益母

墜胎礞石與南星 廂牛膝滑石瞿麥通 硃砂雄黃破故紙

全箔半夏紫石英

礞石 南星 牛夕 滑石 瞿麥 木通 硃砂

雄黃 金箔 半夏 紫奎英 破故子

惡阻證治

妊娠惡阻內停痰。不欲飲食心悶煩。縱然強食仍嘔吐。半
夏湯治保安然。

婦人懷孕有痰惡心。阻食食下片時復吐出也。



又方：

伏龍肝一塊

約一兩煎湯

一碗澄清去

渣飲之止嘔

非常有效。

半夏湯 專治惡阻

妊娠惡心 半夏湯 陳皮 茯苓 共藿香 更有砂仁 大腹皮 蘇梗 香附 並生姜

半夏 茯苓 藿香 陳皮 砂仁 蘇梗 香附

大腹皮 洗 生薑 三片

半夏 辛溫 除濕化痰 退熱安胎 大腹皮 辛溫 痞脹 痰膈 能
苓甘 淡除濕化痰 退熱安胎 大腹皮 辛溫 痞脹 痰膈 能
止嘔 瀉滯 消食 辛溫 開胃 止嘔 能
快膈 導滯 消食 辛溫 開胃 止嘔 能
止痛 安胎 香附 辛溫 香和 胃醒 脾快 氣調 中痞 脹嘔 吐
產諸病 推陳致新 蘇梗 安胎

子瘖證治

婦人懷孕不能言 腎閉舌本 子瘖傳 岐伯有云不可治 分

婉之後仍照前



婦人懷孕不能言語。此因腎閉於舌本。岐伯曰：無治也。生產後自復。

子懸證治

胎氣上冲，心不安，胸中脹悶。名子懸。治法須用安胎飲，或

加芎歸保安然。

子懸者，胸中脹悶也。此因胎氣上冲，宜安之。

安胎飲 治子懸胎氣通用

安胎飲治脹悶胸。蘇梗、腹皮、草荻、苓、砂仁、藿、樸、芩、白朮，或

加當歸、並川芎。

蘇梗平 砂仁平 藿香平 厚樸平 大腹皮平 黃芩平

白朮平 荻苓平 甘草平 生姜引

孕婦為雙身。雙身者，氣必實。氣實必內熱。故順氣清熱，活
血，即為安胎。安胎者，乃使子母並安也。藿香、蘇梗、腹皮



厚朴砂仁皆順氣安胎之藥。再加黃芩以清熱。茯苓白朮以補脾。蓋因胎雖居腎部衣包之中。根實蒂於脾部。故加補脾之藥以固之。或加當歸川芎治血亦可。

子癇證治

妊娠之癇因何名。角弓反張。肝中風。語言蹇塞。痰壅盛。羚

羊角散治安寧

妊娠角弓反張。形如風症。乃肝木中風也。

羚羊角散治子癇

羚羊角散治胎弓。當歸獨活與川芎。木香。杏仁。五加皮。更

有茯神並防風。

羚羊角 桑當歸 川芎 防風 五加皮 獨活 桑

酸棗仁 炒木香 茯神 生薑引



羚羊角辛涼以平肝火防風獨活辛溫以散風
秦神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣
茯神酸

子鳴證治

妊娠因何稱子鳴子在腹中啼哭聲黃豆一盞撒滿地孕

婦拾之自安寧

子鳴者兒在腹中哭聲也乃兒口離包之故用黃豆一盞撒之於地令孕婦拾之拾盡則兒口自入包矣

子嗽證治

妊娠咳嗽子嗽名治法須用馬兜鈴懷孕若將紅來見膠

艾四物有奇功

胎在子嗽者婦人懷孕咳嗽也

馬兜鈴散 專治子嗽

馬兜鈴散用桔梗貝母陳皮甘草等大腹皮同五味子還



有一味是蘇梗

馬兜鈴 平 桔梗 平 貝母 平 陳皮 平 五味子 八粒 蘇梗 平

大腹皮 平 甘草 平

馬兜鈴 止嗽 大腹皮 寬膨 桔梗 清熱 陳皮 順氣 蘇梗 安胎 五味子 止嗽

墜胎治法

膠艾四物湯 專治墜胎

膠艾四物湯 白芍 川芎 當熟地 需三錢 血熱生地良

阿膠 平 艾葉 平 當歸 平 杭芍 平 川芎 平 熟地 平 血熱用生地

當歸 辛苦甘溫 入心脾 生血為君 生地甘寒 入心腎 滋血為臣 芍藥酸寒 入肝脾 斂陰為佐 川芎辛溫 通上下 而行血中之氣 為使也 膠艾者 因衝任虛損 經水淋瀝 故胎欲墜者 用此湯塞之

四物湯加減法 不應在此姑存於此



血證通宜四物湯涼血各症各藥強肝用條芩肺用枳脾
 用生地胃大黃黃柏專瀉膀胱腎山梔木通利小腸三焦
 還是地骨美心胞定然丹皮良大腸又將實芩用心加黃
 連膽同鄉

如清氣心胞絡加麥冬肺只亮肝柴胡青皮脾白芍胃
 乾葛石膏大腸三焦連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥珀
 血虛加龜板血燥加人乳痰血不加桃仁紅花韭汁童便
 行之暴血加蒲黃元參散之血不止加炒蒲黃京墨久
 不止加升麻加引血歸經婦人經血紫黑脈數為熱加
 連血淡脈避為寒加桂附人肥有疾加半夏南星橘紅
 人瘦有火加桃仁紅花元胡肉桂氣虛加參芪氣實加枳
 曲痰滯加桃仁紅花元胡肉桂氣虛加參芪氣實加枳
 朴

胎動治法

妊娠胎不寧當歸與川芎黃芩並蘇梗胎動大有功



當歸 川芎 黃芩 蘇梗 安胎

當歸 川芎 活血 黃芩 清熱 蘇梗 安胎

胎不長症治

妊娠胎不見起長。氣滯血虛無他講鬱悶安胎飲可治瘦

弱八珍湯補養

胎不見長者非血虛即氣滯也。血虛者形體瘦弱以八珍湯補之。氣滯者心腹鬱悶用安胎飲快之。

八珍湯 即四君子湯也

安胎飲 詳子懸門

妊娠傷寒證治

婦人懷孕風寒傷香蘇飲內加芎當。若是傳裏怎生醫。須

用加味黃龍湯。無汗加上葛根好。頭疼加上川芎良。口渴

謔言邪火盛。須用人參白虎湯。實熱謔語燥糞結。四物湯



內加大黃

發熱惡寒頭疼之表證仍用加味香蘇散加當歸川芎
若傳裏若溫熱等證即用加味黃龍湯以主之
邪火盛口渴譫言即用人參白虎湯清之

加味香蘇飲 詳傷寒門

加當歸 川芎

人參白虎湯 詳傷暑門

減人參

加味黃龍湯 治孕婦傷寒傳裏溫熱等證

加味黃龍湯柴胡黃芩當枳殼黑梔草孕婦邪傳良無汗
加葛根頭痛川芎襄

柴胡 辛 黃芩 辛 只壳 辛 梔子 辛 當歸 辛 甘草 平

無汗加葛根 辛 頭痛加川芎 辛

柴胡味苦平少陽厥陰之邪熱宣暢氣血散結調經治
傷寒邪熱黃芩味苦瀉中焦實火理少陽寒熱梔子味



苦瀉心肺之邪熱三焦之鬱火從小便出只壳苦酸破
滯氣寬腸胃當歸味甘辛苦活血潤腸胃
四物湯詳血虛門

加生軍三四錢治孕婦傳裏大便不通燥糞內結譫語

亂言實熱之證

方書云有辜無殞言有病則病受之也但大黃乃妊娠
忌約而熱病尚能損胎况加大黃設或傷胎必然責之
於醫不若辭之何如推辭不治為妙何必苦苦自甘於
疑難也此乃識人情通權達變之見也

子腫證治

妊娠子腫脾虛水面目俱浮身至腿治法即用腹皮飲茯苓

苓大腹救此危

婦人懷孕浮腫乃脾虛水不化也俗呼為琉璃胎

大腹皮 茯苓 水煎服



子煩證治

妊娠五六月中間悶亂不安名子煩。麥門冬湯是正治。不效再用安神丸。

妊以娠養者名曰子煩。或以安神丸。冬湯主之。或安神丸。治妊娠煩悶不安。

麥門冬湯治妊娠煩悶不安

麥冬湯內用防風、茯苓、黃芩、麥門冬。還有竹葉引七片專治子煩不安寧。

麥門冬 卅 防風 卅 茯苓 卅 黃芩 五 竹葉 七片

安神丸 治胎孕煩熱

安神丸黃連、硃砂、生地、全當歸、炙甘草。每服五十九。



炒黃連五 硃砂水飛 生地酒洗 當歸酒洗 炙甘草辛

共為細末。蒸餅糊丸。黍米大。硃砂為衣。每服五十丸。

漏胎證治

妊娠經血不時來。受孕下血名漏胎。氣虛四君須加減血。

虛四物要商裁

妊 娠 經 血 不 時 而 來 名 曰 漏 胎 氣 虛 者 四 君 子 湯 加 黃 芩 阿 膠 血 虛 者 四 物 湯 加 白 朮 黃 芩

四君子湯詳氣虛門 加黃芩辛 阿膠辛

四物湯詳血虛門 加黃芩辛 白朮辛

妊 娠 跛 脚 證 治

婦人懷孕七八月。兩足浮腫名跛脚。面目不浮方纔是平。

胃散治無不瘥。腫上腿膝是水氣。天仙籐散另消摩。



婦人懷孕七八月以來胎氣漸粗兩脚浮腫頭目不出者名曰跛脚平胃散主之兩脚腫上腿膝或足指間出黃水名曰水氣天仙藤散主之

平胃散

詳泄瀉門

天仙藤散

治兩足浮腫至膝步履艱難

天仙藤散草陳皮烏藥良香附天仙藤跛脚治之強

天仙藤

香附

陳皮

烏藥

甘草

男女病證治法同只有胎產要分明胎前減去傷胎藥產

後破瘀是正情

男女病證原無不同治法仍一只有胎前恐傷胎故將傷胎之藥減去產後恐瘀血不行作病故以破瘀為主

保胎無憂散

胎前每月逢七服不能惟安胎並能易產此方分兩一定不可增減



保胎無憂散白芍歸芍芥樸芪羌活虎艾貝草鬼絲子分

兩日期莫錯訛

當歸辛川貝母辛白芍辛酒炒川芎辛荊芥辛枳殼辛

黃芪辛鬼絲子辛姜辛川朴辛艾葉辛羌活辛甘草辛

姜引水煎服

以上皆胎前常有之症故舉數方而別有雜症生於胎前均有之仍照雜症治不過減去傷胎之病藥耳

臨產證治臨產者十月滿足當產也亦有難產者

臨產時正卧自易產交骨不開佛手散假若子腸隨產下

三嘆三縮醋水管產後玉門竟不閉補中益氣功不緩胎

死腹中最難治芒硝五錢平胃散

凡孕婦臨產須要安祖神定慮時常步履緩行以活其胎不可多睡飽食致生鬱滯若見腹腰膈痛一連三陣



兜身已轉使諳練穩婆托按試之如果頭對產門方可
 用力再服催生藥餌若用力太早則臨時怯矣若心
 煩用開水調白蜜三匙飲之再食米粥以接其力加
 交骨不開者即骨縫不開也用大劑芎歸湯以助之加
 龜板髮灰更妙時則子腸先下生後仍不收用醋合水
 盤腸生者未收其腸自收也此因氣虛之故用補中
 玉門不閉者產後產門不合也此因氣虛之故用補中
 益氣湯提之平胃散加芒硝以化之
 胎死腹中用平胃散加芒硝以化之

佛手散 即芎歸湯也

佛手散 川芎當歸有奇功外加髮燒灰龜板在其中

當歸 川芎 龜板 髮灰 一團 胎髮者佳如無即本髮亦可

若血少難產服此又可以代血故今人又呼為代血湯
 難產者或血不活或血滯也當歸活血川芎以通氣血
 况當歸二兩川芎八錢之重乎
 交骨不開者血虛也當歸川芎皆生血之藥故用之古
 人用催生方甚多總不如
 此方之穩而多效也



醋一酒盅。水半盞。合在一處。口噙。嘆面。

補中益氣湯 詳氣虛門

平胃散 詳瀉 加芒硝 辛化之。不過十中之一耳。

小產證治

小產大產原不同。治法虛實要分明。大產瓜熟自落。蒂小

產傷損致下生。虛者弱用八珍補實者脹疼破瘀行。

小產者半產也。大產乃瓜熟自落。小產乃因傷所損。虛則用八珍湯以補之。實則惡露不淨。腹中脹痛者仍用

產後行血之方。

八珍湯 詳虛勞門

行血方 詳產後證治

產後證治

產後諸證要參詳。惟有傷寒非尋常。必先戰慄入血分。而後發熱愈風強。胞衣不下。牛夕散。惡露冲心。破瘀湯。血暈。



鼻聞醋炭氣瘀存口飲益母漿餘血成塊癥瘕起若待蒸
熱命不長產後諸證童便好乳汁不足漆漿良

朱丹溪曰產後宜大補氣血縱有他病從末治之只此
一語致後來諸子百家深辨其非而今人均辨其悟殊
不知產後惡露風寒更堅終成大病古人尚偏况今人
乎所以今時醫之偏者十居其八散
胞衣不下餘血貫滿即脹死也急用牛夕散
血暈者惡露冲心也惡露者餘血作脹也二症均宜攻
之故以俗行產後破瘀湯主之
產行惡露不淨用益母草熬湯紅糖和之常服者良產
後餘血成塊若不急治便是癥瘕久則蒸熱而死
產後傷寒與尋常傷寒不同必先戰慄者風寒入
血分也此產後恒有之症俗醫不識而用麻黃紫蘇等
藥壞者多矣原不宜大發其汗只宜用愈風散神效

牛夕散 專治胞衣不下

牛膝散 肉桂 川芎 朴硝 配蒲黃 與當歸 一服胞衣墜

牛夕 早川芎 辛朴硝 辛蒲黃 辛當歸 辛肉桂 辛



水煎服。一服不下，接再服。

牛夕苦酸能引諸藥下行。誤服墜胎。因其墜而用之。朴硝辛能潤燥。鹹能軟堅。苦能下瀉。通經墜胎。蒲黃甘温。

生用性滑。肉桂辛甘通經。墜胎。仍用芍歸以助其血也。

俗行產後破瘀湯。治血暈。並惡露不行。

俗行產後破瘀湯。芍歸益母共炮。姜桃紅丹皮與蘇木硬。

痛何妨炒。大黃。

當歸 芍 川芍 益母草 芍 炮姜 桃仁 炒 紅花 芍

蘇木 芍 丹皮 芍

腹若硬痛者。加酒炒大黃三四錢。

惡露不淨。瘀血停留。乃產後之常。若不攻之。後續成血塊。不治之證。故用芍歸活血。桃仁紅花。丹皮蘇木。以破血。

黑血名炮。熱則行。血寒則入血分。若硬痛堅實。非上藥所能破。



者故加酒炒大黃以攻之而大黃又不可生用須加酒
炒因酒通能血也
血暈者用隨弱童便熱飲之血自下
又一方木炭燒着用醋澆之使產婦聞之血亦能自下
名打醋炭因醋能散
血也故用之而效

愈風散 專治產後傷寒

愈風散 芥當獨活黑豆襄荆芥黑豆炒產後傷寒良

炒荆芥 當歸 獨活 炒黑豆

乳汁不行證治

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通猪蹄湯熬服葱
白煎湯乳房淋氣脉壅滯乳脹痛湧泉散用白丁香王不
留行天花粉漏蘆殭蠶猪蹄湯

產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜四物湯加
花粉王不留行木通猪蹄熬湯煎藥服用葱白湯時

時淋洗乳房
以通其氣
產後乳汁不行
因痰血停留
氣脉壅滯者
其乳必脹痛
宜湧泉散
余每治乳病
用四物湯加減
甚效

湧泉散

湧泉散丁香王不留行僵天花粉漏蘆煎用猪蹄湯

白丁香 王不留行 花粉 漏蘆 僵蠶
矣

猪蹄湯煎服

四物加減湯 又名下乳漆漿散

四物湯內通草加冬苓漏粉不可少川甲甘草王不留行

乳漆漿散最好

當歸 熟地 赤芍 川芎 通草 麥冬 茯苓

漏蘆 花粉 川山甲 王不留行 甘草



乳汁自湧證治

產後乳汁暴湧出十全大補倍參著食少乳多欲回乳免

懷紅花歸芍膝無兒食乳欲斷炒麥芽湯頻飲宜

產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜十全大補湯倍

用人參黃芪

若食少乳多欲迴其乳者宜兔懷散

若無兒食乳欲斷其乳者宜用麥芽湯

十全大補湯即八珍湯加黃芪肉桂

兔懷散

兔懷散內紅當歸有奇功還有赤芍藥牛夕在其中

紅花平當歸平赤芍平牛夕平水煎服

麥芽湯炒麥芽平熬湯作茶飲之

乳癰證治



乳房忽然紅腫痛。往來寒熱。乳癰成。初起未潰。消毒飲已。潰益氣湯養營。若是潰久膿不斂。參芪桂附大劑。中寒熱。荆防羗獨加。膿成山甲皂角刺通。

乳癰乃陽明厥陰二經風熱壅盛。初起宜服消毒飲。若兼憎寒壯熱者。加荆防風羗活獨活。以解散之。若服後不消。其膿已成者。宜加皂角刺。川山甲。以穿發之。若潰後氣血虛者。宜益氣養榮湯培補之。他如潰或膿清。不斂。又須急服大劑。參芪桂附矣。

消毒飲

乳房初起消毒飲。青皮白芷天花粉當歸柴胡浙貝母。蠶銀花甘草品寒熱荆防羗獨加。膿成皂刺川甲穩。

青皮 白芷 浙貝母 金銀花 當歸 柴胡

殭蚕 花粉 甘草節



左乳生癰鹿角吞當歸查子川鬱金橘核香附川練肉青皮
皮木瓜柴胡根

當歸酒拌山查子研橘核炙研製香附研川練肉醋拌青皮醋炙

木瓜研川鬱金研赤芍研柴胡根醋拌生鹿角尖酒磨沖服

益氣養榮湯 即十全大補湯去川芎加陳皮

吹乳證治

乳被兜吹結核疼堅硬不通吹乳名初起結核不腫疼宜
服括萋散最靈服後若是再不散加上皂刺立效成已成
膿潰未能散外用敷約自消通

吹乳結核不散者當早消之久則成癰宜用括萋散若
服後不散者加皂角刺名立效散膿成者潰未成者消
外用敷約加葱汁
合蜜調敷之自消



栝蒌散

栝蒌散治乳癰結潰後勿用須分別沒藥乳香當歸草甜
酒三杯功效捷。

栝蒌實辛 乳香辛 沒藥辛 當歸辛 甘草平

甜酒三杯熬服。

外敷藥

南星 半夏 殭蠶 白芷 草烏 皂角刺 各等分

為末用蜜合葱汁調敷。

乳巖證治

乳房結核不癢痛年久內潰乳巖成皆因鬱怒損肝脾宜
服通流氣飲來通還有青皮甘草散時時調服戒七情外



熨木香生地餅搗餅熟氣熨之中潰後不愈須培補十全
 八珍歸脾寧

乳巖之症初起結核如圍棋子大深臨有如山巖故名
 十餘年從內潰破嵌空玲瓏洞竅傷損肝脾所致宜速
 用乳岩皆緣抑鬱不舒或性急多怒傷氣器熨之且不時
 以青皮甘草外以木香生地搗餅以熱氣熨之且不時
 鬱怒方始能愈若潰後久不愈惟宜培補其氣血或
 全大補湯八珍湯歸脾湯選
 用之余每用並貝散甚效

流氣飲

流氣飲治怒傷脾當歸白芍人參蒼朮防蘇芷只桔草楨

柳烏朴桂通極

當歸 白芍 人參 黃芪 川芎 防風 蘇葉

白芷 枳壳 桔梗 檳榔 烏藥 厚朴 官桂



木通 芍 甘草 芍

芷貝散

芷貝散治乳巖小瘡瘡不紅掀若破時命難全宜早治莫
遲延共為麩各二錢甜酒送月餘痊

川貝母 牙 白芷 辛 共為麩每服 辛 甜酒送下

妬乳證治

婦人乳上小瘡生疼痛難忍妬乳名成內服連翹散正治
外敷鹿角散收功

乳頭生瘡謂之妬乳宜鹿角散敷之內服連翹散

連翹散

連翹散內升麻防元參白薇芍太黃射干芒硝杏甘草引



用生姜同煎湯

防風 升麻 元參 白芍 白薇 射干 芒硝

大黃 杏仁 甘草 引用生姜煎服

鹿角散

鹿角 甘草 二味為末。鷄子黃調銅器炙敷之

乳懸證治

產後瘀血冲乳房。兩乳細小下垂長。惡露不淨。乳懸證。芎歸治散。薰鼻良。不應草麻貼頂上。乳收即去。莫停常。

若產後瘀血上冲。兩乳細小下垂。過腹謂之乳懸。宜濃煎芎歸湯。不時飲之。以其餘藥薰鼻。則瘀散。乳即升上。

如不頂上者。更以草麻仁搗貼頂上。收即去之。

芎歸散 即佛手散 減髮灰 龜板 甚效



前陰諸證門

陰腫證治

婦人痲痲兩拘痛玉門腫脹墜而疼濕熱龍膽瀉肝治導

赤車前澤瀉芩當歸梔子龍膽草氣虛下陷補中升艾防

大戟熬湯洗只實陳皮炒熱騰

婦人子戶腫脹及兩拘疼痛者謂之痲痲乃肝心二經火盛濕熱下流所致宜服龍胆瀉肝湯即導赤散加減也若因中氣虛下陷重墜者用補中益氣湯以二升舉之外用蘄艾防風大戟熬湯薰洗更以只實陳皮二味為末炒熱騰之其腫自消而疼自定也

龍膽瀉肝湯詳濁證門

補中益氣湯詳氣虛門

陰痛證治

陰中痛名小戶嫁痛極手足不能舒內服加味道遙散四



物乳香搗餅敷

婦人陰中作痛名小戶嫁痛極宜內服
由鬱熱傷損肝脾濕熱下注所致
皮梔子外以四物湯料合乳香

逍遙散

詳血瘀門

敷法四物湯

詳血

加乳香

陰養證治

濕熱生蟲陰戶養內服逍遙龍膽方桃仁膏合雄黃末鷄

肝切片納中央

婦人陰養多因濕熱生蟲甚則肢體倦怠小便淋瀝宜

服逍遙散龍胆瀉肝湯外以桃仁研膏合雄黃末鷄肝
切片蘸藥納戶中其蟲一聞肝腥皆鑽肝內吮食將肝
提出其病即愈

逍遙散

詳血瘀門

龍膽瀉肝湯

詳濁證門

桃仁雄黃膏



桃仁 辛 雄黃 季
其二味研勻用雞肝切片蘸藥約納戶中

銀杏散

杏仁 去皮 水銀 鉛製 輕粉 雄黃 各半
共為細末用五分紅棗肉

棉裹留一線條撚線在外恐小便取出再入一日一

陰瘡證治

惡蝕成瘡濃水淋時疼時癢若蟲行少腹脹悶溺赤濁食

少體倦晡熱蒸四物柴梔丹膽草潰腐逍遙墜補中

婦人陰瘡名曰惡由七情鬱火傷損肝脾氣血凝滯濕

熱下注久而蟲生蝕成瘡濃水淋漓時疼時癢有

不調赤白帶下種種潰爛見宜分治之腫痛者用四物加

逍遙散 詳血瘕 四物湯 詳血虛 補中益氣湯 詳氣虛



陰挺證治

陰挺下脫即癩疝突物如蛇或如菌濕熱腫脹溺赤數氣
虛重陰便長清氣虛補中青梔入濕熱膽龍瀉肝尋外熬

蛇床烏梅洗猪油藜蘆敷自升

婦人陰挺或因胞絡損傷或因分婉用力太過或因氣
虛下陷濕熱下注陰中挺出一物如蛇或如菌如雞冠
者即古之癩疝類也屬熱者必腫痛小便數宜龍胆瀉
肝湯屬虛者必重墜小便清長宜補中益氣湯加青皮
梔子外用蛇床子烏梅熬水薰洗之更以猪油調藜蘆
敷之無不愈者

龍胆瀉肝湯詳濁症門 補中益氣湯詳氣虛門 加青皮梔子

洗方 敷方

蛇床子辛 烏梅九 二味熬湯乘熱薰洗

藜蘆為菜 猪油調敷自收



陰痔證治

陰中突肉名陰痔或名茄子疾俗稱黃水易治白難治烏

頭存性醋熬薰內服逍遙與龍膽補中歸脾酌量行

婦人陰中有肉突出者名曰陰痔俗稱茄子疾也流黃

水者易治流白水者難治用烏頭燒存性釀醋熬內

逍遙散 龍胆瀉肝湯 歸脾湯 詳門補中益氣湯

陰冷證治

陰冷風寒客子臟桂附地黃丸最良遠志乾薑蛇床子莫

黃末裹納中央

婦人陰冷皆由風寒乘虛客於子臟久之血凝氣滯多

變他證且難於受孕宜多服桂附地黃丸外以遠志乾

姜蛇床子吳茱萸研細

棉裹納陰中日二易



桂附地黄丸 即六味地黄丸加肉桂附子

温中坐藥方

遠志

乾姜

吳萸

蛇床子

共

為細末，棉裹，一日換二次，納之。

陰吹證治

胃氣下陷，陰吹喧。全匱方用膏髮煎、猪膏亂髮同煎服導。

從溺去法，通元氣，虛下陷，大補治，升提下陷，升柴漆。

婦人陰吹者，陰中時時氣出，有聲如穀道轉失氣狀。全匱謂由穀氣實，胃氣下泄，用膏髮煎，即猪膏煎亂髮服也。導病從小便而出，其法甚奧，若氣血大虛，中氣下陷者，宜十全大補湯加升麻柴胡以升提之。

膏髮煎

婦人亂髮 用猪膏熬化服之。小便利則愈。

十全大補湯 加升麻柴胡。



交接出血證治

交接出血傷心脾伏龍肝末入歸脾千金桂心釜底墨酒
服方寸七相宜

婦人每交接轍出血者由傷損心脾二經也宜用歸脾
湯加伏龍肝煎服或用千金方中桂心釜底墨二味為
末酒冲服方寸七自愈

桂心釜底散

桂心 釜底墨 二味為末酒調服方寸七

歸脾湯

詳吐血門

加伏龍肝

婦科雜證門

熱入血室證治

熱入血室經適斷邪熱乘虛血室潛寒熱有時如瘧狀小



柴胡加歸地丹

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適來斷此
為熱入血室其血必結故使瘧狀入於血室之間而潛
主之此言邪熱未盡值經來乘虛入於血室之肝主之
藏之故令血結而寒熱有時如瘧狀也血室之肝主之
與胆為表裏因肝受邪而病寒熱故用柴胡湯主
之也加當歸生地丹皮者所以清血分之熱也

小柴胡湯詳傷寒門加當歸生地丹皮引用生姜大棗

熱入血室經適來晝日明了夜譫妄無犯胃氣上二焦熱

隨血去自無恙

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼
狀此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈也
此言熱雖入於血室然經行不斷則熱不留結勿謂譫
妄遂以硝黃犯其胃氣刺傷榮血小柴和解犯上二焦
但候其熱隨血出病必自愈傷寒論曰血自下下者愈
此之謂也

熱入血室成結胸下血譫語頭汗出二者皆當刺期門隨



其實取泄而去清熱行血桃紅丹靈脂地草川甲赤

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脉遲身

涼胸脇滿如結胸狀謔語者此為熱入血室也當刺期

門隨其實而取之又云陽明病下血謔語者此為熱入

血室但頭汗出當刺期門血結在裏為實證一汗出者

愈此二條一言適來即斷血頭汗出為不實證故為熱入

證亦有熱入血室但下血頭汗出為不實證以清熱行血

室亦由肝實故均當刺期門而清熱行血以隨其實

湯治之合四證觀之大抵有寒熱如瘧行之證方可用小

柴胡否則不藥自愈或不刺期門而清熱行血以隨其實

而泄之此仲景心法也不得概以小柴胡治之也

清熱行血湯最佳桃仁丹皮於紅花生地同上五靈脂赤

芍甘草川山甲

桃仁 芍 紅花 芍 丹皮 芍 五靈脂 芍 川山甲 芍 生地 芍

赤芍 芍 甘草 芍 水煎服



血分水分總括

經水先閉後病腫任衝寒溫血壅經先發水腫後經閉水

溢皮膚泛濫行血分難醫水易治二者詳叅要辨明

婦人經水先閉後病腫者乃寒濕傷於衝任血壅經閉也名血分若先病腫而後經閉者乃土不制水水邪泛

難治也。溢於皮膚也。名曰水分。血分難治。水分易治。二者須細詳辨。

血分證治

血水血壅不能行四肢浮腫病非輕但使經通腫自散紅

丹膝入小調經

血分腫乃血壅不行流於四肢故令浮腫此不必治腫但調其經經通自腫其消宜小調經散加紅花丹皮牛

之膝治

加味小調經散



加味調經散 紅花 丹皮 牛膝 當歸 佳 赤芍 桂心 琥珀 草 細

辛麝香酒 姜 誇

紅花 丹皮 牛膝 當歸 赤芍 桂心 沒藥

琥珀 甘草 細辛 麝香 溫酒 姜汁 調服

水分證治

先腫後閉 名水分 停飲 膀胱氣不行 水消腫退 經自至 茯苓

苓導水 效如神

水分腫乃水飲內停 膀胱之氣化不行 水溢皮膚 故令浮腫 經閉也 此但治其水 水消腫退 其經自通 用茯苓導水湯治之

茯苓導水湯

茯苓導水湯 白朮 茯苓 檳榔 豬大腹 縮砂 木香 桑白皮 澤



瀉木瓜陳皮蘇脹加只壳喘葶藶腿腫加上防已服

茯苓 栝榔 猪苓 縮砂 木香 桑皮 陳皮

澤瀉 白朮 木瓜 蘇梗 大腹皮 各等分

脹加只壳喘加苦葶藶子腿腫加防已

夢與鬼交證治

獨笑獨悲畏見人神虛夜夢鬼邪侵歸脾湯調辰砂珀定

志清心魂魄寧

婦人七情內傷虧損心脾神無所護鬼邪於正魂魄不寧故夜夢鬼交獨笑獨悲如有對忤是其候也宜用歸

脾湯調辰砂琥珀末服則邪遠志定心清魄安而無邪夢矣

歸脾湯 詳吐血門 調辰砂琥珀

梅核氣證治



婦人咽中如炙臍。或如梅核結喉間。半夏厚朴湯最效。

樸蘇茯苓引煎。

婦人咽中。有如火臍。炙臍。乾肉也。喉中貼貼。如有炙肉。吐之不出。吞之不下。此證。不因腸胃。故不礙飲。食二便。不因表邪。故無骨疼。寒熱。乃氣為積。寒所傷。不與血和。血中之氣。溢而浮於咽中。得水濕之氣。凝結難移。亦間有之。藥用。

半夏厚朴湯。

半夏厚朴湯。梅核氣。正當苓夏與厚朴。蘇葉。共生姜。

半夏厚朴。蘇葉。茯苓。生姜煎服。

血風瘡證治。

偏身痞癩。如丹毒。癢痛無時。搔作瘡。血風風濕。兼血燥。加味逍遙連地方。愈後白屑。肌膚強。血虛不潤。養榮湯。



婦人血風瘡證。遍身起瘡。如丹毒。或養或痛。搔之則成瘡。由風濕血燥所致。宜加味逍遙散。加黃連。生地。如瘡結痂而愈。復起白屑。肌膚強硬者。乃血少不潤也。宜服益氣養榮湯。

加味逍遙散

養氣益榮湯

陳皮

即十全大補湯去

川芎加

膝瘡證治

憂思鬱怒。肝脾損。濕熱生。瘡長兩膝。外屬三陽。為易治。內屬三陰。治每難。初起紅腫。敗毒散。膿水淋漓。補中煎。晡熱

陰虛宜六味。食少畏寒。桂附丸。

婦人憂思鬱怒。傷損肝脾。或飲食不調。損其胃氣。則濕熱下注。更被寒濕。外邪客則。被必兩膝生瘡。外屬

三陽。經易治。若生於內。膝屬三陰。經每多難愈。初起紅腫。宜參敗毒散。潰後。膿水淋漓。宜補中益氣湯。若更

晡熱。是為陰虧。宜兼服六味地黃丸。若食少體倦。畏寒則為真陽不足。宜服桂附地黃丸。

人參敗毒散

人參敗毒散



人參敗毒羌活茯苓獨活柴胡與川芎前胡只壳桔梗草減
去人參敗毒名

人參 羌活 茯苓 獨活 柴胡 川芎 前胡

只壳 桔梗 甘草

補中益氣湯

六味地黃丸

加肉桂附子名桂附地黃丸也

足跟證治


督脈發源腎經過三陰虛熱足跟痛六味地黃滋真水腫

潰流膿用八珍

足跟為督脈發源之地足少陰腎經從此所過若三陰虛熱則足跟疼痛宜用大劑六味地黃丸料煎服以峻補其真水若久痛不愈腫潰流血膿者宜服八珍湯以補其氣血

六味地黃丸

八珍湯



回乳

乳婦無子其乳必脹用大麥芽二兩煎湯續服必回



以上婦科門終



醫方便蒙卷六目錄

諸方補遺

傷寒

大頭瘟

時疫

瘟疫

中濕

氣鬱

積聚

咳嗽

痢疾

泄瀉

衄血

淋症

牙痛

噎膈

眼目

經閉

產後



醫方便蒙卷之六

補遺

傷寒門

救苦丹

專治傷寒感冒頭疼口渴身熱目脹筋骨酸疼一切風寒皆治

蘇葉 男 羌活 男 生地 男 川芎 男 黃芩 男 防風 男 白芷 男

細辛 男 陳皮 男 葛根 男 香附 男 甘草 男 南蒼朮 男

共為細末。生姜汁打麩糊為丸。如梧桐子大。每服三錢。

葱湯下。或做彈子大亦可。

行氣蘇葉散

治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹滿脹冷痛外感頭疼濕氣頭疼身熱憎寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒飲食不下心腹疼並皆治之

紫蘇 男 陳皮 男 香附 男 宣木瓜 男 烏藥 男 川芎 男 羌活 男

桔梗 男 麻黃 男 只壳 男 甘草 男 水 煎 一 氣虛去麻黃



百病消散方

治脾胃不和飲食不消此方若服數劑飲食倍進氣力充足百病不生飲食不消者胸口脹悶四肢無力者

焦木 平 陳皮 平 穀芽 平 神曲 平 茅朮 平 苡仁 平 半夏 平

芡實 平 山藥 平 厚朴 平

大頭瘟方 頭臉皆腫

福建靛花燒酒一盅鷄蛋清一個攪勻吃下

時疫熱病方 昂治狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進三次有汗

無汗即愈常用

食公散

治卒鬼疰鬼心腹疼如錐刺下血便血不知人事及卧履齧脚腫不覺者諸惡毒氣皆治

白礬 皂莢 雄黃 藜蘆 各等分

為末每用如豆大納入鼻孔以嚏為度



痘疫不傳染方

赤小豆不拘多少。用新布袋入井內。水中漫二日。舉家各服二十一粒即除。

中濕門

自製藥酒方

治風濕老肌膚麻木手足拘攣筋骨疼痛

川烏半 當歸五 大生地五 稀仙草五 紅花五 木瓜五

陳皮五 海桐皮五 五加皮五 煮酒五斤

每早晚各飲二三盞。日久自有功效。

氣鬱氣滯門

沉香化滯丸

治婦人脾胃不清停滯不化睡卧不安一切氣痞每服二錢食遠服孕婦忌

沉香斤 木香五 川軍五 只壳斤 萊菔斤 莪朮五 三稜五



檳榔^{十斤} 山查^{一斤} 青皮^{一斤} 黑丑^{十斤} 靈脂^{十斤} 香^{一斤} 附官桂^{一斤}

共為極細末。水法小丸。

木香順氣丸

治一切氣逆積聚痛疼膨脹宿酒等病每服二錢開水送下婦忌

木香^并 陳皮^并 青皮^并 只壳^并 蒼朮^并 香附^并 砂仁^并

厚朴^并 檳榔^并 黑丑^并 半夏^并 烏藥^并 桔梗^并 神曲^并

山查^并 麥芽^并 共為細末。水法小丸。

積聚門

鰲甲丸

治大人小兒左脇癰塊即肥氣身熱如炒者乃血汁結成越熱越長

鰲甲^{半斤} 胡黃連^并 青皮^并 三稜^并 連翹^并 穿山甲^{八分}

醋熬膏為丸。桐子大。每服三錢。小兒服二錢。溫水送。

咳嗽門



二母寧嗽丸 此藥清咳寧嗽化痰定喘寬中順氣降火滋陰每服一九開水送

川貝母 知母 梔子 黃芩 桑皮 槐花 葶仁

五味子 陳皮 只實 甘草

共為細末每丸重三錢

寧嗽太平丸

橘紅 黃芩 川貝母 前胡 花粉 熟軍 桑皮

天冬 杏仁 五味子 麥冬 桔梗 元參 薄荷

知母 阿膠

痢疾門

地榆槐角丸 治大腸經火因平素不避風毒恣飲醇酒火燒之物縱慾飽淫喜怒不常臟腑壅滯陰陽不利痔漏脫肛一切痛癢並皆治之每服六七丸空心米湯送下

槐角 地榆 只壳 生地 黃芩 柏葉 防風



通尾牙黃栢牙川連牙黑荆芥牙

九製大黃丸

此藥潤臟腑滋血脈去風痰消流大善理腸胃積痰滯鬱結不散聚塊疼痛燥熱不退三焦火盛嘔吐噎膈宿酒宿食不能消化每一二錢早晚用開水送下

小兒少用孕婦忌服

川軍

一斤九蒸九晒

當歸

紅花

生地

赤芍

白芍

川芎

將當歸紅花收汁炙川

郁李仁

火麻

栢子仁

軍再入諸藥為末蜜丸

泄瀉門

止瀉膏 治久瀉

五倍子

醋熬成膏攤布上貼於臍上

血門

蒲黃炒為末

齒衄與鼻衄同

齒衄與鼻衄同

齒衄與鼻衄同



淋症門

金砂五淋丸

治五淋之症小便不清淋漓白濁小腹疼痛陰子疼痛莖中疼痛澀滯腫滿每服一錢五分用灯心煎湯調服

海金砂

石葦

瞿麥

扁竹

滑石

川軍

梔子

車前子

川連

甘草

木通

黃芩

澤瀉

猪苓

赤茯苓

華蘼

共為細末

水法為小丸

金砂為衣

又一方

上海金砂

川牛夕

雄黃

木香

大黃

當歸

各等分為細末初更酒送

牙痛門

綠袍散

治三焦火盛口熱生瘡赤爛腫疼唇口皮燥裂穢氣逼人每用少許上患處吐熨不拘消腫止痛解熱清毒神效

兜茶

薄荷葉

川連

黃柏

青黛

硼砂

冰片



共為極細末

牙疳散

胆礬 分 文蛤 分 煨榔 分 人中白 分 冰片 分

共為極細末

經驗良方 治積聚牙爛

積聚牙爛 柴 弓 桔 連翹 歸尾 大青葉 銀花 只壳 香白芷 土

茯苓 甘草 引竹葉

連翹 分 歸尾 分 大青葉 分 柴胡 分 赤 弓 分 桔梗 分

銀花 分 只壳 分 土茯苓 分 白芷 分 甘草 分 竹葉 引

敷藥方 治積聚口爛

上梅片 分 輕粉 分 琥珀 分 生黃丹 分 黃連 分 雄黃 分

加味冰硼散 治牙痛不拘時發用藥末少許上患處再服清胃火等丸自愈



礪砂 卅 元明粉 卅 硃砂 少許 冰片 卅 石膏 卅 共為細末

噎膈門

治噎食方

砒硝 卅 川軍 卅 枳實 卅 厚朴 卅 狗寶 卅 牛黃 卅

水酒煎服

自製開關散

通治噎膈反胃等症

真琥珀 卅 大硃砂 卅 雄黃 卅 淨礪砂 卅 生海石 卅 礞石 卅

元明粉 卅

共為細末。每早晚各服一錢五。姜湯和服。

眼目門

撥雲散

端治遠年近日一切眼症不論風眼火眼暴發紅腫或疼或癢或隱澁難開怕日羞明雲翳遮睛眼淚昏花眼邊赤爛等證每用濕銀簪蘸約少許點大眼角內閉目淨坐片時點



南京中醫藥大學圖書館版權所有

三四次神效忌酒

葱蒜椒姜等物

煨甘石 丹 月石 三才 漂消 三才 薺粉 丹 射炙 三才 冰片 九

共為極細末

明目蒺藜丸

蒺藜 丹 川芎 丹 羌活 丹 防風 丹 甘草 丹 黃芩 丹 菊花 丹

荆芥 丹 赤芍 丹 連翹 丹 木賊 丹 蟬退 丹 生地 丹 蔓荊 丹

通尾 丹 黃連 丹 共為末水法小丸

經行經閉門

八珍益母丸 治婦女胎前產後諸虛百損月水不調子宮虛冷不受孕首產後勞弱一切百病每服一丸滾水送下

益母草 丹 當歸 丹 川芎 丹 杭芍 丹 熟地 丹 黨參 丹 白朮 丹

白茯苓 丹 炙草 丹 共為細末蜜丸每丸重三錢



四製香附丸

高岩婦人經脈不調崩漏帶下服之能安胎種子滋血脈補虛損扶元氣及胎前產後每服一二錢酒開水送下

四製香附

十斤分四份用醋便酒盪製之即泡之也

當歸 川芎 杭芍 白朮

生地 芎 祈艾 陳皮 澤蘭 條苓 甘草

共為細末水酒法為丸

艾葉暖宮丸

常治婦女百病氣血不和經候失期行經作疼赤白帶下子宮虛冷久不成胎小產傷血崩漏失血氣勝每服一錢早晚服白水送下

芎 艾 香附 當歸 川芎 杭芍 砂仁 川續斷

杜仲 木香 肉桂 白薇 元胡 乾姜 小茴香

產後門

生化湯

治產後惡露盡去新血速生誠產後之要約也

當通身 川芎 桃仁 炮姜



治水腫經驗方

白腹皮 茯苓皮

蓮蓬壳

薏苡仁

冬瓜皮

以上補遺門終

醫方便蒙全卷終

