

永樂大典

卷一千三十三

# 永樂大典卷之一千三十三 二支

## 兒 小兒證治六十六

小兒血

巢元方病源鼻衄候。小兒經脈血氣有熱。喜令鼻衄。犬血之隨氣循行。經脈通遊。腑臟若冷熱調和。行依其常度。無有壅滯。亦不流溢也。血性得寒。即凝澀結聚。得熱即流散妄行。小兒熱盛者。熱來於血。血隨氣發。溢於鼻者。謂之鼻衄。凡人血虛受熱。即血失其常度。發溢漫行。乃至發於七竅。謂之大衄也。孫思邈千金翼方。脈浮發熱。口乾鼻燥。能食者。即衄。聖濟總錄論曰。小兒體本挾熱。舍於經絡。血脈播溢。則為鼻衄。蓋血與氣循行經脈。通於府藏。邪熱乘血。血得熱則妄行。隨氣上溢。出於鼻者。為鼻衄。血虛受熱。散漫失度。出於七竅者。為大衄。鄭端友全嬰方。夫鼻衄者。是五臟熱結所為也。血隨氣行。通流臟腑。冷熱調和。不失常度。無有壅滯。亦不流溢。血得寒而凝結。得熱而流散。熱來於血。血隨氣發。溢出於鼻竅也。又有因傷

永樂大典卷一千三十三

一

寒溫疫。諸傷寒病。不得其汗。熱毒停聚五臟。故從鼻而出也。衄血立効。沈氏子十歲。鼻衄不止。召二三醫。或以茅花煎湯。或以犀角地黃湯。并龍骨末吹鼻。數法皆不効。其血注下。召愚視曰。急以濃鹽水下。龍膽丸一服。減半。再進。全除。主人曰。鹽水有何効。愚曰。夫血得熱而流溢。鹽水鹹冷。能凝其血。譬之屠猪。就血。得鹽水而凝結。黃連龍膽味苦寒。能堅其血。所以知其鹹苦入口。即立効也。楊真子嬰童寶鑑。小兒心熱。肺氣實。血隨熱入。肺經為鼻。衄急。瀉論。小兒鼻衄候歌。欲衄之候。脈弦洪。鼻中乾燥。譬如風。氣衝積。血停留。肺臟煩。冤邪。脈攻。數合。出紅。猶可治。更加升斗。命須終。明師若欲知調治。涼血清胃始有功。清胃清肺也。

方

葛洪肘後備急方。療人少小。衄鼻。衄小。勞轉出。

石用桑耳。無多少。熱令焦。搗下篩。每衄發。取以杏仁大塞鼻。數度。即

可斷。外臺法。燒用為丸。以內亦得。

仙人水。繼方。小兒百日內。鼻中出血方。

葵花一字。急吹之。白礬水浴。更相宜。此是鼻風。不消藥。其效虛誤。

好頭兒。

外臺古今錄驗方療小兒鼻幼不止  
以馬屎煨裏塞鼻孔中

又方

燒髮灰末吹鼻孔中亦佳本草聖惠嬰孺法同甚妙

又方

單服白馬屎汁三合甚良

太平聖惠方升麻散治小兒鼻幼或流血

川升麻十兩 羚羊角屑 甘草五兩 黃芩

赤芍藥七兩 上各一分

右件藥搗鹿羅為散每服一錢以水一小盞入淡竹葉七片煎至五

分去滓入地黃汁半合更煎一兩沸不計時候量兒大小分減溫服

生地黃煎治小兒鼻幼不止

生地黃十斤取汁

五天更行越妙黃芩別研

蜜一合

剉荊半斤取汁杏仁一兩湯浸去

皮天更行越妙黃芩別研

右件藥都入銀鍋中以慢火熬為膏不計時候用新汲水調下一錢

又方  
量兒大小加減服之

剉荊半兩 亂髮灰一分 蒲黃半兩

右件藥搗細羅為散每服以冷水調下半錢不計時候量兒大小加

減服之

桂心散治小兒鼻幼心悶

桂心一分 亂髮灰一分 乾薑一分 地黃一分

右件藥搗羅為散不計時候以冷水調下半錢更隨兒大小以意加

減

梔子仁散治小兒卒然毒氣攻腦鼻幼

梔子仁一兩 槐花半兩 微炒

右件藥搗細羅為散不計時候用溫水調下半錢量兒大小以意加減

又方治小兒鼻幼不止

亂髮灰半兩 伏龍肝一兩

右件藥都研令勻不計時候以新汲水調下半錢量兒大小以意加

減

又方

刺藜汁一合 地黃汁一合 生薑汁少許

又方

石調和令勻徐徐服半合仍將滓塞鼻中即差

炒桑耳余焦熱痔細羅為散不計時候以冷水調下半錢亦吹少許於鼻中量兒大小以意加減

譚氏殊聖方小兒鼻幼數暈噴顏色青黃漸改移忽爾發時繞奔躁速忙走起索東西只緣積熱三焦壅滯水川消貝母知更有荷衣煎五合蜜調頓服定無疑

凝波散 聖濟總錄石上屑散

寒水石

貝母

知母為末各一分

馬牙硝細研川消亦得各一分荷葉一兩以水一片煮上七沸曬

乾焙亦得

右為末每服半錢蜜水調下

蜂雪丹治小兒陽毒煩躁吐血衄血漸生赤壯

丹砂研半兩 煅消研一兩

永樂大典卷一千三十三

三

右二味各研令細再同研鍊蜜和丸如梧桐子大每服一九沙糖水調化服取下涎即安

張漢賢方妙選抵聖散治不以疾病鼻幼不止

盆硝研

亂髮灰燒灰研紅藍花 各一分

右用研勻細以綿纏扭塞鼻中湯調下

槐花散治衄血

槐花一兩炒 蒲黃半兩 川麩薑一分

右件搗羅為細末每服半錢新水調下

張鏡難方治衄血

右每用石榴花末一字許搗鼻內

又方

每用龍骨末少許吹鼻中

患眼觀墜方調榮散治衄血不止

血餘父 女 各上者一兩用麻竹片一枚一片裹燒過

右為末每服半錢或一錢新汲井華水下以上二方或切切折書

鄭端友全嬰方龍睛丸治小兒衄血不止

黃連

龍腦草

右等分為末。糊丸如小豆大。三歲三十九。或作散子以濃鹽水送下。三黃丸亦效。一方研好墨滴鼻中。一方燒亂髮吹鼻內。茅花湯亦得。

青首散治小兒鼻衄吐血。亦治淋瀝小便不通。右以船底青首日乾為末。三歲一錢。藕節汁入蜜少許調下。淋瀝木通湯調下。

榮皮散治小兒衄血至一二升。問絕。

榮皮一兩

梔子一兩

甘草炙半兩

右以咀。三歲一錢。水半盞煎三分。去滓服。一方剪金花莖葉陰乾。水煎服。又一方。白芨末水調塗鼻上。并額門立止。又一方。單麻葉塗油。

炙熱雙兒額上血止。

膠黃散治小兒大衄口鼻耳出血不止。十五六歲兒陽盛多此病。

阿膠一兩

蒲黃半兩

右為末。三歲半錢。生地黄汁微煎調下。以帛急繫兩乳頭。隨血左右。兩竅俱出。拉繫兩乳。

又方 爛寒水石散 牡蠣散

右等分為末。三歲半錢。冷水調下。連連二服。一方人中白燒灰為末。吹鼻立止。一方青竹茹燒灰。入麝香吹鼻。拉效。一方蒜去皮研細。攤餅子如錢大。厚一立許。左鼻出血貼左足心。繫定。右亦如之。兩鼻出血。兩脚如之。血止急洗去。

又方治衄 釜底墨吹鼻即止

吉氏家傳黃藥散治小兒鼻衄不止

右黃藥一味為細末。每服半錢。或一錢。井水調下。或切細研末。

李程小兒保生要方治鼻衄 滑石為細末

右用飯為丸。如雞筋子大。每服三五粒。微嚼破。新水嚥下。未能嚼者。搥碎與之。

又方

生蘿蔔 細研取汁

右入酒相當量。兒大小。溫溫與之。立止。

湯氏望嬰孩妙訣。此候乃血熱不循經。而壅從鼻出也。血隨其氣。而肺主氣。外屬鼻。故自鼻出而衄。春冬幼者。只用生地黄細研取汁。加生蒲黃少許。砂糖井水浸服之。愈。秋夏鼻衄。但用車前草一握。洗淨。研取自然汁。同

生薑一處研取汁。入生薑一起先用洋塞兩鼻。次用新汲井水和塞。并車前草薑汁飲之即愈。凡有此候。皆由榮熱。宜服涼血地黃湯。

地黃湯

治榮中有熱。及肺壅鼻衄。生瘡一切丹毒方。

赤芍藥 當歸 土 犀角 洗淨

川芎 七 分

又方

右件以咀。水煎去滓。大小以意加減。鼻衄臨熟入生蒲黃少許。生瘡通體加黃芩一處等分同煎。丹毒加防風去蘆等分同煎。用之果驗。和薑蜜蘿蔔汁飲之良。

又方

右用車前草葉一握。生薑一塊切研。取自然汁入蜜。新井水調和飲。一盞許。仍用洋塞鼻中即止。

表當時大方治鼻衄。其提舉傳。鹿茅紙裹乾馬糞塞鼻中即止。

演山省翁活切口。治小兒心脾熱。及心血妄行。鼻衄出血不止。良方。右時故紙。藤被一片。作燃子包爵。燒熏入鼻。或吹入鼻中。又令患人

永樂大典卷一千三十三

五

吸呷尤佳。故藤紙被至舊亦得。或燒內小瓶中留性。每服二錢。入麝酒調服極妙。

小兒吐血

論

巢元方病源吐血條。小兒吐血者。是有熱氣盛而血虛。熱乘於血。血性得熱則流散妄行。氣逆即血隨氣上。故令吐血也。聖濟總錄論曰。小兒陽氣盛壯。上焦有熱。伏於肝心二臟。攝流脉中。血得熱則妄行。下入胃中。胃受之則脈滿。與氣俱上。衝擊故令吐血。錢乙小兒方論補下不同云。段喬郎子四歲。病嗽身熱。吐血數日。而咯血。醫以桂枝湯。及防己丸治之。不愈。其涎上攻。吐喘不止。請錢氏。下補銀丸。一大服。方見疾。此以十復以補肺散。補脾散治之。方見日。且不和。門中。今段氏。咯血肺虛。何以下之。曰。肺雖咯血。有熱故也。火即虛癆。命涎上潮而吐。當下其涎。若使不吐涎。為甚使也。蓋吐涎能虛。又生驚也。痰實上攻。亦使發搐。故依法。只宜下痰。後補脾。心涎止而吐愈。若先補其脾。為逆。先下其痰。為順。先下後補。為良也。鄭端友全嬰方。病差後。唾血咯血。下血者。此熱毒積。犀角地黃湯主之。福病亦宜服。夫吐血者。由榮衛氣逆也。榮者血也。衛者氣也。榮衛相濟。不失常

道一有所勝則致去行。血者水也。決之東則東流。決之西則西流。氣之使血其勢如此。巢氏云吐血者是有熱氣盛而血虛。熱乘於血。血性得熱則流散去行。氣逆則血隨氣上。故令吐血也。又或飲食大飽之後脾胃內冷不能消化。葱吐所食之物。氣血相衝。因傷脾胃。亦令吐血。若久嗽氣逆。而日浮腫而嗽吐血者。是肺虛損也。嗽部有方。曾世榮活幼心書小兒九道出血。何為而然。蓋人之所有者血與氣也。心者血之主。肺者氣之主。氣主响之。血主濡之。榮養百骸。灌溉孫脉。升降上下。榮衛諧和。自然順適。一或不調。疾由生矣。或外為六淫所侵。內因七情所汨。氣乃留而不行。血乃壅而不濡。內外抑鬱。不能流注。以榮於身。必有妄動之患。叔和以孔脉為失血之義。在七未屬傷故也。陽明主乎多氣多血。未有不因而得。蓋氣血俱熱。熱鬱內通。失其常度。是以妄行。有在襁褓患此證者。固非七情所傷。皆因乳母執着不自寬釋。及啖辛辣之味。流於乳絡。兒飲之後。停滯不散。鬱蒸於內。亦能動血。或居重帷暖閣。火氣熏逼。不令常見。以日積溫成。熱極則湧泄。或吐或幼。或大小腑亦多血來者。有氣虛而邪熱乘之。則血不得循流。故道滲於諸經。亦生走失之證。其面皖白。脉沉微。血淡紫。口氣穢臭也。又况嬰孩純弱。易虛易實。因熱內攻。血隨氣行。或壅而上。

逆。或下而志逆。遂有吐血。幼與瀉血。瀉血之證。然而血不自動。因氣使之風不自生。因熱而起。由是而論。可以類推。治法先明虛實。審得病源。隨經施治。藥餌無差。不失其機要。實則小柴胡湯。加生地黃。綠茅根。或苦參亦好。妙用水煎服。或吹咀五苓散。合五和湯。亦加綠茅根。苦參。煎及投消毒飲。次用局方蘇九。三黃丸。開服。虛則理中湯。及人參芎歸湯。皆可服。間有腎者。見其血盛。以為熱極。過投涼劑。遂使血寒不能歸源。而妄流。其色皆黯而凝滯。或成小塊。當服薑附之劑。以溫之。自然流暢。安致妄行為。住抽真子。嬰童寶鑑。小兒吐血歌。血為榮兮氣為衛。二氣相隨無住滯。忽然出被氣來侵。所以志形不依位。血隨氣上奔心來。吐下如屠。爭忍視。便須服藥好看承。解熱須令依次第。鄭端友全嬰方。吐血氣逆。持曰。血虛氣盛。不同。熱毒流心。引肺風。葱兩氣虛。榮衛逆。吐出鮮明。照點紅。曾世榮活幼心書。失血持曰。九道何為血妄行。蓋因抑鬱。熱邪生。隨經施治。明虛實。氣順如常。血自勻。

方

孫思邈千金要方。治小兒吐血。燒蛇蛻皮末。以乳服之。并治重舌。又方。取油三分。酒一分。和之。分再服。

簡要濟衆方治小兒吐血不止

右蒲黃細研每服半錢用生地黄汁調下量大小加減進之

治小兒吐血不止

右用黃連一兩去須搗為散每服一錢水七分入鼓二十粒同煎至五分去滓溫服量兒大小加減進已上二方出口如新者

太平聖惠方犀角散治小兒四五歲已上非時吐血

犀角屑

梔子仁

生乾地黄

子芩

紫參

刺薊各一分

右件藥搗鹿羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小加減服之

蒲黃散治小兒吐血不止

蒲黃一分

伏龍肝半兩 乳髮灰一分

右件藥同研令勻細不計時候煖生地黄汁調下半錢量兒大小加減服之

齒根散治小兒吐血心躁煩悶

齒根半兩

犀角屑

川升麻

川大黃剉微炒

永樂大典卷一千三十三

七

黃芩

甘草炙微赤剉已上各一分

右件藥搗鹿羅為散每服一錢以水一小盞入黑豆三十粒淡竹茹半分煎至六分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服

又方

刺薊自然汁不限多少

右件藥取汁一合煖令溫不計時候調下玄明粉半錢量兒大小以意加減

又方

右取生地黄汁一合煖令溫調下麩麩半錢不計時候量兒大小以意加減服之

又方

石以亂髮燒灰細研每服以溫水調下一字  
嬰孺方治少小款唾中有血款冬湯

款冬花

乾薑

何膠炙各二兩 吳茱萸一升

桂心半升

艾一握子大

鯉魚一箇長一尺二寸

右杵細酒和置魚肚中銅器中蒸熟取汁大人服一升小兒一合以



意裁之

豚肺散治少小散逆甚者血出鼻衄

右以豚肺好酒浸一宿半旦取炙乾為末一服一撮飲下

升麻湯治小兒熱病鼻衄或吐血

升麻八分 淡竹青皮 羚羊角各五分 生地黄七分

甘草四分 芍藥六分

右以水三升煮一升一歲兒為三服

治小兒汗出如漿。衄血吐血。小便出血垂死者

都梁香 乾地黄各二兩 紫苑 桂心

人參 青竹葉 茯苓各一兩

右為蒸酒服方寸匕。日進三服。夜一服可至二匕。四方或切如新者

聖濟總錄黃連飲治小兒心脾有熱吐血

黃連去須一分 豉二白粒

右二味將黃連鹿角膠每服半錢匕水七分入豉二十粒同煎取三

分去滓溫服日三更量大小加減

治小兒吐血不定方

刺薊 自然汁不計多少 補消半兩

右二味先研補消為末二百日兒及晬兒每服用刺薊汁調補消末

一字至半錢匕日再服更量大小加減

大黃湯治小兒吐血

大黃 刺薊 黃芩 去心各一分

右二味鹿角膠三四歲兒每服一錢匕水七分入黑豆三十粒同煎

至四分去滓溫服日三更量大小加減

治小兒積熱攻肺卒吐血

飛羅麩二兩 生地黄汁二盞

右二味相和勻蒸乾研為末每服半錢匕新汲水調下日三隨兒大

小加減

又方

刺薊花 蒸乾不拘多少

右一味搗羅為末每用黃牛乳調下一錢匕日三

地黃飲治小兒吐血

地黃一升研取自然汁

右一味。一歲兒服半合。二三歲每服一合。量兒大小增減。日三。張漢醫方妙選。搜小兒內有邪熱。流散妄行。若氣逆。即血隨氣上。或口中吐血。鼻中衄血。今有煙効方治之。

紫參一兩 山梔子一兩 生乾地黄一兩 刺薊一分 芫花

已上搗羅為細末。次用

蒲黃一分 伏龍肝一分 細研

右十都拌勻。每服半錢至一錢。煎竹茹湯調下。

張銳難方治吐血

右用伏龍肝末。每服二錢水一盞。同煎至六分。去滓溫服。不以時

治吐血。衄血

右用白茅花。每服拌一錢水一盞。同煎至六分。去滓溫服。不以時

又方

石用新綿燒灰研細。每服一錢。旋入少麝香溫酒調下。米飲亦可。

王氏手集青金散。治肺嗽喘息。有音及熱。搏上焦血溢。妄行。欬唾血出。咽

永樂大典卷一千三十三

九

噎疼痛。煩渴。嘔吐。寒熱。休歇。減食。羸瘦方

白朮木 青黛研各十兩

右同研勻。每服半錢。或一錢。糯米飲調下。

黃芩膏治小兒衄血。吐血。下血

右以黃芩為末。鍊蜜丸如雞頭大。三歲一丸。濃鹽湯下。一方栝葉石榴花為末。吹鼻。治衄血。吐血。一方定州莞器末。治嘔血。破血。止血。又方鼻衄。久不止。用刺耳許入鼻。立效。又治小兒面目。卒得黑丹。如芥狀。不急治。遍身即死。以猪脂調塗之。即愈。

栝枝散。治小兒衄血。吐血

栝枝乳者 藕節乳者

右等分為末。三歲半大。蓋藕汁入蜜。沸湯調下。一方白芍藥為末。磨犀角汁調。治咯血。衄血。又方龍骨為末。吹鼻。治衄血。如咯血。吐血。藕汁調下。半錢。又方治吐血止及衄血。蒲黃冷水調。生地黄汁調下。尤妙。

獨聖散治小兒吐血。衄血

右以赤芍藥為末。藕汁入蜜。少許調下。食後。又方栝枝煎湯調下。及

治婦女下血

寶黃散治小兒吐血百治不差十無一失

右以大黃為末。取生地黄汁微煎入蜜調下。量大小加減服之。三兩服立效。又一方以白膠香為末新汲水調下。

桂心膏治十歲以上久吐血氣虛胃弱不利

右以桂心為末取生地黄汁薑汁蜜等分熬稠為丸如雞頭大。十歲

兩丸取藕汁入蜜白湯化下

辰膠散治小兒吐血

阿膠炒 蛤粉半斤 辰砂少許

右為末和粉紅色三歲一錢藕汁和蜜調下

一方藕節日乾為末入參蜜湯調下能消瘀血

刺刺散治小兒九竅出血

右以刺刺一握絞汁入好酒合和服之如無膏者乾者為末冷水調

下三歲一錢十一方共切切研者

楊仁齋直指方蒲黃散治小兒吐血咯血

生蒲黃 油髮灰等分

永樂大典卷一千三十三

十

右研細每一錢煖生地黄汁調下或米飲亦得

地黃汁方治小兒吐血如血

生地黄汁取一合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

曾世榮活切心書人參芍歸湯治九道血妄行

人參 土犀 川芎 當歸酒洗三味各半兩

荆芥二錢半

右件以咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

小兒嗽血

方

王氏手集解肌丸治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴煩赤心忪減食熱在上焦嗽有血方

防風 地骨皮各一分

右件燒沙糖為丸每服一九食後煎紫蘇湯下

團參丸治嗽血方

阿膠 皂兒黃 人參各半兩

右除膠為細末湯少許洋膠和如雞頭大白湯化下

朱氏家傳雜清散治款嗽出血下涎  
鬱金丹兩用毛茛菪水一盞或酸棗汁亦得黃芩為度

滑石半兩生 雄黃半兩研末

右為細末每服一字常服薄荷湯調下止嗽螺粉水下款血雞子清  
調下二方或如切切新書

小兒大便血

論

太平聖惠方夫小兒大便血者為心主於血脈心脈有熱熱乘於血血性  
得熱流散妄行不依常度其血流滲於大腸者故令大便血出也鄭端友  
全嬰方夫大便血者是大腸熱結損傷所為也臟氣既傷風邪自入或蓄  
熱或積冷或濕毒傳於脾胃或疳食傷於臟腑因茲冷熱交擊疳濕互作  
致動血氣停留於內凝滯無歸滲入腸中故大便下血也 又有或腹脹  
冷氣在內攻衝亦令大便下血又因風冷乘虛客入脾胃或瘀血腸胃濕  
毒下如豆汁又疳傷於臟亦能使血若上焦心肺積熱流注大腸亦令大  
便下血也亡血脾弱必渴久則血虛其人必肌體萎黃頭髮不黑矣郭彌  
明方便集一小兒年逾十歲夏月便血醫者以涼藥治之雖皆輕減然而

下血不止近及一年每如臘毒涼藥愈進而其證自若醫無策處之忽有  
人來自遠方且云先乃熱疾今延日久又服涼多合是臟寒生風反下惡  
血血濁者五臟風毒也法當微溫去風則安矣遂令服四物湯旬日乃止  
蓋當歸地黃有溫性而勻散血氣使之不聚于臟而下也芍藥川芎有溫  
性而除去風血使之不滯于臟而毒去也醫藥之術亦當窮理知變豈可  
執一偏之見乎漢山翁活幼口議議曰兒生七日之內大小便有血出  
者此由胎氣熱盛之所致也母食濃酒細麵炙煨醃等流入心肝兒在  
胎內受之熱毒亦傳心脾且女子之臟其熱即入於心故小便有之男子  
之臟其熱即入於肺故大便有之血出淡淡有似瑤水盛則其血加鮮凡遇  
有此不可它藥盡以生地黃根研取自然汁五七匙一二匙蜜半匙和勻  
溫溫與服移時安愈男女皆效不請疑謂甘露飲宜兼與服不必它藥萬一  
無恙勿自忽遲妄投丸散後咎矣鄭端友全嬰方大便下血歌風冷腸間  
又熱攻交相繫作糞須紅疳腸腑令便血錢氏云胎前下血而後生以  
云胎前下血胎中下血濕毒兼傳在胃中云云胎前下血而後生以  
且計經濟小兒保命方書脫紅瀉血證詩曰脫紅瀉血積因傷冷熱攻脾  
作清腸消渴口乾焦上熱氣攻虛腫面青黃若有此等候可服槐仁散并

休槐花藥或瀉後變作赤白顏色不一可服前項諸瀉劑等藥

孫思邈千金要方治大便竟出血方龍頭一枚炙令黃黑為末以飲下五分七多少量兒大小日三服外臺救急作龍甲

又方燒車釐一枚令赤內一升水中分二服

又方燒龍帶木傳乳頭上令兒飲  
仙人水蠶小孩子遺血呼為胎風宜使此方人多不識每因上廁犯之至三歲以上解行後有少鮮血宜用此散子方

胎腸風最惡日久殺孩兒如後有鮮血宜取一甘梨梨內安琥珀并蜜封燒之宜待交梨碎取研救孩兒

右取一顆好梨去心入少許琥珀末并蜜即以麩裏泥燒之火中煨一伏時取出去皮研以水調服立效

子母秘錄治小兒下血

右取雌雞翅下血服之已上二方出如神

太平聖惠方羚羊角散治小兒大便出血體熱黃瘦不欲飲食

羚羊角屑 黃耆 川升麻 黃芩

永樂大典卷一千三十三

地榆 甘草 生乾地黄 牛黃

右件藥搗鹿羅為散每服一錢以水一小盞入苦竹茹半分煎至六分去滓不計時候量兒大小分減溫服之

槐花散治小兒大便出血腹痛黃瘦不欲飲食

槐花 白木 熟乾地黄 芎藭 黃耆 木香 當歸 甘草

右件藥搗鹿羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓不計時候量兒大小分減溫服

卷栢丸治小兒大便出血久不止面色萎黃肌體羸瘦或時腹痛不欲飲食

卷栢 赤石脂 阿膠 黃耆 槐花 黃牛角 當歸 黃耆

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大三歲兒每服以粥飲下七丸日三服量兒大小以意加減

治小兒大便後出血方

龜甲一錢。生醋炙。分黃連。土硫磺。

石件藥搗細羅為散。每服以粥飲調下半錢。日三服。量兒大小以意加減。

又方

鹿角燒灰

石件藥細研。以粥飲調下半錢。日三服。量兒大小以意增減。太醫局沒石子丸。治小兒腸虛受熱。下利鮮血。或便赤。汁腥。痛後重。晝夜不止。遍數頻多方。

沒石子

地榆 各半兩

黃連 剉炒一兩半

黃栢 剉碎 各半兩

酸石榴皮 一兩

右件藥搗羅為細末。以醋煮麩糊和丸。如麻子大。每服十九至二十九。溫米飲下。食前服。

茅先生方治小兒大便下血

枳殼 土白 剉炒 荆芥穗

甘草 各半兩

右為末。每服一錢。用陳米飯飲調下。

九齋衛生方紫參散療小兒下血腹痛

臭椿根皮

貫衆

紫參

酸石榴皮 燒灰存

各半兩

右同為細末。每服一錢。米飲調下。腹痛煎艾湯調下。

孔氏家傳神效散。治小兒大腸有血。上後有血。如痢疾相似。但不拘十歲以上。皆治之。

芍藥

地榆

甘草 炙

陳橘皮

黃連

乾葛 匕上 各半兩

石為末。每服一錢。用陳米飲調下。日進三服。

槐黃散。治小兒便鮮血

黃耆 一兩

當歸

槐花

白朮

人參

芍藥 各三分

右為末。米飲下一錢。小兒半錢。

朱氏家傳小兒熱氣攻大腸。其病瀉血。臟腑疼痛。漸如茶色。難治。此病是傷寒出汗不盡。或因瘡子出不足。令熱氣行於大腸。所以瀉血。如治先解汗。後下氣。攻大腸散方。

鬱金一兩 乾薑半兩 大腹皮一兩半

右為末。每服半錢。陳米飲下。

吉氏家傳治瀉血不定。是脾胃氣冷。大腸風毒。宜服此方。

沒石子一箇大者 肉豆蔻一箇 茶末一錢

檳榔白皮二錢

右件末。不計時候。以水如茶點一錢。灌服立差。已上六方。皆切新者。

鄭端友金嬰方桂心散。治小兒吐血。或便血。

右以桂心去皮。不見火。為細末。三歲半錢。藕汁同蜜半匙。調下立效。

胃風湯。亦治下血。方見馮府頌。

若葉散。治小兒大便中有血。或純下血。

右以茶著碗。灰存性為末。米湯調下。食前。

五倍丸。治小兒大便下血。如腸風膿毒。

右以五倍子焙乾。為末。鍊蜜丸。如小豆大。三歲三十九。米湯空心下。

訶灰散。治小兒因疳。大便有血。

右以訶子燒存性。一半為末。米湯調下。食前。三歲一錢。一方像牛子。

合白梅。濕紙裹。燒灰存性。為末。米湯調下。食前服之。

史載之方治小兒大便血

黃連一錢 炒 獨活 白茯苓 去刺 半兩

槐花 炒 訶子 炮 枳實 炒

荆芥穗 蔓荊子 各 分 木香 一錢 白芍藥 三錢

甘草 二錢 炙

右為細末。食後水一盞。煎三錢。取七分。和滓服。或鍊蜜丸。如梧子。

大清湯下。三四十九無時。日一服。或二服。

魏氏家藏方梅連丸。治小兒大便下血。

黃連 十兩 當歸 十兩 各 二錢 烏梅肉 十兩

右為末。鍊蜜丸。如菉豆大。粥飲下。不拘時候。

表當時大方胃風丸。治下血。不下乳食。

人參 白茯苓 白朮 天麻

防風 各 半兩 去 土 乾蝦 一箇 去 土

右為細末。糊丸。如麻子大。每服三十九。食後米湯下。

小兒大小便血論

舉元方病源。心主血脈。心臟有熱。熱乘於血。血性得熱。流散妄行。不依常度。其流滲於大小腸者。故大小便血也。血性得寒。則凝滯。得熱則流散。而心主於血。小兒心臟有熱。乘於血。血滲於小腸。故尿血也。鄭端友全嬰方。夫小便者。蓋心主血。與小腸相合。血之流行。周遍經絡。循環臟腑。若熱聚膀胱。血滲入膀胱。小便血出也。郭彌明方便集。廖人之子。年十歲。許尿血。三載。管筒澀痛。腎作熱。淋治之。竟未取效。不免相問。子曰。夢寐驚悸。舌曰然。每驚又甚。子曰。是其證也。本因驚而入心。心與小腸為受感。心通小便。心因驚而有熱。熱隨小便而行。故尿血。血熱故澀也。此特輕耳。若使驚甚。則外腎昂入。陽道萎縮。小便或血或赤。而澀痛也。赤者。血之餘。無非熱耳。人徒知治熱。淋而不能鎮靜其心也。今投龍齒散以鎮心。心安而涼水道。自無熱矣。是清其源也。又用石韋丸以寬滑水道。管筒自無澀矣。乃治其源。旬日。心安不悖。使乃滑矣。

方

孫思邈千金要方治小兒尿血。燒鴉巢灰。并花水服之。亦治夜尿尿。又方。尿血。交第七椎。兩傍各五寸。隨年壯。姚和衆方治小兒尿血。用甘草五分。以水六合。煎取二合。去滓。一歲兒

一日服令盡

又方。用蜀升麻五分。水五合。煎取一合。去滓。一歲兒一日服盡。太平聖惠方。阿膠散治小兒尿血。水道中澀痛。

阿膠一分。芍藥一分。甘草一分。黃芩一分。梔子仁一分。

車前子一分。右件藥搗細羅為散。每服用新汲水調下半錢。日三四服。量兒大小。以意加減。

又方

榆白皮半兩。生乾地黄半兩。甘草一分。右件藥搗細羅為散。每服用新汲水調下半錢。日三四服。量兒大小。以意加減。

又方

苦棟子一兩。鬱金二枚。地一枚。上用

右件藥搗細羅為散。每服煎葱湯調下半錢。量兒大小。以意增減。

又方

生乾地黄。黃芩。乙上各半兩。

右件藥搗細羅為散。每服一錢。以水一小盞。煎至六分。去滓。溫服半



# 永樂大典

卷一〇三三

合量兒大小加減服之

又方

紫苑洗去苗土黃連去須甘草炙微赤對各一分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入豉三十粒煎至五分去滓量兒大小加減服之

又方

葵子 車前葉 甘草炙微赤對川朴消已上各一分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服

又方

牛蒡根洗去土 右搗絞取汁一中盞入生蜜一合各相和令勻每服半合日三四服量兒大小增減服之

又方

取蒲黃末以溫水調下半錢量兒大小加減服之

又方

車前葉半斤黃取汁 沙糖一兩 右件藥相和令勻每服半合量兒大小加減服之

## 永樂大典卷一千三十三

十六

又方 以生地黃汁每服暖一合服之量兒大小以意加減  
茅先生方治小兒小便下血方

生地黃汁小半兩 輕粉半錢上

右作一服用并華水下或如新古  
張漢醫方妙選車前散治熱感積於小腸甚則尿血

牡蠣半兩燒為粉 車前子 甘草炙微黃對

川朴消已上各一分

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服量兒大小加減不拘時候

吉氏家傳尿血地黃散方

菘豆粉 滑石各一兩 生乾地黃二兩 甘草半兩炙

右藥此病小兒是心藏積熱并脾藏肝藏積熱如大人脾藏受病傳腎有三陰三陽之脉小兒八歲以下只有三陽之脉無三陰脉所以心脾肝三藏受病不傳腎藏傳小腸小腸風熱之極所以尿血每服半錢新汲水下二錢二服止忌熱食酸鹹

鄭端友全嬰方著灰散治小兒尿血陰莖中痛

右以多時茶餅中著。燒灰存性用一兩滑石末半兩並為末三歲一錢燈心煎湯調下

十便良方雙全自然液療小兒尿血方

生地黃汁一升生薑汁一升

右二味相和頓服不差更作此法計今公處云極效

郭綱明方便集龍齒散

龍齒 平兩 赤茯苓 三兩 遠志 去心 取皮 半兩

茯神 去木 半兩 半夏 曲 半兩 甘草 平兩

右為細末和勻每服一大錢水一小盞入薑三片熱水葱一莖同煎

食後臨卧溫涼服

石韋丸

石韋 一兩 剉去葉上七用葉 滑石 平兩 不用青黑者

木通 平兩 芎花 碎根可食者 用花 平兩 豬苓 去皮 平兩

黃芩 二分 茯苓 一兩

右為細末水漬薄荷米糊為丸如菉豆大每服二十九空心溫白湯

下量歲數加減小使少者加車前草湯下

楊仁齋直指尿血方

生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草 微炙 各分

右剉每一錢水一小盞煎七分調髮灰食前服

小兒大便不通

論

巢元方病源小兒大便不通者腑臟有熱乘於大腸故也脾胃為水穀之海水穀之精華化為血氣其糟粕行於大腸若三焦五臟不調和熱氣歸於大腸熱實故大便燥澀不通也聖濟總錄論曰水穀皆入於上焦至中焦而腐熟下焦而化出小兒腑臟狹熱三焦壅滯津液枯少不能傳道實熱之氣歸於大腸故大便燥澀而不通也

方

王焘外臺秘要方紫雙丸主小兒身熱頭痛飲食不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾難飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不差復可再服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方

巴豆去皮心 麩核仁各十八粒 別梅 麥門冬十粒 甘草五粒 甘遂 真珠各二粒 牡蠣各

右八味以湯熟洗巴豆研以新布絞去油別梅甘遂甘草牡蠣麥門冬細篩畢搗已豆麩仁令極熟乃內諸藥散更搗三千杵如藥燥入少蜜足之半歲兒可服如在子一雙二歲兒服如半麻子作一雙三歲兒服如麻子一枚作一雙四歲兒服如麻子二九五歲兒服如大麻子二九七八歲兒服如小豆二九九歲十歲兒微大於小豆二九常以雞鳴時服至日出時不下者飲熱粥汁數合即下九皆雙出也下甚者飲冷粥止之

又方 療小兒大便不通

右用豬苓一兩以水少許煮雜屎白一錢匕與服立差  
太平聖惠方大黃散治小兒臟腑壅熱心神煩燥大便不通

川大黃一兩 犀角屑半兩 川升麻半兩 當歸一分 赤芍藥一分 紅雪一兩 甘草一分 右件藥持鹿羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓三四歲

溫服一合量兒大小加減服之日三四服以利為度

芎藭散治小兒大便不通腹脇妨悶

芎藭半兩 川大黃三分 郁李仁三分

右件藥持細羅為散每服一錢以溫水半盞調服量兒大小以意加減以利為度

又方

陳橘皮一分 牽牛子半兩 甘草一分 川大黃半兩

右件藥持細羅為散每服煎葱白湯調下半錢量兒大小以意加減日三兩服以初為度

丹砂丸治小兒大便不通心神煩熱

丹砂半兩 右件藥都細研令勻鍊蜜和丸如菜豆大三歲兒每服以溫水下三丸量兒大小以意加減服之  
通中丸治小兒大便不通心腹壅悶即煩喘

川大黃一兩到散炒  
去皮子燒令焦黑  
巴豆霜三分  
皂莢一兩不炒者

右件藥大黃皂莢搗羅為末入巴豆霜同研令勻鍊蜜和丸如菜豆  
大四五歲兒以溫水下二九量兒大小以意加減

犀角丸治小兒臟腑壅滯腹脇妨悶大便不通  
犀角屑半兩當歸半兩到散炒  
巴豆一枚去皮心研極細壓土油  
川大黃一兩到散炒  
丹砂半兩細研水  
飛過

右件藥搗羅為末入巴豆丹砂同研令勻鍊蜜和丸如菜豆大三歲  
兒以溫水下三九量兒大小以意加減  
大黃丸治小兒大便不通心腹壅悶  
川大黃一兩到散炒  
枳殼三分麩炒微黃去核  
梔子仁三分  
那季仁三分湯洗去皮微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服以熱水下五九量兒大  
小加減服之  
桃葉湯治小兒大便不通臍腹妨悶宜用

永樂大典卷一千三十三

十九

桃葉一握  
葱白二握  
木通二兩  
燈心五莖  
川朴消一兩

右件藥細剉用醋漿水三大椀煎十餘沸去滓傾向盆中稍溫便坐  
兒在盆內將淨以手帕裹熨於臍下冷即出之後喫地黃柿粥半盞  
良久便通

走馬煎治小兒大便不通連腰滿悶氣急用重  
羊膽一枚  
蜜一合  
鹽花半兩  
右件藥同煎如錫撚如筋鹿可長一寸內下部中須臾即通  
牛黃丸治小兒大便不通心中煩熱  
牛黃一分細研川大黃三分到散炒搗羅為末

右件藥都研令勻鍊蜜和丸如麻子大每服以粥飲下七九以利為  
度量兒大小加減服之  
治小兒大便五六日不通心腹煩滿宜用此方  
右取青蘋鹽末於臍中以手摩良久即通大人用之亦得

蜂房散治小兒卒大便不通  
蜂房二枚炙令微焦

右搗細羅為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

牙先生方治小兒大便不通

打消三錢 大黃一兩五用

右為末周歲一錢半水五分煎四分溫服

治小兒大便不通日赤瘡癩癰腫熱毒心熱宜服之大人加用

大黃一分

黑牽牛一分 檳榔一分 打消三錢

右為末每服一字或半錢用蜜熱水調下

嬰孺方治小兒大便不得 周半夏一分炒黃為末以蜜為丸黍米大乳服一九日再服此方頗效垂罔功效不可具言

小兒大便不通方

杵白花胡葵子為末黃汁服之

又方 用豬脂一斤水黃取一升服五合日三服小兒量之

又方 煎蜜合可索索之捻如七納內下部中二寸許立通

又方 取羊膽汁灌下部中須臾通

丹參湯治小兒大便不通腹滿

升參

消石

甘草長半寸許為末

右以水二升黃棗三箇三沸去滓下末三方寸匕又煮三沸去滓五歲兒服五合不差再服

大黃丸治小兒腹大鳴及內熱堅不得大便更衣

大黃七分

葶藶四分 牛黃三分

人參

厚朴大

芫花一分 桂心

黃芩各一分

右為末蜜丸小豆大飲下三九不知加之

治小兒胃中熱更衣起黃赤而難或四五日乃大便難方

大黃

甘草大 蘇蘇各二分

大棗三十箇

右以水二升半煮一升每服一雞子許日進三服

牛黃丸治小兒調中利大便

牛黃

大黃

麝香

右三味等分為末蜜丸如小豆大飲下二九日再以利為度

漢東王先生方金花散治小兒大腸秘不通兼血痢

郁李仁一分

少檳榔一分 甘草一分

右為末每服一字或半錢砂糖熱水調下七上十二分止如吐則止

聖濟總錄大黃丸治小兒大便不通

大黃剉一分一兩一分

枳殼去穢炒 梔子仁

郁李仁炒去雙仁皮

大麻仁研各三分

右五味搗研為末。鍊蜜丸如麻子大。一二歲兒每服五丸。熱水下。空

心午後各一服。更隨兒大小加減。

滑石湯治小兒大便不通

滑石研

大黃剉

冬葵子

甘草炙各半兩

右四味搗研篩三四歲兒每服一錢匕。水一盞。入燈心七莖同煎至

五分。去滓溫服。更隨兒大小加減。

橘皮湯治小兒大便不通

陳橘皮去白焙 牽牛子炒

甘草炙

大黃剉炒各一分

右四味搗研篩五六歲兒每服一錢匕。水一小盞。入葱白一莖。擘碎

同煎至五分。去滓溫服。未通再服。更量兒大小加減。

木通湯治小兒大便不通

木通剉炒

大黃剉炒

陳橘皮去白焙各一兩

右三味搗研篩三四歲兒每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓溫

永樂大典卷一千三十三

二十一

服。更量兒大小加減。

橘皮湯治小兒大便不通

陳橘皮去白焙一分

大黃剉炒半兩

右二味搗研篩三四歲兒每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓溫

服。更量兒大小加減。

二黃丸治小兒大便不通調中

大黃一兩剉炒 牛黃研

甘草炙

人參各一分

右四味搗研為末。鍊蜜丸如小菘豆大。每服二丸。米飲化下。日再服。

得利即止。

黃連丸治小兒風熱壅滯大便秘澀

黃連去須

大黃剉炒各一分

巴豆土炒去心

右三味搗研為細末。麩糊為丸。如麻子大。每服三丸。至五丸。臨睡柳

枝湯下。

代楮丸治小兒大便

代楮研

丹砂研

大黃剉各二兩

木香

當歸 各一兩一分

桂 各一兩

生犀角 三分

巴豆 炒熟去心。梅 一兩半

右八味研為末。鍊蜜丸如小豆大。每服一九至二九。空心米飲化下。六七歲三九。二百日兒半丸。但得瀉利為度。

驚甲丸治小兒大便不通

驚甲

醋炙黃去核

防葵

訶梨勒 用皮

大黃 剉炒

人參

當歸 剉碎

郁李仁 湯浸去皮

天麻 剉碎入

右七味等分。共味研為細末。入郁李仁和勻。鍊蜜丸如棗豆大。術飲下。五九微利即差。

牛黃散治小兒大便不通。口燥煩赤。

牛黃 一分

大黃 剉炒

甜消 各一分。甘草 炙

人參 各一分

右五味研為細散。每服半錢。七新水調下。乳食後服。張銳難拳方治大便秘結不通。用麻子以水研汁飲之。

莊氏家傳治小兒大腸風熱感不通

大黃 一兩

防風 一兩

朴消 二兩

右件為末。用蜜湯或葱湯調下。

孔氏家傳治小兒大便不通。於消風散中。入鷹條一二寸。遂通。蓋庸醫見小兒大便不通。多服涼藥。與味轉藥積於中。涼轉藥一併發。則其人因矣。此方最佳。

危亦林得効方。沒藥散治風與滯血留蓄上焦。胃腸高起。大便不通。

沒藥

大黃

枳殼 炒

北棗 各二錢

木香

甘草 炙 各一錢

右剉散。每服一錢。薑二片。水一盞煎服。

曾世榮活心書。寬腸丸治痢後裏急。大腑閉澀不通。

枳殼 同上製。仍用清油浸透。一宿。曬乾。五錢

木通 去皮。厚 大黃 半斤。生地 橫切 五錢。各二錢半

麻仁 去殼

右除麻仁。用孔鉢極細杵。碎五味。攪擲不通。大餘。培同研成末。入乳鉢中。與麻仁再杵勻。鍊蜜丸。棗豆大。每服三十九。至五十九。仍以枳

枳殼丸治大腑虛閉氣閉連日不通痢後裏急用之亦効及疎利小便熱

枳殼不拘多少。剉片。炒過。以清油浸過一宿。此

右焙為末。鍊蜜丸。作芡實大。兒小者用甘草糯米煎湯化。下一丸至二丸。兒大者粟豆大。每服三十九。或五十九。食前溫米清湯送下。小

腑熱閉。用車前子煎湯候溫空心投之。

通聖餅治大腑閉澀連日不通滿腹膨脹氣壅悶亂服藥罔效

淨黃連三錢 巴豆十粒 生蒜一箇 生鹽半錢  
右以黃連剉碎為末。同後三味石鉢內爛研。捻作餅子。寸半間貼臍。緊搓乾。切作粟豆大五枚。作五次安臍間餅子上。以火灸之即通。

小兒大小便不通

巢元方病源小兒大小便不利者。腑臟冷熱不調。大腸有遊氣。氣壅在大。小腸不得宣散。故大小便澀不流利也。翰林待詔楊大鄴問小兒大便澀。濕者為何。答曰。乳食失度。使之四大不調。滋味有食。運五歲受物。甘甜聚

食。鹹醋滯澀。食滯留結。胃腸風壅。滯於心肺。氣脈不順。水投不行。雖不逆於上焦。即秘結於下部。小兒不知疼痛。莫說因由。驚啼叫以頻頻。但怒脹而不乳。不知孩兒痛刺連臍。則面色青黃。但按脈息與治。若不見病源。只依外變用藥。必剋安效。田氏保嬰集。使難燥結。兒或服澀藥。腹脹悶亂。命在頃刻。可用握宣丸。以男左女右手握之。不移時。大小便自利也。張子和儒門事親。書凡小兒大小便不通。內經謂三焦約者不行也。可用長流水煎八正散。時時灌之。大小便利則止。若不因熱藥所攻。而致此者。易治。或因多服熱藥而燥。劇至此者。非惟難治。不幸大耳。亦可用蜜水調益九散。送通兩九。鄭端友全嬰方。尿難糞結。歌結熱在腸中。尿難糞不通。外加身壯熱。內必引驚風。湯氏望嬰。孩妙訣。熱氣運達。府氣衝。使成結毒在腸中。身體若須多燥渴。更兼尿真不能通。此按宜利下。若利下。則用四時飲。生

方

孫思邈千金要方治小兒大小便不通

拈白花胡葵子末。黃汁服之。

又方 右末雜尿白服一錢也。



王焘外臺秘要方主小兒大小便不通妨悶

用白蜜一合以鑊中煎為丸內下部中即通小便不通嚼生葱以綿

裹少許內小便道中即通

子母秘錄治小兒大小便不通

用蜂房燒末酒服一錢日再服

錢乙小兒方郁李仁丸治積滯小兒大小便不通并驚熱痰實欲得瀉動者

川大黃一兩古法凡用實者則碎酒洗半日佳乾炒為細末

郁李仁一兩古法 滑石十兩細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲服三二丸更

量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

張漢賢方妙選芎藭散治瀉府有熱小便澀兼大便不通

芎藭一兩 川大黃三分別炒 郁李仁三分湯洗

去皮微炒 石件橋羅為散每服一錢以溫水調下量兒大小加減

朱砂丹

朱砂半兩細研水浸 續隨子半兩 膩粉一錢

右件藥都研令勻煉蜜和如黍米大每服七粒以溫水下量兒大小

加減乳後食

急眼觀燈芍藥散治小兒大小便下藥不通者

芍藥 大黃 甘草大 當歸

朴消一分

右高末每服一大錢水一盞无器中煎至半盞去滓服即通

吉氏家傳治大小便不通

甘草節炮 槐花洗各一兩

右件末每服一錢茶半盞湯點下

又方

滑石一大錢 燈心一握

右以水二碗煎至一盞溫服已上二方或切切新書

阮霖經驗良方治小兒大便不通

以甘草木通炮子仁等分為末水一大盞燈心十莖連根葱白七

箇煎半盞服之

田氏保嬰集握靈丸治小兒大小便難嘔吐藥食不下命在頃刻

已豆一錢半 硫黃 良薑 附子

橫掛 甘遂各半分

右為細末粟米飯和丸粟豆大用椒湯洗小兒男左女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即止

劉智經驗普濟加減方檢頭散治小兒大小便不通

延胡索 川苦楝各三錢皂角子灰三錢

右為末每服三二錢檢頭湯調下以意加減自利効

曾世榮活心書透徹膏治大小腸秘澀投諸藥無驗不拘老幼結膏與之

穿山甲尾七寸者燒成通二錢半 五靈脂 手者二錢半

右二味碾為細末次以已豆二錢重去殼研碎和前藥末仍用大蒜

四錢重去上粗皮三五層於砂鉢內爛研如泥丸作一餅納臍中以

絹帕繫之外以掌心火上烘熱熨至八九次開腹中微響即通

小兒大小便數

孫思邈千金要方脾與胃合胃為水穀之海水之精化為血氣以行經

永樂大典卷一千三十三

二十五

其脾胃氣弱大小腸偏虛下焦偏冷不能制於水穀者故今大小便數也  
小兒大便青

論

太平聖惠方夫小兒大便青者因驚氣及脾氣不和夫大腸虛冷乳食不消  
冷氣搏於糟粕故今大便青色也鄭端友全嬰方夫大便青臟冷也或初  
出微黃良久則青者亦然也靈蘭秘典云瀉下如鹽澀胎中受積驚蓋心  
受驚心主驚心驚則膽怯膽者與肝為表裏也膽怯則肝冷肝傳脾脾受  
邪故大便初出微黃脾之本色良久復青肝之本色也肝熱則外發目赤  
肝冷則內作便青又有不因驚而得此證者蓋稟胎氣怯弱內受風寒故  
也有使青夾白濃稠粘如涎者亦是腸寒久則令兒面白形青腹痛驚啼  
失治則變陰痢也李裡小兒保生要方小兒青黃者冷也亦是肝剋脾之  
證也肝屬木其色青脾屬土其色黃黃脾家之本色也若脾受肝剋則  
其黃青肝木主風宜早治之不爾成脾風發痲也然所謂青黃繞下使青  
若初下時黃良久乃青小兒安樂者皆然不可認為青黃也可服白附子  
九羌活膏張果醫說載小兒真青此脾虛生風之證也脾屬土其色黃黃

黃則是脾家正色。今乃青。肝木剋脾也。肝屬木。其色青。肝盛脾虛。受肝之剋。故黃青也。當服益脾去風藥。如半硫丸。加白附子。竭稍可以治之。雖然小兒青黃。拋下便青者。是風冷也。良久然後青者。非病也。小兒黃自熱。如此田氏保嬰集。使青因驚氣內感。脾氣不和。治法宜服白木湯。鄭端友全嬰方。黃中雜色。詩曰。黃雜元因積。醜酸是食傷。驚深青。殺漆瘡。白臭非常。五臟真色。詩曰。肝冷傳脾。黃綠青。焦黃脾熱。土之形。肺勝寒。積膿粘白。赤黑。因心腎熱成。

方

太平聖惠方白木丸治小兒大腸虛冷乳食不消大便青色

白木

白芍藥

木香

當歸

各一分

麝香一分細研

右件藥搗為末。鍊蜜和丸。如粟豆大。每服以粥飲研下。五九日。三服。量兒大小。以意加減。

訶梨勒丸治小兒內冷腹脹妨悶大便青色不欲乳食

訶梨勒

白木

白茯苓

當歸

陳橘皮

甘草半兩炙 厚朴半兩去粗皮

白芍藥半兩

厚朴半兩去粗皮 人參半兩

右件藥搗為末。鍊蜜丸。如梧子大。三歲兒每服以粥飲研下。五九日。三服。量兒大小。以意加減。

陳橘皮丸治小兒內冷大便青不欲食皆是胎寒

陳橘皮

當歸

人參

芍藥

甘草

白芍藥

右件藥搗羅為末。鍊蜜和丸。如粟豆大。三歲兒每服以溫粥飲下。七九日。三服。量兒大小。以意加減。

木香丸治小兒胎寒腹痛大便青

木香

蓬莪茂

白木

當歸

五十四

麝香一分細研 白芍藥一分

人參半兩

石件藥搗羅為末。都研令勻。鍊蜜和丸。如粟豆大。二歲兒每服以溫粥飲下。七九日。三服。量兒大小。以意加減。

芍藥丸治小兒胎寒腹痛大便青

芎藭二分 黃耆三分 牛黃一分 細研 麝香三分 微炒

石件藥搗羅為末。都研令勻。煉蜜和丸如麻子大。每服以粥飲下五

丸。日三服。看大小以意增減。

當歸丸治小兒大便青不欲食。皆是胎寒。當歸 剉碎 人參 土產 白芍藥 芎藭 已上各半兩

石件搗羅為末。煉蜜丸如麻子大。每服以乳汁下三九日。三量兒大小以意加減。

吉氏家傳治小兒驚瀉青原

用硃砂米粒大。細研入輕粉少許。荆芥湯一茶脚調下。

李程小兒保生要方白附子丸治小兒青黃及吐而有冷證多者

白附子 二錢 干木 船 上硫黃 半兩 研細

半夏 半兩 土為細末 土產白附子 和成劑 拍作小錢 大餅 十沸湯 內下 故黃 然不麻人 為度 取起 研成膠

石貯前三味一處研勻入在半夏膠內和得所。乾即添湯丸如蘿蔔

永樂大典卷一千三十三

二十七

子大每服三五十粒米湯或乳汁下

楊侯家藏方溫藏湯治小兒因驚滯乳氣不宣。浮冷搏腸間。下利青沫。或乳多傷脾。妨不化。常服溫藏府。暖脾胃。化宿冷。進乳食。

人參 一兩 白附子 地 白木 陳橘皮 上白各十兩

丁香 二兩 神龜 炒黃 麥蘖 炒黃 甘草 炙黃 四兩

石件為細末。每服半錢。煎棗湯調下。空心食前。

小兒小便不通

論

巢元方病源。小便不通。利候。小便不通。利者。腎與膀胱熱故也。此二經為表裏。俱主水。水行於小腸。入胞為小便。熱氣在其臟腑。水氣則濕。故小便不通。利也。聖濟總錄。論曰。腎主水。與膀胱合為表裏。膀胱者。津液之府。其氣下通。故能滲泄。而作小便。或胞絡有熱。津液內燥。氣不宣暢。故水道熱。濕甚。則不通。十便良方。治小兒小便赤澀不通。表小兒小便赤澀不通者。由膀胱與腎有熱故也。腎主於水。膀胱為津液之府。此二經為表裏。而水行於小腸。入於膀胱。為小便。今臟腑有實熱。熱入於膀胱。故今小便赤澀不通。

也漢山省翁活切口議議曰小腸乃心之府也水實流行隨其氣而利之心氣若壅小便不通心氣若冷小便多濁謂酒泄也心氣若寒小便多旋心氣若熱小便艱澀心氣積熱小便白赤先赤而後白者所言閉小便者腎謂下結腹肚脹緊膨滿不通其結熱盛用刀勢旋點滴而出乃是閉不通利平心疼痛精神昏憒速用生大地龍數條蜜少許研碎莖卵仍燒蠶蛻紙灰留性朱砂腦子麝香同研煎麥門冬燈心湯調與服移時見效鄭端友全嬰方大小便赤澀歌并四曲歌八止氣壅生風熱大便不疎洩小水澀難通頃刻成驚掣

方

顧顯經治孩子小便不通

茯苓

通草

冬瓜子

車前子

右水四合藥半兩煎一合半作二服忌油膩

葛洪肘後方治卒不得溺取垢灰二刀圭以酒若米飲服

又方以髮灰酒下之又以雞子白亦佳

孫思邈千金要方地膚子湯治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澀痛不出出少如血須臾復出

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實

升麻

葵子

楮茶

海藻

橘皮

通草

大黃

右十二味以水三升煮取一升一日至七日兒服一合為三服

八日至十五日兒一合半為三服十六日至二十日兒二合為三服

四十月兒以此為準五十日已上七歲已下以意加藥益水

治小兒小便不通

車前草 小麥

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三四

又方以冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末陸銖

仙人水蠶小兒百日忽患陰風疾多殺人尿不利若以熱治之其疾轉甚

也何以知之孩兒在胎中時計父母之陰陽毒氣或犯孩兒生下百日而

有新疾腎者不辨根源必言是熱用冷藥轉之不安長大成人遂患陰癥

之疾蓋由此也小兒因此招禍不亦難乎其疾多尿濕及痛一尿一餘節

是也痛腎多作淋疾遂與石韋草犀角之類全乖其志宜須用此方

詩曰附子燒灰使半枚水精一分刀雖排父母手煎添水煙

功加須得土衣壹，土衣是九厘上清生瓦，取向諸者燒為灰用  
右量兒大小，日數與服之，立見神效

外臺劉氏方療小兒急，不得小便急悶

葱白一握 通草一兩 冬葵子一分

右三味切以水二升，煮取一升，去滓量服

外臺廣濟方滑石湯療小兒熱極病，小便赤澀或不通，屎極大喘呼

滑石六分 子苓四分 冬葵子八分 車前草一分

右四味以水二升，煮取一升，一歲至四五歲服一合，日再服甚良

太平聖惠方赤芍藥散，治小兒小便不通心悶

冬葵子 赤芍藥 蓮參 陳橘皮 湯浸去粗

牽牛子微炒 木通到已上各一分

右件藥搗麤羅為散，每服一錢，以水一小盞，入葱白一莖，煎至五分

去滓不計時候，量兒大小分減服之

梔子仁散治小兒小便不通，臍腹妨悶，心神煩熱

梔子仁五分 茅根一兩 冬葵根一兩 甘草一分 炙甘草

右件藥搗麤羅為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓不計時

永樂大典卷一千三十三

二十九

候量兒大小分減溫服

又方

滑石一兩 木通三分 川芒消二分 葵子二分

右件藥搗麤羅為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓不計時

候量兒大小分減溫服

冬葵子散治小兒卒小便不通，小腹急悶

冬葵子一兩 木通一分

右件藥搗麤羅為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓不計時

候量兒大小分減服之

乳煎葱白飲子，治小兒百日内小便不通，心神煩悶，臍下痞滿，宜服之

葱白一握 乳汁三分

右一味同煎至一合半，去滓分溫為三服，稍去如人行十里已來再

服以利為度

浸髮湯治小兒小便不通

木通一兩 生薑一兩 葱白七生 陳橘皮一兩

川椒半兩

右件藥都細剉。以水二大碗煎五七沸去滓傾入盆內者冷煖坐兒於盆中浸之。將滓於兒臍腹下熨之立通。

葵根散治小兒小便不通三日不通欲死者

葵根一握剉 壁魚七枚研

右以水一大盞煎葵根取汁六分後入壁魚同煎五七沸去滓放溫

量兒大小隨時分減服之

地膚子散治小兒積熱小便不通

地膚子

蓮麥

冬葵子

知母

黃芩

川升麻

木通剉

川大黃剉微炒

猪苓 去黑皮。上各半兩

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候量兒大小分減服之

滑石散治小兒小便不通心腹滿悶坐卧不安

滑石半兩

甘草一分炙微赤剉

葵子半兩

川大黃半兩剉微炒

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小盞入葱白五寸燈心一大

末煎至六分去滓三四成溫服一合量兒大小不計時候加減服之

木通散治小兒小便不通臍腹堅滿喘急

木通剉

甘草一分炙剉 葵子已上各一分

川大黃剉微炒

滑石

牽牛子微炒已上各半兩

右件藥都細搗羅為散每服煎葱白燈心湯調下半錢量兒大小服之以利為度

卓前散治小兒小便不通臍腹急痛

卓前子 切半片 小麥二合

右以水二大觔煮取一觔去滓入少稷米煮作稀粥時時量力與服

又方

石韋半兩

蓮麥半兩

小麥一兩

右件藥都剉以水二大盞煎至一觔去滓取汁一合調下滑石末半錢量兒大小以意加減

又方

冬葵子

滑石

海蛤

蒲黃已上各半兩

右件藥搗細羅為末。每服以葱白湯調下半錢。量兒大小以意加減。

葱白飲子治小兒小便澀少妨悶不通。

葱白二錢 木通半錢 冬葵子十兩

右件藥都細剉以水一大錢煎至五分去滓量兒大小以意加減服。

又方治小兒小便不通小腹妨悶。

又方

桑螺蛸十枚 天冬黃

右件藥持羅為末。每服以粥飲調下半錢。量兒大小加減服之。

又方

用頭垢半錢以溫酒調服之。三歲已下服一字。

譚氏殊聖方治小兒小便不通。

右芥菜子爛研以紙花貼臍下相次通妙。

茅先生方治小兒小便不通。

山梔子 滑石 各一分

右為末每服半錢。濃煎燈心湯調下。

永樂大典卷一千三十三

三十一

嬰孺方通草湯治小兒小便不通。

通草 甘草 滑石 各二兩 葵子 三分

右以水三升煮六合二日。兒服半合。日三夜一服。

瞿麥湯治小兒小便不通。

瞿麥 石韋 各七錢 各一兩 滑石 一兩

小麥 二合

右以水三升煮一升。服一合。日四服。夜再。

桃仁湯治小兒暴不得小便。

石用桃仁二十箇去皮尖。以酒一升煮三沸。去滓量兒與之。

滑石散治小兒小便不通。

滑石 各二兩 葵子 二兩

榆白皮 各一兩

右切取滑石上汁煮二味。四沸。絞去滓。調水中。滑石服之。水中澄待。

者滑石也。

麻黃浴湯治小兒小便不通。熱後腹滿。

麻黃 石膏 各一把 滑石 一升



大黃 土兩

右以水二斗煮一斗。去滓放溫浴兒妙。先自臍淋之。

治小兒小便不通泥勝方

右用滑石一升末。以車前草汁和如泥。泥勝方廣四五寸。少覺乾即除之。別上新泥。冬月無車前草汁。只以水和。

治小兒小便不通方

葵莖 半升 葵子 一升

右以水四升。煮取一升。下滑石末一分。研服。半合。日進三服。

滑石湯治小兒熱病小便赤澀不通尿報啼呼

滑石 六分 子苓 四分 冬瓜子 八分 車前子 升

通草 二分 茯苓 五分

右以水四升。半煮一升。二合。一二歲為三服。百日一合。已上。古方。

錢乙小兒方拾頭散治小便不通

玄胡索 川苦棟 各等分

右同為細末。每服半錢。或一錢。拾頭湯調下。量多少與之。如無拾頭。

湯。即湯中滴油數點。食前

聖濟總錄石韋湯治小兒小便不通

石韋 土七 瞿麥 各一兩 滑石 兩

右三味。炭搗篩。五六歲兒。每服一錢。七水八分。入小麥一百粒。同煎至五分。去滓。溫服。如人行十里。再服。量兒大小。以意加減。

治小兒小便淋閉不通神散方

石燕 一枚。先為細末。石韋 去土。研

右二味。為細散。每服一字。七煎。三葉酸漿。單湯調下。甚者。三服。差一方。有海金沙。一兩。

冬葵子散治小兒小便不通臍腹急痛

冬葵子 滑石 海蛤 蒲黃 各半兩

右四味。搗羅為散。每服以葱白湯調下。半錢。七。量兒大小。以意加減。

滑石散治小兒小便淋澀不通及小便血

滑石 研 車前子 各半兩

右二味。細搗羅為散。如二三歲兒。每服半錢。七。空心。食前。粥飲調下。日二服。

萬安散治小兒小便不通欲死

海金沙 滑石

續隨子 炒各半兩

右四味搗羅為細末每服半錢匕煎燈心湯溫調下空心食前服

木通黃芩湯治小兒熱極小便赤澀不通小便赤澀大喘呼疼痛

木通 剉一兩 黃芩 二兩 去黑心 滑石 一兩 半

冬葵子 三分 車前子 二兩 赤茯苓 去黑皮 二兩

右六味搗羅為細末每服一錢匕以水一中盞煎至五分去滓

溫服如人行十里已來再一服更看兒大小以意加減

瞿麥湯治小兒小便不通心悶

瞿麥 剉 赤芍藥 陳橘皮 湯洗去白膜

牽牛子 少 木通 剉 冬葵子 各一分

右六味搗羅為細末每服一錢匕水一中盞入葱白一莖擘碎

同煎至四分去滓溫服如人行十里已來再服量大小以意加減

茯苓湯治小兒小便不通

赤茯苓 去黑皮 冬葵子 木通 剉 車前子 各半兩

永樂大典卷一千三十三

三十三

右四味搗羅五六歲兒每服一錢匕以水一中盞煎至五分去滓溫

服如人行十里已來再服量兒大小以意加減

鄭端友全嬰方治小便黃赤不通

用石韋車前子等分水煎去滓服

又方治小便不通及疔轉 梁上塵去烟速者一撮水調服

十便良方子苓散治小兒壅熱小便赤澀不通水道中澀痛不可忍

子苓 冬葵子 車前子 茅根 剉已上各一兩

滑石 二兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓不計時候

量兒大小以意分減服之

大青散治小兒臟腑壅熱心神煩躁小便赤澀不通

大青 川升麻 蓮麥 黃芩

甘草 炙 剉 已上各半兩 川大黃 三兩 剉 故炒

川朴消 三分 滑石 三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫水調下半錢看兒大小以

意加減

朱砂散治小兒心驚熱感煩躁不安小便赤澀不通

朱砂細研

鉛白霜細研 犀角屑

黃芩

車前子

甘草天散去刺 已上各一分

滑石半兩細研

川朴硝半兩

石件藥持細羅為散入研子藥合勻不計時候煎苦竹葉湯調下半錢看兒大小以意加減

又方

冬葵子三分

滑石三分細研 梁上塵半兩

黃芩半兩

甘草半兩天散去刺

石件藥持細羅為散不計時候煎葱白燈心湯調下半錢量兒大小以意加減

又方

生地黃汁一合 牛蒡葉汁一合 蜜一合

石件藥相和合勻每服一合調下滑石細末半錢臨時看兒大小加減服之

滑石散治小兒熱極小便赤澀不通尿數大啼水道中痛

永樂大典卷一千三十三

三十四

滑石一兩

子苓半兩

冬葵子三分

車前子

赤茯苓半兩

木通三分

石件藥持細羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

車前子散治小兒小便赤澀服藥即通無藥即澀宜服

車前子一兩

子苓一兩

滑石二兩

木通三分

赤茯苓一兩

琥珀一兩

甘草半兩天散去刺

石件藥持細羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒小便赤澀不通宜服此方

滑石二兩

木通一兩

葵子一分

石件藥持細羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

張漢醫方妙選葵石散治小兒小便不通問亂

葵根一握

滑石

木通各一兩

牽牛子半兩炒

石件持為末每服一錢以水一大盞入燈心葱白各少許煎六分

去滓投溫服乳前食  
朱砂丹治小兒心神煩燥小便赤不通

朱砂一分

滑石一分

犀角屑

黃芩一分

車前子一分

甘草一分

右件藥搗羅為散入朱砂同拌勻每服半錢煎竹葉湯調下食前

張說難拳方治小便不通  
用大蒜不以多少研爛攤在紙上臍下貼之

聚寶方治小便不通

獨顆大蒜一枚

鹽花少許

山梔子仁

右三味搗爛攤紙花于上貼臍良久通未通更塗陰囊上立通

莊氏家傳治小便不通  
用白礬為末每服一錢溫漿水調下

長沙醫者丁時發傳石韋散治小兒小便不通

石韋五分

瞿麥

滑石

甘草各一分

右為末每服一錢水八分小麥一百粒同煎五分去滓溫服量兒大

小加減

湯氏望嬰孩妙訣凡此候皆因心經不順或伏熱或驚起心火上炎不降  
濟腎水故使小便不通溺血者由膀胱熱極故也家傳木通散方治小便  
不通腹痛

木通一分

牽牛子半兩炒滑石一分

右為末燈心葱白煎去滓大小以意加減服

王璵百一選方趙使君云其子年十餘歲因小遺為大所驚當時雖無事  
後旬日忽小便不通大便初覺自利後復如常率半月餘方一小遺飲食  
起居間皆無所苦亦無腹脹肢體腫滿之患凡服通利水葯治淋濕藥並  
不效移書問一醫姓劉忘其名寄三方率第一方用地骨皮一兩防風半  
兩甘草一分為細末煎麥門冬湯調下不四五日即通服之不已即三日  
一通終劑已兩日一通矣再服第二方用青皮陳皮通草之類不能盡記  
數服即平愈第三方不曾用也

演山省翁活切口譏屢及蘇治小兒心經虛熱小便濕痛筒管內痰不可

忍者宜服此方

蠶蛻紙不拘多少

右燒留性為末入麝每服半錢七燈心湯調  
曾世榮活幼心書薑鼓餅治久因濕氣中於膀胱復為風邪客熱攻激小

使不利臍凸腹脹食減作痛先投解表散  
生薑一兩碎切生葱五莖切碎豆豉七錢潤者生鹽一錢

生蒜二兩切碎酒醱糟一燈盞無以好酒代穿山甲同上製

右件入右鉢內同杵爛捻作餅子二寸間用微火烘熱帶溫貼臍上  
外以絹帕兜住如冷依前法換帶溫者貼之或再以火畧烘煖亦好

永樂大典卷之一千三十三

永樂大典卷一千三十三

三十六

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*