

須齋鈔

和書門類		四三	一三六	三
號		三	函	册

內閣文庫		和
四三	一三六	三
函	册	號

內閣文庫	
番號	和 43103
冊數	3 (1)
函號	195 18



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



▲月水論第一

▲月水不調論第二

仁散

▲月水不通論第三

又方 萬病圓 通經圓

牛膝散

▲月水或行或不行心腹刺痛第四 温經

湯 桂枝桃仁湯 如神湯 葦撥圓

加減吳茱萸湯 桃

當啟散 琥珀散

澤蘭湯 劫勞散

▲月水不斷方論第五 牡蠣圓 黃芩湯
又方

▲崩中論方第六 小薊湯 阿伽佗圓

熟艾湯 神應散 金華散 縮砂散 如神

散 又方 煮附圓

▲赤白帶下方論第七 乾薑散 又方

乳香散 又方 又方 又方 千金溫經湯

又方 又方

▲白濁多白帶方論第八 金鎖正元丹 祕

傳玉鎖丹

▲月水期過方論第九 當敗散

▲血分水分方論第十 人參當敗圓 葶

歷圓

▲通用摠藥方論第十一 四物湯 佛手

湯 丹參散 二聖散

頓醫抄卷第一

性全集

婦人第一

婦人論

夫婦人之病者此男子十倍難治嗜欲從丈夫
 多故作病又十倍加之嫉妬憂恚慈戀愛增執
 著不能押心作病根深依是療之其難
 況懷妊婦人大事也若一時調護昧其則母子
 共危之ホト下如累卵豈可輕忽凡男子同病交
 載諸方又心以計相互可通用今宗舉異男病

婦人病論卷第一

三

可明治方

▲調經門

▲月水論第一

歧伯云女子七歲ニテ腎氣盛ニテ齒替髮長
生二七ニテ十四歲ニテ天癸初來テ天癸ト八月水ヲ云
也任脉衝脉ト女子ニテ有ニ一ノ血脉異ニ男子ニ衝脉血海ト
湛血海也任脉胞胎ト宿子處也此二脉共
屬腎腎強盛ニテ六衝任ノ二脉流通ニテ經血滿
盛ニテ隨時下ニ三十日一度見故月事ト七月

經ト七月水トモ云也又天然下水ト六天癸トモ
云也象月盈缺故滿盛ニテ則溢下也依是月
水時慎護身可如產時此時受病輕キ則成宿
病重キ則致死可不慎哉蓋驚時則血氣錯亂
經脉滯身ニサカレハ則血分勞瘵等病ヲナス若恚
怒ハ則氣上レ氣上レ六則血滯リテ寒腰腿則月
水欲行時苦痛此血氣若昇滯ハ頭腹心肺背
脇月水欲行時苦痛也若怒窮ハ傷肝則目眩

脇下甚^ク吐血成^テ瘰癧^ノ腫病^ニ凡^ソ月水時中^ニ
風病^ニ風被^テ侵^ム冷病^ニ仍^テ月水前後中間^ニ腹立^テ
恚物^ヲ愁嘆^キ風寒濕諸惡事^ヲ不可^ク侵成時^ハ
少^シテ如秋毫感病事^ヲ重^キ夫如山岳^ノ可不慎^ム
哉

▲月水不調論第二

夫月水不調^ノ立事^ニ依勞傷^ニ血氣身虛弱^ニ則^チ風冷侵^ム之^ニ故衝^ク之^ニ故衝^ク任^ノ二脉^ハ如表裏懷妊^ス

時^ハ此血止^リテ成^リ子^ニ血肉生子^ニ成^リ乳汁^ニ或^ハ二三年^ニ
月水止^リテ不^レ下^ル陰陽調^ル時^ハ此二脉治^リテ月
水定時^ニ下^ル若陰陽不調^ナレ二脉損^ニテ月水不
定^ス若陽氣過^ニ又^ハ月^ノ初^ニ月水下^ル若陽氣不足^ス
ナ^レ月水月^ノ末^ニ下^ル若熱氣過^ニ又^ハ血解^テ月水
忽^ニ多^シ若寒^ニ冷氣過^ニ又^ハ血凝閉^テ月水忽^ニ少^シ
又極熱人崩中^ニ無^ク隙^ニ月水下^ル極^ニ寒^ニ人閉
寒^ニ上^テ月水止^ル天寒^ニ又^ハ地凍^ニ水凝^テ如成^ル氷^ニ

婦人頭昏目眩

天暖ナハ米又解^ケ血解^ケ凝^ルト以此可知如此
不定^ラ月水不調ト云也

加減吳茱萸湯 衝任ノ二脉衰弱^{シテ}月水不

定^ラ或月ノ前或月ノ後或崩漏不止若赤白滯

下上テ白^キ赤^キ交^リ下^リ小腹^{ツリ}痛^ム月水欲^ス下期^ニ

頭重^ク目眩^キ飲食減少^シ胸噪^キ肌焦^悴瘦

息短^ク苦^シヲ治^ス 吳茱萸 半兩 麥門冬 志

乾姜 白茯苓 牡丹皮 去心 楠木香 炭

桔梗 各三兩 甘草 二錢半 當版 半兩

細辛 一錢半 防風 官桂 各一分 半復 七錢

湯^{ニテ}七反洗^テ 焙^ス乾^ス

右細剉^合テ每服四錢水一盞半生姜二片

棗一箇入^テ七分煎^{シテ}滓^ヲ去^テ空心

温服^ス

桃仁散 婦人ノ月水不調^{シテ}或^ハ淋瀝不

斷^シ上^テ月水不斷^シ少^ク下^リ漏^ル也時々止^レトモ

常大血ヲ下シ手足身躰虛弱ニテ飲食不
 不能又腹中堅痛テ行動不事不能月水又
 月前月後若月ヲ經テ止リ身重ク只眠之事ヲ
 好酸物ヲ好食多洩 桃仁去皮 甘草
 半復洗焙各一兩 赤芍藥 生地黃焙各三兩
 澤蘭葉 牛膝 當歸 桂心去麤皮 牡丹
 皮去心 人參去芦 蒲黃 川芎各一兩
 右細剉合テ每服三錢若四錢ノ重水一盞

半生姜三片入テ七分煎ノ滓ヲ去テ空心
 温服久能服有効レ

▲月水不通方論第三

夫月水不通大事ハ血氣勞傷不依テ躰虛風
 冷氣ヲ受依テ血澁結レテ月水不行久ケレハ
 血内殘リ堅リテ如塊各血痕上毛血瘕各チリテ
 年月ヲ經テ瘦疲ヤセツカレテ死也又脾胃虛ツク不故
 血水塞リ澁リテ後水腫成也或吐血レ或大

婦人經閉方論第三

便ヨリ血ヲ下ス事多クハ血盡テ月水不通ナ
事アリ是ヲ血枯ト云是ハ血ヲ治ル藥ヲ服スヘシ

當飯散

月水不通ヲ治ス 當飯散 川山甲 イ本ゾクツニセ
テイリヨカセ

蒲黃 各半
兩 辰砂 一錢 麝香 半錢

右細末シテ每服一錢温酒ニテ服スヘシ若酒
ノニサル人ナス薄荷煎物醋ヲ少シテ搗立テ
服スヘシ

琥珀散

月水止テ心胸迷悶 腹臍如攪痛 各

攻ツルヲ治ス 烏藥 一兩 當歸 蓬莪朮 各

一兩

右細末シテ每服一錢温酒ヲ以テ食前服ス
生冷ノ物油氣ノ物ヲ可禁若産後ノ諸病ハ
生姜ヲヤイテ酒ニ入テ温メタルニテ可服ス

又方

厚朴 鹿皮ヲ去テ細割テ生姜汁浸シテ
一宿ニテ取出テ焙乾スヘシ

右每服四五錢水一盞半入テ六七分煎シテ
滓去テ空心温服此藥梅師方ニ出セリ已ニ

婦人血氣不通

試名ニ有効月水不通ニ最上ノ方也

萬病圓

月水止リテ臍ハツヲ回リテ痛ク筋リ痛

及産後ノ惡血不下血氣不調ニテ腹中堅リテ

不散及癥瘕等ノ病ヲ治ス

乾漆

打碎テ去器ニテ
炒テ烟ヲ盡シテ

取出シテサミシテ
未スハニ

牛膝

去芦ヲ剉テ酒浸シテ一宿シ
取出シテ焙乾シテ各一兩

右細末シテ生地黃汁ヲ一盞入テ石鍋ニ能

煉ツメテ堅クナリテ○是程ニ丸シテ空心ニ每服

二丸三丸ヲ温酒ニテ日ニ服數ヲ不可増ス

通經圓

婦人ノ月水不通及室女ノ月水止リ

出ハ腹痛ニ或ハ血瘕腹ニアルヲ治ス

桂心

去麋皮

青皮

去裏小麥
滓交テ炒ル

大黃

煨

川椒

炒シテ汁ヲ出
黒目ヲ去ル

蓬莪朮

蒸シテ割

川烏頭

炮皮
臍ヲ去

乾漆

碎テ炒テ烟
盡テ碎

當飯

去芦

桃仁

去皮一尖ヲ小麥
滓ニ交テ炒ヘニ

右細末シテ四分テ一ヲ醋ヲ以テイリ子リテ

子ハトアル時餘ノ藥ヲ搗交テ能々搗合テ

○是程ニ丸シテホシカワカヒテ每服廿丸沸湯

醋ヲ少シ入タルニテ服スヘシ若ハ三十九ヲ與ヘシ
温酒ニテ服スルモヨシ空心食前服スヘシ室女
月水止リタルニ青蒿等少冷藥ヲ不可與血
凝堅リテ彌不通也

澤蘭湯 室女ノ月水不通治ス 澤蘭 三兩日奉
ニ号ト云

當皈 芍藥 各一兩 甘草 半兩 **劫勞散**

心腎共ニ虚疲ウツケツカレ咳スル下或ハ二色或ハ三色之夜ハ
煩々煩燥ウツケツカレ下散スレハ則冷身毛冬夜盜汗マ

憂多見咳嗽ニテ痰ヲ吐クニ痰ノ中ニ紅線ヒト上テ赤キ血

筋アリ是ヲ肺痿ト名ク漸身瘦疲傳屍病ニ

似多リ此藥是ヲ治 白芍藥 六兩 黄耆 甘

草 人參 當皈 半复 ユニテ七
反洗 白茯苓 熟

地黄 五味子 阿膠 各三兩
炒爲玉

右細剉ミ合テ每服二錢水一盞半生姜十

二片棗三ケ入テ九分煎シテ温服不定時

日ニ服スヘシ陳惣領カ云ク楊元昇カ女カ替カスルニ

及テ病證甚危シ一年間百藥共試レニ無
有^レ効偶逢^テ名醫得^テ此方只一劑ヲ服ス除^ク其
病根仍^テ錄^シ此方傳^フ入^ル

牛膝散 婦人ノ月水滯リテ不快^{ヨロコバ}臍腹ツリ

痛ヲ治^ス 牛膝 一兩 桂心 去^ル鹿皮^一 赤芍藥

桃仁 湯^ニ浸^シテ皮尖ヲ 延胡索 玄胡索
去^リ忌^ム鉄^ヲ 同物也 當^取

牡丹 去^ル心 川芎 木香 各^一三兩

右細末^シ每服二錢温酒^ヲ以^テ食前^ニ可^ク服^ス

▲月水或ハ行^キ或ハ不行^ク心腹刺痛第四

夫婦人ノ月水欲^ス下^ニ時腰腹刺^シ衝^ク如^ク痛^キ事^ハ
氣血疲^シ傷^テ虛弱^キ故^ニ風冷ノ氣是^レヲ侵^シテ衝^ク任^ノ
二脉ノ間凝^リ堅^リテ風冷ノ血氣^ト相^闘フ故^ニ苦^シ痛^ム
甚^シキナリ血^ハ是^レ心^{ナリ}血亂^レ損^ス故^ニ心^ノ不定^シ心^ノ
不定^シ是^レヲ血氣風冷^ト相^闘フ故^ニ不^レ知^ル或^ハ邪^ノ
氣^ノチヤ^ニシ或^ハ鬼神^ノ祟^ト言^テ祈^リ祭^ル元^{ヨリ}
血脉ヨリ發^スル故^ニ敢^テ無^効此^ノ事^毎人^此理^迷テ

婦人血脈論

忽失命悲ニサルケニヤ呪術祈禱ヲ止テ温經湯等少藥ヲ可與フ

温經湯 又名牛黃湯 月水快ク不下ラ臍ヲ回リテ

痛ニ臍ノ兩方刺衝ク如ク疼痛ヲ治ス 脉沉緊ニルル

月水滯リ人多ク可知ル 當皈尾ノ方ヲ 川芎

芍藥 桂心去テ麋皮ヲ 牡丹皮去心 蓬莪

木各一分 人參 牛黃加減方 甘草 牛

膝各二分

右細剉合テ每服三四錢水一盞半入テ八分煎テ滓ヲ去テ温服即時ニ有リ効此レ祕藥也

桂枝桃仁湯 功能如前 桂心去テ麋皮ヲ 芍

藥 生乾地黄各二兩 桃仁去皮調フ 甘草

一カ二分 牛黃一カ

右細剉合テ每服三四錢水一盞半生姜三片棗一ケ入テ一盞煎テ滓ヲ去テ温服日ニ一

女入血... 金...

三服忽^ニ苦痛止^リ即^チ月水快^ク下^也

如神湯

功能如前 延胡索^延 當歸^當 各五^各 升

牛黃 一^一 升

右細^ニ剉^シ合^テ每服^ニ三錢^三生薑^三片^片水^一盞^盞半^半
入^テ七^分煎^シ滓^去温服^ス陳氏方^桂心^心
等分^ニ加^最腰^痛有^効此^藥甚^有神^驗
立^地止^痛月水快^ク下^也

草撥圓

月水時^ラ不定^下時^レ腹^腰痛^多治^治

草撥

樞^ク對^テ塩^ニ交^テ炒^テ
復^塩ヲ^去ヘ^シ

蒲黃

少^少炒^炒
各^各三^三升

右細末^ニ煉^蜜○是程^ニ丸^レテ每服^ニ三^三
四十九^ツ食後^ニ米飲^ニ塩^少入^テ搯^立テ^テ
可^レ服^最妙^也

▲月水不斷方論第五

夫月水^ノ長^ニ下^リテ不^レ止^事是^モ衝^任ノ^二脉^一
虛損^セル^ニ依^テ血^ヲ納^ル事^依不^レ能^血下^也
是^ハ微^熱ト^テ損^シ虚^ケタル^處容^熱ノ^來ル^故也

婦人血... 金...

下所詮風冷侵時ハ血凝堅リテ不下熱ノ侵時ハ
血解テ下止下大寒ト熱ト故也源ト皆衝任
二脉ノ虚ケ弱キ故ナリ月水常ニ下テ不止身躰
面目皆シホミ黄ニシテ心忪物忘シ子ヲ不産

牡蠣圓 婦人ノ血海虚損シテ月水不止治

牡蠣圓粉 赤石脂 燒テ二三度酢浸ス 代赭石 燒テ二三度酢浸ス
浸谷 一丸 阿膠 熟灰ニイリテ煮 川芎 當朮 鹿茸 劉涓子浸燻
續斷 劉涓子燻 乾姜 各三分 甘草 一分

右細土ハ煉蜜テ丸メ〇是程每服二十九
食前温酒テ可服ス

黄芩湯 月水不止治 黄芩 五分 當朮 二分

栢葉 各一丸 蒲黃 各四分 生姜 二分 艾葉 一分
生乾地黄 二十四分 伏龍肝 十二分

右細剉合テ每服五錢水二盞入テ七分煎
滓ヲ去テ温服ス

又方 月水不止治 蓮蓬穀 分ニテ丸巢ヲ取集テホニ各ナリ

右灰ニ燒テ每服一錢ヲ温酒ヲ以テ空心可服ス

又方 婦人ノ血崩心痛上テ月水下リスヨレ及産

後血下リスヨスニ依テ心ヲ痛事甚キヲ治ス烏賊

魚ノ腹中ニアル墨ヲ取集テホシカワカシテ少シ火ニ

焙焦シテ沸湯ニ醋ヲ必入テ搗立テ每服一二

錢ツ可服最上ノ藥也尤可秘ス

崩中論方第六

夫崩上云臧府虛損シ血脉疲傷ル故ニ暴月

水ヲヒタシク下リ腰背痛也是容熱上テ虛弱キ

所ニ或復々天ニアツケテ多或身ヲス口ニ暖スニ

依テ内熱ス故ニ口ニ血多ク下也小薊湯ヲ可服

小薊湯 小薊葉莖共ニ 生地黃汁一盞 白

木半兩到

右件ノ三種ニ水一盞入テ半分煎テ滓ヲ

去テ温服ス

阿伽陀圓 崩中下血ヲ治ス 胡椒 紫檀

鬱金

茜根

山石榴皮

是八尋常少石榴異也
但尋常石榴皮毛止

功
可

右等分細末水ヲ以テ搗合○是程九

每服二三丸阿膠ノ煎湯テ可服一方

人參 白檀ヲ加テ黃皮入テ山石榴皮ヲ

止テ合スモアリ

熟艾湯

崩中下血ヲ治ス最上也

熟艾

雞卵

阿膠 半兩

乾姜 一錢

右細末ハ合テ先ツ水五盞モクサヨモキ乾姜

入テ半分煎シテ後阿膠ヲ入テ煎解シテ

二服ニ分テ温テ空心ニ可服ス日服六テレ

極テ有効屢是ヲ服スヘシ

神應散

崩中下血不止治 桂心

右細剉テ鍋ニ入テ焦シテ灰ナシテ細末シテ

每服一二錢飯湯ニ可服不定時

金華散

婦人ノ血室有熱俄下血不止諸

婦人血室有熱俄下血不止諸

藥ヲ服スニ無効此藥能治ス 延胡索 瞿麥

穗 當皈 乾葛 牡丹皮 各二分 石膏 五兩

桂心 別研テ 七蓋半 蒲黃 一兩一分 威靈山 七錢半

右細末ノ每服二錢水一盞入テ六分煎テ

空心温服日ニ服此藥内熱ニ殊ニヨシ

縮砂散 崩中下血ヲ治ス極テ有効 縮砂

仁 右土器ヲ以テ炒香クシテ細末シテ每服三

錢ヲ米飲ニテ一日ニ三服スヘシ

如神散 婦人崩中下血白血カク血ヲ治ス 香

附子 忌鉄 赤芍藥 各等分

右細末ノ每服二錢水一盞塩一捻入テ七分

煎シテ温服ス日ニ三服スニ必ス有効

又方 香附子 毛ヲ燒テ研テ炒焦シ 細末スヘシ

右每服二錢ヲ温酒ニテ服スヘシニ三服ニ立

地有効若血下事甚ク心ホレ目暗ナラハ

三錢ヲ可服米飲ニテ服ス生ヨシ許季士カ云

女入血... 卷之二

下血不止治又五色ノ惡キ物下極テヨシ
凡香附子ハ佐血調氣是婦人ノ仙藥也
云ハリ常ニ是ヲ服スヘシ

者附圓 婦人室女一切ノ血氣經脈不調臍

腹ツ痛面色黃ハ三裏ヘナサワカシカ少腹
脹腸ノ下痛頭重ク目眩^女心地アク飲食減
少崩中漏下白帶下及大便血下積聚瘕
瘕等^三痛^之是ヲ服ス極テ有効^レ 香附子 忌鉄

右先^モ燒^テ升^テ嚴醋^ヲ以^テ能^ク煮乾^カレ^テ

ヤカ^テ炒^テ細末^ノ米^ノ粉^ヲ醋^ニ糊^ニ煉^リテ

搗^合テ○是程^ニ丸^シテ每服^三十九^ツ米飲^テ

可服^ス不定時^ヲ婦人^ノ墮胎^ト流產^シテ平不^レ

治^極テ有効^シ 一方^ニ艾^ヲ加^テ煮^モ良^也

▲赤白帶下方論第七

夫赤白帶下ハ赤白相交^テ下^ル也五藏六府共
疲^テ血脉弱^ク或勞傷過度^ト男女交會^ル下

婦人血... 卷之二

七

繁_ニ依_テ血海疲損_シ或_ハ身_ヲ苦_クテ_ハ不止
身弱疲_テ血氣弱_ク冬_ニ時風冷_ニ血筋_ニ入_テ聞_フ
故_ニ血色變_シ或_ハ白_ク或_ハ黑_ク赤_ク若_ハ黑豆_ノ
汁_ノ如_シ若_ハ雨_ノ滴_ノ色_ノ如_シ下_ニ是_ヲ帶下_ト也
熱_ス赤色多_シ冷_ク白色多_シ冷熱同_キ程
ナ_ハ赤白等分_ニ相交_リ下_ニ也故_ニ赤白帶下_ト
云_也帶下_ト兼_テ下_ト言_ハ心_{ナリ}凡_レ帶下崩
中_ノ人_ノ脉_ハ少_ク虛_弱滑_{ナリ}善_ク太_緊實_ニ數_{ナリ}
死_ス不_知知_ルへ_シ脉細_シ遲_キ生_クへ_シト知_テ可_レ治_ス

乾姜散

赤白帶下_ノ年月久_ク不差_ラ治_ス 乾姜
半兩 白芍藥_二分 右各黃色_ニ炒_テ細末_シ

空心_ニ米飲_ニ每服_ニ一錢_ノ服_スへ_シ日_ニ二服

又方

張氏方 是_ハ甚_ク有_レ驗_ニ 乾姜 芍藥 香
附子_各五兩 甘草_二兩_{二分}

右各黃色_ニ炒_テ同_ク細末_シテ空心_ニ米飲_ニ

每服_ニ一錢_スへ_シ日_ニ三服

婦人血脈論

婦人血崩

乳香散 赤白帶下ヲ治スニ極テ有効ニ 草菜

一筒ヲ皮ヲ去テ乳香ニミリト小麥粉ヲ糝ノ累衣テ蒸
灰ニ埋テ以テ蒸シ焦シテ小麥粉ヨミセラルホト焦シテ小麥粉共細研

右細末シテ每服二錢ツノルキ米少飲ニテ可服

病重ク久キ物ハニ錢ツノ可服

又方 婦人血ノ下事不止治ス 亂髮 皂莢ヲモミテヨクハ

アカラ洗イテ弃テ
灰ニ燒テ細末ス

右每服一錢空心ニ温酒ヲ以テ可服

又方 鹿角 灰ニ燒ノ末スヘシ

右是ヲ食前ニ温酒ヲ以テ每服二錢ツノ日ニ下

二服

又方 桃仁 灰ニ燒テ細末スヘシ

右是ヲ每服二錢温酒ヲ以テ可服日ニ三服

千金温經湯 婦人ノ三十六ノ病腹脹唇乾キ

夕ニ發熱ノ臍下ツリ痛ニ手足ホトツリ時々痢

下レ月水不調ニテ久ク懷任セス及ビ産シテ年

經テ如此病ヲ治スニ甚ク有効 吳茱萸 二兩

婦人血崩

白芍藥 當歸 芍藥 各二兩 麥門冬 去心

半復 各二兩半 湯七友洗 人參 阿膠 熱灰炒 牡

丹皮 去心 甘草 桂心 去鹿皮 各一兩

右細剉合 每服三錢水 下益生薑五片入

七分煎之滓 去之空心食前温服 此

藥服之程 生冷物生葱神馬藻菘可禁

又方 鹿茸 醋浸之 當歸 各二兩 蒲黃 半兩

右細末 每服三錢若五錢温酒 下日三

服スヘシ

又方 帶下ヲ治ス最上也 芍藥 七友炒

焦テ合 右是ヲ每服三錢酒ヲ以テ可服

婦人白濁白媠ノ方論第八

夫婦人ノ小便白濁リタルヲ白濁上云小便媠

精交下白媠上云是ハ心腎共ニ疲弱クテ水火

陰陽不升降所致其謂腎ヲ疲カレ損タル故

虚冷テ白濁白媠トナル也

婦人白濁白媠ノ方論第八

金鎖正元丹

白濁白痿ヲ治ス

五倍子

裏虫 屎ヲ

掃 茯苓 各四兩

補骨脂

酒ニ浸テ 炒十カ

巴戟 去

胡蘆巴 炒

肉蓯蓉

焙各 八カ

辰砂

別ニ碎テ各 一カ二分

龍骨 一兩二分

右細抹シテ米粉ヲ酒ヲ以テ糊ニ煉テ擣合テ

○是程ニ丸ノ每服二十九空心温酒ヲ以テ可

服塩湯モヨシ日ニ二三服ス

秘傳玉鎖丹

小便白濁ヲ膏ノ如クシテ心

弱シ面ノ色ツシニ盜汗多ク起居無力治ス 茯苓

苓 四兩

龍骨 二カ

五倍子

十二兩

右細末シ米粉ヲ水ヲ以テ糊ニ煉テ擣合テ

○是程ニ丸シテ每服四十九ツ空心塩湯テ

日ニ三服此藥性温カナレトモ不熟カラ大有神

効

▲婦人月水ノ期ヲ過ル方論第九

月水或ハ三四月止リテ不下或ハ一月ニ二三度

下腰膝疼痛^リテ甚^クシテ六當散散^ラ可^レ與^フ

當散散 是^レヲ服^ス六月水定^テ時^ヲ調^リ下^キ也 當

飯 川芎 白芍藥 黃芩 白朮 各半兩

山茱萸 去核^ラ 二反半 右細^ク抹^シテ每服^ニ錢^二温酒^ヲ

以^テ空^心食前^ニ可^レ服若^シ足冷^ハ黃芩^ヲ除^テ桂心^{一兩}ヲ可^レ加^フ

△婦人ノ血分水分方論第十

夫血分^ト云病^ハ婦人ノ月水留^リ絶^テ手足^浮腫^リ

腫^ハ小便^滯リテ不快^ク血分^ト云也 是^ハ血滯^リ留^テ

變^テ水^ト成^テ皮部筋^ノ中^ニ亂^レ入^テ腫^ル故^ニ血分

云也 水分^ト云六月水^ハ不留^本小便^滯テ不通^ス

故^ニ身^面浮腫^ル然^レテ後^ニ月水^滯ル是^レ水分^ト

云也 少^キキ差別^{アリ}能^ク病者^ニ問^察シテ可^レ與^フ

藥^ヲ血分^ハ人參當散圓^ヲ可^レ與^フ水分^ハ葶藶

圓^ヲ可^レ與^フ

人參當散圓 是^ハ血分^ヲ治^ス根本^ニ月水留^リタル^ニ

婦人血分方論 卷之十 三十三

依テ後小便滯リテ手足悉腫ル血分上云太腹

水病似多然此由不問察水腫療治

ナサハ甚可有誤此藥最良也

當皈 桂心去麋皮 大黃紙裹テ水濡シテ蒸テ剉焙又飲中ニ今

瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓各半 葶

藎炒別研ル一分

右細末シテ煉蜜テ〇是程丸ニテ二三寸

丸ツ米飲ニテ空心ニ可服ス

葶藎圓 水分ヲ治ス是本小便滯リテ後二日

水留リテ身面腫也此藥治之葶藎

續隨子去皮研各半 乾筍タケノコヲホシタル也一兩

右細抹シテ棗ノ肉搗合テ〇是程丸ニテ

每服七丸ツ竹葉ノ煎物ニテ可服若劑是

元不下續隨子葶藎ス一分ツ白木

半兩可加

▲婦人通用惣藥方論第十一

婦人通用惣藥方論第十一

夫通用^{ソフ}摠藥^{ソウヤク}者婦人一切病及產前產後懷妊ノ間病^レシテ治セズ云コトナレ今此摠藥ハ古名醫聖人ノアテカウ處也ト云ヘモヨク^レ機^キ人^ニ依テ或ハ加或減^{シテ}可用刻舟索劍^{ツクボネ}板^{イタ}圖^ヅ尋^ミ馬^{ウマ}守^テ株^ツ待^ツ免^ウ柱^キ付^テ膠^{カウ}ヲ不可^ラ望^ム谷^ムヲ

四物湯

婦人ノ月水或ハ月前或ハ月後或多

或ハ少腰^{ウシ}肺^{ハク}腹中疼痛^シ或ハ崩中漏下或ハ半產^ハ上^ニテ子^ヲウ^ニカケ^テ不出^ル或ハ惡漏^ク多^ク下^リ或ハ

血不下^ラ腹痛^シ或ハ懷妊^シ腹痛^シ血下^リ胎中不安

產後^ニ血^堅如塊^ニ腹中^ニアリ^テ不解^ケ或ハ失血

過多^トテ產海^ニ血多^ク下^ル此藥^ヲ通^シ治^ス之^ヲ如神

有^リ効張^カ芭^バ道^カ云^フ此方^ハ婦人ノ百病^ニ此^レ四物

湯^ニ吳^ウ茱^ウ萸^ウヲ加^テ煎^シ服^ス最^モ勝^トリト云^フ

徐中明方^ニ香附子^ヲ加^ル最^モ妙^ナ也^{ナリ}當^ル師^ト

白芍藥 川芎 生乾地黄 ^{焙^ル}

各等分^ニ割^シ合^テ每服四錢水一盞半入^テ

八分煎滓ヲ去テ食前ニ温服但地黄、和劑
方ニ云ク熟乾地黄用ト云リ今茲コト生乾地黄
用事本草云男子ニ熟乾地黄女子ニ生乾地
黄ヲ用テ見ヘタリ今依テ之常服セニ此四物
湯ヨロシ若月水滯リテ腹中ニ血痕等ノ物
堅リタラ蓬莪朮官桂ヲ等分加テ煎シテ可
服若産後故血ヲ下シ新血ヲ生セト思ハハ本
四物湯ニ生姜ヲ加テ煎シテ服若懷妊ノ間

腹動テ不安下ラ艾葉ヲ十葉ハカリ加テ煎シテ
可服又葱白根阿膠ヲ少加テ煎シテ服ニ七
日服シテ可有効若氣弱ク血海不調ナラハ
一月服シテ可有効若産後ニキモキヘシキキニ
或腹脹リ或痛ニ胸子脹悶絶レ或寒熱トテサケ
夕千ホトヲリテ瘡病ノ如ク手足疼キ痛ニ四
物湯ニ延胡索沒藥香白芷ヲ等分加テ細
末シテ沸湯ニ醋ヲ少入テ搗キ立チ多ク可服若

童子ノ小便ト酒ト等分入合テ温テ服スル最
上ナリ若崩中下血不止熟地黄蒲黃各一
兩ヲ加テ煎シテ可服嘔逆ニ白朮人參各半
兩ヲ可加若藏府滑泄トテ無隙痢下ハ桂心
并炮シタル附子各一分可加若喉乾キ水ヲ飲
頭痛ニ知母石膏各半兩加テ可煎一方婦
人ノ血虚シテ心服ウラリ痛テ不可忍地黄ヲ除キ
乾姜ヲ可加是ヲ名ウ四補湯若老女常風秘テ

冷テ而モ痢ノ結スル青皮ヲ等分加テ煎ソ
服スル痢快出ル也又大黃桃仁ヲ炒リ加テ服スモ
痢快ク下ル也又女ノ赤痢血痢トテ血ヲ痢下ス

阿膠ウ艾葉ウ加テ可服是名ウ小物湯極有ウ効

佛手湯 産前産後ノ腹痛身熱頭痛及諸病

治ス産ウ終ウテ人則先此藥ヲ與ヘテ後餘藥ヲ可服

此藥能々除諸疾除故血生新血ウ 川芎三兩

川當皈三兩

婦人頭昏目眩

右細末、每服二錢水一盞酒少入テ七分煎温服。一方劉合テ煎至可服凡欲產時抱立先此藥ヲ一服可與産畢テ又一服可與産後二日內ハ毎日二度ツ可與三日以後ハ毎日一度ツ可與。一方川芎當歸等分ニ合テ煎テ服スラハ名ッ芎歸湯一切血疾懷妊時胎脹下血及隨胎上テ流産下血多及産後多下血金瘡ヲカフテ心ホトヲリ

目眩キ頭重ク舉テ頭ヲタウレトシ肝キエスルヲ悉皆治若産後血上リテ目眩キナトセハ此藥芍藥ヲ加テ可服名ッ桂香散又産後腹痛不可忍桂心ヲ等分ニ加テ酒童字ツ小便トヲ加テ煎テ可與是服スレハ立チ地ニ有効又名當歸湯若懷妊ノ胎中子死テ不生及子不死胎動不安每服水酒ト交テ煎テ繁ク可服子已ニ死シタス則産ル子不死又胎安此藥ス

婦人頭重

名琥珀散可產月入之每日是之可服瘦子
產令安穩又名君臣散婦人室女心服之痛
月水不調之水以煎之常可服又名苦
當散散婦人血氣不安氣上之喘之脚
腫多之六等分細末之每服二錢空心艾之煎
物之可服又產後血上之胸之衝之腹脹
之氣絕之者與之甚有之効難產子逆
產之橫之產及腹中之子死之不產每服四

錢黑豆一皿炒之水一盞童子小便一盞入
一盞煎之二分之二度可服一服之則生極
有之効產後頭痛及吐血之荊芥加之煎之可
服忽有之効

丹參散 此藥之功能四物湯之全同之產前產
後月水之多少小宿血堅及難產墮胎死胎崩中
帶下月水不調冷熱虛勞瘦之通之服之
極之有之効 丹參 十又 右細末之每服二錢

温酒^ニ可服^ス月水不調^ニ食前^ニ可服^ス熱勞^ニ不
定時^ヲ可服^ス

〔二聖散〕 産前^ニ是^ヲ服^ス八則安胎^ヲ産後^ニ是^ヲ
服^ス六下^ニ惡血^ヲ胎衣不下^ニ服^ス六立地^ニ下^ル也

川芎 羌活

右等分細末^ノ每服^ニ錢水七分酒二分合^テ
一盞入^テ七沸^ニ温服^ス〔一〕

頓醫抄卷第一終

▲中風方論第一 排風湯 三生飲 參

蘓飲

附子理中湯 加減小續命湯 小風引湯

▲婦人中風角弓反張口噤方論第二 防

風湯 又方

▲婦人血風心神驚悸方論第三 排風湯

▲婦人風邪顛狂方論第三 羚羊角散

▲婦人血風白虎歷節走疰方論第五 芍

婦人血風癩疹瘙痒方論第六

藥知母湯 附子八物湯

▲婦人血風癩疹瘙痒方論第六

消風散 四物湯 又方 逍遥散

▲婦人腰痛方論第七 如神湯

▲婦人脚氣方論第八 大腹皮散 半夏

散 薏苡仁散

▲勞瘵方論第九 茱白皮湯 防風湯

補肺湯

逍遥散 枳殼散 熟乾地黄丸 黃耆散

秦艽散

▲寡婦寒熱如瘧病方論第十 生地黃圓

▲婦人血風第十一 赤芍藥散 草豆蔻

散 進食散

▲婦人夢與鬼交方論第十二 茯神散

▲婦人傷寒傷風方論第十二 黃芩芍藥湯

當故湯 瀉心三黃湯

婦人血風癩疹瘙痒方論第六

婦人咳嗽方論第十四 黃耆散 含化丸

定喘湯 金不換散 橘皮湯

婦人喘息方論第十五 神秘湯 神授

湯 九寶湯

婦人痰方論第十六 旋覆花湯 柴胡

半復湯

金沸草散 四七湯 大半復湯

頓醫抄卷第二

性全集

婦人第二 中風方論

凡中風有各種之病相此下一一可明之又有
中氣中寒中暑相似中風誤致中風療治立地
損入夫中風皆陰陽不調血氣錯亂喜怒過
甚少飲食不量嗜慾依忒心血脉或虛或壅身
虛毛孔開弱不緊依是風邪傷身故中風中
云心也其病形昏昏朦々不知萬事延壅喉

舌強ツテ不能言忽顛沛手足或痿或痲身
不仁トテツクモ不痛我身上モ不覺齒クイツ
有不開口或眼口喎弦事アリ有種々之形治
方下委可明之中風上云ハ此病多ハ驕貴人生至テ
在世人之依事繁腹立嘔又依物深思案氣滯
不知神通逆氣上揚テ忽顛沛レ意朦々ト不
知萬事齒クイツ手足絃リ痲中風少モ不異
但レ中氣ハ口中涎ノコエナレ是ヲハ輒ク不可作汗
垂藥風ノ治方是ハ男女通治方不異能心得
分テ可療治但是等少中風中氣中暑等病通
先與菹合圓生心扶氣隨病相後可治凡中風
病年月積生依一日二日治不可差然今人纔
三四日服藥不差訛醫嫌藥是甚不可然久
服可差孟子云七年之病ハ未二年之艾是以テ
思七月病ハ三月服藥七十日病ハ二十日服
藥七日病ハ二日治可差誠二三十年病十

日并日治方以求差愚者也不限中風一切
病皆如斯凡中風藥男女異之必仍今少可
註大方男女中風藥下男子婦人通好見
名ヲ可用又藥治等分不可替

排風湯 婦人之中風物狂ハキヲ治白鮮

皮 白朮 白芍藥 桂心 川芎 當歸

防風 杏仁 去皮尖小麥 甘草 各二兩 白

茯苓 麻黃 去根 獨活 各三

右細剉合于每服三錢水一盞半 生姜四

片入于八分煎之滓去之温服不定時

三生飲 俄中風ノ口眼喎半身不從喉鳴痰

塞亦脉共沉伏之宜與之目眩心驚遍身冷最

好極熱人不可與 生天南星 一兩 生烏

頭 去皮 生附子 各半兩 木香 一分

右細剉合于每服三錢水二盞姜十五片合

六分煎之滓去之温服

婦人血虛... 卷二

參藜飲 中風ノ痰涎喉塞リ胸滿テ多ク吐キ

目眩キ胸煩燥レ胸噪噦キ手足痿引キ口眼喎

斜ニ半身不隨食スル則吐却レ頭疼キ痛身煩

燥ニ如傷寒治ス 人參 紫藜葉 半夏

茯苓 乾葛 前胡 各三 甘草 南木香

陳皮 枳殼 桔梗 各二兩

右細剉合テ每服四錢水一盞半薑七片棗

一ツ入テ七分煎滓去テ空心温服若腹中痛

芍藥ヲ加テ可煎

附子理中湯 五臟寒被傷口クイツ合テ

不開手足強痙音失テ不言治昔武士寒國

行時大雪降テ朝出眺望忽ニ目眩キ倒レ時

或醫師此藥ヲ與ニ劑服終愈被損寒最

可與 大附子 炮ス 人參 乾姜 炮ス 甘草 炙

白朮 各等分 右細剉合テ每服四錢水一盞半姜十

婦人血虛... 卷二

六

第一

片入テ七分ニ煎テ滓去テ口ヲコキアケテ可與
加減小續命湯 卒中風不顧萬事ヲ半身不
隨口眼喎三絃リ手足振ヒワキキ色ワキキ振
不能言身躰痺心老毛頭重目眩涎多筋絃不能
伸縮骨續目煩燥痛クノ床カハリスコアタ
及一切ノ諸ノ風及脚氣ノ足弱ノ天ノ曇時痛
治ス中風ノ藥ノ中ニ是ヲ爲第一 麻黃去根
防已 人參 黃芩 桂心 甘草 芍藥

川芎 杏仁去皮尖大炒 附子炮去皮 防
風一又半 各一又

右細剉合テ每服四錢ノ重水一盞半姜七
片棗二入テ七分ニ煎テ滓去テ温服久ク服
スレハ必有効若心溺多ス扶神遠志ヲ可加
骨節煩燥痛附子ヲ棄テ芍藥可ニ一倍
若骨際冷痛桂心附子増シテ可合嘔吐
腹脹ハ入參ヲ増テ半夏一兩可加若汗無

諸病皆收

婦人倒置金一光二

隙垂麻黃杏仁ラ除テ白木ラ可加脚弱不立
牛膝石斛一兩宛可加若腰痛桃仁杜仲各
半兩可加音ハナ腹失杏仁ラ一兩可增又春麻
黃一兩ラ可增夏黃ハナ苓二分可增秋當ハナ敗
四兩ラ可加冬ハナ附子半兩ラ可增此方人ハ不
知可レ祕スニ

小風引湯

一切之中風ヲ治ス 防風 獨活

細辛 川芎 五味子 白茯苓 人參

白芍藥 白朮 甘草 各等分

右細劉合每服三錢水一盞半姜二片杏
仁五箇尖ナカ去テ打破リ加テ七分煎滓
去テ温服ス

▲婦人ノ中風角弓反張口噤方論第二

夫角弓反張ト弓ノ如シル也是ハ身虚ケタルニ
依テ風邪已ニ入リ腰背カソリツルナリ小續命湯ヲ
可レ與フ

婦人倒置金一光二

防風湯

忽口喎音ワナキテ別此外無苦

事治防風一兩 羌活半兩 甘草

右細剉合テ每服五錢水二盃入テ一盃煎

麝香少入テ温服又方目口喎斜多

治草麻子七粒ヲ皮ヲムキステ細研ツテ錢

鑿作リテ目口左ヘツリ方ハ右手ノウラ中ニ

押付ヨ右ヘツリ方ハ左ノ手ノウラニ押付ヨ口

顔方ニテラハ鈍湯ヲ以テヤカテイソキ可洗落

又小續命湯ヲ與テ可灸治

婦人血風心神驚悸方論第三

夫血風驚悸スルハ風侵心故也心藏納神諸

藏主也若血氣調和ス則心神安定也若虛損

スハ心神虛弱也風邪依是侵是故心弱ク神

溺テ肝消胸噪是故中風ノ肝消溺スハ血

風ト云血心也心風ト云也又婦人血風上月水滯

血堅常冷依テ痛苦ト云是少異也排風

婦人血風

湯可與在前

婦人風邪顛狂方論第四

夫婦人ノ顛狂ノ病ハ血氣虛弱ノ被侵風邪故也
顛ト云卒發心不娛眼ヲニカタ地倒淡ヲ時
口噤脚振ヲ失心ヲ稍久甦也在此云少臥
或ハ山野走リ口多シ或ハ笑或ハ啼漫奔也故
狂ト云是ヲ通ノ顛狂ト云事ハ風邪侵血氣故
也

羚羊角散

婦人之顛狂ヲ治ス羚羊角ス

獨活

遠志

去心

菖蒲

去毛

防風

各半

茯苓

石膏

麥門冬

去心

龍齒

別研

白鮮皮

冬一丸是
無除ケ

人參

生乾地黄

各二分

右細剉合テ每服ニ錢水一盞半入テ七分ニ

煎ノ滓ヲ去テ温服ス

婦人血風白虎歷節走疰方論第五

夫身虛弱風邪被侵筋骨物咬ヤウ之痛也又

婦人血風白虎歷節走疰方論第五

肌皮邊走回リテ如刺衝痛是ヲ走疰上云也

芍藥知母湯 手足爪疼キ痛肌皮邊子リ公

頭重ノ自眩キ失息吐スヲ治ス 桂心 知母

防風 各四兩 芍藥 甘草 麻黃 去根節ヲ各三兩 附

子 炮三兩

右細剉合テ每服四錢水一盞半姜五片今七分煎滓ヲ去テ空心温服ス

附子八物湯 歷節風上テ骨ヲ物咬様ニ痛ニ筋

膚疼キ痛テ手足ヲ槌ヲ以テ打碎如痛ニ不可

忍治ス 附子 炮ス 乾姜 芍藥 茯苓 人參

甘草 桂心 各三兩 白朮 四兩

右細剉合テ每服四錢水一盞姜五片今

七分煎滓ヲ去テ食前温服ス小續命湯

彌吉

▲婦人血風癩疹癢痒方論第六

夫癩疹上云六躰虚々ニ依テ風邪入留膚風寒ニ

逢時發也發時皮膚ハレ子ニリテ足頗ホキ
腫也赤キス赤疹ト云天熱ス時發也白ス白
疹ト云天ノ曇^{カモ}雨降冷キ時出汗出時毛ノ
孔ノク時風ヲタリ及湯アミテ則風ヲヒケ皮膚ノ
邊風入テ生ス依テ風癩トモ云

消風散

葱^{ソウ}諸中風ヲ治別ス癰癧カカリハレ
眉骨イ多ク頭重ク目眩ヲ治ス 白茯苓 川芎

羌活

人參

白僵蚕

炮^スレ^スモ

防風

藿香

蟬蛻

洗^シテ^ラ炙^ル

荊芥穗

甘草

剉^スク^ス各^ニ兩

厚朴

姜製 陳皮 各半

右細抹每服一錢茶ヲタテタウハスニテ可服

四物湯

荊芥ヲ加テ煎テ可服

又方

風疹ノカカリ子ニリヲ治ス

蒼耳花葉

子 各等分

右細抹ノ每服一錢黑豆ヲ炒テアツキ時酒ニ
入テアツカク時其酒ニテ可服

又方 蟬蛻 薄荷葉

右各等分細抹ノ每服三錢温酒ヲ以テ可服
不定時

逍遙散 婦人之癭疹ヲ治ス又婦人ノ一切ノ

病ヲ治ス 白茯苓 當歸 柴胡 白芍藥

白朮 各一兩 甘草 炙半兩

右細剉合テ每服二錢水一盞姜三片薄荷
葉必入テ七分煎ノ滓ヲ去テ温服不定時

婦人腰痛方論第七

夫腎ハ腰ヲ主シ若ク腎氣虛ケ弱キ時ハ外カハ婦
被損内七情被傷腰痛ヲ治ス

如神散 男子女人ノ一切腰痛ヲ治ス 延胡索

桂心 各等分

右細抹ノ每服二錢温酒ヲ以テ可服此藥極テ
有効

婦人脚氣方論第八

婦人脚氣方論第八

婦人脚氣 夫婦人之脚氣ハ男子ニ異也男子ハ即腎藏弱ク虚風濕被傷病也婦人ハ胞絡ノ氣弱ク虚風毒被傷痛其形風邪自足入テ上リテ衝腹胸故脚氣ト云也或脚筋ツリ骨痛或ハ冷痛或ハ脹満或ハ足弱ク自眩キ胸煩燥食スルハ則吐小便赤ク澁リ大便結滯云也

大腹皮散

脚氣ノ甚キ時ハ心神ホヨリモ冬月水不通治 大腹皮 紫蘓 木通 桑白

皮 羌活 荊芥 赤芍藥 青皮 木瓜

獨活 各一兩

枳殼

去裏小麥糲交テ炒繕言二兩二分

右細剉合テ每服四錢水一盞姜五片葱白根七寸入テ七分煎シ滓ヲ去テ温服ス

半夏散

婦人之氣ノ發動ハ心腹脹満シ飲食

不消嘔逆スルヲ治 半夏 陳皮 人參 大

腹皮 桂心 各三分

檳榔子 一兩

赤茯苓

紫蘓 各一兩半

右細劉合^三テ每服四錢水一盞半姜二片合
七分煎滓去テ温服ス

薏苡仁散

婦人之脚氣ノ足弱ク及子ニリ腫

滿^レ心^下苦^ク大便澁^リ滯^ル治^ス 薏苡仁

防風 猪苓 川芎 防已 檳榔子 郁李

仁 大麻子 各一^升 桑白皮 二^兩 枳實 去^裏 三分

甘草 半分 羚羊角 一^升

右細劉合^三テ每服三錢水一盞入^テ七分煎^シ

滓^ヲ去^テ温服ス

勞瘵方論第九

夫勞瘵^上云^ハ或骨蒸^上云^ハ或殭^上云^ハ復連^上云^ハ

尺^上云^ハ此^ノ外種^ノ名雖有^レ通傳^上云^ハ也

又此種類^ニ或^ハ廿^二種或^ハ卅^六種或^ハ九^十九種^{アリ}

太略男子傳尸^上病^上同^シ然^レ上^モ粗^ホ少^ク方^可出^ス

桑白皮湯 勞瘵ノ心胸滿塞^リ左右^ノ脇^{ツリ}

痛^ニ声^ハ虚^ニ勞^ノ熱^ニ氣^上リ^鼻衄^垂治^ス

婦人血虚

五

如入血西臣金二

桑白皮 三分 枳殼 去裏小麥ク 木通 黃芩

生乾地黄 白芍藥 甘草 各半又

右細剉合テ每服三錢水一盞入テ七分煎

滓ヲ去テ食後温服ス

防風湯 虚勞之食後身疼キ懶ク夜盜汗

多ク下血鼻衄多ク若ク吐血等少病依テ血氣經

絡傷レ損々々治ス 黃耆 一又 白芍藥 防風

各三 甘草 半 當皈 生乾地黄 各三

右細剉合テ每服三錢水一盞姜三片棗一ツ

入テ七分煎滓去テ食前温服ス

補肺湯 勞瘵傳尸之嗽ヲ治ス 桑白皮 熟

地黄 各二 人參 紫菀 黃耆 五味子 各

一 兩

右細抹ノ每服二錢水一盞入テ七分煎蜜

少入テ搗立テ食後可服ス

逍遥散 虚勞傳屍骨蒸ノ瘦衰ヲ治ス方在前

婦人血虚

枳殼散

傳屍骨蒸手足煩燥之夜臥盜汗

垂肌瘦黃公三月水不調胸塞リ苦シク悶亂ス

ルヲ治 枳殼 如恒 二兩 半夏 赤芍藥 各一

柴胡 黃芩 各一 双半

右細末之每服二錢水一盞姜二片棗二入テ

八分煎之滓去テ温服ス

熟乾地黄丸

婦人之虛勞冷虛身軀瘦

黃公手足無カ月水不調ヲ不思飲食ヲ治ス

五味子 當皈 川芎 桂心 各半 牛膝

人參 白芍藥 白朮 附子 炮去皮臍 白茯苓

黃耆 各二 甘草 一分

右細末之煉蜜三ト是程丸ノ空心温酒三モ米

飲三モ卅丸ツ、可服ス

黃芩散

婦人之熱勞上テ虚勞ノ瘦羸テ手足

煩燥ニ疼キ胸ホ、メキ口乾キ不思飲食治入

參 黃芩 各三 當皈 分 柴胡 一 双 黃耆

地骨皮 赤茯苓 麥門冬 去心 生乾地黄

赤芍藥 各一兩 甘草 一分

右細剉合 每服三錢水一盞姜五片入 六分滓去 溫服 不定時

秦艽散 熱勞 月水滯 胸煩燥 手足ノ裏

ホ、メ、ク、ヲ、治、ス 麥門冬、秦艽 各一 生乾地

黃、當、飯、地骨皮、鬱金、蘓方木 各一

右細抹 每服一錢半水一盞紅花以入

七分煎 搗立テ 可服若月水無煩紅花

不可用此藥服 間可忌酒熱物 一年此藥

服ノ永ク斷病根元

▲寡婦之寒熱 如瘧病方論第十

寡婦之病從古未言治事 倉公楮潼ト此事

論 比斤厄及夫ナキ女閑居ト思男及有夫

欲心發時則不嫁 又此病ヲナス是ヲ獨陰無

陽トテ女孤ノ無男作病ト此病ト躰忽煩燥

忽振冷テ如瘧病或瘦衰顔黧黑出テ胸塞月水滯白婦小便交出肝脉弦シテ寸口ヲ上リ魚際へ上レ是獨陰無陽ノ病ト可知ル

生地黄圓

許學士之云孤師尼憂風ヲ躰懶

忽振忽煩燥レ面赤胸煩燥或時盜汗垂此時天下有疫病仍醫師見寒熱傷寒ト思大柴胡小柴胡湯ヲ交進ニ數日ノ病弥甚予脉診シ全ク無傷寒脉唯肝脉弦シテ長クシテ

魚際ニ上レ依テ此藥ヲ與ル立地ニ愈柴胡

秦艸去鬚ヲ 黃芩各二 生地黃四 赤芍

藥二 丸

右細沫煉蜜三 ○是程九ノ每服二十九

宛烏梅煎物三 不定時日ニ度可服私

云此藥度々用テ有効尤可祕ス

▲婦人血風方論第十一

夫血風ト云ハ藏腑癱瘦テ血氣虛テ名時風邪

婦人血風方論第十一

侵之故血氣經塞澁時生熱或手足
續目煩燥痛口乾是血風煩悶名也

赤芍藥湯 婦人之血風煩悶不思飲食手

足無力頭重目暗身軀疼痛治牡丹

白茯苓 赤芍藥 香白芷 甘草 柴胡

各三兩

右細抹每服二錢水一盞姜三片棗二入

七分煎食後臨臥溫服

草豆蔻散

婦人之血風冷氣攻脾胃嘔逆

全不食治

人參一兩

草豆蔻

小麥餅裹蒸熱灰蒸

白茯苓 各三兩

半夏 各三兩

高良姜

白朮

縮砂仁

枇杷葉 去毛炙

桂心

南木香

青

皮 甘草 各半

右細剉合每服二錢水一盞姜三片

入七

滓去溫服

進食散

血風脾胃虛寒不思飲食及久病

人全不飲食一服則能食青皮陳

皮甘草高良姜桂心各一分川烏頭炮

皮尖草豆蔻各三兩訶梨勒五ヶ

右細抹每服一錢水一盞姜二片入七分

煎温服

▲婦人夢與鬼交方論第十二

夫人五行之氣受生五藏神保養若

陰陽調藏腑強壯風邪鬼異不能毀之若血

氣虛弱風邪乘其虛鬼神冒其正然婦

人夢與鬼交通事依藏腑虛五臟神不護

身故鬼異作病其形人見事耻獨笑物

言或時啼悲是也脉遲伏或鳥啄雀

啄躍樣也其六極死脉其一也然氣力無

煩無差病此脉現六邪氣脉可知又病甚

夕立地息絕毛脉長閑尋常九

又是邪氣脉也

婦人血脈不通

茯神散 婦人依風虛與鬼交言語錯亂之目

惡手物見_テ治_ス 茯神_一 茯苓_一 人參_一

石菖蒲_{各二兩} 赤小豆_{四兩}

右細剉合_テ每服三錢水一盞入_テ六分ニ

煎_シ滓_ヲ去_テ食前温服ス一切邪氣ノ祟_ヲ

治_ス 又蘓合香圓_ヲ可與_フ

▲婦人傷寒傷風方論第十三

夫傷寒傷風ノ形并治方與男子不異仍今男

子異_ナ計_ヲ可明婦人ノ傷寒ノ月水絶_チ日中_ニ

心地ヨウ_レテ夕病甚_シ多謔語_ト何_トモナキ_キ手

多_クス或_ハ鬼_ヲ見_テ走_リ狂_多是傷寒熱病熱氣

血室_ニ入_テ攻_ルナリ是_ヲ雖熱_ス不可_ラ下_ス可與_フ小柴

胡湯立地_ニ平_ク愈_ス小柴胡湯_ハ男子_ノ傷寒_ノ卷

在_リ之_レ又懷妊_ノ者_ハ傷寒_ニ可與_フ冷藥_ニ不可與_フ桂

心半夏桃仁等藥_ヲ今_ノ小柴胡_ニ半夏除_テ黃龍湯

名_ハ是_ヲ可與_フ

婦人血脈不通

三

婦人傷寒ノ口乾キ喉乾テ腸
脹滿テ不思飲食ヲ治ス
黃芩芍藥湯 黃芩 芍藥 白
木 生乾地黄 各一兩

右細剉合テ每服四錢水一盞入テ七分煎
滓ヲ去テ温服ス内寒生薑少加テ可與

當取湯 婦人之傷寒喘息急欲絕胸煩
燥或時ハスイワ子キサ多ク是陰陽共虛
不可下此藥是ヲ治ス 柴胡 白朮 各二兩 人參

甘草 赤芍藥 當取 各一兩 五味子 木

通 各半兩

右細剉合テ每服半兩水一盞半姜四片棗
二ツ入テ八分煎シ滓ヲ去テ温服ス

瀉心三黃湯 婦人之六七日胃腑内燥屎

大腸中堅ミリテ痢結シ譫語目赤ク閉塞ヲ治ス

大黃 黃芩 黃連 各等分

右細剉合テ每服四錢水一盞入テ八分煎

洋ヲ去テ温服ス若目赤多而モ痛ハ茯苓竹葉少加テ煎レ可服少痢下レテ可服此外治方男子ノ傷寒卷ニ在之

▲婦人咳嗽方論第十四

夫咳嗽ハ肺虛ニ多ク依テ寒熱風濕氣被侵所爲也肺藏ハ余ノ四藏華蓋ナリ内ハ諸藏ノ氣ヲ納メ外ハ皮毛合ス若寒熱風濕被損皮毛ヨリ入テ損肺故咳嗽脈ヲ以テ辨テ可療治脈浮ニ

弦ス風ヨリ發リ多ト可知濡ニ弱ラハ湿ヨリ發リ多ト可知洪ニ數ナル熱ヨリ發リ多ト可知遲ニ澁ナル寒ヨリ發リ多ト知テ可治風ヨリ發リ多ラハ可散ス湿氣ヨリ發リ多ラハ可燥熱ヨリ發リ多ラハ可涼クス寒ヨリ發リ多ラハ可温ム又虚セルハ可補如斯知リ并テ治ス則ハ莫不愈

黃耆散

咳嗽之中熱濃血ヲ吐キ口苦ク喉

乾キ虚セラ治ス 黃耆 四兩 甘草 二兩

婦人血虛金... 卷二

右細抹之每服二錢沸湯三テ日可三服下
甘草一又黃耆六又
是煎服也

含化丸

昔婦人アリテ肺熱ヲ憂テ久ク咳嗽
身煩燥之羸瘦ス寇宗奭上云醫師此藥ヲ與ルニ
立地有効
枇杷葉 桑白皮 款冬
花 木通 紫菀 杏仁 大黃
右細末ノ煉蜜ニテ○是程丸ノ食後臨臥

一丸ヲ口ニ含テ漸クシワリムヘシ

定喘湯

男女之咳嗽喘息氣上喉中涎ノ
声聽胸滿チ塞坐臥不安飲食不消及肺
寒被侵音嘎テ不言鼻塞リ頭重ク年月久キ
咳喘ヲ治ス 半夏翹
阿膠 甘草 聖粟穀
五味子 桑白皮 麻黃 人參
右細剉合テ每服三錢水一盞半姜三片

正粟穀氣味
溫微寒無毒
名米粟子
米家穀和名
志乃如良

婦人血虛金... 卷二

三十四

烏梅一ツ八テ七分煎ソ滓ヲ去テ食後臨臥

温服ス

金不换散

男女之肺胃虚寒ソ久ク咳嗽スル

不止喘息短ク涎垂ク多ク腹脇脹滿シ腰脊痛

或ハ虚勞冷テ咳嗽シ痰ノ中ニ薄キ血交出テ及

年久キ喘咳ノ諸藥不及治極テ有効シ 罌粟

殼 去裏醋浸テ炙乾ソ半又 杏仁 去皮尖小麥 甘草 各二錢重サ

枳殼 去裏剉テ小麥粉相交テ炙 枳殼 各二錢重サ

右細剉合テ每服三錢水一盞半姜二片

烏梅一ツ八テ八分煎シ滓ヲ去テ食後臨臥

温服ス

橘皮湯

春夏寒ニ被損夏秋冷湿氣ニ被侵

咳嗽シ喉ニ痰シ声アリ氣上リ下ラステ頭痛多

治 陳皮 紫苑 麻黄 杏仁 當飯

桂心 甘草 黄芩 各等分

右細剉合テ每服五錢水一盞半入テ一盞

煎之滓ヲ去テ温服ス

婦人喘息方論第十五

神祕湯 水氣肺ニ入テ喘_レ及_レ作_レ飲氷ヲ冷_テ

喘_レ治_ス 陳皮_{去_ル裏_ヲ} 紫菀葉 人參 桑白

皮 生姜_{各等分}

右細剉合_テ每服四錢水一盞入_テ七分煎

滓_ヲ去_テ温服ス

神授湯 喘息之氣上_リ息短_ク多_ク不能臥治_ス

陳皮_{去_ル裏_ヲ} 桔梗 紫菀 人參 五味

子_{各等分}

右細剉合_テ每服四錢水一盞入_テ七分煎

滓_ヲ去_テ食後温服ス

九寶湯 風被侵若熱氣被損一切咳喘息

短_ク若_ク老_者小兒室女婦人産前産後咳嗽

喘_ス皆_レ可_レ與_之但_シ虚勞人汗垂_之不可_レ

與_薄荷葉 紫菀 大腹皮 麻黄_{去_ル根_各}

桑白皮 桂心 杏仁去皮尖 陳皮 甘草

各二兩

右細剉合テ每服四錢水一盞半姜十片
烏梅一ツ入テ六分煎シ滓ヲ去テ食後温服ス
兩浙之張大夫ト云者喘ヲ病事二十年每
至秋冬則發ル事甚シラメ不能坐臥盡ニ百方
不愈後臨平之僧法本ト云者相得此方ヲ
服終愈彼ノ法本喘ヲ病事三十年服此

藥半年終ニ愈テ再不發此藥久ク服可
有驗此外咳嗽喘息ノ治方男子ノ喘息卷
有ヘ通ノ可用ユ

▲婦人痰方論第十六

夫痰疾者藏府風冷小飲積リ胸間堅リ
所為也人ニ痰リ少キ不作煩多作憂ヲ痰
飲胸間堅リテ五藏積ル時目眩キ頭痛キ也
旋覆花湯 婦人之風疾嘔逆ノ飲食不下頭

婦人金匱要略卷之六

重^ラ目眩^ヲ治^ス 旋覆花 枇杷葉 川芎 細

辛 藿香 桂心 枳殼 前胡 人參 羌

活 半夏 湯^ニ七反 洗^イ各半兩 甘草 羚羊角 カニギニ

赤茯苓 各三反 右細劉^合テ 每服三錢水一盞姜三片入^テ

七分煎^テ滓^ヲ去^テ温服^ス

柴胡半夏湯 痰熱^ノ頭痛^ク胸煩燥^シ手足

煩熱^シ氣血^ニ不調^ラツギ^ニ身躰^疼痛^キ臥^テ

好^シ少^ク力^ヲ飲^ム食^ヲ無^味治^ス 柴胡 八兩 半夏 三

半 人參 甘草 黃芩 麥門冬 去^テ心^ヲ各

白朮 二反

右細劉^合テ 每服五錢水一盞半姜五片棗

一ツ入^テ八分煎^テ滓^ヲ去^テ温服^ス

金沸草湯 傷寒^之胸喉^ニ痰^{アリ}テ煩燥^シ頭

痛^ク筋^{ツリ}時^々煩燥^シ冷^ク合^テ多^ク治^ス 荆芥

穗 四兩 半夏 甘草 細辛 各一 赤茯苓 二

兩

前胡 旋覆花 各三

右細抹ノ每服一錢水一盞姜五片棗ツ
入テ六分煎ソ温服ス一服ス立地ニ愈也

大半夏湯 痰飲ヲソヒ脾胃不和ナルヲ治ス

半夏 白茯苓 生姜 各二分

右細剉合テ下度ニ水一盞入テ一盞煎ソ
滓ヲ去テ臨臥温服ス陳皮甘草ヲ加タルハ

二陳湯ト名

四七湯 喜怒憂思悲恐驚ノ氣結ソ痰涎

成テ形繁ノへ名カ如ク或ハ梅核ヲ吞テ喉塞リ
如ク飲ニ不入吐クニ不出是レ七氣ノ所為也痰ト
名ク或ハ喘レ氣上リ嘔逆惡心ニテ中脘壅リ
三千テクヒコ、ロヨカラサルヲ治ス婦人ハ情性執
著シテ心豊カトクル事アタス多ク七氣ニ被侵
氣終ニ胸ノ間ニ滿塞リテ甚キ時ハ息欲絶ト
此藥男女ノ人ニ通ノ氣ヲ治ス也 此藥葉二

婦人血暈

厚朴

姜制

茯苓

四分

半夏


洗

五兩

右細剉合テ每服四錢水一盞半姜七片

棗一入テ六分煎レ滓ヲ去テ温服ス不定時ヲ

久服ノ必ス有リ効ヲ



頓醫抄卷第二終

