

2

醫方類聚卷之四十一

傷寒門十五

永類鈴方三

傷寒嘔吐

乾嘔吐逆


胃受水谷脾主運化脾胃所傷遂成嘔吐

嘔有節來遲吐來逆速嘔者有聲俗謂之

嘔吐者吐山其物也故有乾嘔而無乾吐

傷寒嘔有熱有寒至於吐悉言虛冷傷寒

表邪欲轉裏裏氣上逆則為嘔是半表半



裏証多云嘔熱吐利則酸臭寒吐利則腥穢此猶飯醬熱則酸寒則水腥也生姜是嘔家聖藥能散逆氣半夏能去水水去嘔則止能下痰飲古人多用之凡嘔不可下

脉

病證

治

弦長而緊

無陽則厥無陰則

小柴胡湯上焦得

嘔嘔者足陽明

通津液得下胃

胃之經脇下硬

氣和汗出得屎

滿不大便而嘔

而解

舌上白胎

仲景云嘔多雖小柴胡去半夏加

陽明証不可下人參括樓湯

氣逆亦為實也

加渴

若胸脇滿而嘔小柴胡湯加芒硝

日晡發潮熱心中怔忡小便不利去黃芩加茯苓

若嘔不止心下大柴胡湯大便秘

弦緊

日晡發潮熱

心中怔忡小便不利

去黃芩加茯苓

大柴胡湯大便秘

浮大而弦

急鬱鬱微煩

加大黃桔梗湯中有枳實為妙

太陽少陽合病頭

黃芩湯加半夏生

疼脇滿口苦咽

小姜

乾往來寒熱自

利又嘔者

春初肌肉癢疹嗽葛根橘皮湯黃

而心悶但嘔清

連橘皮湯

汁

長大而弦

陽明少陽合病下小柴胡湯甚則大

利身熱胸脇痛

柴胡湯因渴

乾嘔往來寒熱

飲水則不可下

土被木賊更下

利為胃已困脉

不弦為煩

弦長

谷入胃而嘔屬陽

小柴胡湯小半夏

明

湯加茯苓陳皮

傷寒差後嘔胃腕

竹葉湯加生姜陳

寸口數

有餘熱

手熱心煩渴而吐
以胃腕有熱

皮竹茹湯

五苓散

傷寒發熱汗出不

大柴胡湯下之汁

解心下痞鞭嘔

自出乾嘔加桂

吐下利

枝湯

表未解心下有水

小青龍或加芫花

氣乾嘔微利發

小便不利小腹

熱而咳

滿去麻黃加茯苓

苓

或因汗出因有水
桔梗湯

官局

因下利脾胃有
熱乾嘔

傷寒解後虛弱少
氣氣逆欲吐

竹葉石膏湯陰陽
易差後勞復脉

證

汗吐下後虛煩不
得眠若嘔者

梔子生姜湯

汗下後胃中虛冷乾姜黃芩黃連人
而吐為寒格
參湯寒多不飲

水而吐者理中
湯去朮加生姜

咽乾煩燥厥逆
嘔吐
甘草乾姜湯噦者
陳皮乾姜湯

發汗衄而渴心煩
飲則吐水
五苓散一二服次
服竹葉湯

沉緊
少陰下利六七日

欬而嘔渴煩不
得眠
猪苓湯

沉緊
少陰証具而嘔者
真武湯去附子加

生姜

表解而裏未和身

十棗湯

涼汗出不惡寒
兩脇痛或乾嘔
短氣為裏有水

微沉
絕
少陰下利裏寒外

弦遲

熱或膈上有寒
通脉四逆湯
飲乾嘔

乾嘔吐涎頭痛或
手足逆冷煩燥
吳茱萸湯
甚者

少陰病飲食入口
梔子生姜湯若口
心中欲吐不能
燥舌乾知其熱
吐始得之手足
大承氣湯
冷此胸中實不

可下當吐之

若脉沉遲心煩
四逆湯脉弱小便
欲寐自利而渴
復利身微熱見
厥者已為難治
小便白
虛寒之甚也

弦長

傷寒大熱乾嘔呻
吟錯語不得眠

黃連解毒湯

弦緊

先嘔後渴為欲解
先渴却嘔此為

赤茯苓湯

虛弱數

水停心下屬飲家

中暑惡心頭痛煩 五苓散 香需散

燥心下不快 六和湯

脚氣嘔吐而脚疼

脚弱或疼若毒

烝入心小腹頑見脚氣門

痺不仁嘔吐死

在旦夕

人迎緊盛滑數

宿食不消發熱嘔 治中湯 五積散

吐

膈實者吐之心

腹滿痛宜下

傷寒咳嗽

秋傷於濕冬必咳嗽又云五藏六府皆有咳非獨肺也但咳必先於肺肺為五藏華蓋聲音所從出皮毛賴之而潤澤邪水由茲而生養凡傷寒感冒有咳嗽為輕無咳嗽為重以和氣未傳入藏也若傳入五藏

六府而咳漸入華蓋之下膈育之中危矣
古人多作九噲之傷寒咳而小便利者不
可汗汗則四肢厥倦而苦滿腹中堅為逆
脉散者為心火刑於肺金鬼賊相刑者死

脉

病證

治

浮

太陽証熱在上焦	小青龙湯小便不
飲水咳嗽表不	利小腹滿去麻
解心下有水乾	黃加茯苓
嘔發而咳為水	

沉緊

飲與表寒相合也

小陰咳嗽四肢沉真武湯加五味子	細辛乾姜病在
重腹疼痛心下	陽以青龍土之
亦有水小便不	病在陰以真武
利自下利而嘔	湯主之
為水飲與裏寒	
相合也	

若傷寒中風往來	小柴胡湯去人參
---------	---------

寒熱胸脇滿痛
不食心煩或喜
嘔或咳此陽邪
自表轉裏動肺
而咳

大棗生姜加五
味子乾姜

微弱

太陰病四肢厥逆
腹中痛或泄利
而咳此又陰邪
傳裏動肺而咳

四逆散加五味子
乾姜

微數

下利六七日咳而猪苓湯
古今錄
嘔渴心煩不得
驗橘皮湯尤良
眠

痰逆手足冷煩渴
橘皮湯不惡寒竹
葉湯
口燥倦怠惡寒

傷寒喘急

中藏經云疾風暴雨天地之喘也肺乃陽
中之陽諸氣屬肺諸喘亦屬肺居五藏之
上為華蓋喜清虛而不欲窒碍也陰陽不

和形寒飲冷則傷肺故氣逆而上行氣粗
息數張口擡肩搖身滾肚是為喘也傷寒
發喘有大陽陽明二証屬熱可知劉河間
云寒水為陰主乎遲緩熱火為陽主乎急
數寒則息遲氣微熱則息數炁龕而為喘
矣故仲景所用皆清利下藥

浮脉

病證

治

太陽病頭疼發熱

惡風無汗而喘屬麻黃湯

宜汗

醫反下之利不桂枝加厚朴杏子
止脉促表未解 湯汗後不可行
若下之微喘表 桂枝湯
未解

若因喘而汗出 與葛根黃連黃芩
者邪氣在裏 湯和之
雖表未解

若因汗出而喘 與麻黃杏子甘草

滑

者邪氣在表
雖經汗下

石膏湯以發之

不惡寒反惡熱手
心腋下澀澀汗
不可大泄也

出胃中乾燥糞
結潮熱大便硬
短氣腹滿而喘
或譫語裏証也

心腹連臍疰悶腹小承氣湯微解之

浮長

疼出臥不安喘
急

失下則四肢厥
切不可服熱藥

太陽陽明合病喘
而胸滿者

宜麻黃湯不可下

發汗後引飲心下
有水氣嘔咳癸
熱微喘

小青龍去麻黃加
杏仁發散水蒸
麻黃發陽去之
則蒸易順杏仁
甘苦溫加之以

泄逆炆

發汗後小便不利 小青龍去麻黃加

小腹滿而喘 茯苓

水停心下腎氣乘 五苓散或陷胸丸

心為悸為喘

大渴煩燥全不與 五苓散或

水無由作汗發 陷胸丸

喘欲死或劇飲

停水滿結喘死

陽明病汗出不惡承氣湯然陽明多
寒腹滿而喘或
有潮熱 汗若無汗脉浮
而喘麻黃湯發
汗愈

弦則生

潮熱獨語如見鬼

狀發則不識人 大承氣湯一服利

尋衣撮空直視 則止

微喘或譫語

頭疼身熱自汗體

濇則死

重其息必喘其形不仁嘿嘿但欲眠者風溫證

萎蕤湯

賊風虛邪入府身熱不時上為喘呼

傷寒咳逆

咳逆古方謂之噦噦則喉中吃吃有聲也吐利後多作此大率胃實則噦胃虛則噦有胃虛膈熱噦久而收氣不回有噦而心下緊痞眩悸乃膈間有痰傷寒久病得此

甚惡年高氣虛及產後未易治

脉

病證

治

緊細

傷寒吐下汗後外橘皮乾姜湯羌活

氣拂鬱與水飲 附子湯退陰散

復汗而噦胃中 半夏生姜湯

寒也

浮大

陽明証潮熱短氣

腹脇滿痛鼻乾 小柴胡湯加茯苓

無汗身黃小便 橘皮竹茹湯

難大便秘澀而嘔

浮緊

發汗後表不解飲小
水多乾嘔微利
發熱咳而微喘
為表有水

小青龍去麻黃加
杏仁渴去半夏
加瓜婁小腹滿
小便不利去麻
黃加茯苓

浮緊

小陰下利咳而嘔朱
芩湯
渴心煩不眠
傷寒噦而腹滿或

浮細

小便不利視其前部
宜朱芩湯
前後何部不利後部
調胃承氣湯
利之

發汗吐下後心下
四逆湯

痞噫氣咳逆氣
虛

沉緊

四肢厥逆腹中痛
四逆湯加五味子
或泄利而咳
乾姜

如大陽中風以火

劫發汗陰陽俱

虛身體枯燥不

大便頭汗出腹

滿喘譫語甚而

噦又不尿腹滿

加噦不治是為

真病

不治至此極矣

傷寒霍亂吐利

吐利與霍亂不同若止吐嘔而利經止謂

之吐利必也上吐下利燥擾煩亂乃為霍亂傷寒吐利者邪氣所傷霍亂吐利者飲食所傷今以傷寒言者吐利而加之頭疼發熱身疼惡寒等証偏陽則多熱偏陰則多寒又以此審吐利之寒熱劉河間云霍亂者三焦熱氣甚則傳化失常而吐瀉火性燥動故也或謂煩渴為熱不渴為寒熱吐瀉始得之亦有不渴者亡津液過多則亦燥渴或云熱無吐瀉止是停寒者誤也

但寒者脉沉細而遲熱者脉實大而數或
內因損氣亡液過多則脉亦能實數而反
遲緩雖亦為熱也脉洪大可治脉微舌
倦囊縮難治脉微氣少不語亦難治

脉 病證 治

浮數

吐利止身體痛不

桂枝湯

休和解其外

弦

發熱汗出不解心

大柴胡湯

下痞嘔吐而下

利

弦緊

頭疼嘔吐而利執

五苓散寒多不渴

多而渴

理中元

沉緊

少陰病加吐利手

吳茱萸湯

足冷煩燥欲絕

沉遲

少陰病手足厥或

通脉四逆去芍藥

吐利而咽中痛

桔梗湯麻黃升

麻湯

微欲絕

吐利汗出發熱咽

四逆湯理中湯加

乾惡寒四肢拘
急手足厥冷或
吐已而不解
附子生用通脉
四逆湯加猪膽
湯

傷寒吐
利脉本
微澁

百合傷寒証虛勞
大病後行卧不
安飲食或美或
不炊如健人而
不能行如寒不
寒如熱不熱口
滑石散
枯婁牡厲散
黃湯 雞子湯
代赭湯百合地
百合知母湯滑石

苦小便赤而吐
利

中暑上吐下利心
腹痛渴煩四肢
逆冷冷汗出兩
脚轉筋
黃連香需散姜葱
沉冷服藿香正
氣散 枇杷葉
散 暑濕藿正
連薷打和亦名
二香散

傷寒泄瀉
自利
下利

二香散

傷寒言自利下利者不輕攻下自然溇瀉也傷寒下利多協熱雜病自利多責為寒傷寒自利詳看陰陽二証不可例服暖藥及止瀉藥尤忌脉實發熱厥不止直視譫語少陰病煩燥不得眠

脉

病證

治

浮

太陽陽明合病為在表自利必發散

葛根湯微汗之

浮弦

太陽少陽合病為

半表半裏必自黃芩湯散之

利必和解

弦長

陽明少陽合病少

承氣湯下之

陽邪氣入府自利必逐胃中之

實

沉細

寒中大陰下利胸理中湯加青皮陳

浮緊

膈不快或吐或利

皮快膈理中元五積散

下後協熱而利利不止心下痞鞭

表裏不解桂枝人參湯

促

桂枝証無汗而喘表未解

醫反下之利遂不止麻黃湯

沉緊

下利欲飲水故大黃芩湯

三黃熟

便溏小便自可

艾湯

薤白湯

此有熱

下利雖有表証不可汗走津液令胃虛必腹脹

沉緊而滑

少陰病口燥咽乾或腹滿而喘不大便或下清水

大承氣湯劉河間論下利青色或言為冷指仲景

色青心下痛

此段明其熱也

微細

少陰痢心煩但欲寐或自利而渴

理中湯 乾姜甘草湯

沉微而

初得病便四支逆

四逆湯 理中湯

冷足攣惡寒或

通脉四逆湯

引衣自蓋不飲

當歸四逆加茱

水或下利清谷

萸生姜湯 白

通加猪膽湯

沉

自利身體痛大便

四逆湯

利而身體痛當

附子湯

救裏大便如常

真武湯

身體痛當救表

沉細

自利不渴屬大陰

四逆湯 理中湯

藏寒也

白通湯 白通加猪

膽湯 通脉四逆

沈緊

自利而渴屬少陰

湯猪苓真武湯

四逆加人參湯

少陰病泄利下重

先煎薤白湯內四

不可投熱藥

逆散有枳實芍

藥

尋常胃中不和腹

用生姜瀉心湯最

中腸鳴下利

效

類與小桂枝湯體

沉緊

汗後適失血不利

潤自愈

下利心下痞腹中

甘草瀉心湯生姜

雷鳴

瀉心湯

少陰下利六七日

咳嘔渴心煩不猪苓湯

得眠

沉細

少陰下利咳嗽四

真武湯加五味子

肢沉重疼痛小便不利自下利而咳

乾姜古人治水氣而咳者病在陽則小青龍湯病在陰則真武湯

沉緊

沉緊

身冷四肢厥腹中四逆散加五味子痛或泄利而咳 乾姜

少陰病下利咽痛猪膚湯

胸滿心煩

沉緊

中寒下利手足指

微冷

理中乾姜湯

沉細

少陰下利不止手足微冷無熱候

增損四順湯

洪實或滑促

陽毒証發燥狂走

酸苦湧泄為陰苦

妄言面赤咽痛身斑或下利赤

參大青葶歷苦酒以復其陰汗

黃

則解

沉細

太陰腹滿手足温

四逆湯 理中

自利身不熱不

湯

渴或腹時痛

傷寒大便秘澀 附不大便 大便黑 大便澀 大便鞭

大腸者倉廩之本傳導之官出納變化係焉人或傷於風寒暑濕熱盛發汗利小便過多走枯津液腸胃燥澀秘塞不通

病證

治

傷寒數日不大便小柴胡湯和其津

脈數

大便鞭及有燥屎

液得屎解

皆知當下又有

陰結陽結之異

陽結証能食不

大便或頭汗出

惡寒手足冷或

心滿不食大便

鞭不可下

陰結証不能食身 金液丹

浮或細

沉遲

滑或澀

體重大便反硬

太陽証罷惡寒反

先大柴胡湯後大

惡熱潮熱手心

承氣湯外臺承

腋下汗出大便

氣無芒消

硬小便如常腹

滿而喘或譫語

手足溫小便赤

屬陽明

太陽病汗吐下後

小承氣以和之

微煩小便數大

便因鞭者

陽明病不大便六

七日有燥屎

大便堅小便數不

麻子仁丸 枳實

可下

傷寒不大便六七

日頭痛有熱是

裏証本可下若用桂枝湯

跌陽浮

辨別
四十一
三十一

沉細

小便清知仍在
表當汗此二証
俱見

心下滿不食大便

小硬是裏証可小柴胡湯

下若頭汗出惡

寒手足冷

無表裏証身微熱大柴胡湯大承氣
大便難此為實湯

浮數

可下

數
若已下後脉數抵當湯

不解發熱則消

谷善飢至六七

日不大便者有

瘀血

沈滑
陽証似陰手足逆輕者白虎湯

冷大便秘小便甚者承氣湯

赤或大便黑

沉伏按之滑

熱厥証畏熱飲水白虎湯

承氣湯

或揚手擲足煩

燥不眠大便秘

小便赤昏憤

小緊

寒熱嘔吐間日頻

日發作無時大大柴胡湯

便秘溫瘧証

若浮若弦

陽明潮熱惡寒若小承氣湯微和其

腹大滿不通者胃勿大泄也大

實

或妨悶脉微澹

柴胡湯

腹滿大便秘按之桂枝加大黃湯黃而痛者實痛也連湯大承氣湯

傷寒十餘日外用

小柴胡不愈若大柴胡湯

大便硬

下利譫語有燥屎調胃承氣湯

少陽病脇下硬滿宜小柴胡湯胃和

不大便而嘔舌汗出得尿解

沉實

上白胎欲上焦
潤津液得下

少陰口燥咽乾或大承氣湯

腹滿不大便或

下利清水心下

痛積証也

脚氣暑中三陰所脾約丸木瓜散神

患必熱大便秘
功丸

脚氣証頭疼身熱

微沈

支節痛大便秘賓郎散
或吐逆脚屈弱

協熱利者臍下熱黃連湯薤白湯三

大便赤黃腸間黃熟艾湯白頭翁

津液脂膩湯

血証不發寒熱小

腹滿硬小便利

大便黑身黃發

狂

詳見腹脹門

寒毒入胃臍下寒
腹脹大便或黃
白或青黑
四逆湯理中湯四
逆散加薤白

時行民病驚澹即
鴨澹也澹者胃
中冷水谷不別
華陀云寒即澹
熱即垢仲景說
初鞭後澹有二

証小便不利小
便少皆水谷不
分

微發潮熱而大便
澹胸滿而嘔
小柴胡湯

傷寒婦人新產陰
陽未和因合房
室婦人則裏急
腹痛名陰陽易
燒裯散 當歸白
朮散

沉滑而小便自利發狂大

便黑瘀血証

病已差尚微煩必大便鞭小便少未
可下小便少者恐津液還入胃先
鞭後澹當自愈

傷寒下利膿血

傷寒毒熱不解口

晚壯熱腹痛便地榆散

痢膿血

傷寒熱毒入胃下黃連阿膠元通見

利膿血

畜血門

傷寒熱利

赤石脂元

傷寒畜血

通見傷寒鼻出血門

血菀於上焦而吐血者謂之薄厥留於下
焦而瘀者謂之畜血此由太陽隨經瘀熱
在裏血為執搏結而不行經曰太陽病七
八日表証仍在脈微而沉反不結胸其人
如狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自

利者下血乃愈抵當湯主之大抵傷寒必先
看兩目次看口舌然後自心下至少腹覺有
滿鞭者當審問其小便若小便不利但可利
小便血若小便自利乃畜血証當下瘀血又
曰太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便自利者
爲無血也小便自利其人如狂者爲血証以
抵當元下之愈陽明病其人善忘屎雖鞭大
便反易其色必黑經謂血并於下亂而喜忘
皆畜血証而有輕重

如狂者喜忘者皆畜血之甚者須抵當湯元
以下之若外已解但小腹急結者爲輕也須
桃仁承氣湯以利之又如病人無表裏証發
熱七八日雖脉浮數可下之假令已下脉數
不解合熱則消谷善飢至六七日不大便者
此有瘀血抵當湯主之當不無小腹鞭滿之
候有以承氣湯下者多矣獨能處抵當湯下
之者用藥之妙也且脉

浮而數浮傷衛無數傷榮血熱客於氣則
 脉浮熱客於血則脉數因下之後浮數俱
 去則已若下後數去而但浮者是榮間熱
 去而衛間熱在矣為邪留心中則飢邪熱
 不斂穀潮熱而發渴也及下後浮脉去而
 數不解是衛熱去而榮熱在矣熱客氣合
 覆血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦
 不止則血得泄必便膿血若不大便六七
 日血不得泄為瘀血須抵當湯下之

脉

病證

治

尚浮緩

太陽病不解熱結

膀胱發狂血自宜桂枝湯

下下者愈不愈

太陽病其人適失與少桂枝湯令體

血及下利微潤當自解

鼻衄吐

陽明病頭疼身熱

口燥嗽水不欲

入咽者必衄若

類聚如十一

卷一

血沉細

無表裏証無寒 輕者犀角地黃湯

熱胸腹滿唇燥 甚者抵當湯

漱水不嚥有瘀

血必發狂

傷寒吐血諸陽受 輕者桃仁承氣湯

邪熱在表應汗 犀角地黃湯甚

不汗熱毒結於 者抵當湯丸

五藏有瘀積故

吐血

易治浮

疾難治

陽明病下血譫語

為熱入血室但刺期門汗出愈

頭汗出者

傷寒失下血氣不

通四肢厥逆微大承氣湯急下之

厥却發熱此熱汗出愈

深厥亦深也

傷寒發熱

發熱者謂怫怫然發於皮膚之間而成熱

也與潮熱寒熱若同而異潮熱者有時而熱不失其時寒熱者寒已則熱相繼而發至於發熱則無時發也

表證有謂翕翕發熱者若合羽所覆明其熱在外也即風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致為表故與桂枝麻黃發汗以散之不然則表熱漸傳裏熱也

裏證有謂蒸蒸發熱若熏蒸之蒸明其熱在內也即陽氣下陷入陰中所致為裏

故與調胃承氣湯攻下以滌之不然裏熱甚而復達於表也

半表半裏証以表証未罷邪氣已傳裏裏未作實而俱熱也但熱輕於純在裏耳發熱為傷寒之常一或陰陽俱虛下利新汗後或脉燥疾不為汗衰狂言不食皆惡發熱

脉

病證

治

發熱頭疼腰強汗桂枝湯

浮

太陽證

出惡風或有汗

微惡寒

發熱頭疼腰強無麻麻湯

汗惡寒升麻湯

脉浮喘

太陽証發熱而惡麻黃湯大青龍湯

寒者太陽主氣

脉微汗出惡風

以溫皮膚寒氣

不可服

留外而發熱宜

微弱

汗

若發熱微惡寒柴胡桂枝湯桂枝

或熱多寒少

二越婢一湯

或支節煩疼

嘔結

若熱多寒少者時用小柴胡湯桂

無陽也不可

枝越婢小劑以

汗宜桂枝越

和解之

婢湯若尺脉

遲者血少也
先以小建中
加黃芪養其
血

若吐利發熱惡
寒者霍亂也
胃氣

若汗後不惡
寒但熱者實
也

若發熱不惡寒
而渴為溫病
發汗身體灼
然者為風溫
知母乾葛湯

若大病三日發
汗不解蒸蒸
下之大柴胡湯大
發熱者屬於
承氣湯
胃也

若發熱惡寒身

實

浮

體痛惡寒為表証又為表虛春月陽氣尚弱不可大汗

宜小柴胡湯微汗之

夏月大熱脈洪大宜正發汗見頭痛門冬月不可汗傷寒無汗

桂枝麻黃各半湯傷風有汗柴胡桂枝湯

浮緊

發熱身無汗自衄見衄門發熱惡寒似瘧者

桂枝麻黃各半湯

浮

太陽病七八日發熱惡寒但可小柴胡湯此陰陽俱虛不可汗下吐面赤有熱未欲解者以其不

桂枝麻黃各半湯

得小汗出也

太陽病發汗不解真武湯以筋惕肉
發熱心悸頭眩
瞶屬虛故也

身瞶動欲擗地

瞶屬虛故也

浮緊

太陽中風發熱惡

大青龍湯汗出惡

寒身疼無汗而

風不可用則用

煩或脉浮緩身

麻黃桂枝各半

不疼但重乍有

湯

輕時或傷風見

寒脉傷寒見風

脉微汗之

太陽傷寒表未解小青龍湯或去麻

心下有水烝發

黃加茯苓汗出

熱乾嘔而咳或

熱嘔有水氣官

渴或利或噎或

局枯梗湯

小腹痛小便不

利或喘

傷寒無汗翕翕發桂枝去桂加茯苓

熱頭頂強痛小便不利

白朮

嘔而發熱胸脇滿心下怔忡

小柴胡湯去黃芩加茯苓

小便不利

寸緩關浮尺弱

發熱頭面汗出惡

寒不嘔但心下痞或渴欲飲水

並可五苓散朱

小便不利

苓湯

或霍亂頭痛發

熱身疼痛欲

飲水身無汗

麻黃湯輕者桂枝

發熱惡寒頭項強

麻黃各半湯

痛發汗而愈

麻黃乾葛湯

陽明傷風証身熱

汗出濺濺然陽

明法多汗

人參順氣散

浮緩

若身熱惡風汗桂枝湯 柴胡桂

出或熱多寒枝湯敗毒散汗

少面慘煩燥之

手足不冷

實

若發熱汗多胃

汁乾調胃承

氣湯下之若

白虎湯和解之

大便不秘者

長浮大而

頭疼腰痛肌熱調胃承氣湯下之

日疼鼻乾或

發汗後或不

惡寒反惡熱

或大便秘澹

語陽明胃實

病人有寒汗後

身熱再汗胃

虛藏寒虻虫

上入膈而吐

理中丸 烏梅丸

沉遲弦

厥陰胃冷

熱極不識人循

衣摸床不安承氣湯

微喘直視發

熱譫語

發熱惡寒頸項

強腰身反張見口噤門

口噤為瘧病

潮熱下後發熱

浮大而長

復大便硬或腹大柴胡湯下之

陽明少陽合病不

利身熱胸脇滿見嘔吐門

痛乾嘔往來寒

熱少陽証頭疼嘔而小柴胡湯

發熱不可汗汗

則讞語

細

浮

口燥咽乾協滿
發熱而嘔往
來寒熱或惡
風手足溫而
渴

小柴胡湯或去半
夏加人參栝樓
根

發熱汗出不解

大柴胡湯

心下痞鞭嘔
吐而下利者
非霍亂也

傷寒大熱乾嘔

呻吟錯語不黃連解毒散
得眠

潛微

醫汗之又大下蓋陽微則惡寒四
逆湯主之

之陰氣弱而
亡血當惡寒
後乃發熱無
休止

今陰弱則發熱葶歷苦酒湯主之

為內熱

身熱不去微煩者

梔子乾姜湯主之

傷寒五六日大

下之後身熱

不去或手足

温不結胸心

中結痛頭汗

出不食未欲

梔子豉湯

解

傷寒四五日身

熱惡風頭項

小柴胡湯

強脇滿手足

温而渴

大陰厥陰不發熱

沉或細數

少陰反發熱發汗麻黃辛附子湯或

則動經此表中

麻黃附子湯皆

風寒入裏本不

温表微汗即解

微欲絕

可汗與

外熱裏寒或下

利清谷手足通脈四逆湯

厥逆或乾嘔

陰証似陽身微

四逆湯加葱白

熱煩燥而赤

傷寒汗出亡陽先服防風白朮牡

屬少陰當咽

厲散次服小建

痛而後吐利

中湯

沉細

尺寸緊

熱去不惡寒

四肢拘急厥

冷與四逆湯

若汗多不止

必惡風煩燥

不眠

傷寒六七日嘔而

發熱乃柴胡湯

証悉具而下之

柴胡証仍在復
 與柴胡湯此雖
 已下之不為逆
 必蒸蒸而振却
 發熱汗出而解
 此証迺病人六
 七日過經欲作
 戰汗候也其但
 心慄而鼓頷身

浮滑洪

不戰者已而遂
 成寒逆此証
 多不得解蓋
 陰氣內盛正
 氣大虛必熱
 劑灼艾救之
 表熱者身熱不
 渴不飲水
 裏熱者口燥煩

小柴胡加桂湯二
 藥均治發熱
 白虎加人參湯却

渴

分表裏

表裏証俱見發

熱煩渴小便

赤却當下渴五苓散

飲即吐為水

逆

無表裏証發熱大柴胡湯大承氣

六七八日目

湯此為實當下

中不了了睛

浮數

浮

浮緊

必沉遲

不知大便難
身熱

裏証不大便六

七日頭痛有見頭痛門

熱當下

表熱裏寒身大陰旦湯寒已次用

熱反欲飲水 小柴胡加桂以

皮熱骨寒 溫其表

若發熱手或微却用四逆湯 通

滑而沉

厥下利清谷
此陰証

脉四逆湯

表寒裏熱身大

寒反不欲近

衣皮寒骨熱桂枝麻黃各半湯

白虎加人參以解其外

湯熱除

若脉滑而厥口

燥舌乾所以却用大柴胡湯下

浮

少陰惡

之愈

寒而踈時時

自煩不欲衣

表未解發熱無
蕢苡小青龍湯小

汗或心下
柴胡湯

水氣

衛不和者無他
見自汗門

病發熱自汗

胃不和傷寒得承氣湯立愈未差

汗後熱不退

再服

昏亂狂言下

之

瘀血證發熱

見大便秘門

風溫證汗出而

身熱者風熱

見自汗門

也素傷於風

因復傷於熱

風熱相搏即

身熱常自汗出

傷寒差後更發

熱

小柴胡湯

失下血氣不通

四肢逆冷却

見下血門

發熱此熱深

厥亦深也

陰陽易身熱頭

見目疼門

脈浮以
汗解以
實可下
之

重目眩四肢
急小腹痛手
足拳

濕病汗出復熱
不為汗衰狂
言不食陰陽
交者死發汗
桂枝湯
解半日許復
熱煩脉浮數

燥疾

者可再發汗

若傷寒發汗後
竹葉石膏湯差後
病解虛乏微
燥者餘熱在胃
熱不去

方
腕竹葉湯濟生

陰陽俱
虛

傷寒八日已上
大發熱者難
治

勞復証病新差
脉浮者以汗解柴

血氣津液未復因勞動生熱熱悉既還復入經絡所致

胡桂枝湯 實以下解小柴胡湯 大柴胡湯

食復証病方差脾胃弱谷不化未復食不化因發熱

枳實梔子湯

氣口緊

數

病差後傷食多作痞乾噫食臭腸鳴下利

生姜瀉心湯

頭疼發熱惡寒身不疼痛傷食証

見頭痛門

夏月發熱惡寒頭疼身體痛發熱惡風煩燥手足温見煩燥門夏至已前發熱惡寒頭疼身痛見頭疼門

夏月自汗惡寒身熱而渴見渴門

不惡寒身不痛知非傷寒頭不疼脉

不緊知非裏實但煩熱者虛煩也

見虛煩門

中濕一身盡痛發熱身黃小便不利

大便反快見身痛及小便不利門

脚氣証頭疼身四肢痛大便秘或嘔

逆而脚屈弱見頭疼門

婦人傷寒發熱惡寒經水邇來晝則

明了暮則譫語熱入血室 小柴

胡湯

傷寒惡寒附背惡寒振戰慄

惡寒者風寒客於榮衛非寒熱之寒又非
惡風也故不待風而寒雖身大熱而不欲
去衣者是也其則向火覆被不能過其寒
皆由陰氣上入陽中或陽微或風虛相搏
所致一切惡寒屬表雖裏証悉具而微惡
寒者亦表未解猶當先解其外候不惡寒

乃可攻也經云發熱惡寒發於陽可發汗
無熱惡寒而踈脉沉細發於陰可溫裏惡
寒雖悉屬表亦有虛實之分若汗出而惡
寒為表虛無汗而惡寒為表實表虛可解
肌表實可發汗又有止稱背惡寒者背為
陽腹為陰陽氣不足陰寒氣盛所致若風
寒在表而惡寒者一身盡寒矣

脉

病證

治

太陽証惟傷寒或

已發熱或未發
熱必惡寒宜解
表

傷風不惡寒

自汗惡風或桂枝湯

煩熱

發熱頭疼身體痛

項強

傷寒惡寒無

麻黃湯 桂枝麻

黃各半湯

汗不惡風

傷寒無大熱口燥
渴心煩皆微寒

白虎加人參湯

發熱惡寒身體痛

小柴胡湯

表証也春月

夏月脉洪大

麻黃桂枝加黃芩
石膏知母升麻

冬月傷風無汗

桂枝麻黃各半湯

若傷風有汗

柴胡桂枝湯

浮

沉細

發汗無汗心中大滿及湯止後服

大煩骨節疼
小建中湯

目運惡寒食

已反吐

心下滿不欲食

大便硬是裏

証當下其人

頭汗出微惡
小柴胡湯

寒手足冷却

當汗是半表

半裏証

傷寒失下血炆

不通不發熱

四肢逆冷惡

寒大小便滑

為陰証

冷厥四肢逆冷

手足攣卧而

理中湯四逆湯

通脈四逆湯當歸

四逆加茱萸生

姜湯

蓋不飲水或

下利清谷小

便數大便如

常

頭疼身體拘急

惡寒無汗寒

多熱少面色

慘腰脊痛手

麻黃湯桂枝麻黃

湯 雜方麻黃

葛根湯倉朮散

人參順氣散

類聚

卷之

五

足溫指末微

厥不煩渴

熱多寒少不嘔桂枝麻黃各半湯

清便自可

若脉浮可發桂枝二越婢一湯

汗脉弱亡

陽也

若尺脉遲血小建中湯加黃芪

少也

尺寸

浮大

發熱惡寒或有汗之愈下之

微煩飲食欲而死

溫而冷此陽

虛陰盛

發熱惡寒項強

腰身反張如見發熱門

中風口噤胸

滿脚攣咬齒

發熱惡寒發於桂枝湯桂枝越

浮數

沉細

陽宜表解

婢湯 麻黃湯

無熱惡寒發於

青龍湯

陰宜溫裏

理中湯 四逆湯

傷寒大下後又

發汗心下痞

解表桂枝湯攻痞

惡寒者表未

解不可攻其

痞先當解表

湯

表解迺可攻

痞

下之熱不退陰

氣弱而惡寒

四逆湯

後乃發熱無

休時

太陽病七八日

而惡寒者陰

陽俱虛不可小柴胡湯

浮

或微

汗下吐

若重反發汗則必氣虛耳聾無熱人

用芍藥甘草附子湯有熱人黃芪建中湯

浮緊

太陽傷風發熱惡寒身疼痛無汗而煩躁

大青龍湯微汗之過則恐亡陽

太陽病自汗四肢拘急難屈

甘草乾姜湯芍藥

仲心煩微惡寒而脚攣急小便數

甘草湯

陽明病宜下惟惡當用白虎湯若發寒中寒為病在經與太陽合病則屬表當發汗若吐下後七八日不解熱結在

汗後只惡寒者虛也脉微當用芍藥甘草附子湯

若弦

裏表裏俱熱時

時惡寒者

潮熱惡寒猶有

表証

用小柴胡湯

若浮

若腹滿不通

小承氣湯微和胃氣勿令大泄

小陰証有惡寒太

陰厥陰証不惡

寒下利已惡寒宜建中湯

而蹠手足溫可

治

惡寒而蹠時時

自煩不欲厚大柴胡湯下之

衣此表寒裏

熱

夏月發熱惡寒頭

並見頭疼門

疼身體支節重

痛

夏至以前發熱惡

寒頭疼身體痛

夏月自汗惡寒身見渴門

熱而渴

食積証頭疼發熱見發熱門

惡寒嘔吐腹滿

霍亂証發熱惡寒

或吐利

發熱微惡寒柴胡芍藥甘草附子湯

桂枝湯發汗後

反惡寒者虛也

陰陽俱虛脉微而桂枝麻黃各半湯

惡寒不可更吐

下發汗面赤有

熱者為欲解尚

欲小汗

厥陰証大汗出熱

不去而拘急四逆湯

關沉

肢疼又下利厥逆惡寒

結胸與痞証若惡

寒汗出

附子瀉心湯

發熱汗出復惡寒

五苓散

不嘔但心下痞

婦人發熱惡寒經

見發熱門

水適來

三陽合病背惡寒

者必口中不仁白虎加人參湯
口燥舌乾也

尺寸俱沉

少陰病背惡寒者

必日中和以此

分陰陽寒熱燥潤
附子湯仍灸之

尺寸俱沉

少陰病口中和背

惡寒反發熱倦
細辛附子湯

怠自汗而渴

傷寒惡風

衛氣所以溫分肉充皮膚肥湊理司開闔者也風邪中衛則必惡風惡風惡寒二証均為表証其惡風比之惡寒而輕耳居室則無所畏或當風或用扇則淅然而惡也惡寒則有陰陽之分及其惡寒悉屬於陽所以三陰之証並無惡風証惡風雖在表而發散又自不同若無汗惡風則為傷寒當發其汗故用麻黃湯若汗出惡風則

為中風當解其肌故用桂枝湯裏証雖具而惡風未罷皆當先解其外也

脉

病證

治

太陽病發汗多漏

不止則亡陽惡必以桂枝加附子

風小便難四肢湯溫其經而固

微急難以屈伸其衛

或風濕病皆有

惡風証

類聚 四十一 五十九

若風濕相搏骨節

煩疼濕勝自汗甘草附子湯散其
皮膚不密而惡
濕而實其衛也
風

若汗多不止惡風先服防風白朮牡
加煩燥不得眠
礪湯次服小建
中湯

微弱

發熱汗出惡風為俱用真武湯救之
中風或誤用小
惡熱者去附子

浮緩寸
大尺弱

青龍而筋惕肉
瞶或虛乏人
依加減法

自汗體熱頭疼惡桂枝湯 柴胡桂
風熱多寒少面
枝湯 敗毒散
光不慘煩燥手
獨活散
足不冷不嘔便

清

若脉濡自汗不用小建中湯
可用桂枝湯

類聚 四十一

六十九

類聚四十一
五十一

寸浮

憎寒發熱惡風自柴胡半夏湯

汗胸膈滿氣上 金沸草散

冲不得息而頭 大半夏湯

不疼項不强為

有痰

若氣冲咽喉不瓜蒂湯吐之

得息者

傷寒四五日身熱小柴胡湯無頸項

惡風頸項强脇 强小柴胡加人

傷寒往來寒熱

下滿手足温而 參括樓根去半

渴

夏

傷寒寒熱者謂往來寒熱也經云邪正分
爭往來寒熱言邪氣入而正氣不為之爭
則但熱而無寒也迺有熱而寒自謂正氣
與邪氣分爭而寒熱作也爭則寒熱之氣
鬱不發於外爭甚則憤然而熱故寒已而
熱作焉蓋寒為陰熱為陽裏為陰表為陽

類聚四十一

五十一

邪之客於表者爲寒邪與陽爭則爲寒矣
邪之入於裏者爲熱邪與陰爭則爲熱矣
陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒
其邪氣在半表半裏外與陽爭而爲寒內
與陰爭而爲熱矣表裏不拘內外不定或
出或入由此而寒熱且往且來是以往來
寒熱屬半表半裏之証邪居表多則多寒
邪居裏多則多熱邪居半表半裏則寒熱
亦半矣審其寒熱多少見其邪氣淺深也

小柴胡專主往來寒熱又立成諸加減法
亦爲邪氣在半表半裏往來未有定處也
又寒熱如瘧與發熱惡寒皆似而非也寒
熱如瘧作止有時往來寒熱作止無時一
日有至十數發者此與瘧狀有不同也至
於發熱惡寒爲發熱時惡寒並不見惡寒
時熱不見也不若此熱已而寒寒已而熱
者雖然應往來寒熱屬半表半裏當和解
之又有病至十餘日而結熱在裏復往來

寒熱者亦可與大柴胡湯下之

脉 病證 治

浮數或
洪大
有表証而往來寒
小柴胡湯

熱者

尺寸俱
盛
有裏証而往來寒
大柴胡湯

熱者

瘧脉自
傷寒五六日或已

表或已下胸中

多熱
滿小便利渴柴胡桂枝乾姜湯

弦遲多
寒
形証似瘧而大汗
桂枝湯

而不嘔頭汗出
而往來寒熱心
煩者

陽証

傷寒五六日中風

往來寒熱胸脇

苦滿不欲食心

弦緊可
下可
緊可
汗

煩喜嘔或胸煩
而不渴不嘔或並小柴胡湯主之
渴或腹中痛或
脇下痞鞭或心
下悸小便不利
或不渴微熱或
咳者

浮大可吐

太陽少陽合病下
利頭疼胸滿口
黃芩湯若嘔者加

苦咽乾往來寒
熱而嘔
半夏生姜

陽明病頭疼寒熱
口燥胸腹滿欲
嗽水不嚥為痰
血必發狂
輕犀角地黃湯
甚則抵當湯

表解而內不消非
大滿猶生寒熱
或大滿大實有
當下之

燥屎

汗下之後依前寒桂枝湯或桂枝二
熱表未解當再
麻黃一湯
表

先熱後寒陰不足小柴胡湯

也名溫瘧或寒

熱相等

先寒後熱陽不足小柴胡湯加桂
也

有多熱但熱者白虎湯加桂

有多寒但寒者柴胡桂姜湯

有汗多煩渴小便

赤澁不伏水土五苓散

嘔吐甚者

脈小緊寒熱嘔吐

發作無時大便大柴胡湯

秘

脈浮大寒熱往來祛邪丸吐之久不

強緊

來者

愈瘧母煎自愈

傷寒三四日胸脇
滿痛耳聾發熱小柴胡湯
口苦舌乾或往
來寒熱而嘔不
能食未可吐下

傷寒惡熱

陽明病不惡寒反
惡熱濺濺然汗見自汗門

自出

陽明病頭疼不惡
寒反惡熱胃實調胃承氣湯
也陽明氣實故
攻頭

沉滑

不惡寒反惡熱手
心腋下汗出胃
中乾潮熱大便
秘小便如常腹
承氣湯

滿喘而譫語

傷寒潮熱

潮熱若潮水之來不失其時一日一發必於日晡若日三五發卽是發熱非潮熱也屬陽明胃土應時則旺於四季應日則發於未申蓋邪氣入胃爲入府府之爲言聚也邪入府而不復傳鬱而爲實熱隨旺而潮惟其屬陽明故潮熱爲可下故經曰潮熱者實也其熱不潮未可與承氣湯若或

潮熱而利小便難大便溏脉浮緊是熱未全入府猶帶表邪當和解其外外已解小便利大便鞭者乃可攻也

脉

病證

治

太陽病有潮熱爲用大陷胸湯

大結胸

浮弦

陽明潮熱外証惡且與小柴胡湯以

寒是猶有傷寒

解之

表証

脈實者

發潮熱已而微

利者有微發

潮熱而大便

溇者又有潮

熱而咳逆者

皆當用小柴胡湯

若腹滿不通者

少與小承氣湯

當和其胃氣

大柴胡湯

若潮熱下後大

便復硬

用大柴胡湯

大承氣湯
脈虛者

若脇肋滿而嘔
小柴胡湯加芒硝

冬陽明發潮熱或

當行黃芩湯

脈浮或盜汗

桂枝湯

短氣腹滿心脇痛

大弦浮而

氣不通鼻乾不

得汗嗜卧身目

皆黃小便難潮

小柴胡湯

熱時咳嗽或噦

此少陽中風

長浮清

不惡寒反惡熱手

心腋下汗出胃

乾燥屎結聚潮

熱

胃實陽盛下之

大便硬小便如

常腹滿而喘

狂語不識人

調胃承氣湯

直視譫語

滑疾

陽明病譫語潮熱者小承氣湯主之與

一升腹中轉失炁者勿更與之明日更不大便脉反微瀼裏虛為難治更不可下治潮熱用承氣必兼見譫語者為可施不譫語者不可施轉失氣者及不能食者可施不轉失氣及能食者不可施仲景之川承氣兢兢業業如此

傷寒熱多寒少

太陽熱多寒少有

三証太陽病八

九日如瘧狀

若脉浮熱多寒 桂枝麻黃各半湯

少或不嘔清 汗之

便自可日一

二發者

若脉都大微弱

者亡陽也不 桂枝二越婢一湯

可發汗

若尺脉遲者血桂枝湯微汗之少

少也小建中 與之若淋家衄

加黃芪湯失 家不可汗小柴

血下利 胡解之

傷寒熱多厥少其

病當愈厥多熱

少其病為進

沈弱為 沈厥為 沈滑為 沈脈為

傷寒寒多熱少 通見惡風門

寒多熱少不煩躁 宜大青龍湯若有

手足微厥為傷
寒候脉反浮緩
為中風是即傷
寒見風脉

汗三因以青龍
緊暴用麻黃桂
枝各半為平和
亦以有汗故也

蓋大青龍湯証見無汗及煩燥門

脉似桂枝反 詳見活人四十

無汗病似麻 問

黃反煩燥是

也

病人寒熱而厥面急服五味子湯或

色不澤冒昧而 兼用麻黃細辛

兩手忽無脉或 附子湯晬時必

一手無脉者必 大汗而解之

是有正汗也多

用絳衣包手足

令溫煖

仲景一書只有熱

多寒少之條無

寒多熱少之証
朱肱百篇亦然

傷寒似瘧 通見熱多寒少門

陽并陰則陰實陽虛陰盛內寒陽虛外
寒寒生於內故中外皆寒 太陽虛
腰背頭項痛 陽明虛寒慄鼓頷
少陽虛身體解佻心惕惕然 三陽
俱虛則陰氣盛骨寒而痛
陰并陽則陽實陰虛陽盛外熱陰虛內

熱熱生於外故中外皆熱 太陰虛
不能食善嘔已乃衰 少陰虛熱多
寒少嘔甚其病難已 厥陰虛腰腹
痛小便不利 三陰俱虛則陽蒸勝
熱盛悒悒不樂

大

傷寒有大陽証大

汗出似瘧服桂
枝湯一日再發桂枝二麻黃一湯
寒熱等者汗出

必解宜

若八九日熱多

寒少如瘧狀

其人不嘔清

便欲自可日

一二發者

麻黃桂枝各半湯

浮虛

陽明証煩熱汗出

如瘧日晡發熱承氣湯

桂枝湯脈實者

傷寒後不差朝夕

如瘧

知母桂心湯

婦人熱入血室其

血必結故使如

瘧

傷寒渴

附煩渴引飲

傷寒渴者裏有熱也邪炁自表傳裏三陽先受病為邪在表而猶未作熱故不言渴至邪氣傳三陰入裏四五六日津液為熱

所搏漸就而乾故口燥舌乾而渴六七日
 傳厥陰為消渴為裏熱極矣飲水多而小
 便少者是也故言渴欲飲水為欲愈者以
 其傳經已盡故也所謂少少與之不可多
 與之勿多與也與之常令不足勿極意也
 蓋深戒飲水過多孳生諸証若喘咳噎噦
 乾嘔腫滿下利小便不利數者皆由飲水
 過傷也

脉

病證 脉浮而渴屬大陽渴而有汗
 屬陽明自利而渴屬少陰 治

洪大

太陽病渴表不解小青龍去半夏加
 心下有水氣而渴
栝婁根蓋半夏
 辛溫燥津液栝
 婁苦微寒潤枯
 燥也

服桂枝大汗出白虎加人參栝婁
 後大渴裏有熱也

浮

發熱惡風而渴並五苓散寸脉數

或小便不利
微熱而渴或
汗多而渴或
發汗大江出
煩燥不得眠
而渴痞不解
而渴
手心熱煩渴而
吐以右熱在胃
腕亦用之

傷寒四五日身小柴胡去半夏加
熱惡風脇下
人參栝婁

滿手足溫項
強而渴
風溫証身體灼栝婁根湯 知母
而熱 乾葛湯
發熱無汗而渴薏苡小青龍湯小
此表未解不
可服白虎湯
太陽病發熱不
惡寒而渴為

浮數

浮

浮數

頤聚

頤聚

頤聚

溫病若發汗屬萎蕤湯
後身體灼熱
為風溫

傷寒引飲下焦脉浮五苓散有桂
有熱小便不通或發熱
也脉沉水苓湯

陽明病渴汗出多白虎人參湯無大
而渴胃燥也不熱渴煩背微寒
可服五苓散亦用

或浮或沉

浮滑

浮

若虛老人春秋
月可用竹葉
石膏湯仍可
薏苡竹葉湯

若汗少小便不利
脉浮而渴五苓散
可用

但頭汗出小便茵陳湯小柴胡去
不利渴欲飲半夏加人參栝
水身必發黃婁人發熱朱苓

少陽病渴脇下鞭小柴胡去半夏加
 不大便而嘔舌
 人參括婁湯
 上白胎而渴

湯

傷寒五六日汗

後下後胸脇

滿小便不利

渴而不嘔頭

汗出往來寒

柴胡桂枝乾姜湯

細沉數

熱心煩此表未解

始得病外証或用麻黃附子甘草

腹滿咽乾或湯或麻黃細辛

口燥舌乾而附子湯小發汗

渴為屬裏下

之愈若無此

証但發熱脉

沉誤下則必

死

傷風發熱六七

日不解而煩

有表裏証渴

欲飲水即吐

五苓散

沉滑

熱實結胸心胃

煩燥懊憹舌

燥渴

大陷胸凡陽毒燥

盛大渴黑奴元

發汗後衄而渴先服五苓散次服

水 心煩飲則吐

竹葉湯

自利若嘔而發

熱發渴

朱苓湯

先渴却嘔為

水在膈

赤茯苓湯

少陰病渴自利而朱苓湯一云自利

渴屬少陰傷寒

而渴白通湯加

熱入藏流於少

猪膽朱苓真武

陰腎經腎惡燥
故渴而引飲下
利不得眠咳而
嘔渴

湯四逆加人參
湯此脉必沉緊

下利欲飲水者

有熱也白頭可急下之

翁湯若口燥

咽乾而渴

心煩但欲寐或

自利而渴屬理中湯
少陰

有渴而停飲者

有躁而煩渴五苓散

者亦少陰也

厥陰病主消渴氣

上冲心中疼熱

不食食則吐衄

下之利不止陰

桂枝甘草乾姜附

子之類以復其

陽

盛陽絕為陰毒

無汗渴而劇飲

停水心下滿 五苓散 陷胸丸

結喘死甚多

中暑証太陽中熱

者暈是也自汗白虎湯

出惡寒身熱而

渴

夏至已前煩渴發

熱不惡寒與虛並竹葉石膏湯
煩者

中暑伏熱深發渴 五苓散 酒蒸黃
引飲無度 連元

沉細而
疾寸大
尺小

手足逆冷臍腹築陰毒甘草湯附子

痛咽喉疼嘔吐正元回陽退陰等

下利身痛冷汗湯散可選用熨葱

煩渴此腎虛胸灼艾得汗解

傷脾或頭疼額

上手背冷汗不

止精神恍惚

傷寒虛煩

煩躁煩劇心煩附見
煩渴煩熱見客門

素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒今虛煩者陰虛生內熱也傷寒止言煩者表熱也及其邪熱傷表故有不經汗下吐而心胸煩者有汗下吐後而心胸煩者有虛煩者三者要觀所從來審其虛實為治

不經汗下吐而煩是傳經之熱不作膈實者

心煩喜嘔或胸中煩而不嘔者小柴胡湯

主之少陰病二三日心中煩不得臥者黃

連阿膠湯主之少陰病胸滿心煩者猪膚

湯主之是皆和解而徹熱者也

因汗下吐後而煩是內陷之煩吐下後虛煩

不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹者梔子

豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯若嘔

者梔子生姜豉湯心煩腹滿臥起不安梔

子厚朴湯圓藥大下後身熱不去微煩梔
子乾姜湯是皆取其吐而湧其熱也仲景
云病人久微溘者不可與梔子湯

虛煩之狀心中溫溫欲嘔吐而無奈非吐則
不能已若吐下汗後更煩心下濡者邪氣
乘虛而入則為虛煩與梔子豉湯是吐劑
之輕者若不因此下汗脈乍結心滿而煩
飢不能食是邪氣結於胸中則為膈實與
瓜蒂散是吐劑之重者又陽明不吐不下

心先煩者是煩之實者與調胃承氣湯下
之傷寒二三日心下先悸而煩者是煩之
虛者與小建中湯補之少陽之邪入府者
煩而悸則為熱也大抵先悸而煩為虛先
煩而悸為熱經曰治必先求其本也傷寒
太陽少陰二經為表裏煩燥獨多巢氏云
心煩不得眠者心熱也但虛煩不得眠者
膽冷也

脈

病證

類聚四十一

治

八十二

浮緊

發熱惡風煩燥手足溫為中風候而脈浮緊是中風見寒脈若脈緊不煩燥為麻黃証今又加煩燥以中風併傷寒俱盛故用

大青龍湯以有煩燥一証故可用不審誤用之則發汗多煞人脈微自汗惡風不可服三因謂青龍緊暴以麻黃多用麻黃桂枝各半湯

浮緩

傷風自汗體熱頭桂枝湯輕者柴胡疼惡風熱多寒少面光煩燥若脈緊必無汗

桂枝湯 或敗毒散獨活散

惟濡而緊却當用小建中湯

自汗不可用桂枝

濇

傷寒當汗不汗煩燥不知痛處其

更以麻黃湯發其汗

浮細

人短氣

虛煩熱與傷寒相與竹葉湯蓋有熱
 似然不惡寒身不可大攻熱去
 不疼知非傷寒則寒起矣若嘔
 不可汗頭不疼用橘皮湯一劑
 脉不緊知非裏實不可下當

沉細

太陽病咽乾煩燥甘草乾姜湯以復
 厥逆嘔吐其陽

沉滑

太陽証渴而煩燥

能飲水或大汗出不得眠或發汗後微熱消渴五苓散或陷胸丸
 小便不利胃中乾少與水令胃和則愈

傷寒五六日已汗下胸脇滿結小柴胡桂枝乾姜湯

便不利渴而不
嘔頭汗出往來
寒熱心煩此表
未解

動氣在腹右不可先服五苓散一二

發汗汗則衄而服次第服竹葉

渴心煩飲則吐湯

水

洪實或
滑促

陽毒發躁狂走妄苦參葶藶苦酒復

沉伏而
滑裏有
熱

畏寒或飲水或揚

手擲足煩燥不白虎湯 承氣湯

得眠大便秘小隨証用之

便赤外証多昏

此熱厥也

中風發散六七日五苓散

言面赤咽乾痛 其陰汗則解

身斑下利赤黃 升麻湯 大黃

散 梔子仁湯

而煩渴小便赤
澁或汗多或嘔
吐不伏水土或
手心熱煩渴而
吐

身熱不飲水為表
熱口燥煩渴為
裏熱

表有熱者小柴胡
湯加桂裏有熱
者白虎湯加人
參

傷寒無大熱口燥
渴煩背微寒脾
藏有熱

白虎加人參湯

太陽証服桂枝大
汗出後大渴
白虎湯加人參括
婁根

微細沉

賊風入藏少陰証

心煩但欲寐或理中湯
自利而渴欲吐
不吐
乾姜甘
草湯
四逆湯

疾細而沉

陰盛膈陽身冷煩
霹靂散汗出差或
燥而不飲水
火焰散 丹砂元

浮弦

少陽中風耳聾目

赤胸滿而煩

沉細而弦疾

陰毒誤服涼藥渴

正陽散 肉桂散

燥轉甚若漸深

白朮散等辛熱

四支逆冷腹痛

之藥得汗則解

咽喉不利心腹

結滿燥渴虛汗

不止

若用辛熱藥陽

再與返陰丹即定

氣乍復却煩燥甚但漸減

熱藥

身微熱煩燥面赤

四逆湯加葱白

或欲坐井中陰

証也微熱為裏實煩燥為陰盛

沉微

沈緊

面戴陽為下虛

此名陰燥

少陰汗多不止必先服防風白朮牡

惡風煩燥不得

厲散次服小建

眠

中湯

沈滑

熱寒証胸中煩燥

心下懊憹舌上大陷胃元

燥渴結胸

傷寒吐下後心煩

乏炁晝夜不得酸棗湯

眠

煩燥驚狂臥起不桂枝去芍藥加蜀

安此以火迫劫 漆牡厲龍骨救

出汗或熨而成 逆湯桂枝甘草

火邪 龍骨牡厲湯

陽明病不大便有

燥屎煩燥臍痛 承氣湯

或汗後譫語

弱

有病已差尚未煩
 必大便鞭若小
 便少則津液當
 還入胃又不必
 攻

或用小柴胡通其
 津不中却以承
 氣湯

太陽病汗吐下後

無太陽柴胡証
 煩燥心下鞭小
 便利屎定鞭

小承氣湯微利之

寸關浮

身熱而
煩屬太

太陽証自汗心煩
 若小便數

不可用桂枝表散

傷風發熱五六日

不解而煩欲飲
 水而吐有表裏
 証

五苓散

傷寒無熱但狂言

煩燥不安

五苓散二大錢服

後飲井水一升
以指刺喉吐之

尺寸俱
厥手足

冷自
而煩屬

即愈

少陰証心煩胸滿吳茱萸湯

不得眠已見前

或吐利手足逆

冷煩欲死

若下利六七日

朱苓湯

欬而嘔渴煩

不得眠下利

咽痛而煩滿仍用前猪膚湯

少陰

少陰病惡寒而踈大柴胡湯下之

時時自煩欲去

衣

沉微

下後發汗晝煩燥

不得眠夜則安乾姜附子湯

靜不嘔不渴

沉微

下後病不解煩燥

者或汗後太陽

病

茯苓四逆湯

類聚

九十一

傷寒發厥至七八

日膚冷而躁無

時暫安為藏厥

此為難治

微弱而

中暑背寒面垢手

足微冷煩渴口白虎湯

燥四支不重痛

人迎虛

中暑背寒面垢頭

疼惡心煩燥心五苓散

下不快

中暑吐利手足逆

厥煩燥

香薷散

中濕其風多為煩

劇為流注為拘防已黃芪湯 麻

急非麻黃薏苡黃加朮湯

烏頭不能散之

風溫証頭疼身熱

自汗不解發汗不可再汗萎蕤湯

即譫語煩燥不

頭疼

九十一

得眠

少陰病脈已解而不能消損谷即愈

反發煩者病新

差強與谷脾胃

氣弱

微細而沉

少陰病但欲卧汗出不煩欲吐五六

日自利後煩燥不得卧者死發汗

後下之脈平小煩此新虛不勝穀

氣故也

傷寒懊憹者憤鬱不舒暢比於煩悶而甚

者也出下後表陽乘虛內陷鬱而不發

結伏心胸中經曰表未解反下之胃虛

客氣動膈而然治法或吐之或下之若

汗吐下後虛煩不得眠劇者必反覆顛

倒心中懊憹與陽明病下之其外有熱

手足溫而不結胸心中懊憹飢不能食

但頭汗出二証為邪熱結於胸中以梔

子豉湯吐之以湧其結熱也若陽明病

下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者與陽明病無汗小便不利心中懊懣者必發黃二証爲邪熱結於胸中以大承炆湯茵陳湯攻之滌其內熱也

傷寒振

附戰慄

傷寒振者寒聳振動也皆責爲虛寒振近於戰而輕戰爲正與邪爭爭則鼓慄而戰振但虛而不爭止於聳動耳下後復發汗必振寒者此表裏俱虛也亡血

家發汗則寒慄而振者血氣俱虛也但止振聳而已若吐下後心逆滿炆冲胸頭眩發汗則動經身爲搖振者茯苓桂枝白朮甘草湯主之太陽病發汗不解仍發熱心悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之二湯溫經益陽之效也傷寒戰慄者戰者身動慄者心戰內外不同皆陰陽之爭也傷寒欲解將汗之時正炆內實邪不能爭則卽汗出而不戰

邪炁欲出其人本虛邪與正爭微則振甚則戰戰已正勝而解矣邪炁外與正氣爭為戰戰則愈者也邪炁內與正氣爭為慄慄則甚也戰者正氣勝慄者邪氣勝傷寒六七日欲解當解而汗出其有但心慄鼓領身不戰者已而遂成寒逆多不得解蓋陰氣內盛正氣大虛不能勝邪非剛劑灼艾不可也

傷寒自汗

附盜汗手足汗

頭汗無汗

心之所藏在內者為血發於外者為汗蓋汗乃心之液自汗之証皆由心腎俱虛所致陰虛陽必湊發熱而自汗陽虛陰必乘發厥而自汗此陰陽偏勝致之傷寒有自汗者邪氣干衛氣不因發散無問昏醒浸浸自出有盜汗者謂不睡則不出方睡則湊出覺而又不出也雜病中盜汗責其陽虛傷寒盜汗非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使之然也此邪氣侵行於裏外

連表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽氣不繳津液得泄故但睡而汗出覺而氣而汗止矣悉當和解而已有手足汗出者胃主四腋陽明之証也陽經邪熱傳併陽明陽明為津液之主病則自汗出有頭汗出者亦屬陽明蓋邪搏諸陽津液上蒸見於頭也以實表活血清利為先

風邪于衛發熱自汗出此衛不和 寒邪止傷榮故無汗及其傳裏為熱亦自

汗也 暑邪于衛太陽中暍汗出惡寒身熱而渴 濕邪于衛汗多而濡此其風濕甚

脈

病證

傷寒有汗者九証

治

衛氣不和自汗太

陽病發熱汗出

此榮弱衛強為

不和欲救其邪

用

桂枝湯自汗而煩

不可服

浮緩

傷風自汗太陽發桂枝湯脈弱而煩
熱汗出惡風為不可服

中風

太陽病項背強
桂枝加乾葛湯

惡風

汗出而渴五苓
茯苓甘草湯

散汗出不渴
桂枝加附子湯

四肢拘急足
屈難伸小便
難

自汗小便數不
宜芍藥甘草湯
可用桂枝湯

加附子

自汗小便數或

渴誤用桂枝
甘草乾姜湯以復
附子攻表即
其陽

浮

咽乾煩燥厥

逆嘔吐

若厥逆嘔吐

愈足溫更此藥補虛退熱通

與芍藥甘治悞服朴枝証

草湯脚即猶存者

伸矣

自汗膈不利汗桂枝加厚朴杏仁

下後微喘表湯微汗解

尚未解

發熱汗出復惡

寒不嘔但心

下痞醫下之

者或心下痞附子瀉心湯

復惡寒汗出

者為表虛

發熱汗出復惡

寒不嘔但心五苓散若陽明汗

下痞者為表
實
多雖渴不可與

發汗太汗出胃

乾煩燥不得

眠欲飲水但

少與之胃和

即自愈

發熱汗出不解大柴胡湯又云陽

心中痞鞭嘔
明病汗多者急

太陽過
日多
實不可
汗實不可

吐下利

以下之

實
脈實不
可汗

陽明病自汗不惡

寒反惡熱濺濺

汗自出若汗多
大柴胡湯調胃承

則胃燥而渴或
氣湯外臺承氣

大便秘潮熱不
湯無芒硝尤穩

可與五苓散或

發熱而譫語急

下之

類聚四十一

卷九

遲

浮

陽明自汗小便 應少而不便	宜蜜導法若土瓜 根大猪膽汁皆
自利不可下汗 之即死	可導
若汗出多微惡 寒表未解	宜桂枝湯小汗之
陽明法多汗若 無汗而喘發 汗則愈	宜麻黃湯

浮緊

陰陽俱浮

冬月陽明病潮 熱發作有時 但脈浮者必 盜汗	黃芩湯
風溫自汗太陽証 頭疼身熱自汗 不解身重喘息 多睡必齟語言 難治在少陰厥	萎蕤湯

類聚四十一

卷九

微弱而虛

陰不可汗汗則
譏語煩燥不臥
驚癇自亂

中暑自汗太陽中

熱者暍若汗出

惡寒身熱而渴白虎湯

或手足冷四肢

倦怠而不痛重

中濕自汗汗出不

止腎主濕故知

汗出不可止

亡陽自汗太陽病

發汗多遂漏不表虛桂枝加附子

止其人惡風當湯

溫其經

傷寒汗出亡陽

此屬少陰當四逆湯汗多更以

咽痛吐利其溫粉撲之

尺寸緊
或緩而
欲絕

人熱不去內
拘急四肢疼
厥逆而惡寒

若汗多不止必
惡風煩燥不
得臥
先服防風白朮牡
蠣湯次服小建
中湯

沉細

柔痙自汗太陽病
與傷寒相似搖
頭口噤背反張
桂枝加葛根湯
小續命湯去麻

發痙之狀有汗
出而不惡寒
黃加葛根

霍亂自汗吐利汗
出發熱四肢拘
急手足厥逆
四逆湯

三陽合病汗後讖
語下之則額上
汗手足厥冷若
自汗
白虎加人參湯

類聚四十一

百一

沉弦

身涼汗出心脇下

十棗湯

鞭痛或乾嘔頭

疼短氣此表解

裏未和尙有水

絕沉緩欲

陰毒証冷汗出手

四逆湯等辛熱之

足逆冷臍腹築

痛咽疼嘔吐下

藥

痢煩渴身如被

杖

病人腹間有動氣先服防風白朮牡
 不可汗發汗則 蠓湯汗止服建
 頭眩汗不止筋 中湯
 惕肉瞤爲逆難
 治

中脘有痰令憎寒

前胡半夏湯 金

癸熱惡風自汗

沸草散大半夏

胸滿氣衝不得

湯

類聚四十一

百一

強有似傷寒

細或沉

傷寒五六日頭汗小柴胡湯

出微惡寒手足

冷心下滿不食

大便鞭為陽微

結有表復有裏

脉雖沉緊不得

為少陰病

傷寒五六日已汗

下胸脇滿微結柴胡桂枝乾姜湯

小便不利渴而

不嘔但頭汗出

往來寒熱心煩

者此表未解也

若但頭汗出身五苓散 茵陳散

無汗劑頸而小柴胡去半夏

還小便不利加人參括婁根

渴引水漿此

疼熱在裏身
必發黃

陽明病下之其外

有熱手足溫不

結胸心中懊憹

不食頭汗出

梔子豉湯

若心下緊滿無

大熱頭汗出

者此水結在

小半夏加茯苓湯

胸脇

陽明病下血譫語
剝期門隨其實而

者此熱入血室

瀉之澱然汗出

但頭汗出者

則愈

若汗出讖語有

燥屎也過經

乃可下之下

之早語言必

亂表實裏虛

滑沉伏而

故也

頭汗証有熱厥蓋承氣湯

下証悉具見四	諸手足逆冷皆
逆者是失下後	屬厥陰不可汗
氣血不通四肢	下此則仲景所
便厥醫不識便	謂厥深熱亦深
疑是陰厥誤用	應下之若反發
熱藥大抵熱厥	汗必口傷爛赤
脈沉伏而滑頭	

上有汗手雖冷
 時復指爪溫手
 足掌心必溫非
 正厥逆也當消
 息之

浮緩或急

衄家不可汗汗出

額上陷直視不
 能瞬不得眠汗
 桂枝湯
 而衄脈尚浮緩

者

手足汗出為熱聚

於胃津液傍達

也大便必鞭或

譏語

若陽明中寒不

能食小便不

利手足汗出

作痼瘕大便不可下者

下之愈

初鞭後溏知

胃冷水谷別

知故也

陰陽爭則戰邪氣

將出邪與正爭

其人本虛而戰

正氣勝則戰戰

已復熱而為汗

解矣

傷寒無汗者七證 太陽陽寒剛瘧病太陰病少陰病厥陰病

冬陽明病陰陽病伴身五陰不得有汗

寒邪中榮腠理緻密津液內滲或水飲內蓄與亡陽久虛皆無汗

寒邪在表而無汗者經云太陽病惡風無汗而喘及脈浮緊無汗發熱及不出汗而煩燥陽明病反無汗而小便利二三日嘔而咳手足厥苦頭痛鼻乾不得汗脈浮無汗而喘與其剛瘧無汗是也

邪氣行於裏而無汗者經云陽明無汗小便不利心中懊憹身必發黃及傷寒發熱無汗渴欲飲水無表証者白虎加人參湯與三陰為病不得有汗是也

水飲內蓄而無汗者經云服桂枝湯或下之仍頭痛項強發熱無汗心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯是津液內滲真陽虛而無汗也

陽虛無汗者諸陽為津液之主陽虛則津

液少經云脉浮而遲遲為無陽不能作汗其身必痒陽明病反無汗身如虫行皮中之狀此久虛故也用朮附湯建中湯溫之

或當汗而不汗服湯至三劑而不得汗者死病也

或熱病脉燥盛而不得汗者黃帝謂陽脉之極也死此二者為真病不治

傷寒怔忡太陽便利多飲水陽明煩嘔小便難少陽嘔下仍虛悸誤

下煩而胃裏乾汗過自冒甘桂証內調真武却須安許知可論

怔忡者即悸也心血不足所致其由有氣虛者陽氣內弱心下空虛正氣內動也有停飲者水停心下心為火而惡水水既內停心不自安正氣內虛邪氣交擊而悸者與氣虛而悸者又加甚矣或鎮固或化散尤當益其榮血耳

脉

浮數

病證

治

太陽病汗不解發

類聚四十一

百八

熱心悸頭眩身
瞶動欲擗地者
例不可發汗

真武湯

弦數

嘔吐發熱胸脇滿
心下怔忡小便
不利

小柴胡湯去黃芩
加茯苓

而弦細長

傷寒厥逆心下怔
忡宜先治水却
治厥不爾則水

茯苓甘草湯若浸
於肺必喘咳於
胃必噦噎作利

結代

氣散而無不之
矣

於皮膚為腫潰
於腸則下利

傷寒心動悸

炙甘草湯

少陰病四逆或悸

四逆散加桂五分

者氣虛也

傷寒飲水過多水

停心下氣上乘
濟生茯苓飲子

則悸

傷寒二三日心中
小建中湯 三因

類聚四十一

百九

類聚四十一

百八

悸而煩

茯苓補心湯

傷寒不得眠卧

巢氏云晝陽夜陰主臥今熱氣未散陽盛陰虛

病後不眠陰氣未復於本也

脉

病證

治

浮

太陽証發太汗胃

中乾煩燥不得

眠欲飲水少與

之胃和自愈若

脉浮小便不利

五苓散

發渴者

下後復發汗晝煩

夜靜不嘔不渴

無表証脉沉微

身無太熱者

乾姜一兩附子一

个生用仲景以

乾姜為主恐其

變陰姜引其陽

生附逐其元傷

寒邪

汗吐下後虛煩不

得眠甚則反覆梔子豉湯吐之

類聚四十一

百八

顛倒心下懊懣

傷寒大熱乾嘔喘黃連解毒湯

吟錯語不得眠

傷寒吐下後心煩酸棗湯

氣乏晝夜不得

眠

長

陽明病身熱目疼

見目疼門

鼻乾不得眠

汗多不止惡風煩見白汗門

燥不得眠

少陰病得之二三

黃連阿膠湯

日已上心中煩

不得眠

少陰病六七日下

朱苓湯

利而渴欬而嘔

心煩不得眠

傷寒差後熱氣與

諸陽相并陰氣梔子烏梅湯

類聚四十一

百廿

未復病後不得眠

發汗若下之病仍茯苓四逆湯

不解煩燥者

風溫發汗已讖語

煩擾不得眠若萎蕤湯

驚癇目亂無時

傷寒多眠但欲寐

脉

病證

治

浮細

太陽証頭項強痛

小柴胡湯脉但浮

惡寒十日已去

者麻黃湯

嗜臥者外已解

設胸滿脇痛

尺寸浮

風溫証頭疼身熱

自汗體重息喘

萎蕤湯不可發汗

四肢不收嘿嘿

欲眠

微細沉

少陰証心煩欲吐

類聚四十一

百廿

類聚
白
若口燥舌乾而
渴急下之又
須看脉
但欲寐者少陰証也急作四逆湯以
復其陽若狀如傷寒四肢沉重忽
忽喜眠須看脣上下上脣有瘡虫
蝕五臟下脣有瘡虫蝕下部作狐
惑証治之濕毒氣所致
狐惑傷寒嘿嘿欲
眠目不能開起桃仁湯 黃連犀
居不安虫蝕其 角湯 雄黃銳
喉為惑其聲啞 散 又雄黃燒
虫蝕下部為狐 熏肛門

不吐但欲寐或理中湯乾姜甘草
自利而渴小便
湯

若口燥舌乾而
渴急下之又
須看脉

但欲寐者少陰証也急作四逆湯以
復其陽若狀如傷寒四肢沉重忽
忽喜眠須看脣上下上脣有瘡虫
蝕五臟下脣有瘡虫蝕下部作狐
惑証治之濕毒氣所致

尺寸俱
沉細

狐惑傷寒嘿嘿欲
眠目不能開起桃仁湯 黃連犀
居不安虫蝕其 角湯 雄黃銳
喉為惑其聲啞 散 又雄黃燒
虫蝕下部為狐 熏肛門

傷寒讖語 又作
贍

傷寒胃中熱盛上乘於心心為熱冒

類聚四十一
重也

則神昏亂而成譫妄有譾語者有獨
語者有狂語者有語言不休有言亂
者以見其熱之輕重也狂語言亂為
重也

脉

病證

治

傷寒不應汗而汗

大便秘小便赤

手足溫必譾語

也傷寒四五日調胃承氣湯

滑實

脉沉而喘滿沉

為裏反發其汗

津液越出太便

難表虛裏實譾

語屬胃胃實不

和則煩燥自汗

大便硬小便數

三陽合病腹滿身

重難以轉仄口白虎湯不可發汗

類身四十一
百十四

中不仁面垢譫語遺尿

白虎加人參

汗之則譫語下

之則額上生

汗手足厥逆

若自汗者

凡譫語脈短沉

汗出譫語此為風

也須下過經可

下之若下之早

言必亂表虛裏實

者細逆冷

發汗多亡陽譫語柴胡桂枝湯和胃

此津液不和不通津液

可下

下利譫語者有燥

屎

小承氣湯甚則柴

微熱脈浮洪大

傷寒七八日下之

胸滿煩驚小便

湯胡加龍骨牡蠣

死

類聚四十一
百五

不利讖語身重
不可轉側

者生

婦人傷寒發熱經水適來書明了
小柴胡湯甚則入胃燥成血結則

暮讖語此熱入針期門

血室

此血實有熱非

胃家實若犯

胃氣晝夜讖與抵當湯

語喜忘或小

腹滿小便利

風溫譫語不可汗萎蕤湯詳見自汗

汗則譫語獨言門

煩燥目亂無睛

傷寒大熱乾嘔呻

吟錯語不得眠黃連解毒湯

陽毒發躁狂走妄苦參大青苦酒葶

言面赤咽痛身歷酸苦之藥

促洪實滑

類聚四十一

百病

斑或下利赤黃

仲景云實則譫語

虛則鄭聲大便

秘小便赤手足

溫脈洪數必譫

語大小便利手

足冷脈微細必

鄭聲鄭重也重

語也

傷寒發狂

經曰邪入於陽則狂又曰重陽則狂諸經之狂為陽盛也傷寒熱毒在胃併於心至於狂為邪熱至極矣非大吐下則不能已狂言目反直視為腎絕汗出復熱狂言不食失志死

脈

病證

治

太陽病熱結膀胱桂枝湯外已解小其人如狂血自腹急結桃仁承

類聚四十一
集

實

下下者愈不愈
此外不解

氣湯

陽毒煩躁狂走妄
陽毒升麻湯 大

言面赤咽痛潮
黃散 梔子仁

熱獨語如見鬼
湯

狀

死 弦生 瀕

甚者不識人循

衣摸床惕不
太承氣湯

自安直視喘

微而沉

發熱譫語

無表裏証無寒熱

唇燥漱水不欲

入咽小腹鞭滿
桃仁承氣湯

小便反利大便

必黑身黃發狂

此血証為陰伏

熱畜在裏熱化為
輕則桃仁承氣湯

血喜忘如狂血
犀角地黄湯甚

類聚卷之四十一

百病

上逆則喜忘血
下蓄則內爭

則抵當湯丸

或以火劫汗出或桂枝加蜀漆牡蠣
熨而成火邪亡
陽煩燥驚狂起
臥不安

龍骨湯 柴胡
加龍骨牡蠣湯

醫方類聚卷之四十一