

大德重校聖濟總錄卷第三十六

瘡病門

足厥陰肝瘡

手少陰心瘡

足太陰脾瘡

手太陰肺瘡

足少陰腎瘡

足少陽膽瘡

足陽明胃瘡

足太陽膀胱瘡

瘡病發渴

足厥陰肝瘡

論曰內經謂足厥陰肝瘡在經則令人腰痛少腹滿小便不利如瘰狀非瘰也數便意恐懼氣不足腹中悒悒在藏則令人色蒼蒼然太息其狀若死者俱刺足厥陰蓋足厥陰之脉循陰器邪氣客之則少腹滿小便不利也肝為將軍之官謀慮出焉故病則恐懼不足也蒼蒼者肝之色也宜察其經絡府藏而治之

治肝瘡顏色蒼蒼頭掉氣喘積年不差鼈甲丸方

鼈甲去襍爛

蜀漆葉

烏梅取肉

常山剉

知母焙各壹分

甘草微炙

細辛

去甘集

苦參

各半分

香豉

微炒

石膏

半兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十

丸未發前米飲下臨發再服

治肝瘧木香犀角丸方

木香

犀角

屑

羚羊角

銹屑各

升麻

玄參

者

豬苓

去黑皮

檳榔

各貳兩半

龜甲

炙

甘草

各兩

豉

伍兩

右一十一味搗篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子大溫酒或

米飲下三十九日再服體熱卽去甘草檳榔加大黃

五兩

治肝瘧顏色蒼蒼顛掉氣喘蜀漆丸方

蜀漆

烏梅

取肉微炒

常山

剉各半兩

石膏

龍甲

去裙襴醋炙各壹兩

甘草

微炙

知母

苦參

剉

麝香

研

桃人

湯浸去皮尖雙人楚炒過各半兩

右一十一味搗研爲末同研令勻鍊蜜和搗三二百

杵丸如梧桐子大空心溫酒下二十九晚食前再服

治肝瘧久不差烏梅丸方

烏梅取肉酒浸微炒

常山剉各壹兩

知母

犀角鎊屑

丹砂研

龍骨

升麻

豉炒

桂去蟲皮

甘草微炙

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒過各半兩

虎頭骨鎊

龍甲去裙襴醋炙各壹兩

右一十三味搗研為末同研勻鍊蜜和搗二三百杵

丸如梧桐子大空心溫酒下二十九晚食前再服

治肝瘧上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌肉消瘦不下

金知母湯方

知母

地骨皮

升麻各壹兩

龍甲去裙襴醋炙

犀角鎊

人參

麥門冬去心焙

羌胡生

石膏各貳兩

甘草生剉半兩

虎頭骨酥炙過壹兩半

右一十一味羅搗篩每服四錢匕水一盞入香豉五

十粒煎至六分去滓溫服不計時候

治肝瘧小便不利如瘧烏梅飲方

烏梅取肉

山梔子人兩各半

知母壹兩

芍藥

木通剉

生地黄

升麻各壹兩

右七味噉咀如麻豆每以五錢匕水一盞半煎至一

孟去滓下朴消一錢匕食後未發前冷溫二服

手少陰心瘧

論曰心瘧者內經謂令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰是也蓋心為神舍邪不可干邪氣干之故煩心其欲清水者以心火內熱故也其反寒多不甚熱者內熱而外寒故也治宜通心經利邪熱則愈

治心瘧常山丸方

常山

別號

桃人

取陳昔去雙人炒和皮搗壹兩

鉛丹

別號

豉

合炒令煙盡手捻可碎攤冷別搗

右四味搗研為末鍊蜜和再搗千杵丸如梧桐子大

每服十五丸雞鳴時空心酒下欲發時再服十五丸

其日不得梳洗發過方可飲食

治心瘧煩心甚欲得清水反寒多不甚熱常山湯方

常山

別號

梔子人

炒

石膏

碎研

烏梅

去核炒

龍甲

醋浸炙去甘草壹分

豉

合炒

蜀漆

分

右八味搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三片剉

碎煎至七分去滓未發前溫服臨發再服

治心瘧熊膽丸方

砒霜

研

丹砂

研

麝香

研

雄黃研

熊膽各貳兩

右五味以熊膽和前四味爲丸如菘豆大發日空心冷水下兩丸臨發時再服一丸皆以冷飯壓或當日便止或大作乃差如欲吐卽以煖水下之當吐出痰涎卽差

治心瘧黃連散方

黃連去須

右一味搗羅爲散發前以酒和五指撮服

足太陰脾瘧

論曰足太陰之經脾之脉也脾經之瘧令人不樂好太

息不嗜食多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃寒寒則腹中

痛熱則腸中鳴鳴已汗出故謂足太陰瘧又名脾瘧

治脾瘧寒熱時作肌瘦食減腸泄腹痛吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾炒 蒼朮米泔浸壹宿切焙 龍甲去裙襖醋炙

防風去義

人參

芎藭

藿香葉

芩胡去苗

肉豆蔻去殼

甘草炙各半兩

右一十味搗篩每服三錢七水一盞生薑二片煎至七分去滓未發前溫服

治脾瘧不思食厚朴湯方

厚朴 去麤皮生薑汁炙參兩

半夏 為末薑汁作餅焙乾膏兩

陳橘皮 湯浸去白焙貳兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分去滓空心日午臨臥各一服

治脾瘕木香丸方

木香

附子 炮裂去皮臍

大黃 剉

厚朴 去麤皮薑汁炙

人參 各壹兩

芍藥

桂皮 去麤皮

京三稜 煨

獨活 去蘆頭

乾薑 炮

芎藭

羌活 去蘆頭

甘草 炙各半兩

陳橘皮 湯浸去白焙

檳榔 剉各貳兩

右一十五味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸未發前溫水下日三

治脾瘕寒熱檳榔湯方

檳榔 剉

青橘皮 湯浸去白燥

前胡 去蘆頭

白木

菝葜 各壹兩

右五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分未發

前去滓溫服

治脾瘕無問遠近阿魏丸方

阿魏 研

安息香 入胡桃

蘇合子 剉各壹錢

蕪黃人 微炒為末壹分

右四味爲細末鍊蜜丸如菉豆大每服二十九未發
前溫水下得吐則差

治脾瘡寒熱善嘔多汗青蒿湯方

青蒿

附子炮裂去皮臍

桂去盡皮

厚朴

去蘆皮薑汁炙

甘草炙

陳橘皮湯浸去白

半夏

爲末薑汁和作餅暴乾

麻黃去根節

草豆蔻

去皮

白朮各半兩

藿香葉壹兩

右一廿一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三

片棗一枚擘破煎七分去滓溫服日三不拘時

治脾瘡人參飲方

人參

甘草炙各壹分

陳橘皮湯浸去白蠟半兩

烏梅

伍枚去核焙

草豆蔻

柒枚去皮

右五味搗篩每服五錢匕用濕紙裹定熱水二盞
生薑一棗大拍碎棗二枚擘破瓷器內煎至一盞去
滓未發前溫服

治脾瘡寒多熱少有汗頭目昏暗背胛拘急或胸膈痞

悶嘔逆欬嗽心腹脹痛面黃肌瘦肢節疼痛此胡湯方

此胡

苗去

葛根剉

棗肉焙

甘草

炙

檳榔剉

常山

烏梅

去核焙

草豆蔻

去皮

厚朴

去蘆皮薑汁炙各肆兩

右九味麤搗篩每服五錢匕酒半盞水一盞煎至一盞去滓未發前溫服

治脾瘧無間新久驚甲散方

鼈甲

去裙 醋炙

甘草

各壹兩 參分

常山

壹兩

烏梅

去核 壹兩 壹分

陳橘皮

湯浸 去白 壹分

松蘿

桂

去麤皮 各參分

右七味爲細散每服二錢七未發前以酒調下日三

治脾瘧硫黃丸方

硫黃

研

桂

去麤皮

巴豆

去皮心膜 出油 研

乾薑

炮各半兩

藍澱

研壹分

右五味攪羅二味爲末入別研三味和勻麪糊丸菴豆大每用一九綿裹未發前男左女右塞耳中差合時取五月五日午時面北先吸氣七徧却於藥上呵七徧神驗

治脾瘧橘皮散方

陳橘皮

湯浸 去白 壹分

常山

乾漆

炒煙

桂

去麤皮 各參分

牡蠣

燒赤 壹分

右五味爲細散每服三錢匕未發前溫酒調下三服

必差

治脾瘧半夏散方

半夏為未薑汁調
作餅焙乾

阿魏研各
壹錢

右二味研勻以溫酒半升未發前調勻旋旋服之

治脾寒瘧疾七瘵散方

烏頭大者壹枚炮良久移壹處
再炮凡柒處炮滿去皮臍

右為細末都作一服用大棗七枚生薑七片葱白七寸水一椀同煎至一盞疾發前先食棗次溫服藥只一服差一方烏頭不炮用沸湯一盞泡以物蓋之候

溫溫更泡滿四徧去皮切焙乾依上法作一服

手太陰肺瘧

論曰肺瘧者內經謂令人心寒寒甚則熱熱間善驚如

有所見刺手太陰陽明是也蓋心肺獨居膈上其氣相通故瘧邪干肺內動於心則為寒熱善驚之候也

治肺瘧心寒甚即發熱熱即驚如有所見常山秫米湯

方

常山壹兩
半 秫米壹兩 甘草炙劉
半兩

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓未發前溫服發時再服

治肺瘧心寒熱善驚如有所見人參丸方

人參 龍甲醋炙去
襍蘘 桃人去皮尖雙
人炒研

常山 甘草炙
劉 肉蓯蓉酒浸
切焙

升麻

各分

杏人

去尖雙

桂

去皮

丹砂

研

阿魏

研各

烏梅肉

炒

龍齒

研各

右一十三味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五

九空心米飲下未發時併兩服

治肺瘧及補心氣麥門冬湯方

麥門冬

去心壹兩半

升麻

知母

焙

甘草

炙

鼈甲

醋炙去

茈胡

去

前胡

去頭

桃人

去皮尖雙

枳殼

去穢炒

梔子

去皮

蘆根

剉

烏梅肉

炒各

人參

右一十三味搗篩每服三錢匕水一盞半入桃柳

枝各五寸剉生薑三片煎至八分去滓入石膏末半

錢匕更煎沸未發前一服

治肺瘧心驚常山丸方

常山

搗末

桃人

去皮尖雙

鉛丹

研各

鼓

妙壹

右四味爲細末鍊蜜和搗千杵丸如梧桐子大有服

十五丸食前溫酒下未發時服

治肺瘧杏人丸方

杏人肆治枚湯浸去皮尖雙入炒黃

常山分

丹砂別研半兩

甘草生剉分

右四味為細末鍊蜜丸如菉豆大每服十九丸未發前

米飲下日再服

治肺瘧心寒熱善驚丹砂丸方

丹砂別研

阿魏醋化去沙石製和作餅炙

麝香研分

鉛丹研分

右四味合研細末取五月五日午時粽子尖三七枚

與藥同研於北斗下露一宿丸如梧桐子大未發前

熱水下丸將一丸以緋帛裹安耳內男左女右

治肺瘧心神驚悸二丹丸方

丹砂別研

鉛丹別研

甘草炙剉各半兩

當歸切焙

常山各分

右五味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服三丸食前溫

酒下未發時再服俟飢即以葱豉粥與之

治肺瘧烏梅丸方

烏梅肉炒

常山切

鱈甲去裙醋炙

人參

肉苳蓉酒浸切焙

知母焙

桃人去皮尖雙入研各半兩

右七味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服三十九溫酒

或米飲下未發前三服

治肺瘧心虛黃連湯方

黃連去須壹兩半

當歸切焙壹兩

乾薑炮半兩

右三味蠶絲篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

臨發時服

足少陰腎瘧

論曰內經謂足少陰腎瘧在經則令人嘔吐甚多寒熱
熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已在藏則令人灑灑
然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少
陰蓋腎脉入肺中肺脉環胃口故使人嘔陰虛則陽氣

偏故熱多若夫洒淅腰脊痛大便難目眴手足寒特以
藏氣內虛機關不利故為此證也

治腎瘧令人灑灑然腰脊痛大便難目眴手足寒烏梅

九方

烏梅肉炒壹兩半

常山剉金分

豕膏壹合炒

桃人湯浸去皮尖雙炒研壹兩

虎頭骨酥炙半兩

附子炮裂去皮臍半兩

肉苁蓉酒浸切焙半兩

知母切焙壹分

麝香研壹錢

桂去麝皮壹分

右一十味搗研拌勻鍊蜜和丸梧桐子大每服空腹
米飲下二十九未發時服

治腎瘧菴蓉丸方

肉菴蓉

酒浸切

烏梅肉

炒半兩

桃人

湯浸去皮尖炒研參分

常山

剉參分

豉

炒參分

升麻

半兩

桂

去麝皮半兩

甘草

兩半

右八味搗研和勻鍊蜜丸梧桐子大每未發日空腹

溫酒下二十九米飲亦得至發時更服二十九

治腎瘧天雄丸方

天雄

炮裂去皮臍壹兩半

鉛丹

研參分

右三味搗研和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸未

發日空腹米飲下日三五服

治足少陰瘧嘔吐寒熱人參湯方

人參

常山

剉各半兩

甘草

生剉參分

燈心

伍拾莖

陳橘皮

湯浸去白焙

茶末

各壹分

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至七分去

滓入酒半盞相和未發前頓服以吐為効未吐再服

治足少陰瘧嘔吐半夏散方

半夏

湯洗去滑為末生薑汁和作餅暴乾再為末

阿魏

細研各壹兩

右二味同研勻每服二錢七溫酒一盞調下未發日

頓服

治足少陰瘧嘔吐半夏散方

半夏湯洗去滑生薑汁製焙

乾薑炮各半兩

綠鑿研壹錢

右三味搗研和勻每服半錢匕未發日以醋湯調下足少陽膽瘧

論曰足少陽瘧之狀內經謂令人身體解你寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘧邪外中其氣不守故常心惕惕然邪盛故熱多有風故汗出治足少陽瘧身體解你見人心惕惕然熱多汗出升麻湯方

常山壹兩半

升麻

鼈甲醋炙去裙爛

淡竹葉各壹兩

犀角屑

麥門冬上心焙

知母切各壹兩

甘草炙半兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心日午溫服

治足少陽瘧清膽黃連丸方

黃連去須壹兩

甘草炙剉半兩

龍膽去苗

鉛霜研

定粉研

人中白各壹分

馬牙消研壹兩

右七味搗研為細末用豬膽汁和丸如梧桐子大每

服二十九用枇杷葉拭去毛煎湯下日三
治足少陽瘡身體解你或寒或熱心惕惕然汗出犀角
丸方

犀角屑壹分

常山兩

蜀漆葉兩

豉炒壹合

右四味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九
未發前米飲下

治足少陽瘡熱多汗出蘆根湯方

生蘆根兩

麥門冬去心

升麻

葛根各壹兩半

梔子人兩

石膏碎研

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入淡

竹葉二七片煎至一盞去滓溫服早晚食前

治足少陽瘡解你熱多汗出犀角湯方

犀角鎊

甘草各壹兩

麥門冬去心

升麻

知母

龍甲醋炙去襍

石膏碎研

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

一盞去滓未發前溫服

治足少陽瘡熱多汗出此胡湯方

此胡去

秦艸去

麥門冬去心

蘆根

淡竹葉各壹兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入青蒿自然汁半合再煎沸未發前五更初溫服

足陽明胃瘧

論曰足陽明胃瘧在經則令人先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然當刺足陽明跗上在胃則令人旦病善飢而不能食食則支滿腹大當刺足陽明太陰橫脉出血蓋胃圍冲氣爲水穀之海邪氣客之則冲氣不和故善飢不能食食則支滿腹大傳於

經者爲寒熱陽不勝於陰故喜日月光及火氣也

治胃瘧腹滿人參蜀椒湯方

人參半兩

蜀椒去目及閉口炒出汗壹分

乾薑炮壹兩

阿魏麩和作餅炙參分

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分未發前去滓溫服

治胃瘧飢不能食蒜薑酒方

獨窠蒜壹顆

生薑壹分

右二味研碎以酒半升調去滓未發時旋旋服之治胃瘧阿魏酒方

阿魏研末壹錢匕

半夏為末生薑汁作餅暴乾再搗取半錢匕

右二味以酒一盞調未發時溫服

治胃瘧脹滿不食常山橘皮散方

常山壹兩壹分

陳橘皮湯浸去白壹兩

牡蠣熬

桂去麤皮各叁分

右四味搗羅為散每服一錢匕未發前溫酒調下至

日西煮溫粥壓之當日不得以冷水洗手面

治胃瘧心腹脹滿不食枳殼湯方

枳殼去瓢麤妙叁兩

厚朴去麤皮生薑汁煮人參

白朮

白茯苓去黑皮各貳兩

右五味蠶搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑一棗

大切煎至一盞去滓溫服

治胃瘧黃連湯方

黃連去須壹兩半

當歸切焙壹兩

乾薑炮半兩

右三味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

未發時併二服

治胃瘧不食支滿腹脹時作寒熱正氣湯方

藿香葉

陳橘皮湯浸去白焙厚朴去麤皮生薑汁煮

半夏為末生薑汁作餅暴乾

甘草炙炙兩

右五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓未發時併兩服

治足陽明胃瘧文滿腹大順氣湯方

厚朴

去麤皮生

陳橘皮

湯浸去白

白朮

半夏

湯洗米泔

乾薑炮

芫胡苗

甘草

炙各半兩

右七味曝擣帥每服三錢匕水一盞生薑五片棗二

枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

治足陽明胃瘧寒熱汗出食則支滿腹大厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙

白朮

陳橘皮

湯浸去白

甘草

桂

去麤皮各半兩

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚擘煎至七分去滓食前溫服

足太陽膀胱瘧

論曰足太陽瘧之狀內經謂令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇鳴鳴然熱止汗出難已刺郤中出血蓋膀胱經下抵腰中上巔絡腦故腰痛頭重寒從背起也經虛受邪故先寒後熱也熱止汗出難已以真氣不勝邪故也

治足太陽瘧寒熱芫胡湯方

卷三十六

七

茈胡苗去

常山剉

龍甲去裙襴醋炙令黃色

知母焙

青蒿乾者

甘草炙

枳殼去瓢炒

桂去麩皮各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞入柳枝心七枚
葱白二寸細切同煎至七分去滓空腹溫服發前再

服

治足太陽瘧腰痛頭重寒熱互作酒煎飲方

常山壹兩

龍甲去裙襴醋炙令黃壹兩

知母參分

白頭翁參分

桂去麩皮半兩

青蒿壹握

甘草生參分

桃李枝頭心各柒枚

葱薤白各柒莖

茈胡參分

右一十二味細剉如麻豆大每服五錢匕以酒一盞
半浸一宿平旦煎取一盞去滓空腹頓服當吐痰出

再煎滓服

治足太陽瘧腰痛頭重寒多熱少茈胡桂薑湯方

茈胡去苗剉兩

桂枝去麩皮貳兩

黃芩去黑心參兩

栝樓根肆兩

牡蠣熬

甘草炙

乾薑炮各貳兩

右七味咬咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫
服日三初服微煩汗出愈

卷三十六

七

治足太陽瘧壯蠭湯方

牡蠣熬肆兩

麻黃去根節煎掠去沫焙肆兩

甘草炙貳兩

蜀漆參兩若無常山代之

右四味咬咀每用五錢七水二盞煎至一盞去滓溫服若吐勿更服

瘧病發渴

論曰內經謂諸瘧皆得之夏傷於暑以熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也治瘧發渴者與此胡去半夏加栝樓根湯方

此胡去苗壹兩參分

黃芩去黑心

人參

甘草炙到各一分

栝樓根到壹兩

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至一盞去滓空腹溫服日晚再服

治久瘧憎寒壯熱渴欲飲水車前草湯方

車前草

常山剉

升麻

豉炒

甘草生剉各半兩

梗米合

右六味麤搗篩每以五錢七水一盞半宿浸藥於星月下橫一小刀子在藥上候五更煎至一盞去滓分

温二服空腹一服未發前再服良久吐吐定即食漿水粥

治瘧病發渴飲水不止常山湯方

常山參兩

石膏兩

白稗米貳合

右三味咬咀每服五錢匕以水一盞半入竹葉十片煎取八分去滓温服平旦一服欲發再服正發時又一服

治瘧經數年不差發渴者梔子湯方

梔子人分壹

常山對參分

車前葉焙壹兩

白粳米半合

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

温服未發前一服臨發一服

治瘧發熱骨節痛口乾煩渴蘆根湯方

生蘆根對參兩

麥門冬去心

升麻

葛根對各壹兩半

山梔子去皮壹兩

石膏貳兩碎

箏竹葉壹握切

右七味麤搗篩每以五錢七水一盞半煎至八分去

滓食前分温二服

治瘧病苦渴烏梅飲方

烏梅貳拾枚擘破

右一味以水三盞煎取一盞半去烏梅和蜜一匙分
二服細細啜之

治瘧止渴生薑飲方

生薑

大棗

甘草炙

草豆蔻去皮

木通各半

右五味咬咀如麻豆水三盞煎至一盞半去滓分三

服溫飲之

治瘧疾發渴引飲煩躁妙應丸方

菘豆肆拾粒

黑豆參拾粒

砒霜半錢

丹砂黑豆大

鉛丹壹錢

右五味同研極勻滴水和丸作二十粒每服一丸以
東南桃心七枚取井華水研向日吞服之醋水下亦
得服後病稍重者只微寒若小可便絕有孕婦人不
可服

治瘧病發渴及寒熱攻作常山湯方

常山

蜀漆燒烟

甘草炙到各

淡竹葉切壹

大黃生到

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

大德重校聖濟總錄卷第三十六

大德重校聖濟總錄卷第三十七

瘧病門

瘧病發熱身黃小便不利

瘧痢

瘧氣

瘧瘧

寒熱往來

瘡病發熱身黃小便不利

論曰寒熱凌虐於人名爲瘡病瘡而發熱小便不利者
身必發黃此蓋熱氣下迫入於小腸水道既澀故小便
不利也

治瘡病手足苦煩發熱渴躁通身悉黃小便不利常山
飲方

常山

芫胡去苗

甘草炙微赤剉

梔子人

兩各青

赤茯苓

去黑皮

石膏

蜀漆

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襴各貳兩

石八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉二七

片豉五十粒煎至八分去滓不計時候溫服

治瘧病發熱煩渴咽乾口燥身黃怠墮小水澀滯知母

湯方

知母

地骨皮

升麻

犀角屑

人參

麥門冬去心焙

茈胡

去苗各乾兩

石膏

鼈甲

曬炙令黃去裙襖各貳兩

甘草

生剉半兩

赤茯苓

去黑皮參兩

右一十一味麝搗篩每服四錢匕水一盞半入香豉

五市粒煎至八分去滓不拘時候溫服

治瘧病大渴煩躁引飲不止身體皆黃小便不利茈胡

湯方

茈胡

去苗貳兩

甘草

炙微赤剉半兩

知母

人參

麥門冬

去心焙

杏仁

湯浸去皮尖雙入麩炒微

黃芩

壹兩

右六味麝搗篩每服四錢匕水一盞煎至六分去滓

不計時候溫服

治瘧病發熱煩躁體黃小便不利麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

犀角屑

杏仁

易浸去皮尖雙入麩炒微

黃

常山

甘草

炙微赤剉各半兩

糯米

捌拾壹粒

右六味麤搗篩以水五盞煎至三盞去滓分爲五服
於發時前溫服

治瘡病發熱身體皆黃小便不利升麻湯方

升麻 芫胡去苗各肆兩 桂去麤皮

人參 常山 甘草各兩

大黃炮半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎八分去滓溫

服不拘時

治瘡病但熱不寒徧身發黃小便澀滯茯苓散方

赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 麻黃去節

甘草炙到各壹兩

右四味搗羅爲散每服三錢匕新汲水調服不拘時

治瘡發熱身黃小便不利蜀漆湯方

蜀漆 常山 人參

赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 天黃炮半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片聚

三枚擘同煎至八分去滓溫服不拘時

治瘡病發熱煩躁身面皆黃小便不利茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 黃芩去黑心

升麻 常山 蜀漆

甘草 炙到各半兩

右七味麤情篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治瘧病頭痛發熱身面黃色小便不利常山散方

常山 梔子人桂去毒

赤茯苓 去黑皮 甘草 剉

右五味等分搗羅為散每服二錢匕溫水調下不拘

時

治瘧病身黃發熱小便不利常山散方

常山 梔子人黃去毒 升麻 塗醋炙令

赤茯苓 去黑皮 梔子人 人參各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫水調服不拘時

治溫瘧發熱身黃咽乾苦渴小便不利鼈甲湯方

鼈甲 塗醋炙令黃去裙襴 甘草 生用各壹兩 冬瓜汁 肆合

車前葉 豐握無葉取子貳合 常山 半兩

右五味麤搗篩四味漿水二盞并冬瓜汁隔宿浸欲

發日五更初以急火煎取一盞半去滓分為二服五

更一服取快吐三五度至發時又服亦取吐三五度

過時便得喫漿水粥補之

治溫瘧發熱身面皆黃小便不利常山丸方

常山

赤茯苓去黑皮

黃芩去黑心各試兩

香豉炒訖合

右四味搗羅爲末以粟米飯和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下不拘時

治瘧病身黃發熱小便不利升麻湯方

升麻壹兩

常山

檳榔各參分

鼈甲塗醋炙令黃去裙襴知母

生地黃各壹兩半

右六味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入葱白三寸豉三十粒同煎至八分去滓溫服不拘時

治瘧病發熱身黃小便不利茯苓湯方

赤茯苓主黑皮

白芍藥

瞿麥穗各壹兩

白朮參分

右四味搗篩每服五錢七水一盞半入葱白五寸生薑一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

瘧痢

論曰瘧痢者瘧久不差寒熱邪氣內傳腸胃也其病寒熱往來痢下膿血赤白相雜腸中切痛隨其陰陽而治之

治瘧兼痢無問亦白水穀鮮血皆主之黃連犀角丸方

黃連去須

犀角屑

豉妙各貳兩

龍骨兩

牡蠣熬半兩

右五味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九米

飲下日三

治瘡痢無度赤白相雜黃連丸方

黃連須去

黃蘗去麤皮

羚羊角屑

艾葉炒

赤芍藥各鼠

當歸切焙

右六味為細末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每

服三十九粥飲下不拘時

治瘡痢挾熱下血腹痛地榆湯方

地榆剉

黃連須去

黃芩去黑心

犀角屑各壹兩

升麻

齒根各半兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治瘡兼痢不止常山丸方

常山

黃連須去

豉炒各

附子炮裂去皮

右四味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服四九米飲下

未發前空腹服欲發更服三九自旦至暮乃食三日

勿雜食佳

治瘡痢苦渴烏梅飲方

烏梅 貳拾枚 擊破

右一味以水三盞煎至一盞法滓和蜜一匙細細飲之

治瘡痢黃連散方

黃連 去須 當歸 切焙各壹兩 乾薑 炮半兩

右三味為細散每服三錢匕水一盞煎至七分放溫臨發時服如茶點或熟水調服亦得

治瘡痢牡蠣散方

牡蠣 熬 常山 剉 陳橘皮 湯浸去白焙

桂 去麤皮各參分

右四味為細散每服一錢七溫酒調下

治瘡氣急黃并痢前胡丸方

前胡 去頭 赤茯苓 去黑皮 芍藥

枳殼 去麤皮炒 黃芩 去黑心各半兩 大黃 壹兩生

大麻人 壹兩半細研

右七味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九丸午食前以米飲及漿水下令溼利為度不利加至十五丸

右小量意服之有痲癬者宜加後藥

蝨蟲 去翅足炒 黃耆 薄切 天門冬 去心焙

鼈甲 去裙襖 生乾地黄 焙各貳兩 赤茯苓 去黑皮

人參各等

右七味爲細末與前藥末相和鍊蜜丸如梧桐子大
每服二十九漸加至三十九空心地黃酒下以差爲
度

瘴氣

論曰傳言瘴者山川厲毒之氣又云江山霧氣多瘴凡
以其氣鬱蒸而然也諸家方論治瘴之法不一或謂其
證與傷寒相類有在表可汗者有在裏可下者有在膈
可吐者又或以治瘴之法治之者今原廣南山川地形
瘴氣所生之因及春夏之交瘴氣所起之時與夫人染

瘴氣而拯治之法悉著于篇庶可考焉且陽生於子盛
於巳陰生於午盛於亥陽不極則陰不萌陰不極則陽
不芽而廣南位當巳午則陰陽之氣蘊積於此可知矣
天不滿西北地不滿東南西北方陰也土地高厚東南
方陽也土地卑下而廣南方屬東南則土地之卑下可
知矣以其土地卑下而陰陽三氣之所蘊積是以四圍
之山崇高回環百川之流悉所歸赴及秋草木不凋瘁
當冬蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不散霧露之氣易以
傷害此正岐伯所謂南方其地下水土弱霧露之所聚
者也故瘴氣獨盛於廣南然瘴氣所起其名有二孟夏

之時瘴名芳草而終於秋孟冬之時瘴名黃芒而終於
春四時皆能傷人而七八月之間山嵐烟霧蛇虺鬱毒
之氣尤甚故當是時瘴疾大作不論壯老或因飢飽過
傷或因榮衛虛弱或衝烟霧或涉溪澗但呼吸斯氣皆
成瘴疾其狀頭疼體痛胸膈煩滿寒熱往來欬逆多痰
全不思食發渴引飲或身黃腫脹眉須脫落是皆毒藹
鬱蒸所致夫生於陵者安於陵其土人宜無所慮矣然
且日食檳榔蓋檳榔之爲性破堅毒除蘊積故耳治法
當先以礞石下收其陰次以丹砂上正其陽陰陽氣正
中滿自消然後以檳榔解其餘蘊

治瘴收陰礞石丸方

礞石

參兩煨醋
淬壹柒個

右一味搗羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服三
十九新汲水嚥下臨卧一服

治瘴正陽丹砂散方

丹砂

參兩
飛研水

右一味飛研取細每服半錢匕溫蜜水調下平旦一
服

治瘴解蘊檳榔湯方

檳榔

參兩
生剉

右一味蠶搗篩每服二錢七水一盞煎至七分日午
一服凡服此藥隔夜先服磁石九次日一服丹砂散
當日午服檳榔湯至夜再依此次第服之三日後病
勢減藥減半病勢盡藥卽止

治山嵐氣安心藏丹砂丸方

丹砂研半

阿魏豐分米醋浸令軟
劬以醋爲糊用

白朮

人參

白茯苓去黑
皮

當歸切焙各
半兩

右六味搗研五味爲末用阿魏醋煮麩糊丸如梧桐
子大如常服空心溫酒嚥下七丸遇患者空心桃人

湯嚥下十九檳榔湯亦得

治山嵐瘴氣如瘧秦芄湯方

秦芄去苗
土

苡胡去苗各
半分

常山分

烏梅搗
收

糯米搗
搗

右五味剉如麻豆都用水二盞煎至一盞半去滓分
溫二服未發前服之取吐利

治山嵐氣炒桃人方

桃人壹
斤

吳茱萸

青鹽各肆
兩

右三味一處鍋內炒候桃人熟爲度以瓷餅貯密封
一七日後取出去茱萸并鹽只將桃人去皮尖時嚥

一二寸枚大辟山嵐毒氣

治山嵐瘴毒氣令不著人草豆蔻飲方

草豆蔻

去皮

高良薑

甘草

炙各半兩

右三味麤搗篩每服五錢匕煎作熟水頻飲之

治山嵐瘴氣有黑霧起處急服却毒散方

麻黃

去根節

蜀椒

去目并合口炒出汗

烏頭

炮裂去皮臍

白朮

各半兩

防風

去叉兩

桔梗

炒

桂

去麤皮各半兩

乾薑

炮壹分

右八味搗羅爲散每服一錢匕溫酒調下每日食前常服

治山嵐瘴面黃力劣寒熱往來心胸煩渴常山飲方

常山

貳兩

乾漆

炒煙出叁分

甘草

炙剉壹兩

豉

生用壹合

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半同煎八分去滓空心溫服吐吐黃痰効

治山嵐瘴氣痰滯嘔逆時發寒熱荷葉散方

乾荷葉

大者壹片

砒霜

研壹分

葉豆

半兩

甘草

壹分

右四味搗羅爲散每服半錢匕冷水調下吐出痰効
治嵐瘴鬼瘧等辟邪丸方

萊豆

肆拾粒
為末

黑豆

參拾粒
為末

砒霜

半錢
研細

丹砂

兩粒如
豆大研

鉛丹

青錢研留
少許為衣

右五味同入乳鉢內滴冷水丸如梧桐子大每服一丸以東南桃心七枚取井華水研向日曬下醋水亦得

治瘴氣數日寒熱不定隨甲丸方

鼈甲

去裙襖
醋浸炙

常山

炒

豉

炒各
半兩

右三味搗羅為末入麝香少許再研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服十九至二十九空心臨卧溫米飲下於發前服慎熱物一時久即不吐瀉

治嶺南瘴氣頭疼體痛寒熱往來胸滿腹脹煩渴嘔逆欬嗽多痰心躁狂言大便難小便赤露宿湯方

常山

炒壹兩

秦艸

去苗
土

梔子人

芫胡

去苗

青蒿子

檳榔

甘草

炙剉各
半兩

桂

去蟲皮
壹分

右八味麝搗篩每服三錢匕水三盞入烏梅二枚黑豆二十粒煎至一盞半去滓露一宿五更初再溫服其滓再入水二盞煎至一盞去滓當夜臨卧時服治瘴氣虛弱面色萎黃不思飲食或因或省心腹脹滿痞氣耳鳴補元氣十補丸方

巴戟心注

肉蓯蓉

酒浸切焙

白朮

米泔浸壹宿切焙

五加皮剉

石斛

去根各兩

鹿茸

去毛酥炙半兩

人參

菟絲子

酒浸壹宿別搗

栝子人研

菊花各參分

右一十味等分搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服

二十九空心臨臥溫酒下鹽湯亦得

治嶺南諸瘴豫固丸方

丹砂

雄黃

各壹兩並水飛過令乾

鬼臼

半兩為末

阿魏

壹分酒半升熬成膏

右四味再研勻阿魏膏和丸如雞頭大緋絹袋貯十

丸常執手中頻嗅瘴氣內行不著人遇瘴病者并華

水嚼下三九五服可差

治瘴氣惡心四肢疼痛口吐酸水不思飲食憎寒壯熱

發過引飲二廣七閩多山嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣當秋

七八月之間芒華發時此疾大作謂之黃芒瘴又謂黃

芽瘴是也蓋人或因飢飽或由虛怯或衝烟霧或涉溪

澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟇瘴啞瘴其名不一並皆

療之香椿散方

香椿嫩葉

酒浸焙參兩

甘草炙

南壁土

向日

臘茶各壹兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕用酒調下如患久者
更入甘遂此胡各半兩空心臨臥服

治瘴疫時氣溫黃若嶺表行此藥常帶隨身茵陳蒿丸

方

茵陳蒿兩

大黃伍兩

豉伍合

常山

梔子人蔥

芒消研

杏人

去皮尖雙人
炒研各參兩

龍甲

去帶兩兩
浸炙貳兩

巴豆

半兩去皮心
熬別研去油

石九味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大初得時氣三
日旦服五丸至半時許或吐或利或汗爲効如不吐

利不汗更服一二九卽以熱飲投老小加減凡黃病

痰癖時氣傷寒瀆痢小兒熱欲發癩服之皆差治瘴

氣尤妙

治瘴氣久治不差者菖蒲散方

菖蒲兩

白朮炒

蒼朮炒

梔子人

荆芥穗

芎藭各壹兩

甘草炙

乾薄荷

側柏色黃

吳茱萸

湯洗
焯乾

消石

研各
半兩

右一十一味搗羅爲散用薄荷湯調下二錢匕如患
熱疾水一盞入生薑五片棗二枚擘破煎至七分溫

治嵐瘴煮豆丸方

服

白木

貫眾土

蒼朮去皮

甘草炙等分

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如彈子大每一丸先用黑豆一盞銚子內鋪面令平於豆中心安藥丸在豆內添水高豆一指許慢火煮水乾取豆暴乾以絹袋盛豆每服二十粒新水下有瘴處空心一服如涉遠遇飢新水下五十粒至一百粒粗可充餒

治瘴木香丸方

檳榔雞心者

陳橘皮湯去白焙各貳兩

木合

附子大者炮裂去皮臍人參

厚朴去麩皮生薑汁炙

桂去麩皮

羌活去頭

京三稜炮

獨活去頭

乾薑炮

甘草炙

芎藭

大黃炒

芍藥各半兩

牽牛子壹斤搗取末肆兩

肉豆蔻陸枚去殼

右一十七味搗羅爲末瓷器盛密封臨服再用牽牛末二兩藥末一兩同研令勻鍊蜜爲丸如梧桐子大心腹脹滿一切風勞冷氣臍下刺痛口吐清水白沫

醋心痰癖氣塊男子腎藏風毒攻刺四肢及陽毒脚
氣目昏頭痛嘔逆及兩脇堅滿臨臥橘皮湯下三十
丸以利爲度婦人血痢下血刺痛積年血塊胃逆手
足心煩熱不思飲食生薑湯下三十九取利小兒五
歲以上疳氣腹脹氣喘空心溫湯下五七丸小者減
丸數服凡胸腹飽悶不消脾泄不止臨臥溫酒下取
利食毒癰疽發背嵐瘴氣纔覺頭痛背膊拘緊便宜
服之快利爲度常服可以不染瘴疾凡瘴疾皆因脾
胃實熱所致常以涼藥解膈上壅熱并以此藥通利
彌善此藥本治嵐瘴及痘瘡大効昔人嘗刻石于大

庾嶺蒙効者不可勝數皆以快利爲度

治瘴氣烏藥湯方

烏藥剉焙

半夏半斤生薑絞汁

桂去麝皮

馬鞭草焙 荆芥穗

陳橘皮去白焙乾

甘草炙

右七味屬搗篩每服二錢匕水一盞入生薑五片煎
七分去滓不拘時溫服

治初得溫黃瘴氣憎寒壯熱速宜通轉茵陳丸方

茵陳蒿壹兩

大黃剉

龍甲去襍 醋

常山

杏仁湯去皮尖雙

梔子人

各半兩

巴豆

去皮心膜芒消研各出油盡

研各分

右八味搗研爲末以豉汁和丸如梧桐子大每服空

心茶下五丸得快利以冷粥止之

瘡瘡

論曰人與天地同流通萬物一氣故有感於山川毒厲之氣而爲病者瘡瘡是也以其寒熱時作與瘡同類故謂之瘡瘡傳謂兩山夾水多瘡蓋陰氣多而陽氣少則易爲寒熱之疾故也

治瘡瘡經百日或一年者白薇湯方

白薇

蜀漆葉

各半兩

常山

壹兩

知母

切焙半兩

龍甲

去裙襴醋炙黃參分

甘草

炙

苦參

各半兩

大黃

生壹兩

升麻

半兩

石膏

碎參分

豉

壹合

蒜

獨顆者參枚切

淡竹葉

切參兩

赤茯苓

去黑皮參分

龍膽

黃芩

去黑心各半兩

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞酒半盞同煎至一盞去滓未發前溫一服發時一服仍以藥

汁塗手面良

治瘡癩麝香散方

麝香

研壹錢

龜甲

去裙襴黃半兩

丹砂

研貳分

甘草炙半兩

大黃炒分

常山兩

右六味搗羅為散每服二錢匕未發前溫酒調下臨

發時更一服

治諸瘴癘及蠱毒瘡等木香丸方

木香壹分

升麻分

鼈甲去裙黃

甘草炙各半兩

玄參

豬苓去黑皮各參分

犀角銹

檳榔剉各半兩

豉炒壹合

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空腹溫酒下日三服

治山嵐瘴癘或入山早吸毒氣令人寒熱如瘧終日不

已頭痛痰逆嘔吐不下食日漸羸瘦砒霜丸方

砒霜兩半

雄黃

丹砂已上參味同壹處研

瑇瑁銹

藜蘆炒

椿葉陰乾者各壹兩

阿魏壹兩半別研

右七味搗研為末和勻用安息香一兩酒浸重湯煮

為糊丸如赤小豆大每用三丸男左女右以緋絹袋

盛繫於臂或衣帶上如瘡不已卽用醋湯而東嚙下

三丸如要吐空心漿水下五丸如吐甚以冷水調漿

豆末一二錢匕服卽止忌熱物此藥五月五日合勿

令婦人雞犬見

治瘴瘧白朮丸方

白朮

丹砂研

麝香研

丁香

訶梨勒皮

安息香入胡桃人研

檀香剉

葦撥

犀角鎔各半兩

薰陸香

蘇合香

龍腦研各壹分

莎草根

石膏

木香各半兩

右一十五味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十

丸空腹井華水下老人小兒三丸仍用紗絹袋盛帶

於臂辟鬼氣臘月合以新瓷器盛勿令泄氣

治嵐瘴寒瘧兼解邪毒砒霜丸方

砒霜壹

澱花貳

鐵砧上末肆兩淘淨

右三味搗研為細末用麝香少許金銀薄四十片以

糯米糝子丸如雞頭大每服一丸用酒磨下或吐或

瀉為差

治山嵐瘴瘧寒熱往來或二日三日一發常山飲方

常山剉

厚朴去薑皮生薑汁炙熟各壹兩

草豆蔻去皮

肉豆蔻去殼各兩枚烏梅和核柒枚

檳榔剉

甘草炙各半兩

右七味麝搗篩每服二錢七水一盞煎至六分去滓

候冷未發前服如熱喫即吐

前山嵐瘴瘧寒熱久不差保安湯方

常山兩

青蒿

知母各壹兩

桃人湯浸去皮去雙入研半兩

右四味蠱搗篩每服二錢匕水一盞生薑半分同煎至六分去滓稍熱服不拘時

治一切瘴瘧常山飲方

常山

秦艸去

甘草剉

麻黃節去根

烏頭炮裂去皮臍剉

杏仁去皮尖雙入炒研

陳橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

厚朴去麩炙生薑汁炙各半兩

右九味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑半分

漿二枚擘破煎至一盞去滓未發前不拘時溫服

治山嵐瘴瘧赤小豆丸方

赤小豆分

鬼白

丹砂研

雄黃研

阿魏研

鬼箭羽各半兩

右六味先搗研五味為末酒煎阿魏和丸如梧桐子大每服一粒用絳絹帛子繫中指上男左女右

治山瘴瘴南方山嶺瘴氣令人寒熱發作無時萎黃腫

滿四肢痺弱鮫鯉甲酒方

鮫鯉甲炙伍枚

鼈甲去裙襖炙黃

烏賊魚骨去甲

附子炮裂去皮臍各壹分常山兩

右五味細剉以酒二升半漬一宿瘡發前稍稍服之
勿絕藥味也兼以酒塗身體服藥良久方可進飲食
寒熱往來

論曰寒熱往來者陰陽虛實更勝也夫陰實生內寒陽
虛生外寒皆為陰勝陽陽實生外熱陰虛生內熱皆為
陽勝陰陰陽相勝故寒熱互作而往來治法宜使陰陽
和平氣無相勝則病可愈

治寒熱往來夜臥盜汗四肢無力飲食口苦上氣欬嗽

此胡湯方

此胡去苦壹兩半

五味子

桔梗炒

熟乾地黄焙

白茯苓去黑皮

麥門冬去心焙

紫苑去苗

人參

地骨皮

黃耆剉

白朮

桂去麤皮

牡蠣研粉各壹兩

半夏去滑湯洗柒遍

甘草炙各

右一十五味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑半分

拍碎棗三枚擘破煎至六分去滓溫服不拘時候

治寒熱往來久成勞瘵地骨皮湯方

地骨皮

知母焙

此胡去苗

枳殼去瓤麤炒各半兩

籠甲去襁爛醋炙參分

赤茯苓去黑皮參分

虎頭骨壹兩酒炙焦

右七味蠶搗篩分爲五貼每貼以水三盞煎取一盞
下地黃汁一合更煎三五沸去滓分溫二服食後良

久相繼服日一貼

治寒熱似瘧枯梗湯方

桔梗剉炒

兩

甘草

炙半兩

知母

焙半兩

芫胡

去苗壹兩半

大黃

剉炒半兩

鼈甲

去襖醋炙貳兩

右六味剉如麻豆分爲六貼每貼用童子小便二盞

葱白三莖豉半合浸食頃煎取一盞去滓食後分溫

二服日一貼

治寒熱乍進乍退虎骨湯方

虎頭骨

壹兩酒炙爲末

知母

焙半兩

葱白

柒莖

鼈甲

去襖醋炙半兩

豉

分

右六味細剉如麻豆用水三盞煎取二盞下童子小

便半盞和煎數沸去滓食後良久分溫三服

治寒熱不能飲食羸瘦少力黃耆湯方

黃耆

剉貳兩

人參

兩

白茯苓

去黑皮各壹兩

芫胡

去苗壹兩

當歸

切焙各半兩

白朮

壹兩

桂

去麋皮半兩

甘草

炙半兩

枳殼

半兩去瓢炒

桔梗

剉炒半兩

桃人

半兩湯浸去皮尖雙人炒黃

右十一味蠶搗篩每服三錢匕水一盞生薑半分

拍碎棗三枚擘破煎至六分去滓不計時候溫服

大德重校聖濟總錄卷第三十七