



上谷閻純璽先生著

增補
繪圖
胎產心法

雲陽王鎬題

新出各種醫書廣告

薛五齋醫業全集

精校本湯頭歌訣

精校眼科百問

精校婦人良方

精校本草原始

精校眼科大全

精校外科秘錄

精校雷公藥性賦

精校三指禪

陳修園醫書全集

精校王李脈訣合刊

精校針灸大成

御纂外科金鑑

精校李瀕湖脈學

精校摘方備要

御纂醫宗金鑑

精校達生篇

精校小兒直訣

精校徐批外科

精校壽世保元

陳氏傷寒辨症錄

精校外科圖說

精校萬病回春

精校錄海精微

王洪緒外科全生

精校張傷寒論

精校傳男女科

精校外科正宗

精校醫宗必讀

精校萬法歸宗

精校本草備要

精校醫學三字經

精校祝由十三科

四開大字本草備要

精校濟陰綱目

精校痘疹定論

四開大字湯頭歌訣

精校牛馬經

精校醫林改錯

重刊胎產心法序

胎產心法一書濟世之寶筏也青郡自陸司馬刻行後流傳未廣遂攜板回籍不無遺憾營陵陳雪舫先生以光祿家居好善樂施因時疫流行既刻痧喉論徧給矣復亟取此書付諸梓蓋利人濟物之心隨事而寓故所為必實有益於世非徒好行其德也刻既竣敬綴數語以告異日之讀是書者道光丙午嘉平上浣愚姪夏與賢頓首拜序

重刊胎產心法序

余家非業醫者於岐黃書多所收藏而胎產心法存有鈔本不知編錄出自誰氏逮予經目已漸次散佚欲付剞劂蓄有空願而已時家子儀兄亦以是書失傳既久難遽為哀輯乃先取胎產祕書復參之達生續達生等編增廣成帙梓以行世遵其法亦屢有奇驗然於胎產雜證尚有缺而未備者及變堂陸司馬泣青州出重翻刻本以示同郡乃知心法一書為上谷閻觀察所著分為上中下三卷並以目錄序言一切雜證無不備載按其方論施治奏效捷如影響誠婦科之金鍼而胎產之津梁也余物色一編常置案頭以供檢閱後被友人假而不返陸司馬又復挾板南旋此書遂為余家所無遇家中有患胎產證者往往於親串中借觀數日旋即索償以去丙午夏余子婦王氏產後忽遭危疾急尋此書不得因而殤逝益信胎產心法實為救急之要書而恨其傳之不廣於是覓本繕寫校對無訛鳩工重鐫四閱月而板成是編悉遵陸氏舊刻不致一字妄為增減所以存其真也亦期於世之業婦科者稍有裨益云爾是為序

道光二十有六年歲次丙午仲冬營陵陳汝憲雪舫氏書於三楹綠蔭草堂

胎產心法後序

蓋聞天地之德大生廣生軒岐以來有方有藥惟傳方差勝於捨藥而臨證或難於得方矧伊
蓬遠之閩中何自乞靈於海上脈息必忝諸經訣卵翼多費其心神若乃產後胎前尤多兼證
誰則條分縷析彙以成書

愛堂陸司馬先生收藏最富上谷閩誠齋觀察著作頗精心法一編功德萬眾醫者意也詳哉
言之緬
司馬之

先世杏林偕橘井施仁稱鉅閥於靈州玉軸共牙籤受讀愛此帙則棄藏篋行鑒其術之洞見
垣方闔觀察若現女身極切婆口篇立一論法備諸門耻為帶下之醫忝以枕中之秘造化在
手刺量從心雖大藥原非寒士所能儲而兼證悉屬他書所未備即所論列之處並加可否其
間所當家有其編板行於世而自初刊定本百年浙派其流傳重校需人一語遂深其誣謬非
走之所為樂於從事者乎夫惟觀察所著包孕良多

司馬鳩工仁育不少如持贈以藥樹為消導其木魁耻君子之獨為付老嫗而皆解毋負此腹
贊成男成女之知能若取諸懷完良相良醫之心願從此遂孽以字莫苦其生飭一路分占十
三科題哺千兒各作五百道乳保抱搗持屢婦子居然使卿有功福德咸重有女人何嘗從佛
得度於其刻之竣也欣然書之


道光戊子秋福山王延慶頓首拜序

胎產心法原序

醫以寄苑生每患術少而胎產尤闕兩命木惟本病須子細亦且兼症費料理也予不敏博採方書日取先賢名論探索奧妙並三十餘年閱歷臨證似有以得其要領折衷是非都為一書釐成三卷凡婦人受胎之始必固其根臨產之際必防其變既產之後必保其生曲折周詳可云備矣不敢自私為一家之學爰付梓工願世之業醫諸君融會貫通而神明其術不亦可乎即不然依論擇方對症加減倘不以予言為河漢則所保全之子母幸甚時

雍正庚戌九月之中浣廣西左江觀察使上谷閩純璽誠齋書此於官署

圖腑臟內盆骨女



圖片半經陰



交骨 第五塊股骨
 陰阜 鈎
 膀胱 尾闕骨
 總溺管
 陰莖
 內戶
 外戶
 陰道
 會陰
 子宮口
 子宮頸
 子宮頂
 直腸
 肛門


圖器殖生人婦



圖面前宮子



臟腑圖



姓 卵 圖



一月十六日



兩月二
十四日



十四日
廿日
廿六日
三月廿日
三月廿四日
三月廿八日
四月一日

胎 兒 與 胎 盤 運 血 圖



三月半


圖月足胎雙



橫生圖



兒胎之月個六娘姪



增補繪圖胎產心法卷之上

各論目錄

脉法

逐月養胎並慎擇醫藥論

三禁

妊娠藥忌歌

惡阻論

胎逆上逼脹滿子懸論

子煩並五心煩熱及煩躁口乾論

轉胞淋閉論

喘急論

中惡中暑中濕中風論

瘧論

傷風論

大便燥論

胎不長養過期不產並枯胎論

腸單似孕並蓄血似孕論

諸方目錄

脉訣歌

受胎試驗法 附方

教養宜忌論

種子補益受胎壽子論

胞漏並小產論

諸血證論

遺尿論

泄瀉論

子癇論 附破傷吐衄血類中風

傷寒溫熱時疫論

傷食論

子瘡論

子瘡論

妊娠出痘論

全圖解 方附本條

試男女胎法

飲食七情禁忌

胎動安胎論

諸痛論 附孕癰

子腫子氣子滿論

子淋論

子嗽論

霍亂論

痢論

謔語論

臟燥悲傷論

腹內兒哭鐘鳴論

鬼胎論

妊娠麻疹論

補益門

種子丹

種子奇方

坎離丸

延嗣酒

補陽益氣丸

河車大造育麟丸

胎動安胎門

丹溪安胎飲

安胎萬全飲

黑白安胎散

芩木安胎飲

惡阻門

加味參橘飲

參橘飲

二香散

小和中飲

良方半夏茯苓湯

胞漏小產門

加味補中安胎飲

景岳胎元飲

諸痛門 附孕婦

川芎茶調散

補益大豆方

濟陰壽子飲

山精壽子丸

濟陰大造丸

加味安胎飲

杜仲丸 附千金保孕丸

加味四物湯

紫蘇飲

加減安胎飲

胡連丸

四物湯 加減用法

保胎神效丸

止嘔安胎飲

青竹茹湯

保生湯

六味異功煎

茯苓丸

歸脾湯 附加味歸脾湯

泰山磐石散

膠艾安胎散

加味芎歸湯

歸原飲

橘皮湯

半夏茯苓湯

理陰煎 附附子理陰煎

苦柚單方

尊生安胎飲

安胎萬全神應散

增損八物湯

鳳衣散

止漏絕神丹

尊生定痛延胡散

藿香正氣散

尊生定痛延胡散

人參養胃湯

平胃散

二妙散

阿膠散

加味導赤湯

東垣涼膈散

胎逆上逼脹滿子懸門

四君子湯

尊生和氣飲

諸血證門

加味清胃散

涼血地黃湯

子腫子氣子滿門

子滿即名胎水

全生白朮散

茯苓湯

子煩並五心煩熱及煩躁口乾門

竹葉安胎飲

加減參麥湯

子淋門

加減安榮散

六君子湯

膠艾湯

獨活寄生湯

授徑方

小柴胡湯

香薷散

道遠散

針灸方

黃芩清肺飲

健脾利水湯

千金鯉魚湯

千金竹瀝湯

知母丸

千金托裏散

膠艾芎歸湯

三物解毒湯

六味地黃湯

下瘀血湯

和氣安胎飲

千金芩朮芍藥湯

千金托裏散

佛手散

八珍湯

三物解毒湯

六味地黃湯

下瘀血湯

和氣安胎飲

加參平胃散

加味地黃湯

局方五皮湯

加味五皮湯

加味天仙藤散

束胎飲

加味竹葉湯

一味黃連湯

二陳湯

尊生加味安胎散

補中益氣湯

佛手散

當歸活血湯

四烏湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

當歸活血湯

轉胞淋閉門

二陳升提飲

遺尿門

白薇散

加減六味湯

子嗽門

寧肺止咳散

蘇桔湯

喘急門

參蘇飲

平安散

泄瀉門

胃風湯

加味理中湯

不換金正氣散

胃苓湯

密齋加味四君子湯

人參白朮散

霍亂門

香蘇散

加味四味紫蘇和胎飲

回生散

七味白朮散

中惡中暑中濕中風門

散滯湯

藁艾方

搜風安胎飲

清暑和胎飲

子癇門

羚羊角散

鈞藤湯

清神湯

琥珀壽星丸

加味治中湯
加味六君子湯

四苓散 附五苓散

六和湯

黃芩白朮湯

荆防安胎散

痢門

厚朴去乾姜湯

香連丸

駐車丸

一味阿膠飲

瘧門

枳實理中湯 附理中湯 附子理中湯

散邪飲

明砂止瘧丹

傷寒溫熱時行疫證門

蔥白香豉湯

黃龍湯

柴葛安胎飲

千金石膏大青湯

謬語門

生地黃黃連湯

臟燥悲傷門

甘草大棗湯

大便燥門

厚朴生薑甘草半夏人參湯

連理湯

白頭翁加甘草阿膠湯

阿膠黃連飲 又名黃連阿膠湯

承氣湯

截瘧湯

加減丹溪安胎飲

尊生香蘇散

三黃解毒湯

生津葛根湯

石膏六合湯

血證黑神散

淡竹茹湯

黃芩芍藥湯

千金三物膠艾湯 又名膠艾榴皮湯

當歸黃芩芍藥湯

加味香連湯

黃連解毒湯

柴胡知母湯 附白虎湯 參白虎湯

黃連解毒湯

柴胡知母湯

金花湯

護胎法

梔子蔥豉湯

升麻六合湯

濟陰香蘇散

又法

加味化斑湯

三

潤燥湯

胎不長養過期不產並枯胎門

保元湯

十全大補湯

補血行滯湯 又名催生湯

鬼胎門

決津煎

通瘀煎

姙娠出痘門

黃芩湯

姙娠麻疹門

升麻葛根湯

固胎飲

卷之中各論目錄

脉厥歌

保產論

胎殺方位

房中避神方位

生子宜向方

安產藏衣方向宜忌

借地法

臨產須知

難產五因

催生論

子死腹中論

胞衣不下論

交骨不開論

諸方目錄

保產門 預服易產

達生散

密傳達生散

養胎散

神寢丸

保產無憂散

千金不換方 一名保產無憂方

保氣丸

滑胎煎

滑胎散

家傳胎產金丹

臨產須知

效逆湯

催生門

催生獨參湯附論

三合濟生湯

催生芎歸湯即佛手散

乳硃丹

催生如神散

催生起痘神驗方

子死腹中門

立候下胎散

牛膝丸

扶羸小品方

鷄熨下死胎法

胞衣不下門

益母丸一名返魂丹
附益母膏

又方

良方牛膝散

半夏散

交骨不閉門

參使佛手散

三補丸

催生萬金湯附論

魚膠散

葱白益母湯

伏龍肝散

催生如聖散

尊生救生湯

烏金散局方名黑神散
靈苑名肉桂散

琥珀丸

仙傳保命丹一名安讓丸
一名奪命丹

下胎單方

良方奪命丹

血極膏一名醋大黃

灸足小指法

催生佛手散

催生簡易方

神柘飲

二脫散

手握丹一名兔膽丸
又名萬金膏

神應丹

脫金煎

官桂散

千金榆皮湯

失笑散

二柘下胎方

千金牛膝湯

油密飲

催生如意散

秘錄加味神柘飲附論

膠養散

琥珀黑龍丹

香桂散一名桂香散
附散苦散

黑神散

返魂丹

下胎衣單方

花蓋石散

蛇蛻烏金丸

加味芎歸湯

開骨膏

卷之下各論目錄

脉訣論

生化湯論

附方

三衝論

血塊論

惡露不止論

傷食論

腹痛論

手足身痛論

類中風痙瘓及語澀口

麻昏論

痢滯論

腹脹滿悶論

小便數及遺尿不禁論

大小便血論

乳少無乳並乳汁自出論

乳懸論

諸方目錄

生化湯附論

三衝門

產後大補須分虛不虛全實三證論

調攝論

產後不宜汗下利小便論

暈厥論

氣喘論

忿怒氣逆論

小腹痛並兒枕論

發熱論

口噤不語筋等證論

口乾渴兼小便不通或短少論

霍亂論

浮腫論

暮勞骨蒸論

月水不通論

前陰諸證論

四物湯不宜產後論

產後藥誤須知

新產三審論

血脫氣脫神脫三證論

血脫暴崩氣脫似喘神脫甚妄見及諸語聲發狂

惡露不下論

頭痛論

脫汗亡陽及諸汗論

腰痛論

大便燥秘論

脇肋痛論

怔忡驚悸並虛煩燥論

泄瀉及完穀不化並遺尿論

氣逆嘔吐不食論

呃逆論即吃武又

咳嗽論

淋證論

吐衄及口鼻黑氣起而衄並舌黑論

癰疽論

妒乳吹乳乳癰論

乳巖論

來復丹

新產三審門

殿胞煎

暈厥門

急救量法

加參生化湯

血脫氣脫神脫門

荆苳治崩湯

尊生升舉大補湯

寧神生化湯

龍齒清魂散

惡露不止門

蒲索四物湯

固陰煎

良方一味防風散

氣喘門

金水六君煎

惡露不下門

加減八珍湯

脫汗亡陽及諸汗門

二味參蘇飲

從權急救生化湯

參麥五味飲

加參生化止崩湯

千金伏龍肝湯

寧神定魄茯神湯

升陷固血湯

壽脾煎

保陰煎

大補元煎

清化飲

薛氏加味四物湯

滋榮益氣湯

升舉大補湯

續氣養榮湯

千金遠志湯

四味散

增補台心法

麻黃根湯

傷食門

黃耆建中湯附小建中湯內補建中湯

止汗散

人參養營湯

生化消食湯

健脾消食湯

長生活命丹

忿怒氣逆門

木香生化湯

健脾化食理氣湯

頭痛門

產後芎歸湯即佛手散此方因證加藥治法

參蘇芎歸湯

心痛即胃脘痛門

生化立效方

腹痛門

加味生化湯

當歸建中湯

金匱當歸生薑羊肉湯

金鈴子散

五君子煎

胃關煎

四神丸附二神丸

四神散

小腹痛並克枕痛門

延胡索散

蠟礬丸

太乙膏

腰痛門

養榮壯腎湯

局方調經散

琥珀地黃丸

脇助痛門

芎歸瀉肝湯

當歸地黃湯

加減小柴胡湯

加減補中益氣湯

瀉白散附加味瀉白散

歸芍清用飲

手足身痛門

起痛散

發熱門

辛散生化湯 附辛散湯

當歸補血湯

補中益腎湯

大便燥秘門

養正通幽湯

潤腸粥

類瘧及寒熱往來門

滋榮益氣扶正湯

加減養胃湯

三陰煎

補陰益氣煎

類中風瘖瘖及語謔口噤不語筋攣癱瘓門

滋榮活絡湯

天麻湯

芎歸棗仁湯

七珍散

怔忡驚悸並虛煩煩燥門

加減歸脾湯

人參當歸湯

養心湯

麻昏門

地黃飲子

口乾渴兼小便不通或短少門

生津止渴益水飲

生津益液湯

泄瀉及完穀不化並遺尿門

加味五苓散

濟川煎

參朮膏

參歸湯

加味生脉散

舒筋湯

止汗生血飲

安神丸

人參丸

蓮子生化湯

參苓蓮子飲

加味六君子湯

痢滯門

香苓生化湯

伏龍肝湯丸

霍亂門

生化六和湯

氣逆嘔吐不食門

加減生化湯

加味香砂生化湯

補中和胃湯

呃逆門 即吐或又名咳逆

加味理中湯

腹脹滿闕門

治脹方

浮腫門

咳嗽門

加味生化湯

健脾利水生化湯

加味生化湯

歸芍連殼飲

歸芍連殼飲

溫中散

溫中散

溫胃丁香散

安胃行血湯

益黃散

羌附湯

養生化滯湯

調經湯

桔梗湯

參苓木附湯

參苓大補生化湯

五皮散

五皮散

附子散

附子散

石蓮散

加減六和湯

抵聖湯

加減六君子湯

小調經散

加味甘桔湯

參苓生化湯

參香散

香連丸

香連丸

加味理中湯

加味理中湯

香砂生化湯

和中湯

桑貝芎歸清肺湯

桑貝芎歸清肺湯

加味五皮湯

加味五皮湯

異功散

淋證門

知柏導赤散

加減茅根湯

小便數及遺尿不禁門

升陽調元湯

還少丹

葶勞骨蒸門

參歸湯

清骨散

千金當歸芍藥湯

吐衄及口鼻黑氣起而衄並舌黑門

二味參蘇飲

大小便血門

小薊湯

乳少無乳乳汁自出門

行氣下乳湯

又方

如乳吹乳乳癰門

二母湯

益元散

濟陰加味四物湯

桑螵蛸散

白茯苓散

保正湯

烏骨雞丸

玉露散

香砂四君子湯

獨參湯

參朮湯

人參螵蛸散

蟹中湯

加味大造丸

漏蘆湯

通草猪蹄羹

益心湯

當歸羊肉湯

增損柴胡湯

豬蹄湯

湧泉散

瓜蒌散

連翹金貝煎

橘葉散

清肝解鬱湯

曾生治吹乳初起一

曾生治吹乳結腫三

人參敗毒散又名敗毒散

神效瓜蒌散

消毒飲

定痛消毒飲

槐艾洗法

瓜蒌貝母散

乳巖門

益氣養榮湯

乳懸門

方附本論中

前陰諸證

硫黃湯

斂宮方

當歸湯

龍胆瀉肝湯

千金療蝕方

椒湯治法

殺蟲硫黃散

肉汁治法

硫黃散

慰陰洗陰法

收腸方

又收腸方

金銀散

脉法

經曰婦人手少陰動甚者。娠子也。又曰。陰搏陽別。謂之有子。滑伯仁曰。三部脉浮沉正等。無曰身有病而無邪脉也。又尺中之脉。按之不絕者。妊娠也。滑伯仁曰。三部脉浮沉正等。無他病而不月者。娠也。按婦人帶證。足少陰脉亦多滑利。頗似孕脉。然必與手少陰脉動相應。方為娠子。否則為帶也。凡婦人懷孕。其血留氣聚。胞宮內實。故尺陰之脉必滑數。此必然之理也。然亦有中年受胎。及血氣羸弱之婦。脉見細小不數者。但於微弱之中。必有隱隱滑動之氣。此即陰搏陽別之謂。乃妊娠之脉也。但胎孕之脉。數勞損之脉亦數。然損脉數中。兼弦滑。胎孕數必兼和滑。此幾微中。邪氣胃氣之異。一診便知。再加審之以證。則顯然而明見者也。凡業醫者。不深究脉理。不細玩內經。往往誤認為陰虛勞損經閉之證。若非婦之夫。明以告之。鮮有不誤治反成半產漏下者矣。可不慎歟。

脉訣歌

肝為血兮肺為氣。血為榮兮氣為衛。陰陽配偶不參差。兩臟通和皆以類。血衰氣旺定無娠。血旺氣衰應有嗣。婦人經脉不見行。其脉微滑帶數意。身雖有病脉無邪。不濇不伏不弦勁。寸微關滑尺數形。流動往來雀啄利。兩手關脉大相應。胎已有形無差異。以上胎脉指下詳。數月懷身經脉閉。左疾為男右為女。帶縱帶橫雙生據。左手脉逆生三男。右手脉順生三女。又恐左右臟氣偏。不若陽男與陰女。寸滑為陽尺滑陰。兩寸滑實雙男取。兩尺滑實一女陰。此定男女分明語。右尺左寸滑見形。蚤別一男又一女。又云左寸浮大男。右寸沉細稱為女。屢經診驗不差。說說與醫人為確據。小兒日足胎成聚。身熱脉亂無所苦。汗出不食吐逆時。精神結備其中住。

滑疾按散三月胎。但疾不散五月母。八九十月疾數無。亦有始終洪數婦。胎脉弦牢滑利安。沉細而微歸泉路。若脉沉細服微疼。雖有形如懷抱。滿腹不動是為奇。獨冷臍下翕翕動。更兼早暮尺不同。大小浮沉無定論。或動或止或有無。此是鬼胎脉現證。連日數日皆如此。補氣活血何須問。更有夜叉胎作名。急如風雨脉情形。少停復來如初樣。否則關中雀啄成。又有指下脉弦勁。再加大小不調勻。夜叉脉候應如此。切莫妄胎成話柄。編成胎證脉訣歌。熟讀自能通捷徑。

金匱解 方附木條

凡婦人脉無病。惟陰脉小弱。乃營氣不足。若感邪而營氣不足者。必惡寒發熱。今無寒熱妨於食。是知妊娠矣。經水不行。至六十日。血聚氣搏。始凝成胎。營氣並於胎元。而胃氣不足。津液少布。故其人渴不能食。宜桂枝湯和營益胃。如醫以他病治之。反加吐下者。此為惡阻。當絕止醫法。候其自安可耳。桂枝和營散邪。芍藥收陰。甘草緩之。引以凡婦人行經時。遇冷則餘血留而為癥。然癥病婦人恒有之。或不碍子宮。則仍行經。而受孕。雖得血聚成胎。胎成三月而經始斷。斷未三月而癥病復動。遂漏下不止。癥在下迫其胎。故曰癥瘕害。所以臍上升動不安。詢為真胎無疑。若是鬼胎。即屬陰氣結聚。斷無動於陽位之理。今動於臍上。是胎已六月。知前三月經水雖利。而胎已成。後三月經斷。而血積成疝。是以血下不止。桂枝茯苓圓主之。藥俱等分為丸。食前服一丸。不止。加至三丸。用桂枝茯苓丹皮桃仁。熟以散其疝。芍藥以護其營。則血方止。而胎得安。世本作桂枝茯苓圓。乃傳寫之誤。詳桂枝氣味俱薄。僅堪走表。必取肉桂之心。方有去癥之功。安常所謂桂不傷胎。勿疑有碍於胎。觀下條子藏開。用附子湯。轉胞用腎氣丸。俱用桂附。內經所謂有故無殞是也。

妊娠六七月。脉弦為虛寒。虛陽散外而為發熱。陰寒內遊。而作胎脹。腹痛惡寒者。其內無陽。子

藏不能司閉藏之令故陰中覺寒氣習習少腹如扇也用附子湯以溫其藏則胎自安仲景用附子安胎非神而明之莫敢輕試也方缺可以意擬必薑桂之屬

行經與結胎皆屬衝任衝任雖恃乎陰陽交合為肝腎之用事然長養成胎又資坤土蓋陰陽抱負則不泄坤土隄防則不漏若宿有痰濁客於衝任則陰自結不得與陽交合故有時漏下

半產下血不絕也凡妊娠胎氣陽精內成陰血外養今陰血自結與胎阻隔不得相和獨陰在內作腹中痛下血皆陰陽失於抱負坤土失於隄防膠艾湯主之其方芍二兩歸三兩宣通陽

血芍四兩乾地黃四兩宣通陰血阿膠二兩血肉之質同類以養之安胎補血塞其漏泄甘草二兩緩中解急和陰陽通血脉艾葉二兩專理濕鬱帶漏之病此方藥氣內入開利陰血之結

而通於陽調經止漏安胎養血之妙用也然加減又必從宜若脈遲緩陰勝於陽則加乾薑或見數大陽勝於陰則加黃芩可不言而喻

妊娠有因脾土為木邪所剋穀氣不舉濕淫下流以滯陰血而腹中疔痛當歸芍藥散主之此與胎阻痛者不同故君以芍藥一兩瀉肝利滯佐以芎歸各三兩補血止痛茯苓四兩澤瀉半

勛滲濕降於小便白朮四兩益脾燥濕要知內外六淫皆能傷胎成痛不獨濕也

妊娠先因脾胃虛弱津液留停蓄為痰飲至妊娠二月之後濁陰上衝中焦不勝其逆痰飲遂湧中寒乃起嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之此即世俗所謂惡阻病也故用乾薑一兩止寒人

參一兩補虛製半夏二兩以治痰散逆即以生薑汁和丸飲服十九日三服

妊娠小便利難者膀胱鬱熱氣結成燥病非中焦而在下焦所以飲食如故歸母苦參丸主之每味藥各四兩丸如小豆飲服三丸加至十丸此方當歸和血潤燥貝母清肺開鬱苦參長於治熱利數逐水佐貝母並入膀胱以除熱結結通則水行矣

妊娠小便利病在膀胱膀胱者內為胞室主藏津液氣化出溺外利經脈上行至頭為諸陽

之表今膀胱氣不化水溺不得出外不利經脈所以身重灑淅惡寒起即頭眩但利小便則水去而經氣行表病自愈用葵子茯苓散主之葵子一觔直入膀胱以利無閉佐茯苓三兩以滲水道小便利則諸病自愈

凡妊娠之婦精留血裏尺搏而形於脈動搏則生變化若靜而不動則不生不化是以妊娠血不可以靜靜則凝滯滯則不生不化而虧少虧少則虛皆不能與化胎之火相合要知胎孕生化必脈動搏故調之者先和陰陽利其氣血常服養胎之藥非惟安胎易產且免產後諸病宜常服當歸散酒飲服用芎歸芍藥各一觔安胎補血白朮半觔去腰臍間之陳瘀而補胃養胎其胎外之血因寒濕滯者皆解之黃芩一觔化壯火而反於少火以生氣故為常服之劑然當以脈證遲數虛實加減有病則服否則不必也藥味偏而不正不比米穀豈宜無病久服經曰味之所入各歸所喜攻氣增而久天之由也

凡妊娠血聚而後成胎少遇邪則所聚之血將宿而不運反類瘀惡必生新開陳然後胎可養也養胎不惟在血而胎係於腎養之又在於胃所以補腎調胃補腎以固其精調胃以和其中白朮散主之但白朮散方藥四味本草皆云能去惡血而養胎用之何也蓋白朮三分能調胃蜀椒三分出汗一本開脾辟開則陽精至杜蠹四分治崩崩止則陰精固川芎三分下入血海運動胎血破舊生新如或陰血不利肝木為害在內抑屈而痛者瀉以芍藥之酸寒以通其陰設直衝過而痛者散以芎藭之辛溫以通其陽或挾瘀惡之氣上逆於胃而胃中吐煩不能食者用細辛溫中去痰下氣半夏治心下急痛和胃進食止吐逆若嘔而不止者由肝木妄動用小麥飲養其本氣以安之且又平胃下氣止煩一舉兩得大麥主消渴益氣調中故中氣不足而渴者用之

凡婦人有孕則手足十二經脈氣血週流俱供養胎元豈有逐月某經養某胎之理故不具載如孕婦有疾必擇專門明醫平日相信而無錯誤者方可用之若未試之醫有毒之藥切勿輕用以貽後悔更不可輕用針灸以致墮胎。

受胎試驗法附方

婦人經水不行過二三月疑是兩身又疑血滯心煩寒熱恍惚以佛手散艾葉湯調驗之用全當歸七分生川芎一錢共為末濃煎艾葉湯空心調下或好酒調服亦可待三兩時辰覺臍腹間微動者即孕也否則經滯動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯惡物自行經滯之病亦愈一方驗經脈不行已經三月者用生川芎為細末濃煎艾湯空心調下二錢覺腹內微動則有胎也否則經滯查古方有探胎散用皂角去皮炙草各一錢黃連少許共末酒調服有孕則吐無孕則不吐但皂角探胎未有不吐者恐胃弱之婦即無胎亦不免於吐耳姑錄此方用者慎之此皆試之以藥也若尺脈搏手與寸脈滑動者為孕脈此試之以脈也凡婦人受孕四十日外必患惡阻有不患者在疑似之間方用此試法。

試男女胎法

凡懷男孕動在三月陽性早也婦臍必突按之頗實兩乳甚黑男面背母而懷背脊抵腹其形圓如釜母腹故硬女孕動在五月陰性遲也婦臍軟乳頭雖黑不甚女面母腹而懷足膝抵腹下大上小其形如箕又法令孕婦抱未生齒兒女是男孕則所抱女兒瀉青糞若男孕抱男兒女孕抱女兒則無恙又法令孕婦前行人忽從背後呼之左回首者是男右回首者是女又法孕婦登廁時夫從後呼之男左回首女右回首蓋男受胎在左則左重女胎在右則右重故回首慎護重處而然也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而左脈現滑大疾數等形為男脈矣胎在右當亦如之再推之經曰陰搏陽別謂之有子蓋受

胎處於臍腹之下。則血氣護胎而盛於下。故陰之尺脉鼓搏有力。而與陽之寸脉殊別也。又如癰節發上。則血氣從上而寸脉盛。發下則氣血從下而尺脉盛。發左則氣血從左而左脉盛。發右則血氣從右而右脉盛也。丹溪以左大順男。右大順女。為醫人左右手。豈非智者之一失歟。但丹溪治產精微。恐無此失。大約以此診男女之病。而分順逆。原非診別男女也。

三禁

婦人年幼。天癸未行。屬少陰。天癸既行。屬厥陰。天癸既絕。屬太陰。治胎產之病。從厥陰始。是祖氣生化之原也。治法無犯胃氣者。是後天生化之原也。所謂三禁不可汗。不可下。不可利。小便。恐亡其津液。而傷其生氣也。大抵產病天行。從增損柴胡。雜證從增損四物。宜詳脉而用之。

教養宜忌論

教養宜忌之道。世人不特未諳。即有知者。亦鮮能傳而行之。難免半產。產難之虞。胎毒大傷之患。良可慨矣。今擇其緊要者言之。婦人娠三月。而形像始化。未有定儀。因感而變。口談正言。身行正事。生子端正。莊嚴。欲生男者。聽古文史。鑑執弓矢。欲生女者。觀鸞鳳。牡丹。施環珮。欲子美好。佩白玉。欲子賢能。看詩書。欲轉女為男之法。有以絳紗囊。佩雄黃於左者。或潛以夫髮及手足甲。置席下者。或偕以雄雞尾。尖長毛。三莖。置席下者。勿令本婦知。皆外象內感。屢試屢驗者也。古者婦人有孕。即居側室。令老嫗伴宿。不與夫接。勿亂服藥。勿過飲酒。勿信師巫。勿食邪味。勿聽淫詞。野傳。勿去登高涉險。勿妄針灸。勿舉重物。立不蹀坐。坐不邊口。不可出惡言。手不可行鞭朴。勿看日月薄蝕。勿見鬼神怪戲。毋哭泣。毋嗔怒。毋驚恐。毋沐浴。時當炎夏。雖難免於澡洗。然須避其熱湯。若遇嚴冬。縱然寢被清寒。切勿迫以爐炭。若心有大驚。犯之難產。子必癩癩。如或勞力過傷。腎氣不足。生子解頤。自家及鄰家。修造動土。須宜遠避。若有衝犯。令子頰形殞命。刀犯者。形必傷。泥犯者。竅必塞。打擊者。色青黯。擊搏者。相拘攣。坐不實其前陰。卧不久偏一。

側若孰生嗜卧。氣血則為凝滯。常見富貴之家。厚養安逸。血滯氣凝。交骨堅閉。必難生育。雖曰勿勞時須小役。四體氣血流行。胎息易於運動。即如貧賤之婦。四時常行走動。作疎通筋骨。開露骨眼。所以易產。其最甚者。不遵禁忌。縱情交接。以擾子宮。有觸動胎元。一月而墮者。有三五月而小產。半產者。有胎肥碩而難產者。有敗精凝裏而碍產者。有生子多疾。痘瘡稠密者。皆由縱慾之故。其三五月之胎墮。人所共知。而一月之小產。人所不覺。可不慎歟。至孕婦腰腹復漸粗。飲食不宜過飽。茶湯更須節省。大熱大涼。總非所宜。有毒之物。切宜禁食。即椒薑一切之品。亦須少嘗。其豕肉。醇酒。濕麵之類。縱不能屏絕不食。亦不可恣啜。歸精於胎。過於著長。致母臨產難產。而子在抱中。稟質肥脆。襁褓必多羸困。婦人孕懷。甫交三月。即當滿裏其腹。胎氣漸長。僅可微鬆其束。切勿因其氣急滿悶。而頓放之。致胎肥難產。俱當謹遵禁忌。戒隨時調護。可免諸患。此乃宗祧所重。人命所關。安可視為兒戲耳。

飲食七情禁忌論

子在腹中。資母之氣血而生。孕婦飲食。皆生子之氣血者也。故凡厭忌之物。所當屏戒。苟恣性偏嗜。不但能觸動胎氣。且臨產艱難。能令子殘。母損。慎之戒之。食羊肉。子多白睛。且多病。豆醬雀肉同食。子生點黯黑子。食羊肝子多厄。食醬肉子項短。且能損胎。食犬肉。子無聲音。食鯉鱈魚。及同鷄子食。子害疳。食螃蟹子橫生。食野禽肉。子無耻。且多淫。鷄蛋同桑椹食。倒生。食薑椒子。氣促。且痘毒盛。食田雞鱔魚。子瘡啞。多食薑子。生歧指。並主多瘡。食驢馬肉。過月難產。多飲燒酒。子禿頭。成瞽。食兔肉。子缺唇。雞肉糯米同食。子生寸白蟲。多食鹽。子解顛。食冰水。並冷物。過多。胞衣遲下。食茨菇。消胎氣。豆醬同煮。香食之。墮胎。食一切無鱗魚。難產。食諸般菌。生子驚風。而夭。食雀腦。子雀目。多食酸。傷肝。多食苦。傷心。多食甘。傷脾。多食辛。傷肺。多食鹹。傷腎。過喜則傷心。而氣散。

過怒則傷肝而氣上

過思則傷脾而氣鬱

過憂則傷肺而氣結

過恐則傷腎而氣下

妊娠藥忌歌

疝蝨水瘕地蟾蟲

牛黃水銀同巴豆

牙硝芒硝牡丹桂

槐子牽牛並皂角

瞿麥蘆薈如蟹甲介

凡遇胎前除各味

種子補益受胎壽子論

凡妊婦衝任經虛血氣羸弱此本來稟賦不足若一受孕氣血分而蔭胎則虛證自然百出或孕成隨墮或胎不長養必資藥力以助母安胎壽子是以虛人屢產生子無氣及育而不受者皆父母元氣不足故也若少男得壯盛之婦為之配又能愛精如持寶計落紅始盡婦人雙歲單月或單歲雙月必經盡後一三五七單日合陽氣日時而施受焉則一舉成男矣即婦人雙月雙歲單月單歲若經期逢單日而來必逢單日而止仍以一三五七日交合亦成男孕所以往往依俗計算而不準者此之謂也此乃陰陽至理如精養俱足所稟既厚體滿骨堅何病之有何用藥為自然生子神足無病而有壽若壯陽弱陰成孕則母無餘血以蔭胎必借藥力滋補生血培養方能生子精神體壯如弱男衰翁得壯盛婦女必須異床寡慾加以藥味填滿精血等候經期盡而陽施陰受方能成孕生子神健易長若不遠帷幃相火易動則陽一舉即未交合而靈精數點隨痿而出雖候經期又何益哉倘遇強陰氤氳之候即或感而成胎亦必易墮苟全足月所生之子骨少肉多五遲五軟勢所必然又安望其長年耶經云陰平陽秘精神

烏頭附子及天雄

大戟蛇脫及蜈蚣

蝮蝎飛生與虺蟲

蟻蟻桃核共茅根

蝟皮赤箭赤豆紅

又能活潑號良工

蜘蛛野葛蜈蚣類

牛膝藜蘆和薏苡

代赭炸蟬胡粉麝

乾薑礞砂與乾漆

馬刀石蟹衣魚輩

烏喙側子與葶藶

金銀錫粉黃雌雄

芫花蕪荊草三稜

茵草傷胎一樣同

半夏南星通草同

乃治又曰因而和之是為聖度焉得而不藉補益之藥力以回天乎醫可通神切勿漫視而忽之

種子丹 治男子陽事不舉不能堅久精薄無子並治婦人下元虛弱不能受孕服此丹自能受孕又能安胎

生地酒洗擇頂熟地擇頂大枝頭者用天冬去心各黃柏十二兩勻分作四分酒浸一分
鹽水大枝頭一分各浸鹿茸六兩者五
宿俱炒褐色

以上藥味俱忌鐵器為末煉蜜丸桐子大空心鹽湯或酒送服八十丸 鹿茸須擇形如茄子色如瑪瑙者看紫潤圓短者為上破之如朽木者良毛瘦枯縞去長生歧者為下大嫩者血氣未足無力酥塗灼去毛微炙用不塗酥則傷茸但不可炙焦有傷氣血之性亦有用酒炙者炙後去頂骨用茸鹿茸不可嗅嗅之有蟲恐入鼻顙鹿茸麋茸罕能辨別大抵其質粗壯腦骨堅厚毛蒼黧而雜白毛者為麋耳其形差瘦腦骨差薄毛黃澤而無白者為鹿茸鹿茸補督脉之正陽麋茸補督脉陰中之陽不可不辨

種子奇方 此藥艱於子者服至百日後擇婦人單歲雙月雙歲單月及經後陽日時與婦人交即能受孕兼胎固子壽且久服鬚髮不白顏色如童

當歸分作四分浸一宿便乳各用醋魚膠各一生地治法 枸杞 沙苑蒺藜 茯苓各八兩

右末煉蜜為丸桐子大每服八九十丸空心煮酒吞之

坎離丸 烏鬚黑髮壯筋骨大有補益精壯則婦人感而受孕其子必壽

黑豆不拘多少用桑椹汁浸透蒸熟再浸再蒸共五遍 右為末另用紅棗量足配豆末成丸之數蒸熟去皮核搗如泥和黑豆末為丸或印成餅隨

便食。

延嗣酒

大有補益。早晚男婦各

飲三五杯。婦人經不對者自正。經正者即受胎矣。

生地

酒洗熟地。凡蒸天冬心參冬去心各

仙靈皮上兩飯當歸酒洗枸杞酒浸

俱切碎。絹袋盛入大罈酒內。重湯煮。自卯至酉為度。埋土內七日取起用。

補益大豆方

此方秘傳。固精補腎。健脾降火。烏鬚黑髮延年。服之既久。與婦人交感有

孕。其胎自固。而子多壽。

大黑豆

何首烏。而赤者。大茯苓。兩三青鹽。八甘草。兩一

剉為片。先晚以磁鉢一個。盛豆入水八碗。用絹包藥置內。次日以沙鍋內煮。候水乾為度。去

藥不用。取豆畧晒。用磁瓶收貯。每早晚白滾湯不時服。

山精壽子丸

此丸能延已壽。而生子又壽。無論有病者宜服。即無病服之尤妙。凡壯年

之男。種玉無成。幼歲之婦。從不受孕。或受胎而中懷墮落。或得正產而又生女。匪男。或

生而不育。或育而夭殤。即苟延性命。難免多疾病者。此皆由真陽不足之故。均宜服此

丸。

山藥

五錢。用酒洗。心結實者。有姪者。勿

黃精

二兩。用酒洗。真者。另者。可多用。

黑棗

七兩。用酒洗。肥丸。大者。去皮。用

懷牛膝

一兩。用酒洗。去淨。酒拌。蒸。或。用。竟。以。牛。膝。易。石。斛。亦。可。然。須。加。倍。

石斛。生。六。安。山。中。形。如。蚌。蛭。脾。味甘。體。粘。方。真。如。孕。婦。忌。用。牛。膝。竟。以。石。斛。三。兩。

大何首烏

二兩。五錢。或。三兩。亦可。用。黑。豆。湯。浸。軟。木。棒。打。碎。置。瓦。器。中。底。注。黑。豆。湯。務。以。豆。湯。可。

乾也。秤。準。

川杜仲 二兩 未取

川續斷 二兩 酒洗

大熟地 四兩 酒洗

草覆盆子 三兩 酒洗

沙苑蒺藜 二兩 酒洗

川巴戟天 二兩 酒洗

肉蓯蓉 二兩 酒洗

遠志 二兩 酒洗

兔絲子 四兩 酒洗

白茯苓 二兩 酒洗

山萸肉 二兩 酒洗

遼五味子 二兩 酒洗

甘州枸杞 二兩 酒洗

右藥共十八味

除精棗二膏

餘皆共為細末

徐徐上于精棗膏內

杵和極勻

加煉蜜為丸小

取 氣味皆失不堪用 必須九

蒸 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

酒 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

成 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

去 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

不 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

有 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

成 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

如 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

精 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

多 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

用 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

大 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

熟 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

味 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

除 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

精 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

棗 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

膏 兩者乾者 氣味皆失 不堪用 必須九

川杜仲 二兩 未取

川續斷 二兩 酒洗

大熟地 四兩 酒洗

草覆盆子 三兩 酒洗

沙苑蒺藜 二兩 酒洗

川巴戟天 二兩 酒洗

肉蓯蓉 二兩 酒洗

遠志 二兩 酒洗

兔絲子 四兩 酒洗

白茯苓 二兩 酒洗

山萸肉 二兩 酒洗

遼五味子 二兩 酒洗

甘州枸杞 二兩 酒洗

右藥共十八味

除精棗二膏

餘皆共為細末

徐徐上于精棗膏內

杵和極勻

加煉蜜為丸小

補陽益氣煎 此方益氣強陽服至十劑頓然改觀矣再用後凡藥三料可補氣填精也

人參 枸杞酒洗 白木款炒黃各一錢五分 熟地錢五錢 可加至八錢 巴戟天一錢 可加至一錢 肉苁蓉酒洗去

甲茯神 杜仲鹽水炒 遠志肉桂五分 山黃肉酒洗 龍眼肉四枚

白水一碗半煎至八分渣再煎服 弱衰之甚多服十劑精濃氣足

補陽益氣丸 此丸大能填精補氣雖年老亦能舉子兼別有妙益

人參 肉苁蓉酒洗去 白茯苓 白芍藥酒洗 巴戟天 當歸身酒洗 麥冬去心各 大熟地八

山黃肉核去 白木炒土淮山藥 川附子一個重一兩二錢 鹿茸一付乳 紫河車一具 首胎者

粉入肉桂 遠志肉 製柏子仁去油 杜仲鹽水炒 補骨脂鹽水炒 五味子 棗仁炒去 炙草各一

砂仁五錢去 共為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心服五錢淡鹽湯送下

濟陰壽子飲 此方大益胎元而分婉易生子易育瘡痘稀婦人孕成後每月十五服弱

甚者一日一服神有餘而補不足加減附於方後用者擇之

人參錢弱 當歸身炒熟地 酒拌頂大枝頭無灰 白木土炒各 川芎八分 紫蘇 陳皮 炙草各四

大棗一枚水煎不拘時食遠溫服渣再煎服 如虛肥人陳去白 加蜜炙黃耆五錢 泄瀉加

去心蓮子十枚 帶皮砂仁三錢 減地黃 多怒加木香二分 磨服 口燥加去心麥冬一錢 怔忡加

炒棗仁錢 益智仁錢 龍眼肉十枚 濟陰大造丸 婦人孕成後服濟陰壽子飲兼服此助胎尤妙並治產後日久腎虛腰痛

人參 熟地各一兩 當歸身二兩 五冬心去 天冬心去 山藥炒各 五味子五錢 黃柏八錢

右各為末加頭胎壯盛紫河車具 水洗挑去經絡汚血淨酒蒸搗爛入諸藥末煉蜜為丸如

桐子大每服三錢白水桂枝湯任下早晚俱可服 如脾胃患瀉去黃柏減地黃加土炒白

木一兩

河車大造育麟丸 治婦人血氣不足。苦於小產。或生而難育。或產下昏迷而死。皆氣血

虛而胎不旺也。宜服此丸甚妙。

熟地四兩 蒸九兩 晒紫河車一具 洗淨胎 爛肥 大山藥炒 白朮土 沙各一 茯苓神 茯苓人 參棗 仁去 破

麥冬心 去阿 膠成 珠粉 炒續 斷肉蒸 杜仲鹽 水炒 沙參黃 耆神 鉤炒 建蓮肉炒 條苓酒 白芍藥炒

丹皮兩 各一 當歸身錢 酒洗 五味子炒 研如 血不熱去 條苓丹皮加 肉桂三五 錢亦可。蜜丸。梧子大。早晚秋石桂元湯任下。每服二三

胎動安胎論

胎動安胎論

妊娠胎動。有傷仆忤觸動而不安者。人皆見證施治。故無差謬。若內傷而動。所因不同。治法亦異。人多錯誤。雖然。要不外乎。虛實寒熱四端。人能察其病之所由。而調劑焉。自無不安者。所以安胎之方。不可執一。若泥定某經月數。按日用藥。猶膠柱鼓瑟。執滯而不通矣。考安胎之藥。方書多用清涼。然間有宜用溫補者。不可不知。如虛而不安者。或衝任不足。受胎不實。或脾胃氣虛。不能提固。又或由色慾勞倦。飲食七情所傷。務須分別在氣在血。虛熱虛寒。或假寒假熱。察其所由。隨其疾苦而調之。虛者補之。治無不效。仍加戒慎可也。如實而不安者。或由食滯氣滯。或由於鬱怒傷肝。鬱結傷脾。觸動血脈。不安。須察其由。而開之導之可也。如寒而不安者。或吐酸嘔惡。喜熱畏寒。下寒泄瀉。或慣於小產。虛寒滑脫。屢用清補安胎而不效。脈必現沉微細弱。此屬陽虛寒證。宜用溫中安胎可也。余內人屢患小產。即速房幃。慎起居。擇專門女科調治。總皆罔效。余雖稍通醫理。奈因王事。執掌馬能。如業醫者之臨證。多而機神速耶。爰專任於醫。乃屢安而屢墮。前後凡五次。比觀其方。不過清熱養胎。補氣血。滋滑脫而已。迨後復有孕。余自診視其脈微弱。及時大補。至七十日如期。而仍下血腰痠而腹不痛。此正合產書云。胎動胎漏皆

能下血胎動腹痛胎漏腹不痛胎動宜調氣胎漏宜清熱然前已用清熱罔效余因而思及小產既多陰血虛寒而滑脫陽氣虛寒而不固爰用溫中之法以薑炭桂皮加於參朮歸耆地續膠艾之中又取紅見黑止之義不數劑而血止胎安矣因悟及古人之治惡阻必用二陳六君生薑半夏之屬而愈則知胎亦有用溫中而安者緊可徵矣若夫胎熱而不安者或煩熱渴燥或漏血溺血或信用煖補之藥反受其害動而不安須用清熱養血可也此虛實寒熱之各異如此但有因母病而胎動者治其母病而胎自安有因胎動而致母病者當安其胎則母病自愈矣凡胎動而輕轉動不安或微見血察其不甚者或用安胎飲安之若腹痛腰酸下墜勢若難留者用佛手散胎未損服之可安已損服之可下下後隨證調補之醫者當細心詳審圓機活法以施治庶得保全人命若漫執一偏之見虛其虛而實其實豈非欲留而反驅之其能無愆於余影耶考之保產內有云妊娠受胎兩三個月胎動不安蓋由于宮久虛血海虛羸多令胎墜其危同於風燭非正產可比若妊娠曾受此苦可急用杜仲丸預服以保胎元余常遵丹溪先生定安胎飲諸方治孕婦虛弱胎氣不安飲食不美常多小產或腹痛腰酸疼痛等證甚效又曾用黑白安胎散一方以救貧乏之人每治胎動奇驗今再擇備用諸方加減用法于後便於隨證去取耳

丹溪安胎飲 治孕成後胎氣不安腰腹作痛飲食不美孕至五六月並宜服之

人參錢白朮炒當歸酒洗熟地各錢二川芎 條苓各八分砂仁三分陳皮 紫蘇 炙草各四

引加薑一片棗二枚水煎服 一方無砂仁有炒白芍

加味安胎飲 治孕婦元氣不足或胎動不安或身熱食減並皆治之

人參 當歸身洗 熟地各錢 二麥冬煩渴加用 條苓八分 白朮一分 炮陳皮 紫蘇 炙草各四

不用引水煎服

加減安胎飲 治孕婦腹中作痛小腹重墜血虛氣陷之證

人參五錢熟地白木炒當歸身二錢川芎八分紫蘇陳皮炙草各四

薑一片水煎服 寒加吳茱萸錢一砂仁乾薑各五

安胎萬全飲 如脾胃氣弱不能管束其胎血弱不能滋養其胎不以日月多少而常墮

者此湯主之更兼服杜仲丸胡蓮丸佳

人參 白木土當歸身酒生地 條芩陳皮 白芍藥酒炒各一錢砂仁帶殼炙草各五

薑三片棗二枚水煎服 杜仲丸附千金保孕丸 治胎動不安腰痠疼痛須防墮胎宜服此丸與胡蓮丸同日服更

妙早空心服杜仲丸晚食前服胡蓮丸

杜仲薑汁炒川續斷肉二錢酒洗各

共為末煮棗肉杵和為丸梧子大每服三十丸米飲下 保孕丸內杜仲再加二兩用糯以

山藥糊丸治妊婦腰背痛苦於小產

胡蓮丸 安胎聖藥與杜仲丸同日服

條芩四兩沉白木土蓮肉去心各砂仁微炙草各一

共為末山藥五兩作糊為丸如菘豆大米飲下五十丸

黑白安胎散 治胎動不安

白木炒懷熟地黃各一兩 水煎服 此方妙在用白木以利腰臍熟地以固根本藥品少而用專所以取效神也 白

木用五錢亦可

加味四物湯 治因房事過度觸動胎氣不安者

歸身酒熟地 阿膠各一錢 砂仁炒 炙甘草各五分 竹茹一錢

水煎調男子祝禧灰一錢服更禁房事

四物湯 治七情觸動胎氣不安者以四物為主按證加入各藥

生地酒歸身洗 白芍藥一錢 川芎八分

此四物湯本方薑棗引水煎食前溫服 如因怒傷肝者加炒黃芩五錢 人參柴胡甘草各一錢

因憂悲傷肺者加炒黃芩炒阿膠蘇葉各一錢 五味子粒十三 炙甘草五分 因恐傷腎者加製

續斷炒黃柏炒杜仲各一錢 五味子粒十五 改生地為熟地 因思慮積久不解傷脾者加土炒

白朮五錢 人參陳皮製香附各一錢 炙甘草五分 因喜樂太過傷心者加條芩黃連土炒白朮去

心麥冬各一錢 炙甘草五分 因跌撲觸動者安胎飲主之歸身炒白芍各一錢 土炒白朮黃芩蘇葉

五分 炙甘草五分 各五分

白朮米泔水浸一宿去蘆切片曬乾 土炒香如脾脈虛弱細軟緩大無力外證飲食少進惡

條芩如肺者 炙甘草五分 因跌撲觸動者安胎飲主之歸身炒白芍各一錢 土炒白朮黃芩蘇葉

當歸身者忌用 一錢 五錢 或七錢 而無別證以黃土炒用

帶殼砂仁內微炒 五分 或七分 而無別證以黃土炒用

生知母二錢 或三錢 或四錢 或五錢 或六錢 或七錢 或八錢 或九錢 或十錢 或十一錢 或十二錢 或十三錢 或十四錢 或十五錢 或十六錢 或十七錢 或十八錢 或十九錢 或二十錢 或二十一錢 或二十二錢 或二十三錢 或二十四錢 或二十五錢 或二十六錢 或二十七錢 或二十八錢 或二十九錢 或三十錢 或三十一錢 或三十二錢 或三十三錢 或三十四錢 或三十五錢 或三十六錢 或三十七錢 或三十八錢 或三十九錢 或四十錢 或四十一錢 或四十二錢 或四十三錢 或四十四錢 或四十五錢 或四十六錢 或四十七錢 或四十八錢 或四十九錢 或五十錢 或五十一錢 或五十二錢 或五十三錢 或五十四錢 或五十五錢 或五十六錢 或五十七錢 或五十八錢 或五十九錢 或六十錢 或六十一錢 或六十二錢 或六十三錢 或六十四錢 或六十五錢 或六十六錢 或六十七錢 或六十八錢 或六十九錢 或七十錢 或七十一錢 或七十二錢 或七十三錢 或七十四錢 或七十五錢 或七十六錢 或七十七錢 或七十八錢 或七十九錢 或八十錢 或八十一錢 或八十二錢 或八十三錢 或八十四錢 或八十五錢 或八十六錢 或八十七錢 或八十八錢 或八十九錢 或九十錢 或九十一錢 或九十二錢 或九十三錢 或九十四錢 或九十五錢 或九十六錢 或九十七錢 或九十八錢 或九十九錢 或一百錢

炙甘草四分 或五分 或六分 或七分 或八分 或九分 或十分 或十一分 或十二分 或十三分 或十四分 或十五分 或十六分 或十七分 或十八分 或十九分 或二十分 或二十一分 或二十二分 或二十三分 或二十四分 或二十五分 或二十六分 或二十七分 或二十八分 或二十九分 或三十分 或三十一分 或三十二分 或三十三分 或三十四分 或三十五分 或三十六分 或三十七分 或三十八分 或三十九分 或四十分 或四十一分 或四十二分 或四十三分 或四十四分 或四十五分 或四十六分 或四十七分 或四十八分 或四十九分 或五十分 或五十一分 或五十二分 或五十三分 或五十四分 或五十五分 或五十六分 或五十七分 或五十八分 或五十九分 或六十分 或六十一分 或六十二分 或六十三分 或六十四分 或六十五分 或六十六分 或六十七分 或六十八分 或六十九分 或七十分 或七十一分 或七十二分 或七十三分 或七十四分 或七十五分 或七十六分 或七十七分 或七十八分 或七十九分 或八十分 或八十一分 或八十二分 或八十三分 或八十四分 或八十五分 或八十六分 或八十七分 或八十八分 或八十九分 或九十分 或九十一分 或九十二分 或九十三分 或九十四分 或九十五分 或九十六分 或九十七分 或九十八分 或九十九分 或一百分

以上各稱準水煎食遠服 如脈弱虛細或緩大無力飲食減少口不知味溏薄泄瀉者加

人參一錢 或五分 一炒白朮一錢 或五分 或二錢 白茯苓一錢 廣皮七分 炒條芩一錢 去知母 如血虛內熱

人參一錢 或五分 一炒白朮一錢 或五分 或二錢 白茯苓一錢 廣皮七分 炒條芩一錢 去知母 如血虛內熱

人參一錢 或五分 一炒白朮一錢 或五分 或二錢 白茯苓一錢 廣皮七分 炒條芩一錢 去知母 如血虛內熱

人參一錢 或五分 一炒白朮一錢 或五分 或二錢 白茯苓一錢 廣皮七分 炒條芩一錢 去知母 如血虛內熱

肝腎脉洪數無力。腰疼腿膝痠軟無力者。加熟地三錢或七錢或生地二錢酒洗芍藥一錢或五錢

炒杜仲酒洗當歸一錢或五錢炒續斷一錢如肝腎脉虛細濡弱。腰疼腿膝麻木冷痛。加熟地三錢或七錢或川芎八錢製續斷肉一錢鹽水炒杜仲五錢歸身二錢酒洗五錢或去知母一錢如胸腹脹悶。加欬炒枳殼八錢製大腹皮八錢醋製香附米七錢如素多鬱怒。加蘇梗八錢或醋製香附米八錢或小柴胡八錢酒洗撫芎八錢如嘔噦加藿香八錢或竹茹六錢製透半夏八錢陳皮八錢帶殼砂仁四錢煨薑三錢去知母一錢胃寒嘔噦。去條芩知母竹茹。加製去黃水吳茱萸三錢如虛煩。加去心麥冬錢竹茹錢咳噦。加去心麥冬錢蜜炙桑白皮八錢或去皮尖杏仁八錢胡錢欬炒枳殼八錢如小便淋瀝不通。加車前子錢赤苓錢木通錢甚者加滑石一錢或二錢

如胎動下血。倍加生知母紋銀一錢小忌鐵器。

紫蘇飲 治妊娠臨月浮腫喘脹。並子懸證。胎不安。上疔作痛。或臨產氣結不下等證。

當歸酒洗紫蘇川芎芍藥酒炒陳皮大腹皮淨各一錢人參炙草各五錢

引加生薑三五片葱白七水煎服一方有香附無人參。若肝脾氣血虛而有火不安。宜兼道遙散。若脾氣虛弱不安。宜用四君芎歸。感冒風寒去腹皮加香豉。胎動不安加炒黃芩土炒白朮。胎不運動加木香砂仁。肥盛氣滯加製半夏製厚朴。虛羸少氣加土炒白朮倍人參。

保胎神效丸方

白茯苓二條茶揀實心細白朮米泔浸一宿去皮切香附米童便浸二延胡索陳米醋紅花紙

益母草淨葉各沒藥隔火培去油

右各製度為末。蜜丸桐子大。每日空心白湯服七丸。前藥不可因其丸小。加之七丸之外。凡孕婦胎不安者。一日可服四五次。安則照常。如遇腹痛腰痠。或作脹墜。宜即服之。如受胎

增補台產心去

卷上

三五月常墜者。須先一月製服。能保足月。甚至見紅將墮者。急服此丸。亦能保留。謹戒惱怒勞力。忌食煎炒椒辣發氣閉氣糟味冷水冷物。切忌房勞。每藥一料。可保數胎。

佛手散 見本卷諸痛門

惡阻論

惡阻者。謂有胎氣。惡心阻其飲食也。妊娠稟受怯弱。中脘宿有痰飲。便有阻病。其蓋顏色如故。脉息平和。但覺多卧少起。肢體沉重。頭目昏眩。惡聞食氣。喜噉酸醎。或嗜一物。或大吐。或時吐痰與清水。甚者或作寒熱。心中憤悶。嘔吐痰水。胸膈煩滿。恍惚不能支持。此皆胃氣弱而兼痰與氣滯者也。亦有素本不虛。而一受胎孕。則衝任上壅。氣不下行。故嘔逆者。又有由經血既閉。水漬於藏。藏氣不宣通。故心煩憤悶。氣逆而嘔吐。及三月餘而嘔吐漸止。蓋三月相火化胎之候。未能上食於母。血氣未用。五味不化。中氣壅實。其為鬱滯痰火穢惡之氣。盡衝於胃。所以有惡阻等證。及三月後胎元漸大。則臟氣僅供胎氣。不有鬱滯。自無嘔上逆矣。亦有不拘弱強間有不病者何也。凡婦人無病。不分強弱。俱能受孕。懷子病月。不在形之強弱。在於臟腑虛實。如中宮氣健。胃中宿無痰飲清濁。自能升降。不令穢氣上壅。自無惡阻等證。即俗謂胎氣好也。又婦人懷子。喜食酸醎果實為何。蓋陰陽交合。受胎於腎。生化於肝。二臟皆供給於胎。則肝腎不足。故喜食酸醎以自救也。以上諸證。輕者不須服藥。乃常病也。重者須少藥調之。宜用加味參橘飲考之。古人有用半夏茯苓湯。茯苓丸專治惡阻。又有用白朮散人參丁香散人參橘皮湯醒脾飲。其中不用半夏。恐胎初結。半夏性能動胎。慮其辛燥易散。但惡阻又非半夏不止。須薑汁炒以製其毒。故仲景用人參半夏乾薑丸。羅謙甫用半夏茯苓湯。朱丹溪謂肥人多痰。瘦人多火。用二陳加減治胎前惡阻痰逆嘔吐。心煩頭眩。惡食俱效。經云有故無殞是也。立齋云半夏乃健脾氣化痰滯主藥。脾胃虛弱嘔吐。或痰涎壅滯。飲食不化。胎不安。必用半夏茯苓湯。倍加

白朮安胎健脾。常用其驗也。惡阻兼腰痛者。防胎墮下。尤宜二陳四物加條芩白朮和中理脾為主。不可升舉。益嘔逆氣已上升。再用升藥。則犯有升無降。上更實而下更虛。益促其墮矣。再若左脉弱而嘔。服諸藥不止者。當服理血歸原藥。則愈。經云無陰則嘔是也。後選備諸方。用者擇取可耳。

加味參橘飲 治孕成兩三月後。惡阻嘔逆惡食。或頭眩暈倦怠者。

人參錢 歸身酒洗 白朮土炒各 半夏八分 橘紅 藿香 炙草各 砂仁四分 竹茹一團

加薑一片水煎服 肥人加竹瀝一盞薑汁一匙

止嘔安胎飲 治孕婦嘔吐百藥不效服之即愈

人參 青皮麸炒各 廣皮 半夏製 白茯苓各 吳茱萸湯泡浸黃 炙草各 三

加煨薑三片水煎徐徐溫服

歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥不止者

人參 川芎 歸身 白芍 丁香 炙草各 茯苓 白朮土炒 陳皮各 砂仁各 半夏一兩 桔梗

枳殼錢五分

共為細末引用薑五片棗一枚水煎調每服三錢 方內丁香不若易以砂仁或豆蔻為穩

如果胃寒之甚用者亦詳慎之

自此以下諸方出自濟陰綱目擇錄以備採用

參橘散 治妊娠惡阻吐逆痰水不食心虛煩悶

人參 橘皮去 茯苓 麥冬心去 白朮土厚 朴薑汁 炙草各 砂仁各 竹茹一團

引加生薑三片水煎服

青竹茹湯 治妊娠惡阻嘔吐不食此方清而不寒

竹茹一罇子大 橘皮 白茯苓各一錢五分 半夏製 生薑各二錢

水煎溫服忌羊肉鷄魚麵食全書加粳米一撮

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食也

人參 竹茹 橘皮 白木二錢 生薑一厚朴一錢五分

水煎服 惡阻惡食貴之脾虛嘔吐責之有火所謂諸逆衝上皆屬於火也此方竹茹能平

少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人參白木所以益脾開胃益脾欲其安穀云爾

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降嘔吐酸水起坐覺重

香附子製一兩 藿香葉 甘草各二錢

右為細末每服二錢不拘時沸湯調下

保生湯 治妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參錢一 白木炒 香附製 橘紅 烏梅一方作炙草各五分

加生薑水煎服 覺惡心嘔吐加丁香謂不若易砂仁七粒為穩 吐瀉作渴則效在烏

梅矣作烏藥者非

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸醎多卧少起百節煩

痛羸瘦有痰胎孕不牢

人參 白木炒 陳皮各一錢 熟地胸滿者去之 旋覆花無痰涎不用 桔梗 半夏湯泡七次 白芍酒炒 川芎

炙草各五分

加生薑三片水煎空心服 千金方無旋覆花有紫蘇葉細辛 有熟加炒黃芩 有客熱

煩渴口瘡去橘皮細辛加前胡酒炒知母分七 若腹冷下利去地黃加炒桂心分五 桂心炒用

即不墮胎然非真腹冷下利者不宜 若氣逆作脹者加麩炒枳殼蘇梗製香附

小和中飲 治妊婦胎氣滯滿飲食停滯作脹

陳皮 茯苓 厚朴薑汁製各一錢五分 山查 扁豆炒各二錢 炙草五分

水一鍾半加生薑三五片煎服 如嘔者加製半夏一錢 如脹滿氣不順者加砂仁七分

如火鬱於上者加焦梔子一錢 如婦人氣逆血滯者加紫蘇梗製香附之屬

以下二方出全書新方錄之以備採擇

六味異功煎 治妊婦胃虛寒多嘔者

人參二錢 白朮炒 茯苓各二錢 乾薑炒黃 陳皮 炙草各一錢

水一鍾半煎服

理陰煎 附附子理陰煎 六味回陽飲 治妊婦肝腎陽虛作嘔者此理中湯之變方也

熟地三五錢 當歸二錢 乾薑一錢 炙草一錢

水二鍾煎七八分熱服治雜證此方內或加肉桂一二錢

人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

良方半夏茯苓湯 治妊婦脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏湯泡七次 陳皮 砂仁炒各一錢 茯苓二錢 炙草五分

右用薑棗烏梅水煎服 或煎服一二劑後用茯苓丸

茯苓丸 治妊婦煩悶頭暈間食吐逆或胸腹痞悶

人參 赤茯苓 桂心 橘紅 半夏湯泡七次 乾薑一錢 白朮炒 枳殼炒 炙草各二錢

右為末煉蜜丸梧子大每服五十丸米飲空心下日三服 必脈遲證寒方用薑桂用者宜詳審之 右原方有葛根二兩似非所宜故不開入方中 一方加去心麥冬 肘後方加

北五味子

苦柚單方 治妊婦惡阻嘔吐不食頭暈不敢行步

苦柚皮不拘

右一味濃煎湯飲數盞即愈吐甚者加薑汁

胞漏並小產論

凡妊娠經水壅之以養胎畜之以為乳其衝任氣虛不能約制故月水時下名曰胞漏血盡于死然亦有妊婦血盛月信常來而胎不動俗呼狗兒胎是也若以漏胎治之則胎必墮若不以漏胎治之其胎未必墮亦有脉見滑數而別無風熱病經脉如常但較前畧少此因胎小血盛有餘而然俟遲至三四月外兒大能飲經脉自止今常見懷胎七八月而生子者人但以血止為度謂之不足月然其受胎於未止之前至此而足月人實不知也又有壯盛孕婦按月下血點滴若無腰痠胎動不須服藥此血氣強盛孕至四五月後自然經止如孕婦虛羸腰常痠痛並胎動而按月下血點滴或下血不止此非血有餘乃胎漏也宜服加味補中安胎飲又云胎漏多因於血熱然亦有氣虛血少服涼藥而下血益甚食少體倦者此脾氣虛而不能攝血也宜歸脾等方加減當以脉候察之凡墮胎之病多在三五七月如前次三月曾墮後必如期乘其所虛而亦墮必預服尊生安胎飲或胎元飲加減用之或泰山磐石散安胎萬全神應散等方對證擇用以預防之須常服過七月可無患矣更宜戒房慾氣惱勞役博炙諸食又有受孕一月即墮者人皆不覺止知其為按月經行不知暗墮於中矣凡人經盡初交得孕後最宜將息絕慾若再交接以擾子宮其胎或一月三五月必墮試思驛馬有孕壯者近則踢之名曰護胎所以絕無小產之患人可不慎歟至若勞怒舉重亦墮洗下體則竅開亦墮今之無子者大半一月墮胎非盡不受孕也至於顛仆傷動胎氣宜服艾膠安胎散三四月前胎未成形名曰墮胎至五六月後胎已成形名曰半產俗人均曰小產總屬妊婦氣血虛弱胎元不固益氣虛

則提攝不固。血弱則灌溉不周。多致小產。况婦人腎以繫胞而腰為腎之府。腰痛則墮不可不防。凡治胎漏者。當預培其根。宜用千金保孕丸。又有止漏絕神丹。治漏胎甚效。大凡孕婦暴下水者。其胎必墮。若徐徐下水。可用補氣安胎藥治之。有胎漏黃漿。或如豆汁。胎動腹痛。乃肝脾濕熱。用升陽除濕湯。大全治用黃耆兩川芎錢。糯米合煎服。要知小產與大產不同。大產如果熟自脫。小產如生摘之破。其皮殼斷其根蒂。忽成病者不少。因而致死者恒多。然此症始因歛血以成胎。繼因精血以長養。終因精血不足而萎墮。故瘀血甚少。倘有腹痛成塊。有形多屬血虛氣逆。惟有用生化湯去瘀生新為妙。後須大加溫補。若但知消瘀破滯。則逆氣愈攻而愈升。多致不救。戒之。戒之。妊婦三月後尺脉或濇或微弱。胎必不固。惟脉洪盛者。胎不墮耳。所以脉訣內云。胎脉弦牢滑利安。沉細而微歸泉路。正此之謂也。雖半產皆氣血不足。然有稟質偏陰偏陽。或寒或熱之異。自當憑脉調治。如陰虛內熱。而用艾附白木砂仁溫煖之劑。則陰道愈消。如草木之無雨露。自然枯萎。如陽虛內寒。而用芩芍涼血之劑。則脾胃虛寒。氣血亦弱。猶果實春夏易生。秋冬少結也。總之三月以前宜養脾胃。四月以後宜壯腰腎。補血順氣。佐以清熱此大法也。

加味補中安胎飲

凡孕婦元氣壯盛。受胎後尚有經來。幾點乃血氣盛。故耳。若不腰痛。腿痠。不必服藥。如虛羸孕婦下血不止。或按月下血點滴。名曰胎漏。多因勞而氣血兩虛。或喜食燥熱物過多。而致宜謹房事。並服補藥以保全也。

人參

錢一

白木

炒當歸

酒洗各

川芎

黃芩

各八

紫蘇

陳皮

薑一片

水煎服渣再煎

歸脾湯附加味歸脾湯

濟生歸脾湯

治心脾鬱結

經閉發熱

並治脾虛不能攝血

致血

妄行及經帶胎漏等證。由於勞傷心脾。發熱體倦。食少不眠。怔忡驚悸等證。

人參 白木 灶茨神 棗仁 炒龍眼肉 各二錢 黃耆 一錢 五 歸身 酒洗 遠志 肉 各一錢 甘草 水製 木香

炙草 各五分

薑棗引水煎服

如柴胡梔子名加味歸脾湯 柴胡易丹皮名濟生歸脾湯

尊生安胎飲

治血虛有火曾三個月墮胎宜服此方並預防五月七月之墮亦治胎動

胎漏

歸身 酒洗 白芍 炒酒熟地 生地 砂仁 阿膠 炒珠 各 杜仲 鹽水炒 白木 土炒 各 條茶 五分

續斷肉 酒製 川芎 陳皮 蘇梗 各五分

水煎服 見血加炒地榆炒蒲黃 各一錢 腹痛或下墜砂仁白芍熟地倍加分兩服之

用棗肉為丸服亦可

景岳胎元飲 治婦人衝任失守胎元不安不固隨證加減或間日或二三日服一二劑

人參 隨宜 當歸 酒洗 杜仲 炒鹽水 白芍 酒炒 各 熟地 錢二三 白木 分錢五 陳皮 者七分 無滯 錢一

水二鍾煎七分食遠服 如下元不固而多遺濁者加炒山藥炒補骨脂五味之類 如氣

分虛甚者倍白木加炙黃耆但著木氣浮能滯胃口倘胸膈有飽悶不快者須慎用之 如

虛而兼寒多嘔者加炮薑一二錢 如虛而兼熱者加酒炒黃芩五錢或加生地二錢去杜

仲 如陰虛小腹作痛加枸杞二錢 如多怒氣逆者加製香附無妨或砂仁亦妙 如有所

觸而動血者加製續斷肉炒阿膠 各二錢 如嘔吐不止加製半夏 錢一二 生薑 片三五

泰山磐石散 治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱或肝脾素虛倦怠少食屢有

墮胎之患此方平和兼養脾胃氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加

黃芩更宜戒怒事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮

人參 黃耆 當歸 酒洗 川續斷 製黃芩 各一 白木 土炒 川芎 白芍 酒熟地 各八 砂仁 炙草