

丹臺玉案序

今天下無非受病之宇
矣。夷狄之所不犯者。流
氛戾之。流氛之所不
者。疾痛困之。蓋入道陰

陽之患。恒與寇賊水火。
更相竊發。居嘗抱隱懼。
以爲安。得東南半壁。無
干戈之擾。併無疾癘之
災。俾黃口秀髮。咸登仁

壽哉。此非遇大醫。王不
可而不謂孫君對薇。真
其人也。對薇幼習制舉
業。湮鬱不售。遂染沉
後。乃棄帖括。而精軒岐

之術焉。夫儒非孔子孟不
道。醫亦非軒岐不尊。莫
謂小道。有至理存焉矣。
久客吾東湖。余數相晤
對。知其沉潛內經。洞晰

脈理。一經診視。靡不奄
息頓甦。而枯髀倏旺。雖
日識見絕人。亦其得於
素所講求者甚審。今日
出其手自著述者。爰付

殺青以公天下。其自古
經所垂。凡素難靈樞黃
庭內景。以暨鍼經靈經。
諸篇無不詳確。攷之書
者。必驗之於治。驗之治

者。復筆之於書。芟蕪存
奧。不知幾易藁矣。昔王
冰註釋素問。不及靈樞。
古人垂論立模。蓋其難
也。以故皇甫士安博極

羣書不遑闡發其解。卽
洞垣見裏者。且有遺議。
惟子長傳倉公之秘。越
人顯標指之奇。可共千
古。其神解處。交相契耳。

余方靜息林壑。思得衛
生之方。以娛老。而對薇
丹臺玉案。適成實深快
焉。有對薇之人。可以拯
救一世。有對薇之書。可

以垂訓四方。使上池之
裔。而盡弦誦斯編也。寧
獨東南半壁。厥疾有瘳
也哉。余滋幸矣。 嘗
崇禎戊寅歲次重九日

賜進士及第光祿大夫
左柱國少師兼太子太
師吏部尚書中極殿大
學士知

制誥 經筵日講

兩朝實錄總裁當湖施
鳳來題



丹臺玉案叙

余以弱。能受當湖事三片。
病不勝河山之緣。一旦使
勇古而病。由即能受。三
與不勝。各自成境。所稱由

之語。又余現前真實地位。宵旦之所圖維。庶幾日汲中冷。為上地之珍饈。昔涉金焦。斷在草之地味。所與身共。緇澗。目俱流覽。惟余孫甥。對前漸。顏慧。惺儼。忝協玄奧。商較辨。所負。能深得我受。豐易之源。默執我自治之術。情念方及。若輒先副。嘗。繇英少。

補習經子。揣摩帖括。竭
念矣。精視雲。達霄。級。若
將振武。而升。竟以進。執
致。瘵。透。今。此。路。果。在。天。
畢。生。不。得。到。別。向。農。軒。

岐。扁。問。得。大。道。從。我。身。
西。禪。人。整。術。自。我。痛。瘡。
知。人。疾。病。守。昔。術。章。切。
脈。望。名。湯。以。捷。蕩。丸。以。緩。
效。業。已。百。仆。軟。衆。骨。肉。而。

業枯笑貌也。所謂進守後矣。
系口何能以一彈丸受孫鑄
技。浙吾舊以藩臬待白華
變年友當湖過。系飛有
人偏鑑。又能如桓譚之
漢仲景。且湖為前後忠僕
皆取地。錫尚如扁鵲之
為者。人嬰笑。物人醫。所以
地易。必為忠僕醫。尚湖
以。如手。兩名。大。扶。杖。至。

以方藥自驗。攷之古經。其
素難靈樞。多存內景。
神和氣白。以監正時。東
垣丹溪。法家。以如十百卷。
合為採撰。物華。古坐

始之以思。為今真家。善之鑒
鏡。如唐孫思邈公。以方
清之舊德。他書不少。染
欠。平一金一方。出之以函藏。
陸官公忠勳著。唐山究以

遠。禱。忠。洵。亦。有。醫。國。方。之。
揆。今。為。湖。三。平。原。上。湖。宜。
公。名。固。只。別。封。漸。此。如。可。謂。
家。承。思。邈。地。勢。言。宜。余。
幸。拜。立。自。裝。鳥。宜。相。

分輝。晚。年。字。出。言。

崇。禎。九。年。歲。次。丙。子。中。

秋。日。

賜。進。士。第。通。議。士。立。在。
天。府。府。中。醫。易。祖。談。自。有。撰。

并書



耳。春。至。東。一。序。

朱。在。少。之。年。友。張。君。靜。之。之。此。在。江。南。瑞。
故。如。耀。淫。吹。故。在。地。多。為。務。人。其。者。
雲。手。極。在。物。之。空。故。新。稱。其。也。孫。
夫。其。之。漸。生。在。其。之。山。白。霧。官。其。年。典。謁。

徐叙一

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

已。囊。括。久。雅。志。然。其。意。已。真。歷。久。如。名。情。
不。始。展。其。六。節。披。舒。結。致。在。推。進。愛。人。
而。讓。其。善。功。乃。從。何。所。起。毫。生。中。
身。之。生。意。以。固。之。據。以。法。名。其。法。其。解。
法。期。以。善。之。自。應。為。執。濟。固。是。軒。家。

之。心。善。也。又。久。之。不。固。少。說。精。理。去。及。診。
以。為。功。用。我。亦。所。為。極。得。其。以。招。而。
致。之。極。危。清。危。一。邑。之。人。少。之。危。居。其。年。
家。稱。戶。說。姓。名。進。于。得。法。比。以。得。提。
初。之。功。一。郡。之。人。之。少。之。危。年。能。年。云。以。

齋俸之役。假哺。手憐。市中。諸軍。語
朱曰。移者。知對。微。漸。生。神。子。子。
之。必。勝。游。能。在。角。里。一。鄰。疾。疾。難。
坡。以。道。朱。因。是。苦。飲。第。第。多。潤。垣。之。
後。去。深。之。為。是。此。深。研。苦。以。精。理。此。情。
學。之。位。著。說。應。不。換。別。門。分。數。應。一。
不。得。之。時。未。恒。子。法。可。法。甲。親。生。匹。
余。若。少。之。忘。人。身。苦。性。以。子。林。弱。人。慈。
此。贈。以。書。之。望。有。之。以。忽。愧。之。大。亦。可。
者。中。人。之。疾。病。苦。覺。以。可。以。之。則。


予嘗前糖理照義。因病以沒方。少能
有以。病多。平生。在。任。州。名。羅。涇。州。
在。鄧。湖。名。岳。嶺。湖。在。鄧。法。則。名。振
駕。諸。史。在。汝。物。新。考。名。岳。嶺。新。都
七年。名。梓。甘。梅。其。之。古。嘉。嘉。嘉。嘉。

時

榮。秩。戊。寅。季。秋。第。日。

賜。進。士。第。中。順。大。友。庭。乞。病。承
前。南。系。為。實。司。知。吏。部。文。監
考。功。法。吏。司。監。中。上。子。

旨
主計 徐石麒拜撰



丹臺玉案序

余嘗謂經濟莫論出處。活
億萬生靈為大。而活億萬
世生靈為彌大。是故良醫
賢良相。先王父暨先大人

國立中央圖書館 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鑒此。遂薄功名而工岐扁。究心諸書。精詳攷驗。若飲上池。有所獲。試之輒符。聲名噪起。江以南。竒疴沉瘵。非兩大。人未能下手。筑民

無告。則捐餌療之。余從帙括暇。亦不忘箕裘。頗於中探採。以是與術家言。悉知其伎倆。良楛畢照。不為庸流蒙。乙丑冬。司鐸當湖士

子爭以文相質。讀易誦詩。
亶亶不倦。願欲訪一二異
人謀養生事。缺然無聞。越
歲遇孫君對薇。與語。輒
竒。試技。輒效。察以九竅。叅

以五臟。處虛實之分。定順
逆之節。知與斯道。得三昧
焉。然淵源奚自。對薇寄當
湖。非當湖。人生新安。長北
固。北固迺宿曜。厥臨醫獨

冠海內。對薇卜。築在茲。應
出尋常地。靈之驗。信然乎。
曰。否。北固豈人。對薇人。
不傑。地亦不靈。對薇。以而
穎敏。治經史。颯舉不凡。自

謂取青紫。如拾芥。竟以孱
質。罹疴。於是棄墳典。乞靈
素難。以是捷於國士者。移
於國手。真不啻反掌間。非
僅上特北固靈耳。今伊道

揚序

大行轉盼活億萬生靈不
淺而對薇猶未滿志迺所
出手披一集俱從靈樞黃
庭內景叔和河間以訖東
垣丹溪諸篇細為刪訂叅

以獨解生平伎倆具在茲
編或詰余曰人問許宗胤
何不著書宗曰人病在心
意之巧而知變脈之深趣
不可言傳孫氏茲編無寧

糟粕。余答之曰。二十年苦心。九折臂而証之。不可言傳者。能以言傳。非孫氏不能。有是書。昔葛洪抄金匱方百卷。肘後急要方四卷。

亦寧好事。活億萬世生靈。對薇。其有遐心耶。先王父暨先大人。頗稱世德。余不敏。謏劣承乏。兩作吏。未審活人幾許。然一片婆心。寧

柔克。無剛克。寧失出。無失入。以副。

聖明如天之仁。養家數百季。元氣私心爾。閻閼父老。竊為世德有報。

余滋愧焉。憶孫長孺喜藏書。為樓置其上。後子孫舉進士。矧伊養生之策。行而不藏乎。處勝於出。行看出勝於處。孫氏其昌於後。余

言是券。昔

崇禎戊寅仲秋

承德郎知江寧縣事茗水
通家侍教生楊雋卿拜書
於雨花之木末亭



丹臺玉案自叙

予世居新都之休邑。弱不好狹。與群
兒游。輒岸然自遠。先君子異之。誠曰。
小時了了。大未必佳。盍走通都大邑。
聞所未聞乎。因命往京口。謁渭陽氏。
京兆談公。談公一再發難。皆嗟稱善。

頗有宅相之目。於時苦攻下帷。日課
經生業而已。久之。二豎為祟。日與地
之上池名。詰砥摩。乃探襍叩藏。則靈
樞內景諸書。次第咸列。僕初緒覽。苓
朮之味。與帖括之苦。略相當。徐乃漸
入甘境。久而揣摩。獲中病盡。脫矣。因

嘆人。能殫精。皆可證聖。安在農軒業
不足寄志乎。遂悉發古今人論著。窮
搜博討。攷故徵新。即不敢望三十日
而知物。三十日而見癥結。然而五運
六氣之微。五行六腑之變。溫涼生尅
之數。標本竒正之方。亦庶幾管窺蠡

測探其一班矣。或曰：子業已成，盍少試乎。乃行之京口。所投輒治，問膏肓者踵相接也。顧予性不耐紛，大江南北之衝，郵使星輶之過，日不暇給，心猷苦之。於是又寓之古吳。古吳人士閒雅，林水瀟散，讀書譚道，地與性宜。

遂寄籬廬焉。因以濟物之暇，益肆力於仲景元素諸家之秘旨，精思劇解，彙輯成編。用公同志，昔陶弘景以神農本草合雜家別錄，銓釋注名，嘗言江南偏方，不周曉藥石，往往紕繆，四百餘物，予乃知東晉士大夫好服五

石散其時風氣涼薄。習祖清玄。而國
脉以促。弘景之言。此其驗與。夫東郭
迂突善筮。先人事而後說卦。北山愚
公善鑿。先飲食而後丸劑。故秦越人
察氣觀變。名聞諸侯。而不如其長兄
中兄。名不出閭里也。讀予是編者。併

以斯言贈之。使貴五穀而賤金石寶
真氣而陋參耆。則枚生七發。人自有
之。亦無所用予書矣。

崇禎丁丑孟夏上浣八日孫文胤對
薇父書於仁壽堂



丹臺玉案凡例

一集素難靈樞仲景河間丹溪東垣諸家等書合為採撰刪其繁雜雷同摘其精核簡要一言可當千萬言以便流覽

一質諸賢達究心於此者并海內同道諸名公虛心諏訪不敢槩恃臆見

一分卷為六卷之內有類類之中有論論之次評脈脈之後主方苦心詳析庶幾開卷井然

一先天脈鏡得之異人秘授并自診驗與軒岐叔

和有所不同。故另列一帙。

一試之考驗所中。兼於朝夕展卷細翫。靜悟研思。別有所得。亦不敢盡勦成說。

一是集經二十年。參訂攷較。非敢草草飾閱。

一自手錄付之。謄真續付。剞劂一一對明查改。當無訛謬。

一外著蠡斯秘寶錄。而爲育嗣種子。深究精微。纂已成章。緣未遑續較。以俟它日。再鐫附入。

凡例畢

丹臺玉案目錄

卷之一

先天脉鏡

調攝養生

計一十六款。

靈蘭秘典

藏象論。并臟腑圖形。各臟補瀉溫涼引經。

八風宜避

卷之二

傷寒門

附驗舌形症三十六種。針灸法三穴。

中風門

附癱症。

丹臺玉案

目錄

厲風門

癩症門 附疰症。

麻木門 附脫陽。

中暑門 附注夏。

中濕門 附痿症。

卷之三

瘧疾門

痢疾門

黃疸門 附黃胖。黃汗。

火症門

發熱門

痰症門 附痰飲。

三消門

癩疹門

內外傷 附諸內傷。

眼目門

喉痺門 附失音。骨鯁。乳蛾。針法一穴。

齒痛門

口症門 附舌。 唇症。

卷之四

諸血門 吐血。 便血。 尿血。 血汗。 血潛
鼻血。 五竅出血。

諸虛門

癆瘵門 附夢遺鬼交。 盜汗自汗。 骨蒸潮熱。

諸氣門 附氣滯。 鬱症。

諸痛門

頭痛門

頭眩門

咳嗽門 附喘。 喘症。

嘔吐門 附翻胃。

霍亂門 針法二穴。

噎膈門 附坐功取效。 梅核氣。

脾胃門

心痛門 附怔忡。 驚悸。 健忘。 癡狂。 邪祟。

痞塊門 附備雜。 呃逆。

腹痛門

蟲症門 附好喫壁泥。 生米。 茶葉等積方。

卷之五

蠱脹門 附水腫。

脇痛門

腰痛門 附針法一穴。

泄瀉門 附灸法二穴。

閉結門 附轉脘。不禁。

便濁門 附遺精。

疝氣門

股痛門 附脊痛。

婦人科

月信不調

經閉門

疼痛潮熱

血鼓門 附血瘕。血腫。血風。熱入血室。

崩淋門

帶下門

懷孕藥忌

懷孕食忌

胎前門 子煩。子懸。子痢。子淋。子腫。
子氣。子瘡。腹內見哭等方。

臨產門

產後門

卷之六

小兒科

初誕法

護養法

面部氣色 有圖

三關觀指 有圖

臍風撮口

重舌驚口

丹毒門

中惡門 附天吊。客忤。夜啼。

吐瀉門 附食積傷食。

驚風門

疳積門

癩疾門

痢疾門

傷風門

咳嗽門

八卦部位 有圖

耳後筋紋看法 有圖

痘疹門

痧麻門

瘡瘍科

發背門

癰疽門

附腦癰。肺癰。腎癰。附骨疽。

乳癰門

附乳巖。腸癰。囊癰。

懸癰門

疔瘡門

附癰瘡。臈瘡。

瘰癧門

附湯火。金瘡。

廣瘡門

附結毒。便毒。疔瘡蛙疔。

痔瘡門

附痔漏。

耳瘡門

附諸蟲入耳。

口疳症

附在口疳門。

乳蛾症

附在喉痺門。

諸蟲咬

諸獸咬

丹臺玉案目錄畢

丹臺玉案卷之一

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著

當湖孝廉友弟屠壽徵山靜父較正

懷寧縣庠盟弟游必遠自邇父

古潤內弟江國春如一父

全閱

先天脉鏡叙

夫測意在聲氣之微。幻矣。卽究詰感因。亦臆揣耳。若以三指叩五臟。尤在意揣外。軒岐暨叔和已發玄妙。而戴氏尚有刊誤之辨。蓋慎之也。余不敏。敢附贅疣。

顧所得異人秘授。兼之胘候。驗證參攷。更與先天有三昧焉。豈云超軼先聖賢。而實有闡先聖賢所未洩者。是亦一畫之繫。九疇之衍。奚忍私之。敬公同志。以參所未逮。

尊生主人孫之。謹識

先天脉鏡論云

夫脉之胃氣者何氣也。一陽之氣升於。二部者是也。爲先天之氣。物之所賴以生者此也。而人不自見。不自見。故在脉中。指下難取形狀。便是胃氣。但以形狀擬。便是六淫之氣也。昔人以和緩擬之。吾

以口中吹出重氣擬之。又以軟而滑者擬之。此亦無可擬之中。而強擬其畧相似者以示人也。

夫胘脉下指之時。須觀胃氣爲主。若此部得其中和。則此部無病。或云獨大者病。獨小者病。此言猶未盡善。譬若寸關尺三部有。二部皆受熱邪。則二部洪盛。而一部獨小者。得其中也。今若以小者配大者。不去涼。二部之熱。而反來溫一部之寒。吾恐如抱薪救火。而反傷其一部中和之體。可不損人之天年者矣。故當以胃氣爲主者是也。

夫胗脉法。固以胃氣爲主。而胃氣之取法。前言備之矣。乃指下渾渾緩緩無形之可礙者是也。但覺有形。便是六淫阻滯。就可認之爲病脉也。須大小緩急不同。乃六淫之體性有不同耳。自與中和胃氣大相懸隔。苟若以邪爲無形。則氣血以自通暢流行。乃正氣而非邪氣。何病之有哉。旣言爲邪必有形也。但在人察識之力。體認之真。以何經用何藥。而不眩。而或二或三之真見真知。而在陽分者。而用陽分之藥。血分者。而用血分之藥。浮沉不失。

降無差。軒岐之旨斯得矣。又云一陽一陰之謂道。

偏陰偏陽之謂病。信哉言乎。

此論當與後篇病在中不實不堅論兼者

夫胗脉之時。須要澄心靜慮。一毫事務不可雜擾。然又調停息氣。初下指。必須輕手於皮毛之間。消息其所以然也。次以按至血脉。消息其所以然。三按至肌肉之分。消息其所以然。四又按至筋之分。消息其所以然。五又按至骨之分。消息其所以然。此五等消息之方。得其詳也。蓋皮毛肺之分。陽中之陽也。其形如此。血脉之分。陽中之陰也。其形如此。

肌肉脾之分。胃氣分也。筋乃肝之分。陰中之陽是也。其形如此。骨乃腎之分。陰中之陰是也。其形如此。

夫一部之中五行具焉。五行之中陰陽分焉。陰陽之間胃氣存焉。其胃氣若桃李核中之仁。分之兩片。兩片之中有穿一線。其線即胃氣也。所賴以生生之機者此也。所賴以爲化化之妙者此也。

夫六部須各具五行之性。莫不由陰陽分來。若火邪乃五行之一也。總以一而言之。施運兼備。即爲太

極也。有表有裏。即爲陰陽兩儀也。表中有裏。裏中有表。即爲四象也。其土氣於四象無不在。何也。如河圖之土五數焉。天一生水。地六成之。一得五而成六也。地二生火。天七成之。二得五而成七也。至於三四皆由得五而方成八九也。此土之數。所以於四時無不在也。其陰陽五行之定位如此。

其脉之有病者何也。惟欲其無太過無不及。各得其性而已。假如部之屬木者。於時爲春。萬物於此暢茂條達。萌芽甲拆。此部必得軟滑而長。如萬物之

在春者。方得木之體也。外此或短而清。燥淫傷也。或平而滲。濕淫傷也。或微而滯。寒淫傷也。或浮而弦。風淫傷也。或洪而盛。熱淫傷也。或尖而數。火淫傷也。至於六淫合傷。五運害制。斯又在人察識之力耳。木須如此。火土金水何也。如火也。於時爲夏。萬物莫不盛茂。張佈施發。此部必得微洪而大。如萬物之在夏也。方得火之體也。外此皆爲病矣。金也。於時爲秋。萬物莫不完聚收斂而實。此部必得清肅而浮。如萬物之在秋也。方得金之體也。外此則皆爲病水也。於時爲冬。萬物莫不歸藏安靜。潛伏。此部必得沉細而實。如萬物之在冬也。方得水之體也。外此太過不及。皆爲病矣。至於土者。惟以和緩安靜。且三焦包絡之火。非心火之比。遊行於天地之間。惟以滑數流利。前體若此者。乃本來自然之性。以知消息處治之道。但恐智者過之。愚者不及。難以造斯道之精耳。

前云五行之性如此。亦惟以在經者言耳。而絡脉之分佈。此又不可不知也。絡者與經之何異。蓋經猶

木之有根。而絡猶木之有枝也。枝若有傷。於根何預。是以絡須病。而經不病者。有之。既以察其經矣。又當察其絡。察絡之方。又不易也。又云。大幹者。走經。旁枝者。走絡。甚是至理。在人詳辯。升降浮沉。而用之耳。譬若天地為經。日月星辰為絡。人脈之直行者。為經。傍發者。為絡。是以生瘡癩於手足。或積塊於身旁。必察絡而後知其病之所在也。此圖畧載以示大端。後當詳論。前論備而未詳。尚有輸孫兩手絡圖。兩手須左右不同。絡脈為病。大同小異。

右 手 經 絡 圖 形



前頭至腹下

後背至足

五臟外發見之圖

見於外者。知其肝經受病也。餘臟做此而推之。



如病人面青。或好呼。或喜酸。或泣。或怒。數內有一


左手經絡圖形

外背

內胃



五臟外應之圖



內經曰。上境上者。喉嚨及頭間事也。下境下者。後腰及足脛間事也。前以候前後。後以候後。左寸外以候心。內以候膻中。左關外以候肝。內以候膈。左尺外以候腎。內以候膀胱。右寸外以候肺。喉內以候膈。右關內。胃外。脾。右尺內。以命門外。以候三焦。前圖所載部位絡脈。若此部此絡有病。脈則主此處有病。毫髮不差。但審六氣。知其作何病。為異耳。前說須是一家傳受。看病認証。亦有似是而非。但以輸孫脈分來。無不詳備者。

夫六淫之邪。皆陰陽二氣推遷。相代太過不及而成。此六邪也。陽中之陰則爲風。陽中之陽則爲熱。陰中之陽則爲燥。陰中之陰則爲寒。而火乃三焦胞絡之部。爲發生之本。始氣血之父母。土乃脾胃之分。無所不該。故難定位。但脉中有外寒而內熱。有外熱而內寒。彼此相制而不得其自然。以致病相隱伏於其中。實不外乎陰陽升降之性也。故用藥者。當知升降陰陽爲主。

夫治六邪之藥。佐之而六淫之邪非外來物也。然人之一身。本乎六氣而成。十二經絡之中。不可無一氣也。但各不安其位。或太過不及。於是僭雜則爲病耳。而天地之所以爲天地者。亦不外此六氣。相代以爲造化之機也。

一論六淫之邪。浮越起於上。而得按入裏。便不相似者。風也。百病不離乎風。遲滯微虛者。寒也。尖而數者。火也。洪而盛者。熱也。平潤而滲者。濕也。細而濇者。燥也。或獨至。或兼來。在人體認。如地理之辨星辰。頭同而脚異者。

陽邪在表。自得發散之體。如甑上熱氣。烘烘上升。四圍無約束之狀也。乃陽氣自旺。本部如此者。當伏以降之。

陰邪在表。自得澀滯之體。如煎銀將化。面上有鎔。蓋覆不開也。乃陰乘陽也。如此當發之。散之。升之。舉之。陰有形而陽無質者。此也。

一論人身之中。惟陰陽二氣而已。陰在內。陽之守。陽在外。陰之使也。陰須在內。而根於外。陽之下。陽須在外。而根在內。陰之上。故曰。陰根陽。陽根陰也。是以

脈中。表須屬陽。以活動爲其體性。而猶有靜順之陰在內。裏須屬陰。以靜順爲其體性。而猶有活動之陽在中。如此乃兩得相依倚也。或表脈惟散尖洪大。裏脈惟蹇遲細小。乃陰陽相拒而不相和。各盛於本位。當以藥之氣味輕清者。收斂表陽。使根於內。又以氣味俱厚者。溫和裏陰。使根於外。又或有表滿下而裏冲上者。在外在陽氣不升。在內爲陰火冲發。此常情多有也。當升表之陽氣。降裏之陰火。亦有表寒澀而裏洪數者。亦有陰乘陽。陽乘

陰也。當升發之。當升降之。其治法脉法之綱。不過如此。其中或兼五運六氣之邪。或有積聚成痰。此又在人所擇藥味治之而已。而陰陽之理不能離也。

一論人身中。惟陰血陽氣而已。貴乎不可有偏勝也。一有偏勝。皆爲病矣。勝輕則病輕。勝重則病重。至日久則病愈勝。微者愈微。漸至孤陰孤陽。是皆死也。脉若孤陽。死在春夏之日中。脉在孤陰。死在秋冬之夜半。所謂孤陽不生。孤陰不成。何也。蓋陽無

陰則散漫不能收斂。陽之所倚者陰也。陰無陽則翕聚不能發散。陰之所倚者陽也。觀之天傍地。地傍天。天地自相倚杖。而人則可見矣。

一論陰陽之性。陰之性靜。陽之性動。陰之性收。陽之性散。陰之性降。陽之性升。陰之性沉。陽之性浮。陰之性遲。陽之性數。陰之體平。陽之體尖。陰之性橫。陽之性直。陰之性成。陽之性生。陰之性殺。陽之性長。陰之性內。陽之性外。陰之體弱。陽之體強。陰之體濁。陽之體清。陰之味鹹。陽之味辛。陰之味苦。陽

之味甘。陰之氣涼。陽之氣溫。陰之氣寒。陽之氣熱。陰之體潤。陽之體燥。陰之體扁。陽之體圓。陰之體短。陽之體長。陰之體有形。陽之體有質。此陰陽形質之大道也。

一論陰陽升降之道。其陽上升。非在陽分而復上升。乃陰極陽生之道。陽自陰分。上升至陽分耳。陰下降。非在陰分而復下降。乃陽極陰生之道。陰自陽分。下降至陰分耳。故曰。天陰自上而降地。天晴自下而上升。正此意也。又曰。地氣上而爲雲。天氣下

而爲雨。

一論陽性無不發散。陰性無不收斂。陽性發散。散何物。不過發散乎陰耳。非外有物與陽發散也。陰性收斂。斂何物。不過收斂乎陽耳。非外又有物與陰收斂也。

或有陽收斂。陰發散者。乃陽中之陰收斂。陰中之陽發散耳。而陰陽之性。未嘗先也。

一論六淫之邪性。有浮起升散者。有沉平降斂者。所風熱火者。其性屬陽。本乎天者。親上。其來必浮起。

升散寒濕燥者。其性屬陰。本乎地者親下。其來必
沉。下降斂。但各得其位。受胃氣之所養。升降浮沉
得遂其性。則爲天地推遷運化之氣耳。何病之有
哉。一不如此。則陽去乘陰。陰去乘陽。則陰陽不和。
各先其職。故性相倚仗者。而變爲相形者矣。漸必
至於陽微陰勝。陰微陽勝。感則陰去陽難獨守。陽
去陰難獨存。常道值此。大變可立待矣。

一論升降浮沉在脉中。貴在平和。但浮沉若夏冬二
時。寒熱至此極矣。極則改常。然或有生者。猶未至
於極也。升降者。若春秋寒熱未極之時也。或升降
不得其平。則病見矣。察病之道。亦惟以此。若前寒
熱浮沉之極。則陰孤陽寡。固不必治。而亦不能治
也。

夫治病者。主脉不及。治之宜緩。客邪居之。治之宜急。
藥性分兩。不可惑也。

夫三陽之表有邪當汗。其汗宜急。三陽之裏有邪當
下。其下宜緩。三陰之表有邪當汗。其汗宜緩。三陰
之裏有邪當下。其下宜急。陽之表乃裏之表。無形

經絡受病。故宜大發其汗。陽之裏乃表之裏。有形經絡受邪。故宜利小便。下大便。陰之表乃裏之表也。亦爲經絡受病。故宜清形。以爲汗。陰之裏乃裏之裏也。實爲有形經絡受邪。故宜大便下之。何也。蓋表乃陽之分也。陽性本浮之客。寒滯陰邪。故宜發散。以順其陽之性。裏乃陰分也。陰性本沉降之客。洪數陽邪。故宜利下。以順遂陰之性也。升降浮沉。治法須異。不過順陰陽之性。而利導之耳。外是失之。皆爲穿鑿。所以智者惡其鑿也。

夫治腫毒初得。宜發汗。亦以其所得未深。在無形經絡。久則宜下。以其漸進入裏也。在有形經絡中矣。其所謂膿成而補者。以其邪熱已定。正氣已被所傷。故補其氣血之不足。非補邪也。觀此雜病。皆與傷寒治法同。今人以爲不同。是不知陰陽之理也。夫十二經在三陽外。無不主內有所受者。受小谷傳糟粕也。在三陰內。無所受外有所主者。皮毛血脉肌肉筋骨耳。用藥主治者。在所當知。夫胞絡者。本三焦之配也。今人惟以命門爲三焦之配。不知十

二經惟有胞絡之名。今棄胞絡而不言者。惑之甚也。吾故以三焦爲氣之父。其性輕清居上。命門爲液之祖。較之於吾。則有形質矣。故次三焦之下。胞絡爲血之母。全屬陰矣。故此於命門之下。是以爲父。爲祖。爲母。皆生生之原。不得不同居於一部也。但當以氣質而論其清濁。以定其上中下之位。次可也。若經所謂審清濁而知部分數。

夫結滯積聚。多屬陰脉。何也。蓋陰性收斂。向實歸之意。若陽性則主發散。冲開。何積聚之有。所以經云。陰搏陽別。是各有姓。亦以陰脉成聚。完結之意也。是以有姓之婦。得陽脉來。便主落胎。陽化氣。陰成形。天地生成之功用也。又云。血旺氣衰。應有體正。此意也。

夫小兒痘疹。惟其右尺相火熬煎。左尺腎水。以致腎水逆尅心火。乃一定之病機也。若水勝則陰勝。其痘必主氣虛。不能發起。故以助陽發表之藥爲主。若火勝則陽勝。其痘必主血虛。其氣之發。無所益。覆必難成。漿漸至乾枯。又以斂表之藥爲主。愚按

風熱相兼。惟治熱爲主。佐以收藥。
風寒熱相兼。惟治風爲主。佐以溫藥。之論大槩在
人消息之耳。

一論人身有十二經絡。統之五運六氣而已。運氣又
不可執一也。總之者。惟一陽一陰。人能自運氣而
推其陰陽之理。則軒岐脉針之旨得之矣。自陰陽
而根究其無極之妙。則浮沉升降之化得之矣。學
者不肯遡流窮源。而惟限於局方之習。終於局方
而已。其不枉人之天年者得乎。

一論人身之胃氣。乃先天之炁。前以言之矣。但此氣
在人身少而壯。由此氣以漸而成也。人之大小。強
弱。壽夭。皆由得此炁之厚薄耳。運用之盡。則有死
而已。所以能養之士。固守此炁。而不使喪耳。亦不
能外有所增益也。又云。能延年者。如燭在風中。則
不耐久。移在密室之中。則所差遠矣。是以常人惟
損之志。人固守之。

一論胃氣在人之脉。固滑而和本。是或有邪淫之來。
此脉渾然在中。邪淫日久。此氣殘傷。殘傷至盡。生

氣殄矣。所以人須病。而脉猶有胃氣者可醫。無則不能治也。故診之時。既是邪脉。猶當表裏之中。尋取胃氣也。此脉但可被邪脉傷。終不與邪脉混。故當審察分看。不可茫茫然無雜別也。人能知此醫理。斯過半矣。

一論大腸脉自外而下降。三焦脉自內而上升。小腸脉自內而下降。膀胱脉自外而上升。故內經云。天陰自上而降。地陽自下而升。是此意也。

詳論

一論前載六淫之氣來。應指下必有太過不及之形也。倘六脉不實不堅。且散且聚。而症却在中。此無形而有病也。殊不知人身有六氣。有五運。既無六氣有餘之邪。則必屬五運不足之邪矣。若岐伯所謂無積者。求其藏。虛則補之。藥以却之。食以隨之。行水漬之。和其中外。可使畢已之謂歟。邪已退。正未復。此意也。兼前論看。

一論寒熱交爭者何也。蓋陰外乘陽。陽與陰爭。此言寸也。或陽乘陰。陰與陽爭。此言尺也。於是寒熱作

也。其寒熱卽陰陽之氣也。或表脉見遲滯寒瀉。或裏脉弦數動滑。皆主作寒熱也。司治者在表。陰邪當升發。以復其陽之性。在裏陽邪當降斂。以復其陰之性。陰陽得位於寒熱何爭之有。若夫陽分洪數。或陰分寒瀉。此乃偏勝之脉。惟寒惟熱而已。不。至於寒熱爭也。又有陽去乘陰。陰不能與陽爭。是陽獨勝也。惟主熱而已。或陰去乘陽。陽不能與陰爭。是陰獨勝也。亦惟主寒而已。三等理論。在所當知。

一論寒熱之客於人身也。寒邪多自皮毛而入筋骨。熱邪自筋骨而出皮毛。故曰寒自外入。熱自內出。如是觀之。天陰自上而降地。地陽自下而上升。其理蓋可見矣。

一論表脉乃尖之尖者。若稍平來。則似裏脉之體。風寒風濕是也。裏脉若尖。則反似表脉。燥火之體也。一論脉尖數。在上爲陽。平濶在下爲陰。此常人之平脉也。或微有尖數在下。而不見平濶之體。此陽極也。當下之。或微有平濶在上。而不見尖數之體。此

陰勝也。當升之。此篇當前論看。

一論人身之筋。過熱則縱。過寒則縮。縱則痿緩。縮則疼痛。或有痿疼痛悉備者。因受濕熱。而大筋施長。小筋更短之謂也。

一論人之病出於六淫之邪。實不外乎四時寒熱溫涼之氣。此脉須辨升降浮沉。而以六淫參之。斯得病情矣。因以用藥無不動也。

一師云。風淫之邪。無晴不有。若風濕風燥風熱風火風寒之類。若三者兼來。如風寒濕風濕熱類也。故

前云百病不離乎風。一日問師云。水風在脉何以認。答曰。須與濕相似。而畧有不同。如野馬氤氳之意。以師言度。乃渾渾不清之體。

一論凡知病處法。亦有一大理也。心腎二部。上至頂巔。下至足心。若子午上下之中正也。肝若天。三生木。屬左也。肺若地。四生金。屬右也。脾土雖屬於右。而實在中。多三焦相火。雖屬於左。而亦寄膻中也。一論用藥之法。譬若心臟大熱。腎臟大寒。此乃陰陽各盛本位也。當涼陽分之熱。溫陰分之寒。上呼下

疾者方是。予意以黃連之類涼心。桂附之類溫腎。師云不可也。黃連固是。而桂附不宜用。恐反助陽火矣。惟以澤瀉瀉腎之寒。則脈自轉平和。一論藥味之甘者上行而發。苦味直行下泄。二味更相平也。辛味橫行而散。酸味收而來斂。二味更相平也。又若苦能堅軟。鹹能軟堅。二味少相反也。須然二味相兼。則以重者論。則輕者又難爲主矣。一論脈中有輪有經。有絡有孫。四端縱橫錯綜。方成人形。輪者乃氣助行。無有定體。若人生之初。可善可惡也。是以偏勝之氣。而居處於飲食之間。稍得調之。則無有矣。

經脈者。乃此氣行來。已有着實定體。如人之生。習學已成。善則善。惡則惡。至此病端。定已可施醫藥。調養之力也。生歿在此分。安危在此判。絡脈者。得之各經受來。若經中元氣。穀氣充盛。不爲所因。間有發於絡脈。爲病之小者。無關人之生歿矣。

孫脈者。則又受之絡。爲有小節之刺。可以治。可以無

治可以外用敷貼而愈矣。其脉之在人于也。其行直經也。其行橫絡也。其行亦橫孫也。一橫一直無少差也。譬若天地逆行之序焉。輸脉者。若一輸者。輸氣至於經也。經者。總而經理者也。如寸關尺三部。表裏分之。兩手共十二經也。絡者。絡分四旁也。孫者。又絡之分佈出也。予曾得大腸風燥。病痔下血。須不常見。其根常在。自察其脉。右手得浮弦小瀼。挨在輸脉之分。久治未愈。師云。此乃熱被寒鬱。在輸而不得達於經也。據脉言。乃寒火之類。故以

荆芥苦温之藥。主之。加以薄荷蘇葉。又以貝母行滯氣。其荆芥能傳送五臟。乃使輸脉發行至經。其味苦能降火。濕能散寒。以之。主治恰是。至當學者。宜以此知彼。擴而充之。可也。

一。凡有人求治於予者。不可因貧富而異其心。當潛心察脉。辨色驗症。惟圖愈疾為主。不可輕易求其了事而已。常聞古人云。得失之中。增見識。亦爲吾之一小試可也。苟若以謾心乘之。非惟無益於彼。抑且有失已之初心矣。又云。纔放肆。則就放蕩。五

殺不熟不如美草日流污下何能登軒岐之堂而
為當世之司命也

診脉捷要歌

浮緊弦遲屬風寒。升之散之氣自完。
弦數浮洪風熱認。藥用收降病自安。
浮弦小濇如絲線。風燥藥宜降潤施。
浮而平濇來歸指。風濕升散加參主。
小濇無力寒燥傷。溫潤之藥端可與。
洪盛而濇乃燥熱。降藥潤藥皆急取。

平濇革遲為寒濕。升燥之藥為未一。
濇濇洪數為濕熱。苦寒藥餌宜用急。
枯濇小濇乃火燥。滋潤之藥用之可。
數而無力寒火觀。甘補溫藥俱勿少。
數而有力熱火功。苦寒之藥正相同。
亦有濕盛火俱下。寒火之脉認宜真。
有見表滯裏表實。此脉莫把熱認之。
分明寒鬱熱難發。發散寒邪熱自驅。
又有表數裏無力。陰盛格陽正此期。

溫內更加斂表藥。
積滯之脉自沉伏。
血積有形按不散。
按滑如苔各痰積。
氣口繁盛食積新。
食不下兮氣口滑。

陰陽和時脉自如。
流注如珠或結乳。
氣積按有尋却無。
食積惟在右關係。
關若伏兮食多日。
食不化兮氣口滯。

大凡痛脉多屬陰。
亦有火熱來作痛。

陽脉即散痛難成。
外由陰鬱故來侵。

照脉玄竅訣

夫人身之有五臟六腑俱靜而不能自動惟脾一臟時能動磨製水穀以司變化故五臟六腑之係于脾者由萬物稟育於土也若脾有病則不能以養百脉凡各臟有病或各府有病亦不能不干累于脾凡各臟腑有病內則病氣干於脾之臟外有脉氣見于脾之部故有諸中必形諸外形諸外則有所據是以看脾為之關鍵凡診脉稍有疑難應將脾部下指者是其體真一切一照即知病脉見於某部遂將這部移指去尋又當體認十八脉狀響者應如神也莫知此實玄竅也照法恭亮抄錄於後


右手表裏圖形



表三焦手
表胃脈足陽明經
表大腸手陽明經


尺下
關中
寸口

裏命門又半表半裏心包絡
裏脾脈當作三層看
裏肺脈足太陰肺經
右手經絡訣
寸表大腸手陽明經
寸裏肺脈手太陰經
關表胃脈足陽明經
關裏脾脈足太陰經
尺表三焦手少陽經
尺半表半裏心包絡厥陰經
尺裏命門



左 手 表 裏 圖 形

表小腸脈手太陽經
表膽脈足少陽經
表膀胱脈足太陽經



寸表小腸手太陽經
寸裏心脈手少陰心經
關表膽脈足少陽膽經
關裏肝脈足厥陰肝經
尺表膀胱足太陽膀胱經
尺裏腎脈足少陰腎經

詳

假如經脈者若十二月也。絡脈者若三百六十日也。

症 脈 照 圖


孫脈者若四千三百二十時也。人亦如一。小天地於此則可見矣。



輸經絡孫圖

經孫直

輸絡橫



照脉口訣

脾經見浮脉其病受在肺與大腸經。其肺與大腸相表裏

見芤脉其病受在五臟與六腑無干。其五臟屬陰心肝脾肺腎也

見滑脉其病受在肺與胃二經。

見實脉其病受在心與小腸。

見弦脉其病受在肝與膽二經。

見緊脉其病受在膀胱一經。

見洪脉其病受在心與膀胱腎三經。

見微脉其病受在三焦命門。

見沉脉其病受在腎一經。

見緩脉其病受在本經之脉也。

若太緩太急其病在胃經

見濇脉其病受在肺與腎。

見濡脉其病受在膀胱一經。

見弱脉其病受在腎與命門。

見遲脉其病受在大腸一經。

見伏脉其病受在三道之內。

氣道血道津液道女人受在命門

見虛脉其病受在心胞絡。

其數脉六部未嘗缺也

若諸部俱無犯成病脉單在脾經見又作脾經受病。

三焦照六腑

六腑受病處脉形疑似不明三焦照之相同相似即是無差。

脾照五臟

五臟受病處脉形疑似不明以脾照之相同相似無差。

脾見浮脉肺亦有浮脉即斷肺有風。

三焦見浮脉大腸亦有浮脉即斷大腸有風。

脾見芤脉五臟相應與三焦無干。

脾見滑。肺亦滑。

三焦見滑脉。胃亦滑。

脾見實脉。心亦實。

三焦見實脉。小腸亦實。

脾見弦脉。肝亦弦。

三焦見弦脉。膽亦弦。

脾見緊脉。腎亦緊。

脾見洪脉。心亦洪。

三焦見洪脉。小腸亦洪。

十八脉形歌

浮洪濡虛是扁脉。

圓脉芤滑實沉遲。

尖脉惟有細一樣。

長脉數緊併弦微。

緩弱濇伏皆長類。

十八脉形細認知。

五運體性

圓扁尖長乃金水火木之體。金之形圓。水之形扁。火之形尖。木之形長。四者本來自然之體。而豈無體耶。各旺四時。中和之體也。乃土之體也。圓形中和。乃圓形內有土體也。扁形中和。乃扁形之內有土也。而尖

長皆然所謂土旺四時無不在也。四者之體固如此。而升降浮沉。人為四者之性。急為木之性。聚為金之性。滲為水之性。亦道易云。本乎天上者。親上本乎地者。親下。意同。

其各部中。當認天陽地陰。乃天地自然之本體。若地陰居上而天陽在下。而陰鬱陽當以散其陰邪。而復其天陽矣。



六氣合來為邪脉

尺關寸右

流	中	浮	沉
三焦	命門	胃脾	大腸肺
指侵外候三焦也	指侵裏候命門也	指侵外候脾胃	指侵裏候大腸肺

左寸關尺

沉	中	浮	沉
膀胱腎	膽肝	小腸心	
指侵外候膀胱	指侵裏候腎	指侵外候膽肝	指侵裏候小腸心

以上六脉

下部臍至腿足止

中部胃至臍止

上部首腦至背胃止

論三部脉先定陰陽與太過不及。

左手太過脉

左尺脉浮主腎其脉上至關部下不及尺乃爲陽是太過也主腎虛冷定令人怯弱腰脊強惡寒足跨疼痛。

左關脉主肝上至寸口下不應指乃爲陽太過也主目暗筋疼多怒緣肝屬木豈無根而有枝葉。

左寸脉主心其脉上至魚際下不應指是陽有餘爲太過也主心怔忡夢多舊事多忘緣心屬火合當

離明不當太過。

右手太過脉

右尺部主命門其脉上至關部下不及尺是陽有餘。乃太過也。主遺精多夢思交過度經水白濁脫肛戰慄緣命門主藏精不合精液如水流。

右關部主脾其脉上至寸口下不守關陽有餘乃爲太過。主面黃眼泡浮腫貪睡懶動四肢倦怠緣脾主中央尺當安寧不宜動。

右寸脉主肺上至魚際下不及關是陽有餘乃太過。主氣短身瘦。咳吐稠濃時如瘧狀屬金四季多汗如毛。

左手不及脉訣一

左寸脉主心其脉下至關上上不守寸是陰不及也。主謔語亂言目内生花常不識人緣心屬火火當炎上不當消滅。

左關脉主肝下至尺上上不守關是爲陰乃不及也。主怒多口舌眼赤目内生翳障淚多流滴。

左尺脉至腎其脉上不及關下不應指是爲陰乃不

及也。主小便頻數。腰如帶石不可動。側呻吟。緣腎屬水。當溢滿。不合枯少。

右手不及脉訣

右寸脉主肺。其脉流下至關。上不及氣口。是爲陰。乃不及也。主氣短。胃脇哽悶。咳嗽吐痰。身體瘦削。緣肺屬金。四季多浮。

右關脉主脾。其脉流下至尺。上不守關。是爲陰。乃不及也。主腹痛。腸鳴。口舌飲食不納。思甜口臭。緣脾主中央。只當安守。

右尺脉主命門。其脉上不應。指下至命門。是亦不及也。主小腹陣痛。膀胱偏墜。小便赤少。足膝腿疼。女子則血脉不通。五心煩熱。黃瘦。緣命門主藏精。合當溢少。不可枯少。

凡尺脉上不至關。爲陰絕。寸脉下不至關。爲陽絕。陰陽相絕。人何所依。蓋脉太過不及。皆有疾患。而作焉。脉鏡終

調攝養生 計一十六款

夫治疴猶治國。然國有政。所以調其元氣。防其戕害。

抱疴者而不謀夫調之防之者。鮮不滅裂矣。故錄調攝最要者十有六。以爲却病者司南云。

却妄

彼妄想者名爲客塵。而我真神原不妄行。倏忽入極神飛杳冥。真元幾何堪此淫騁。

遠色

脂乾燈盡汲頻水竭。物理固然匪云妄說。皓齒蛾眉。是吾勾牒。伐性斧斤。永宜簡節。

貴達

靜坐觀空皆爲幻景。人生大事蝶夢泡影。達者視之。千古一瞬。何與天真。日用凜凜。

調息

身中坎離卽在土釜。不向天邊別尋子午。取彼鉛龍。益我汞虎。鍊炁歸神。還吾真府。

除煩

無明爲障。莫大煩惱。種種多礙。自性明了。肝木上炎。如焚如燎。矧此沉疴。識之宜早。

節食

丹臺玉案

卷 調攝養生

三十三

五經環列。土位中都。病從口入。昔有良諫。過飽脾怯。食多胃浮。不節則嗟。是則誰辜。

慎勞

乾靜故專。坤靜故翁。人身二氣。惟休乃逸。如彼勞薪。燃之猶急。筋骨日瘁。安有餘息。

酌飲

麴臺糟丘。濫腸狂藥。無量不亂。至人斯樂。溺則精撓。酒則神索。知止弗殆。是在自酌。

懲忿

怒氣屬肝。過並傷肺。冲冠裂眦。忽發難制。炎炎隆隆。天君狂吠。克之弗力。胡以息氣。

守口

古人有訓。守口如瓶。匪第蓄德。亦以尊生。多言耗氣。設語搖心。淵然靜嘿。抱寂凝真。

防感

邪氣乘虛。風寒襲逆。榮衛稍疎。感輒易入。譬猶勁敵。有間則突。慎之慎之。宜固吾鑄。

去疑

弓影非蛇。蕉夢豈鹿。境因疑生。致此成鬱。忽二忽三。茫無定局。渙然米消。乃慊幽獨。

破拘

神圓則融。脉膠則括。抱此沉憂。天機宜活。瀟然散步。灑然獨樂。解纜釋拘。生意灼灼。

寡交

伐木丁丁。友生是求。值此煩疴。艱厥應甯。靜處一室。可以優游。何用往還。頗如馬牛。

自貴

吾性吾命。吾愛吾真。彼蒼畀我。肩荷匪輕。百爾調攝。衛生有經。藐然桎梏。不自尊。

能斷

我有慧劍。倚天耀雪。水可斷蛟。陸可割革。況此情緣。何難斬截。一揮立碎。乃爲俊特。

已上數款。不假藥石。其用較藥石猶精。無事餌木。其功視餌木更捷。所謂一點清涼。二豎立瘥。抱疴者。洵宜置之榻左。永爲箴砭焉。

尊生主人孫文胤謹識

靈蘭秘典篇

藏象論附臟腑圖形并各經補瀉
溫涼引經

帝曰五臟應四時各有收受乎岐伯曰東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝其病發驚駭其味酸其類草木其畜雞其穀麥其應四時上為歲星是以春氣在頭也其音角其數八其臭臊是以知病之在筋也其聲為呼其變動為握在志為怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心其病在五臟其味苦其類火其畜羊其穀黍其應四時上為榮惑星是以知病之在脉也其音徵其數七其臭焦其聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣酸勝苦

中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本其味甘其類土其畜牛其穀稷其應四時上為鎮星是以知病之在肉也其音宮其數五其臭香其聲為歌在變動為噦在志為思思傷脾怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘

西方白色入通肺開竅於鼻藏精於肺故病於在背

其味辛。其類金。其畜馬。其穀稻。其應四時。上為太白星。是以知病之在皮毛也。其音商。其數九。其臭腥。其聲為笑。在變動為歎。在志為憂。憂傷肺。喜勝憂。熱傷皮毛。寒勝熱。辛傷皮毛。苦勝辛。

北方黑色入通於腎。開竅於二陰。藏精於腎。故病在谿。其味鹹。其類水。其畜彘。其穀豆。其應四時。上為辰星。是以知病之在骨也。其音羽。其數六。其臭腐。其聲為呻。在變動為慄。在志為恐。恐傷腎。思勝恐。寒傷血。燥勝寒。鹹傷血。甘勝鹹。

帝曰。願聞十二臟相使貴賤。何如。岐伯對曰。心者。君主之官也。神明出焉。肺者。相傳之官。治節出焉。肝者。將軍之官。謀慮出焉。膽者。中正之官。決斷出焉。膻中者。臣使之官。喜樂出焉。脾胃者。倉廩之官。五味出焉。大腸者。傳導之官。變化出焉。小腸者。受盛之官。化物出焉。腎者。作強之官。伎巧出焉。三焦者。決瀆之官。水道出焉。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。凡十二官。不得相失也。故主明則下安。以此而養生。則壽。歿世不殆。以為

藏腑正圖




丹臺玉象圖

一卷藏象論

三六

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



臟腑背面圖




心臟形

心形如
未敷蓮
花重十
二兩中
有七孔
三毛盛
精汁三
合附脊
第五椎。

肺腕

五臟系皆
屬於心



補 棗仁 麥門冬 遠志 山藥 當歸 天冬黃

瀉 貝母 玄胡索 黃連 木香

溫 藿香 石菖蒲

涼 竹葉 牛黃 硃砂 連翹 犀角

引經 獨活 細辛

肝臟形

肝重四

觔四兩


左三

右四

凡七葉

附脊第

九椎



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補 木瓜 阿膠 薏以仁 棗仁

瀉 青皮 芍藥 柴胡 青黛

溫 木香 肉桂 吳茱萸

涼 甘菊 車前子 胡蔓連 龍膽草

引經 柴胡本經 川芎行上 青皮行下

脾臟形

脾重二

筋二兩

扁廣三

寸長五

寸有散

膏半筋



補 人參 白朮 黃耆 蓮子 芡實 陳皮

扁豆 甘草 山藥 蒼朮

瀉 枳實 青皮 石膏

溫 丁香 藿香 胡椒 良薑 附子 官桂

吳茱萸

涼 滑石 玄明粉

引經 升麻 身藥

肺臟形 手太陰經

肺重三

筋三兩。 咽喉肺系


六葉兩

耳凡八

葉附脊

第三椎。

共計九節



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補

人參 黃耆 五倍子 山藥 紫苑 百部

茯苓 麥門冬 阿膠

瀉

防風 葶藶 桑扈 枳殼 澤瀉 蘇子

溫

乾薑 生薑 欬花 木香 白豆蔻

涼

沙參 玄參 天門冬 貝母 桔梗 瓜蒌仁


枯苓 馬兜鈴 山梔 人溺

引經

葱白 升麻 白芷

腎臟形

腎有兩枚。形如豇豆。重一觔。一兩。附脊第十四椎。當胃下兩傍。前後與臍平直。



補

芡實 地黃 龍骨 虎骨 牡蠣 桑螵蛸

龜板 山藥 瑣陽 五味子 牛膝 杜仲 山茱萸

瀉

澤瀉 知母

溫

附子 肉桂 破故紙 鹿茸 沉香 臘臍

涼

黃柏 知母 牡丹皮 地骨皮

引經

獨活 肉桂

膽腑形

足少陽胆

膽在肝之

短葉間重

三兩三銖

藏精汁三

合狀如瓶



補 龍膽草 木通

瀉 青皮 柴胡

溫 半夏 生薑 陳皮 川芎

涼 黃連 竹茹

引經 川芎 上行 柴胡 本經 青皮 下行

胃腑形

食脘



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

補

白朮 蓮子 芡實 陳皮 扁豆 黃耆

山藥 半夏 百合 蒼朮

瀉

枳實 朴硝 大黃

溫

藿香 厚朴 益智 丁香 吳茱萸 草薢

皂莢 肉豆蔻 良薑 乾薑 生薑 木香 胡椒

涼

滑石 石膏 石斛 玄明粉 黃連 黃芩

天花粉 山梔 升麻 連翹 葛根 竹茹 知母

引

經 升麻 白芷 葛根 石膏

大腸腑形

大腸重二觔十


二兩長二丈一

尺廣四寸徑一上口即小腸下口也

寸當臍右廻疊

積十六曲盛穀

一斗水七升半



下接直腸為
肛門穀道即
後陰是也

補

牡蠣

肉豆蔻

訶黎勒

五倍子

龍骨

蓮子

粟殼

瀉

枳殼

桃仁

麻仁

芒硝

大黃

檳榔

石斛

溫

乾薑

肉桂

吳茱萸

涼

槐花

條芩

引

經

葛根

白芷

升麻

石膏

行

小腸腑形

小腸重二觔十

四兩長三丈二

尺廣二寸半徑

八分分之少半

左迴叠積十六

曲容穀二斗四

升水六升三合


合之大半

小腸上口

胃下口也

小腸下口

大腸上口



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補 牡蠣 石斛

瀉 荔枝子 蔥白 紫蘇 木通

溫 小茴香 大茴香 烏藥

涼 天花粉 黃芩

引經 藜蘆 羌活 黃柏 每

膀胱腑形

膀胱重九

兩二銖縱


廣九寸盛

溺九升九

合廣二寸

半。

上系 小腸 津溺 由小 腸下 焦滲 入。



下聯 前陰

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補 檟核 菖蒲 龍骨 續斷 益智仁

瀉 芒硝 滑石 澤瀉 車釐

溫 茴香 烏藥

涼 生地 葶藶 黃柏

引經 藜蘆 羌活 黃柏

十二經絡中。惟三焦獨無圖者。上焦如霧。中焦如源。下焦如瀆。有象無質。即上中下三部臟腑空處是也。

補 黃耆 甘草 益智仁

瀉 澤瀉

溫 附子

涼 石膏 地骨皮

引經

柴胡 川芎 行上 青皮 行下

入風宜避 風者發屋折木揚砂起石開發腠裏體虛弱病後宜當避之

從正南方來名曰大弱風其傷人內舍於心外在於

脉其氣主為熱 夏至為實風冬至為虛風

從西南方來名曰謀風其傷人內舍於脾外在於肌

其氣主弱 立秋為實風立春為虛風

從正西方來名曰剛風其傷人內舍於肺外在皮膚

其主氣為燥 秋分為實風春分為虛風

從西北方來名曰折風其傷人內舍於小腸外在於

手太陽脉脉絕則溢脉閉則結 立冬為實風立夏為虛風

從西北方來名曰大剛風其傷人內舍於腎外在於

骨與肩背之膂筋其氣主為寒 冬至為實風夏至為虛風

從東北方來名曰凶風其傷人內舍於大腸外在於

兩脇腋骨下及肢節 立春為實風立秋為虛風

從正東方來名曰嬰兒風其傷人內舍於肝外在於

筋紐其主為身濕 春分為實風秋分為虛風

從東南方來名曰弱風其傷人內舍於胃外藏於肌

肉其氣主體重 夏至為實風冬至為虛風

此八風皆從其虛之所襲。乃能病人。故聖人云。避
風如避矢石焉。



丹臺玉案卷之二

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著

當湖孝廉友弟屠壽徵山靜父較正

平湖縣庠盟弟俞允昌爾迪父

古潤內弟江國春如一父 全閱

傷寒門

夫傷寒者。冬月天氣嚴寒。水冰地凍。而成殺厲之氣。體弱之人。觸犯之者。中則卽病。名曰正傷寒。不卽病者。乃寒邪藏于肌膚之間。伏于榮衛之內。至春因溫

暖之氣而發者。名曰溫病。至夏因暑熱而發者。名曰熱病。雖曰傷寒。實爲熱病。凡治傷寒。必先辨明六經。而後可以用藥。如初發于一二日之間。便覺頭頂痛。腰脊強。而發熱惡寒者。乃是太陽膀胱之受病也。而胛之則尺寸俱浮。浮緊有力爲傷寒。浮緩無力爲傷風。而太陽經症可辨矣。太陰病已。以次而傳經。必傳于胃。發于二三日之間。便覺目疼。鼻乾。不得眠。日晡潮熱。不惡寒。而反惡熱者。乃是太陽陽明胃經受病也。而胛之則尺寸俱長。長而微洪者。臟病。長而沉數者。

腑病。而陽明瘧可辨矣。陽明病已。以次而傳經。必傳于膽。發于三四日之間。便覺胃脇痛。而耳聾。寒熱嘔而口爲之苦。乃是少陽膽經受病也。而胛之則尺寸俱弦。弦而滑數者。病發厥。弦而和者。病欲散。而少陽經病可辨矣。少陽病已。以次而傳經。必傳于脾。發四五日間。便覺腹滿。或痛。而咽喉乾燥。大便不通。小便如常。或自利。手足溫而渴者。爲傳經。腑熱起。無頭疼發熱。但惡寒。自利不渴。手足冷者。爲直中陰經。乃是太陰脾經受病也。而胛之則尺寸俱沉。沉實有力爲

裏實熱。沉遲無力爲裏虛寒。而太陰經症可辨矣。太陰病已。以次而傳經必傳于腎。發于五六日間。便覺口燥舌乾而渴。手足乍溫乍冷。便秘。讞語者爲熱。或泄瀉清穀不渴。手指甲而青者爲寒。乃足少陰腎經受病也。而脛之則尺寸俱沉。沉實有力知其熱。沉遲無力別其寒。而少陰經症可辨矣。少陰病已。以次而傳經必傳于肝。發于六七日間。便覺煩懣而囊縮。讞語而渴者爲熱。口吐涎沫。小腹痛不渴。身冷如冰者爲寒。乃足厥陰肝經受病也。而脛之則尺寸俱沉。沉

實有力是其熱。沉遲無力定知寒。浮緩者病自愈。而厥陰經症可辨矣。又有兩感傷寒者何也。假如一日太陽與少陰俱病。頭疼爲太陽邪盛于表。口乾煩滿爲少陰邪盛于裏。二日陽明與太陰俱病。身熱讞語爲陽明邪盛于表。不欲食腹滿爲太陰邪盛于裏。三日少陽與厥陰俱病。耳聾爲少陽邪盛于表。囊縮而厥爲厥陰邪盛于裏。若水漿不入。又不知人者。六日歿。以其一臟一腑同受其邪。此兩感之所以不救也。然其間亦有輕重之不同。表重于裏者宜先救其表。

而後及于裏。裏重于表者。宜先救其裏。而後及于表。此又求于一生于萬。歿之中。不得已而施治也。其不兩感于寒。更不傳經者。至七八日間。其本經之邪漸退。至十二日。則精神清爽。而自愈。然傷寒傳經種種不同。未可執爲一定之序。有始于太陽。以次而傳入陰經。而不傳少陰者。或太陽不傳陽明。少陽而卽傳少陰者。或不由陽經。而直入陰經者。或始終卽在一經。而不傳者。或二陽三陽同受。而爲合病者。或太陽陽明先後受。而爲併病者。種種不一。詳審而治可也。

又有中寒一症。或卒中天地之寒氣。或口得寒物。直中陰經。六脉沉弱無力。身倦手足厥冷。口禁不語。非若傷寒之邪。循經漸深也。然真正傷寒。與感冒傷寒。及似傷寒。而非傷寒者。何以辨之。蓋寒者。冬月嚴凝。肅殺之氣也。自霜降以後。春分以前。皆屬冬。此時感冒。而卽發者。乃爲真正傷寒也。若冬傷于寒。不卽病。至春分後。而發者。名曰溫病。其症發熱咳嗽。身痛口渴。不惡寒。其脉弦數不緊。右手反盛于左手。蓋怫然內故也。冬傷于寒。春亦不病。到夏至後。而發者。名

日熱病其脈洪數其症熱渴比春更甚溫熱二症俱不惡寒而渴不惡寒則病非外來渴則熱自內達于表間有惡寒者乃冒非時暴寒非若冬月之甚也其有不因冬傷于寒而春自傷于風夏自傷于暑者則自有傷風傷暑之別而又不可以溫熱並論矣或有感于天行時氣而病相同者謂之溫疫其症頭疼身痛發寒發熱一家一方長幼傳染者是也或足膝等處忽然紅腫或軟弱發熱頭疼謂之腳氣傷寒或心腹飽悶嘔逆頭疼發熱惡寒右手關脈緊盛左手三

部和平而身不痛者是傷食也若頭痛而身亦痛左右手俱緊盛謂之夾食傷寒左手脈來緊盛右手洪滑或寸脈沉伏身熱惡寒隱隱頭痛喘咳煩悶胃脇體痛是夾痰傷寒頭痛發熱惡寒但右手脈來空虛左手脈來緊盛是勞力傷寒左手脈來緊澁右手脈沉芤心胃脇下小腹有痛處汗至脛而回是蓄血傷寒太陽症則如狂陽明症則善忘少陽症則寒熱似瘧此皆類傷寒而非傷寒也其餘傷寒中雜症頗多不能枚舉皆諸病門中所有者但雜症一兼傷寒卽

所謂傷寒雜症。醫者以意求之。則不言而自喻矣。

立方

神仙粥 治身熱作飽。不思飲食。頭疼。冒雨受寒。一時無覓醫處。此法取汗。

用帶皮老薑三兩。搗爛。將熱酒泡飲。出汗。輕者即愈。重者可解一時之急。

麻黃湯 太陽症。頭頂痛。腰脊強。發熱無汗。宜此湯主治而汗之。

麻黃 一兩 五錢 桂枝 一兩 甘草 五錢 杏仁 五十枚

作一劑。每服用五錢。水煎溫服。汗出為度。無汗再服。春分後。忌之。用此藥發汗不出。脈弱者。無陽。及不至足者。為難治。身熱不退。脈愈燥者。難治。

葛根湯 陽明症。目痛。鼻乾。不得眠。身熱無汗者。以此湯治之。

葛根 三錢 芍藥 錢半 桂枝 一錢 薑三棗二加黃

芩名葛根解肌湯

白虎湯 治渴而有汗不解者。

知母 二錢 石膏 五錢 甘草 六錢 粳米 小半 加人

參名。人參。白虎湯。無汗大忌。

小柴胡湯。少陽症。胃肋痛。而耳聾。往來寒熱。病在

半表半裏。此湯為主治。

柴胡 二兩 半夏 八錢 黃芩 甘草

人參 各七錢半 作五服。每服加薑三棗二。但人參一

味亦宜斟酌。若邪氣未退。不可輕用。

大柴胡湯。治身熱譫語。不大便。惡寒。

柴胡 二兩 黃芩 七錢 芍藥 三錢 半夏 六錢

枳實 五錢 大黃 五錢 作三服。加薑棗。

桂枝大黃湯。太陰症。肚腹硬滿。燥渴咽乾。或腹痛。

大便實者為裏熱。以此湯主之。

桂枝 大黃 甘草 枳實

厚朴 人參 芍藥 檳榔 甚者加

芒硝

附子理中湯。腹滿自利。不渴者。屬裏寒。

人參 白朮 乾薑 甘草

附子

四逆湯。治四肢厥冷。脉微欲絕者。

乾薑 五錢 附子 二錢 甘草 一兩 水煎熟冷服

大承氣湯 少陰症口燥咽乾譫語五六日不大便

手足心并腋下澼澼痞滿燥實俱全者用此湯主

之

大黃 厚朴 枳實 芒硝 各二錢半

小承氣湯 治傷寒傳裏有痞滿實而無燥堅者以

此湯主之

大黃 五錢 厚朴 枳實 各二錢

調胃承氣湯 無痞滿而有燥實堅者

大黃 四錢 芒硝 三錢 甘草 二錢 枳實 二錢

厚朴 二錢 若初起手指甲青兼之腹痛嘔吐身

如彼杖脉細沉無力謂之陰毒急用四逆湯温之

外灸關元氣海復其陽氣不効即死

麻附細辛湯 本經身發熱四肢冷指甲青腹痛脉

雖沉亦有可汗者此湯主治

麻黃 二錢 附子 三錢 細辛 一錢 甘草 五分

人參 二錢 黃連 一錢 芍藥 一錢 以其無頭疼故

名少陰似太陽假若身不發熱豈敢輕汗之

桂附湯 厥陰症。煩滿囊拳。讖語而渴者。當下之。三承氣湯。選用。口吐涎沫。小腹痛。不渴者。當此湯主之。

桂枝 一兩 附子 三錢 青皮 甘草

柴胡 各四錢 作三服 每服加姜三片

陶氏冲和湯 兩感傷寒。雖不治之症。然所稟有虛實。所感有淺深。若胎元稟得厚者。而所感得淺間。亦可生。如兩感陰陽未分。或陽先受病者。以此湯服之。

柴胡 乾葛 石膏 黑豆

生地 防風 白芷 川芎

細辛 羌活 甘草 黃芩

羌活湯 治兩感陰陽已分

羌活 一錢 獨活 防風 防已

黃芩 黃連 蒼朮 白朮

甘草 細辛 知母 川芎

生地 各一錢 煎服未解再服三四劑病愈則止。

又方。陰陽兩感。表裏未分。用後方主治。

麻黃

升麻

乾葛

芍藥

各二錢

甘草

五分

蘇葉

青皮

香附

白芷

川芎

陳皮

各等分

每服三錢加姜葱煎服痞滿加枳殼大抵兩感脈

從陽可治從陰難治

九味羌活湯

春分後感冒傷寒宜此湯主之

羌活

蒼朮

防風

各一錢半

甘草

白芷

川芎

生地

黃芩

各一錢

細辛

四分

姜三棗二水煎加葱白搗汁五匙入

藥再煎熱服覆取汗原有汗去蒼朮加白朮溫

服汗不止去細辛加黃芪再不止加桂枝芍藥

不作汗加蘇葉渴加知母石膏嘔逆加薑

汁有痰去生地加半夏肌熱加柴胡葛根

喘加杏仁虛煩加知母麥門冬竹茹胸膈飽

悶去生地加枳殼桔梗便秘加大黃中寒于

經絡加附子濕土司天倍蒼朮久雨加木瓜

蒼朮太陽症倍羌活加藁本陽明症加升麻

葛根少陽症加柴胡半夏太陰症加厚朴枳

實。少陰症。加桔梗。知母。黃栢。厥陰症。加柴胡。倍川芎。此方通治六經傷寒。無有不驗。乃四時傷寒之聖藥也。

回陽急救湯。治直中陰經。無熱惡寒。面慘。手足厥

冷。唇紫舌卷。瓜甲青黑。身重難于轉側。不渴臥多。踈足。大便泄利。小便青白。脉細沉微。

附子 乾薑 人參 甘草

白朮 肉桂 陳皮

嘔吐加半夏薑汁拌炒。腹痛甚加芍藥。木香。老薑汁。

利不止。加陳壁土炒升麻少許。口吐涎沫。加吳

茱萸鹽炒。無脉。加五味子。猪膽汁。戰慄。加附

子。麻黃。小腹絞痛。加青皮。吳茱萸水。一鍾半。棗

二生薑自然汁半盞煎。臨服入泥漿水澄清。一匙

溫服。

合病。

或二陽同病。或三陽同病。不傳者。太陽合陽明。

升麻葛根湯。陽明合少陽。小柴胡合升麻葛

根湯。或通用九味羌活湯。

併病

始初二陽合病後二陽氣盛一陽氣衰併歸一經獨重者陽明併太陽 麻黃湯合升麻葛根湯 少陽併太陽 麻黃湯合小柴胡湯 少陽併陽明 為木尅土難治 小柴胡合升麻葛根湯 或通用九味羌活湯 加味理中湯 治中寒即冬時直中真寒一身受邪難分經絡手足厥冷或腹痛嘔吐甚則卒倒昏迷不省人事脉遲無力

乾薑

人參

白朮

肉桂

甘草

半夏

陳皮

細辛

茯苓

煨薑五片煎熟再入薑汁半盞服其

腹內外仍用薑炒熱時時熨之 輕則依本方

重則加熟附子 身甚寒者加麻黃 挾氣加木

香 嘔吐涎沫加丁香 腹痛加木香砂仁 挾

食加草菓枳殼 瀉不止加升麻蒼朮 外灸關

元氣海再用蔥熨法

溫病

此病發于春間。經日發熱不惡寒。反渴者溫病也。分表裏治之。表症如天溫。升麻葛根湯。如天寒。柴胡桂枝湯。太陽合少陽。敗毒散合小柴胡湯。陽明合少陽。升麻葛根湯。合小柴胡湯。半表半裏。小柴胡湯。裏症大柴湯。重者一時表裏俱發。防風通聖散。表裏俱熱。大便自利者。柴胡黃芩湯。加木通山梔。竹葉石膏湯。治虛煩變雜症。表症已解。邪毒未除。

熱結在內。心胃煩滿。渴甚。飲水無度。

石膏 五分 人參 二錢 甘草 七分 麥門冬 一錢

淡竹葉 十四片 糯米 一撮 水煎入薑汁二匙

升麻葛根湯

葛根 升麻 芍藥 甘草

表熱加柴胡。內熱加黃芩。有吐衄血加生薑。

牡丹皮。熱甚加山梔黃連。或加連翹天花粉。

大便硬加枳實大黃。頭痛加川芎。身痛加羌活。

痞悶加枳殼桔梗。咳嗽加棗仁。痰加半夏。

發汗加玄參。如老人去芍藥。加柴胡人參。

羌活 獨活 柴胡 前胡

枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓

人參 甘草

皮膚瘡癢。加蟬蛻。口乾舌燥。加黃芩。去人參。加

防風。荆芥。名荆防敗毒散。

小柴胡湯。

柴胡 黃芩 人參 半夏

甘草 加薑棗

陶氏加陳皮芍藥。頭疼加川芎。胃中煩而不

嘔。去參夏。加瓜蒌仁。渴去半夏。加知母。天花粉。

腹痛。去黃芩。加芍藥。脇下痞悶。加牡蠣。枳實。

去棗。脇痛。加青皮。心胃悶。加枳殼。桔梗。不

効。加枳實。黃連。瓜蒌仁。去甘草。茯苓。心下悸。小

便不利。去黃芩。加茯苓。咳嗽。去參棗。生薑。加五

味子。炮乾薑。嘔。加薑汁。竹茹。虛煩。加竹葉。梗

米。鼻衄。加生地。茅花。痰盛。加瓜蒌仁。桔梗。枳

實。喘加桑白皮烏梅。熱盛錯語不眠加山梔。
黃連黃栢。少陽陽明合病口燥目疼加芍藥乾
葛。壞症加鱉甲。自汗惡熱讖語煩渴去半夏
合白虎湯。自汗惡風腹痛或寒多熱少脉弱去
黃芩合桂枝湯。血虛發夜熱合四物湯去川芎
加麥門冬知母黃栢。脉弦虛無力或浮散發熱
煩燥口渴不飲水此為虛熱去半夏黃芩合生脉
散。熱入血室小腹痛晝明夜昏妄見或寒熱不
定似瘧合四物湯加牡丹皮。男子加生地。婦

人加當歸紅花。瘥後發熱本方和之。脉浮加
蒼朮蘇葉。脉實加大黃枳實。寒熱似瘧而裏
未實者加桂以溫血。表熱而裏又燥渴糞硬者
加大黃以清血。如無耳聾脇痛只則身熱發渴
讖語大便實者加大黃。

大柴胡湯。

柴胡

黃芩

芍藥

枳殼

半夏

大黃

薑棗

昏亂讖語加黃連山梔。

痞滿加枳殼桔梗厚朴。

口燥渴。舌胎黃。加瓜蒌仁。夏月熱病煩燥。脉洪。大加知母。麥門冬。石膏。發斑。加生地。玄參。牡丹皮。發黃。加茵陳。黃柏。鼻衄。加犀角。大便不通。加芒硝。

防風通聖散

防風	川芎	當歸	芍藥
大黃	麻黃	薄荷	連翹
芒硝	石膏	黃芩	桔梗
滑石	甘草	荆芥	白朮

山梔 加薑三片

凡雜症。耳目口鼻。唇舌咽喉。風熱風痰等疾。外科癰疽瘡癤。小兒驚疳積熱。諸風無所不治。如自利。去芒硝。自汗。去麻黃。

清熱解毒湯 熱病發于夏。脉細小無力。足冷。如得汗而燥盛者。死。如下痢腹痛者。亦不治。

黃芩	知母	升麻	葛根
石膏	人參	白芍	羌活
黃連	生地	生甘草	薑三片

酒製 三分 酒製 五分 酒製 七分

胃痞悶加枳實半夏各一錢薑汁四五匙去生地
脾胃不實加白朮表症在太陽九味羌活
湯汗後煩渴脉洪大背惡寒者白虎加參湯
益元散裏症大柴胡湯重者一時盛發

雙解散或防風通聖散

白虎加參湯即化斑湯

石膏

知母

粳米

甘草

山梔

麥門冬

人參

五味子

天花粉

黃連

薑棗

烏梅

心煩加竹葉竹茹

小便短少加滑石

背惡寒

渴加茯苓去山梔

嘔加薑汁炒半夏

頭微疼

眼眶疼加葛根去山梔

益元散

一名六一散
一名天水散

滑石

六兩

甘草

一兩

為末每服三錢入蜜少許沸湯調服熱者冷水

調服傷寒熱不解加蒼朮末三錢蔥豉湯連進

數服汗出為度汗吐下後餘熱以此解之虛

煩不眠加辰砂少許一切風熱上壅咽喉不利

加青黛薄荷少許蜜丸嚙化。產後腹痛自痢用補脾補血藥下或加五靈脂能行血。止痢瀉甚加肉豆蔻少許。一切痰熱吐逆及胃熱驚癇顛狂加黃連少許薑汁蒸餅爲丸。

瘟疫

有瘟疫寒疫此天地不正之氣多感于房勞辛苦之人從口鼻而入當隨時令察運氣而施治不可大汗大下當從乎中。而用陽明少陽二經藥初看未見端的先以其敗毒散加薄荷治之看歸何經。

再隨經施治。見陽明經者用升麻葛根湯。見少陽症者用小柴胡加防風羌活。少陽陽明兼見者柴葛二湯合服。寒熱往來而大便泄者小柴胡合五苓。寒多去苓留桂。大便秘小柴胡加大黃。小便秘小柴胡合四苓。發黃再加茵陳。作渴小柴加石膏知母。發狂不識人大柴胡加當歸。如大便泄者三黃石膏湯。若入太陰經無熱症見者用理中湯此症必腹痛而瀉痛止仍用小柴胡。若入少陰厥陰經用陰症傷寒

傳經治之。如春夏染者。參看溫熱病二條。秋時染者。多身熱咳嗽。金沸草散。若渴。白虎湯加蒼朮。若熱畜發痘。茵陳五苓散。若痢疾。人參敗毒散。加陳倉米炒。倘燥太過。用潤燥散。冬時染者。多身熱頭疼咽乾。人參敗毒散。或甘桔湯加玄參。發斑者。陽毒升麻湯。通用加減調中湯。預防四時疫氣。用藿香正氣散。四時外感發熱。惡寒用香蘇散。四時感冒風寒。鼻塞頭疼痰涎。嘔逆用參蘇飲。又有大頭傷寒。天行時病初覺。

寒熱身痛。次則頭面紅腫。疔瘡甚則咽喉堵塞。害人最速。多發于冬溫之後。脈浮在表。用普濟消毒散。或荆防敗毒散。脈沉在裏。羌活黃連黃芩。俱酒炒。大黃酒蒸。鼠粘爲主。連兩目鼻面腫者。陽明也。加乾葛升麻石膏赤芍藥。發耳前併頭角少陽也。加柴胡瓜蒌仁。發腦後項下腫起。太陽也。加防風荆芥水煎時時呷。邪氣甚者。通大便。加芒硝。遇凶荒勞役。宜普濟消毒散。即普濟普濟消毒散。端治大頭傷寒。

黃芩

黃連

各一錢

鼠相子

藍板根

連翹

馬屁勃

各一錢

陳皮

生甘草

桔梗

玄參

柴胡

各一錢

升麻

僵蠶

各五分

人參

三錢

為末白湯調服。時時呷之。留一半蜜丸噙化。或加防風薄荷當歸川芎水煎服。大便硬加大黃。若非便秘忌用降下之劑。腫不消者。砭去血。可用通關散。倍羊躑躅及藜蘆少許。搗臭以洩其毒。久不愈。欲作膿者。內服托裏消毒散。

疎風清熱飲

風熱

治蝦蟆瘟。遍身如蝦蟆之皮。皆屬于

羌活

防風

荆芥

黃芩

甘草

各二錢

煎服

又方

側柏葉自然汁調蚯蚓泥敷之。

又方

丁香尖南星醋磨傅之。

三黃石膏湯

黃芩

黃連

黃柏

山梔

各二錢

麻黃

錢半自汗者去之

石膏

五錢

香豉

三錢

水煎加辰砂服。

又方 治時疫寒熱將黑豆二合炒香甘草二寸炙黃切碎。用水煎時時呷之。

理中湯

人參

白朮

乾薑

甘草

大便澀者用散利者用丸。寒甚腹痛四肢冷加附子。臍下動氣欲作奔豚去朮加肉桂。吐多去朮加半夏薑汁製。下多還用朮。悸加茯苓。渴倍白朮。腹痛裏虛倍人參。寒倍乾薑。

吐不止去甘草加薑汁。吐蛔去甘草加烏梅。餓逆加丁香柿蒂。噦逆加木香。瘧亂轉筋加石膏。寒濕發黃加茵陳。脾弱瀉不止溺不利倍參朮合五苓散。內虛腹痛合小建中湯。陶氏加肉桂。陳皮茯苓薑棗。臨服入陳壁土炒一匙。自利肚腹痛加木香磨薑汁。腹痛甚去白朮。或陰結症本方加大黃利之。

金沸草散

金沸草

荆芥

麻黃

甘草

赤芍

半夏

前胡

薑棗

潤燥湯

生地

山梔

升麻

柴胡

石膏

生薑

自汗加桂枝

無汗加蘇葉乾葛

虛煩加麥門

冬渴加天花粉

咳嗽加杏仁

陽毒升麻湯

升麻

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

加減調中湯

芍藥

茯苓

白朮

麥門冬

生地

陳皮

桔梗

烏梅

痰加貝母

熱甚加黃芩

藿香正氣散

此方治內傷脾胃外感風寒若病在

太陽頭疼發熱骨節痛不可用

藿香

紫蘇

白芷

大腹皮

茯苓

厚朴

白朮

陳皮

桔梗

半夏麩

甘草

薑棗

丹臺玉案

二卷 瘟疫

三

一方去白朮加香附米

香蘇散

香附

紫蘇

陳皮

甘草

蔥薑

頭目痛加川芎白芷

熱甚加柴胡

參蘇飲

人參

半夏

茯苓

陳皮

枳殼

桔梗

前胡

乾葛

甘草

紫蘇

後人去人參以川芎代人參柴胡代前胡各芎蘇

飲

若寒天氣促咳嗽加麻黃杏仁金沸草 若

溫天咳嗽加桑白皮杏仁 如有熱痰加黃芩瓜

蒺仁 周身骨節疼加羌活 婦人胎前產後加

川芎當歸芍藥

又秘方

人中黃五錢蒼朮羌活各三錢煎服立愈

小陷胃湯

胃膈迷悶乃邪熱結于上焦而生痰也

半夏

六錢

黃連

三錢

瓜蒌

一箇

連皮肉取四分之一作一服水二鍾先煮瓜蒌至

一鍾半下餘藥煎至一鍾溫服如未效再服口出

黃涎卽愈。

大陷胃湯 胃前脹悶煩滿不進飲食及渴多飲水有停飲在上行早之故名曰結胃。

大黃 五錢 芒硝 一兩八錢五分 甘遂 二錢五分

為末作二服水二鍾煎大黃至一鍾去渣入硝煎一沸入甘遂末溫服得快利止。

脚氣

惡寒發熱全類傷寒但新起脚膝軟弱赤腫為異耳此濕熱之所聚在肌膚流注于脚膝。

祛溫湯 治熱氣留于肌肉之中宜急治之少緩其

氣上行至心卽死。

蒼朮 黃柏 赤茯苓 牛膝

木瓜 木通 檳榔 甘草

黃連 烏藥 防已 各三錢

量輕重治之水煎空心服。

又方 敷紅腫處朴硝大黃寒水石牙皂為末以鷄子清調敷甚効。

又方 人中黃為末芭蕉水調傳甚妙。

食積

外症頭疼發熱惡寒全類傷寒惟身不痛心腹飽悶
噯噎嘔逆為異耳甚者用滾鹽湯調阜莢末五
分探吐復用加味平胃散頭痛身亦痛者謂之
夾食傷寒加味治中湯如表症多藿香正氣散

裏症多小承氣湯

加味平胃散

蒼朮

厚朴

陳皮

白朮

甘草八分

乾薑一錢

山查

神麴

草菓

各二錢

黃連

二錢

枳實

一錢

薑

臨服入木香磨汁調下

如腹痛加桃仁

便實去查麴菓薑加大黃

加味治中湯

陳皮

枳實

青皮

厚朴

白朮

八分

甘草

五分

蒼朮

一錢

乾薑

五分

草菓

砂仁

各一錢

熱甚去白朮加柴胡嘔吐加薑汁炒半夏

中飽悶去甘草白朮加枳實腹痛甚者加芍藥

大黃。去乾薑。白朮。

夾痰症

憎寒壯熱惡風自汗胃膈滿悶氣上攻冲頭不昏疼。

項不強者是也。

自熱者芎蘇飲金沸草散柴胡

半夏湯。

無熱者二陳湯温膽湯通用加味導痰

湯。

有痰結胃者鶴頂丹枳桔二陳湯。

有痰上

隱隱頭疼者瓜蒂散吐之。

加味二陳湯。

甘草 八分

半夏 一錢

茯苓 一錢

陳皮 一錢

五分

南星

枳實

黃芩

白朮

黃連

瓜蒌仁

桔梗

杏仁

山查

柴胡 少佐

貝母

金沸草

薑汁

竹瀝

年力壯盛者先吐去痰後

服此藥。

瓜蒂散。

瓜蒂

赤小豆

各五錢

為末鹽湯調服服後宜臥片時欲吐且耐之良久用指探之。

虛煩

外亦發熱有類傷寒。初症但頭身不痛。不惡寒。脉不緊數。但浮而無力。慎不可攻熱。去則寒生。

人參竹葉湯

石膏 五錢 人參 二錢 甘草 七分 麥門冬 一錢五分

淡竹葉 十四片 粳米 一撮 水煎入薑汁二匙服

如氣弱大渴。加倍人參。汗多加黃芪。痰加貝母。泄加白朮。澤瀉。陰虛夜煩。加知母。黃柏。生地芍藥。嘔吐去石膏。加陳皮。茯苓。

加減補中益氣湯 勞力傷寒。頭疼發熱。惡寒。但微

渴。自汗。身腿酸軟無力。此內傷氣血。外感風寒。故也。

人參 黃芪 當歸 生地

川芎 柴胡 陳皮 甘草

細辛 羌活 防風 白朮

薑棗蔥水煎溫服。

如元氣不足。加升麻少許。咳嗽加杏仁。汗不止。去細辛。加芍藥。胃中煩熱。加山梔。竹茹。乾

嘔。加薑汁炒半夏。胃中飽悶。去生地。甘草。黃芪。白朮。加枳殼。桔梗。痰盛。去防風。細辛。加瓜蒌仁。貝母。腹痛。去芪朮。加芍藥。乾薑。

蓄血症

外症寒熱往來。但脉孔濇。日輕夜重。蓄于上焦。則衄血。善忘。嗽水不嚥。胃脇腹皆滿痛。譫語昏憤。謂之血結。胃中用犀角地黃湯。蓄于中焦。則頭汗發渴。發黃。用桃仁承氣湯。蓄于下焦。則如狂。便黑。小腹急脹。按之則痛。用抵當湯丸。或用犀角地

黃丸。加青皮。大黃。通用。小柴胡。加桃仁。生地。兼梔子。茵陳。一切血症藥。此皆治法。不易傷寒。有用承氣。大下不解。反更兼善食者。瘀血也。所以打撲傷損症。亦類傷寒。

犀角地黃湯

犀角 牡丹皮 各一錢 白芍 一錢 生地 三錢

一方有當歸錢半。如表熱。加柴胡。黃芩。鼻衄。加山梔。內熱甚。加黃連。腹脹。或通瘀血未下。加桃仁。紅花。大黃。小腹急痛。加青皮。陶氏加

甘草。桔梗。陳皮。紅花。當歸。薑三片。臨服入藕節汁。

三匙調下。

紫雪 治發斑。讖語。蓄血。三陽症。煩燥。作狂。氣喘。

赤金 十兩 升麻 六錢 寒水石 石膏 各四兩 八錢

犀角 羚羊角 各二兩 玄參 一兩 沉香 六錢

木香 丁香 各五錢 甘草 八錢

右以水五升。以赤金同升麻先煮。至三升。去金。入諸藥。再煎。至一升。濾去滓。投朴硝三兩。二錢。微火煎熬。卽成紫雪。

桃仁承氣湯

大黃 四錢 桃仁 三錢 桂枝 芒硝 各二錢

甘草 一錢

右水煎。溫服。血盡為度。未盡再服。陶氏加枳殼。

青皮。當歸。芍藥。柴胡。薑三片。臨服入蘇木一錢。煎。

二沸熱服。

如傷寒犯內傷。食積蓄血。大便硬脹。不能言語。神思盡脫。兩目直視。手足僵仆。難以下藥者。將紫蘇煎湯。用手巾泡熱。絞乾。攤肚腹及小腹上。輕輕揉運。手巾。

漸冷卽換熱者。連連揉運待宿糞硬塊。或積血下。纔可用藥。如糞門結用蜜導法。

江南溪毒

江東江西諸源澗有蟲名曰短狐溪毒。又名射公。其蟲有翅能飛。有一長角橫在口前。如弩檐。臨其角端。如上弓。以氣爲矢。無日有耳能聽。在山源水中。聞人聲。使以氣毒射人。故謂之射公。此蟲畏鷺鷥能食之。此症似乎傷寒。寒熱往來。身不喜冷。筋急體強。目疼頭痛。張口呻吟。咳嗽呼吸悶亂。始終更不能言。朝輕

暮重。非其土人中之便。謂之傷寒。今說其狀。以明其症。與傷寒別矣。

螺螄疔

惡寒發熱。胃膈作悶。身發紅點。如蚊跡者。類乎傷寒。此點起之于手。沿至于心前。其人發狂。悶亂而斃。不知者。但以傷寒發斑治之。百無一生也。

治法

以三角針。刺其紅點之首尾處。出血。外用鑪鐵釘磨水。敷之內服犀角地黃湯立愈。方見前。

水漬法

陽毒漸深六脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻如烟煤

登布數重新水漬之稍揆去水搭於患人背上須臾蒸熱又以別浸冷布易之頻換熱稍退再進陽毒藥驗舌形瘡三十六種



舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱毒熾盛堅結大腸金受火制不能平木故也急用調胃承氣湯下之

白胎

方見前

大黃 芒硝 甘草 枳實 厚樸



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胃中有寒乃

少陽半表半裏之瘡宜小柴胡湯梔子豆豉湯治之

小柴胡湯 方見前 柴胡 半夏 黃芩 甘草 人參

梔子豆豉湯 方見後



丹臺玉案

二卷 驗法

舌見紅色。熱蓄於內也。宜用透頂清神散。

當歸

白芷

北細辛

猪牙皂角

右為末等分。和勻。令病人先嚥水一口。以藥少許吹入鼻內。吐去水。取嚏為度。如未嚏。仍用藥再吹。



舌見純紅。內有黑形如小舌者。乃邪熱結於裏也。君火熾盛。反兼水化。宜服涼隔散。大柴胡湯。

大柴胡湯

方見前

柴胡

黃芩

芍藥

半夏

枳實

涼隔散

方見後



舌見紅色。而有小黑色者。熱毒乘虛入胃。蓄熱則發癍矣。宜用升麻葛根湯。加玄參。化癍湯解之。

升麻葛根湯

方見前

化癍湯

方見前



丹臺玉案

二卷

診舌

三十二

舌見淡紅。中有大紅星者。乃少陰君火熱之盛也。所不勝者。假火熱以侮脾土。將欲發黃之候。宜茵陳五苓散治之。

茵陳五苓散 方見後

黑尖舌

淡紅

舌見紅色。尖見青黑者。水虛火實。腎熱所致。宜竹葉石膏湯治之。

竹葉石膏湯 方見前

石膏 人參 甘草 麥冬 皮竹叶 粳米

裏圈舌

淡紅 紅 黑

舌見淡紅色。而中有一紅暈。沿皆純黑。乃餘毒遺於心胞絡之間。與邪火鬱結。二火亢極。故有是症。以承氣湯下之。

承氣湯 方見前

人裂舌

純 人 人 人 紅

舌見紅色。更有裂紋。如人字形者。乃君火燔灼。熱毒

炎上故發裂也。宜服涼隔散。


涼隔散 方見後 生甘草 連翹 山梔 大黃 黃芩 薄荷 朴硝



舌見紅色更有深紅色癍點如蟲蝕之狀者乃熱毒

熾盛火在上水在下不能相濟故也宜小承氣湯下

小承氣湯 方見前



舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥於肝經肝主筋故

舌見如絲形宜理中湯四逆湯溫之

理中湯 方見前

四逆湯 方俱見前



舌見黑色水尅火明矣患此者百無一生治者審之



丹臺玉案

二卷 驗古

三十四

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

舌見尖白根黃。其表症未罷也。宜解表。然後方可攻之。如大便秘。用涼隔散。加硝黃泡服。小便澀者。用五苓散。加木通。合益元散。加薑汁少許。白滾湯調服。

涼隔散
五苓散 方俱見前



舌見茲白。心黑而脉沉微者。難治。脉浮滑者。可汗。沉實者可下。始病即發此色。乃危殆之芒也。速進調胃

承氣湯
調胃承氣湯 方見前



舌尖白胎二分。根黑一分。必有身痛惡寒。如飲水不至。甚者五苓散。自汗渴者白虎湯。下痢者解毒湯。此亦危症也。

白虎湯 方見前
解毒湯 方見後

丹臺玉案

二卷 乾言

三五

十
六
水
白胎
色

舌見白胎中有黑小點亂生者。尚有表症。其病來之
雖惡。宜涼隔散微表之。即退。速當下之。下用調胃承
氣湯。

調胃承氣湯 方見前

十
七
俱
灰
色

舌見如灰色。中間更有黑暈兩條。此熱乘腎與命門

也。宜急下之。服解毒湯。下三五次。遲則難治。如初服
量加大黃。

解毒湯 方見後

十
人
微
黃
色

舌見微黃色者。初病即得之。發譫語者。由於失汗。表
邪入裏也。必用汗下兼行之。以雙解散加解毒湯兩
停主之。

雙解散

丹臺玉案

二卷 卷之三

三六

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

解毒湯 方俱見後

舌 九 十
白胎 微黃

舌中見白胎外則微黃者必作瀉宜服解毒湯惡寒者五苓散

解毒湯

五苓散 方俱見後

舌 十 二
微黃

舌見微黃色者乃表症未罷宜用小柴胡湯合天水散主之可下者大柴胡湯下之表裏雙除臨證時當

審用之

大柴胡湯 方見前

舌 一 十 二
黃色 色本

舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已入胃宜急下之若下遲必變黑色為惡症為亢害鬼邪氣深也宜調胃承氣湯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

調胃承氣湯 方見前



舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加人參三錢服之

白虎湯 方見前



舌右白胎滑者病在肌肉為邪在半表半裏必往來

寒熱宜小柴胡湯和解之

小柴胡湯 方見前



舌左見白胎滑此臟結之症邪併入臟難治



舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之症兼有表者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下

丹臺玉案

二卷

卷二

三十八

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

益元散

方見前

五苓散

方見後



舌見黃色而有小黑點者邪遍六腑將入五臟急服

調胃承氣湯下之次進和解散

調胃承氣湯 方見前

和解散

藁本

桔梗

甘草

炙各五錢

蒼朮

三錢

陳皮

厚朴

薑炙各一錢

右水二鍾薑三片棗二枚煎七分去渣不拘時服

解毒湯

黃連

一兩

黃栢

五錢

黃芩

五錢

山梔

六錢

右每服五錢水一鍾半煎至一鍾熱服

五苓散

加茵陳卽茵陳五苓散

澤瀉

二錢五分

茯苓

猪苓

白朮

各一兩

肉桂

五錢

右每服六錢水二鍾煎至一鍾溫服

丹臺玉案

二卷

驗百

三十九

涼隔散

生甘草二錢 連翹四錢 山梔仁八錢 大黃二錢

黃芩 薄荷 各二錢

右作一劑水二鍾加淡竹葉二十片煎一鍾不拘時服以利為度

梔子豆豉湯

梔子二錢 淡豆豉五錢

右水二鍾煎七分去渣服

雙解散 加解毒湯

防風 川芎 當歸 白芍藥

大黃 麻黃 連翹 芒硝各五錢

石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩

甘草二兩 荆芥 白朮 山梔各五錢

右每服一兩水一鍾半薑三片煎八分去渣服

茵陳湯

茵陳五錢 大黃三錢 山梔仁二錢

右水一鍾半煎至一鍾去渣服

抵當湯

丹臺玉案

二卷

論

四十

大黃 三錢 水蛭 糯米炒七枚 蠱蟲 炒去翅足七枚
 右作一服水一鍾半煎一鍾去渣服
 十棗湯

芫花 醋浸炒 大戟 甘遂 煨各等分
 右每服二錢弱人減半水二鍾棗十枚煎八分去渣服

七十二舌
 黃色
 色白

見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼膈散

二服合進之脉弦者宜防風通聖散
 防風通聖散 方見前

二十八舌
 純黃

舌見黃而色有膈瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急宜大承氣湯下若身發黃者用茵陳湯下血用抵當湯水在脇內十棗湯結胃甚者人陷胃湯
 大承氣湯 茵陳湯 抵當湯
 十棗湯 大陷胃湯 五方俱見前

十二 微
九 黑灰色
舌 紅

舌見四邊微紅。中央灰黑色者。此由失下而致。用承氣湯下之。熱退可愈。必下三四次。方退五次下之。而不退者不治。

大承氣湯 方見前

三十 黃
舌 色

舌見黃而黑點亂生者。其症必渴。譫語。脈實者生。脈

清者。或循衣摸床者不治。若下之見黑糞亦不治。宜

大承氣湯

大承氣湯 方見前

三十一 黃
舌 色

舌見黃中黑至尖者。熱氣已深。兩感見之。十人九死。

惡寒甚者亦死。不惡寒而下利者可治。宜調胃承氣

湯主之。

調胃承氣湯 方見前

丹臺玉案

一卷

卷五

四十二



舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未盡用雙解散加解毒湯相半微汗之汗罷急下如結胃煩躁目直視者不治。


雙解散加解毒湯 方見前



舌見灰色尖黃而不惡寒者脉浮可下之若惡風惡

寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見糞黑不治。

雙解散加解毒湯 方見前



舌見灰黑色而有黑紋者脉實急以大承氣湯下之脉浮渴飲水者用涼膈散。

大承氣湯

涼膈散 方俱見前

三 微淡
五 黑紅
舌 黃

舌根微黑尖黃。脉滑者可下之。脉浮者當養陰退陽。若惡風寒者微汗之。用雙解散。若下利用解毒湯。十救七八也。

雙解散。

解毒湯 方俱見前

三 灰
六 色
舌 黃

舌根灰黑尖黃。隱見或有一紋者。脉實急用大承氣湯下之。脉浮渴飲水者。以涼隔散解之。十可救二三。

大承氣湯

涼隔散 方俱見前

已上三十六舌。乃傷寒驗證之捷要。臨症時當細心治之。百無一失耳。

灸少陰者

少陰吐痢手反不冷反食飲水脉不至

少陰即太谿穴也。太谿二穴在足內踝後跟骨上動脉陷中灸七壯。

灸關元穴。臟結成症不可攻宜此。

關元穴在臍下一寸是也。乃少陰任脉之會。

灸期門穴。婦人熱入血室。咳逆。打呃。

婦人屈乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小者以一指為率。陷中有動脉是穴。艾炷如小豆大灸五七壯。婦人熱入血室刺之下針。令病人吸五吸停針良久起

針。

附傷風

傷風之症乃風邪客于腠裏。灑淅惡寒。噴嚏呵欠。頭

疼發熱類于傷寒。但見風寒即怕亦不太甚者是也。

脉云

陽浮陰弱。大蓋肺部見浮者多以此為辨。

立方

加味香蘇飲。

川芎 紫蘇 羌活 防風

蒼朮 香附 甘草 荆芥

白芷 各三錢 葛根 前胡 各一錢

右加蔥頭十枚。生薑三片。煎服。以被覆取汗為度。

若以爲小疾而不治。日久則風入於肺。必成咳嗽。即費調理矣。凡感風邪。初起忌服茯苓。以其味淡。善于滲泄。有表症服之。則引邪入于陰經也。如當用補。或消痰。或消食。以香蘇飲爲主方。隨症加減。不得一一細贅矣。

中風門

附癩症

夫人似乎無恙而卒然中風者。豈一朝一夕之故哉。蓋內必先腐也。而後蟲生之。土必先潰也。而後水決之。木必先枯也。而後風摧之。夫物且然而況於人乎。

經曰。邪之所轉。其氣必虛。風豈能以自中乎。人亦人之自受乎風耳。使其內氣充足。精神完固。則榮衛調和。腠理緘密。雖有風將安入乎。惟其不戒暴怒。不節淫慾。或飢不暇於食。或寒不暇於衣。或嗜酒而好色。或勤勞而忘身。或當風而沐浴。或大汗而行房。或畏熱而露臥。或冒雨而奔馳。以致真元耗亡。氣血消盡。大經細絡。積虛彌年。平時無甚痛苦。而不知榮衛皆空。徒存軀殼。正猶無心之木。將折未折。無基之牆。欲頹未頹。其勢已不可支。而方且自謂無恙。遂迷而不

知戒。一旦爲賊風所襲。如劇寇操刃直入無人之境。勢若破竹。不移時而皆潰。則枯酒談笑之間。舉步轉移之頃。卒然顛仆。頓爲廢人。不亦重可駭哉。由是觀之。雖由外風之中。實因內氣之虛也。然人之一身。表裏上下。未必皆虛。惟積虛之處。氣多不貫。而勢有偏重。故一爲風所入。而肢體是乎廢矣。若以臟腑言之。則又各有形症焉。中臟者。多滯九竅。故有唇緩失音。鼻塞耳聾。目昏便秘之症。中腑者。多着四肢。故有半身不遂。手足不隨。左癱右瘓之形。又有中血脉者。則

外無六經之形症。內無便溺之阻澀。惟口眼歪斜。或左或右而已。而手足動靜起居。食息故無恙也。其或肢不能舉。口不能言。更無別症。乃中經也。比中臟腑則爲輕。比之中血脉猶爲重耳。然因其病而藥之。則中臟者宜下。中腑者宜汗。中經者宜補血以養筋。中血脉者宜養血以通氣。此皆可治之症也。而又有難易于其間。中臟爲難。而中腑次之。中經又次之。其或初中于血脉。藥之而愈。苟不守禁忌。必復中。而中必在于臟中。一次則虛。一次虛。一次則重。一次故中腑

雖可治也。由先中血脉與經而後及于腑。則難治矣。中臟本難治也。由先中腑而後及于臟。則不治矣。若中腑而兼中臟。與傷寒兩感者何異。其又可生耶。凡中風口開者為心絕。手撒者為脾絕。眼合者為肝絕。遺尿者為腎絕。聲如鼾睡者為肺絕。汗出如油者為元氣內絕。筋痛者為無血。髮直指而為頭上竅。面赤如粧而汗綴如珠。皆所不治之症也。其有一中即死者。何為而如此之急耶。蓋人之五臟以心為君心也。者所以主宰乎一身者也。五臟之中惟心最難死。故

人死氣絕。一身盡冷。而心頭獨熱者。以其難死故也。中臟之人不即死者。以四臟之氣雖絕。而心猶未絕也。一中其心。則梧酒未乾。片言未盡。而冤鬼先亾矣。縱有起死回生之藥。亦何所施乎。大法中風諸症。總屬風痰初中之時。不論在表在裏。必先以攻痰祛風為主。待其甦醒。然後審其經絡。分其氣血而治之。不可因其內氣之虛。而驟用補劑。蓋一中之間。道路以為痰阻絕。雖欲補之。孰從而補之。若其病的係太虛。口眼不喎斜。手足不偏廢。便溺不阻澀。但汗出不休。

眩運不定。四肢軟弱。氣息短促。方可用獨參湯。而猶必佐之以橘紅。加以薑汁。竹瀝。始可服也。若無監制。一時或可全愈。而痰邪不泄。當為患。他日或發癰疽。必無救藥者矣。

脉云

風之中人。六脉沉伏者多。但以人迎為主。訣云中風。口噤遲浮。舌急實大。數三菟。孤舉要云。中風脉浮滑。兼痰氣。其或沉滑。勿以風治。浮大者帶虛。浮緩者帶濕。浮緊者帶寒。其有微而數者。虛弱熱極也。

立方

通開利竅散 治中風不省人事。牙關緊閉。湯水難進。

麝香 一錢 半夏 三錢 青黛 八分 猪牙皂角 五錢

右為細末。用少許吹鼻。有嚏者生。無嚏不治。

仙授立刻回生丹

牛黃 真西者 兩 膽星 製過九次者 一兩 二錢 鉛霜 二錢

橘紅 廣皮去白 一兩 五錢 蛇含石 醋煨七次 五錢

麝香 三錢 枳實 用小者 炒一兩 沉香 忌火 兩

真金箔三十片

朱砂研極細三錢

取鉛霜法 用出山鉛十觔打寸許方牌以線穿懸之于大磁砵內下以燒酒六觔好醋二觔上另以一砵覆之外用鹽泥封固熬在鍋內熱水中五日取開掃下即成鉛霜矣

右各為極細末以竹瀝加老薑汁為丸分作七十二丸朱砂金箔為衣外加蠟封之每服一丸去蠟薑湯調下此丹乃異人秘授効驗通神真萬金不易之方予以濟衆心切不敢自私故爾錄之廣傳

治一切中風不拘臟腑中痰中氣不省人事垂危等症灌下一丸立醒并治一切急慢驚風辛未年秋橋李姚叔祥先生七旬有二忽然中倒不省人事便遺出痰壅上聲如鼾睡手指眼合先賢有言遺便者必不能治投下一丸少頃即醒至今甚健功效廣大救人甚溥不能一一槩錄

小續命湯 治卒暴中風不省人事痰涎壅盛半身不遂口眼歪斜手足顫搖言語蹇澀身體麻痺神昏目眩筋脉拘攣四肢不能屈伸者并療之

川芎

附子

童便製過 各八分

防風

官桂

黃芩

杏仁 去皮尖

甘草

防已

各二錢二分

人參

白芍

麻黃

去節各一錢

水二鍾煎八分。臨服加薑汁五茶匙。

烏藥順氣散

治一切風攻四肢骨節疼痛脚膝軟

弱婦人血風老人冷氣上攻胃腹脹痛吐瀉腸鳴

烏藥

陳皮

川芎 各二錢

殭蠶

白芷

麻黃

去節

枳殼

桔梗

各一錢

甘草

乾薑

炒黑各五分

水二鍾加薑三片。棗二枚煎八分。熱服。

排風湯

治風邪中入于臟狂言妄語精神錯亂手

足不仁痰氣上逆。

茯苓

獨活

川芎

當歸

杏仁

白芍

防風

甘草

各八分

肉桂

四分

白朮

麻黃

白鮮皮

各七分

水二鍾薑三片。臨服加竹瀝半酒鍾熱服。

愈風湯

治言語難肝腎虛筋骨弱及風熱體重四

肢偏枯半身不遂一切中風等症。

獨活

羌活

蟬殼

半夏

薑礬製

川芎

黃芩

酒炒各一錢二分

黃連

薑汁炒

白芍

酒炒

當歸

陳皮

刺楸

防風

各八分

生地

葳蕤

金沸草

僵蠶

貝母

茯苓

各一錢五分

膽星

八分

水二鍾薑五片棗二枚煎八分溫服。

稀涎散 治中風痰涎隔壅服此下痰。

明礬

一兩

肥皂角

四條

右共為細末每服五分溫水調下。

清神解語湯

治中風痰迷心竅不省人事舌強不能言語四肢不能舉動口眼喎斜半身不遂。

石菖蒲 南星 薑汁炒 黃連 薑汁炒 茯苓

麥門冬

去心 防風

陳皮

當歸

各一錢

白芍

生地

川芎

遠志

去骨

半夏

薑礬製

烏藥

枳實

羌活

甘草

各六分

水二鍾

生薑三片竹茹三分煎熟加童便竹瀝同

服。

保命金丹 治中風口眼喎斜手足躄拽言語蹇澀四肢不舉晨昏痰多。

貫仲 七錢 生地

大黃 各五錢 青黛

板藍根 各三錢 朱砂 蒲黃

薄荷 各二錢 珍珠 龍腦 各一錢五分

麝香 一錢 牛黃 三錢

右為細末煉蜜丸如雞豆大每日晨昏以清茶調化一九。

解語丸 治中風語言不正。

白附子 石菖蒲 遠志 各一兩 全蝎 三錢

羌活 明天麻 殭蠶 各五錢

右為細末蜜丸菜豆大每服三十九丸空心薑湯下。

正舌湯 治中風舌強難言。

明雄黃 荆芥 各等分

右為極細末每服二錢以豆酒調下。

稀菴丸 中風或初中或中過者并體胖之人宜久服甚妙。

稀蒼草。又名火欬草。五月五日。或六月六。九月九。採者甚効。去其花實。只留葉。刷去葉上毛。以酒蜜。拌入甌。蒸晒九次。焙乾為細末。煉蜜為丸。如梧子。大空心。以溫酒。或米湯下。六十九。服過千服。鬚髮。變黑。筋骨強健。飲食倍進。步履如飛。

類中風證

忽卒倒不語。但風必有斜歪。搐搦之症。為異。有因受氣而中者。脉沉身冷。無痰故也。用薑湯調蘇合香丸。灌之。至醒。隨其寒熱虛實調之。輕者用烏藥順氣散。

或曰。此氣暴逆而然。氣復即已。雖不藥而愈。然閉口。脉絕者。亦不治。

有因停食而厥者。必胃中滿悶。

有夏月卒倒。為暑風。此類中風。而實中暑者。

有因火者。內火外火。合而炎鑠。劉守真作將息失宜。

一水不勝二火也。

有因痰者。火氣激搏。痰塞碍心竅也。以上四者。皆

用鹽湯吐之。

防風至寶湯

南星 防風 天麻 陳皮

當歸 半夏各一錢 僵蠶一分 白芍

川芎 甘草 青皮 梔仁

烏藥 羌活 黃芩 黃連

麻黃 白芷 牛膝各八分

水二鍾。加薑五片煎服。忌食蒜。

附癇症

癇症一發卽顛仆。眼直口吐痰沫。其聲類畜。不省人事。少頃卽甦。此因驚風食而得之。其症有五。而似五

畜。以應五臟。原因或七情之鬱結。六淫之所感。或因大驚。神不守舍。亦有幼小受驚。以至痰迷于心竅。故也。

脉云

虛弦爲驚。浮洪爲陽癇。沉爲陰癇。浮散爲風癇。

立方

育神鎮心丸秘傳 治五種癇症。并顛狂驚恐。痰迷心

竅等證。

羚羊角 犀角各四錢 膽星製過丸次者

遠志去心 茯神去木 百子仁去油 石菖蒲

橘紅各八錢 礞石煨過六錢 大黃五錢 天麻煨過七錢

牛黃二錢 瓜蒌五錢 麝香一分 朱砂二分 真金箔三十張

右為細末。竹瀝同膽星打糊為丸。朱砂金箔為衣。每服空心薑湯送下一錢。

清心豁痰湯

石菖蒲去毛 麥門冬去心 茯苓去皮 枳實炒各一錢二分
遠志去心 天花粉 貝母去心 酸棗仁去油

玄參 黃連薑汁炒 橘紅各一錢 甘草稍四分

水二鍾。加薑五片。竹茹八分。煎一鍾。溫服。

癩風門

夫癩風者。卽大疥風也。又名曰癩。蓋緣感受天地肅殺之氣。古人謂之癩風。以其酷烈暴悍可畏。爾人得之。須分上下治之。看其疙瘩先見上體多者。病在上也。先見下體多者。病在下也。人之一身。總不外乎氣血。血隨氣以為之運化。氣所傷則為凝滯。氣滯則血必聚矣。血聚不行。則肉爛生蟲。鼻崩眉墮。此固理之

必然者。然風之入人。又有氣血之分。氣受之上身多。血受之下身多。上下俱多。氣血俱病也。凡治此症。必當審其從上從下治之。然所主不外乎陽明一經。蓋陽明主胃。無物不受。病之所感如此。非醫者神手。病者鐵心。罕有免于死焉。按法治之。惟宜絕厚味。斷酒色。戒勞碌。若不守此。雖或少愈。必至再舉。則無救藥矣。

脉云

浮洪者屬風熱。浮滑者屬風痰。沉遲無力。氣血俱虛。

難治。

立方

換肌散 治大痲風年深不愈。眉毛墮落。鼻梁坍塌。額顱腫破。此方神効。

白花蛇

三兩 烏梢蛇

三兩酒浸一宿

地龍

去土三兩

當歸

酒製

北細辛

白芷

各一兩

天麻

蔓荊子

葳靈仙

荆芥穗

甘菊

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

川芎

甘草

炙

沙苑蒺藜

天門冬

赤芍

何首烏

石菖蒲

九節佳

胡麻炒

草烏頭

蒼朮

米泔浸

木鱉子

去殼

定風草

各三兩

右同為細末。每服五錢。食後酒調服。

通天再造散

治大癱風初起。

鬱金一錢五分

大黃

一兩炮

白牽牛

六錢五分半生半炒

皂角刺

一兩黑大者去尖

右為末。每服五錢。日初出面東。以無灰酒調下。

祛癘神效丸

丟子肉

十五兩

防風

二兩半去蘆

白蒺藜

二兩半

荆芥

二兩半

銀柴胡

六兩

胡黃連

六兩

草胡麻

二兩半

當歸

二兩半酒浸

蕪荑

二兩半

木鱉子

十五兩去殼

薄荷

一兩

諸品藥味切要精製為丸。以酒為丸。每服五錢。日服三次。輕者五六升。重者一斗即愈。

若脾經受病。加白朮五兩。肺經受病。加黃芩五兩。

胃經受病。加厚朴五兩。肝經受病。加連翹五兩。

心經受病。加山梔仁。胡黃連各八兩。腎經受病。

加破故帑五兩。五臟受病加蒼朮四兩。甘草二兩。六腑受病加葳靈仙四兩。續斷四兩。何首烏八兩。春則氣暖融和加連翹一觔。夏則大旺煩燥加胡黃連八兩。薄荷八兩。秋則乍寒乍暖多生霧露加蒼朮八兩。白朮八兩。冬則嚴寒水凍加烏藥一觔。面生浮腫加白芷五兩。續斷八兩。遍身浮腫加蒼朮八兩。脚底腫加牛膝八兩。手蹇攣加葳靈仙八兩。骨節疼痛加虎骨一觔。凡遇是病依前法加減其驗如神。

消腫瀉毒湯

治面腫痛十日可瀉一次

苦參 三錢

白蒺藜

草胡麻

連翹

大黃

芒硝

各二錢

防風

丟子肉

羌活

獨活

各五分

牛膝

白芷

蒼朮

木瓜

各一錢

水二鍾煎八分空心服瀉三次以溫粥補之午後

再服丸藥

搽藥方 治遍身發斑

川椒

一兩五錢炒黑

枯礬

一兩五錢

水銀

三錢

松香 一兩 蛇床子 五錢 大楓子肉 一兩

苦參 一兩 五錢 硫黃 一兩 防風 三錢

右為細末菜油調搽

冰熊散 治脚底心爛

辰砂 一兩 冰片 二錢 熊膽 二錢

右為細末鷄子白調搽每日洗三次搽三次百日

全愈

癩門 附症

癩者逆也。陰陽氣不相接則厥。手足逆冷是也。其症

不一。散之方書者甚多。今姑撮大槩。有陽厥煩渴譫妄身熱。而其脉洪數也。有陰厥身冷脉沉。足踈臥唇口青。或自利不渴。小便色白也。然陽厥伏熱深而振慄。及見身冷脉微。欲絕而死者。陽極似陰。服熱藥即死。陰厥虛寒。甚而發燥。欲坐于泥水之中。此陰極似陽。服寒藥即死。不可不辨。外此又有暑厥。中暑耗氣發厥。脉虛自汗。有氣厥。因暴怒而得。即氣中也。與中風相似。風中身熱。氣中身冷。有痰厥。其脉洪滑。或咽中如拽鋸聲。有虵厥。胃中冷。吐出長蟲者。是有氣虛

厥脉細者是有血虛。厥脉大如蔥管者是有驚厥。因勞後後飲水被驚而發者是有尸厥。凡吊歿問疾或入廟登塚卒中外邪與臟氣相忤氣遏不行忽手足冷頭面青黑牙關緊急昏暈卒倒或錯言妄語決不可作風治。

脉云

厥逆之脉多於沉伏者。但沉遲散爲之寒。沉伏而數爲之熱。浮而無力者是氣虛。洪滑有力屬頑痰。沉滑身冷者難治。

立方

蘇合丸 凡厥瘖先以薑汁調服灌醒然後議脉辨瘖用藥。此方考治陰厥通治方也讀者知。

白木 土炒

青木香

朱砂 研水飛

犀角

沉香

麝香

訶梨勒皮 煨取

安息香 酒熬膏

丁香

白檀香

華撥

香附 以上各二兩

龍腦 五錢

薰陸香

酥合油 各一兩

右爲細末研勻和安息香膏加煉蜜丸如龍眼核

大。每服一九。

大承氣湯

治陽厥與陽極似陰。

方見傷寒門

四君子湯

治氣虛厥

白朮

土炒

白茯苓

去皮各一錢

人參 二錢

甘草

五分

水二鍾。加黑棗二枚。熟服。

四物湯

治血虛厥

當歸

白芍

川芎

懷生地

各二錢

水二鍾。加龍眼肉七枚。不拘時服。

加味理中湯

治虵厥

大附子

童便製一錢

乾薑

炒黑

甘草

檳榔

白朮

土炒

人參

各八分

肉桂

川椒

各六分

水二鍾。烏梅三箇。煎服。

逐痰湯

治寒痰發厥

廣橘紅

二錢

半夏

甘草

各一分

錢

大附子

川貝母

各一錢

水二鍾。加竹瀝薑汁煎服。

四逆湯

治陰厥與陰極似陽。

方見傷寒門

祛暑湯 治暑厥氣升不省人事。

香薷

厚朴薑汁炒

白扁豆

各一錢炒

沉香二錢

川黃連酒炒

陳皮

桔梗

各一錢二分

水二鍾加燈心三十莖煎七分服。

烏藥順氣散

治氣逆厥

方見中風門

鎮邪飲

治尸厥如神先以酥合丸灌醒再服此方。

紫朴

膽星

蒼朮

廣木香

橘紅

各一錢

甘草

辰砂

各三分

水二鍾加薑汁半盞酒一盞同煎服。

附瘧

以症不治者

第一由氣

第二由痰

第三由濕

第四由暑

第五由風

第六由毒

第七由勞

第八由憂

第九由思

第十由怒

其瘧與癩相似比癩為甚癩則身軟特醒瘧則身強

不醒甚有昏冒而遂亡者所因不同治法亦異因外

感者有剛柔二瘧太陽病發熱無汗而反惡寒白剛

柔身身過熱者瘧其症脚攣咬齒眼開甚則搖擗反張者是也

有汗

間被瘧來收不惡寒曰柔瘧其症四肢不收特或搖擗目是也

牙關因風瘧

忘者皆相因內虛者七情鬱悶或產後或金瘡或跌仆撲傷癰

欲厥汗出如

瀉潰濃之後一切去血過多無以養筋而卒急角弓

反張若用風藥反燥其血而致不救也有因虛受風

丹臺玉案

二卷

瘧

邪而挾痰火濕熱者。痰壅痰瘵不醒。或則手足搐搦。左右動搖。火則遍身戰掉。猶如火炎而旋轉也。熱則胃滿口噤。牙脚挛臥。不着床。大便閉。仍忌風寒。如大人脊下容側手。小兒容二指處。汗出如珠者。皆不治之症也。

脉云

脉按之築。然而弦直下直上。如雨濺散。出指外者立死。

立方

別症

葛根湯 治剛症。

乾葛 四錢 麻黃 三錢

桂枝 甘草

羌活 各二錢

薑三片 棗二枚 煎服。

桂附湯 治柔症。

官桂 大附子 防風 黃芩

川芎 防已 甘草 各一錢

生薑三片 煎熟熱服。

八味順氣散 治七情症。

丹臺玉案

二卷

卒四

七情症 依稀

到症心者汗 在汗心者汗 皆因於初成 而已

柔症

不吐者 若吐者 在初或後 亦也

血虛症

陳皮 青皮炒 白茯苓去皮 烏藥各一錢
 人參 白朮土炒 白芷各一錢 甘草三分
 水二鍾加黑棗二枚煎熟熱服
 益元湯 治去血過多症
 確有實效

氣痰症

當歸 生地 人參 黃耆各二錢
 川芎 白朮 丹皮各一錢
 水二鍾棗二枚煎服
 祛風逐痰湯 治痰症挾風
 半夏麩 枳實炒 橘紅各一錢

火症

此痰症之由也
 所以宜早治之
 生大酒門而
 外清其熱
 等分大酒

桔梗炒 膽南星 明天麻濕紙包煨
 防風 薄荷各一錢 全蝎七枚洗淨
 水二鍾加竹瀝半酒椀煎十茶匙
 抑火湯 治火症
 此神抑火白公白公天未去死是

川黃連酒炒 當歸酒洗 白芍酒炒 黃芩酒炒
 黃栢炒各二錢 知母鹽水炒 枳殼麩炒
 甘草 玄明粉各一錢
 水二鍾加燈心三十莖童便半酒椀
 麻木門 附脫陽

人皆以麻木爲一病而不知麻與木固自有不同也。所謂麻者非癢非痛肌肉之內如千萬小蟲亂行雜沸按之不止搔之愈甚者是也。所謂木者非癢非痛自己之肌肉如他人之肌肉按之不知搔之不覺者是也。麻如未之亂故名曰麻木。如木之厚故名曰木。麻猶知痛癢而木則全無覺矣。然求其病之所屬將何以斷之。蓋麻有久暫。木有久暫。暫時之麻者或因坐臥不得其所。四體相壓阻節榮衛血行既遲而氣亦未至故也。然麻或太甚亦有似于木焉。暫時之木

者亦因坐臥不得其所。四體重壓又着寒氣一時不曾護持而榮衛不相聯屬。血已不行而氣久不至故也。然木或還醒亦有似于麻焉。此其暫時之麻木。雖因氣血不足而有未足爲病。惟久麻久木者斯爲病耳。蓋經年累月無一日而不麻者。麻之久者也。麻之久者非坐臥不穩所致。必其內氣虛甚。風痰轉爲患。不能作麻。以其挾于風邪。痰爲風之所噓。如風吹波浪自騰沸而去。肌肉之中已爲風痰所據。陰陽二氣失其運行之柄。安得而不麻乎。經年累月無一日而

不木者。木之久者也。亦非坐臥不穩所致。乃是死血凝滯于內外。挾風寒。又因陽氣虛敗。不能運動。而肉已死。若與我不相干。此其所以木也。人之一身。皆氣血所養。氣血行遲。即能成病。況其不行乎。此久麻久木。所以可畏也。然麻木之處。小猶可治之。若半體一肢。甚難救療。醫者知此。則人之死。生病之輕重。了然于胸中。而用藥之妙。尤在善處。其可以執法乎。使暫麻暫木。而用重劑。則損其真元。久麻久木。而用輕劑。則不能取效。審而治之。可也。

脉云

脉浮而濡。屬氣血虛。脉浮而緩。屬濕。脉浮而緊。屬寒。脉瀉而芤。屬死血。脉緊而滑。屬濕痰。

立方

人參調元湯 治一身麻木。四肢倦怠。

人參 沙參 黃耆 甘草 各二錢 五分

肉苁蓉 白芍 川芎 北五味 各一錢 二十粒

水煎溫服。

舒氣活絡丸 治男婦七情所感。氣血不行。手足頑

麻。

當歸

酒洗

白芍

酒炒

沉香

忌見火

香附

醋製各二兩

桂枝

八錢

川芎

牛膝

烏藥

蒼朮

炒

薏苡仁

炒

生地

忌鐵器

柴胡

丹皮

炒

桑寄生

各二兩五錢

甘草

防已

茯神

各一兩

大附子

一箇童便黃連製

右爲末老薑四兩搗汁加水法爲丸每服空心服三錢白滾湯下

大法麻木之屬雖有風痰瘀血之分然治療之藥皆

當以熱藥爲引導如生薑附子官桂川烏之類以引經藥引至各經如手臂用桑條股足用牛膝威靈仙之類以行氣藥通其氣如烏藥木香枳殼青皮之類以通竅藥開其經絡如木通穿山甲牙皂之類有痰則去痰有風則去風有血則行血此其總綱也久麻者皆氣虛爲風痰所轉也然係氣虛亦不暇補其氣先補其氣則風無能而自散痰無能而自去矣宜以生薑爲引導枳殼以開氣半夏南星以逐痰防風羌活荆芥以散風牙皂木通以通經絡手臂用桑

條。肢足用牛膝以引經。待其病減。然後用參耆。白朮。茯苓。甘草之類可也。

久木者皆陽氣不運。或血滯凝。外挾風寒所致也。宜以附子。官桂之類。以爲引導。木香之類。以開其氣。川山甲。木通。牙皂之類。以通經絡。當歸。桃仁。蓬朮。紅花。阿魏之類。以消其血。因其病之所在。以引經藥引之。加桑條。牛膝之類。待其病減。以八物湯補其血可也。背上麻木。以羌活爲引經。胷前麻木。以桔梗爲引經。風用風藥。痰用痰藥。皆以開氣爲主。而此三處。惟以

生薑爲引導。而附子之類。不必用也。

遍身肌膚大麻癢。淫淫然如蟲行者。風也。宜以殭蠶爲君。羌活防風爲佐。烏藥以勻氣。木通以開經。生薑爲引導。蓋木通能行十二經絡。烏藥能勻一身之氣。生薑能開一身之腠理。羌活防風能去一身之風。而殭蠶一味。專治如蟲行者之聖藥也。至於加減輕重之間。則存乎其人耳。而豈吾之所能備述者乎。

附脫陽

大吐大瀉。或房慾過度。大耗真元。陽氣旣去。陰血不

能固守亦隨而脫去也。如丈夫交媾過度脫在婦人身上須婦人緊緊抱住用氣嚙入口內少頃自省若就放開必死。

回陽湯

大附子三錢 人參二錢 白朮 乾薑各一錢

廣木香一錢五分

木煎熱服

蒸臍法

蔥葉一大把以線紮緊兩面切平半寸厚內用麝

香三分摻入蔥內外加艾圓灸之以蒸熱氣入腹神妙。

熨氣海穴 在臍下

食鹽一觔炒熱先熨氣海再服回陽湯

中暑門 附注夏

暑者夏月炎蒸之氣也丙丁當權祝融用事炎威酷烈鑠石流金柔脆之軀不堪燔炙而中暑之病有不免矣病之初起身熱自汗口渴面垢而已其餘雜症皆後傳變然昔人有中暑之分豈暑之外別有

所謂熱耶。蓋暑與熱本無所異。而人感之則有異耳。富貴之人避暑於涼亭水閣之中。脩竹遶欄而成蔭。清泉漱玉而生寒。偃篔以取涼。揮羽扇以祛熱。浮瓜沉李以消渴。鮮菱脆藕以解煩。自謂可以無暑矣。不知富貴必生驕奢。驕奢必生淫慾。元氣日消。肌裏必疎。坐談之頃。卒然爲暑風所傷。邪氣直入。霎時昏曠。迷不知人。此所謂靜而得之爲中暑是也。貧窮勞苦之人。竭力於畎畝。而汗血成漿。驅馳於道途。而咽喉似炙。赤日方爲魑。而清風不來。熱地已成爐。而寒泉

竟精神疲而欲絕。筋力困而不知。卒然傾仆不省人事。此所謂動而得之爲中暑是也。然暑初入自口。鼻牙頰達於心胞絡。以火從火。故古法當暑取冷水灌漑。勿嚥入肝。則眩暈頑麻。入脾則昏睡不覺。入肺則喘咳痿躄。入腎則消渴中暑歸心。神昏卒倒。此症之重者。緩則爲傷淺。急則爲冒深。又爲伏暑。又何以辨之。蓋傷暑在肉。分周身煩燥。或如針刺。或有赤腫。蓋天氣浮於地表。故人氣亦浮於肌表也。冒暑或腹瀉水瀉者。胃與大腸受之。惡心者。胃口有痰飲也。伏

暑即胃暑久而藏伏三焦腸胃之悶熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿癉痢煩渴腹痛下血等症但暑氣病多不身痛間有痛者或為熱浴水濕相搏耳又有暑風厥手足搐搦為風手足逆冷為厥治此病者當視其所處貧富所為勞逸所稟虛實所感輕重而斟酌用藥斯得之矣。

脉云

經曰脉虛身熱得之傷暑舉要曰熱傷於氣所以脉虛眩洪花遲體狀無餘

立方

祛暑神秘丹 治夏月中暑率倒不省人事一丸立愈。

青蒿

淨末 一觔

白梅

烏梅

生薑

各四兩

生薑皮

一兩 沙糖 十兩

右為末。共搗為丸。如龍眼肉大。每服一丸。井水調下。

解急方法 中熱在路昏迷不知人事湯藥不便恐氣脫難治急扶陰涼處不可臥濕冷地搦道上熱

土於臍上撥開作竅。令人尿於其中。急求生薑。或蒜嚼爛。以熱湯或童便灌下。外用布蘸熱湯慰氣。海立醒。醒後切勿飲冷水。飲之即死。

香薷飲 治臍臍冷熱不調。飲食不節。元氣久虧。好食生冷。或臥濕地。當風取涼。中暑等症。

香薷 五錢 厚朴 二錢 薑汁炒

白扁豆 一錢 五分炒

右為一劑。水煎候冷。不拘時服。中暑復傷風。搗不省人事。加黃連。羌活。伏暑頭痛。小便澀濁。加茵陳。車前子。霍亂吐利。加藿香。木瓜。生薑。

臍臍積熱便血。加枳殼。黃連。赤芍。烏梅。小便有血。加藿麥。小薊。車前子。壯熱大渴。或五心煩熱。加麥門冬。淡竹葉。茅根。燈草。脚氣作痛。行步艱難。加木瓜。羌活。陳皮。蒼朮。枳殼。半夏。中風加防風。羌活。手足搐搦。加羌活。白芷。挾痰。加南星。半夏。腹痛。小便赤。加枳殼。木通。甘草。單只腹痛。加黃連。枳殼。赤芍。莪朮。

清暑益氣湯 治夏月暑熱。蒸人。不思飲食。四肢乏力。神思困倦。小便赤澀。大便作瀉。時時作渴。胃膈。

飽悶

人參 白朮土炒 黃耆各一錢

北五味二十粒 當歸 麥門冬去心

甘草 乾葛 青皮炒 神麴炒

澤瀉各一錢 黃栢酒炒 陳皮

蒼朮 升麻各八分

水二鍾煎七分溫服

生脉散 夏月以此代茶能生津液益氣和申

人參一錢 麥門冬二錢 北五味二十粒

煎當茶飲之

清暑十全湯 治傷暑頭目昏重潮熱煩悶多渴嘔

吐身體倦怠并一切伏暑暑瘧神効

香薷 木瓜 蘇葉 厚朴各一錢

人參 甘草 白茯苓 白朮

白扁豆 半夏 白芍各一錢

水二鍾煎七分不拘時服

清暑六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔

吐泄瀉寒熱往來痰喘咳嗽肢體浮腫嗜臥昏倦

小便赤色。并胃暑中酒。

人參

杏仁

去皮

厚朴

薑汁炒

白茯苓

去皮各一錢

香薷

白扁豆

炒

砂仁

炒

半夏

薑汁製

藿香

各一錢五分

甘草

木瓜

各八分

加薑三片。棗二枚。煎七分。熱服。

桂苓甘露飲。治伏暑飲水過多。肚腹膨脹。霍亂吐

瀉。

澤瀉

猪苓

各一錢二分

寒水石

二錢

桂枝

八分

蒼朮

滑石

甘草

各一錢

水煎溫服。

消毒飲。治暑毒入內。心中煩燥。睡臥不寧。精神恍

惚。

香薷

川黃連

遠志肉

各一錢

石膏

麥門冬

各一錢二分

北五味

二十粒

生甘草

茯神

各八分

水二鍾。加燈心三十莖。煎服。

辰砂益元散。治中暑身熱。小便不利。睡不安穩。此

藥清心火。除胃腕熱。

滑石 六兩 飛淨 甘草 一兩 去皮 淨

辰砂 一兩 研極細

右共為細末。每二錢。燈心湯調下。

冷香飲子 治虛人中暑。煩渴身倦。燥甚。服涼藥不

効者。

大附子 二錢 橘紅 一錢五分 甘草

草果 各一錢

水三鍾。加薑五片。煎八分。熱服。

辰砂五苓散 治中暑。煩渴。身熱。頭疼。霍亂吐瀉。小

便短少。心神恍惚。

白茯苓 去澤瀉 去毛 猪苓 各二錢 白朮 一錢二分 土炒

官桂 一錢 辰砂 八分 極細

水二鍾。加燈心三十莖。煎服。

附注夏

每遇春末夏初。便覺頭疼脚酸。神思困倦。飲食減少。

四肢消瘦。軟弱乏力。

補中固元湯 治注夏一切等症。

人參 黃耆 白朮 甘草 各一錢

生地 二錢 當歸 陳皮 各八分

棗二枚。煎八分。臨臥服。

又方 治汗不時出發熱惡寒四肢無力作渴。

石膏二錢 煨熟 知母鹽水炒 人參 甘草

陳皮 玄參各一錢 五分

加浮小麥八分煎服。

中濕門 附痿症

濕者天地鬱蒸之氣也。方其升騰於上，氣猶籠結而未開，雖寒天值之，亦覺其溫煖。此濕氣之熱者也。及其布護於下，氣將流演而舒散，雖暑月值之，亦覺其清涼。此濕氣之寒者也。濕氣之熱者多中於氣虛之

人則發而為濕熱之症，頭面如裹而四肢浮腫，身體沉重而轉側不便者是也。濕氣之寒者多中於血虛之人，則發而為寒濕之症，四肢酸疼而關節不利，筋脉拘攣而行履重滯者是也。其有不因鬱蒸之氣而得者，必其冒雨而行，涉水而走，或露臥以取涼，或汗衣而不解，漸漬於肌肉之中，滲入於骨髓之內，流溢於脾胃之間，牢纏於腰腎之處，則肌內冷而骨髓痛，脾胃薄而腰腎疼，挾於風痰則麻而不仁，兼乎瘀血則木而不覺，動乎火邪則腫痛而難忍，隨其所感而

病斯痼焉。其有不因冒雨涉水等而得者。必其內傷
生冷酒麵之類。多肚腹腫脹。醫者審其濕之。或寒或
熱。或虛或壯。病之在上在下。感之在外在內。因其病
而藥之。庶乎其得之矣。

脉云

中濕之脉。沉緩微細。兼風者浮。兼寒者澹。兼熱者滑。
數兼痛者洪。而浮緩濕在表。浮而緩濕在裏。沉而微。
立方

滲濕湯 治濕傷脾胃下部虛腫大便泄瀉小便不

利

丁香

蒼朮

白朮

薑黃

茯苓

甘草

陳皮

各等分

棗二枚。薑三片。煎八分服。

清燥湯 治六七月之間。濕令大行。于能令母實致
寒涼以救之。燥金受濕熱之邪。絕寒水生之之源。
源絕則腎虧。腰下痿軟。癱瘓不能舉動。行步不正。
此方主之。

茯苓

去皮

蒼朮

未泔浸炒

澤瀉

猪苓

人參各一錢神麴炒

當歸 黃耆蜜炙

橘紅各八分升麻

黃柏酒炒柴胡

白朮土炒甘草

生地 麥門冬各七分去心

北五味九粒

棗二枚煎八分服。

腎著湯 治腎傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便

自利。

雲朮 茯苓各二錢乾薑一錢五分甘草五分

棗二枚煎七分熱服

防已黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚四肢少力

防已二錢五分白朮 黃耆各二錢甘草八分

薑三片棗二枚煎七分服。

獨活寄生湯 治腎氣虛弱坐臥濕地或當風取涼

風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛行步艱難并治白虎歷節風。

白芍酒炒獨活 當歸各一兩桑寄生二兩

熟地酒煮人參 川芎 茯苓去皮

杜仲鹽水炒秦艽各五錢防風 牛膝

細辛

桂心各四錢 甘草一錢

右到一劑加生薑煎熟作數次服

栝木四製丸 滋陰抑火開胃進食能除周身之濕

川黃栝

去皮四觔 酥炙一觔 人乳浸一觔 童便浸一觔 鹽水浸一觔

茅山蒼朮

括去皮二觔 川椒炒八兩 破故紙炒八兩 五味子炒八兩 當歸炒八兩

揀去同炒之藥只用蒼朮黃栝為末煉蜜為丸如

梧子大每服五十九空心酒下

生附湯 治濕溜下部兩足無力步履艱難腰膝疼

痛等症。

大附子

蒼朮

香附

白朮

各一錢

甘草三分

乾薑五分

杜仲

牛膝

茯苓

厚朴

各八分

薑三片棗二枚煎八分服

當歸拈痛散

治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重流

注足脛痛不可忍。者口乾壯熱兩足濕毒瘡痛癢

當歸

防風

黃耆

各一錢

甘草

五分

黃栝

玄參

人參

茯苓

丹臺玉案

十

白朮

蒼朮

各八分

乾葛

升麻

知母

茵陳

羌活

各六分

水二鍾煎八分服

清熱瀉濕湯

治濕攻注四肢周身發腫面色痿黃

小便不利

茯苓

黃連

車前子

各一錢二分

木通

猪苓

滑石

蒼朮

各一錢

石葦

山藥

黃栢

各八分

燈心三十莖煎八分空心服

附痿症

因肌軟弱。身體重滯。經年不能起床。而飲食如故。不痛不酸。有似乎濕。而實非濕。乃肺經受熱。其葉焦垂。不能統攝一身之氣。故成痿疾。

脉云

舉要曰。人脉虛弱。緩澹而緊。洪大者不治。

立方

閏肺扶氣湯

治痿症肺枯氣弱

茯苓

人參

白朮

甘草

丹臺玉案

二二

八二

麥門冬

黃芩 各一錢

桔梗

百合

薏苡仁

各八分

北五味

九當歸

生地

各一錢二分

水煎加藕汁半鍾食後服。

又方

治火灸肺枯不能統攝。

山梔仁

炒黑

瓜蒌仁

去油

當歸

酒洗

生地

百部

各一錢五分

紫河車

二錢

天門冬

去心

陳皮

桔梗

蜜炒

人參

沙參

各一錢

棗二枚燈心三十莖食後服。

丹臺玉案二卷終



丹臺玉案卷之三

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著

崑峨縣令友生游士進旂揚父較正

常山縣庠盟弟徐待問洪鍾父

全閱

雲間盟弟何遠履方父

瘧疾門

夫瘧者殘虐之意也。從病從虐。故名曰瘧。是病者多發於秋。因夏傷於暑。故至秋而發也。有先寒後熱。先熱後寒。單寒無熱。單熱無寒。大寒大熱。

六之



異。分而言之。先寒後熱者。先得於寒。先熱後寒者。先得於熱。又云。先熱者爲血虛。先寒者爲氣虛。單寒無熱者。內傷必重。單熱無寒者。內病必多。大寒大熱者。邪必深微。寒微熱者。邪必淺。又有久寒久熱。經年累月而不愈者。必其不守禁忌。兼以元氣虛弱故也。合而言之。不專於外傷。客邪亦平日飲酒不節。及七情六慾所傷。兼之以脾裏痰而不散。與內之飲食外之暑氣相結。交固流聚於少陽之分。少陽位人身之中。爲陰陽往來必由之路。又在半表半裏之間。陰血流

過其處。激而發熱。或陰陽交會。則寒熱交作。久而不愈。則結成瘧。母藏於膈下。膈下者。少陽之分也。治此病者。以引經藥。引至少陽之分。而以消食化痰。疎風調氣之劑。量其輕重而投之。無不應矣。然同一瘧也。有一日之發。間日一發。有三日一發者。何也。蓋病之所由來者。有遠近也。冬傷於寒。不卽病。直至明年秋。而後發者。則三日一發之瘧也。三日一發者。受病或一年間。日一發。受病或半年。一日一發。受病或三月。每以得病之遠近。爲所發之日期也。醫者以心度之。

見其三日一發。則知其得於寒。當以辛溫之藥散之。見其間日一發。則知其得於暑。當以清暑之藥治之。然又必見其症有相合者。方可接也。如浙西但初發瘧疾者。皆言謂之胎瘧。蓋莫敢服藥。若瘧疾始初。不去疎表。邪何能自散。而愈發愈盛矣。及至延之日久。氣血兩虛。肝邪日旺。脾經受尅。以至四肢消瘦。飲食少進。面黃膚腫。纔議用藥。如體厚者。還可救療。體弱者。竟無救矣。既然有胎瘧。亦該有胎傷寒。胎痢疾之說。何獨瘧疾有胎。而他疾無胎乎。此言大謬之甚。如

此說明。後人諒不再朦蔽。以至誤人之性命者耳。然不拘初發再發。但有食則消食。有痰則化痰。有風則散風。有寒則攻寒。有熱則驅熱。有氣則開氣。新病則去其病。久病則補其元。神而明之。則存乎人也。

脉云

瘧脉自弦。弦遲多寒。弦數多熱。代散則死。弦短者傷食。弦滑者多痰。弦如刀。刀者死。弦小者生。

立方

清脾飲。治脾瘧。脉來弦數。或熱多寒少。口苦咽乾。

小便赤澀。

茯苓 去皮

青皮 醋炒 厚朴 薑製

草菓 去皮

半夏 各六分 薑製

白木 土炒 黃芩 酒炒

柴胡 各一錢 二分

甘草 四分

水二鍾薑三片棗二枚煎七分空心服。

桂枝芍藥湯

治瘧大作戰動陽盛陰虛此太陽陽

明合病也。

桂枝 一錢五分 黃耆

知母 芍藥

石膏 各三分

才二鍾薑五片熱服。

四獸飲

治五臟氣虛陽明偏勝結聚澀飲與胃經

相傳者

白木 人參 各一錢 甘草 茯苓

半夏 各八分 陳皮 一錢二分 烏梅 二箇

水二鍾薑三片棗二枚空心服。

七寶飲

治一切瘧疾無論寒熱多少及山嵐障氣。

青皮 陳皮 厚朴 甘草 各一錢 二分

草菓 檳榔 常山 各一錢

水酒各一鍾。清晨服。

驚甲飲子。治瘡久不愈。脇下痞滿。腹中結塊。名曰瘡母。

川芎

黃耆

白朮

驚甲 各一錢五分

草菓

橘紅

甘草

白芍

檳榔

厚朴 各八分 烏梅 二箇

水二鍾。棗二枚。食遠服。

秘驗方。治瘡疾久遠不愈。一服止。

人參 三錢

知母

白朮

柴胡

藿香

各一錢 六分

常山

一錢 烏梅 七箇

何首烏

一錢 四分

水二鍾。薑三片。煎八分。露一宿。空心服。

神妙丸

治瘡母積塊。作痛發熱。

真沉香

一兩 阿魏

檳榔

穿山甲

雲朮

各一兩 五錢

硃砂

雄黃 各八錢

右共為細末。醋和為丸。如梧桐子大。每服六十九。

空心薑湯下。

參苓養胃湯

治瘡多寒。少熱。脾胃虛弱。飲食不進。

丹臺玉案

三卷 瘡疾

五

茯苓

人參 各一錢

蒼朮

半夏

陳皮

草蓰

藿香

厚朴 各八分

甘草 四分 烏梅 一箇

水二鍾棗二枚煎七分另以老薑二兩取汁和勻

露一宿空心服

祛癰飲

治癰經歲月不愈者諸藥不効方可服之

白朮

蒼朮

青皮

陳皮

草蓰 各一錢二分

厚朴

檳榔

茯苓

甘草

良薑

半夏 各一錢

人參 三錢 烏梅 三箇

水二鍾加薑五片空心服

柴苓扶元湯

治癰疾陰陽不和元氣虛弱寒熱漸

盛

柴胡

黃芩

人參 各一錢五分

猪苓

澤瀉

白朮

青皮 各一錢

何首烏 二錢 茯苓

肉桂 各八分

水二鍾棗二枚食遠服

加味補中益氣湯

治平素不足兼勞碌內傷感寒

丹臺玉案

三卷

六

受暑以致瘧疾

黃菁

白朮

黃芩

人參

柴胡

各一錢

半夏

陳皮

各八分

升麻

三分

白芍

當歸

各一錢二分

甘草

五分

水二鍾薑三片棗二枚空心服

七棗湯

治瘧疾但寒無熱

附子

一箇以鹽水浸泡七次去皮臍

分為二服水二鍾棗七枚薑七片

空心服

二陳湯

以此湯為主照各經病症加藥錄後

茯苓

一錢

甘草

六分

陳皮

半夏

各二錢五分

太陽經瘧必腰背頭項俱痛加藁本防風羌活

少陽經瘧必口苦嘔吐惡心脇痛加柴胡黃芩青皮

少陰經瘧發于子午卯酉四正之日舌乾口燥嘔吐

欲閉戶牖加芍歸黃連黃柏或小柴胡半夏

厥陰經瘧發於寅申巳亥四旁之日小腹痛引入陰

作淋加桂枝薑附重者四物加玄胡金鈴子附子

太陰經瘧發於辰戌丑未之日腹滿自利善嘔嘔已

乃衰。加蒼白朮。柴胡。此三味。瘧家必用。以上三陰血分受病。發在處暑後者。俱謂之痰瘧。寒重者理中湯。方見傷寒門

痢疾門

古無痢疾之名。惟日滯下。今從病從利。故名之日痢。然其為症。豈一朝一夕之故哉。蓋因平素飲食不節。油膩生冷恣食無忌。或飢飽不時。或冷熱不擇。停蓄於中。久而不化。又或外感暑濕。內傷七情。行房於既醉之餘。努力於過飽之後。所積之物。煨煉稠粘。有赤

白相雜。與純黃之異。不見其糞。而惟見其積者。蓋積氣血而變成也。傷於血則變為赤。傷於氣則變為白。氣血俱傷。則赤白兼黃。則脾家亦傷。而純於赤白者。亦未必非傷脾之所致也。使其無赤白。而其色純黃。則專傷脾土。而氣與血。猶未甚動焉。至若下痢如黑塵之色。及屋漏水者。皆不治之症。而噤口者。亦多以其無胃氣。而邪熱獨結於上也。大法初起。當先推蕩。而後調理。病久則帶補。帶收。切不可驟用澀藥。初痢一澀。積蓄不去。多致死亡。又不可因久利之人。氣

血不攝妄投黃耆升麻之類。下痢若服黃耆卽發膨脹。多服升麻則小便與積皆升至上焦。此速死之道也。但傷血則調血傷氣則調氣傷脾則養脾。當寒而寒當溫而溫當燥而燥當清而清。因病用藥其可以執一乎。

脉云

下痢之脉宜微小忌浮洪宜滑大忌弦急。所謂身涼脉細者生身熱脉大者死。叔和云下痢微小却回生脉大浮洪無瘥日。

立方

導滯湯 治初痢濃血赤白混雜裏急後重日夜無度。

黃芩 酒炒 黃連 酒炒 木香 各二錢 當歸 錢

赤芍 檳榔 山查 各一錢 五分 大黃 三錢

水二鍾煎八分熱服

木苓調中湯 治過傷飲食大便泄瀉下痢肚腹膨脹等症。

白芍 猪苓 茯苓 澤瀉

厚朴 各一錢二分

陳皮 甘草

蒼朮 各八分 白朮 各八分 山查

香附

麥芽 神麩 各二錢

燈心三十莖 食前服

倉廩湯 治噤口痢 熱毒盛極 水米不下

前胡 柴胡 甘草 厚朴

川芎 各一錢 獨活 羌活 茯苓

桔梗 人參 枳殼 各八分 陳倉米 三錢

棗二枚 食前服

乳香飲 治久痢腸滑

乳香 人參 肉豆蔻 白朮

地榆 當歸 防風 甘草

棗二枚 不拘時服

屢驗方 治瘧疾兼之於痢 脈氣虛弱 身痛 以此活

血養胃

人參 五分 白朮 蒼朮 滑石 各一錢

白芍 陳皮 川芎 甘草

桃仁 各八分

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

水煎空心服。

加味香連丸 治一切新久痢疾。

大川黃連 四兩 酒炒

廣木香 五錢 真沉香 五錢 同上忌火

吳茱萸 八錢 水 泡炒

肉豆蔻 五錢 麵 包煨

右製為末。荷葉湯法為丸。每服大人二錢。小兒一

錢。空心米飲湯下。

立効散 治休息痢。

當歸 一兩 白芍 八錢 粟殼 七錢 石榴皮 一兩 錢

地榆 甘草 各四錢

右為末。每服三錢。空心燈心湯下。

血痢湯 治血痢。

白朮 條芩 各一錢 蒼朮 黃連 各五分

乾薑 黃柏 當歸 滑石 各八分

烏梅 二箇

水煎食前服。

寶靈散 秘傳 治一切痢疾神效。

當歸 二兩 酒洗 黃連 四兩 用吳茱萸 一兩 煎湯浸 白芍 二兩 炒

白朮 一兩 土炒 山查肉 一兩 石蓮子 一兩 蒼朮 一兩 米泔 水浸炒

枳殼三錢 麥芽一兩 神麩一兩 肉豆蔻一兩

木香一兩 見火

右製為末每服大人二錢小兒一錢白痢薑湯下

赤痢白滾湯下水瀉米湯下

點眼散 治噤口并赤白痢

以首胎糞一錢 雄黃五分 黃連八分

冰片一分

右為細末點兩眼大眦

胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃水穀不化及腸胃

濕毒下如豆汁瘀血

肉桂八分 赤茯苓 人參 蒼朮

芍藥各一錢 川芎 當歸 粟殼各六分

水煎溫服

四味連香丸 治諸痢神效

黃連十兩 酒炒 大黃四兩 酒煨 木香二兩 檳榔二兩

右為末糊丸棗豆大每服七十九空心米飲下有

積自行無積自止如下痢色黑大黃湯下色紫地

榆湯下色紅黃芩湯下色淡薑湯下色白肉桂湯

下。色黃。山查湯下。水瀉粟殼湯下。痛甚木香湯下。

固腸湯 治冷熱不調下痢赤白。

木香

陳皮

白芍

當歸

人參

枳殼

粟殼

柯子肉

茯苓

乾薑

各一錢

水煎溫服。

連薊湯 治受暑下痢鮮血。

黃連

香薷

一兩

烏梅

三箇

水煎食前服。

升陽除濕湯

治痢久脾陰下陷。裏急後重。至圍不能便。

能便。

蒼朮

白朮

茯苓

白芍

防風

木通

車前

各一錢

水煎食前服。

黃疸門

附黃腫

附黃汗

黃疸之症。皆濕熱所成。濕氣不能發泄。則鬱蒸而生熱。熱氣不能宣暢。則固結而生濕。濕得熱而益深。熱因濕而愈熾。二者相助而相成。愈久而愈甚者也。然

求其濕熱之所由生。未有不由於大醉大飽及醉飽後貪睡久臥與努力行房而得者。或醉飽後入水洗浴寒氣斂束密其腠理汗不得出以致濕熱相感而成此病焉。外不得汗內不得瀉薰蒸濡染流入皮膚上達面目下至足趺中及手臂前腹後背皆如塗金小便赤如薑黃猶之罨鹽罨醬因濕熱而變其色也。大法上半身黃甚則宜發汗下半身黃甚則宜利小便以分消其濕而兼以退熱之劑。然又必觀其所傷之物而消化之非徒治其濕熱而已。其疸有五酒疸。

黃疸黃汗穀疸女勞疸。須有種之分。病源起之於濕熱欲知其不治之症何以辨之曰黃疸變黑如烟塵者。必小便如膏者。必腹脹者。必飲食太少者。必眼漸白。小便長者。病將退也。

脉云

五疸實熱脉必洪數其或微瀋症屬虛弱。

立方

茵陳清濕湯 治濕熱傷脾四肢困倦身體麻木飲

食不化小便不利

茯苓 去皮 茵陳 各一錢 麥芽 山梔 炒

蒼朮 炒 白朮 各二錢 土炒 黃芩 酒炒

黃連 酒炒 枳實 炒 猪苓 陳皮

防已 各八分

加燈心三十莖。食前服。

濟生茵陳湯 治黃汗染衣內有積熱不能流通小

便不利。

茵陳 一兩 大黃 七錢 山梔 五錢 炒黑

水煎熱服。

濕濕湯 治酒疸作渴者。

黃栢 一錢五分 黃連 猪苓 澤瀉 各八分

青皮 茵陳 山梔 龍膽草 各一錢

水煎服。

參桂通濕湯 治疸症脉虛便赤。

白朮 人參 各八分 猪苓 茵陳

澤瀉 木通 各一錢 山梔 一錢五分 桂枝 五分

燈心三十莖。空心服。

又方 治諸疸。取小麥秧杆汁絞飲。晝夜飲三四次。

愈。

調元滲濕湯 治腎疸。目與渾身金色。小便赤澀。

羌活 白朮 防風 獨活 各八分

升麻 四分 蒼朮 猪苓 柴胡

茯苓 各一錢 澤瀉 乾葛 甘草

人參 黃栢 神麴 各六分

水煎空心服。

梔子大黃湯 治酒疸。心中懊懣。或作心痛。

淡豆豉 五錢 大黃 四錢 山梔 枳實 各二錢

薑二片煎八分空心服。

清利湯 治黃疸腹脹。小便不利。表和裏實。以此下

之。

大黃 六錢 芒硝 四錢 山梔仁 黃栢 各二錢

水煎不拘時服。

黃連飲 治疸症大小便秘澀。瘧熱。

大黃 五錢 黃連 四錢 芒硝 五錢 梔子 三錢

加燈心三十莖不拘時服。

除濕湯 治黃疸內熱嘔吐而渴。欲飲冷水。身體面

目俱黃。小便不利。

茯苓

澤瀉

茵陳

猪苓

各八分

黃芩

黃連

知母

天花粉

白朮

各六分

防已

陳皮

青皮

蒼朮

各三分

水煎空心服。

牛黃散

治酒疸。穀疸。及水氣蠱症。飲酒太過。宿食

積久。面目甚黃。通身浮腫。肚腹如鼓。

黑牽牛

春八錢 秋七錢

夏九錢 冬一兩

大黃

春八錢 秋七錢

夏九錢 冬一兩

檳榔

春八錢 秋七錢

夏九錢 冬一兩

甘草

春八錢 秋七錢

夏九錢 冬一兩

右爲細末。每服五錢。五更時面東。以井花水調服。服後不動。朝太陽吸氣三口即愈。

秘方 治傷食成疸。

山查

厚朴

阿魏

麥芽

各二錢

神麴

青皮

枳實

各一錢

茵陳

蘿蔔子

各三錢

加燈心三十莖。食前服。

効驗方 治黃疸久久不愈。

茵陳 一兩 為末 紅棗 每一歲一枚

水一碗半煎八分空心食棗并湯。

神効丸 治好食諸物停積成黃疸者。

使君子肉 四兩 炒 膽南星 二兩 檳榔 二兩

共為末如好吃生米加麥芽 舂好。好吃茶葉加茶葉一舂。好吃黃泥加壁土一舂。好吃黑炭加黑炭一舂。隨其所好加入煉蜜為丸每五六十丸空心砂糖湯下。

養榮丸 治五疸體弱血虛口淡耳響微寒發熱小便白濁。

便白濁

黃耆 當歸 桂心 甘草

陳皮 各八分 白朮 人參 白芍

生地 各一錢 五味子 九粒 茯苓 遠志 各二錢

水煎溫服

滑石散 治女勞疸并濕疸。

滑石 八錢 明礬 五錢 枯過

右為細末每服一錢大麥湯調下。

秦艽飲子

治黃疸。口淡咽乾。惡寒發熱。

白朮

茯苓

秦艽

各二錢

薄桂

橘紅

各二錢

水煎服。

穀疸丸

治穀疸。

苦參

三兩

龍膽草

兩

水牛膽

一箇

右為末入膽汁加蜜少許為丸。每服二錢。空心薑

湯下。

又方

治黃疸久不愈者。

桃樹根向東行者一束。洗淨切碎。煎二三碗。空心服之。如人行二十里。即欲大便。下盡黃水。疸即時愈。不可謂全安。而不調理。須必服參桂通濕湯。調補庶不生他症。

又方

治五疸。

老絲瓜連子燒存性為末。因麪病者。麪湯下。酒病者。酒下。

又方

治濕疸。

萬年青搗汁。加煮酒飲三四鍾。愈如大便不實。

者忌之。

附黃腫

人有病黃腫者不可誤以為黃疸。蓋黃疸者遍身如金眼目俱黃而面無腫狀。又呼曰黃胖。黃腫之黃則其色帶白而眼目如故。雖同出脾胃而病形不同。醫者當審而治之。黃疸之起由於濕熱蒸染而黃腫之症則濕熱未甚而多因蟲積食積之為害也。或偶吞硬食過多礙其脾家道路經久不消脾胃失運化之權濁氣上騰故面部黃而且浮手足皆無血有蟲者

又吐黃水毛髮直指肌膚不澤且好食生米茶葉之類者是也。若腫及四肢者難治腫及腹者不治飲食減少者不治以其無胃氣也。

大溫中丸 專治黃胖

香附 一觔童便浸

甘草 二兩 針砂 一觔炒紅醋煨三次

苦參 春夏二兩 秋冬一兩

厚朴 五兩 薑製 芍藥 五兩 酒炒

陳皮 二兩 山查 五兩

青皮 六兩 蒼朮 五兩 米泔浸

白朮 茯苓 各三兩

俱為末。醋糊為丸。如桐子大。面黑筋骨露氣實者

米飲下。六十九。面肥白與氣虛羸弱者白木湯下四十九。

調脾湯 一婦年六十面黃倦甚足疲口苦脉散而大此濕傷也。

白木

陳皮

蒼朮

木通

各二錢

黃芩

砂仁

人參

川芎

各一錢二分

黃栢

甘草

各八分

水煎食前服

神効丸 治男婦大小黃病。

皂礬

八兩加麩一餅和作餅入火內煨焦為度

茶朮

米泔浸

厚朴

薑汁炒

陳皮

甘草

各六兩

川椒

十兩去目閉口者

右為末用紅棗三觔煮熟去皮核胡桃三觔去殼同搗成膏和藥丸如桐子大每服七八十九酒服初服時覺此藥甘美服至病將愈便覺藥臭矣。

附黃汗

黃汗之為病身體腫兼發熱汗出而渴其汗沾衣其色黃如栢汁染者脉來沉細此症因何而得之人若以汗出時入水而浴病從毛孔中入得也。

著桂酒 治黃汗。

黃耆

白芍

各一兩

桂枝

三錢

苦酒半碗。水一碗。煎八分。空心服。

又方

黃栢

黃耆

各一錢

棗仁

人參

牡蠣

黃連

白朮

各一錢五分

水煎不拘時服。

火門

火之為病。其害甚大。其變甚速。其勢甚彰。其死甚慘。

何者。蓋緣燔灼。焚燬。飛走。狂越。一動便傷。元氣偏。遺害他經。內經病機十九條。而屬火者五。劉河間推廣五運為病。屬肝者。諸風之火。屬脾胃者。諸濕痰火。屬心肺者。諸實熱火。屬腎者。諸虛之火。散於各經。浮遊之火。入氣分。無根之火。入血分。消陰伏火。故曰。諸病尋痰火。痰火生異症。要分內外虛實。外因邪鬱。經絡積熱。臟腑此為有餘火。內因飲食情慾。氣盛似火。此為有餘之中不足。陰虛火動。乃不足之火。又有大怒之火。起於肝。則手掉目眩。醉飽之火。起於胃。則痞

塞腫滿。悲哀之火。起於肺。則氣鬱喘息。房勞之火。起於腎。則骨蒸潮熱。氣從左邊起者。肝火也。氣從臍下起者。陰火也。熱從腳下起至腹者。虛之極也。若壯實之人。有此是濕鬱成熱之候也。不可不辨。實火內外皆熱。口渴。日夜潮熱。大小便閉。虛火潮熱。有間。口燥不渴。虛火可補。實火可瀉。輕者可降。重者從其性而升之。君火正治。可以濕伏。可以水滅。可以直折。相火反治。不可以水濕折。惟從其性而伏之。卽如實火發狂。宜三黃湯治。虛火發狂。先與薑湯。然後補陰。其火

自降。凡火盛不可猛用涼藥。必消炒過。或兼滋陰。書能緩急。火不妄動。動由於心。靜之一字。其心中之水乎。

脉云

經曰。脉來弦數無力。爲虛火。實大有力。爲實火。洪數見於左寸。爲心火。見於右寸。爲肺火。見於左關。爲肝火。見於右關。爲脾火。見於兩尺。腎與命門火。

立方

黃連解毒湯 治實火躁亂。煩渴蓄熱內盛。

丹臺玉案

三卷 火門

三

黃連

黃芩

黃柏

山梔仁

各二錢

水煎服。加大黃。名梔子金花丸。

滋陰抑火湯

治陰虛火動。火起於湧泉穴。此補坎

水降離火。

當歸

川芎

知母

白芍

各一錢二分

生地

黃連

人參

熟地

各一錢

龜板 二錢

丹皮

杜仲

各八分

棗二枚煎服。

棕膈散 治一切鬱火。

連翹

黃芩

山梔

薄荷

各一錢二分

大黃 三錢

甘草 五分

芒硝 二錢

加薑三片煎服。

如咽喉痛加桔梗荆芥。

酒毒。

加黃連乾葛淡竹葉。

咳而嘔加半夏。

衄血加

當歸赤芍生地。

小便淋瀝加滑石茯苓。

風眩。

加防風川芎石膏。

斑疹加乾葛荆芥赤芍防風。

天花粉。

咳嗽加桑皮杏仁桔梗款冬花。

讞語。

發狂加黃連。

目生翳障流淚加菊花木賊生地。

益元散

治火不流通。

方見傷寒門

碧雪 治積熱不行。口舌生瘡。心煩喉閉。并痰火神效。

芒硝 石膏 青黛 寒水石

馬牙硝 各二兩 研細末 甘草 六兩 牛黃 三錢

右將甘草煎濃湯去渣。入諸藥末。再以柳木條不住手攪令硝溶入青黛和勻。傾砂盆內候冷。結成霜。研為末。每用少許。含化津嚥下。

清咽丸 治肺火作嗽。咽喉痛甚。

薄荷葉 五兩 犀角 一兩 川芎 八錢 防風 一兩

桔梗 二兩 貝柿霜 一兩

右研細末。蜜為丸。如龍眼核大。噙化。

三黃丸 治三焦積熱。咽喉煩燥。小便赤澀。大便秘結。

黃連 二兩 黃芩 大黃 各四兩 酒浸蒸晒

共為末。蜜丸。如梧子大。每服五十九丸。白湯下。

玄明粉 治邪熱所干。胃中氣滯。一切痰火咳嗽等症。

朴硝二十觔。入鍋化開。炒極燥。貯陽城罐內。上

以园瓦蓋之。鹽泥封固。入火煨至裏外通紅。爲度。乘熱傾入水。研化。用竹籃上以布綿紙二層。將水瀝下。清汁露一宿。明早去水。其下凝結。白如冰者。復照前法。滾湯化開。又露約數次。待其味淡。卽成粉矣。晒收磁罐內。每一觔加甘草生熟各一兩。爲末。和勻。每服一二錢。不拘時服。

清火神秘湯

治四肢發燒。鬱火不散。心煩內熱。口

苦咽乾

丹皮

地骨皮

柴胡

沙參

各一錢二分

人參 一錢

玄參

天花粉

生地

當歸

各二錢

白芍

甘草

知母

各六分

燈心三十莖。食前服。

祛火利痰丸

治一切痰火。久嗽不住。

大黃

錦紋者一觔。切片好酒浸二日。上下柳葉蒸。黑色晒乾。爲末。

巴戟天

四兩水。泡去骨。

蘿蔔子

炒

真蘇子

炒

麥芽

炒

枳實

炒各二兩

右爲細末。蜜丸如梧子大。每服五十九。空心清茶

下。

凡大怒動火起於肝經。醉飽動火起於脾經。悲哀動火起於肺經。房勞動火起於腎經。思慮動火起於心經。見牙痛齦宣腮頰頤腫此胃火動也。見月黃口苦坐臥不安此膽火動也。見舌胎喉痛便秘不通此大腸火動也。見頭眩體倦手足心熱此三焦火動也。

瀉各經之火藥

黃連瀉心火。黃芩瀉肺火。芍藥瀉脾火。柴胡人中白瀉肝火。知母黃柏瀉腎火。木通瀉小

腸火。青黛瀉五臟之鬱火。玄參石膏瀉胃經之遊火。龍膽草瀉肝膽之火。童便降諸經之火。山梔仁能去一身曲折之火。滑石能降三焦妄火。大黃瀉大腸火。玄明粉能潤十二經之燥火。此皆苦寒之劑能瀉有餘之火也。

發熱門

世間發熱數種治各不同而外感內傷乃大關鍵。然外感之熱與內傷之熱又有虛實之分。醫者不可不辨。如傷感發熱是實邪入衛與陽氣交爭而為外熱。

其脉緊而有力。此發於正冬之時也。類傷寒發熱。冬傷寒不即病。至春變溫。至夏變熱。又有一種天行瘟疫熱病。多發於春夏之間。沿門閭境相同者。此天地之疫氣。時令不正。乍寒乍熱之感也。病有發喘者。熱則息麓。而氣不循序也。病有發嘔者。胃中有熱而火炎上也。有鼻塞者。熱客陽明而鼻膜脹也。又有一種冬瘟之病。治之非其時。而有其氣。蓋冬寒時也。而反病溫焉。此天時不正。陽氣反泄而熱也。又有一種時行寒疫。却在冬溫之時。此亦天時不正。陰氣返逆而

熱也。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。却類內傷。與傷寒大異。蓋寒傷形。寒邪客表。有餘之症。故宜汗之。暑傷氣。元氣爲熱所傷。而耗散其脉。虛遲而無力。不足之症。又有因時暑熱。而過食冷物。以傷其內。或過取冷風。以傷其外。此則非暑傷人。乃因暑而自致之病也。若夫飲食勞倦。內傷元氣。其熱晝夜兼發。或晝重夜輕。口中無味。是陽氣自傷。不能升達於陰分。而爲內熱。乃陽虛也。故其脉大而無力。屬肺脾內傷。色慾發熱。午後發熱。至半夜止。口中有味。是陰血自傷。不

能制火。陽氣升騰而爲內熱。乃陽旺也。故其脈數而無力。屬心腎陰陽兩傷。晝夜發熱。煩渴不止。鼻乾者。有內傷飲食類傷寒初症。但右手脈氣口緊盛。身體不痛爲異。有內傷思慮神昏恍惚。眼燒而發熱者。有內傷生冷鬱遏陽氣而發熱者。有因服金石灸燻夜臥火坑。或火烘衣服。久則蘊積熱毒。脈浮大。此屬實熱。有因銷礫腎水。相火炎上。口燥煩渴。精神短少。脈細小。此屬虛熱。有氣分實熱。血分實熱。血氣俱實熱。有氣分虛熱。血分虛熱。血氣俱虛熱。有骨蒸熱。有心

熱。熱在血脈。日中甚。面赤。心煩喜笑。瘡瘍自汗。掌中熱。口舌乾。是也。有肺熱。熱在皮毛。日西甚。上氣喘急。咳嗽咽痛。肩背痛。鼻流血。是也。有脾熱。熱在肌肉。遇夜猶甚。怠惰嗜臥。面黃腹脹。口甜流涎。易飢體重。是也。有肝熱。熱在肌肉之下。骨之上。寅卯尤甚。脇疼目痛。淚出。頰腫。頭旋筋急。多怒。是也。有腎熱。熱在骨間。或子時甚。兩足手心如火。多睡溺澀。口乾足腫。是也。有五心煩熱。乃陰虛火盛也。有胃中煩熱。頭昏口燥。乃心內煩燥。無外熱。仍分虛實。若因汗吐下後。津液

去多。五內枯燥者。皆屬虛也。若不因汗吐下後而得者。是實有潮熱。若傷寒日晡發熱。乃胃實。別無虛症。其餘當審其虛實。如前有面獨熱。是陽明經氣盛。有餘。或風熱上升也。然積病最能發熱。多夜分腹肚熱甚也。經曰。治病必求其本。風熱。痰熱。濕熱。三者尤百病之根本。宜詳審之。如風熱。頭目腫痛。眩暈。眼昏。目赤。耳聾。鼻塞。口燥。舌乾。斑疹之類。皆風熱炎上之所爲也。如痰熱。咽痛。喉閉。膈噎。胃痞。顛狂。驚悸之類。皆痰火凝滯中焦之所爲也。如濕熱。泄瀉。下痢。木腫。鼓

脹。黃疸。遺精。白濁。疝痛。脚氣。腰膝痛。皆濕熱下流之所爲也。治者於小熱之氣。涼以和之。大熱之氣。寒以收之。甚熱之氣。以汗發之。內熱者。下之。外熱者。發之。虛者。補之。庶無悞矣。

脉云

六脉洪數而長。熱病也。其寸口實者。熱在脾肺。其關上滑數者。熱在胃中。至尺實者。熱在遍體。尺脉見數。熱在臍下。

立方

柴苓清熱湯

治虛損手心足心發熱。

茯苓

柴胡

知母

人參

各一錢

天花粉

八分

甘草

五分

白芍

黃芩

各一錢二分

加燈心三十莖。食遠服。

清心湯

治心血不足發熱無時。兩頰忽赤。口苦作渴。

一

黃連

一錢二分

五味子

九粒

麥門冬

當歸

生地

犀角

各二錢

加龍眼肉七枚煎服。

補元散熱飲

治元氣虛弱。口乾發熱。小便短赤。

人參

黃耆

白朮

各五分

柴胡

黃芩

甘草

白芍

車前子

當歸

各一錢二分

加燈心三十莖煎服。

蒸

鱉甲飲 治病後勞復邪熱未除。房勞虛損。一切骨蒸。

當歸

秦艽

柴胡

各一錢

鱉甲

三錢 羊酥炙

地骨皮

枳實

知母

烏藥

各八分

加燈心三十莖煎七分空心服。

導赤散 治心經發熱。

生地

木通

甘草

各一錢

淡竹葉

二十片

犀角

薄荷

連翹

各一錢五分

水煎服。

瀉白散 治肺經發熱。

桑白皮

炒黃

地骨皮

各二錢

五味子

廿一個

甘草

貝母

去心

天門冬

去心

麥門冬

各一錢去心

水煎服。

瀉黃散 治脾經發熱。

山梔

藿香

石膏

甘草

防風

各一錢五分

水煎服。

瀉青丸 治肝經發熱。

羌活

大黃

川芎

山梔

龍膽草

當歸

防風

柴胡

白芍

各等分

右爲末蜜丸如芡實大每服一九淡竹葉煎湯調

下。

滋腎丸 治腎虛發熱。

黃栢

知母

各四兩俱
鹽水炒

肉桂

四錢

山茱萸

生地

丹皮

各三兩炒

右爲末。蜜丸如梧子大。鹽湯空心送下六十九。

人中白散

治五心煩熱。

人中白

二兩

知母

青黛

甘草

各五錢

右爲末每服二錢滾白湯調下。

升犀湯

治面獨熱。

升麻

五分

乾葛

白芷

甘草

芍藥

黃連

黃芩

各一錢五分

玄參

荆芥

薄荷

犀角

各八分

加燈心三十莖煎服。

地仙飲

治潮熱。

地骨皮

三錢

防風

一錢五分

薄荷

甘草

各一錢

烏梅肉

八分

水煎服。

如柴胡瀉肝熱。須以片苓佐之。片苓瀉肺熱。須以桑皮佐之。黃芩又瀉大腸之熱。須以枳殼佐之。黃連瀉心熱。用猪膽汁炒。更以龍膽草佐之。又能瀉膽熱。白芍瀉脾熱。須以石膏佐之。知母瀉腎熱。又瀉膀胱之熱。須以黃柏佐之。梔子瀉三焦之熱。須以澤瀉佐之。人中白非獨瀉肝熱。又能瀉三焦及膀胱之熱。

痰門 附痰飲

痰本脾胃津液。週流運用。血氣出之。如道路。然不可無者。但內外感傷。則津液壅逆。稠濁。故名爲痰。或吐咯上出。或凝滯胸膈。或聚積腸胃。或流注四肢。或在皮裏膜外。或在脇下。或隨氣升降。遍身上下。無處不到。其爲病也。種種不一。初起頭疼發熱。類是外感表症。久則咳嗽。朝輕夜重。內傷陰火。又有痰飲流注肢節。痰痛類乎風症。但痰症胃滿食減。肌色如故。脉滑不勻爲異耳。又眼胞及眼下如炭烟薰黑者。痰也要分久新。新而輕者。形色青白稀薄。氣味亦淡。久而重者。黃濁稠粘。凝結咯之難出。漸成惡味。酸辣腥臊。鹹

苦。甚至帶血而出。生於脾多。四肢倦怠。或腹痛腫脹。泄瀉。其脈緩肥。人多有之。名曰濕痰。若挾食積痰血。遂窠囊痞塊。又名食痰。留於胃脘。多嘔吐吞酸。嘈雜。上衝頭面。烘熱。名曰火痰。若因飲酒乾嘔。多成臂脇痛。又名酒痰。升於肺。多毛焦面白。如枯骨。咽乾口燥。咳嗽喘促。名曰燥痰。久爲老痰。鬱痰。又七情鬱滯。膈多。胃脇痞滿。咯之不出。嚔之不下。形如破絮。或如梅核。名曰氣痰。迷於心。多怔忡顛狂。夢寐奇怪。其脈洪。名曰熱痰。動於肝。多眩暈頭風。眼目眵。昏澀耳。

輪搔癢。脇肋脹痛。左癱右瘓。麻木蹠跛奇症。名曰風痰。聚於腎。多足膝酸軟。腰背強痛。肢節冷痺。骨痛。名曰寒痰。又勞力色慾過度。有氣虛痰。血虛痰。凡身中習習如蟲行。或身中結核。不紅不痛。或走馬喉痺。或胃腹間如有二氣交紐。噎塞煩悶。或背脊中常有一點。如水冷痛。或心下水冷時痛。或四肢腫硬似痛非痛。或骨節刺痛。無常處。或吐冷涎。綠水黑汁。或大小便膿。或關格不通。以致癆瘵。荏苒婦人經閉。小兒驚搐。皆須先去敗痰。然後調理。如鬪毆。骨撲傷。刺痛不。

已散血之劑。罔功。續以自已。飲之。須臾吐痰。其痛立止。百病兼痰。如此治法。以痰生於脾胃。宜實脾燥濕。又隨氣而升。宜順氣爲先。分導次之。又氣升屬火。順氣在於降火。熱痰則清之。濕痰則燥之。風痰則散之。鬱痰則開之。頑痰則軟之。食痰則消之。在上者吐之。在中者下之。中氣虛者宜固中氣。以運痰。若攻之太急。則胃氣虛而痰愈盛矣。凡痰喘聲。脉散汗出如油。身冷如水者。必死也。

脉云

沉弦細滑大小不勻。痰之爲病。偏弦爲飲。雙弦爲痰。飲浮滑而洪。膈上有稠痰也。

立方

二陳湯 此爲治痰之主方。加減錄後

茯苓 一錢 甘草 五分 陳皮 去白 半夏 各二錢

二陳 橘半 茯苓草 清氣化痰爲至寶

膈上不寬 加枳桔 火旺生痰 黃芩好

參朮如名 六君子 健脾和胃無如此

中脘生痰 去了參 舒中順氣 香砂增

飲食過餐不尅消

麩麥山查厚朴調

再加枳實黃芩炒

何必拘愁體弱嬌

咳嗽生痰分冷熱

熱即芩連並枳桔

寒痰積宿配原方

化氣胃中痰自滅

風寒外感嗽何辜

二陳枳桔與前胡

乾葛桑杏能消去

東垣爲此號參蘇

二陳半夏性本燥

血虛煩渴皆不要

人有風痰疾病生

天麻白附皂角星

濕痰在胃身多軟

二朮仍須配二陳

火鬱胃中是痰結

滯住喉間咯不絕

星萋香附桔連翹

少佐玄胡痰自消

痰在經絡及四肢

薑汁還將竹瀝施

脾胃有痰須枳實

脇間白芥永全除

溫膽湯加竹茹實

寧神豁痰爲第一

五六日來嘔不休

心中脹悶手難揉

多加枳朴芩連芎

便秘硝黃一服瘳

嘈雜暖氣一般看

胃中積熱與停痰

石膏香附並南星

二陳加減有何難

悶脹吞酸與吐酸

本方加入炒茱連

此是二陳加減法

休將方與外人傳

玉樞丹

即紫金錠

此丹解諸毒療諸瘡利關竅治百病開頑痰功過於牛黃。居家出外不可無此。

山茨菰

三兩去皮淨

紅芽大戟

一兩五錢洗焙為末

麝香

五錢

千金子

一兩去油殼淨

文蛤

即五倍子二兩

右各為末。以糯米粉糊和勻。於木相中杵干下。分作六十錠。每服半錠。重症一錠。薑湯或薄荷湯磨

下。脩合日於端午。重陽。勿令婦人孝服及雞犬見。要在淨室中。虔心焚香脩製。

竹瀝達痰丸

此方清氣化痰。不傷元氣。痰自大便

中出。

半夏

薑焙製

橘紅

各四兩

人參

各二兩

白朮

土炒

茯苓

去皮

沉香

各一兩

大黃

三兩蒸九次

黃芩

一兩五錢酒炒

甘草

五錢

青礞石

一兩二錢煨

右為末。竹瀝一大碗。薑汁二酒鍾。為丸。如棗豆大。每八十九。白滾湯送下。

蠲痰飲 治痰流注四肢阻滯經絡疼痛之極。

羌活 歲靈仙 蒼朮 各一錢 桂枝

沉香 烏藥 膽星 各一錢二分

木通 牛膝 各八分

薑汁五茶匙 竹瀝半栳熱服。

導痰湯 治痰凝氣滯。

半夏 二兩 南星 枳殼 橘紅

赤茯苓 各五錢 甘草 一錢

薑五片煎服。

逐痰湯 治痰壅塞上焦不行。

大黃 四錢 黃芩 沉香 枳實

半夏 各二錢 南星 一錢

竹瀝半栳生薑五片煎服。

消痰噙化丸 治一切痰氣凝結痰嗽喘急。

苦丁茶 硃兒茶 各五錢 牛黃 四錢

天花粉 三錢 川貝母 硼砂 真沉香 各二錢

右為末蜜丸如雞豆大噙口中潤下。

加味滾痰丸 治諸般痰症失心喪志癲狂癩病効。

驗如神。

大黃 六兩 晒九次

黃芩 五兩 酒炒 膽南星

青礞石 煨 沉香

橘紅 各二兩

右為細末。竹瀝為丸。每服三錢。空心白湯下。

舒中化痰湯 治氣不降升痰涎壅盛。

橘紅 貝母

枳實 柴胡

膽南星 各一錢 二分

木通 半夏

萋仁 桔梗

蘇子 各一錢

生薑三片。水煎熱服。

化痰湯 治痰嗽并氣上逆。

黃連 一錢 五分 酒炒

桑白皮 杏仁

枳殼 海石 各二錢 研細

橘紅

蘇子 炒研 茯苓

黃芩 酒炒 半夏 麩 各一錢 二分

生薑三片煎服。

和中丸 治濕痰症。

蒼朮 米泔 浸炒 橘紅 薑汁 拌晒 黃芩 各四兩 酒炒

半夏 薑 製 香附 各三兩 醋炒

右為末。水法為丸。每服三錢。空心白滾湯下。

牛黃丸 治諸風緩縱。言語蹇澀。心忤健忘。頭目眩暈。胃中煩鬱。痰涎壅塞。心經不足。神志不定。驚恐畏怖。虛損少睡。喜怒無時。癲狂癩症。并皆治之。

茯神 遠志去骨 羚羊角 麥門冬各二兩五錢去心

牛黃一兩二錢 犀角 龍腦 真阿膠蛤粉炒

麝香 沉香各二兩 川芎 杏仁去尖

人參 枳實各八錢 金箔三百片為衣

防風 當歸酒洗 朱砂研細 大附子黃連甘草煮

桔梗各一兩 白芷七錢 黃連二兩薑汁炒

右為極細末。煉蜜為丸。重一錢二分。朱砂金箔為衣。蠟封。薑湯調下。小兒驚風薄荷湯下。

四製丸 化痰清熱。并治陰虛咳嗽。

半夏四觔泡去臍 分作四分 一分生薑黃連各

四兩 水二碗同煮乾。一分知母貝母各四兩

水二碗同煮乾。一分人參杏仁各四兩 水二

碗同煮乾。一分桔梗桑皮各四兩 水二碗同

煮乾。

右諸藥揀出。只用製過半夏切片曬乾。為細末。水

法爲丸。每服二錢。空心薑湯送下。

附飲

痰伏胞絡。自肺竅嗽出。涎伏脾胃。自口角流出。飲生胃腑。從食腕吐出。飲症有六。水停腸胃。腹響輓輓。有聲。名痰飲。水流在脇。咳吐則痛。名懸飲。水流四肢。身體重痛。名溢飲。水停膈上。飽逆倚息。短氣不得臥。名支飲。水停心下。背冷如手掌大。四肢歷節疼痛。缺盆咳嗽轉甚。名留飲。水停膈滿。嘔吐喘咳。腰背痛。淚出。名伏飲。六者不同。皆因飲水。及茶酒停蓄不散。再加

外邪。生冷七情相搏而成。脉多弦滑。或伏。眼下皮如炭黑。治法在皮裏膜外表分者。汗之。在胃膈者。吐之。在四肢經絡脇肋者。分利之。在腸胃裏分者。下之。病人一臂痛。不一時復移在一臂。其脉沉細。非風也。必有飲在上焦矣。

立方

挖涎卅 治一切痰飲症。或漉漉有聲。或手足冷痺。氣脉不通。

大戟

白芥子

瓜蒌麴

各二兩

薄桂 三錢

全蝎 八箇

雄黃

朱砂 各一錢

右爲末。粉糊爲丸。如梧子大。每服六七十丸。臨臥薑湯送下。

五飲湯 治五飲神効。日雷飲。日癰飲。日痰飲。日溢飲。日流飲。

旋覆花

人參

橘紅

枳實

白朮 各一錢

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓 各八分

前胡

桂心

白芍

甘草 各六分

薑五片煎服

降痰丸 治三焦氣閉。痰飲壅滿。咳嗽吐痰。肢體倦怠。不思飲食。

木香

檳榔

青皮

陳皮

三稜

枳殼 炒

半夏 薑製

大黃

黑牽牛 各二兩

右爲末。麩糊爲丸。每服三錢。薑湯食前服。

三消門

消者易消之謂也。邪火內鑠。真陰枯竭。善渴善飢。不

能滋養肌膚。飲食入胃。頃刻消盡。故名消症。以其上中下三焦受熱。故又曰三消。所謂三消者。何。口乾不休。日消渴。多食善消。日消中。小便頻數。日消腎。乃心脾與腎三經之火症也。而心脾二經之熱。又皆出於腎虛。蓋腎之所主者水也。真水不竭。自足以滋養乎脾。而上交於心。何至有乾槁消渴之病乎。惟腎水一虛。則無以制餘火。火旺不能撲滅。煎熬臟腑。火因水竭。而益烈。水因火烈。而益乾。陽盛陰衰。搆成此症。而三消之患始劇矣。其根源非本於腎耶。然分而言之。

又若有自爲病者。如心經既虛。邪火乘之。而又內挾心火。心火與邪火一時騰起。不能制抑。薰蒸上焦。以致口乾舌燥。咽喉如燒。引飲雖多。而煩渴不止。小便頻數而短少。所謂消渴是也。脾經既虛。邪火乘之。而內炙脾土。脾家爲火所燥。胃火亦從而起。倉廩之官失職。中宮之位已空。令人消穀而易飢。飲食大倍於平日。肌肉漸瘦。小便如泔。雖甚煩渴。而飲不多。所謂消中者是也。腎經既虛。邪火乘之。水本能勝火。而今反爲火勝。一枯之水。易乾。車薪之火。方熾。則先天真

一之精必煎熬殆盡。由是骨髓皆枯。肢節瘦細。腿膝酸疼。唇裂火燥。渴而引飲。飲雖不多。而便溺時卜不能收攝。所謂消腎者是也。三焦雖自爲病。而其本總歸腎經。真水一虛。而二病從之。醫者可以求其原矣。此病惟好酒好色。喜食炙博。愛服丹砂金石之藥。而成之。蓋好酒則熱易積。好色則火難制。喜食炙博則津液耗亾。愛服丹砂金石。腸胃燥烈。而火症起矣。能食者必生癰疽。不能食者必不免中滿鼓脹也。慎之。

脉云

脉訣云消渴脉數大者生虛小病深厄難治。

立方

生津散 治上焦之病渴而飲水。

黃栢

天花粉

黃連

山梔

各二錢

白扁豆

生地

麥門冬

知母

各一錢五分

茯苓

乾葛

各八分

加燈心三十莖空心服。

清心降火湯 治消渴小便不利。

黃連

天花粉

麥門冬

去心滑石

各二錢

丹臺玉案

三卷 三消

聖

五味子 木通 茯苓各一錢 甘草五分

加燈心三十莖。食前服。

三黃丸 治男婦消渴。不生肌肉。飲水無度。口燥咽乾。小便短澀。

春三月 大黃二兩 黃連四兩 黃芩四兩

夏三月 大黃一兩 黃連一兩 黃芩六兩

秋三月 大黃二兩 黃連二兩 黃芩六兩

冬三月 大黃五兩 黃連三兩 黃芩三兩

右三味。依時加減為末。蜜丸如棗豆大。每服百丸。

一日三服。一月病愈。

神効散 治消渴。形容漸瘦。精神倦怠。

麥門冬 黃耆 天花粉 白扁豆各一錢

枇杷葉 天門冬 烏梅各一錢 甘草五分

水煎食前服。

扶兔丸 治三消等症。并治白濁。

茯苓四兩 兔絲子八兩 北五味五兩 石蓮子肉三兩

山藥五兩

右為末。以山藥為粉。作糊為丸。如梧子大。每服六

十九。滾湯下。

加味地黃丸 治下消。

山藥 炒

山茱萸

北五味

澤瀉 去毛

黃柏 鹽水炒

知母

各四兩青鹽水炒

懷生地

八兩

牡丹皮 炒

白茯苓

去皮各二兩五錢

右為末。蜜丸如梧子大。每服三錢。空心滾湯下。

抑火理脾湯 治中消。

山梔

白朮

扁豆

寒水石

各二錢

白朮

黃連

茯苓

沙參

加蓬二

益於劑

身少陽。二焦相火。有已張。而無頭粒。重者紅如錦。身少陰。君火浮。上而有頂。隨出。隨沒。沒而復出。地傷。復發。起有。西。治。濕。毒。起。至。重。紅。赤。者。為。胃。熱。若。焦。者。為。胃。爛。也。一。則。下。之。早。一。則。下。之。晚。乃。外。感。熱。病。發。起。也。陰。症。發。起。皆。出。背。背。之。間。手。足。雖。有。亦。稀。少。而。微。紅。此。無。根。去。守。之。久。聚。於。胃。中。止。溺。重。脂。傳。於。皮。膚。而。為。斑。點。但。如。蚊。蚋。透。風。形。狀。而。非。綿。丹。臺。玉。條。三。卷。癩。癩。四。七。

紋也。內傷發斑者。胃氣極重。一身之火遊行於外。所致輕如蚊跡。多在手足也。疹雖屬少陰君火。見於面多者。乃心火入肺而然。背上多者。是太陽膀胱火熱而然。胃前多者。是陽明火熱而然。四肢多者。脾與心火熱而然也。又有所謂癩疹者。多屬脾。隱隱然在皮膚之間。故曰癩疹。發則多癢不仁。有風熱風濕之殊。又有所謂丹疹者。皆惡熱毒血蓄於命門。遇相火合發。即發也。色有赤白。熱有微甚耳。在小兒得之名曰赤癩。自有治法。見啞科。

脉云

陽浮而數。陰實而大。火盛於表。故陽浮而數。下焦實熱。故陰實而大。

立方

消斑青黛飲。治熱傳裏。裏實表虛。血熱不散。熱氣乘虛出於皮膚。而為斑。色黑者不治。

柴胡

玄參

黃連

知母

石膏

各一錢五分

生地

山梔

犀角

青黛

人參

各一錢

甘草

五分

棗二枚。竹葉十五片。不拘時服。

玄參升麻湯 治熱毒發斑咽痛煩燥譫語

玄參 升麻 甘草各二錢 石膏

知母各二錢

水煎服

消毒犀角湯 治癰及癩疹

牛蒡子五錢 荆芥 甘草 防風各二錢

水煎溫服

消風散 治丹疹屬血風血熱

荆芥 甘草 陳皮 厚朴各五錢

白蘘蠶 人參 蟬蛻 茯苓

防風各二錢 川芎 藿香 羌活各二錢

右為末每服三錢清茶調下

通聖散 治諸癰身上熱疹子

防風 川芎 當歸 麻黃

薄荷 連翹 芒硝 大黃

白芍各二錢 黃芩 石膏 桔梗

滑石 荆芥 山梔 白朮

甘草 各一錢
五分

水煎熱服

內外傷藥 附內傷

凡傷寒惡寒。猛火不除。內傷惡寒。稍就溫暖即止。傷風惡風。不耐一切風寒。內傷惡風。傷惡夢。小賊風。外傷惡熱。無有休歇。日晡轉劇。直待汗下方退。內傷發熱煩燥。時作時止。或自袒裸亦便清涼。內傷寒熱間作而不齊。外傷寒熱齊作而不間。內傷頭痛時止時作。外傷頭疼非發散直待入裏方罷。內傷元氣不足。

神思昏怠。語言倦懶。外傷邪氣有餘。神思猛壯。語言強健。內傷則手心熱而手背不熱。外傷則手背熱而手心不熱。內傷邪在血脉中而不渴。外傷邪氣傳裏則大渴。又以手按心口不痛為勞役傷。痛為飲食傷。勞後傷發熱兼惡寒。頭骨節俱痛。飲食傷不惡寒。但發熱頭不甚痛。骨節不痛。但中腕飽悶。見食即惡。宜細辨之。

脉云

凡內傷氣口脉洪盛。外傷人迎脉浮緊。然內傷勞役。

氣口脉急大而數。時一代而澀。澀者脉之本脉。代者元氣不相接也。若不甚勞役。惟宿食不消。則獨右關脉沉而滑。經曰脉沉滑者有宿食也。

立方

補中益氣湯 治內傷勞倦。加減於後。

人參 黃耆 甘草 當歸

白朮 各一錢 升麻 五分 柴胡

陳皮 各八分

如咳嗽去人參。加五味子。麥門冬。秋冬加不去。

節麻黃 春加款冬花。心下痞悶加芍藥黃連。能食心下痞者加枳實黃連。不能食心下痞者加生薑陳皮。胃脘當心痛加草豆蔻。腹痞脹加枳實厚朴。木香砂仁。天寒加乾薑。腹痛加白芍。寒痛加桂。夏加黃芩。冬加益智。臍下痛加熟地。不已加桂。脚軟痛加黃栢。不已加防已。身刺痛倍當歸加枳殼。身體重痛乃風濕相搏。去人參黃耆加羌活蒼朮防風。宿食加山查麥芽。食不知味加神麩。飢

餓日久去柴胡加乾山藥。食不下胃中有寒。或氣滯加青皮木香。精神短少倍參加五味。犯房者陽虛去升柴加桂附陰虛者去升柴加熟地山藥茱萸。傷飲食視其所傷何物各以主藥治之。如傷於魚肉用山查陳皮蓬朮三稜。甚至有加阿魏砂仁巴豆霜。如傷於米食用麥芽神麴。枳實檳榔草菓。如傷於麵食用萊菔子爲君而佐以蒼朮厚朴陳皮。如傷於生冷用官桂木香乾薑砂仁。

附諸內傷

傷寒家以外感風寒爲外傷內傷飲食勞倦爲內傷矣。然而日內非止於飲食勞倦也。凡傷於血傷於氣傷於精皆非外傳也。獨不可以言內傷乎。蓋好勇鬪狠奔走負重恃壯使力跌撲輕生必傷於血。血之積於上則胃膈疼。血積於中則中脘痛。血積於下則小腹痛。傷重則行其血。傷不重則活其血。血旣行則養其血而已矣。或忿恨衝心暴怒頓發爭言鬪舌叫號罵詈必傷於氣。氣之積不散則兩脇脹滿胃膈塞悶。

甚至發為鼓症。飲食不進。而病斯劇矣。宜大劑伐肝化氣之藥治之。或自恃強壯。不惜氣力。縱情於女色。耗亾其真精。則小腹併其冷如冰。其堅如石。痛連陰器。小便秘而不通。切不可以精虛之故。妄加補劑。又不可以悞為霍亂。妄投鹽水。要當以活血為主。而調氣次之。待其痛止。養和方可。漸加帶補之劑。

立方

補榮湯 治五臟俱虛。思慮過度。傷精損血。頭眩目昏。睡臥不寧。

天門冬

人參

麥門冬

五味子

沙參

棗仁

遠志

各一錢五分

地骨皮

生地

當歸

栢子仁

扶神

各一錢

棗二枚煎服。

調元益本湯

治勞神過度。元氣虛弱。四肢倦怠。

白朮

人參

黃耆

山藥

茯苓

各二錢

紫河車

三錢

當歸

丹皮

棗仁

遠志

各一錢五分

棗二枚煎服。

秘授木寶真丹 治一切內傷虛損。

雲苓 去皮 白朮 土炒 人參 黃耆

阿膠 各四兩 蛤粉炒 當歸 酒浸 生地

丹皮 各五兩 炒 紫河車 二具 海狗腎 一對 酥炙

甘草 一兩 炙 杜仲 鹽水炒 山茱萸 骨碎補 各三兩

右製為末煉蜜為丸每服五錢空心鹽湯送下。

和榮抑氣湯 治跌墜所傷心腹作痛。

當歸 生地 玄胡索 木香

沉香 各二錢 紅花 烏藥 鬱金

山查 蘇木

水煎服

又方 治血凝氣滯。

桂枝 附子 各一錢 烏藥 五靈脂

陳皮 各三錢 丁香 八分

水酒各半煎服。

內傷於血視其所傷者何處分上下治之。如胃前

痛則用紅花赤麴降香丹皮而以桔梗引經枳殼

開氣 如兩脇痛用當歸蘇木。紅花桃仁。而以青皮柴胡引經。以木香調氣。如中脘痛用當歸爲君。佐以玄胡紅花蘇木。而以芍藥引經。厚朴大腹皮寬膨脹。如小腹痛用桃仁爲君。佐以當歸紅花蓬朮。而以青皮官桂引經。檳榔破氣。凡血併不行。加川山甲麝香。內傷於氣。宜伐肝破氣之藥。治之用香。皮爲君。佐以芍藥香附烏藥官桂木香。

內傷於精。宜養血調氣之藥。治之用紅花爲君。佐以桃仁丹皮當歸生地牛膝甘草。少加鹽一撮。引經。如有痛連前陰者。必有血滯於莖中。甚至小便不通。宜以頭髮燒灰爲末。童便調下三錢。此其大畧而言。若夫斟酌損益。則非言之所能盡述也。

眼疾門

人之有兩目者。猶天之有日月也。日月有明。照臨萬方。若烟霧障天。則明者暗矣。兩目有神。旁燭萬物。若風火發越。則神斯耗矣。善調攝者。安養天和。使氣血常運。何至有目痛之患乎。惟夫七情內攻。六氣化感。

加以酒色過度。當風眺望。或冒熱奔走。宿水洗面。不知自惜。是以病其目也。分而言之。眼皮上下皆屬於脾。皮紅濕爛。脾火上蒸也。兩眦左右皆屬於心。眦肉綻紅。心火上炎也。四圍白處皆屬於肺。白有紅筋。肺火上騰也。烏輪圓大皆屬於肝。兩輪腫痛。肝火上升也。總而言之。皆以肝為主。肝爲相火。肝火一動。諸經之火從之。而痛斯作矣。然又有連睛多淚。癢不可忍者。風也。風動肝木。吹噓鼓舞。故連睛不止。其所以淚多者。淚

爲肝之液。風行而水流故也。其所以癢不可忍者。純乎風而無火。故但癢而不痛也。又有瞳子散大而無光者。腎虛也。腎水不足。無以滋養肝木。肝木無力。不能收斂英華。故散大而無光也。又有視物昏花者。氣虛也。乾枯少潤者。血虛也。羞明喜暗者。虛極也。眩暈不定者。風痰壅也。眼腫脹痛者。肝氣盛也。醫者審而治之。有火則瀉火。有風則散風。氣虛則補氣。血虛則補血。虛極則補虛。風痰壅則消風去痰。肝氣盛則抑肝順氣。而凡是目疾。又皆以養血爲要。然古人云。五

臟精血皆稟受於脾。而上貫於目。此養脾乃治目之
上策。心之神發於目。宜靜而安養。勞則挾動相火。妄
行君令。而邪氣併搏。自失其明。此養心治目之根本
也。凡醫者當以理脾胃及養血安神爲夫治目之本
宜細審之。

起害訣

氣主昏朦不足。虛則熱淚生花。熱則赤脉澀痛。
風則腫癢更加。上下拳毛倒睫。脾胃風熱堪嗟。
內障皆因色慾。食毒醫瘴來遮。胥肉攀睛突出。

酒浸心肝損傷

此般症候宜識

明師用藥無差

脉云

左寸洪數心火炎也。關弦而洪肝火旺也。右關俱弦
洪。肝木挾相火也。兩尺浮洪腎水竭而風熱盛也。

立方

明目流氣飲 治男婦翳障癢澀難開迎風冷淚時
氣暴赤視物不明

大黃	牛蒡子	川芎	甘菊
白蒺藜	細辛	荆芥	防風

玄參

山梔仁

黃芩

甘草

各一錢五分

蔓荆子

木賊草

草決明

蒼朮

各一錢

水煎食後服

掃雲開光散

點一切翳障并時氣熱眼

蘆甘石

二兩水漂淨火煨重便浸五次

海漂硝

去麋殼

明礬砂

乳香

沒藥

薄荷

麝香

東丹

各六錢

血礪

三錢

硃砂

二錢

珍珠

二兩

各製為極細末以人乳點大小眼皆

洗心湯

治心經積熱邪氣上攻眼澀睛痛

白朮

當歸

大黃

赤芍

荆芥

甘草

薄荷

各一錢五分

水煎空心服

瀉肝飲

治目痛坐臥不寧

大黃

五錢

荆芥

一兩

甘草

二錢

水煎溫服

補心丸

治眼痛不已日久無光

當歸

一兩五錢

川芎

五錢

粉草

一兩

生地

一兩

遠志

一兩

棗仁

一兩

人參

五錢

栝子仁

五錢

丹臺玉案

三卷

眼疾

五十八

辰砂 五錢 琥珀 五錢 茯神 八錢 南星 五錢

半夏 五錢 石菖蒲 一兩

右為末蒸粉為丸如棗豆大金箔朱砂為衣每服八十九燈心湯送下

瀉心散 治眼赤疼痛

甘草 二錢 澤瀉 五錢 黃連 五錢 草決明 一錢

共為末每服二錢燈心湯調下

洗肝飲 治風毒上攻赤腫流淚昏暗羞明突起高

睛

甘草 煨 大黃 煨 山梔 各一錢五分

防風 薄荷 羌活 川芎

當歸 各一錢

水煎食後服

瀉肝飲 治烏風瘴眼蟹睛疼痛

防風 羚羊角 遠志 桔梗

黃芩 甘草 赤芍 各一錢 人參

細辛 各二錢

水煎食後服

補肝飲 治烏睛陷者。

甘菊

甘草

山藥

熟地

各二錢

防風

栝子仁

茯苓

枸杞子

白芍

柴胡

各一錢

水煎溫服。

鎮肝飲

治黑風內障。

菊花

旋復花

石決明

芫蔚子

各一錢

車前子

蔓荊子

枸杞子

各一錢

燈心三十莖。食後服。

瀉肺湯

治浮翳白障。赤脉拳睛。

當歸

赤芍

黃芩

各一錢二分

桔梗

麻黃

枳殼

桑白皮

葶藶

子各八分

玄參

地骨皮

旋復花

生地黃

白芷

各一錢

水煎食後服。

清肺飲

治衝風淚出。

粉草

細辛

各一錢

川烏

五分

荆芥

木賊草

殭蠶

旋復花

黃芩

各八分

水煎溫服。

補肺散 治白瘵點珠

人參 三錢 白茯苓 白石脂 白朮

杏仁 蒼朮 各一錢 蛤蚧 車前子

旋復花 玉屑 各一分 北五味 二十粒

黑棗二枚。食後服

平腎散 治日中不清視物不明。只可服五劑。

黑丑 二錢 澤瀉 當歸 枸杞 各二錢

白丑 苦參 各八分

水煎食後服

明目益水丸 治一切患目腎水枯竭。

北五味 熟地 肉蓯蓉 酒浸 枸杞子

杜仲 鹽水拌炒 沉香 各一兩 石斛 二兩 青鹽

磁石 各四錢 兔絲子 三兩

共為末蜜丸每服二錢空心白滾湯下

補腎丸 治腎虛眼目昏花近視不明

小茴香 巴戟天 肉蓯蓉 牡丹皮

枸杞子 破故紙 各二兩 沙苑蒺藜

生地

熟地各四兩辰砂六錢

右為末蜜丸辰砂為衣每服三錢空心白滾湯下

羊肝丸 治內障眼疾

羯羊肝一副竹刀去膜瓦上焙細辛 熟地

羌活 獨活 北五味 菊花

草決明各二兩杏仁去皮尖枸杞子

青箱子 芫薺子各一兩當歸二兩五錢

萎蕤仁去殼麥門冬去心地膚子各一兩二錢

右為末蜜丸每服二錢日進三服

椒紅光明丸 治瞳仁黃風內障

川椒 夜明砂 海金沙 菊花

石決明 川芎 蟬蛻 白蒺藜

防風 蒼朮 熟地 當歸

車前子 川烏各一兩玄精石三錢黃連

珍珠各五錢人參八錢

右為末蜜丸每服三錢空心木香湯下

潤光丸 治兩皆紅腫赤灌瞳仁

琥珀一兩防風 玄參 當歸

蔓荆子

牛蒡子

草決明

各一兩
五錢

甘草

蒼朮

大黃

菊花 各一兩
二錢

右為末蜜丸每服三錢空心白滾湯下

疝鼻散 治拳毛倒睫

木鱉子

一箇去殼為末綿裹塞鼻左塞
右右塞左其拳毛各分上下

上清撥雲丸

治風熱昏花迎風流淚羞明怕日

羚羊角

犀角 各二兩

牛黃

入錢

川黃連

酒炒

黃芩

酒炒

川芎

白芷

當歸 各一兩
五錢

菊花

大黃 煨

防風

草決明

羌活

生地

滑石

地膚子

蟬蛻

各一兩

右為末蜜丸每服三錢臨臥服

復明膏

點一切翳障并時氣等眼

川黃連

五筋煎極
濃去渣

秋梨

二十觔
取汁

二汁同雪水熬成膏入熟蜜一觔人乳五碗羊膽

汁一碗和勻曬微乾成餅用井花水磨點

眼皮紅爛者瀉脾火為主君以石膏煨熟大黃黃連

白芷連翹佐以生甘草當歸

兩背肉綻者。瀉心火爲主。君以黃連。佐以赤茯苓。連翹。甘草。麥門冬。燈心。

白上紅筋者。瀉肺火爲主。君以黃連。桑白皮。佐以連翹。黃芩。升麻。山梔。甘草。菊。

兩輪腫痛者。瀉肝火爲主。君以黃連。龍膽草。佐以柴胡。青皮。草決明。生甘草。

瞳子昏暗作痛者。瀉腎火爲主。君以澤瀉。黃柏。佐以連翹。黃連。升麻。甘草。

連翹。多淚作痛者。疎風爲主。君以防風。荆芥。佐以薄

荷。紫蘇。黃連。甘草。

瞳子散大無光者。以補氣爲主。君以當歸。五味子。佐以黃柏。天麥門冬。

乾枯少潤者。補血爲主。君以當歸。生地。佐以天麥門冬。黃連。升麻。人參。甘草。連翹。

羞明喜暗者。大補爲主。君以人參。白朮。當歸。生地。白芍。佐以黃柏。知母。黃耆。大棗。

眼眶脹痛者。抑肝順氣爲主。君以青皮。黃連。佐以柴胡。草決明。龍膽草。

目眩不定者。散風去痰爲主。君以天麻。半夏。防風。佐以柴胡。黃芩。甘草。

喉痺門

附失音

附骨鯁

肺氣通於咽。胃氣通於喉。蓋咽以出氣。喉以納食。乃一身之關隘也。閉塞而不通。則道路阻絕。飲食難下。或生安危。胥此係焉。此人之至急者也。使不早治。則不救矣。而喉痛之症。惟喉風。猶急。乳蛾次之。若左右皆乳蛾。是亦纏風也。纏風云者。喉中皆纏緊。惟有一線之通。乳蛾云者。腫處如蛾形。猶有可通之路。要其

致病之由。皆因平日感受風熱。積之既久。留於上焦。一時未發。乘機而動。醉後而重。醉勞後而復。勞動其相火。相火一熾。而平日所積之風熱。一齊而起。痰血騰湧。如潮之至。結於咽喉。外不得吐。內不得下。爲腫爲痛。苦楚呻吟。飢不能食。渴不能飲。煎劑卒難奏功。丸散安能施效。病勢已逼。將立而視其死矣。必須用刀針以決之。庶可以洩其毒。而救其熱。然後治之以藥。乃可愈耳。

脉云

喉痺之脉兩寸洪溢。上盛下虛。脉忌微伏。

立方

祛火通關飲。治喉痺不通。飲食不下。

黃連

玄參

山豆根

桔梗

牛蒡子

枳實

各二錢

大黃

玄明粉

瓜蒌仁

各三錢

薑二片。水煎溫服。

立消散

白礬砂

燈心灰

以燈心塞入罐內。固濟煨之。煙紅為度。

風化硝

黃柏

青黛

冰片

各等分

右為極細末。以盧管吹入喉中。

吐法

青魚膽

具一膽 礬礬

二錢

牛黃

冰片

各五分

以三味放入魚膽內。線紮其口。懸於當風處。陰乾為末。以雞羽蘸藥點喉中。即大吐痰血立愈。

又方

白礬

十勒巴豆肉十五枚同炒過去巴豆

以鷲毛蘸陳醋煨礬。薑汁皂角末引吐立消。

又方

土牛膠搗汁灌下吐痰即消。

黃法

巴豆末一兩。攤在麤草紙上。一頭巴豆。一頭無巴豆。緊緊捲作一巨。長可二寸餘。將巴豆一頭點火。即吹滅。其無巴豆一頭。令病人含口內。使人對火。輕輕吹之。令烟透入喉中。立破膿血而寬。

屢驗方

治纏風并雙乳蛾。

榆樹上刺毛高一箇。剪病人指甲脚爪。如左邊盛。

剪左邊手足。右邊盛。剪右邊手足。若雙蛾。左右皆剪。用食鹽少許。同入鍋內煨過為末。吹入患處。以手拍其後頂。如蛾在左。拍左。在右。拍右。雙蛾兩邊皆拍。即時破潰。痰血立出而愈。

神仙飲

治陰經喉痺。服涼藥反痛者。

黃耆

人參

白朮

知母

附子

各一錢

當歸

柴胡

玄參

各一錢五分

水煎溫服

鍼法

經喉風水不能通。或在項刺一刺即愈。

刺少商穴。在大指端內側。去甲如韭葉許。白肉宛宛中是也。兩手皆刺出血。其水米卽通。蓋此穴乃手太陰肺經之穴。直通咽喉。鍼式用三角柳葉匾薄者。

附失音

神水丹

天花粉 玄參各三錢 青黛 地骨皮各二錢
冰片四分 牛黃一錢 知母 川貝母各六錢
右為末以藕汁熬膏為丸如彈子大噙化潤下

清爽化痰湯 治喉音不清

玄參 桔梗 甘草各一錢 生地二錢
柯子肉八分 麥門冬 橘紅 百部各一錢五分
燈心三十莖不拘時服

附骨鯁

化骨神丹

楮實子一兩為末 雷梅肉三兩

右共為丸彈子大噙化嚥下

又方

宿砂

威靈仙

黑沙糖

各等分

酒煎時時呷之其骨立消。

神秘方 不拘諸骨立化。

千年矮

即平地木

不拘多少搗碎酒煎盡醉服

之即愈。

又方

單治魚骨鯁。

橄欖核為末以順流水調服二錢。

齒痛門

齒與牙同類而異名齒者內床也牙者外版也內床

能嚼而外版無為能嚼則恒勞無為則恒逸恒勞則易傷而常逸則無恙故痛多在內床而罕於外版也。味之辛酸氣之厚薄質之堅脆性之冷暖一咀嚼間而飲食之毒流滲於齒縫其有餘物芟少偶乾於中未能即脫者又於當風處剔之甚至有剔傷出血者。幾何而不為致病之階也故齒痛之病風痛居多風入於內即時腫痛連頰咀嚼難合此人之所最苦者也。而風症之外又有火與蟲之屬焉風從外得火自內傷而蟲又火之所化也何以言之蓋齒者骨之苗。

腎之餘也。而齒根之肉。當縫之深處。則屬於足陽明胃之經。今之患齒者。豈真齒之痛也。齒之堅。尤甚於骨。非血非筋。乃物之至頑而木者。何痛之有。痛之所。在則在於齒當縫之深處也。以陽明有火。熱蒸於胃。胃經受熱。上通於齒。故其痛也。必臭穢難近。根肉深。赤齒縫流水。而味如鹽。名爲牙宣。而多糜爛。此得之於胃火而成者也。其或癢或痛。或大痛難忍之際。又忽然痛止。而如無恙者。非屬於風。非屬於火。其蟲之爲蠹。是蟲也。又何從而生之。必有些須食物。留於齒。

根爲火煨煉。藉血氣而成也。嚙其齒則齒碎。嚙其肉則肉疼。其或不嚙而微痛。則肉癢。此蟲痛之所以異於風與火也。或不痛而焦枯脫落者。非胃火也。乃腎氣衰弱。不能固其根也。是以老人之齒多疎豁而少壯者。則無焉。觀於此。則可以施治矣。

脉云

右關脉洪數。胃火上炎。浮洪乃是風熱。尺脉洪大而虛者。腎經不足。主齒動搖。相火上升作痛。

立方

祛風抑火湯 治齒縫脹腫作痛。

防風

荆芥

薄荷

白芷

各一錢五分

升麻

八分

黃芩

黃連

各二錢

甘草

五分

蔥頭二枚食後溫服。

清胃湯

治胃中積熱平昔喜酒者。

石膏

煨熟

白芷

升麻

各一錢

乾葛

黃栢

各二錢

甘草

五分

水煎食後服

神妙飲

治牙疼不可忍牽引頭面發熱發腫者。

生地

當歸

細辛

各一錢五分

骨碎補

防風

赤芍

川芎

槐花

各二錢

升麻

知母

各二錢

水煎溫服

蠲痛飲

治牙齒疼痛浮動出血。

甘菊

二錢

大黃

石膏

煨各三錢

竹茹

防風

各一錢

水煎溫服

又方

治齒疼并出血

丹臺玉案

三卷

齒痛

圭

青鹽四兩煨過。淬竹瀝中取起炙乾。又淬又炙。收盡竹瀝。四鍾為度。朝朝擦之。

又方 治齒縫出血不止。

竹茹四兩醋浸一宿。少少含之。其血即止。

定疼散 治蟲牙作痛不可忍。

細茶葉

朴硝

白芷

細辛

鍾乳石

花椒

冰片

麝香

各八分

為末。每日早晚擦之。

三黃丸 治一切火痛。方見三消門。

又方 治牙根搖動欲落。

石膏

四兩

青鹽

北細辛

羊脛骨

白芷

各一兩

雄鼠骨

五錢

右為末。清晨擦。有涎水時多嚼多漱。如有搖動者。將牙咬定。擦之。自然堅固。

烏鬚固齒神妙散

秘授

當歸

生地

母丁香

子丁香

青鹽

旱蓮草

細辛

沒食子

茯神

去皮為末。以桑椹取汁浸晒九次。各等分。

右為細末。清晨擦牙。即用滾水多漱。嚥下。未白者。永不白。已白者。擦上半載。鬚髮皆黑。齒牙堅牢。

珍珠散 治走馬牙疳。

人中白 二錢 銅青 五分 珍珠 麝香

牛黃 各三分 南棗 煨灰六分

右為極細末。吹於患處。

神秘丹 治牙疼立止。

真川椒 雄黃 蟾酥 麝香

草撥 各等分

右為極細末。以棗肉拌藥為丸。如黍米大。塞一丸於患處。其蟲化為黃水。

口門 附舌 附唇

脾開竅於口。飲食厚味。則脾氣凝滯。加之七情煩擾。過度。則心火炎盛。而口瘡生矣。大要有實熱。有虛熱。脈洪而數。迺實熱。脈洪而虛浮。中氣不足。又口中味有覺苦甜酸辛鹹淡澀。不同宜細辨之。口苦兼生瘡者。心熱也。若謀慮不決。而苦者。膽熱也。口甜者。脾熱也。口酸者。肝熱也。亦有飲食停滯。而作酸者。口辛者。

肺熱也。口鹹者。腎熱也。口淡者。脾虛也。口糜者。膀胱移熱小腸也。口臭者。積熱蘊於胃膈而冲於口也。又有飛絲入口。治各不同。

立方

清膈湯 治口瘡作痛上焦實熱。

黃連

黃栢

枳殼

石膏

玄參

大黃

各三錢

甘草

一錢

水煎不拘時服。

千金衛化丸 治上焦實熱口內潰爛飲食難進。

玄明粉

石膏

煨紅黃連煎汁

玄參

各二兩

白礪砂

薄荷葉

黃栢

各四錢

冰片

五分

右為末。生蜜為丸。如龍服大。每服一丸。衛化外用。

珍寶散 搽上即愈。

甘露湯 治中焦虛火。服涼藥反盛者。

人參

白朮

升麻

附子

黃耆

丹皮

各二錢

棗二枚煎八分。食遠服。

紫金丹 治下焦陰火炎上。日晡潮熱。口內起泡。

珍寶散

黃栢 知母 當歸 生地
天門冬 麥門冬 玄參 白芍
右為細末如彈子大噉化潤下。

珍珠 三錢 珊瑚 各一錢
青黛 各一錢 冰片 五分

黃連 人中白 各二錢
煨過

右為細末凡口內諸瘡皆可搽之。

濟急飲 治飛絲入口令人口舌生泡。

紫蘇葉細嚼白湯嚥下如此數次即愈。

清火育心湯 治口苦。

黃連 遠志 扶神 人參 各一錢
五分

麥門冬 棗仁 地骨皮 各八分

水煎溫服。

清脾抑火湯 治口甜。

黃連 青皮 黃芩 黃栢 各二錢

燈心三十莖食遠服。

清金飲 治口辛。

百部 黃芩 桑皮 各一錢
桔梗

枳殼

麥門冬

石膏 各二錢

水煎溫服。

苓木飲 治口淡。

白茯苓

雲木

人參 各二錢

白芍

山藥

芡實

甘草 各一錢

黑棗二枚。食遠服。

調肝飲 治口酸。

小柴胡

甘草

當歸

青皮

龍膽草

枳殼

各二錢

水煎溫服

滋腎丸 治口鹹。

當歸

生地

人參 各一兩

杜仲

石斛

枸杞子

山茱萸

破故紙 各二兩

五味子 八錢

何首烏

龜板膠 各一兩

五錢

右為末煉蜜為丸。每服三錢空心滾湯下。

効驗湯 治口糜。

陳皮

麥門冬

桔梗 各一錢

玄明粉

木通

黃柏

山梔

連翹

丹臺玉案

三卷

四

美

生地 各二錢

水煎溫服

清氣丸 治口臭

青皮

黃連

黃芩

甘草

各五錢

石膏

檀香

各一兩

右為末。蜜丸如彈子大。每服一丸。細嚼滾湯下。

附舌

心之本脉係於舌根。脾之脉絡係於舌兩傍。肝脉循陰氣絡於舌本。腎之津液出於舌端。分布五臟。心實

主之。故曰諸經皆會於口。外感風寒傳經者。則舌胎白白而黃變黑者。厥卒中者。則舌強而短。舌卷不言者。厥內因七情氣鬱。有舌強壅腫或短者。痰熱肺脹也。有舌上出血如泉者。肝熱也。有舌上生瘡破裂者。心熱也。有舌胎乾澀如雪者。脾熱也。舌上有一二黑點者。腎虛也。又有木舌。舌腫滿口不能轉動者是也。有重舌。附舌根而重生一物。口不能言。飲食不進。又有舌出過寸者。各有治法。

立方

清順湯 治舌強推腫

黃芩 麥門冬 黃連 連翹

山梔仁 生地 各二錢 大黃 四錢

薑三片不拘時服

又方 治舌上出血

蒲黃 生地 麥門冬 當歸

人參 甘草 各二錢

臨服加藕汁一鍾

又方 治舌血不止

槐花 炒過為極細末 搽上即止

又方 治舌胎

生薑蘸水指擦再煎黃連水漱之

犀黃飲 治木舌腫脹滿口

玄參 犀角 升麻 甘草 各二錢

大黃 五錢

水煎不拘時服

立消散 治重舌

皂角刺 朴硝 黃連 冰片 各等分

升臺玉案 三卷 女門舌血熱散 女門重舌散

右爲末。搽患處。再煎黃連湯。時時呷之。

縮舌散。治舌長過寸。

冰片 二錢 硃砂 三錢

右爲細末。猪膽汁調敷。卽收。

又方

雞冠刺血。盛盞內浸舌。卽縮上。

附脣

脣皆屬於脾。脾受邪則脣爲之病。若風勝則脣爲之動。寒勝則脣爲之揭。熱勝則脣烈。燥勝則脣乾。氣鬱

則生瘡。血少則慘而無色。上脣內有白點。蟲食上部。下脣內有白點。蟲食下部。蘭脣緊小不能開合。飲食不得。不急治。卽死。毋忽。毋忽。

立方

瀉胃湯 治脣腫乾烈便秘煩渴

葛根 桔梗 枳殼 各二錢 大黃 二錢

前胡 杏仁 各一錢

水煎食後服。

又方 治脣不潤

生地 當歸 天門冬 麥門冬

黃耆 各二錢 升麻 六分

水煎食後服。

又方 治唇生白點。

蕪荑 炒 乾漆 炒烟盡 各等分

右為末每服五分滾湯調下。

又方 治繭唇。

青皮 煨灰 橄欖 煨灰各等分

右共和勻猪脂調搽。

又方 補缺唇舌。

鮮蟹 煨灰 乳香 五分 沒藥 四分

右為極細末搽上即生肉。

丹臺玉案卷三 終

丹臺玉案

三卷

卷三

八十



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



丹臺玉案卷之四

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著

嵎峨縣今友生游士進旂揚父較正

平湖縣庠盟弟俞允昌爾迪父

仁和縣庠兄 有緒武卿父 全閱

諸血門

吐血 便血 尿血 血汗 血潛
鼻血 五竅出血

血乃水穀之精化於脾生於心藏於肝布於肺施於
腎善調攝者不妄作勞則血之運於身者無一息之
停自然肌膚潤澤筋脉和暢何病之有後生少年輩

恃其壯盛。恣情酒色。而貧窮勞苦之人。又不暇自惜。涉遠負重。奔走於衣食。而無日夜之安寧。其能不傷於血乎。傷於上部。則胃臆痛。傷於中部。則兩脇中脘痛。傷於下部。則小腹痛。由是吐血。衄血。便血。尿血。之病作矣。夫吐血與衄血無異。但所出之經不同。而要之。皆暴於脾也。脾能裹血。不能使血之不升。胃火上蒸。則血從口出。肺火上騰。則血從鼻出。然有輕重之差焉。衄血太甚。始於吐血。無異不甚不足為慮也。至於吐血。雖不甚。而實為可畏。用藥者其可以混施耶。

夫吐血固甚於衄血矣。而就其吐血言之。則亦自有輕重。如一咯一塊者。胃口血也。其所從來者近。痰中見血色如瑪瑙而成塊者。亦胃口血也。其所從來者亦近。二者勢若可畏。而猶可調理。法當任其自出。又必看其色不鮮者。舊血也。勿以藥止之。其色鮮者。新血也。所積者必不甚多。宜以藥止之。蓋舊血終不歸經。不任其自出。及於增劇。新血終當歸經。若所出者多。則損人矣。故宜藥止之。以引血歸經。此皆可以調理而愈者也。若痰中見血。或一點之小。或一絲之細。

語其勢若無可畏。而病根反深。此血非胃口之血也。乃從肺臟中來。肺爲虛火所逼。血從痰出。故也。其所出者亦少也。蓋肺臟以氣爲主。本多氣而少血。是以以枯而無以領一身之氣矣。所害不亦大乎。至於五竅出血者。勢如潮湧。耳目口鼻一齊逆流。藥不及煎。針不及下。歿在頃刻間。此猶血症之至極者也。醫者豈可無急治之法。若夫滲入腸間。從下部而出。則爲腸風。爲膿毒。爲溺血。其病易治。非若上焦之血也。又

有從汗孔出者。爲肌衄。從舌出者。爲舌衄。從委中穴出。爲臑血。皆有治法。諸血見若身熱。脈大者。難治。是火邪熱甚也。身涼。脈淨者。易治。是正氣復也。治法未見血。則宜消。宜和。既見血。則宜涼。宜止。舊血未盡。則化其血。新血未盡。則補其血。因其勢之輕重。而爲緩急之施。則無不中矣。若婦人崩漏。女子月信。則自見本科。而此不及載云。

脉云

失血之症。脉皆見芤。芤在何經。血亦從何經。只宜微

細不宜浮大。訣云。鼻衄吐血沉細宜。忽然浮大必傾危。

立方

涼血抑火湯 治吐血衄血初起氣盛上逆不能下降歸經。

當歸

赤芍

各二錢

大黃

三錢

黃芩

黃連

丹皮

生地

川芎

各一錢五分

燈心三十莖臨服加藕汁半椀。

必勝飲 治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血并

皆効驗。

生地

當歸

各三錢

川芎

一錢

蒲黃

炒黑二錢

小蓳

取汁半酒椀

加烏梅五箇空心服。

茜根散 治吐血衄血錯經妄行并婦人月信不止。

茜草

阿膠

各二錢蛤粉炒

側柏葉

炒過一錢

生地

甘草

黃芩

各一錢五分

加童便半酒椀温服。

犀角地黄湯 治怒氣傷肝積熱不散鬱於經絡隨

氣湧泄。為吐血衄血便血等症。并各經宜加錄後。

懷生地 犀角 丹皮 赤芍 各二錢

加童便半杯空心服。心經血加麥冬黃連。肝

經血加青皮黃芩。脾經血加百合白芍。肺經

血加百部天冬山梔。腎經血加知母黃柏玄參

青蒿。膽經血加柴胡竹葉。胃經血加乾葛大

黃。心胞絡血加茅根丹皮。大腸經血加槐花

地榆。小腸經血加山梔刺楸木通。膀胱經血

加茅根牛膝。三焦血加地骨皮連翹。吐血不

止。陳棕灰炒黑荆芥穗。蓄血不消。加桃仁大黃。

四生丸 治血熱妄行吐咯不止。

生栢葉 生荷葉 生地黄 生艾葉 各等分

四味共搗極爛。丸如芡實大。每一丸白滾湯下。

保真神應丸 治男婦吐血咳嗽氣喘痰涎壅盛骨

蒸潮熱面色痿黃日晡面熾睡臥不寧服之神效。

遼五味 揀淨一觔 杜仲 薑汁炒 阿膠

白朮 各二兩 貝母 白茯苓 花椒目

荷葉 煨灰存性 懷生地 各四兩用栢子仁三錢砂仁三錢絹袋盛之入生地同煮

棟去栝子
仁砂仁

右為末。以具棗肉。同地黃汁搗為丸。每服三錢。空心白滾湯下。

急濟飲 治吐血如泉之甚。一服立止。

小蘗 搗汁 童便 磨墨汁 藕汁 各半

沉香 磨一錢

作二次緩緩呷下。

神寶飲 治風邪入於胃經。下血鮮紫。及腸胃濕毒。

下如豆汁。

蒼朮 白朮 人參 各五錢 茯苓

當歸 白芍 川芎 槐角 炒黑各一錢五分

升麻 一錢

水煎食前服。

槐花散 治腸風臟毒下血。

扁栝葉 炒黑 槐花 枳殼 炒 荆芥穗 炒黑 各等分

右為末。每服三錢。空心白滾湯下。

對金飲 治大腸下血。

黃連 槐花 蒼朮 各一錢二分

甘草

白朮

厚朴

枳殼

陳皮

藿香

當歸

升麻

水煎食前服。

栢灰散 治臟毒下血諸藥不効。

側栢葉

取發春東夏南秋西冬北煨灰存性

每服二錢空心滾湯調下。

仙露飲 治小便出血。

生地

蒲黃

黃連

升麻

小薊

旱蓮草

川芎

各一錢

水煎空心服。

又方

當歸

川芎

各一錢五分

益母草

阿膠

人參

劉寄奴

龍膽草

荆芥穗

各二錢

水煎溫服。

固元湯 治血從毛孔中出名曰血汗此元氣不足。

人參

五味子

各五錢

黃耆

甘草

棗仁

各二錢

水煎溫服。

又方 治血汗初起。

人中白二錢 人參一兩 麝香半分 臨服加入

水煎溫服

靈秘散 治偶然抓傷血絡血出不止名曰血潛若不急救血盡即危。

糞桶籬煨灰三錢

胎髮煨灰一錢 煮酒餅上紙煨

右為末和勻摻上自服犀角地黃湯方見前

寸金散 治臭衄不止

黃藥子五錢 土馬稔五錢 有足者生

生甘草一錢

右為末每服二錢新水調服。

又方 伏龍肝半升以井花水大碗淘取汁和頓服。

又方 韭汁飲之立止吐血亦妙。

又方 頭髮燒灰吹入鼻中即止。

五竅出血以井花水當面連噴幾口急分開頭髮用

草紙數層蘸醋令透搭在顛門其血即止。

諸虛門

諸虛先要辨陰陽血陰而氣陽也有暴虛而無傷損

者易復。有虛而虧損者亦可補益。惟久虛而傷壞者必保養。僅可半愈。多汗又形肥而面浮白者陽虛。形瘦而面蒼黑者陰虛。男子久病氣口脈弱則死。強則生。女人久病人迎脈強則生。弱則死。虛症必食少神昏遺精潮汗痰嗽腰背胷脇筋骨痛。但見一二症便是陽損。自上而下。一損於肺則皮聚而毛落。二損於心則血脈虛少不能榮於臟腑。婦人月水不通。三損於胃則飲食不能消。尅不爲肌膚治宜酸苦。若鹹過脾則胃則不可治矣。陰損自下而上。一損於腎則骨痿不

能起於床。二損於肝則筋緩不能自收持。三損於脾則飲食不能消。尅不爲肌膚治宜酸苦。若鹹過脾則不可治矣。大要心肺損而色憊汗多者爲陽虛。肝腎損而形瘁汗多者爲陰虛。經云損其肺者益其氣。損其心者補其榮。血損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。古庵云肺脾主氣。肺惡寒而脾惡濕。則溫寒燥濕之藥是補肺脾。而瀉心腎也。心腎主血。心惡熱而腎惡燥。則清熱潤燥之藥是補心腎。而瀉肺脾也。要之陰陽損傷皆水火不

濟火降則血脉和暢。水升則精神充滿。或心腎俱虛。或心脾俱虛。或肺腎俱虛。或五臟俱虛。但以補和心腎為主。兼養脾胃。則飲食進而精神氣血生矣。

脉云

虛人脉多弦。弦濡大而無力者為氣虛。沉微無力為氣虛甚。多在右手上見。脉弦數而無力為血虛。脉滑而微為血虛甚。此多在右手上見。或寸微尺大而緊者。血虛有火。

立方

十全大補湯

治氣血兩虛。并病後虛極者。

人參

黃耆

茯苓

白朮

各二錢

芍藥

當歸

川芎

熟地

各一錢五分

甘草

肉桂

各一錢

棗二枚。薑三片。煎服。

八珍湯

治氣虛血少。四肢無力。

生地

當歸

川芎

芍藥

各二錢

人參

白朮

茯苓

甘草

各二錢

棗二枚。煎服。

黃耆湯 治五臟虛寒。四肢消瘦。皮毛枯澀。津液不

通。脈氣微弱。

黃耆

白朮

人參 各三錢 生薑 五錢

附子

肉桂

各二錢

棗十枚煎服。

補中益氣湯 治中氣不足。勞倦傷脾。四肢乏力。飲

食少進。久泄不止。

當歸

黃耆

人參 各二錢 白朮

陳皮

柴胡 各二錢 升麻

甘草 各八分

棗薑煎服。

滋陰抑火湯 治血虛火盛。朝涼晚熱。精神減少。睡

臥不穩。

當歸 三錢

知母

麥門冬

天門冬

地骨皮

丹皮

棗仁

柴胡

天花粉

人參

各二錢

燈心三十莖。食遠服。

六味地黃丸 治腎氣虛弱。脾經不和。一切損傷。虛

煩骨蒸。

山茱萸

山藥

各四兩

熟地

八兩

澤瀉

丹皮

茯苓

各三兩

右為細末。煉蜜丸。每服三錢。空心服。

生脉散 治虛損之人。口苦咽乾。脉息微弱。不時可

以當茶飲之。

人參

遼五味

麥門冬

去心各二錢

水煎温服。

古庵心腎丸 治水火不濟。心神恍惚。血虛氣弱。寒

熱往來。

生地

熟地

山藥

炒

茯苓

石斛

枸杞

龜板

羊酥炙

牛膝

丹皮

各二兩炒

黃連

酒炒

鹿茸

各一兩

酥炙

當歸

澤瀉

黃柏

鹽水炒

甘草

各一兩五錢

右為末。蜜丸。每服三錢。空心鹽湯下。

虎潛丸 治真元不足。榮衛不調。氣血虧損。陽事痿

弱。

黃柏

知母

熟地黃

龜板

各三兩

虎脛骨

一對

鎖陽

四兩

當歸

陳皮

白芍

牛膝

各二兩

右為末以羊肉為丸每服四錢空心滾湯送下。

固本保元丸

治諸虛百損精血不固元神不足四肢乏力肌肉消瘦朝涼暮熱夢寐遺精陽事不舉。

人參

茯苓

各三兩

紫河車

具二 枸杞

五味子

知母

鎖陽

仙茅

當歸

各二兩

生地

四兩

黃耆

杜仲

各一兩

天雄

一枚

甘草

八錢

右為末蜜丸每服三錢空心鹽湯下。

補天膏

治腎氣不足下元虛乏臍腹疼痛脚膝緩弱肢體倦怠面色痿黃腰疼背脹。

雲朮

當歸

生地

牛膝

沉香

各三兩

人參

沙參

天門冬

阿膠

山茱萸

核桃肉

龍眼肉

各四兩

紫河車

二具

黍米金丹

一粒即小兒出世口內大血珠

右為咀片以桑樹柴文武火煎熬成膏不時可服。

天王補心丹

治心經血少神思倦怠恍惚易忘并

讀書人燈窗刻苦至癡久服之亦令人聰明。

白茯苓

人參

玄參

遠志肉

丹參

桔梗

各一兩

當歸

遼五味

麥門冬

天門冬

生地

栢子仁

酸棗仁

各二兩

右為末蜜丸。硃砂為衣。每服三錢。空心白滾湯下。

癆瘵門

附夢遺鬼交

盜汗自汗

骨蒸朝熱

癆者勞也。猶妄作勞以成病也。從病從勞故名曰癆。勞力負重則傷血。而氣亦重傷。然精猶未傷也。勞力以行房則傷精。而血氣其能以獨不傷乎。或勞力以

負重而復勞力以行房。更失於檢束而不避風寒。侍其強壯而縱欲。麴蘖則精神與血俱傷。而真元剝削。風寒麴蘖交次。而虛火易熾。病根日深。病已不可拔。猶不知戒。而肆情逞慾。則心肝肺腎損矣。心損則精神不守。恍惚。肝損則失血少睡。面白無色。肺損則聲音低小。言語不續。腎損則腰膝軟弱。小便短數。而虛損之症成矣。虛損者癆瘵之始。癆瘵者虛損之終。由勞傷而成虛損。由虛損而成癆瘵也。癆瘵之為病也。有咽乾喉癢。頻嗽而無痰者。有哮喘滿急。氣壅而不

得眠者。有痰中見血。一咳而卽出者。有面常類熱。忽
灑淅而似寒者。有胃前如火。而兩足冰冷者。有腰疼
背痛。而筋骸無力者。總屬於虛。至於夢遺鬼交。盜汗
自汗。骨蒸潮熱。又屬非虛之所致耶。究而言之。夢遺
鬼交。虛不暇言矣。然何以有是夢。有是交。而又有是
精耶。蓋夢者。心之神也。鬼者。肝之魄也。精者。腎之液
也。心之火。君火也。肝腎之火。相火也。相從君之令者
也。君火一動。相火從之。而夢遺鬼交之病起矣。盜汗
自汗。虛不暇言矣。然均之爲汗也。何爲而有盜與自

之異耶。蓋盜汗者。睡去卽出。醒來卽收。盜之偷竊乘
其虛隙。而惟恐人知。故有盜汗之名焉。而求其所屬
之經。則猶於心氣之不足。汗者。心之液也。心氣不足
則神不守舍。而液無所攝。故睡中出汗。一驚覺之間。
則心神漸定。故汗亦收也。自汗者。無睡無醒。自然濡
濕。故有自汗之名焉。較而論之。則自汗爲甚。是何也。
蓋盜汗本於心虛。而其真元猶未盡虛也。自汗則真
元耗散。腠理皆開。肺失統氣之權。不能固表。故毫竅
疎豁。汗流不禁。豈不大可畏哉。若汗出如膏。凝而不

流者。乃真元盡洩於外。而生氣以絕。死期至矣。骨蒸潮熱。虛不暇言矣。然何以使熱之蒸於骨耶。蓋骨之所屬者腎也。腎實則寒。腎虛則熱。骨熱龍火大旺。煎熬真陰。真陰既竭。熱無所容。流入於骨。故成骨蒸。骨蒸既久。上蒸於顛。顛赤而熱。則不救矣。蓋顛者骨之本也。骨本一枯。則腎經已絕。死期至矣。又有喉啞一症者。百無一生。傳尸一症者。九死一活。相思一症者。無藥可治。或平素有漏瘡。及下部忽生腫毒。與夫脾虛發腫。泄瀉者。皆難治之症也。

脉云

凡男子尺脉虛數。而寸沉微者。為癆。女子寸脉虛數。而尺沉微者。為癆。要之癆瘵。脉數或濇。細如潮汗。咳血肉脫者。殂。

立方

滋陰抑火湯 治陰虛火動盜汗發熱咳嗽吐血身

熱脉數肌肉消瘦酒色過傷已成癆瘵者

知母 人參 黃栢 天冬

麥冬 各一錢 貝母 生地 當歸

白芍

白朮

各一錢五分

煨薑灰

八分

加燈心三十莖溫服。

保真飲

治勞思虛損妄泄真元陰虛火動痰喘氣

急咳嗽吐紅。

遼五味

當歸

白朮

酸棗仁

紫河車

石斛

玄參

沙參

各一錢

紫苑

山梔

炒黑各二錢

人參

三錢

加童便一椀煎服。

驚甲地黃湯

治虛癆手足煩熱心下怔忡及婦人

血室有乾身體羸瘦飲食減少。

天冬

麥冬

驚甲

白朮

人參

白茯苓

柴胡

甘草

各一錢五分

肉桂

熟地

石斛

秦芫

各一錢

水煎溫服。

河車回天丸

治咽喉乾嗽灑淅似寒腰膝酸疼日

晡頰赤頭眩眼花吐血喘逆飲食少進肢體羸

人參 一兩

紫河車

具一

附子

八錢

當歸

白朮

兔絲子

杜仲

知母

黃栢各二兩

秋石

丹參

貝母

阿膠

白芍

遼五味

各一兩二錢

右為末。煉蜜為丸。每服三錢。空心白滾湯送下。

參附接命膏

治癆弱喉音啞者。飲食不進。肚腹疼痛。

痛

人參八兩

大附子

八兩

右為麤末。將天鷲油二觔。浸半月。慢火熬至焦黑。絞去渣。再熬至滴水成珠。再入東丹一觔。慢熬成膏。待溫加入麝香五錢。攤紵絲上。貼在丹田處。連

臍內服河車。天九癆瘵將危。貼此回生。

喻化紫金丹

治肺熱咯血。癆嗽不止。

川貝母

天花粉

紫參

玄參

款冬花

蜜蒙花

紫苑茸

各五錢

牛黃八分

青礞石

海粉

黃芩

甘草

桔梗

各三錢

右為極細末。煉蜜六兩為丸。如芡實大。每一丸喻

化潤

濟陰丹

治酒色過度。怒氣傷肝。陰虛火動。咳嗽吐

丹臺玉案

四卷 芳錄

式

痰咯血盜汗並皆治之。

紫苑

麥冬

遼五味

各四兩

人參 二兩

知母

青蒿 各三兩

紫河車

二具

右為細末。以陳荷葉煎湯為丸。每服三錢。空心白滾湯送下。

癆蟲治法

蓋因初起病癆之人。先為癆蟲所食。五臟而灰。既灰之後。五臟皆冷。蟲不能居。從鼻而出。鼻乃肺之竅。癆乃肺之病。故從其竅而出。其色赤。無翼而能飛。或有不見而着人者。以骨肉尋骨肉。

以同氣質同氣無藥可治。惟久人身上蛆食之。以絕其傳染。恨人不知。知者亦以臭穢而不用。其外無治法矣。

抽胎換骨丹

治虛癆補元氣固精壯腎夢寐遺精

並虛寒等症。久久服之。功效通神。

真川椒

二動揀去合口者并子新毛上焙乾

牛膝

一動八兩酒浸焙乾

懷生地

懷熟地

各四兩

右為末。不犯鐵器。煉蜜為丸。如梧子大。每日空心溫酒送下。三十丸服。至五十丸止。不可過服。

歌曰

其椒備五行。	其神通六義。	欲知先有功。
夜間且不起。	服至半載餘。	脚心汗如雨。
骨蒸及煩勞。	五臟無風氣。	明目腰不疼。
身輕心健記。	別更有異能。	三年精自秘。
顏貌若嬰童。	精爽更少睡。	但服此神妙。
一生無瘡痢。	若能志心服。	三屍自然棄。
更有九般蟲。	各各自迴避。	儻逢此色人。
第一須傳意。	雖未遇神仙。	初緣已得地。

附夢遺鬼交

夢屬心鬼屬肝精屬腎君火動則相火隨故有此症。治此症者不獨澀其精又必清心火不獨清心火又必補其虛惟虛故火易動。若火動故精易洩矣。

脉云

夢遺遺精當驗於尺微瀆精傷洪數火逼亦有心虛。左寸短小脉遲可生急疾便天。

立方

九龍丹 治夢遺鬼交精虛火旺久久不愈。

當歸身酒洗 枸杞子 金櫻子 石蓮肉炒

蓮花蕊各二兩 懷熟地四兩 芡實炒

白茯苓去皮 山查肉各三兩

右為末。煉蜜為丸。每服三錢。空心白滾湯送下。

清離固精丸 治夢遺日久。精神倦怠。面色痿黃。飲

食減少。腰酸背脹。久不育子。服之神驗。

黃連酒炒 草薢 人參各一兩 鹿角霜三兩

知母青鹽水炒 秋石 牡蠣煨過 茯神去心

遠志去心 石蓮肉炒 白朮各一兩五錢上炒

右為末。以荷葉煎湯。法為丸。每服三錢。空心鹽湯

送下。

附盜汗自汗

盜汗屬心。自汗屬肺。心神不守。故盜汗。肺氣不收。故

自汗。久久不愈。令人喪鬼。

脉云

汗脉浮虛。或濇或濡。自汗在寸。盜汗在尺。凡人脉帶

虛弱微細者。必有盜汗。

立方

歛汗育心湯 治盜汗養心血。

棗仁 扶神 知母 白芍

當歸 各二錢 牡蠣 麥門冬 沙參

甘草 各一錢 生地 五分

棗五枚煎八分溫服。

鎮元飲 治自汗固肺經。

人參 當歸 白朮 黃耆

五味子 各一錢 山茱萸 肉蓯蓉

麥門冬 黃栢 生地 各一錢

蓮肉十枚燈心三十三粒煎八分臨臥服。

當歸六黃湯 治盜汗自汗。

當歸 生地 熟地 黃芩

黃連 黃柏 各一錢 黃耆 三錢

棗五枚煎八分臨臥服。

護命散 治汗如神。

枯礬 一錢 五倍子 五錢 龍骨 煨過一錢五分

右為細末以津唾調寒滿臍中外用絹條紮定。

過夜即止。

附骨蒸潮熱

骨蒸潮熱。微有不同。骨蒸則無時而不熱。潮熱則如潮信之來。必有定期。熱者。

立方

調榮清熱飲 治骨蒸屢驗

丹皮 炒

地骨皮

當歸

鱉甲

酥炙

白朮

各一錢五分

黃耆

蜜炒

青蒿

知母

鹽水炒

人參

柴胡

各一錢

棗二枚煎八分不拘時服

靈應飲 治潮熱

茯苓

小柴胡

人參

生地

銀柴胡

黃芩

各一錢

知母

麥門冬

各一錢

棗五枚臨服加童便一椀

諸氣門

附氣滯

附鬱

人得天地之氣以成形。形者氣之所攝以寓者也。氣者形之所攝於充者也。二者固相為用而亦有輕重之差焉。形病氣不病。雖羸瘦而無害。氣病形不病。雖肥壯而可憂。是形在所輕而氣在所重也。人能安養

天和使五臟之氣均得其平。則何病之有。惟內傷七情外感六氣。而五臟之氣病矣。故心氣盛則煩燥不寧。口乾舌燥。肺氣盛則壅塞喘急。上膈煩滿。肝氣盛則暴怒時發。兩脇膨脹。脾氣盛則中脘痞塞。腹滿飽悶。腎氣盛則膀胱滿急。水道不通。皆氣之有餘者也。心氣虛則精神恍惚。夢寐不寧。肺氣虛則呼吸短淺。皮毛灑淅。肝氣虛則筋脉不和。頭空少睡。脾氣虛則飢不欲食。溏泄自利。腎氣虛則腰腦不能轉側。大便與小便前後牽引而微痛。此皆氣之不足者也。善醫

者調其氣而已。有餘者瀉之。不足者補之。又豈有虛虛實實之患乎。凡本經之虛實。或宜補而宜瀉。然虛則補其母。實則瀉其子。又不可不知也。

脉云

下手脉沉。便知是氣沉極。則伏瀕弱難治。其或沉滑。氣兼痰飲。又曰沉弦細動。皆氣痛。心痛在寸。腹痛在關。下部痛在尺。脉象顯然。

立方

利氣丹 治一切氣滯。心腹脹悶。疼痛嘔吐酸水。痰

涎不利。頭目眩暈。或下利膿血。大小便結滯不快。鬱結等症。

沉香 各二兩 木香 各二兩 黑丑 一兩半 生半熟

玄胡索 檳榔 枳殼 麩炒 莪朮

烏藥 各一兩 五錢 大黃 四兩 黃連 三兩

山查肉 一兩 八錢

右為末水丸。每服二錢。空心白滾湯下。

心氣虛則補之以炒鹽。心氣實則瀉之以生甘草。此本經之補瀉也。然肝為心之母。虛則以薑橘補肝。

脾為心之子。實則以黃連枳殼瀉脾。

肺氣虛則補之以五味子。肺氣實則瀉之以桑白皮。

此本經之補瀉也。然脾為肺之母。虛則以炙甘草。

大棗補脾。腎為肺之子。實則以澤瀉瀉腎。

肝氣虛則補之以薑橘。肝氣實則瀉之以芍藥。此本

經之補瀉也。然腎為肝之母。虛則以地黃黃柏補

腎。心為肝之子。實則以生甘草瀉心。

脾氣虛則補之以甘草。大棗。脾氣實則瀉之以黃連。

枳實。此本經之補瀉也。然心為脾之母。虛則以炒

鹽補心。肺爲脾之子。實則以桑白皮瀉肺。

腎氣虛則補之。以地黃黃栢。腎氣實則瀉之。澤瀉。此本經之補瀉也。然肺爲腎之母。虛則以五味子補肺。肝爲腎之子。實則以芍藥瀉肝。

合而言之。諸氣之病。分爲五臟。五臟之病。分爲諸症。皆不可以一節言也。此之所陳。乃補瀉之大畧耳。然此正藥之外。又不能無增益者焉。如炒鹽補心。甘草瀉心。固矣。而麥冬亦可以補心。黃連亦可。以瀉心。又如五味子補肺。桑白皮瀉肺。固矣。而人

參亦可以補肺。黃芩亦可以瀉肺。如薑橘補肝。芍藥瀉肝。固矣。而細辛亦可以補肝。黃連亦可以瀉肝。如炙甘草大棗補脾。黃連枳實瀉脾。固矣。而白朮亦可以補脾。石膏大黃亦可以瀉脾。如地黃黃栢補腎。澤瀉瀉腎。固矣。而杜仲亦可以補腎。茯苓亦可以瀉腎。臨病用藥。其可以執一耶。

附氣滯

蒼天之氣清淨不息。變爲雲霧爲雷雨者。山澤濕熱薰蒸也。人身元氣導引血液升降三焦周流四體。變

則為火。有升無降。以致膠乎咽膈。則為嘔咳。為痞滿。充乎臟腑。則為積聚。為疝癖。而心腹脇肋刺痛。蓄於下焦。則為腰痛。為脹墜。流乎經絡。則週迴刺痛。多因七情飲食鬱為濕熱。成痰與積。起初宜辛溫之藥。開鬱行氣。豁痰消積。稍久。即以辛平之藥和之。辛寒之藥折之。如此。則火易降。氣易平。而病根可除矣。

立方

開鬱理氣湯 治氣鬱不散。肚腹脹滿。

- 香附
- 沉香
- 半夏 各一錢
- 蘇子

- 枳實 各一錢
- 蘿蔔子 各五分
- 丁香

- 大腹皮 各八分
- 藿香

水煎熱服。

清氣抑肝丸 治氣不消散。凝滯膈上。

- 青皮
- 桑白皮
- 枳殼 各三錢
- 檀香

- 山梔仁
- 烏藥 各一錢
- 半夏 各一錢
- 橘紅

- 白荳蔻 各一錢
- 砂仁 各二分

加生薑三片煎服。

氣滯上焦。以橘紅。枳殼。桔梗。甘草。藿香。香附。黃連。砂

仁。枇杷葉。瓜蒌仁爲主。

氣滯中焦以木香。檳榔。山查。枳殼。蓬朮。在兩脇加青皮。柴胡。龍膽草。芍藥爲主。

氣滯下焦以沉香。茴香。川練子。荔枝枝。山梔爲主。

附鬱

鬱者結聚而不得發越也。當升而不得升。當降而不得降。當變化不得變化。則諸病生焉。然有病久不解而成鬱。有鬱久而生病。其症有六。脉多沉伏。胃滿脇痛。脉沉澇者爲氣鬱。周身關節走痛。首如物蒙。足重。

遇陰寒便發。脉沉滯者爲濕鬱。胃膈滿動則喘急。起臥怠惰。寸脉沉滑者爲痰鬱。目蒙口乾舌燥。小便赤澀。脉沉數者爲熱鬱。四肢無力能食。便血。脉沉芤澇者爲血鬱。噎酸腹飽不能食。左手脉和平。右手脉緊盛者爲食鬱。

立方

舒鬱丸 治一切鬱症。

香附

枳實

蒼朮

各三兩

沉香

一兩五錢

宿砂

山梔仁

撫芎

紅麩

半夏 各二兩

右為末水丸每服三錢空心白滾湯下。

氣鬱加烏藥木香檳榔乾薑枳殼桔梗

濕鬱加白朮白芷赤茯苓木通蒼朮

痰鬱加南星海石瓜蒌仁枳殼桔梗小皂莢

熱鬱加黃連青黛連翹山梔

血鬱加桃仁紅花丹皮當歸莖汁

食鬱加山查麥芽神麴傷冷食胃脘痛加草豆蔻乾

薑如春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸

諸痛門

諸痛之症種種不同其患有周身骨節肩背手臂項脊腰肋心膈小腹之殊其致疾之由有風寒濕熱燥火痰血積氣之異如週身遍體無所不痛者此有火或飲酒之人素有濕痰停積於內又為風寒邪氣所侵以至痰不能周流疎利留蓄於經絡關節之間日久凝滯不散鬱於肩背項脊腰肋手臂等處不腫則痛須令人按之摩之則熱氣至而痛止故今之背痛者痰滯也必搥打千百而後散可知矣不然則為痰

爲涎爲飲三者之症。蓋濕邪上浮於肺。隨氣壅嗽。發動則名爲痰。濕邪聚於脾。隨氣溢於口。氣流出不禁。則名曰涎。至於胃爲濕邪所乘。而爲吐爲嘔。爲噦。則名曰飲。此又不可不察。然大要以勝濕消痰。順氣和血。養脾爲主。外此又有飲食之後。爲冷氣所傷。而發熱身痛。此傷食身痛也。宜消導之。六脈浮緊。鼻塞身重。頭痛氣麤。發熱身痛者。此傷寒傷風身痛也。宜解表之。如病後汗下而身痛者。此氣血虛也。宜調補之。至於頭痛頭風。以發散爲主。心痛卽胃脘痛。有舊疾。

有客寒。有積痰。以開鬱化痰爲主。其腹痛腰脇痛。宜溫經散寒。熱濕爲要。若飲食過多。內傷脾氣者。宜消導之。又如小便作痛者。須問小便利不利。小便利者。是蓄血小便不利者。是溺澀。有卒然大痛者。是感寒。痛時止者。是火。若婦人小腹爲衝任之海。一遇寒冷。則血氣凝結。爲之擊搏。而作痛。得溫煖則氣和通。而痛自止。又有胞絡之間。陰戶之中。爲房事所傷。或外寒鬱遏。亦能作痛。臀尖盡處。又有所謂尻骨痛。有痰有血虛。死血不同。學者宜詳審之。

脉云

舉要曰諸痛脉多於沉伏惟風寒頭痛脉浮而洪。

立方

蠲痺湯 治周身作痛。

防風

羌活

蒼朮

各一錢

木瓜

當歸

威靈仙

烏藥

生地

各二錢

白芍

秦艽

川芎

各八分

永酒各半煎服。

定疼湯

治肩背項脊痛并背心痛此其寒痰不散。

獨活

羌活

藥木

各二錢

川芎

甘草

防風

前胡

當歸

各一錢五分

陳皮

肉桂

蘇子

各八分

酒煎温服

拂疼飲

治手臂腫痛皆因濕痰濕火或風寒凝滯

不散

烏藥

南星

僵蠶

川芎

麻黃

各二錢

蒼朮

桂枝

白朮

橘紅

各一錢

竹瀝

一搗

水煎溫服。

活絡飲 治肢節疼痛。

當歸

川芎

白芍

酒炒

半夏

薑礬製

南星

桑寄生

秦艽

生地

蒼朮

炒各一錢五分

臨服加酒一椀。

降氣湯 治胃膈作痛脹悶喘急飲食難進。

木香

當歸

蘇子

生地

各二錢

宿砂

丁香

山查

青皮

枳殼

大腹皮

各二錢

水煎溫服。

手拈散 治心腹腰脇兩肋疼痛并瘀血凝滯。

草薺

玄胡索

五花脂

乳香

沒藥

沉香

阿魏

各五錢

右為末每服二錢煮酒調送下。

通達飲 治小腹脹痛溺澀不通內有蓄血結聚。

當歸

桃仁

去尖

大黃

酒煨

豬苓

澤瀉

木香

各二錢

附子

滑石

玄胡索

各一錢二分

加燈心三十莖食前服。

立効飲 治婦人爲房事所傷陰戶內脹疼難忍一

服立瘥

川芎

當歸

玄胡索

丹皮

薑黃

大茴香

紅花

各一錢五分

桂心

秦艽

赤芍

各八分

臨服加煮酒一鍾。

流氣飲 治刺痛皆因心事憂鬱不得舒暢而作痛

如刺。

白檀香

沉香

烏藥

桔梗

各一錢五分

香附

白芷

枳殼

宿砂

蒼朮

各二錢

水煎溫服。

頭痛門

頭居身體之上爲諸陽之會其位至高猶山之有巔。木之有杪也風之起也愈高而愈狂山巔木杪先得之故雲行如飛葉落如雨皆風使之然也頭居上體。

爲風之所先及。然以其會乎諸陽而不畏寒。故人多忽之而不知所避。風邪一入頭卽痛焉。是以頭痛之症風痛居多。夫風何以能痛也。蓋風之爲物也善行而數變也。其性易入。其氣易感。頭之諸陽內聚而拒風。風之勢內外攻以抗陽。風與陽相爭。兩不肯伏。交戰至於高之分。而頭之諸經始病矣。以諸陽之強且不能以勝風。而況以諸陰乎。其有氣虛血虛而作痛者。雖係本原之不足。而實風之爲病也。蓋虛之所在。邪必轉之。使無風之入。惟覺眩運而已。何以作痛耶。但其氣血已虛。無力拒風。風雖入而不與爭。故其痛亦不甚也。其有飲食不消。痰涎湧上。而作痛者。非風之罪也。宜審而治之。

脉云

內經曰。寸口脉短者。頭痛也。脉經曰。陽弦。頭痛定無疑。脉訣云。頭痛短滑。應須灸。浮滑風痰。皆易治。

立方

清巔抑火湯 治血虛頭痛並偏正頭風

藁本

當歸

生地

川芎

各二錢

丹臺玉案

四卷 頭痛

二

防風

蔓荆子

黃連

石膏

白芍

白芷 各一錢

加蔥白五枚。生薑三片煎服。

千金一笑散

治諸般頭疼並一切頭風。

北細辛

人參

秦艽

甘菊花 各一錢五分

白芷

甘草

當歸

薄荷 各二錢

蔥白五枚煎服。

空青散

治偏正頭痛年深日久不愈者並療風寒

濕熱頭上及腦痛惟血虛者不宜服。

川芎

五錢

柴胡 七錢

黃連 酒炒

防風

羌活

各一兩

甘草

五錢

黃芩

三兩一半生一半酒炒

右為細末每服二錢以清茶調下。

羌活附子湯

治寒冬犯腦痛及齒痛名曰腦風。

麻黃

大附子

防風

白芷

白殭蠶

各六分

黃栢

蒼朮

黃耆

佛耳草

甘草

各一錢

升麻 三分

水煎溫服。

點眼丹

治一切頭痛心腹絞痛又治攪腸沙盤腸

丹臺玉案

四卷 必痛

蓋

氣痛疝痛

牙硝

麝香

硃砂

雄黃

各五分

右為細末磁磗收貯臨病以銀簪蘸藥點兩眼內立時取効

靈速散 治一切頭痛立愈

細茶

一兩水二鍾煎至半鍾去渣

白芷

細辛

牙皂

紫蘇

薄荷

各三錢

煎七分食後服

風入太陽經則髮際痛脉浮緊惡風寒以羌活為君

川芎升麻白芷防風甘草為佐

風入陽明經則額前痛兼鼻痛脉浮緩發熱惡寒以

白芷為君羌活升麻川芎防風為佐

風入少陽經則兩鬢間及額角痛脉弦往來發熱以

柴胡為君川芎升麻羌活白芷為佐

風入少陰經則頭骨緊痛以細辛為君獨活防風黃

芩白芷為佐

風入厥陰太陰之交則頂巔痛以藜本為君升麻川

芎牙皂甘草為佐

頭眩門

頭痛之外又有頭眩。雖無痛苦而精神眩耀。所見之物皆顛倒搖動。身如浮雲。足如履空。飲食下咽即吐。胃中快快。眼花不定。乃其症也。此為風動肝木。根本皆搖。捲痰上升。迷亂清氣。故耳。

脉云

左數熱多。瀉芫芎。右實痰積火盛。凡脉溢大者必眩。

立方

定眩飲 治頭眩眼花

明天麻 青皮

薄荷

柴胡

半夏 各二錢

山茱萸

龍膽草

枳殼

黃連 各錢

水煎溫服

和榮湯 治氣血兩虛頭眩

人參

當歸

白朮

生地

天門冬

麥門冬

五味子

各二錢

水煎溫服。如有痰加生薑汁竹瀝。

止旋飲 治胃兩中濕實火上炎頭眩不可當者。

大黃 酒炒 五錢 蛤茶 八錢 枳實 三錢

生薑七片煎服。

咳嗽門 附哮喘 附喘

有聲無痰之謂咳。有痰無聲之謂嗽。有聲有痰者各曰咳嗽。然謂無聲者非全無聲也。咳而易出聲之不易響也。謂無痰者非果無痰也。嗽而費力痰之不易出也。分而言之。咳為在肺。嗽為在脾。合而言之。肺與脾迭相為用。而又互相為害者也。使肺不受熱則化

氣自清。亦可以利脾。而何至於生痰。脾不受熱則游溢精氣自足以滋肺。而何以至於成嗽。此肺與脾之互相為害也。由是觀之。則脾肺雖分二經。而咳嗽總為一病。病之所由成。皆火之所致也。雖然。火固能致病矣。而亦有得於外。或傷於風。或傷於寒熱。如此之類。種種不同。亦皆歸咎於火乎。殊不知始之者風寒與熱也。而成之者火也。內外夾攻。病斯成焉。而不可以一端求也。然此特論夫咳嗽之由耳。而咳嗽之名非一言之所能盡悉。而數之有火痰嗽。濕痰嗽。鬱痰

嗽。頑痰嗽。清痰嗽。風寒痰嗽。酒食痰嗽。乾咳嗽。時行
嗽。瘀血嗽。與大肺脹嗽之異焉。而諸嗽之形症。又何
以別之。蓋火痰嗽者。嗽必面赤。聲多痰少。用力久而
後出。脉數喘急是也。濕痰嗽者。喉中漉漉有聲。嗽而
易出者是也。鬱痰嗽者。胃臆脹滿。連嗽不出。喉中有
喘聲。夜不得眠。上飽下餓者是也。頑痰嗽者。膠住咽
喉。咯不能出。必努力大嗽。而後出少許。如脂膏之狀
者是也。清痰嗽者。必待嗽而後出。其痰不稠粘者是
也。風痰嗽者。肺氣壅盛。必頓嗽而後出。其痰浮而有

沫。狀如津唾。而畧稠粘者是也。寒痰嗽者。得於秋冬
之交。或爲冷雨所淋。或爲冷風所侵。或露臥星月。或
寒天入水所致。其嗽必哮喘。而或肩背覺寒。得熱湯
飲之則緩者是也。酒痰嗽者。醉後感冒風熱。腹中有
酒積。飲濁酒卽發者是也。食積痰嗽者。每食後則嗽。
胃膈不寬。其痰稠粘。覺有甜意。面上蟹爪路。一黃一
白者是也。乾咳嗽者。平素陰血不足。虛火有餘。喉中
常癢。癢卽頓嗽。有聲而無痰是也。時行嗽。發寒熱。鼻
塞。氣急。瘀血嗽。喉間常有腥氣。肺脹嗽。動則喘滿。氣

急或左或右眠不得者此痰與瘀血碍氣而病也。又有嗽而兩脇痛者名曰肝咳。有嗽而腰軟痛者名曰腎咳。有嗽而中脘作痛者名曰脾咳。有嗽而鼻流清涕者名曰肺咳。有嗽而口苦舌乾者名曰心咳。又有嗽而遺尿者氣虛也。又有嗽而五心煩熱者血虛也。凡治病者當精詳而審之。

脉云

肺脉實者浮大有力。若沉而滑則痰氣盛也。虛者弦洪無力。若沉而帶數則火鬱也。大要浮大者生。沉伏

匿者不治。

立方

哮喘抑火湯 治肺火上炎咳嗽痰多。午後面赤。

知母 瓜蒌仁去油 貝母各二錢 玄參

麥門冬 黃芩 天花粉 山梔仁

枳實各一錢 竹茹 桔梗各一分

生薑三片煎服。

開鬱降痰湯 治鬱痰咳嗽胃脇脹滿並積痰咳嗽。

杏仁去皮尖 枳殼 黃芩酒炒 蘇子炒各一錢

桔梗炒 香附童便製 貝母去心 瓜蒌仁去油

山查各二錢 甘草二分

燈心三十莖食後服

保肺飲 治久患咳嗽肺金衰弱上氣喘急口乾喉

啞痰中帶血絲或咯出鮮血或痰如灰色將成肺

痿

知母 天門冬 五味子 川貝母

杏仁各一錢 天花粉 麥門冬 紫菀茸

款冬花 百合 桔梗 蘇子

阿膠各八分

水煎溫服

清氣化痰湯 治酒色過度咳嗽不止兩肋疼痛

人參 沉香 青皮各八分 甘草二分

知母 桑白皮 地骨皮各一錢五分

五味子廿一粒 蘇子 半夏薑製 麥門冬各一錢

水煎食遠服

蘆吸散 治寒痰凝結肺經喘嗽氣急午後發寒

肉桂 明雄黃 鸞管石 款冬花

粉甘草 各等分

右為極細末以蘆管挑藥輕輕含之吸入喉內徐徐以清茶過口

保真湯 治微微乾嗽骨蒸盜汗四肢壯熱飲食少進氣虛血虧損

生地 熟地 黃耆 人參

地骨皮 白木 各六分 柴胡 黃栢

橘紅 各五分 五味子 各五分 甘草 二分 天門冬

知母 麥門冬 貝母 白茯苓 各八分

水煎食遠服。

喻化潤金丹 治諸般咳嗽久久不愈此丹能清氣

化痰生津保肺滋陰降火止嗽定喘

玄參 貝母 款冬花 麥門冬 各五分

牛黃 一錢 金沸草 知母 各二分 明礬砂 八分

烏梅肉 當歸 各八分

右為細末以梨汁熬膏為丸如芡實大每次一丸噙口內潤化下

華蓋飲 治肺感寒邪咳嗽聲重胃膈脹滿頭目昏

眩

赤茯苓

桑白皮

橘紅

蘇子

各一錢五分

乾葛

桔梗

杏仁

各一錢

麻黃

五分

生薑三片食遠服

團參飲子

治七情六鬱所傷以致脹氣不平咳嗽

濃血將成肺痿憎寒發熱羸瘦困倦

團參

膽星

半夏

甘草

麥門冬

杏仁

各一錢二分

遼五味

十五粒

阿膠

蛤粉炒

紫苑

百部

旋覆花

各一錢

桑葉

經霜者五片

生薑五片食遠服

如意丹

治嗽久不愈諸火上升口苦面赤頑痰壅

塞氣逆口疳

青礞石

煨過

礞砂

款冬花

薄荷葉

各四兩

黃芩

酒炒

玄明粉

桔梗

各六錢

大黃

酒蒸九次五錢

右為末烏梅肉搗爛為丸每服二錢白滾湯送下

參蘇飲

治肺感風邪膈中有熱咳嗽聲重鼻流清

涕

人參 五錢 紫蘇

桔梗 乾葛

前胡 半夏

枳殼 白茯苓

陳皮 各一錢 二分

甘草 三分

蔥頭三枝生薑二片不拘時服

諸嗽皆宜用桔梗乃肺經之要藥故不可不用但不
可多用以其為舟楫之劑能上而不下不用則不能
引藥至肺部多用則又承載諸藥而不能行反能作
飽故不可多用

附哮

哮者即痰喘也甚而常發者喉中有水雞聲牽引留
背是也

立方

四陳散 治痰哮

陳訥茶 陳薄荷 陳皮 陳紫蘇 各二錢

薑十片煎熟溫服

必勝飲 治哮症久久不愈一服即止

半夏 枳實 各二錢 石膏 煨三錢 杏仁 去皮

茶葉 麻黃 瓜蒌霜 去油 甘草 各一錢

薑五片。不拘時服。

二仙丹 治一切哮喘症

沉香 一兩 萊菔子

淘淨蒸熟 曬乾五兩

右為細末。生薑汁為細丸。每服八分。白滾湯送下。

附喘

呼吸急促之甚。經曰。諸逆衝上。皆屬於火。然火有虛實。虛者氣乏。身虛實者氣壯。身熱。凡喘未發時。以養正氣。已發時。以攻邪為主。

立方

定喘湯

治胃虛作喘。脈氣無力。擡肩頓項。喘而不休。

麥門冬

去心 人參

各二錢

遼五味

廿一粒 麻黃

五分

白朮

土炒 杏仁

去尖 陳皮

去皮 葶藶子

各一錢

二分

加黑棗二枚。食遠服。

二母湯

治水喘。水氣轉轉。有聲。怔忡者。

遼五味

黃栢

酒炒 知母

鹽酒炒 貝母

去心 各

二錢

加黑棗二枚。食遠服。

平喘湯

治火喘。乍進乍退。得食則減。食已復喘。

蘇子炒

黃芩

酒炒

枳實

各二錢

山梔仁

炒黑

桔梗炒

杏仁

去皮尖

瓜蒌仁

去油

桑白皮

各一錢

加燈心三十莖食遠服

保肺飲 治肺氣不足因嗽久而作喘

白茯苓

人參

金沸草

麥門冬

去心各一錢

遼五味

廿粒

阿膠

蛤粉炒

紫苑

各二錢

水煎溫服

紫金錠 治一切痰喘食喘氣喘水喘惟火喘不可

用薑湯磨服二錢

方見痰症門

三拗湯

治外感風邪並多服參耆發喘

麻黃

不去節

杏仁

不去皮尖各二錢

生甘草

一錢

生薑三片黑棗二枚煎服

嘔吐門

附翻胃

嘔者有物在中其所來之道遠故必嘔而出也吐者亦有物在中其所來之道近故一吐而即出也分而言之微有不同合而言之同歸於火飲食痰涎停積不化胃氣一升則湧而出矣其與翻胃相似而實各有所屬翻胃屬寒嘔吐屬熱惟其熱也故其出也無

定時或隨食隨吐或食良久而後吐隨食隨吐者火邪急速不及入胃而卽出無嘔吐之苦無掉略之勞是卽吐之謂也食良久而後吐者火猶稍緩必入胃餘時委曲而出酸苦萬狀傷神勞精腸捲而腹急是卽嘔之謂也而所出之物亦不甚盡惟翻也則陰氣下結水穀暫容朝食則暮吐暮食則朝吐或朝食至午而吐午時至暮而吐其吐必盡所食日日如此不少愆期蓋胃家受寒不能運化自不容於不出此翻胃與嘔吐所以不同也又有吞酸吐酸者何也蓋飲

食入胃胃弱不能消而又挾肝火是以作酸浮飲停蓄變爲酸痰肝火升卽吐肝火降卽吞其吞與吐皆肝火升降之所爲也故治嘔吐者必治其熱治翻胃者必治其寒治吞酸吐酸必抑其肝而後所投之藥無不中矣

脉云

關上脉滑而大小不勻者必吐逆又云嘔吐無他寸緊滑數微數血虛單浮帶扎則有痰最忌瀆弱

立方

安胃和中退。治嘔吐因飲食過多。一時不能尅化。胃窄不能容。又挾寒邪於內。

山香

檳榔

草菓

藿香

白荳蔻

各一錢五分

半夏

薑炒

南星

泡過

厚朴

蘇梗

各一錢

生薑十片煎服。

薑橘飲

治嘔吐乾噦四肢厥冷。

廣橘皮

四兩

老生薑

六兩

水煎不拘時服。

藿香定嘔湯。治七情傷感氣鬱於中。變成嘔吐寒熱眩暈不進飲食。

人參

藿香

半夏

各一錢

枇杷葉

五片蜜炙

蒼朮

一錢二分

肉桂

木香

橘紅

桔梗

各七分

甘草

三分

水煎空心熱服。

加味二陳湯

治氣鬱傷脾飲食停胃以致嘔吐。

半夏

陳皮

白茯苓

甘草

各八分

藿香梗

砂仁

厚朴

香附

各一錢

山查肉 紅豆蔻 各六分

生薑五片煎服。

調胃和中湯 治中脘寒痰嘔吐不止。

大附子 童便製 橘紅 蒼朮

青皮 草菓 子丁香 半夏 各一錢五分

生薑十片煎服。

六妙飲 治吐嘔不止口渴身熱。

陳皮 半夏 薑製 黃連 薑汁炒 梔子仁 酒炒

檳榔 各三錢 老生薑 五錢

水煎溫服。

附翻胃

立方

丁沉透膈湯 治胃氣不和痰涎阻隔翻胃嘔吐膈

噎痞塞。

沉香 丁香 砂仁 人參

蒼朮 藿香 青皮 醋炒 陳皮

半夏 厚朴 薑汁炒 香附 各八分 甘草 三分

木香 草菓 神麴 肉苳蔻 各六分

生薑五片煎服。

養胃丸 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐。

子丁香 甘草 陳皮 神麩炒

麥芽炒各二兩 大附子童便製八錢 砂仁

肉苳蔻麵包煨 白苳蔻各一兩二錢

右為末生薑四兩煎湯法為丸每服三錢空心白

滾湯下。

虎肚回生丹 治一切遠年近日翻胃危篤之極立

救回生。

虎肚一具泥裝煨過 母丁香三錢 沉香八錢

狗寶二錢五分

右為末老生薑取汁為細丸每服八分酒下。

秘方 治翻胃垂危者一服神效。

牛黃 鴉片各五錢 狗寶六錢 五靈脂四兩淘淨

右為末狗膽汁丸如芡實大每服一九薑酒調下。

霍亂門

霍亂之症急於風雨心腹絞痛腸胃并結欲吐不吐欲下不下手足揮頓滾轉煩悶頃刻之間而歿生安

危係焉。蓋由平日過傷飲食。多勞多氣。一感臭穢。清氣混淆。於是陰陽不調。暢水火不升降。中氣潰亂。而病斯劇矣。邪在上則吐。邪在下則瀉。邪在中則吐瀉兼作。是皆易治者也。若不吐不瀉。則或在旦夕矣。又有轉筋霍亂者。緣筋屬肝木。脾胃暴敗。則血與氣暴截。無所接濟。故筋急而轉縮矣。此尤霍亂中之至重者也。若吐瀉則亦有可治。倘不吐瀉。必死無疑。大抵霍亂初發。不得用藥。以其氣亂。藥不能理也。

脉云

微而澀。或代而散。或隱而伏。或大而虛。洪者為熱。弦者為痛。微弱漸絕。死。脉漸大者生。

立方

速驗飲

治寒暑相搏。霍亂轉筋。煩渴悶亂。

艾葉

三錢

香薷

藿香

各四錢

黃連

二錢

水煎不拘時服。

鹽水飲

治霍亂初起。以此探吐。

食鹽二兩。炒乾。乘熱投水中。調和。約三碗。令病人連連飲之。一吐即愈。

漑濟湯 治霍亂虛煩不得眠

人參 一錢 甘草 三分 竹茹

麥門冬

半夏 粳米 各二錢

生薑五片煎服

通脈四逆湯 治霍亂多寒脈將欲絕

當歸 二錢 北細辛 木通 大附子 童便煮 各一錢

白芍 八分 甘草 三分 吳茱萸 肉桂 各四分

棗二枚薑三片不拘時服

正氣湯 治霍亂吐瀉不住

陳皮 蘇葉 澤瀉 山查

蒼朮 各一錢 藿香 厚朴 薑汁 半夏 薑礬製各 一錢五分

甘草 三分

老薑五片煎服

蒸臍法 治霍亂欲絕但胃中微有熱氣用鹽填平

臍中灼艾不計壯數即甦

鍼法 刺少商穴出血立愈乾霍亂藥不能治惟此

神效屢試屢驗

少商二穴在大指端內側去爪甲角如韭薺白肉

宛宛中刺之。

噎膈門 附梅核氣

噎者咽喉噎塞而不通。飲或可下。食則難食也。膈者胃口隔截而不受。雖飲食暫下。少頃復吐而不能容也。求其所以致病之由。要皆憂鬱不開。思慮太過。忿怒不伸。或驚恐時值。變故屢遭。汲汲遑遑。無安寧之日。以致內氣併結於上焦。而噎膈之症斯成矣。此皆處於逆境者然耳。至於素享富貴之人。亦有是症者。何哉。必因厚味所傷。酒色過度。虛火用事。真陰消鑠。

以至血液乾枯。頑痰膠固。結於咽喉之處。則成噎。結於胃口之處。則成膈。又有不因酒色而得者。亦當以血枯痰膩及氣鬱治之。但審其所得之由。及觀其所稟之厚薄。方可用藥。如瘦人多火。其血亦乾。亦有因火而生痰者。肥人多濕。其痰易結。亦有因濕而生滯者。窮困之人多憂鬱。經營之人多思慮。不得志之人多憤恚。遭變故之人多驚恐。好酒之人多痰火。好色之人多積血。嗜味之人多宿食。使氣之人多惱怒。當細審而治之。不可以一端求也。又有所謂鼠噎者。見

人卽不食。背人卽私食之。乃食鼠屎。中毒所致。又豈
可用一例治之乎。凡治此症。以開鬱消痰。順氣潤血
爲主。斯得竅妙矣。

脉云

氣虛者脉必緩而無力。血虛者必數而無力。痰者寸
關沉滑。氣滯者寸關沉而帶滑。

立方

透關散 治噎膈不通。痞滿氣結。飲食難下。

白芷 菘

子丁香

沉香

各四錢

青皮

醋炒

香附

醋炒

橘紅

枳實

各五錢

青礞石

煨過三錢

右爲末。每服二錢。空心煮酒送下。

神仙蒸臍法

治噎膈極危重症。服藥不效。用此法

神驗。並一切五勞七傷。諸虛百損。遺精白濁。痞塊

蠱脹。中風不語。婦人赤白帶下。效妙。種種不能盡

述。

大附子

一箇重一兩。連皮浸焙。

人參

白茯苓

鹿茸

青鹽

蓮蕊

真川椒

各一錢

右爲細末。填入臍中。外用槐錢蓋上。將蘄艾灸五

壯為度。

黃金散 治噎膈湯水不能下

螺螄

淘淨養於磁盆內俟吐
出殼內之泥曬乾五候

牛黃 五分

右為細末每服一錢燒酒送下

又方 治鼠噎

鼠糞

燒灰
存性

萊菔子 炒 白薑 葱

沉香 各五錢

右為末每服二錢空心酒送下

分氣飲 治遠年近日噎膈神效

藿香

枇杷葉

貝母

去心

陳皮 各一錢

當歸

厚朴

沉香

香附

蘇子

炒

白豆蔻

各一錢
五分

生薑五片煎服

二苳靈丹

治噎膈如神

雄黃

二錢

百草霜

五錢

乳香

硃砂

各一錢
五分

烏梅

十

萊菔

十

黑薑

各四十
九粒

右為末煉蜜丸如芡實大每用一九噙口中不待

化盡以白麴餅浸濕壓下

坐功取效

淨心少坐。用意在丹田。直穿過尾尻尾尻。行至泥丸。並九宮一轉。落下口中。虛嚥一口。送下引至丹田。少停再行。如此三十六遍。每日做七次。夜間做五次。七日全愈。驗過數人。效妙通神。

附梅核氣

梅核氣乃七情所傷。痰氣鬱滯。結在咽喉之間。吐不出。嚥不下者。是也。

立方

加味二陳湯 治六鬱七情。神思所傷。結成痰核。芥

芥喉中咯之不出。吐之不下。

白茯苓 陳皮 半夏各一錢 厚朴

桔梗 枳實 黃芩 貝母去心

蘇子各一錢二分 甘草 肉桂各二分

生薑三片煎服

丁香透膈丹 治一切梅核氣

檳榔 半夏高麗製 木香 砂仁炒研

枳殼二兩 芭荳四十九粒 入肉紫 好酒醋浸乾 去芭荳不用

橘紅 枳實炒 白荳蔻炒 沉香

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

貝母各一兩 丁香五錢 礞砂三錢 草菓炒

益智仁炒各八錢

右為末每服一錢六分薑湯送下

脾胃門

五臟之有脾胃猶五行之有土也。天一生木，得土之五而成六。地二生火，得土之五而成七。天三生木，得土之五而成八。地四生金，得土之五而成九。天五生土，復得土之五而成十。五行無土不能成。五行五臟無脾胃不能資。五臟脾胃者五臟之本也。心肝肺腎

不能容飲食能容之者脾胃與胃也。飲食入於脾胃而精氣行焉。味之鹹者先入於腎，所謂水得土而成木也。味之苦者先入於心，所謂火得土而成火也。味之酸者先入於肝，所謂木得土而成木也。味之辛者先入於肺，所謂金得土而成金也。味之甘者本宮受之而實，所以調和五臟，所謂土又得土而後成也。夫然後腎水常滋，心火常淨，肝木調達，肺金清潤，而周身脉絡無不貫通，病無自而作矣。故善保身惟養脾胃而已。若不節勞，即傷脾而四肢於是乎倦怠，不節食

卽傷胃而中脘於是乎痞塞。濕土之氣鬱而不發。則鼓脹黃疸之疾成。濕土之氣漬而下注。則痢疾瀉泄之病作。而脾胃之症。此爲極矣。不但已也。脾胃一傷。則五臟皆無生氣。由是爲腰痛。爲煩渴。爲膀胱脹滿。而腎斯病矣。爲恍惚。爲怔忡。爲煩燥。而心始病矣。爲吞酸。爲吐酸。爲脇脹。爲多怒。而肝始病矣。爲咳嗽。爲喘急。爲呃逆。而肺始病矣。五臟之病。雖亦有自爲病者。未可皆歸罪於脾胃也。而病之始於脾胃者。居多焉。人其可以不調理脾胃乎。要而言之。飲食勞倦。皆

宜有節。而二者之間。又以節飲食爲至要。蓋胃居脾下。飲食之所聚也。而尅化之權。則在於脾。脾覆于胃。運開闔之機。無一時而不動。胃火上升。脾火下降。氣常溫煖。是以飲食易消。若嗜味而過飽。則充塞胃口。上礙於脾。脾雖欲動。不能動矣。其能以尅化乎。此所以調理脾胃。又莫先飲食之節也。

脉云

脉喜沉細而緩。帶洪數者。卽是病至。

立方

加味四君子湯 調理脾胃進飲食。

白茯苓 白朮 人參 各一錢

甘草 陳皮 厚朴 蓮子 各一錢

水煎溫服

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進或吐瀉日久。

大病後調理

人參 白朮 茯苓 去皮 山藥 各一錢

甘草 五錢 桔梗 白扁豆 炒 蓮子 去心 各一錢

薏苡仁 炒 各一兩

右為末每二錢空心米飲湯送下。

平胃散 和胃健脾祛濕消食

蒼朮 米泔浸炒 陳皮 甘草 炒 厚朴 薑汁炒 各一錢

右為末每服二錢白滾湯送下

香櫛飲 治脾臟不和飲食不進神思困倦

白茯苓 香附 各一錢 石斛

橘紅 人參 砂仁 各二錢

棗二枚煎服。

調中和胃丸 治脾胃不和食後反飽肌肉漸瘦酒

丹臺玉案

四卷脾胃

五九

後泄瀉。

白朮 土炒 蒼朮 炒

半夏 薑製 厚朴 薑汁

砂仁 炒 白豆蔻 炒 廣木香 薏苡仁 炒

澤瀉 各一兩 五錢 肉豆蔻 麩色

沉香 山藥 炒各 八錢

右為末以水法為丸每服二錢五分空心白滾湯

送下

升陽益胃湯 治脾虛胃弱逢春口淡無味遇夏炎

天惡寒

黃耆 人參 半夏 神筴

當歸 各一錢 黃連 柴胡 升麻

草豆蔻 陳皮 甘草 各八分

棗五枚煎服。

心痛門 附怔忡驚悸健忘 附顛狂 附邪祟

心痛者非真心痛也。乃心胞絡與胃脘痛也。然果何以知之。蓋心胞絡護捧其心。脈絡相係。位居心之四旁。火載痰而上升。礙其所居。胞絡為痰相軋。故脂膜緊急而作痛。遂誤認以為心痛也。胃脘近心。位居心

下而絡於脾。飲食過多不能消化。傷乎胃脘。病根常在。畧傷飲食。卽悶悶作痛。亦誤認以爲心痛也。大抵痛而有痰。常覺惡心。嘔去痰卽寬者。卽爲之心胞絡痛也。痛而作飽時時。暖氣直至飢而緩者。卽謂之胃脘痛也。又有痛時得飲熱湯酒而稍緩者。乃寒氣客於心脾之間也。又有心頭作痛。其痛應於背心者。乃憂鬱悲思積而成病也。又有心頭急痛。唇白毛豎。口吐黃水者。乃蟲之爲害也。又有心頭結疼。逆氣上騰。如蟲攪擾。自覺胃中唧唧作聲者。非蟲也。乃瘀血隨

氣而動也。又有一月一發。或一月兩發。或二三月一發。其發也。疼極悶死。搔爬無益。涎水一湧而卽甦者。乃寒積於心脾之間。安堵不動。一爲惱怒勞倦所傷。則寒痰乘勢湧起。泛溢胃口。迷塞心竅。故悶疼而欲死。涎水一湧而出。則胃口漸寬。心竅漸通。而復甦也。凡此皆可施治。惟平素原無心痛之疾。卒然大痛。無聲。面青氣冷。咬牙噤齒。手足如冰冷者。乃真心痛也。蓋寒邪直犯君火。旦發則暮死。暮發則旦死。不救之症也。

脉云

沉細小吉。浮大弦長者。凶。死血痛者。左手脉必清。花熱痛者。左手脉必數。積寒痛者。右手脉必實。大氣食痛者。肝部必弦。其氣日脉必緊。

立方

八寶蠲痛湯

治七情傷感。六氣為痛。心疼。腹痛。不

可忍者

玄胡索

乳香

甘草

沉香

各一錢二分

官桂 八分

陳皮

當歸

白芷 各一錢

各二分

水煎服

補心湯

治心氣虛。不能藏血。以養心。故心痛。四

肢厥冷

當歸

生地

各四錢

白芍

玄胡索

烏藥

丹皮

遠志

茯神

各一錢

龍眼肉 五枚 煎服

愈痛散

治急心痛。並胃脘痛。

高良薑

玄胡索

五靈脂

各五分 錢

蓬莪朮

當歸

甘草

各一錢

丹臺玉案

日卷

心痛

六十二

右為末。每服二錢。空心酒送下。

秘方 治九種心忡。水米不下。痛不可忍。者一服立愈。

沉香

子丁香

妙阿魏 各五錢

大茴香

妙

石菖蒲

廣木香

乳香

檀香

各四錢

川椒

二錢

砂仁

炒

玄胡索

各三錢

右為末。好醋為丸。每服一錢。白滾湯送下。

扶陽助胃湯 治一切心忡無症。

附子

重便

乾薑

各一錢五分

草薢

益智仁

人參

甘草

白芍

酒炒

官桂

各一錢

吳茱萸

陳皮

白朮

土炒各五分

水煎溫服。

又方

黃連

酒炒

肉桂

砂仁

吳茱萸

炒各五錢

荔枝核

微存性三錢

右為細末。薑汁為丸。每服一錢。老酒送下。

附怔忡驚悸健忘。

人之所主者心。心之所養者血。心血一虛。神氣不守。

此怔忡驚悸之所肇端也。曰怔忡。曰驚悸。豈可無辨乎。心虛而停水。則胃中滲漉。虛氣流動。水既上乘。心火惡之。心不自安。使人有快快之狀。是則怔忡。心虛而鬱痰。則耳聞大聲。目擊異物。使人有惕惕之狀。或驚然而跳躍驚動。是則為驚悸。又有所為健忘者。為事有始無終。言語不知首尾。是也。治之之法。怔忡者。與之逐水消飲之劑。驚悸者。與之豁痰定驚之劑。健忘者。與之定志安神之藥。總之要在調養心血。和平心氣而已。

脉云

寸口脉動而弱。跌陽脉微而浮。

立方

虎犀丹 治怔忡驚悸。因七情所傷。心神惑亂。健忘等症。

虎睛 一對 微炒 犀角 羚羊角 麥門冬 去心

生地 膽星 各八錢 黃連 薑汁炒 山梔仁 炒黑

遠志 甘草水泡 半夏 薑汁製 石菖蒲 天麻 煨

棗仁 炒各一兩 辰砂 八錢 為衣 麝香 甘草 各三錢

丹臺玉案

四卷 怔忡驚悸

論

金箔

二十張

人參

茯神

各一兩五錢

右為末。蜜丸。桐子大。每服三錢。燈心煎湯送下。

溫膽湯

治心膽虛怯。觸事易驚。

半夏

薑製

竹茹

枳實

炒

橘皮

各四錢

甘草

炙

白茯苓

各二錢

加龍眼五箇煎服。

鎮心丹

治驚悸。

辰砂

龍齒

遠志醋煮各一兩

右為細末。猪心血為丸。如菜子大。每服一錢。麥門

冬煎湯送下。

琥珀育心丸

治怔忡驚悸。日久不愈。形容漸瘦。四

肢乏力。

茯神

鬱金

遠志

各一兩

牛黃

三錢

龍齒

四錢

酸棗仁

黃連

各八錢

辰砂

五錢

真金箔

三十張

右為末。煉蜜為丸。辰砂金箔為衣。如欠實大。每日

蚤晚一丸。燈心煎湯調下。

加味定志丸

治肥人多痰驚悸。

天花粉 貝母去心 瓜蒌仁去油 白茯苓各二兩

遠志甘草水泡 石菖蒲 人參 琥珀

鬱金各一兩 辰砂六錢

右為末蜜丸辰砂為衣每服二錢白滾湯送下

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾以至健忘

人參 黃耆 白朮各一錢 茯神

遠志 酸棗仁 當歸各一錢五分

木香 甘草各八分

龍眼肉五枚煎服

養心湯 治心虛膽怯健忘怔忡不能成寐者

玄參 白朮 麥門冬 當歸

白芍 生地各一錢 川芎 天麻

紫石英 栝子仁 棗仁 陳皮各八分

燈心三十莖煎服

附顛狂

顛者異常也平日能言顛則沉默平日不言顛則呻吟甚則僵仆直視心常不樂狂者凶狂也輕則自高自是好歌好武甚則棄衣而走踰牆上屋又甚則披

頭大叫。不避水火。且好殺人。然顛為心血不足。狂為痰火實盛。治狂專於下痰降火。治顛則兼乎安神養血。若神脫目瞪如愚癡者不治。

立方

安神養志丸 治顛瘖。

當歸

生地

棗仁

黃連

玄參

白朮

人參

甘草

膽南星

冬一兩
二錢

右為末。荷葉湯為丸。每服二錢。空心白滾湯送下。

紫金錠

治顛狂二症。薑湯磨服二錢。

方見痰門

虎睛丸

治失心風顛發狂。精神恍惚。時作謔語。

虎睛

一對
微炒

大黃

酒蒸

遠志

各一兩

山梔

炒六錢

右為末。蜜丸。每服一錢五分。白滾湯送下。

墜痰丸

治痰火凝結於胃膈。以致顛狂。謔語妄言。

大黃

酒煨
二兩

貝母

去心

膽星

青礞石

煨過

石菖蒲

各一兩

麝香

一錢

蛇含石

煨紅醋淬
七次五錢

右為末。薑汁為丸。每服一錢。空心白滾湯下。

附邪祟

凡人染邪祟皆因精神衰乏。邪從而入。其脉乍大乍小。乍長乍短是也。

灸法

灸鬼眼穴。以兩手大指並縛定。用大艾炷騎縫灸之。務令兩甲角及甲後四處着火方效。

痞塊門

附嘈雜

附呃逆

痞者否塞之意也。從病從否。故有痞之名焉。又以其堅實有形。故又名之曰痞塊。然是物也。從何而得之哉。蓋因瘀血不化。宿食不消。痰飲積聚而成也。有三

者。併而成塊。有三者各自成塊。各自成塊者。易治。併而成塊者。難消。然果何以辨之。察其脉。視其形而已矣。脉弦為痰。脉滑為食。脉芤為血。三脉俱見。則併而成塊也。以其形而言之。宿食成塊者。居於中脘。視之則無形。按之則有質。在腸胃之間。以人之飲食皆入於胃。故不在皮裏膜外。其在皮裏膜外者。皆痰與血。蓋痰能流注於脂膜。血能運行於皮肉。痰積而不流。則脂膜之間為其所據。而有形可見。血瘀而不行。則皮肉之間為其所碍。而有形可見也。欲辨痰與血。

之異亦審其痛之何如耳。痛甚者爲血。痛不甚者爲痰。又手推不動者爲血。手推易動者爲痰。以熱物熨之而痛緩者爲血。熨之而無所覺者爲痰。此痰與血之辨也。若痰血相成者何以辨之。塊之所漸而大者是也。蓋先有瘀血而又有痰以累之。則以漸而大。先有積痰而又有血以併之。亦以漸而大。若單是血或單是痰無相併相累之物。只如初起之形而已。何至以漸而大乎。然宿食成塊亦未有不資於痰與血者。是何也。蓋飲食所傷者惟中脘作痛。或按之硬實而

已。初未嘗如彈丸之形者。使不資於痰與血。何以成塊乎。必先有硬飯或魚與肉或餛飩米團之類。一時失嚼誤咽。停於胃中。經月不能消化。碍其道路。血流過其處。又累一層痰與血共相累之。則不能不成塊矣。累一層則大一層。故始如彈丸。久則如楮如碗。其初尚隱於胃中。猶有質而無形。其後漸大。則腹皮頂起。而形外見矣。又有時升時降。時隱時見者。乃氣塊也。或左或右。或上或下。按之不見塊。不按又若有形。而漉漉作聲。乃停飲也。非塊也。此纔論其塊云耳。然

以其在人而言。則雖各有專病。又不可拘也。如婦人之塊。多惡血。而亦有氣成者。小兒之塊。多食積。而亦有痰成者。易怒之人。多氣癖。而亦有血成者。肥胖之人。多痰飲。而亦有食成者。當問其得病之由。或偶傷食。自此日而起。始也。或毆受氣者。自此而起。或偶因負重勞力。自此日而起者。或平素有鬱痰膠固。偶發作而起者。在婦人。必審其月事之通閉。在小兒。必審其飲食之多寡。皆當以意求之。不能盡述也。

脉云

經曰。積塊之脉。必結伏。見在左。塊居左。見在右。塊居右。此其驗也。

立方

磨平飲 治瘀血成塊。奔走作楚。

- 紅花
- 桃仁
- 山查
- 蘇木 各二錢
- 京三稜
- 蓬莪朮
- 枳殼
- 香附

烏藥 各一錢五分

水煎空心服。

萬靈丹 治痰積成塊。

半夏 薑製 南星 薑汁炒 瓦礫子 煨 青礫石 煨

沉香 銼各二兩 青皮 醋炒 莪木 醋煮 三稜

香附 醋炒 白芍 各一兩 二錢

右為末醋打糊為丸每服二錢空心酒送下。

立消丸 治飲食積聚成塊。

檳榔 草菓 炒 山查肉 萊菔子 炒各二兩

阿魏 酒煨化 三稜 莪木 醋煮

廣木香 青皮 醋炒 香附 各一兩 五錢

右為末神麩六兩打糊為丸每服三錢薑湯送下。

化痞丸 治積氣成塊并瘧母而成痞塊者神效。

黑丑 半炒 半生 檳榔 沉香 阿魏 各一兩

針砂 醋炒 五錢 官桂 青皮 醋炒 白木 土炒

蒼朮 米泔浸炒 枳殼 麸炒 半夏 薑製各一兩 二錢

右為末醋打麵糊為丸每服二錢空心薑湯送下。

秘方消痞膏藥 內服九子外以膏藥貼在塊上內

外挾攻定然消鎔。

紅花 蓬朮 三稜 當歸 各四兩

兩頭尖 五靈脂 穿山甲 川烏

生地 丹皮 巴豆肉 木鱉子 各二兩

前藥為咀片以蔬油勸半浸五日熬枯去渣再用文武火煎至滴水成珠再入後藥

阿魏 沉香 銚末 乳香 研各一兩 蘇合油

麝香 研細五錢 廣木香 銚末 子丁香 研細 檀香 銚各一兩五錢

前八味俟藥油熬致滴水成珠緩緩加入即成膏矣。

附嘈雜

凡嘈雜皆因心脾二經虛火發動兩手寸關脉來弦

滑是也

立方

調脾抑火湯 治脾氣不足心中不時嘈雜

白茯苓 黃連 山梔仁 白朮 各二錢

陳皮 黃芩 甘草 各一錢

水煎不拘時服

又方 治心血少胃口嘈雜不時索食

黃連 薑汁炒 當歸 人參 白朮 土炒各二錢

龍眼肉五箇煎服

附呃逆

諸逆衝上皆屬於火。古以為寒恐非也。治法須辨有餘不足而治。

脉云

浮而緩者易治。急者難治。

立方

橘皮竹茹湯 治大病後中氣不足呃逆不已。脉來虛細。

人參

陳皮

竹茹

甘草

各二錢

棗五枚。生薑十片煎服。

解毒湯

治痰火相搏呃逆不住。

方見傷寒門

丁香竹茹湯

治中焦氣塞下焦呃逆。

柿蒂

陳皮

竹茹

各二錢

丁香

五枚

生薑五片煎服。

又方 治婦人產後發呃。

黃栢

當歸

知母

陳皮

各二錢

生地

川芎

竹茹

白芍

各一錢二分

生薑三片煎服。

腹痛門

腹位於人之中而統於脾胃水穀之府也有寒客之則阻不行有熱內生鬱而不散有食積久血濕水結滯妨礙升降有怒氣傷肝木來尅土有傷勞倦血虛氣虛則運化自遲皆能作痛又有蟲痛暑痛疝痛積聚痛絞腸痛痢痛腸癰痛種種不一皆宜辨之綿綿痛而無增洞以熱手熨之稍止脉細沉而遲小便清白自利者寒也時痛時止痛處亦熱手不可近口乾舌燥小便赤澀大便閉或肛門如燒者火也曾膈飽

悶以手重按愈痛欲大便利後則痛減者食也痛有常處遇夜益甚腹膨小便利脉澹者瘀血也阻滯氣道小便不利其脉滑者痰也痛連兩脇或攻注腰背其脉弦者怒也若平素慎於飲食而視其肢體瘦弱又不飽悶但假假作痛如細筋牽引者血虛也若肚腹常覺空虛似餓非餓翕翕作痛呼吸如無氣力者氣虛也面黃肌瘦肚大青筋往來絞痛痛定能食面生白斑脣白毛豎嘔吐清水蟲也暑痛傷暑積聚痛有形可按疝痛引丸絞腸沙痛不吐不瀉痢痛後重

腸癰痛。臍生瘡。小便如淋。大槩大腹痛。屬太陰。多食積外感。臍腹痛。俱少陰。多積熱痰火。小腹痛。屬厥陰。多痰血及痰。與溺澀。臍下如此推之。則寒熱虛實。明矣。

脉云

宜於沉細忌浮大弦長。

立方

千金飲 治寒氣客於臟腑。腹中絞痛。或作嘔吐。

廣木香 磨 烏藥 各二錢 乾薑 肉桂 各一錢

白芍 炒 砂仁 炒 甘草 木通 各一錢

水煎不拘時服。

拂手湯 治濕流入胃經。腹中作痛。時疼時止。

大黃 酒蒸 三錢 青皮 醋炒 石膏 煨 黃連 酒炒

甘草 厚朴 薑汁炒 各二錢

水煎不拘時服。

稜木飲 治飲食凝積。結聚腸胃。并有寒邪。滿腹痛。

不可忍。

檳榔 三稜 蓬朮 草菓 各一錢

山查 白芍 麥芽 陳皮
 砂仁 廣木香 各一錢 甘草 五分
 水煎熱服。

至寶飲 治瘀血凝結肚腹絞痛如剗割者。

桃仁 當歸 川芎 紅花 各一錢
 烏藥 蘇木 青皮 大黃 酒蒸各二錢

酒水各一鍾煎服。 摩痛飲 治濕痰腹痛。

陳皮 半夏 甘草 白芍 各一錢

香附 蒼朮 厚朴 膽星
 青皮 烏藥 各二錢
 水煎熱服。

化蟲丸 治腹中有蟲疼痛難忍唇生白斑嘔吐清水
 水

廣木香 檳榔 雷丸 山查肉
 蓬朮 烏梅肉 黑丑 炒熟各一兩
 棟樹根 甘草 各五錢

右為末燒酒加黑沙糖為丸如菜菔大每服二錢。

五更時白滾湯送下。

神仙蒸臍法 治一切肚腹疼痛。母論虛實氣血痰。

食等症。一蒸即愈。屢屢神驗。方見噎隔門。

靈妙飲 治腹內作痛而兼瀉。

白茯苓

蒼朮

猪苓

白苳仁

各一錢五分

澤瀉

厚朴

木通

沉香

各一錢

甘草

肉桂

各七分

生薑五片。食前服。

秘方參附丸

治氣血虛極寒邪凝結臟腑終日腹

疼諸藥不效。

大附子

童便製

人參

白芍

酒炒各一兩

肉桂

炒七錢

當歸

二兩

甘草

八錢

真沉香

一兩五錢

右為末。蜜丸。每服二錢五分。空心白滾湯送下。

凡痛宜用芍藥甘草。乃腹痛要用之藥。蓋芍藥味酸。

能於土中剋木。甘草味甘。甘先入脾。而能緩痛。曲

直作酸。酸者甲也。稼穡作甘。甘者巳也。甲巳化土。

此仲景之妙法也。故芍藥甘草。名曰戊巳湯。統治

諸腹痛。而血虛腹痛者。猶效為甚也。

蟲門 附好喫壁泥。生米。茶葉。

蟲動物也。草木水土之中宜有之。何爲而有於人之腸胃中乎。蓋蟲者亦得天地之氣以成形者也。而形不自成。必假於物而後成。如草腐而生螢。雀歿而生蛤。魚爛而生蛆。皆舊有形之物。感陰陽之氣而後形體成焉。人身小天地。而人之氣。卽天地之氣也。然則蟲之生於腸胃中者。亦豈無所假而成哉。飲食入胃。不能消化。如魚鮮肉醢。生麪硬飯之類。停積于中。濕熱相感。稠粘膠固。資熱血以相成。得生氣以陶鎔。則

不動之物。悉成能動之形。頭尾背具。而渾然一蟲類矣。其始也。因飲食而變。其旣也。賴飲食以養。絞擾蟠結。食人精氣。飲人膏血。壞人臟腑。殞人命壽。蟲之爲害。可勝言哉。大凡難化之物。皆能生蟲。不但肉醢麪硬飯之類而已。若誤吞頭髮羽毛。尤其易生者也不特此也。雖無質之物。亦能生焉。如濃茶濁酒。本無質者。而所澄之脚。最能成病。故有茶癖酒積之症。久之亦變爲蟲。成於茶者。常思食茶。成於酒者。必酷嗜酒。一日不能暫安。此其症也。又有所

謂癆蟲者。又何所自而生耶。蓋癆蟲卽屍蟲也。勞疾之人多癆血。癆血不消。得火煨煉。遂成細蟲。其色變赤。無翼而能飛。或隱或見。其來也不測。皆血之所化也。以其爲血所化。故比諸蟲則甚靈焉。血統於肝。則藏魂。故此蟲者。魂之所依也。病人旣死。魂隨蟲出。好覓同氣。同氣之親。不幸而染之。則成傳屍勞症。此又蟲之可畏也。然蟲病人常有之。何以灼知其真。而藥之耶。必有形症可見也。蟲病之人。面黃肌瘦。唇白毛豎。容顏不澤。臉多白印。時覺惡心。口吐清水。或心腹

絞痛。飲食不爲。肌膚或頭髮疥癩。灑浙惡寒。或額面生瘡。濕癢沿連。皆其症也。如此詳察。則可以用藥矣。

脉云

脉虛小者生。緊急者死。

立方

尋蟲散

治大人小兒腹內諸蟲。

白丑一半炒

黑丑一半炒

雷丸

檳榔

各一兩

廣木香五錢

右爲末。每服三錢。黑沙糖調下。

檳榔飲 治諸蟲積久。肚腹脹大。

檳榔 五錢 苦棟根 六錢向東南者洗淨

水一碗。入黑糖少許煎服。

寶鑑化蟲丸 治蟲咬心痛。

鶴虱 去土 檳榔 苦棟根 各一兩

白礬 枯過 胡椒 炒入 三錢

右為末。米糊為丸。如粟米大。大人服八分。小兒服

三分。米飲湯送下。

又方 治小兒口中常吐出蟲。

黑錫灰 檳榔 各等分

右為末。每服一錢。花椒煎湯送下。

追蟲至寶丹 治五臟諸蟲。面黃膚瘦。四肢疋羸。肚

腹膨脹。飲食減少。蟲咬心疼。癥瘕積塊。並皆治之。

大黃 四兩 雷丸 檳榔 廣木香

玄胡索 山查 各二兩 貫衆 去土 黑丑 半生

三稜 醋炒 使君子肉 各一兩 蛇含石 煨醋淬 五錢

右為末。甘草煎水為丸。每服三錢。五更時白滾湯

送下。

又方 治好喫壁泥。

黃泥 一觔 砂仁 四兩
泥炒

右為末黃連熬膏為丸每服二錢五更糖湯下

又方 治好喫乾茶葉並茶癖

寒水石 煨 蒼朮 炒 黃芩 酒炒 薄荷葉

膽星 各三錢 白芍 酒炒 朱橘皮 使君子肉 各五錢

右為末黑沙糖神麩打糊為丸每二錢空心糖湯

下。

祛蟲丹 治小兒疳蟲面黃肌瘦肚腹膨脹

大蝦蟆 一隻將砂仁實其腹中刺

人參 白朮 土炒 檳榔 使君子肉 炒各一兩

針砂 二錢 醋炒 胡黃連 山查 麥芽 各一兩 五錢

右為末水法為丸每服二錢空心白滾湯下為散

用糖調下

又方 治好喫生米

藿香 蒼朮 酒炒 神麩 名一兩 厚朴 薑炒

雷丸 各二兩 白朮 土炒 石膏 煨 粟米 各一兩 二錢

右為末以沙糖水調每服二錢空心下



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

五機並苗上行惟存附蟲下行最難治療須用抽爪
為末調藥於初四日初六日嚴此兩日附蟲上行

丹臺玉案卷之五

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著

古澗外父 江東銘懷一父 較正

懷寧縣庠盟弟游必遠自邇父

仁和縣庠 兄 有緒武卿父

全閱

鼓脹門 附水腫

單腹脹。以其中虛外堅。有似於鼓也。鼓脹。食者有得於氣者。有得於氣。食兼併者。而後傷於食者。有先傷於食。而後傷於

色者傷於食則食不能消。而胃氣以窒傷於氣。則肝
而痞塞不通。傷於氣食。則肝家有餘。脾家不
足以有餘之肝木。尅不足之脾土。則氣愈結。而食愈
化。由是膨脹緊急。而病日益深矣。先得於食。而後
於色。則脾先病。而腎繼之。中脘先脹。而後及於小
腹。先得於色。而後傷於食。則腎先病。而脾繼之。小腹
先脹。而後及於中脘。若氣與食色三者俱傷。則一齊
而發。中脘小腹兩脇盡脹。此病之尤重者也。三者之
中。又有虛實之分。虛者殼殼然堅而不痛。氣滿按之

則陷而軟。實者內挾宿食。或瘀血邪實於內。按之不
陷而硬痛。又有眼下忽如臥蠶狀者。必發水腫。然水
何自而來耶。蓋人身真水真火。消化萬物以養生。脾
土虛弱。則水流爲濕。火炎爲熱。濕熱鬱結。經絡濁腐。
氣津液與血皆化爲水。水積妄行。面目虛浮。流於
外。遍身皮膚光腫。手按成窟。隨手而起。上則喘急。
咳嗽者何也。蓋金生水。脾病則肺失降下之令。故喘
嗽下則足膝胛腫者何也。蓋腎主水。脾病則濕熱下
注。故胛腫。陽水先腫上體。肩背手膊。屬手三陽經也。

治宜辛寒散結行氣。苦寒瀉火燥濕。陰水先腫下體。腰腹脛附屬足三陰也。治宜苦溫燥脾或辛熱導氣。故男從脚下腫起。女從頭上腫起也。逆陰陽微妙欲。何以斷之。曰鼓脹之病。臍滿者重。臍突者。人發熱者重。腹如牆壁堅硬者死。水腫之病。手心足。心平滿者死。面黑肉硬腹多青筋者死。此斷死生之大訣也。大法治鼓脹者以實脾去濕寬膨利水為主。不可過於尅伐。治水腫者以行水為主。而後補之。如此治法萬無一失矣。

脉云

脉宜浮大。忌沉細。經云水氣浮大得延生。沉細應當是死別。

立方

廬酒 治單腹脹初起。一服立消。

苦葫蘆

一箇。去蒂如蓋。內盛老煮酒。原以蒂蓋上。隔水裝滾。乘熱飲酒吐利。後即愈。

舒中益元湯 治氣虛中滿。肚腹膨脹。朝寬暮急。肚

大筋青。

人參

白朮

土炒

肉桂

各一錢

萊菔子

厚朴薑汁炒澤瀉各一錢二分

水煎溫服。

實脾飲 治蠱脹不煩渴大便溏小便少不澀一切

腫脹忌食鹽醬。

檳榔 白朮 乾薑 大附子

草菓各一錢廣木香 白茯苓 厚朴

蒼朮各一錢五分

水煎空心服。

五子十皮湯 治一切蠱脹并氣虛中滿單腹脹。

茯苓皮 草菓皮 牡丹皮 生薑皮

大腹皮 地骨皮 木瓜皮 木通皮

五加皮各一錢甘草皮五分大腹子 車前子

葶藶子 紫蘇子 兔絲子各一錢二分

加燈心三十莖空心服。

四炒枳殼丸 治氣血凝滯變成鼓脹。

枳殼四兩分作四處一分蒼朮兩同煮乾炒

黃色去朮。一分小茴香一兩同煮乾炒黃色去

茴香一分乾漆一兩同煮乾炒黃色去漆一分

一分蘿蔔子 一兩。同煮乾。炒黃色。去蘿蔔子。

香附 醋炒 二兩 檳榔 玄胡索 三稜 各一兩

右為末。好醋同老米打糊為丸。每服二錢。空心白滾湯下。

換金丹 秘方 治一切鼓脹神效。

廣木香 青皮 醋炒 蘆薈 肉苳蔻 麵包煨

麥芽 炒 神麴 炒 山查肉 千金子 去殼油 各二兩

白朮 土炒 黃連 各二兩 檳榔 一兩 沉香 七錢

黑蟬七隻。洗淨入雄猪肚內。紫口煮半熟。取出去。

蟬骨與腸。再同煮極爛。和前藥搗為丸。每服五分。白滾湯送下。加至一錢止。如上膈脹。白苳蔻湯下。下膈脹。砂仁湯下。此丸服後。要合參苓白朮散間服。方見脾胃門

珍珀活命丹 治單鼓脹。

牛黃 虎珀 珍珠 蟾酥

硃砂 各一錢 螻蛄 七箇 地鼈蟲 七箇

右為細末。人乳為丸。每服五分。空心白滾湯送下。二丑奪命丹 治氣壅血壅。大小便不通。面足浮腫。

肚大青筋。痰喘氣急。飲食不進。服此丸忌鹽醬房勞發物葷腥百日之外。

木通 香附醋炒 大黃 草蓂炒

芫花 檳榔 澤瀉去毛 紅芽大戟

小芽皂 甘遂各一兩 黑丑炒 白丑生用各五錢

雷丸三錢

右為末。以白酒醬同老米打糊為丸。每服三錢。白酒送下。瀉三四次。第二日服補脾丸藥。第三日又服一錢五分。看行下何物。如血蠱血下。氣蠱屢多。

水蠱水多。食蠱糞多。服此藥。如脹腫不消。以陳壁土煎水服之。即消散矣。

又方 治鼓脹小便不通。急脹如鼓。

石幹五錢 琥珀二錢 沉香三錢 白檳榔

木香各一錢五分 麝香五分 螻蛄即土狗二十箇

右為末。以白酒醬為丸。每服一錢五分。陳香圓湯送下。

送下

神仙蒸臍法 治鼓脹服藥難於取效。內服換金丹。

外用此法。方見噎膈門

紫金錠 治鼓脹初起。薑湯磨服四錢。方見痰門

秘效丸 治肚腹脹大小便短澀。臍凸氣喘夜不得

臥。

橘紅 青皮 醋炒 砂仁 炒 枳殼 麸炒

桑白皮 草菓仁 炒 檳榔 各兩 芫花

大腹皮 茯苓皮 厚朴 丁皮 炒

肉桂 炒 南木香 蒼朮 米泔浸炒 益智仁 各八錢

右為末。醋打麩糊為丸。體厚者五錢。體弱者三錢。

第一服消上部。蔥湯下。第二服消中部。陳皮湯下。

第三服消下部。桑皮湯下。俱要五更時服。服後如

未消。仍前湯引服之。重者六服收功。輕者不三服

而愈。

婦人有氣鼓血鼓。方與論並見婦人門。

附水腫

水腫之病。有因鼓脹而得者。有不因鼓脹而得者。視

其眼高起如臥蠶狀者。必發此症。論大法宜實脾利

小便。寬膨去濕順氣。然病勢至此。則水氣用事。真氣

無權矣。

立方

祛水飲 治腰已上腫身熱氣在表宜發汗而愈。

麻黃 去節 柴胡 各一錢 升麻 八分 防風

山查 各三錢

生薑五片煎服。

消腫湯 治腰已下腫小便不利。

猪苓 澤瀉 木通 車前子

葶藶子 各二錢 地骨皮 五加皮

生薑皮 海金沙 枳殼 各一錢

燈心三十莖空心服。

琥珀丸 治一切水腫小便不通大便溏瀉氣喘等

症。

大戟 芫花 醋炒 海金沙 炒 白丑 微炒搗末

焙乾各二兩 琥珀 八錢 黃連 酒炒 滑石 各一兩

肉桂 五錢

右為末以木通一觔煎濃湯法為丸每服二錢空心白滾湯下。

扶脾逐水丸 治通身水腫氣望上逆小便竟無日

不能食。夜不能臥。

白茯苓 雲白朮

山藥

苦苧蘆

花椒目

巴戟

各五錢

黃連

黑丑

各八錢

北五味

二錢

海金沙

澤瀉

各一兩

右為末。荷葉煎湯為丸。每服三錢。空心白滾湯下。

尊重丸

治一切腫脹。小便澀。大便閉。並單腹脹。

沉香

丁香

人參

檳榔

廣木香

青皮

陳皮

枳殼

白芷

車前子

苦苧蘆

木通

赤茯苓

胡椒

海金沙

全蝎尾

白苳蔻

滑石

各三錢

蘿蔔子

八錢

郁李仁

一兩五錢

右為末。薑汁打糊為丸。每服二錢。空心白滾湯下。

治水腫。熵各經加藥法。

如從陰腫起。其根在腎。加澤瀉。從面腫起。其根在

肺。加桑白皮。從四肢腫起。其根在脾。加大戟。從

背腫起。其根在膽。加雄黃木通。從胃腫起。其根在

皮膚。加茯苓。從腹中腫起。其根在脾與胃。加花椒

目。從口脣腫起。其根在小腸。加巴戟。從脚腫起。

其根在心。加葶藶。從脇腫起。其根在肝。加芫花。從腰腫起。其根在胃。加甘遂。從臍腫起。其根在大腸。加薑皮。從頭目腫起。其根在心肺。加羌活。從膈至小腹腫起。其根在膀胱。加海金沙。

脇痛門

肝藏於內外。應乎脇。脇之所在。肝之所在也。所藏者血。所屬者怒氣。撲跌鬪毆。內傷乎血。敗血積蓄於肝。之分。瘀而不流。則脇痛作矣。或有外觸惱怒。欲振而不得。伸鬱結不行。藏於肝部。則雖無瘀血。而亦痛矣。

然何以辨其爲血與氣耶。蓋瘀血作痛者。痛而不膨。按之亦痛。不按亦痛。其痛無時而息也。怒氣作痛者。痛而且膨。得噉則緩。已而復痛。其痛有時而息也。此非血與氣之辨乎。然有左脇痛。右脇痛。左脇痛甚者。必是肝火盛。木氣實。右脇痛甚者。必是痰流注。并食積。兩脇走痛者。必痰飲也。又有季脇作痛者。何也。蓋季脇兩肋稍之處。肝之下膽之位也。痛甚而下連小腹者。亦是瘀血。痛不甚而止於一處者。痰也。治此病者。審其所傷而治之。亦無不中矣。

脉云

脉沉氣清。血滑痰數熱。兩脇疼痛。脉必雙弦。弦滿者順洪大者逆。

立方

疎肝散瘀湯

治瘀血凝結兩脇刺痛。

當歸

紅花

蘇木

青皮

柴胡各一錢

山查二錢

白芍

烏藥

桂枝

甘草各八分

水煎熱服。

抑肝定痛飲

治怒氣傷肝脇痛。

廣木香

橘紅

青皮

柴胡

白芍

當歸各一錢五分

官桂六分

沉香

枳殼各一錢

水煎熱服。

龍會丸

治肝火盛肋脇作痛。

當歸

龍膽草

山梔仁炒

黃芩酒炒

黃連各一兩

大黃酒蒸

蘆薈

青黛各五錢

廣木香三錢

麝香五分

右爲末。神麴三兩。打糊爲丸。每服二錢。薑湯送下。
和肝飲 治脇下枉梗起一條作疼

當歸

白芍

三稜

青皮

各一錢五分

大茴香

木香

枳殼

柴胡

砂仁

各八分

水煎不拘時服

調肝飲 治季脇痛連小腹

當歸

川芎

烏藥

玄胡索

青皮

各一錢五分

柴胡

檳榔

廣木香

桃仁

去皮尖 各一錢

水煎熱服

舒肝湯 治痰凝聚結兩脇脹痛夜不能臥

白芥子

柴胡

青皮

各二錢

橘核

烏藥

各一錢五分

澹竹瀝

一鍾

龍膽草

一錢

生薑五片煎服

腰痛門

腎藏於內外應乎腰。腰之所在腎之所在也。惟房勞不節。竭其真精。則腎臟空虛。而腰斯病矣。其痛悠悠

不已而脉大者是也。衰老之人無房勞而腰常痛者亦因少壯之時自恃雄健。斲喪真元。遺其病於暮年。也有瘀血腰痛者。因跌撲墜墮。傷及兩腰。俱痛日輕。夜重。而脉滑者是也。有濕痰腰痛。因天陰久坐而發。或因膏梁而致其脉或滑而伏是也。又有閃挫而得腰痛者。亦有腎虛無所憑依。一有閃挫。則腎離其故處。其脉實。此痛之所由作也。又有久瀉而得腰痛者。利盡其水。而真水亦涸。故也。又有腰重如帶五千錢者。何也。蓋腎屬水。其質本重。而又兼脾濕下注。濕與水而同宮。水得濕而溢滿。此腰之所以重也。然但濕而不甚痛者。以腎水不收。故也。女人腰痛。少壯者多。血滯衰老者多。血虛產婦臨蓐而先腰痛者。乃胞系欲脫於腎。故也。治此病者。審其虛實。而施治無不中矣。

脉云

腰痛之脉。多於沉弦。沉爲氣滯。弦爲損腎。濡細傷濕。滑爲瘀血。滑乃痰火。洪大腎虛。脉帶沉滑。易痊。

立方

立安飲 治腎虛腰痛。

杜仲 鹽水炒 黃栢 炒

破故紙 炒 人參

兔絲子 牛膝 各一錢五分

白茯苓

當歸 川芎 生地 各二錢

水煎臨服加鹽三分。

散痛飲 治瘀血所滯兩腎作痛。

烏藥 玄胡索 杜仲 鹽水炒

桃仁 去皮尖各一錢五分

青皮 柴胡 穿山甲 牛膝

紅花 各一錢 甘草 二分

加生薑三片煎服。

調榮湯 治閃挫腰痛。

當歸 生地 各二錢 官桂 一錢 烏藥

紅花 陳皮 白芍 酒炒各二錢

水酒各一鍾煎服。

祛濕湯 治腰痛重墜如帶數千錢者內有濕熱也。

澤瀉 黃栢 白茯苓 木通 各一錢

防己 蒼朮 杜仲 破故紙 各一錢六分

生薑三片煎服。

奇妙丸 治婦腰痛。血凝氣滯。經水不調。腎經虛極。

當歸 酒洗 白芍 酒炒 杜仲 各二兩 廣木香

肉桂 玄胡索 牛膝 各一兩 破故紙 炒

甘草 炙 桃仁 去皮 生地 川芎 各一兩 五錢

右為末。蜜丸。每服三錢。空心白酒送下。

煨腎丸 治腎虛腰疼。

杜仲 鹽水炒三錢 用猪腰子一枚批作五七片以

椒鹽醃去腥水。摻末在內。以荷葉包裹外。加

紙三四重。放灰火中煨熟。熱酒送下。

腎着湯 治腰痛體重。腰冷如冰。

白茯苓 甘草 各一錢 白朮 三錢 乾薑 炒黑一錢五分

加黑棗五枚。空心服。

青蛾丸 治一切腰痛。腎虛血少。痛時腰冷寒。凝

滯氣血不和等症。

草薢 四兩。分作四分。鹽水童便。米

杜仲 薑汁 胡桃肉 去膜另研 補骨脂 四兩 酒浸

右為末。蜜丸。每服三錢。空心青鹽二分。酒送下。

神功散 治一切腰疼。不論腎虛血滯。閃挫立效。

杜仲

四兩童便
二碗煎乾

橘核

一兩五錢
同杜仲炒

黃柏

五錢炒
令褐色

右爲末每服三錢空心酒調下。

腰痛曲不能轉者針人中立愈。

泄瀉門

泄者如水之泄也。勢猶紿緩瀉者勢似直下微有不
同而其爲病則一。故總名之曰泄瀉。要其致病之由
皆內傷飲食外感寒濕脾土受傷不能運化以致陰
陽不分漏滲人腸而病斯作矣。然亦有先感怒氣而

後傷飲食者。有先傷飲食而後感怒氣者。有適值飲
食之間而忽發暴怒者。有憂鬱內結而合悲以食者。
有飲食後卽入水洗浴者。有飲食未久復飲食者。凡
此皆足以成其病。善調攝者不飢不食不渴不飲喜
怒有節不使太過。何至有泄瀉之患哉。大抵泄瀉與
下痢皆脾家之疾。而受病之新久不同。故勢有輕重。
而治之有難易也。然果何以知之。蓋宿食停於中得
濕熱而始變。則有赤白諸般之色。而爲下痢。此受病
已久。故有積而無糞也。飲食過飽挾濕而不盡化。則

大便通痢。無裏急後重之苦。而爲泄瀉。此受病未久。故有糞而無積也。此泄痢之別。用藥者其可以樂施乎。諸痢多熱而寒者少。諸瀉多寒而熱者間或有之。惟完穀不化。屬於客熱在脾。火性急速。不及傳化而自出也。然亦有脾寒不能運而完穀不化者。此其常也。治此病者。當視其小便之赤白。察其脈之洪數沉遲而已。小便赤脈洪數則爲熱。小便清脈沉遲則爲寒。不可不辨也。

脈云

沉遲寒侵。沉數火熱。微小者生。浮弦者死。

立方

調脾除濕湯 治濕氣傷脾。久瀉不止。中氣下陷。小便黃赤。腹微作脹。

- | | | | |
|-----|-----|----|-----|
| 升麻 | 柴胡 | 防風 | 麥芽 |
| 各一錢 | | | 各一錢 |
| 蒼朮 | 陳皮 | 豬苓 | 澤瀉 |
| 半夏 | 各一錢 | 木通 | 羌活 |
| 二分 | | | 各八分 |

水煎溫服。

十珍散 治一切脾瀉。久久不愈。元氣虧傷。脾胃虛。

弱。面黃肌瘦。飲食減少。

薏苡仁炒 宿砂 山藥炒 蓮子去心各一錢

白朮土炒 白茯苓 人參 黃耆蜜炒

白扁豆各一錢二分 北五味二十粒

水煎溫服。

五苓散 治泄瀉小便赤澇并霍亂吐瀉。

白茯苓 澤瀉 猪苓各二錢 白朮八分

肉桂五分

燈心三十莖食前服。

肉苳蔻散 治脾胃虛弱腹脇脹滿水穀不消臟腑

冷滑。

川烏 柯子 肉苳蔻 小茴香

乾薑 肉桂各八分 甘草 厚朴

陳皮 蒼朮各一錢

棗二枚薑三片食前服。

立效飲 治脾經濕熱作瀉。

白茯苓 車前子 木通各二錢 黃連一錢八分

澤瀉 蒼朮各二錢

燈心三十莖煎服。

立愈飲 治過傷生冷以致脾胃不和嘔吐泄瀉

草菓仁 肉荳蔻 麪包煨 各一錢

紅麴 炒

山查 各一錢 五分

蒼朮 米泔浸炒 白茯苓 去皮

澤瀉 厚朴 薑汁炒 木通

益志仁 炒

藿香 車前子 各八分

生薑三片食前服。

扶元湯 治脾胃久虛泄瀉不止神思倦怠飲食少

進四肢酸軟

人參 白朮 各二錢 石斛 白茯苓 各五分

肉桂 一錢 升麻 一錢 山茱萸 黃連 各一錢 二分

加棗二枚食前服。

諸般所傷作瀉暨各經泄瀉引經錄後

如傷肉食瀉以山查為君佐以蓬朮三稜枳殼黃連

如傷麪食瀉以萊菔子為君佐以枳實黃連麥芽神

麪檳榔草菓 如傷生冷瀉以肉桂為君佐以乾薑

檳榔萊菔子陳皮枳殼 如傷油膩瀉以蒼朮為君

佐以滑石茯苓陳皮厚朴炙甘草白朮神麴 如傷

米食瀉。以麥芽爲君。佐以神麩。陳皮。蒼蓬朮。三稜。枳實。黃連。如傷於酒瀉。以消食藥中加消酒之藥。如葛粉。菜菔粉。天花粉。黃連。山查。如傷於暑瀉。以香常黃連爲君。佐以車前子。滑石。茯苓。木通。厚朴。扁豆。直腸自下者。名曰洞泄。以白朮爲君。佐以五味子。訶子。肉菓。牡蠣。粟殼。每朝登廁澹滑者。名曰脾泄。以白朮爲君。佐以煨薑。大棗。茯苓。炙甘草。久泄腰痛者。名曰腎泄。以白朮。杜仲爲君。佐以茯苓。

人參。肉菓。訶子。五味子。

泄瀉兩脇痛。名曰肝泄。以芍藥爲君。佐以白朮。茯苓。蒼朮。厚朴。青皮。甘草。

當泄時又閉而不下。及所下者多白沫而有聲。乃風泄。以防風爲君。佐以蒼朮。厚朴。陳皮。甘草。白朮。茯苓。灸法。治吐瀉日久。服藥不效。垂危之極。

天樞二穴 在臍傍各周二寸灸五十壯 氣海一穴 在臍下一寸五分灸五壯

秘結門

秘者氣之閉也。結者糞之結也。氣閉則攻擊於腸胃。

而瘀塞於臍門。欲下不下。雖努力以伸之。而難於通暢。甚至有肛下者。糞結則乾澀硬多。轉失氣而小腹結痛。欲下不下。甚至有肛門燥結而瀝血者。秘而不結。雖不通利而不甚艱難。結而不秘。雖不滋潤而不甚費力。惟秘結兼至。難中之難也。少壯之人多患秘。以其氣有餘而不及轉運也。衰老之人多患結。以其血不足而大腸乾燥也。又有所謂風秘者。常欲轉失氣。而氣終不洩。肛門壅塞。努力伸之。則有聲如裂帛。而糞又不下者。其根始於傷風咳嗽。咳嗽將愈。而此病即發。以肺大腸相為表裏。風入於肺。而傳病於大腸。故也。脉經曰。尺脉見浮。風入肺。大腸乾澀。秘難通。非此之謂乎。大法秘者。調其氣。結者。潤其血。而秘之。得於風者。即於調氣。潤血藥中。加去風之劑。則得之矣。

脉云

燥結之脉。沉浮勿疑。熱結沉數。虛結沉遲。若是風結。右尺浮洪。

立方

丹臺玉案

五卷 秘經門

三

調氣飲 治氣閉結滯。大便不通肚腹急脹。

廣木香 檳榔 枳實 蘇梗

青皮 陳皮 各二錢 玄明粉 四錢

水煎臨服。加蜜一兩熱服。

潤腸湯 治血枯糞結

當歸 三錢 知母 麥門冬 桃仁

麻仁 蘇子 生地 各一錢五分

水煎食前服。

通暢飲 治一切閉結枯燥之極

麻仁 研為泥 桃仁 去尖 杏仁 去皮尖 當歸

滑石 各一錢五分 瓜蒞仁 去殼 郁李仁 去殼

玄明粉 陳皮 枳殼 各二錢

水煎臨服入蜜一兩熱服。

祛熱湯 治火結。

大黃 三錢 黃連 厚朴 桃仁

朴硝 各二錢

水煎不拘時服。

牛黃丸 治一切閉結並痢疾後重。

黃連 酒炒 廣木香 檳榔 各三兩 大黃 一兩

當歸 黑牽牛 一觔炒熟取頭末各四兩

右為末生蜜為丸每服三錢白滾湯下。

如意湯 治風閉結

防風 蘇紫 當歸 枳殼

桃仁 各一錢五分 廣木香 荆芥

玄明粉 山查 各二錢

蔥白五根煎服。

立通飲 治內有積熱閉結不通。

黃芩 三錢 石膏 煨五錢 黃枮 山梔仁

麥冬 各一錢 玄明粉 桃仁 各二錢

水煎不拘時服

搜風順氣丸 治老年血枯大腸乾燥結硬難解並

治肢節頑麻手足癱瘓氣血不和積熱不散

大黃 十兩酒浸九蒸九曬 火麻仁 去殼 山藥 炒

車前子 牛膝 酒洗 檳榔 郁李仁 去皮

枳殼 麩炒各四兩 獨活 兔絲子 酒煮搗各三兩

右為末蜜丸每服三錢清茶送下

淋閉門

附轉胞

附不禁

小便滴瀝澀痛者謂之淋。小便急滿不通者謂之閉。淋症有五。氣砂血膏勞是也。其感不一。或因房勞或因忿怒。或飲醇酒。或食厚味所致。房勞者陰虛火動也。忿怒者氣動生火也。醇酒厚味者蓄成濕熱流於下焦。所以小便淋瀝欲去不去。不去又來。而痛不可忍。甚者閉塞則令人悶絕矣。皆屬於熱。間有挾冷者。必先寒戰而後溲便。蓋冷氣與正氣交爭。冷氣盛則寒戰而成淋。正氣盛則寒戰解而得便溺也。治宜清

熱利小便。開鬱行氣。破血滋陰。至於調平心火。乃治淋閉之綱領也。又分在氣在血而治。以渴不渴辨之。如渴而小便不利者。熱在上焦。氣分宜清熱。不渴而小便不利者。熱在下焦。血分宜滋陰養血。又云。腎經陰虛而不利者。用八味地黃丸。熱結膀胱而不利者。用五淋散。元氣虛而不能輸化者。用補中益氣湯。脾肺之氣燥而不能化生者。用通淋琥珀丸。若轉筋便閉。氣喘不問男女。孕婦急用八味丸。緩則不救矣。

脉云

舉要曰。淋病之脉。細數何妨。少陰微者。氣閉膀胱。陰人見之。陰内生瘡。大實易愈。虛瀉其亡。又云。鼻頭色黃。小便必難。脉浮弦。瀉見於左尺。

立方

加味八正散 治氣滯淋澀初起莖中作痛。

車前子 瞿麥 扁蓄 滑石

生甘草 各一錢五分 山梔仁 木通

大黃 赤茯苓 黃柏 各一錢

燈心三十莖空心服

通淋琥珀丸 治砂石淋莖中澀痛不可忍

琥珀 三錢 鱉甲 五錢 滑石 黃連 各八錢

石管魚腦骨 三對 牛膝 八兩 熬膏

右為細末以牛膝膏為丸每服二錢空心清茶下。

當歸飲 治血淋

牛膝 蒲黃 當歸 黃連

生地 各二錢 麥冬 去心 木通 扁栢葉 微炒

山梔仁 各二錢

燈心三十莖食前服

鹿角霜丸 治膏淋。溺與精並出。混之如糊。如米泔者。

鹿角霜 四兩 白茯苓 三兩 秋石 二兩 海金沙 二兩

右為末。老米糊為丸。每服三錢。空心白滾湯下。

苓珀丸 治勞淋。遇勞即發。痛墜及尻。

當歸 白茯苓 白芍 川芎

生地 各二兩 琥珀 一兩 鹿茸 一對 木通 六兩

右為末。以木通湯為丸。每服二錢五分。空心白滾湯送下。

清肝散 治肝經氣滯。積熱而淋。莖中刺痛如刀割。

車前子 黃柏 各三錢 甘草稍 青皮 各一錢

木通 澤瀉 各二錢

燈心三十莖。空心煎服。

補中益氣湯 治中氣虛弱。不能運通水道而淋。

黃耆 人參 各二錢 甘草 白朮

當歸 柴胡 各二錢 升麻 三分 陳皮 八分

水煎空心服。

清心蓮子飲 治上盛下虛。心腎不交。血虛內熱。淋。

澀作痛。

麥門冬 石蓮子 赤茯苓 車前子 各一錢二分

黃耆 地骨皮 黃芩 人參 各二錢

甘草 三分

燈心三十莖空心煎服。

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不

斷或尿如豆汁或出砂石或下膏糊或便鮮血。

當歸 小蘗 赤芍 山梔仁 炒黑

赤茯苓 各二錢 甘草 八分

燈心三十莖空心煎服。

八味丸 治腎虛淋瀝莖中澀痛或時作癢

熟地 四兩 山藥 炒 澤瀉 去毛 山茱萸肉

丹皮 各二兩 白茯苓 三兩 黃柏 鹽水炒 知母 鹽酒炒各二兩五錢

右為末蜜丸每服三錢空心鹽湯送下。

滋腎丸 治腎經不足內熱閉固諸火不能升降雖

不甚渴而小便不利淋澀作痛

黃柏 鹽水炒 知母 鹽酒炒 白芍 酒炒 麥門冬 去心

白茯苓 去皮 人參 各二兩 枸杞子 鱉甲 羊酥炙

天門冬去心 生地

山茱萸去核 牛膝各一兩

甘草八錢

右為末蜜丸每服三錢空心鹽湯送下。

附轉脬

脬下併急而痛小便不通有因熱逼或強忍小便以至氣逆者。

至氣逆者。

立方

通利運轉湯 治脬轉內熱。

寒水石 車前子 木通 滑石各二錢

麝香三分

淡竹二十片空心煎服。

補中益氣湯 治忍尿行房。方見前

葵髮散 治婦人脬轉。

頭髮煨灰 冬葵子炒各等分

右為末每服一錢燈心湯下。

神仙蒸脬法 治脬轉立刻見效。方見噎膈門

附不禁

小便不禁古方多以為寒殊不知屬熱者多蓋因膈

膀胱邪妄動。水不得寧。故不能禁。而頻數來也。

立方

清勝丸 治一切不禁

當歸

生地

丹皮

白茯苓

各三兩

山茱萸

去核

北五味

牡蠣

蓮蕊

黃柏

益智仁

知母

各二兩

右為末蜜為丸。每服三錢空心白滾湯下。

便濁門

附遺精

便濁濕熱兼癆。分有餘不足。治之恣意膏梁濁氣下

注者此為有餘。思慮淫慾精元失守。而成濕者。此為不足。赤者濕熱甚。心與小腸主之。白者濕熱微。肺與大腸主之。然古人有謂思慮過者則赤。淫慾過與痰者則白也。遺精比夢遺猶甚。或小便後出多不可禁。或不小便而自出。或莖中出而癢痛。常如欲小便者。皆因思慮過度。以動君火。君火動則相火翕然而起。所以激真水而疎泄也。有因色慾太過。泄滑不禁者。其為熱症明矣。

脉云

兩尺脉洪數。必便濁遺精。如女人尺脉濇而弱者。或
洪數而促者。皆為白帶。心脉短小。因心虛所致。必遺
精便濁。

立方

分清飲 治內有濕痰。濕火赤白混濁。

陳皮

半夏

各一分
五分

白茯苓

草薢

木通

各二分

山梔仁

澤瀉

各一錢

燈心三十莖。空心煎服。

又方 治思慮過度。真元不足。下焦虛寒。便溺滲瀉。

猪苓

澤瀉

白朮

白茯苓

肉桂

三錢

遠志

酸棗仁

石蓮肉

天門冬

麥門冬

栝子仁

甘草

人參

各五錢

硃砂

三錢

右為末。蜜丸。硃砂為衣。每服三錢。空心白滾湯下。

導赤散 治赤濁。

當歸

白芍

生地

川芎

各五錢

甘草

半夏

陳皮

白茯苓

檉白皮

各四錢

青黛

滑石

各三錢

右爲末。每服二錢。空心燈心湯下。

清心益元飲 治一切白濁神效。

石蓮肉 川草薺 赤茯苓 石菖蒲各一錢

遠志 麥門冬 黃栢 地骨皮

人參 滑石各八分 甘草二分

燈心三十莖。淡竹葉十片。空心煎服。

附遺精

立方

固精丸 治思慮憂愁或酒色過度上盛下虛真元

不足精闕不固陽事易舉遺精無度。

牡蠣煨 黃栢鹽酒炒 知母鹽水炒 遠志甘草泄

白茯苓 艾寶炒 蓮蕊各二兩 山茱萸肉

龍骨煨各一兩 硃砂五錢 山藥炒四兩

右爲末以山藥打糊爲丸。硃砂爲衣。每服三錢。空心鹽湯送下。

四妙丸 治精不固

韭菜子炒 兔絲子各四兩 牡蠣煨人乳

龍骨煨各二兩

右爲末。荷葉煎湯爲丸。每服三錢。空心鹽湯送下。

疝氣門

疝氣俗名小腸氣。其實非小腸也。其所屬者厥陰肝經也。人之一身。惟兩脇與小腹。以至陰囊。畢丸皆統於肝。肝主筋。而脈循陰器。陰器者筋之宗也。人因醉飽勞後。房慾忿怒。等動火。火鬱之久。濕氣生焉。使濁液凝聚。并入血隊。流於肝經。肝火急速。又暴爲外寒所來。是以作痛。甚至有上升入腹者焉。若寒作寒論。恐爲未備。大要熱者過熱則發。二便赤澀。小腹肛門

俱熱。外腎累垂。玉莖挺急。六脈洪數。寒者遇寒則發。二便皆利。脇腹清冷。外腎紫縮。六脈沉細。又有冷熱不調者。外腎小腹。或冷或熱。二便或閉或利。又其痛走注無形者。屬氣痛。有常處有形者。乃濕痰食積。瘀血下聚而成也。按之不痛者。屬虛也。又有脇傍動氣。或時脹起。橫入陰處。響如蛙聲。而下墜者。亦寒疝也。至於感濕而成者。一丸漸大。一丸漸小。而小者或至於消盡。皆併於大者而成。獨丸焉。其冷如水。其硬如石。至大如鵝卵。沉沉而痛。上連小腹。筋脈牽引。坐臥

不得安。乃肝木得濕。暢茂條達。如樹得地氣。易於長成。此爲濕疝也。又有身體發熱。陰囊脹大。皮破水流。痛不可忍。者乃得之於房勞。因婦人不潔。穢水侵淫。熱氣蒸染所致。此爲勞疝也。又有身體發熱。耳後忽生疔腮。紅腫脹痛。疔腮將退。而睪丸忽脹。一丸極大。一丸極小。有似乎偏墜。而非偏墜也。蓋耳傍乃少陽膽經之分。與厥陰肝經相爲表裏。少陽感受風熱。故疔腮忽生。後又遺發於肝經。故疔腮既減。而睪丸卽大。此亦熱疝也。又有陰囊大如斗。陰莖反縮於內。小便淋漓。不能通快。行履滯礙。不能輕捷。者非疝也。乃膀胱氣也。蓋腎與膀胱爲表裏。腎主水。而不能藏。故膀胱受之。氣化則能出矣。惟腎虛爲邪所客。遺病於膀胱。膀胱受邪氣。閉而下墜。小便滲入陰囊。日積月累。故脹大如斗也。治此病者。以伐腎邪爲主。若夫小兒偏墜。當以食積治。蓋食積不消。脾濕下行。流入肝部。故成此症。豈以大人之疝治之。至於婦人小腹兩邊。逼近陰處。忽然併結。脹痛。或皮內頂起。如鴛子大者。乃寒氣聚於厥陰所致。小腹受寒氣。其病卽發矣。

便淋漓。不能通快。行履滯礙。不能輕捷。者非疝也。乃膀胱氣也。蓋腎與膀胱爲表裏。腎主水。而不能藏。故膀胱受之。氣化則能出矣。惟腎虛爲邪所客。遺病於膀胱。膀胱受邪氣。閉而下墜。小便滲入陰囊。日積月累。故脹大如斗也。治此病者。以伐腎邪爲主。若夫小兒偏墜。當以食積治。蓋食積不消。脾濕下行。流入肝部。故成此症。豈以大人之疝治之。至於婦人小腹兩邊。逼近陰處。忽然併結。脹痛。或皮內頂起。如鴛子大者。乃寒氣聚於厥陰所致。小腹受寒氣。其病卽發矣。

是之謂陰疝。熟謂婦人無疝乎。大法以熱治寒。以燥治濕。以活血治勞。有食積則散之。有邪則伐之。有寒則祛之。斯得之矣。

脉云

疝脉弦急積聚在裏。牢急者生。弱急者死。沉遲浮瀉。疝瘕寒痛痛甚則伏。或細或動。脉經云。肝脉大急與沉皆為疝。

立方

一陳雙核飲 治疝氣遇勞碌風寒即發。外腎腫大。

墜痛

陳皮

青皮

醋炒

橘核

炒

荔枝核

炒各二錢

甘草

五分

乳香

白茯苓

半夏

沒藥

大茴香

各八分

生薑五片煎服

一醉散 治寒熱不調以致疝氣

青皮

小茴香

陳皮

青木香

荔枝核

橘核

大茴香

各一錢五分

青鹽

五分

生薑五片不拘時服。

七聖飲 治疝氣遇熱即發并疝臃腫退忽患偏墜者。

山梔仁 冬葵子 青皮 各二錢 黃栢

猪苓 赤茯苓 大黃 各一錢五分 酒蒸九次

燈心三十段食前服。

疝氣湯 治疝氣遇寒即發。

吳茱萸 肉桂 乾薑 橘核

青皮 荔枝核 甘草 等分

薑五片煎服

神速飲 治疝氣走注疼痛無有形積

陳皮 青皮 香附 各一錢 柴胡

川棟子 廣木香 破故紙 甘草 各一錢 五分

生薑五片煎服

削堅飲 治疝氣時常在一處疼痛有形內有積痰者。

山查 玄胡索 桃仁 檳榔 各一錢 五分

昆布 海藻 青皮 烏藥 各一錢 二分

生薑三片。臨服加酒一椀。

補腎湯 治疝氣內中虛寒者。

羌活

黃耆

大附子

便製

木瓜

各二錢

川芎

沉香

磨

蘇葉

白朮

白茯苓

人參

甘草

各一錢

水煎不拘時服。

蟠葱散

脾胃虛冷氣滯不行。膀胱外腎受寒。偏大

不消痛連心腹。并治婦人血氣刺痛。

乾薑

玄胡索

白茯苓

丁皮

各一錢

莪朮

三稜

青皮

宿砂

各一分

肉桂

蒼朮

甘草

各五錢

右為末。每服三錢。空心酒調下。

祛濕止痛飲

治畢丸一大一小。疼痛不可忍者。此

濕疝也。

蒼朮

防己

白朮

各一錢五分

官桂

澤瀉

烏藥

木通

橘核

萹澄茄

各一錢

水煎食前溫服。

橘桂湯 治陰囊腫大皮爛水流者勞疝也。

當歸 紅花 白芍 大茴香

木通 各一錢二分 黃栢 青皮

橘核 桃仁 官桂 各八分

水煎不拘時溫服。

橫沉飲 治婦人小腹近陰之處結聚脹痛或皮內

頂起如鷄子大者陰疝也。

橫榔 沉香 磨水 官桂 廣木香 各一錢磨水

大腹皮 青皮 香附 小茴香 各一錢五分

生薑五片煎服

疝疾靈丹 治一切疝疾疼痛并陰囊大如斗小便

淋漓。

澤瀉 一觔分作四分童便鹽水醋酒各浸七日放日中曬乾炒

吳茱萸 二兩炒

右為末老米打糊為丸每服三錢空心鹽湯下。

股痛門 附脊痛

股居一身之下。衆陰之所歸而其所以作痛者三經受病也。足太陰脾經主肉。足厥陰肝經主筋。足少陰

腎經主骨。脾經受濕。下流於肢。則肉酸疼。肝經受寒。下及於肢。則筋攣急痛。腎經受寒。下注於肢。則骨髓冷痛。其痛各有所屬也。而可以一槩治之乎。設使筋攣急痛。悞以爲濕。而用燥劑治之。則燥盡其血。而筋失所養。其痛愈甚。必投以養血之劑。則筋自舒。而不攣急矣。使骨髓冷痛。悞以爲濕。而用燥藥治之。則燥盡其髓。而骨空虛。其空愈加於痛。必投之以補髓之劑。則骨氣充。而無所苦矣。使肉內酸痛。單用熱藥。而不用燥劑。肉得熱。而融活。則有微效。而濕留於中。何時而去。必以熱藥爲向導。而以燥劑君之。以血藥佐之。則濕可去。而血亦不枯。此萬全之法也。若婦人產後。或患肢痛。乃惡血流於經絡也。要當以熱藥爲向導。而以活血之劑君之。以行氣之藥佐之。則愈。若悞以爲濕。而投燥劑。則不惟肢中之血易乾。而一身之血亦病矣。若悞以爲寒。而投熱藥。則血得熱。而行。猶爲庶幾然。大熱之劑。亦未可輕用。慎之慎之。

脉云

肢痛之脉。沉遲者多。浮大因風熱。

立方

舒筋調榮湯 治一切肢痛神效

當歸 肉蓯蓉 川芎 牛膝

人參 威靈仙 紅花 生地

丹皮 沉香

黑棗二枚 食前服

蠲痛神異膏 治一切肢痛立效

松脂 三觔入鍋化開。瀝入水中取起。再入鍋慢

煉。不住手攪待乾為度。入猪油半觔。再煉少頃。入乳香沒藥各三兩。麝香一兩。攤貼患處神效。

洗法 肢痛洗三四次即住

鳳仙草 一大束 搗爛 蒼朮 半觔 防風

荆芥 各五兩 蔥 一束 搗爛

水煎以舊衣服浸湯內搭其痛處立效

和榮湯 治兩肢上連腰膝疼痛

牛膝 杜仲 天門冬 麥門冬

黃柏 人參 烏藥 當歸

白芍 沉香 青鹽

水煎溫服。

附脊痛

背脊乃腎脉所貫屬太陽經其所以作痛者乃房勞過度不惜勞力脊虛髓空所致若為賊風乘虛而入即時囑強不能屈伸也

立方

桂附湯 治脊痛筋攣急服乃血受寒

大附子

肉桂

各二錢

川芎

五錢

白芍

生地

當歸

木瓜

各一錢五分

水煎溫服。

散濕飲 治脊內酸痛

白朮

蒼朮

防已

防風

茯苓

各一錢

官桂

天麻

當歸

各一錢五分

水煎臨服加酒一杯

虎兎丸 治骨髓冷痛背脊酸疼神効

虎骨

二兩羊酥炙

天門冬

去心

麥門冬

去心

破故紙

炒

玄胡索

各一兩五錢

杜仲

鹽水炒

大附子

便製

兎絲子

酒煮

香附

醋炒

廣木香

各一兩

右為末入雄猪脊髓一條同蜜搗丸每服三錢空

心酒下。

婦人科

乾道成男而坤道成女。故男爲陽而女爲陰也。氣屬乎陽而血屬爲陰。故男多氣而女多血也。陽輕清而陰重濁。故氣無形而血有形也。氣惟無形。故充滿於中而不露。血惟有形。故流溢於外而可見也。然是血也。以其初而言之。卽先天真一之水。女子十四天癸至。則源泉之通。自此而始。其往來有信。如潮汐之不愆其期。然後血脉調和而病無由生。一失其期。便能

作疾而生育之機亦因以窒矣。故治女病者。以調經爲先。而善調經者。以順氣爲主。氣順則經自調。經調則血常足。是以月事旣正。新血一生。一交媾之間。而胚胎卽結。血少精多。則精裹血而成男。血多精少。則血裹精而成女。欲得子者。於月事初止之後。三日之內。新血始生。而氣猶清。交感而成胎者。必男也。三日之外。新血漸多。而氣已濁。交感而成胎者。必女也。其有交感於三日之外。而亦生男者。必其平素血氣不盛。而其來不濁故也。其有交感於三日之內。而亦生

女者必其平素血氣太盛。而其來不清故也。其有血氣未嘗不足。而月事又調。宜乎成胎也。而久不生育者。何也。是必男子精氣不稠。或精寒不相交結故也。而非女子之病也。其有男子精氣素充。而又無子者。是必女子子宮之寒。不能攝精故也。而非男子之病也。然何以知子宮之寒哉。蓋女子尺脈常盛。若沉細而遲。如無所動。則子宮之寒可知矣。其有子宮不寒。而亦無子者。必其血不足。或痰有餘故也。然果何以知其血之不足。痰之有餘哉。亦視其形之肥瘦而已。

瘦人多血虛。血虛則不能凝精。肥人多濕痰。濕痰流注於下焦。則痰與血混淆。而化氣不清。故亦不能凝精也。其有瘦人肥人。而亦未嘗無子者。又何也。蓋瘦人多血虛。道其常也。若月事既調。而無熱症。則血常滋潤而不枯。是以能生育也。肥人多濕痰。亦道其常也。然或肌肉不甚浮。而色不甚白。飲食無厚味。則濕痰亦少。而血氣常清。是以亦能生育也。由是觀之。則女子之血實所以宰生生化之機也。方其未成胎也。則此血周流而不息。應期而至。及其既成胎也。

則此血榮養於內以護其胎。今婦人初有孕。卽頭眩惡心。或發嘔吐。多厭飲食。而常思酸者。乃足厥陰肝經養胎也。肝主風。故頭眩。肝有餘。則惡心嘔吐。肝勝脾。故多厭飲食。肝喜酸。故常思酸也。過此則諸經輪次養胎。其七八月之間。兩足浮腫者。足太陰脾經養胎也。脾注四肢。故兩足浮腫也。兩手不浮腫而獨見於兩足者。何也。蓋脾本足之陰經。況此時胎氣已墜下。故不能不見於兩足也。每一月則一經養之。十箇月則十經養之。十月滿足而後產焉。其餘二經。則又

養於既產之後。而化血化乳汁矣。是乳汁亦血也。而其色白者。何也。蓋胃前部倍屬太陰肺經。乃西方庚辛金也。金色本白血。從陰分而來。故變赤而爲白也。凡血去多。則令人虛。今乳汁既爲血。亦不宜去多也。然其來也。恆有餘。其出也。無盡。止足以飲小兒。而其母不覺其虛者。何也。蓋人身之血。皆資於飲食以生者也。飲食入胃。游溢精氣。上輸於肺。從肺之部位而出。故成乳汁。婦人既產而飲食倍於常日。既產之後。又屬足陽明胃經養之。乳傍屬陽明。故乳汁多。受於

此處胃能化飲食。飲食能生血。飲食既足。則血亦足。血既足。則其化爲乳汁也。自無窮盡矣。何至今人虛乎。甘屬胃。故乳汁亦甘。白屬肺。故乳汁亦白。是以知既產之後。乃肺胃二經養之也。小兒二三歲。其母復有姪兒。飲魁乳。卽黃瘦泄瀉者。以乳汁味酸。正足厥陰肝經養胎之日。肝能尅脾。故兒飲之。卽瀉也。當此之時。肺經失令。胃土無權。則所以滋養乎血者。已無所藉。幾何而不爲兒之病哉。此特論胎前產後之事。而原其本於血歸其功於十二經耳。若夫胎前產後之症。又各具於諸症條下。而不及一一細論云。

月信不調

衝爲血海。任爲胞絡。腎氣全盛。二脉通流。經血豐盈。應時而下。謂之月水。乃和平之氣。常以三旬一見。像月盈而虧。不失常度之謂。如期外爲血氣所干。內爲七情所鬱。於是。有經病焉。然經病亦有不同。有月候不調者。有月候不通者。而不調不通。有兼發熱者。有兼發熱者。此分爲四也。然四者之中。若細推之不調。有趨前有退後。不通有血滯有血枯。疼痛有常時作。

痛有經前經後作痛。發熱有常時發熱。經行發熱。此又分爲八也。又有先期而來者。血熱也。其色紫者。亦血熱也。紫黑有塊。熱之甚也。後期而來者。血虛也。其色淡者。亦血虛也。或先或後。色淡而稠粘者。痰也。或止或來無定期者。因氣不調。故血亦隨之。爲行止也。或一月兩至。或數日一至。不可以月論者。氣虛血熱也。或經來之後。累數日而不能止者。乃血海脫滑。兼火有以動之也。既止之後。隔三四日而復見。微血者。以舊血未盡。爲新生之血所催。故不能容而復出也。

可隨症施治之。

脉云

凡婦人脉常欲濡弱於丈夫。惟尺脉盛而右手大。是其常也。反此是逆。

立方

溫經湯 治婦人衝任虛損。月事不調。行經作痛。腰疼。腹冷。久不受胎。崩漏去血。

當歸

赤芍

肉桂

川芎

人參

各一錢二分

莪朮

牛膝

丹臺玉案

五卷

目錄不詳

四十五

丹皮

甘草

各一錢

生薑五片。空心煎服。

涼血四物湯

治月信先期而來及紫黑色者

當歸

黃連

山梔

香附

槐花

川芎

白芍

生地

各一錢

各二錢

燈心三十莖。空心服。

調榮四物湯

治月信過期而來及其色如淡紅水

者

熟地

當歸

各一錢

北五味

斷艾

香附

敗龜板

各一錢

秦門冬

八分
去心

大棗二枚。空心服。

調經固榮湯

治月信色淡而稠粘肚腹疼痛。

白茯苓

橘紅

烏藥

香附

枳殼

各八分

當歸

白芍

宿砂

熟地

半夏

各一錢二分

大棗五枚。食前服。

琥珀散

治月水凝滯腹脇脹滿疼痛并血逆攻心

眩暈

丹臺玉案

五卷

月信不調

四十六

琥珀

烏藥

蓬朮

劉寄奴

白芍

各五錢

肉桂

二錢

丹皮

當歸

生地

玄胡索

各八錢

右為末每服三錢空心砂仁湯調下

珍寶飲

治月信一月兩至或數日一至者

當歸

白芍

人參

白茯苓

生地

各一錢

蒲黃

炒黑二錢

香附

川芎

白朮

甘草

黃連

各八分

大棗二枚食前溫服

保榮湯

治月信每次數日不能止或隔幾日復見

微紅

當歸

山梔

炒黑

地榆

牡蠣

各一錢

側柏葉

川芎

赤芍

生地

各一錢二分

燈心三十莖空心煎服

和榮艾附湯

治一切經水不調或先或後久不孕

青

當歸

川芎

條芩

香附

阿膠

各一錢五分

黃連

知母

丹臺玉案

五卷

月信不調

四十七

甘草

澤蘭葉

白芍

各八分

大棗五枚空心煎服

寶珍丸

調經種子平和氣血滋補真元溫煖子宮

牡蠣煨

桂心

當歸

龍齒煨

益智仁

烏藥

各一兩

杜仲

石菖蒲

山茱萸

茯神

牛膝

各一兩二錢

川椒

五錢

北細辛

半夏

乾薑

各六錢

人參

當歸

白芍

紫石英

各八錢

右為末蜜丸每服三錢空心白滾湯送下

經閉

經閉者言新血滯而不流舊血凝而日積臍腹腰多痛血痕血風與熱入血室之症多自此始也然要其閉之之由或月事將臨之時適感暴怒肝氣一發血隨氣升而不下亦令經閉或月事適至之時因渴飲水并食生冷之物及坐水中洗浴寒氣入內血則凝滯亦能令人閉經也或因墮胎多產而傷其血或因久患潮熱而消其血或因久熱盜汗而耗其血或因脾胃不和飲食減少而不能生血或因思慮悲哀過

極致心脾虧損而不能養血。凡此之類皆能令人經閉。其有肥白婦人月事不通者，必是濕痰與脂膜壅滯之故也。若閨女經閉多因恣食鹽醃煎炒，或逾年未嫁，或年未笄而思男，思傷心血也。寡婦經閉，因鬱悶百端，心火無時不起，或加之飲食厚味，遂成痰火。其症乍寒乍熱，面赤心煩，或時自汗，當隨所因而治之。其可一例施乎。

脉云

脉左寸沉心病，右寸弦關脉沉肝病，兩寸弱小屬虛。

滑屬實，寸關調如故，尺絕不至者，月水不利。

立方

疏通飲 治因感暴怒以至經閉者

青皮

官桂

木香

各一錢

當歸

香附

紅花

山查

桃仁

各二錢

酒煎空心服

立行飲 治因食生冷以至經閉者

官桂

三錢

乾薑

廣木香

玄胡索

各一錢

牛膝

蓬朮

歸尾

山查

各一錢五分

酒煎空心熱服。

活血行經湯 治因坐冷水而得寒氣以至經閉

大附子

官桂 各一錢五分

厚朴

香附

桃仁

紅花

山查

當歸

各二錢

生薑五片煎服

逍遙散 治寡婦經閉

白茯苓

白朮

甘草

白芍

柴胡

各一錢

歸尾

三錢

薄荷

八分

煨薑

二錢

酒水各一鍾空心服

大黃膏子

治閨女經閉

大黃

四兩酒浸焙乾

右為末以醋一碗熬成膏為丸如芡實大每服一

丸空心酒調下

通經丸 一切經水不通面黃肌瘦

桂心

當歸

川烏

炒

青皮

乾漆炒

大黃

酒蒸

川椒

莪朮

桃仁

乾薑

各等分

右為末以米醋為丸。如梧桐子。每服三十九。好酒送下。

牛膝散 治月水不通。臍腹作痛。或小腹引腰氣。致胃膈。

牛膝

官桂

赤芍

玄胡索

桃仁

各一兩

歸尾

丹皮

廣木香

各一兩五錢

右為末。每服三錢。空心溫酒調下。

又方 治月信經年不來。久久不通。尋常藥服之不効者。

玳瑁

殭蠶

蜜蟲

水蛭

各十箇

土牛膝

五錢

當歸

紅花

各三錢

滑石

二錢

右為末。每服一錢五分。桃仁七枚。研細。空心溫酒送下。

送下

通經奇方 治一切經閉。

玉簪花

并葉

急性子

乳香

沒藥

各等分

右為末。以燒酒為丸。每服二錢。空心熱酒下。

疼痛潮熱

月水循環。纖疴不作。而後有子。若疼痛等症。必先去

病而後滋血調經。經將來而先腰腹痛者，血滯而氣不順也。經既止而復腰腹痛者，血海空虛而氣不收也。經前有潮熱者，血虛有滯也。經後有潮者，血虛有熱也。尋常潮熱者，參看發熱門用藥。

立方

二香飲 治臨經時肚腹疼痛

- 廣木香 當歸
- 香附 川芎 各一錢
- 青皮 牡丹
- 枳殼 生地
- 蓬朮 各一錢 二分

生薑三片空心煎服

歸芍飲 治臨經并經後作痛

- 當歸 白芍 各一錢
- 川芎 白朮 各一錢
- 人參 生地
- 香附 陳皮 各一錢 五分

大棗二枚食前服

交加地黃丸 治經水不調血塊氣塊肚腹疼痛

- 老生薑 搗出汁渣 焙燥為末
- 生地 各八兩 薑汁浸 曬盡汁為度
- 玄胡索 當歸
- 川芎 白芍 各一兩
- 廣木香 沒藥
- 桃仁 去皮 尖 人參 各八錢

香附 四兩薑汁浸炒

右為末醋為丸每服二錢空心好酒送下

濟陰丸 治經不調屢次過期

香附 一觔分作四分一分童便製一分醋製一分艾湯製一分鹽水製一分

川芎 當歸 白芍 熟地 各四兩

阿膠 二兩蛤粉炒

右為末以香附留末一半打糊為丸每服三錢空

心滾湯送下

加減逍遙散 治經前潮熱

當歸 二錢 白芍 白茯苓 丹皮 各二錢

甘草 山梔 各一錢

燈心三十莖食遠服

奇効四物湯 治經後潮熱

當歸 白芍 川芎 生地 各一錢

阿膠 艾葉 黃芩 各五分

大棗五枚空心服

血鼓門 血瘕 血腫 血風 熱入血室

婦人鼓脹雖有因於氣食而成者然成於血者則居

多焉。成於氣食者。腹雖脹而經不閉。成於血者。其經必閉也。婦人之血恒有餘。故月見其血而不以為病。若閉而不通。則日積而充滿。其始發之時。小腹先膨。久則上連中脘。脹緊如鼓。青筋綻露。而血鼓之症成矣。其有因產後惡血不下。逆而上升。滲入於皮膚。充積於中宮。上騰於面。而成紫色者。此必死之症也。癥塊雖有因痰與氣食而成者。然成於血者居多焉。痰與氣食而成塊。雖成而不礙於經水。成於血者。經水雖來。亦必有時而斷也。此必因經水既來之

後尚有舊血未盡。偶感寒氣。或觸於怒氣。留滯於兩腋小腹之間。故成血癖也。

血腫與水腫不同。先因月信不通。而後腫。名曰血腫。乃瘀血化水。閉塞胞門。流走四肢。悉皆腫滿。比水腫更難治。先因小便不通。身面浮腫。而後經水不通。名曰水腫。治各不同。

血風者。經水逆上。攻於腦間。頭目悶迷。不省人事。甚至滿面滿頭。皆成赤斑者。此因經水適臨。感冒風邪所致。蓋風之為氣。善行而數變。其勢易上而難

下其經水為風所激。故致倒流而上行也。

熱入血室者。何以致之。必其經水臨行時。或犯熱症。因而經止。經隨熱而入於血室。則往來潮熱如瘧之狀。而無定期。或一日兩三發者。是也。熱久不止。傳於骨髓。多成骨蒸。

立方

破血散聚湯

治血鼓腫脹。堅硬如石。朝寬暮急。臍

凸發喘

桃仁

紅花

歸尾

牛膝

各一錢

三稜

蓬朮

各一錢

蘇木

木通

官桂

青皮

穿山甲

各八分

酒煎空心服

神仙蒸臍法

治血鼓血瘕血瘋等症

方見啞隔門

桂紅丸

治血瘕血痞神効

官桂

紅花

桃仁

當歸稍

阿魏

各一兩

廣木香

一兩五錢

白芷

蓬朮

血見愁

穿山甲

一兩二錢

右為末。醋打米糊為丸。每服三錢。蚤晚一服。酒下。

消腫丸 治血腫等症。

人參 當歸 大黃九蒸過 各一兩

桂心 瞿麥 蘇木 白茯苓

葶藶子 廣木香各一兩 四錢 木通五兩

右為末以木通煎湯法為丸每服二錢空心米飲

送下

消腫飲 治症同前

五靈脂 肉桂 川芎 當歸各一錢 五分

牛膝 青皮各一錢 玄胡索 黑牽牛各二錢

生薑五片空心煎服

紫金錠 治血鼓并血瘕血腫酒磨三錢服方見痰

祛風活血湯 治一切血風等症

防風 當歸 川芎各一錢 五分

荆芥 紅花 生地 桃仁

青皮 香附 天麻各一錢 二分

水酒各一鍾煎服

又方 治症同前

蒼耳草陰乾 小薊陰乾

右爲末。每服二錢。酒調下。

清熱涼血飲 治熱入血室。

麥門冬 丹皮 赤茯苓 各一錢 二分

連翹 秦艽 生地 當歸

川芎 各一錢 五分 黃芩 赤芍 各一錢

燈心三十莖不拘時服。

崩淋門

崩淋者。其病相似。而實不同。崩者。如土之崩。源舉逆流。而不禁。乃血熱而兼氣虛。不能收攝也。淋者。如木

之淋漓。艱澀而不通快。乃內有鬱熱。而氣亦滯也。然崩則皆血。而淋則有赤白。砂石之異。赤者屬血。白者屬氣。砂石者氣血之猶濁者也。治此病者。惟調其氣血。清其內熱而已。

脉云

脉數小爲順。洪大爲逆。

立方

如神飲 治血崩。來如湧泉。面黃肌瘦。

蒲黃 艾葉 升麻 黃芩

地榆各入 歸身 柴胡 血見愁

黃連 山梔各一錢 紫荊皮二分

燈心三十莖空心煎服

斷泉神秘丸 治一切遠年近日血崩等症并治婦

天癸當住行之不止

牡蠣 山梔 黃連各一兩 陳棕煨灰存性

槐花各四錢 側柏葉 人參 黃耆各八錢

蒼耳草煨灰三錢

右為末搗小蘗汁藕汁以二汁為丸每服一錢五

分空心鹽湯送下

秘方 治血崩初起一服立效

當歸 蘄艾各一兩 升麻四錢 荊芥穗炒黑三兩

右為末每三錢空心童便調下即止

又方 治崩淋經年不住手足俱有血絲露去血如

流者

白芷一兩 百草霜 五靈脂 荊芥穗各八錢

赤石脂四兩 黃連煨全四兩 煎汁

右為末以黃連汁為丸如菉荳大每一錢空心白

滾湯送下。

膠連飲 治一切崩淋神效。

此必崩者多淋方可用

黃連

當歸身

阿膠

各二錢

赤芍

芡實

澤瀉

車前子

牛膝

山藥

各七分

川芎

熟地

各一錢

水煎臨服加入童便一小鍾

帶下門

奇經八脉之中帶脉在腰如帶之狀婦人患帶下者病在帶脉也。雖有赤白總屬腎虛其病與淋相似然

淋病之所下者多散而薄必覺自臭。帶疾之所下者多滑而稠無腥穢之氣以此為辨耳。

脉云

脉濇而弱者洪數而促者皆為便濁白帶。虛遲者生。急疾者死。

立方

赤白並治

清氣養榮湯

治婦人氣血不調赤白帶下四肢倦

怠五心煩熱。

當歸

生地

香附

地榆

各一錢五分

此丸與前丸同
去國故藥取復
療之此存之行
藥之九有五
此丸與前丸同

白茯苓 澤瀉

丹皮 黃連

山茱萸肉 各八分

燈心三十莖空心煎服。

補元湯 治婦人久因經水不調。氣血虛弱。赤白帶

下。神思倦怠。

人參 白朮 當歸 白茯苓

川芎 各一錢 白芍 生地 澤瀉

黃柏 各八分 伏龍肝 一錢即心土 甘草 三分

大棗二枚空心煎服。

保元湯 治赤白帶下。久久不愈。氣血虧損。

石斛 巴戟天 人參 白茯苓 各一錢

黃柏 柴胡 甘草 地骨皮 各七分

黃連 一錢二分 荆芥 知母 升麻 各六分

大棗二枚空心煎服。

大靈丹 治婦人一切赤白帶下。因此久不孕育。諸

虛百損。神効。

當歸身 人參 各四兩 阿膠 三兩 川芎

牡蠣 天麻 各一兩 生地

此丸與前丸同
之澄故藥取壯
水堅陰。此丸
也清。此丸

丹皮

續斷

何首烏

九蒸九晒

山梔

各二兩炒黑

甘草

八錢

右為末蜜丸每服三錢空心白滾湯送下

又秘方 治赤白帶下

赤石脂

兩

川芎

五錢

紫荆皮

赤茯苓

各二兩

右為末醋打米粉糊為丸每服二錢空心酒下

懷孕藥忌

蜈蚣水 蛭地膽 蟲烏頭 附子 配天雄 躑躅 野葛 螻蛄 類烏喙 側子 及蟲 蟲牛 黃水 銀并 巴豆 大戟 蛇 蛻 與

凡孕位德河訓
和血氣為要一
切宜行自重寫
魂高魂之可尚
皆為胎毒所禁
況乎耗氣減血
裂腸敗胃之有
形物哉

蜈蚣 牛膝 藜蘆 并薏苡 以金石 錫粉 及雌黃 牙硝 芒硝 牡丹皮 蜥蜴 飛生 及蟪 蟲代 楮 蚱 蟬 胡粉 麝 芫花 薇 御草 三稜 槐子 牽牛 并皂角 桃仁 螻蛄 和芋根 欖根 硃砂 與乾漆 亭長 波流 茵草 中藿 麥 藜 茹 蟹 爪 甲 蝟 皮 赤箭 赤頭 紅馬 刀石 蠶 衣 魚 等 半夏 南星 通草 同 乾薑 蒜 鷄 及 鷄 子 驢 肉 兔 肉 不 須 供 切 要 婦 人 胎 前 忌 此 歌 須 記 在 心 曾

懷孕食忌

凡受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感動胎氣

身有想與身疏馬
等同忌

之戒。然於物理亦有厭忌者。設或不能禁忌。非特延
月難產。亦能令兒破形不壽。慎之慎之。 鷄肉糯米
同食。令兒生寸白蟲。 食鱈魚鱸魚及鷄子。令兒成
疳多瘡。 食犬肉。令兒無音聲。 鴨子桑椹同食。令
兒倒生心寒。 食螃蟹。令兒橫生。 食鱉。令兒項短。
及損胎。 食兔肉。令兒唇缺。 雀肉同豆醬食。令兒
面生黥黯黑子。 豆醬同藿香食。令之墮胎。 食雀
肉。令兒不恥多淫。 食山羊肉。令兒多病。 食椒蒜。
令兒損目。 食生薑。令兒多指生瘡。 食蝦。莫鱈魚。

令兒瘡癩。 食驢騾馬肉。令兒延月難產。

胎前門

凡有胎孕者。當隨症調理。如一月二月。經水不通。無
病似病。呵欠倦怠。神思昏昏。手足軟弱。按其脉滑大
而俱勻。或尺脉不絕者。此孕脉也。脉訣云。肝為血兮
肺為氣。血為榮兮。氣為衛。陰陽配偶。不參差。兩臟通
和。皆類例。血衰氣旺。定無姪。血旺氣衰。應有體。寸微
關滑尺帶數。流利往來。并雀喙。小兒之脉已見形。數
月懷胎猶未覺。經云。陰搏陽別。謂之有了。搏者近也。

陰脉逼近於下。陽脉別出於上。陰中見陽。卽滑脉是也。脉滑而動。是謂陰施陽化。法當有子。足少陰脉動甚者。孕子也。手少陰屬心。足少陰屬腎。主精。精血交會。投識於其間。則有娠。又三部脉沉正等。無病而經不至者。妊也。脉經云。左手尺部脉浮洪者。男胎也。右手尺部浮洪者。女胎也。兩手尺部俱洪者。爲兩男。俱沉實者。爲兩女。又云。中指一跳一止者。一月胎。二止者。二月胎也。此娠妊脉之舊例如此。然邇來運氣變遷。其脉有異於前法者。往往不同。

一月始露珠。名曰胎胚。足厥陰肝脉養之。夫十二經皆養胎者也。而肝經獨養於初妊之時。何也。蓋胎者。血之始成。而肝則血之所藏。造化之相爲合也。然受氣之始。則何經以主之。曰。足少陰腎經也。天一生水。得氣最先。故男子先生左腎。女子先生右腎。而婦人右腎亦以繫胞。爲胎之根抵。先天眞一之氣。發此以爲之朕兆耳。足厥陰養胎。多有惡心嘔逆。謂之惡阻。蓋肝常有餘。本不能容物。而今乃有妊。則肝氣爲胎所礙。不得發泄。故惡心嘔逆也。

過此則別經養胎。而惡阻之病息矣。

二月如桃花瓣。名曰胎膏。足少陽膽脈養之。此時腹中或動或不動。猶可狐疑。若吐逆思酸。有孕明矣。

三月如蠶繭。斯謂之胎。手厥陰心胞絡脈養之。其脈滑疾。重按之則散。男女未有定形。宜用變女爲男。

是月相火所主。胎最易墜。宜慎之。

四月男女以分。男思酸味。女思淡味。始受水精。以成血脉。手少陽三焦脈養之。其左脈疾者爲男。右脈疾者爲女。左右俱疾。當生雙產。

五月始受火精。以成陰陽之氣。是太陰脾脈養之。脾主四季。五月之時。兒四肢皆成。按其脈。重手按之。不散。但疾不滑者。五月脈也。若脈緊。必胃阻。脈遲者。必腹滿喘急。脈浮者。必水氣作腫。

六月始受金精。以成其筋。足陽明胃脈養之。脈喜弦長。遲濇則防墜。五六月胎不安者。或腹微痛。或腰痛。或飲食不美。用安胎飲。或固胎飲。

七月始受水精。以成其骨。手太陰肺經養之。男向左脇動。女向右脇動。脈滑疾者。胎動不安。若暴下惡

水多者其胎必墜。謂之非時。孤漿預下。即服安胎飲。

八月始受土精。以成皮膚。手陽明大腸經養之。脉實大弦緊者。生子多壽。沉細微弱者。子亦不祿。如胎不安者。即服固胎飲。

九月始受石精。以成皮毛。百節俱備。足少陰腎經養之。宜服達生散。

十月五臟六腑俱全。納天地之氣於丹田。自當正產。宜服滑胎飲。

立方

此其有方也
八珍湯

治娠妊體弱。氣血不和。

當歸

川芎

白茯苓

生地

白朮

人參

甘草

芍藥

各一錢

八分

大棗二枚。臨臥煎服。

參橘飲

治娠妊惡阻。嘔吐喜酸惡食。

人參

陳皮

厚朴

藿香

白朮

各一錢五分

淡竹茹

五分

生薑五片。不拘時服。

保生湯 治婦人經後不調。或不行。身體無病。精神如故。惡聞食氣。或嗜酸物。或時吐清水。或六脉俱勻。滑大。乃是孕脉也。切勿作寒病治之。宜服此劑。

烏藥

橘紅

香附

艾葉

人參

白朮

各一錢五分

甘草

五分

生薑五片。不拘時溫服。

護胎散 治娠妊二三箇月。胎氣不安。嘔吐不止。腰膝酸疼。或有紅來。

白朮

人參

黃芩

各二錢

阿膠

艾葉

砂仁

各一錢五分

薑三片。黑棗二枚。食前煎服。

安胎飲 治娠妊胎氣不安。及胎痛。

陳皮

白朮

當歸

生地

砂仁

香附

各一錢

白芍

黃芩

川芎

各一錢二分

黑棗二枚。空心煎服。

和胎飲 治娠妊下血。謂之漏胎。

阿膠

鹿角屑

熟地

斷艾

各一錢五分

白朮

黃芩

甘草

砂仁 各一錢

大黑棗二枚空心煎服

靈効散 治娠姪尿血比漏胎更甚

當歸

生地 各一兩 赤芍

川芎

山梔 各六錢 血餘 煨存 升麻

龍骨 各三錢 煨 黃芩 木浸

艾葉 五錢

右為末每服二錢空心童便調下

乾桃散 治娠姪下血不止

乾桃 乃樹上乾不落 地榆 各等 桃子 燒灰 性

右為末每服二錢空心白滾湯調下

奇聖散 治症同前

雄鷄肝三箇地榆二錢酒一碗煮熟食之即止

溫胎飲 治娠姪遺尿不禁

北五味 斷艾 大茴香 各二錢

牡蠣 川芎 各一錢 二分

生薑三片食遠服

又方 治症同前

益智仁 白薇 白芍 各等分

丹臺玉案

五卷

前

卷

右為末。每服二錢。加鹽三分。滾白湯調下。

通便飲 治娠妊小便不通。因胎壓膀胱。以致閉塞。

赤茯苓 人參各一錢 車前子 龍膽草

木通各二錢 甘草稍 川芎各六分

燈心三十莖。空心煎服。

滑胎散 治娠妊臨月。宜多服之。瘦胎易生。

枳殼 二兩 滑石 粉草各一兩

右為末。每服二錢。白滾湯空心調下。

達生散 娠妊一上九箇月。日日宜服。并臨產服之。

白芍 黃芩 紫蘇 枳殼各八分

陳皮 甘草 當歸 川芎各七分

人參 大腹皮各一錢

黑棗二枚。不拘時煎服。

固胎飲 治胎氣不固。常欲小產。

當歸 白芍 川芎 熟地

阿膠各一錢 香附 白朮 黃芩

砂仁各八分 糯米百粒

水二鍾。不拘時服。

芩朮飲 治娠妊泄瀉不止久則傷脾

白朮 白茯苓 香附各六分 黃連酒炒

澤瀉 陳皮各一錢 五味子 砂仁炒

人參 山藥各八分

黑棗二枚空心煎服

連香飲 治娠妊痢疾恐其墜胎

廣木香 黃連 白朮 白茯苓各一錢

白芍 甘草 陳皮各六分

燈心三十莖不拘時煎服

子煩

娠妊苦煩者乃肺臟虛而熱乘於心則煩燥悶亂因火尅肺金故令其煩也

茯歸煎 治娠妊心驚膽怯終日煩悶

茯苓 當歸 麥門冬 黃芩各二錢

淡竹葉二十片

燈心三十莖不拘時服

麥冬湯 治娠妊煩燥胎氣不安

白茯苓 人參各二錢 麥門冬 防風各二錢五分

淡竹葉

片十五

生薑五片空心煎服。

除煩清心丸

治膽怯心驚煩燥口苦。

知母

黃連

天冬

各一兩

麥冬

一兩五錢

硃砂 三錢

右為末。荷葉湯丸。硃砂為衣。每服二錢。空心白滾

湯送下。

子懸

娠。妊氣逆。湊上。胃膈滿。疼痛甚。則一時悶絕者。謂之

子懸也。

紫蘇飲

治娠。妊子懸。

紫蘇

白芍

當歸

各八分

川芎

陳皮

大腹皮

人參

各一錢

甘草

五分

蔥頭五枚。食遠服。

秘驗加

治娠。妊氣血不和。懷胎近上。逼心疼痛之

甚。

白朮

黃芩

各二錢

艾葉

三錢

蔥白七莖。不拘時煎服。

丹臺玉案

五卷

有秘驗方

子癇

娠妊頭項強直筋脉攣急語言寒寒痰涎壅盛昏昏不識人時醒時作者子癇也

羚羊角 三錢

棗仁

五加皮

獨活 各一錢

當歸

川芎

羌活 各八分

生薑五片不拘時服

如痰涎多加貝母陳皮

子淋

娠妊受濕滲於膀胱積熱不行以致淋瀝腹中疼痛是也

清利飲 治子淋濕熱不行肚腹作痛

木通 白茯苓 麥門冬 車前子

大腹皮 各一錢 五分 淡竹葉 十五片

燈心三十莖食前服

又方 治娠妊因傷於房事以致淋瀝

人參 當歸 川芎 澤瀉

猪苓 各一錢五分

肉桂

白茯苓 各八分

大棗五枚。食前服。

子腫

娠妊身腫。小便不利。腹大異常。高過心胃者。胎中蓄水所致。亦有煩渴引飲太過。變為泄瀉。傷損脾胃。虛不能制水。故胎腫耳。

鯉魚湯 治一切胎氣。

當歸 茯苓

白芍 各三兩 白朮 五兩 土炒 共為末

鯉魚 一尾 破洗 留鱗

右為末。以鯉魚白水煮熟。取汁。每汁二盞。入末五錢。生薑七片。再煎空心服。

子氣

娠妊單止腿足發腫。以致喘悶。甚則脚指間有黃水流出。卽是子氣也。

千金飲 治一切子氣。

廣木香 防己 五加皮 地骨皮 各一錢二分

桑白皮 紫蘇 木瓜 各一錢

燈心三十莖。食遠服。

子瘖

娠姪三五箇月。忽然失音不語。或至九月而瘖。此可不必治也。分娩之後不藥而自愈。蓋係於腎。腎脉貫舌。為胎氣所約。故不能言矣。

腹內兒哭

腹內兒哭者。臍帶疔瘡。兒含口中。因姪婦登高舉臂。脫出兒口。為此作聲。令姪婦曲腰就地如拾物。仍入兒口即止。

黃連湯

治腹內兒哭

黃連一兩煎濃汁。時時呷之。

又方 用房中多年鼠穴中上為末。酒下一錢。

娠姪服藥。禁汗吐下三法。并鍼灸。

臨產門

娠姪之難產。其因不一。有在一月之前。忽然腹痛大作。如欲產而不產者。謂之試月。有將臨月時腹痛。或作或止。一二日。或三四日。謂之弄胎。有漿水淋漓來少。名試水。雖臍腹痛。而腰不痛者。俱非當產。若腹痛連腰者。即產。

婦人小腹之下。陰戶之上。有骨高起。中有節駝相湊。未產則合。一臨產則分開。謂之交骨。此造化之巧。爲男女生育之大關隘也。雖兒頭向下。其勢已順。而交骨不開。終難生產。立見危殆。

產婦橫生。一臂先下。乃兒在母腹轉運偏側。筋斗未翻。內有所礙。而不得遂也。逆產者。兩足先下。必是母腹中脂膜窄狹。兒不得轉運而直下。此皆因勞力挫閃。悞傷其胎。以致如此。

兒奏心不下者。其手必捧母心。多致母子俱歿。必以

藥引入心。分解兒手。方可得下也。蓋兒手裏捉物最緊。藥氣一到。兒手自軟解開。

子歿腹中者。腹必悶痛兼冷。畧無動意。面如土色。其舌又黑是也。故試驗云。面黑舌不黑。母死子活。舌黑面不黑。母活子歿。此之謂也。

或有未曾受蔕。腹中畧痛而胞水未破。乘勢而下。固爲大幸。設或胞水漏乾。惡露出盡。其兒不能生。苟無法下之。則母子俱不可保矣。

假如生產胞衣不下者。不可視以爲細。故而忽之。多

有升至心而死者。

有盤腸生者。臨產之時。母腸先出。然後兒下。

脉云

歌曰。欲產之婦。脉離經沉細而滑也。同各夜半覺痛。應分誕來。朝日午定知生。又有大小不調勻。或如雀啄屋漏。應腰疼腹痛。眼生花。產在須臾。却非病。

立方

濟生飲 治將產試月弄胎試水腰痛。

牛膝

枳殼

香附

粉草

川芎

各一錢

當歸

三錢

大腹皮

紫蘇

各一錢五分

水煎卽刺熱服。

促胎方 治臨盆交骨不開不能分娩。急用此藥。

急性子

穿山甲

麝香

各三錢

右爲末。以蜜搗和。作指頭麈尾子。塞入陰戶。近骨處。又以蔥二三。舂煎湯。令產婦坐浸於中。以手運之。骨自開矣。

全生飲 治橫生將兒手輕輕納入戶內。逆產者。不可以兒脚推進。急服此劑。

麝香 八分 蛇蛻

血餘

蟬蛻 各假灰存性二錢

右為末每服二錢滾酒調下。

至寶散 治兒捧母心

乳香 五錢 麝香 六分 官桂 一錢

右為末作一服酒送下。

奪命丹 治子死腹中

丹皮

官桂

赤芍

桃仁

芒硝 各等分

右為末每服四錢滾酒送下。

靈効散 治胞衣不下

花蕊石 一兩

硫黃 四兩

入罐鹽泥封固煨過

右為末每服一錢滾湯下

又方 以頭髮含口中作惡即下

車前四物湯 治胞水漏乾兒不能下服藥時即以

燭油塗產戶內

當歸 一兩

車前子 四兩

生地

川芎

赤芍 各五錢

水煎臨服時加酒釀一鍾同服。

磁石湯 治盤腸生服藥時以草蘇子四十九粒搗爛塗產婦頭頂卽上。

磁石四兩煎湯先以磨刀水拭潤其腸再服磁石湯卽上。

回生至寶丹 治臨產艱難或胎衣不下產後血暈不省人事或崩惡露不止腹中刺痛血滯浮腫氣血相搏身熱頭疼寒熱往來并一切危急惡異諸症灌下一丸頃刻回生。

當歸 川芎 熟地 烏藥

玄胡索	桃仁 <small>去皮尖</small>	白茯苓	蒼朮
香附	蒲黃	牛膝 <small>各二兩</small>	白芍
甘草	陳皮	木香	三稜 <small>醋炒</small>
五靈脂	羌活	地榆	人參
白朮 <small>土炒</small>	青皮	木瓜 <small>各一兩</small>	良薑 <small>入錢</small>
乳香	沒藥 <small>各三錢共爲末</small>	蘇木 <small>敲碎以水五碗煎汁</small>	
<small>三碗去渣存用</small>	紅花 <small>各三兩炒黃色入酒二碗煮三五沸去渣存用</small>		
黑豆 <small>三升煮熟去豆存汁</small>	大黃 <small>爲末一觔</small>		

右先將大黃末以醋三四碗攪燉次下蘇木紅花。

黑豆等汁。同熬爲膏。如有粘鍋底者。刮起焙乾爲末。和前藥末爲丸。如彈子大。每一丸老酒調下。

兔腦丸 治一切難產。或橫逆。棒心生者。

母丁香

乳香

各二錢

麝香

一錢

兔腦

臘月者佳。去皮膜。

辰砂

一錢五分

右爲末。以兔腦爲丸。如芡實大。辰砂爲衣。每服一丸。溫水送下。卽產男左女右。握於手中。不出。

產後諸症

娠既產之後。臟腑受傷。血氣俱積。爲病甚多。不可

不審條列於後

婦人新產。忽覺昏暈。口噤。眼合。面如土色。欲倒者。乃惡血衝心也。名曰血運。令人持住。勿使臥下。卽以熱醋向鼻噴之。卽醒。

產後恍惚。謔語。舞手掉頭。口流涎沫。少醒。又發。有似敗血衝心。其實因痰犯心胞絡也。蓋敗血衝心。昏迷不能少醒。而痰犯心胞。但昏迷。有時而醒。覺耳。產後發狂。跳躍不顧羞恥。欲上屋者。非顛也。乃各經之血一齊乘虛上升。迷其心竅。而下部惡血。又相

奔騰其勢上而不下。故發狂跳躍不能自禁也。
產後腹痛不可盡作惡血不行。須看新久。若初產腹
中有痛陣如將產之狀。腹皮又寬軟。又若運轉不
寧。乃是雙胎。若經一二月腹痛者。惡血停滯而未
盡去也。名曰兒枕塊。若惡血已收而腹中如芒刺
者。翁翁無力。乃空痛也。不可復以行血之劑治。惟
養血而已。

產後腰痛多是惡血停積於兩腎空隙之處。其痛重
急不能轉側。得熱物慰之則緩者是也。若兩腎疼
痛翁翁然。如不能呻氣者。虛也。

產後下血不止者。看其血之紅紫。紫為舊血。任其下
紅為新血。宜止之再補。然紫者既盡。必繼之以紅。
紅者既盡。必繼之以淡。此必然之勢也。宜斟酌治
之。

產後瘧疾。適值秋七八月間發者。方可以瘧治。若春
夏及冬時而發者。非其時而有其氣。謂之非瘧。而
似瘧。必是產後風食所傷。氣血兩虛也。

產後傷寒。決不可用汗下之劑。以其氣血俱虛。汗則

亾陽而傷氣。下則亾陰而傷血。若犯麻黃大黃。多致不救。惟以和解爲主治。而以血藥佐之。
產後中風危疾也。若外有六經之形症。內有便溺之阻塞。皆難治之症。唯口眼喎斜者無事耳。若忽然角弓反張。目定項強者。必平素有痰風邪乘虛而入。風痰交作。壅塞經絡。致使榮衛不通。痰氣上逆。似中而非中也。若又汗出不止。或遺尿不禁。其死必矣。

產後瀉痢甚者。死多生少。不甚猶可施治。然瀉比於痢。則痢爲猶難。而瀉全在調理。大抵瀉者以補脾爲主。而以消食藥佐之。痢則以扶脾消食爲主。而以血藥佐之。

產後身熱不止。口乾煩渴。日晡尤甚者。血虛也。宜大補其血。不宜寒涼之劑。反佐以溫熱。則熱自除矣。乍寒乍熱。不可便作外感治。先審其乳房脹痛。乳汁行否。乳汁不行。發寒熱者。氣滯也。乳汁行過而發寒熱者。必審其小腹痛否。痛若手不可近。必敗血不散。入於肺則熱。入於脾則寒。腹不作痛而發寒。

熱者實是氣血虛。氣虛則寒。血虛則熱也。若心胃飽悶發寒熱者。非飲食所傷。必切其脉。若浮數者。方是感冒寒熱也。

四肢浮腫者。因敗血停滯不行。流入四肢。日久化血為水。若作水氣治。而用導水之劑。則虛而愈虛矣。或血停脾胃。必致腹脇脹悶。嘔逆惡心。或血入肺經。必至面黑。欲喘欲死。或血悶心竅。必致神志恍惚。語言不明。舌根強硬。

心痛。此因產後氣虛。偶為外寒所侵。搏於血分。凝滯不得消散。其氣逆上。沖擊於心經也。

遍身痛。腰背不得轉側。手足不能動搖。此敗血流凝不散。以致腹痛。若飲食停滯者。必惡食吞酸。瘀血痛。必手不可按。虛寒痛。必四肢厥冷。小腹痛。瘀血不盡。大便不通。枯澀。因去血太多。大腸乾涸。小便不通。因津液燥竭也。

喘有二。有氣血暴絕。有瘀血凝滯。咳嗽有血。虛有肺氣虛。有風寒有瘀血。產門不閉。生腸不收。陰戶及子宮脫下。皆由氣血虛。

弱也。

脉云

訣曰。新產之脉緩滑吉。實大弦緊死來侵。若得浮弱小者吉。忽若堅牢命不停。

立方

逐瘀湯。治產後瘀血凝滯。頭疼發熱。胃膈不寬。肚腹絞痛。

當歸

紅花

生地

官桂

烏藥

桃仁

去皮尖各一錢五分

酒水各一鍾煎服。

清菟散。治產後血暈。

澤蘭葉

當歸

荆芥

川芎

五靈脂

各六錢

右為末。每服二錢。酒灌下。外以醋炭薰之。即醒。

匙金。治產後血入心經。錯語亂言。心神恍惚。

真血竭

沒藥

二兩一兩五錢

右為末。每服一錢。童便調下。

芎歸飲。治產後惡血衝心。發狂跳躍。

丹臺玉案

五卷

全

當歸 二兩 川芎 一兩

水煎臨服加童便一椀。

安平飲 治產後一二日肚腹絞痛瘀血凝滯。

桃仁 紅花 山查 歸尾

益母草 各二錢

酒水各半煎服。

勻氣飲 治產後腰痛不能轉側惡血不甚下者。

烏藥 當歸稍 桃仁 各一錢

杜仲 牛膝 官桂 各一分 川芎 五分

水煎臨服加酒一椀。

斬龍散 治產後下血不止

蒲黃 炒黑 棕皮 煨灰 各五錢 鹿角

烏梅 各一兩 當歸 赤芍 川芎

生地 地榆 各一兩 五錢

右為末每二錢空心滾水加童便調下。

橘半飲 治產後瘧疾。

當歸 柴胡 生地 各八分 白芷

半夏 橘紅 山查 川芎 各一錢

生薑三片。不拘時服。

羌蘇飲 治產後傷寒。忌汗吐下三法。以和解取微汗。

羌活

香附

紫蘇

各一錢五分

當歸

白芍

柴胡

陳皮 各一錢二分

蔥白三莖。不拘時服。

加減續命湯 治產後中風不省人事。

科半

身不遂。語言蹇澀。手足顫搖。

杏仁

官桂

膽星

橘紅 各八分

川芎

防風

人參

黃芩

附子

各一錢 甘草 五分

生薑五片煎服。

祛風豁痰湯 治產後血虛風痰壅塞似中非中。

陳皮

瓜蒌仁

半夏

紫蘇子 各八分

烏藥

川貝母

防風

當歸 各一錢

生薑三片。臨服加竹瀝一小鍾服。

調榮湯 治產後痢疾。

白茯苓

當歸

生地

山查 各一錢

赤芍 木通 香附 丹皮 各六分

川芎 甘草 各五分

烏梅五箇煎服。

清熱飲 治產後身熱不止。

當歸 人參 生地 白芍 各一錢二分

地骨皮 丹皮 香附 各一錢 紅花

沙參 續斷 各八分

大棗五枚臨臥煎服。

調衛飲 治產後發寒皆緣乳汁不行以致多寒。

廣木香 木通 枳殼 各八分 當歸

穿山甲 漏蘆 柴胡 各一錢 甘草 三分

水酒各一鍾食後煎服。

琥珀調經散 治產後浮腫。

琥珀 五錢 白芍 當歸 各三兩 沒藥

肉桂 細辛 各四錢 甘草 麝香 各一錢

右為末每服一錢五分食遠酒調下。

七珍散 治產後血閉心竅疼痛悶絕不省人事。

防風 人參 五靈脂 各五錢

細辛

生地

石菖蒲

各一兩

右為末。每服二錢。白滾湯調下。

愈痛丸

治產後遍身疼痛。

當歸

白芍

羌活

川芎

香附

各二兩
艾煮

肉桂

五錢

玄胡索

桃仁

各八錢

乳香

沒藥

各三錢
各去油

右為末。以酒為丸。每服二錢。空心白滾湯送下。

潤腸湯

治產後大腸枯燥。大便不通。

當歸

桃仁

棗仁

生地

杏仁

各一錢
二分

青皮

二錢

水煎臨服。加生蜜五錢調服。

利便飲

治產後小便不通。

木通

當歸

車前子

生地

各一錢

白芍

川芎

白朮

澤瀉

各八分

甘草

三分

燈心三十莖。空心煎服。

補元湯

治產後。產門不閉。

人參

三錢

川芎

熟地

白朮

紫河車

白芍

各一分

五味子

升麻

各三分

大棗十枚不拘時服。

補中益氣湯

治產後陰戶及子宮脫下不收先以

五倍子煎湯浸洗再以五倍子白礬為末摻上再

服此劑。方見脾胃門

和血理氣散

治產後忽然下血成片相似崩漏。

當歸

白鷄冠花

各一兩

木香 三錢

熟地

香附

人參

阿膠

各五錢

側柏葉

炒黑

蒲黃

炒黑各六錢

右為末每服二錢空心米飲調下。

飛步飲 治產後虛極足軟不能行步

人參

白朮

土炒

當歸

牛膝

蓮子

各一錢五分去心

大棗五枚不拘時煎服。

產後不治之症有三痢疾不食口鼻黑色鼻衄喘急

犯此三者凶多吉少

丹臺玉案五卷

終

丹臺玉案

五卷

丹臺玉案卷之六

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著

古潤外父 江東銘懷一父 較正

常山縣庠盟弟黃袁仁德懷父

蘭陰 盟 弟方調元善長父 全閱

小兒科

男子婦人之病可以問而知可以切而得斷。死生辨。難易審。差劇猶有所依據。而不至於大悞。若小兒者。懷抱之時。雖有所苦。而不能言。及能學語。又不能指。

其苦之處。欲診其脉。則骸骨短小。氣血未足。寸關尺將何以分。浮中沉將何以定。雖有一指滾取二部之說。而終未得其部位。況至數急促。豈能以悉審之大約八九至為平。五六至為遲。十一二至為數。依稀彷彿之間而已。故啞科治療之難。每十倍於大人。而尤不可以不慎者也。惟虎口之脉。稍為可驗。其脉在食指外側。每一部一關三節。為三關。男視在左。女視在右。有筋脉如系。映於肉內。仔細觀之。紫則為風。紅則傷寒。青則為驚。白則為疳。黃則為脾困。青黑則為慢。

驚。人掌則為內吊。若三關通度為沉痾之候。惟此可以少知之耳。雖然。幼科之治病。當多方求之。豈可執虎口之脉法而盡小兒之諸病哉。必於病之未形。而用意察之。庶可以為預消之地。如小兒呵欠連綿。乃小兒臟腑受邪。病之漸也。若面赤則知其風熱而瀉肝之劑。可以先服。面青則知其驚風。而治驚之劑。可以先服。面黃則知其為脾虛。而補脾之劑。可以先服。多睡則知其為內熱。而清熱之劑。可以先服。口中氣熱則知其為傷風。而疎風之劑。可以先服。皆當隨症。

形而先治之。勿俟其發而後用藥也。其有不治之症者。尤不可以不知。小兒眼上有赤脉。顛腫及陷者。一不治也。魚口氣。龕齒。咬人者。二不治也。冷汗如雨。痰熱不退者。三不治也。臍風撮口。鎖肚吊腸者。四不治也。風攻頤頷。脣項腫硬者。五不治也。鼻有黑色者。六不治也。咳喘心痛者。七不治也。四肢浮腫者。八不治也。曾高而突起者。九不治也。五軟五硬者。十不治也。凡見此等之症。卽當去矣。苟不如幾而復藥之。則病者之歿。雖不由於我。我亦何辭於彼哉。大凡小兒

之病有常。多者不得所慾。則易怒而啼。故肝病常多。飲食不知節。雖飽而猶求食。故脾病常多。心神未定。聞響易動。故驚病常多。性喜吮乳。甘食停積。而易感風熱。故痰病常多。治兒之病。審其所常多者。酌而施之。以已之意。參病之情。亦庶乎用藥之無悞也。然此數種。雖或常有。而肝脾之病尤多。神而明之。存乎其人。得心應手。不可以言求也。

初誕法

小兒在胎。稟陰陽五行之氣。以生臟腑。日飲藉胎液。

以滋養。受氣既足。自然生育。出世之時。口含血塊。啼聲一出。隨卽嚥下。而毒伏於命門。遇天行時氣。或飲食停滯。或外感風寒。驚風發熱等因。發爲瘡疹。須急於未啼時。用軟帛裹指。挖出其血。用黃連。硃砂。甘草解之。後出痘亦輕。有嚥入卽時肚脹。嘔吐氣短。不乳者。用茯苓丸治之。但黃連性寒。若母稟氣膏梁積熱者。宜服若滋味淡薄。胎元弱者。又不宜用。硃砂固能解毒。恐金石鎮墜。不若牛黃分許。蜜調與吮爲佳。又有嬰兒因其難產。或冒風寒。而垂厄者。切不可斷臍。

帶急烘綿絮包抱懷中。急以胎衣置火中煨燒。更用大紙捻於臍帶上往來燎之。使煖氣入腹。須臾氣復自甦。猶戒洗浴。恐勝理不密。元氣發泄。而外邪乘之也。

立方

硃蜜法 先以黃連煎湯拭兒口。吐去惡汁。再以硃砂一分。研細。蜂蜜少許。抹兒口。吮之。鎮心定鬼。安神解毒。

牛黃法 以牛黃二分。硃砂半分。竹葉七片。煎湯調。

灌益肝膽除煩熱祛驚邪辟惡氣除小兒癩病。

茯苓丸

赤茯苓 黃連 胎冷者易芍藥 枳殼 各等分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸乳汁化下。

護胎法

小兒初生肌膚未實宜用舊絮護其背不可太煖更宜頻見風日則血氣剛強肌肉緻密若藏於重幃密室或厚衣過煖則筋骨軟脆不任風寒多易致病衣服當隨寒熱加減但令背煖為佳亦勿令出汗恐表

虛風邪易傷乳哺不宜過飽若宿滯不化用消乳丸治之陳氏所謂忍三分寒喫七分飽頻揉肚少洗澡要肚煖頭涼皆至論也須令乳母預慎七情六淫厚味炙烤則汁清寧兒不致病保嬰之法未病則調治乳母既病則審治嬰兒亦必兼治其母為善。

立方

消乳丸

砂仁 炒 蓬朮 煨 三稜 陳皮

神麩 麥芽 各五錢 香附 一兩炒

一色強。依時無急逆時殃。要分旺相休囚否。盡在人心自酌量。春天青旺亦爲相。黑休白囚黃否家。夏天赤旺黃相吉。青休黑囚白不良。假爲肝病面青時。白色當春未易醫。此是肺金來尅木色黃。又被脾家欺。心病夏天尚面赤。望色只愁形色黑。此彼腎水尅心火。白色又被肺家屈。肺病愁來面白。宜若行赤色最難除。此因心火尅肺金。青色反令肝作威。腎病面黑各天相。黃色現時多悒快。此乃脾土尅腎水。色赤反致心磨障。脾居四季面形黃。

如遇青色最難當。此爲肝木尅脾土。色黑反使腎家強。春赤夏黃秋黑色。冬青雖相亦無益。從前來者實形傳。實瀉其子平方吉。五臟所屬各一宮。五色分來人不全。色內能分明與滯。據色方能辨吉凶。心赤順時鷄冠色。不宜瘀血糊塗赤。肝形翠羽順光多。色如嫩草安爲吉。脾色貴如蟹腹黃。形如枳實必災殃。肺形獨貴豬脂狀。枯骨定知壽不長。腎色最尚如鳥羽。形如炭煤非吉理。色去將兩色分吉凶。灼然不虛語。更看人氣清明順。神昏氣

餒作凶認瘦而氣壯色必實肥而氣怯色必妙
 壯則實以安祥氣怯則虛壽不長再看得病面如
 何發熱額上紅必多青色現時急驚作若成昏暗
 定知死額冷足冷夾食驚額熱足熱傷風重顛門
 貴合不宜陷腫起成坑兩無用印堂青色驚之疴
 紅色心驚白主和或見微微青紫色只因客忤驚
 相過山根青兮驚為疾紫色傷於乳和食瀉脫宜
 黃白須延年壽黃為吐利基若成眈白是平虛兩
 頤赤為啼哭熱左腮紅是痰氣為右腮紅是傷風

熱面青唇赤傷寒至面目皆黃濕熱生面黃弄舌
 五心熱兩眉紅主兒夜啼眉縐頭疼痢疾為眼睜
 浮腫主久嗽病之將瘥目皆黃淡紅心熱無多說
 目多直視乃驚風赤脉貫睛肝病凶魚目定睛非
 吉兆瞳人中陷死之宗

三關觀指舉症

虎口三關左手圖應心肝



男兒握拳大姆指於外為順於內為逆

虎口三關右手圖應脾肺



女兒握拳大姆指於外為順於內為逆

魚刺形



青驚疳赤身熱

懸針形



青黑水驚赤色肺熱慢驚

水字形



主咳嗽積滯驚風

乙字形



主驚色青黑慢脾風

如環形



主傷食嘔吐

如鈞形



主傷生冷物

雙鈞形



主傷寒

如蠶形



主傷硬米食物

曲向外形



主傷風多汗

曲向裏形



主傷寒無汗

如絳形



主脾經濕熱泄瀉

川字形



主食積五臟有病

三關通度形



若紋細而紅外在裡可救青黑不治

三關觀指脈法

陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑。部位既別逆順難明若存寸舌之浮沉必乃橫亡於。孩子須明虎口辨別三關消詳用藥始無差誤。

寢後方將形脉看要分寅卯辰三關男看左手女看右氣寅風卯命辰安紋青枝紫驚為病紋紫枝

紅傷寒症。紅爲米粒。肺結熱。黑色透辰傷暑。論青紋瀉痢胃家寒。白色微微卽是瘡。枝赤涎潮胃痞。膈黃紋隱隱困脾。端枝形宛爲鉤。鈞樣傷風傷寒。分所向向外傷風有汗形。向內傷寒無汗相。枝青渾如魚刺形。驚疳虛風三部分。枝直懸針青黑色。水驚肺熱慢脾。併枝如水字三關有。咳嗽積滯風疳久。枝如一字青紅紋。總是驚風慢脾疾。一曲如環傷食于兩曲。如鉤傷冷看三曲。長蟲傷硬物。雙鉤脈樣是傷寒。枝形或似如蛇樣。定是脾經濕熱。

多亂紋食指如川字。食積相兼五臟疳。

臍風撮口

臍風撮口總爲一病。未有臍風而不撮口。未有撮口而非臍風也。患此病者九死一生。蓋臍命根也。臍爲風所入。命根絕矣。而可以得生乎。求其所屬之經。乃心脾之症也。開口屬心。閉口屬脾。風入於臍。先流於脾。由脾而至上。傳入於心。心爲邪所客。故口不能開。而頻撮也。其發搐者。風使之也。究其病之所由。成有內外因之異。蓋臍帶繫於胞。必其未生之時。其母先

感風邪遺其邪於小兒謂之胎風其驚搐者謂之胎驚病從內得故曰內因其或斷臍之後包裹失於周密被窩風入來及六七日而臍帶已脫必成此症病從外得故曰外因有以艾灸其臍徒苦之耳竟何益哉欲求一生於萬死之中惟下之而已矣外此更無他法

立方

復生飲 治一切臍風撮口

牙皂

僵蠶

穿山甲

各六分

麻黃

防風

膽星

半夏

各五分

甘草

三分

大黃

一錢後入
畧煎一滾

先卽以此兒脫下臍帶煎五六沸去帶再入前藥煎臨服加入薑汁竹瀝各二茶匙麝香少許調勻徐徐以匙灌之以通利則有生機

又方 前藥不効再服此劑

牛黃

僵蠶

各錢

膽星

八分

麝香

一分

右爲末每服五分薑汁調灌下

封臍散

生南星爲末封臍不可再見風

重舌鵞口

舌者心之苗也。以爲君火其體本熱。而況小兒以純陽之軀。先受於胎。復感熱於外。其母愛惜之至。惟恐其寒。而又裹之以綿衣。覆之以重衾。幾何而不爲兒之病哉。重舌鵞口之症。未必皆兒之自病。或者其母有以致之也。古人云。若要小兒安。常令飢與寒。飢則不致於傷脾。寒則不致於生熱。此保嬰之道乎。所謂寒者亦非使之凍也。惟令常溫。不至甚煖耳。冷煖得宜。豈復有鵞口重舌之患耶。然何以名之曰重舌重

舌者。舌下腫突其狀。又若一層。故謂之重。非真有兩舌也。何以名之曰鵞口。鵞口者。滿口皆白。有似鵞之口中。俗謂之雪口是也。分而言之。重舌屬心。鵞舌屬脾。合而言之。總爲心熱。何者。心統於脾。故曰治於口也。使不由於心熱。則口雖白而舌自赤。何爲而舌上皆白耶。大法內服瀉心清熱之劑。而外敷涼藥。則重者可消。白者可退矣。

立方

清熱飲 治重舌

黃連

生地各一錢 甘草

木通

連翹

石蓮子各五分

淡竹葉七片時時灌入口中。

瀉脾飲 治鷺口。

山梔

石膏 黃連各八分 生地

黃芩

白茯苓各七分

燈心十莖徐徐灌之即愈。

涼心散 重舌鷺口皆可吹入舌上。

青黛

礪砂

黃連人乳拌曬 人中白各二錢

風化硝

黃栢各一錢 冰片二分

右為極細末吹之並治口疳。

丹毒門

丹毒火症也。得於胎熱其母受胎之後。不忌胡椒薑蒜煎熬炙烤酒麪之類。或感風熱或不節房事。皆能助火。火邪內攻。胎受其毒。而傳氣於兒。故小兒出胎之後。多有是症。近則五六日。或十日。或半月。遠則彌月之後。或兩三月。其症形不同。或頰下如櫻桃突出。色赤而光。謂之赤瘤。或遍身紅點如灑珠。謂之丹疹。

或遍身紅腫。熱氣如蒸。謂之火丹。或小腹踴上陰囊等處。忽然紅腫如霞。流行不定。謂之赤遊丹。病名非一。總為丹毒。丹毒入腹。腹脹不飲乳者。必於未入腹之時。急服退毒涼劑。外用小刀輕輕刺出惡血。猶有可生。其入腹者。無如一瀉。間有瀉而得生者。乃千百中之一也。諸丹毒。惟赤遊丹為至危。善保嬰者。若見小兒多啼多哭。多乳則遍視其身上。一有紅色。即急治之。苟看視不周。丹毒在身。而母猶未覺。及至覺時。已入腹矣。救之奚及。丹毒惟絲癩不治。因久服熱

藥遺熱在胎。非藥所能解也。

立方

解毒湯 治小兒一切腫硬。嫩赤諸般丹毒。初起即服立愈。

黃芩

黃柏

黃連

各一錢

甘草

連翹

天花粉

皂角刺

各五分

竹葉十片。不拘時呷之。

化毒飲 治火丹遍身紅腫。

赤芍

當歸

甘草

大黃

各八分

水煎不拘時服。

防犀飲 治丹疹遍身如洒珠者。

防已 三錢 朴硝 犀角 黃芩

黃耆 升麻 各八分

澹竹葉十五片煎服。

消毒飲 治五種丹毒。

鬱金 天花粉 乾葛 各一錢二分

甘草 赤芍 各八分

燈心二十莖不拘時服。

搽毒散 多年胞衣化開同金汁塗之神效。

又方 綿羊腦子同朴硝研貼患處并治赤癰神効。

十種丹毒三日不治毒入腸胃則不可救治法

錄後

一從頭項起腫用蔥白研汁塗之。二從頭上起紅

腫痛用赤小荳末鷄子清調搽。三從面起紅腫用

麤心土鷄子清調搽。四從背起赤點用桑白皮爲

末羊脂調搽。五從兩臂起赤腫黃色用柳葉燒灰

水調塗。六從兩脇起虛腫用生鉄屑和猪糞調搽。

七從臍上起黃腫用檳榔末米醋調搽。八從兩脚起赤腫用乳香末羊脂調搽。九從兩脚有赤白點用猪槽下土麻油調塗。十從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調搽。

中惡門

天吊

客忤

夜啼

中惡天吊者為惡鬼之氣所中兩日上攏吊起而不能勝也。此因胎氣不足精神失守虛之所在邪必勝之心虛則神走肺虛則鬼亂肝虛則鬼亾脾虛則意擾腎虛則精乏而鬼得以犯之矣。其症面白帶青或

土色目睛上視口吐白沫手足拘攣身冷如冰有似於驚風而實非驚風也。又有所謂客忤者非中惡之謂也。乃偶見生人異物卒然驚駭啼哭不止心志恍惚聞響即跳常欲躲避之狀者是也。如為所忤犯故為客忤豈以客為鬼乎。又有所謂夜啼者非客忤之謂乃心經受熱也。其症至夜即啼百計安之而不能止蓋心為君火而主於血夜則血歸於肝而心虛火熾故煩燥不寧而多啼也。

立方

定神散 治中惡天吊。

茯神

遠志

膽星

麥門冬 各五錢

石菖蒲

二錢 琥珀 一錢五分

右為末每服二錢滾湯調下。

抱龍丸

治中惡天吊夜啼客忤等症每一丸薑湯

下。方見驚風門

安魂湯

治客忤立効。

棗仁

茯神

遠志

各一錢 當歸

膽星

各七分

燈心二十莖煎服。

保安丸

治夜啼。

人參

麥門冬

黃連

茯神

龍齒

遠志

各五錢

硃砂

一錢五分

金箔

二十片

右為末蜜丸朱砂金箔為衣每服一九滾湯化下。

吐瀉門

附食積傷食

小兒吐瀉交作人皆以為脾胃受寒不能容飲食故上則為吐下則為瀉此據其病形而言耳而不知脾胃受寒者止於腹中餵餒作痛或微洩或吐痰涎而

已其勢殊無可畏。至於大吐大瀉。一時發越。津液頓
亾。面目乍瘦。豈受寒之為病哉。必是平素先傷飲食。
鬱蒸作熱。蓄之既久。將發未發。一感外之風勢。勢不
可遏。故攻擊臟腑。一齊而至。遂令小兒困憊。當此之
時。若以為吐瀉空虛。即投補劑。盡溫熱之藥。立見危
亾。慎之慎之。如有吐而無瀉。或有瀉而無吐者。乃有
寒熱之分。吐酸臭而苦者。熱也。清痰則非熱矣。瀉臭
穢而不可近者。熱也。

立方

藿半散 治小兒吐酸苦者。

黃連 薑汁炒 半夏 薑製 藿香 各五錢 白茯苓

砂仁 各三錢

右為末。每服二錢。不拘時。薑湯調下。

安然湯 治吐清痰者。

白豆蔻 蘇子 藿香 各一錢 膽星

陳皮 各八分

生薑五片。不拘時煎服。

震齡散 治小兒吐瀉交作。

木瓜

厚朴

砂仁

藿香

各五錢

木通

白扁豆

黃連

薑汁炒

白芍

廣木香

各三錢五分

右為末每服二錢白滾湯調下

和脾溫胃散

治小兒瀉利清水不止

陳皮

蒼朮

白朮

白茯苓

甘草

防風

各五錢

肉桂

二錢

右為末薑湯調下一錢

消滯調脾飲

治小兒泄出臭穢之極

陳皮

滑石

黃連

各八分

神麩

麥芽

白芍

車前子

澤瀉

各六分

生薑三片不拘時煎服

香橘丸

治吐瀉或食積所傷肚腹作痛脾胃不和

蛔蟲上行並皆治之

橘紅

茯神

青皮

麥芽

厚朴

山查

各二兩

砂仁

三稜

神麩

人參

澤瀉

各一兩

甘草

五錢

右為末蜜丸如龍眼每服一九薑湯化下

附食積傷食

消瘦散 治小兒諸食所傷以致肚腹膨脹面色黃瘦

蓬朮 三稜 陳皮 山查

草菓 去殼各一兩

右為末每服二錢薑湯調下

針砂丸 治小兒腹中食積成塊堅硬如石作疼痛塊身面俱黃肚腹脹大

針砂 四兩煨紅醋淬七次 使君子 肉三稜 各二兩

草烏 皮醋煮 南木香 皂麻 煨

鷄肫皮 各二兩炒 蝦蟇蛆 蘆薈 各二兩五錢

右為末以練樹皮煎湯為丸如棗豈大量兒大小或三四五六分臨睡苦茶下

運脾飲 治小兒飲食所傷腹中作痛脾氣不調

香附 蘿蔔子 陳皮 山查 各六分

廣木香 白朮 青皮 丁香 各四分

生薑二片不拘時溫服

驚風門

夫風一也。在大人則爲中風。在小兒則爲驚風。大人無驚。故名之曰中。小兒易驚。且易惹風。故以驚名。而兼乎風也。驚之有慢。有急。猶風之中。腑中。臟急。驚與中。腑同。謂之陽症。而症俱在表。慢驚與中。臟同。謂之陰症。而症俱在裏。治者能辨其陰陽表裏。而治之。斯可以無悞矣。蓋急驚之症。其身常熱。其眼常開。手足直跳。頭項強直。痰涎壅盛。啼叫哭泣。煩燥不寧。者是也。慢驚之症。身常不熱。眼常半開。手足微掣。精神倦怠。形體若呆。大便或洩。者是也。又有慢脾風者。虎口

紋青紫色。或黑色。隱隱相雜。似出而不出。手足不動。遍身皆冷。兩眼常合。不能啼哭。症若至此。無復救矣。慢驚病根。固有淺深。而亦可以施治。於萬一之中。若因急驚而變慢驚。或因吐瀉而生慢驚。則難治矣。因慢而成慢脾。或因吐瀉而致慢脾。則不治矣。大抵驚屬於心。風屬於肝。心火動則振跳。而不可遏。肝氣發故搖擗。而不自持。二經相助。其勢必盛。心火有餘。則火熾而風益猛。是風從火出也。肝有餘。則風狂而火益旺。是火從風熾也。風火齊發。故可畏。此特以急驚

言之耳。而慢驚慢脾。又兼脾虛與寒。勢若稍緩而及深焉。然以其病之可生可死而細分之。則各有所屬。非謂止於心肝二經而不入於他經也。是故不時吊眼者驚入於肝。夢中咬牙者驚入於腎。夜啼至晚者驚入於小腸。喉中如鋸者驚入於大腸。面青下白驚入於膽。氣喘吸水者驚入於脾。不時乾嘔者驚入於胃。睡中驚哭者患在三焦。此皆可生之症也。至若瓜黑者為肝絕。瀉黑血者為心絕。日多盜汗者為胃絕。忽作啞聲為肺絕。咬人者為骨絕。眼半開半合者為

腎絕。口鼻乾黑者為脾絕。驚風患此七絕。其兒何能得生耶。

立方

秘寶萬靈丹 治急慢驚風。慢脾風。垂危者。一丸立愈。

- | | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 牛黃 | 硃砂 | 礞石 | 蛇含石 |
| 燿蠶 | 全蝎 | 膽星 | 半夏 |
| 茯神 | 麝香 | 金箔 | 銀箔 |
| 皂角 | 麥門冬 | 錢煎膏 | |

右為末。以皂角麥冬膏為丸。如櫻桃大。金銀箔為衣。每服一九。薑湯化下。

鎮驚丹 治急慢驚風發喘痰盛。或咳嗽并痰迷心竅。不能言語。

南星

薑汁炒

防風

枳實

麥麩炒

天麻

甘草水浸煨

半夏

薑製

桔梗

各二兩 四錢

熟大黃

九蒸九曬

生大黃

礞石

用生各一兩

巴豆霜

去油淨 二錢

辰砂

雄黃

各四錢

右為末。蜜丸。如粟米大。量小兒大小。或三四分。薑湯下。有風寒。蔥湯下。

抱龍丸 治驚風發搐。或風痰身熱。

膽星

琥珀

雄黃

硃砂

各五錢

天竺黃

全蠍

各六錢

麝香

一錢

甘草

二兩煎膏

右為末。甘草膏為丸。如芡實大。每服一九。薑湯化下。

保嬰秘効散 治急慢驚風。或胎驚。臍風。撮口。天吊。

夜啼。奇怪異症。

牛黃 一錢

膽星

琥珀

珍珠

各一錢五分

滑石

茯神

遠志

各二錢

麝香

硃砂

各六分

大黃

九蒸九曬五錢

右為末量兒大小四五分燈心湯調下

聚寶丹

治慢脾風神効

人參

五錢

白茯苓

琥珀

天麻

膽星

防風

各八錢

全蝎

三錢

礞石

白附子

烏梢蛇

硃砂

各二錢

麝香

一錢

右為末蜜丸如芡實大每服一丸薑湯化下

至寶湯

治一切驚風等症

天麻

膽星

白附子

陳皮

各五分

礞石

鈎藤

白朮

白茯苓

各三分

甘草

一分

生薑二片不拘時煎服

疳積門

小兒疳症大抵多是過食甘甜味之物停積於脾不能消化則變而為疳疳者甘也脾喜甘而凡屬於甘者其味皆屬於脾從病從甘故名曰疳其症身體常熱形容黃瘦小便如汁肚腹膨脹毛髮黃腫臉多

白印。惡心欲吐。飲食不爲肌膚。或頭面頭上多生瘡。瘻而疔之大槩有如此者。此脾之症也。脾先受病。傳於他臟。故有五疔之名焉。在心則爲驚疔。在肝則爲風疔。在脾則爲滾疔。在肺則爲氣疔。在腎則爲急疔。五疔分屬五臟。而其爲病亦未盡同。悉而言之。則渾身壯熱。四肢無力。面黃臉赤。怕寒愛煖。口臭乾燥者。因驚撲而成。所謂驚疔是也。搖頭揉鼻。白膜縵眼。揩磨多淚。面有青色。體渾瘡癩。毛髮焦墜者。因感風而成。所謂風疔是也。食物難消。愛食泥土。腹大有筋頭。髮稀疎。喘息阿欠。無歡欲啼。痢多酸臭者。因傷食而成。所謂滾疔是也。多啼嗽逆。鼻頭生瘡。昏昏愛睡。體瘦腸滑。四肢軟弱。面色帶白。瀉濃吐血者。因傷氣而成。所謂氣疔是也。瀉痢兼作。吐逆脫肛。身體壯熱。手足偏冷。飲食不進者。病勢已急。所謂急疔是也。五疔之症。惟急疔爲難療。以其腎氣不足。上來尅水故也。要而言之。總歸於脾胃上一虛。則不能攝五臟之氣。故其傳變至於如此耳。

立方

保命丹 治諸般疔積神效。

大蟬 二隻剖開。砂仁。胡黃連。各五錢。

皂角 二枚煨。灰存性。 蛤粉 三錢 麝香 二分

使君子肉 一兩

右為末以神麴打糊為丸如粟米大每服一錢薑湯下。

肥兒丸 治疔積肌肉消瘦肚大筋青飲食不思或

泄瀉口渴。

黑蟬 以大者不拘幾隻。放深缸中。取糞坑內蛆淘淨。倒其缸內。任從自食。待五日。瀉出糞。

水取。起。倒。掛。陰。乾。炙。脆。為。末。三。兩。

人參 一兩 白木 使君子肉

山查肉 各一兩 宣黃連 胡黃連

白茯苓 蘆薈 蓮子 各八錢

右為末陳米糊為丸每服一錢米飲化下。

鷄肉丸 治疔癆壯熱形體羸瘦眼閉不開四肢漸

小肚腹漸大。

黃連 薑炒 柴胡 鶴虱 秦艽

知母 酒炒 黃芩 酒炒 使君子 炒 蘆薈 各一兩

蕪荑 五錢

共為末。用黃雌雞一隻。以大麻子飼之。七日。縊死。去毛淨。尾上開一孔。取腸洗淨。拭乾。入前藥末於內。縫密。以小甌先用黑荳舖底。安雞上。又以黑豆蓋之。厚三寸。蚤晨蒸至晚。俟冷。去骨。搗爛為丸。如乾加酒少許。丸如麻子大。每服十九。五歲二十九。量兒大小加之。白滾湯下。

雞肝散 治疳積眼目不明翳膜朦朧

雄雞肝一具 威靈仙

白土

各二錢為末。即打米光粉。

右雞肝同二末。煮熟。只食肝。每日一箇。七箇全愈。

瘧疾門

小兒瘧疾。不外乎風痰與食。無食不發熱。無風不作寒。而痰食風之所成也。外感風寒。則手太陰肺經先病。肺主皮毛。故風易入內。傷飲食。則足太陰脾經先病。脾受有形。故食多則傷脾也。肺氣不清。則生痰。脾土受傷。則裹痰。故痰者風食之所成也。無痰則不成瘧。故寒熱作焉。要而言之。風雖屬肺。食雖屬脾。而風食之所藏。又近於膽經。故作寒熱。蓋膽經為足之少

陽其位在半表半裏。是以寒熱往來也。大率寒多則為風。熱多則為食。寒熱相半則風食俱多。治此病者。惟消食疎風化痰而已。然消食必兼疎風。疎風必兼消食。而消食疎風必兼化痰。蓋三者不全則不能成瘧。故宜兼用。但量其所屬輕重可也。

立方

疏脾飲 治小兒因風成瘧。

紫蘇

柴胡

半夏各一錢 防風

青皮

厚朴

川芎各五分

生薑三片不拘時熱服。

檳陳飲 治小兒因食成瘧。

山楂

青皮

草菓各八分 檳榔

枳實

半夏

柴胡 麥芽各六分

生薑三片空心煎服。

平妥飲 治小兒痰瘧來時作嘔。

半夏

貝母

橘紅

柴胡各七分

黃芩

草菓

白朮

枳殼各五分

生薑三片不拘時熱服。

驚甲飲 治小兒久瘧不住。

何首烏

驚甲

酒炙

當歸

白朮

人參

黃芩

各八分

黑棗三枚。空心煎服。

痢疾門

凡瀉在脾而痢在腎。故先瀉而後痢者。則曰脾傳腎。為賊邪。其病難愈。先痢而後瀉者。則曰腎傳脾。為微邪。其病易愈。此前人之說也。以愚論之。瀉為在脾。不暇言矣。而謂痢為在腎。不能無議焉。瀉固多由於飲食而痢獨非飲食之所傷乎。飲食停積。因濕熱而化。遂為稠濁膠固於腸胃之中。欲下不下。是以有裏急後重之苦。明是脾經之病矣。而顧以痢屬於腎者。何所謂歟。吾未聞飲食之入。不由於脾。而反由於腎也。大槩謂之腎病矣。然治痢之藥。悉用蒼朮厚朴黃連木香白朮陳皮之類。並未有用杜仲黃柏牛膝地黃補腎等藥。治腎之疾。而乃用脾家之劑。必其非腎病故也。要之。先痢後瀉而易愈者。以其積滯已盡。而脾尚虛也。豈腎傳脾之謂耶。先瀉後痢而難愈者。以脾

土已壞。而積滯方壅也。豈脾傳腎之謂耶。腎能藏精。不能藏飲食。若以痢屬於腎。則飲食皆藏於腎矣。豈理也哉。大約治痢之法。與大人無異。但下痢純血者。在成人則為難治。在小兒則為食積。而無所妨。而治小兒之痢。又宜多以消積為主。其詳具大人痢疾門。不復細贅耳。

立方

通快飲 治小兒痢疾始發

- 山查 一錢 麥芽 蒼朮 萊菔子

- 枳實 木通 各七分 大黃 檳榔 各一錢

生薑三片。不拘時熱服。

金寶散 治小兒赤白痢疾。肚腹作痛。裏急後重。

- 廣木香 黃連 酒炒 陳皮 各三錢 肉豆蔻 麩包

- 厚朴 炒 車前子 各二錢 白朮

- 白查 蒼朮 各一錢

右為末。每服一錢五分。空心燈心湯調下。

歸芍飲 治小兒痢疾久不肯住。

- 人參 白朮 白芍 白茯苓

柯子肉 各五分

烏梅 半箇 黃連

厚朴 肉荳蔻

柴胡 各六分

黑棗二枚空心煎服。

傷風門一

傷風之症頭疼身熱鼻塞氣喘噴涕呵欠呻吟不絕。見風便怕灑淅微寒與大人傷風無異若挾食即吐食挾痰即吐痰藥劑比大人所服者宜減一半不論有痰有食否常須兼用清痰消食之藥蓋小兒易傷食而熱則生痰故劑中宜畧用輕輕疎解令汗微出

不宜過多過多則真元亦傷是伐無過之地也

立方

柴葛湯 治小兒傷風頭疼發熱鼻流清涕

紫蘇

乾葛

前胡

柴胡 各七分

枳殼

半夏

陳皮

甘草 各五分

蔥白三莖生姜二片煎服

保幼湯 治小兒冒風嘔吐頭疼身熱

羌活

山查

紫蘇 各八分

藿香

柴胡

桂枝 各八分

生姜五片煎服

咳嗽門

小兒咳嗽風熱居多而寒者間或有之以其為純陽之體其氣常熱而不甚寒也凡肌肉肥白者易於惹風赤而堅實者易於感熱惟虛弱瘦損面青不澤乃易感寒為感風而嗽者必鼻寒氣粗多涕多淚或發熱多痰是也感熱而嗽者無鼻寒氣粗之症唯口中發熱舌燥煩渴而赤頓嗽而有濃痰是也感寒而嗽者灑淅惡寒哮喘不寧至冬日即發是也凡此症

與大人無異而所感畧有不同大人兼七情所傷或任勞嗜酒而小兒無是是以不能無少異耳藥劑以輕清為佳而服藥亦不宜太驟當逐時進之不必盡劑。

立方

平肺飲 治感風邪咳嗽痰多灑淅惡寒

陳皮 前胡 桑皮 薄荷

防風 各五分 瓜蒌仁 蘇子 桔梗 各四分

生薑三片煎服

八卦部位舉症圖



中央戊巳
土疎黃無
辛苦若見
紫黑色便
是木來尅。

涼肺湯 治肺熱咳嗽。痰盛音啞。

黃芩 貝母

天花粉 枳殼 各七分

橘紅 山梔

桔梗 麥門冬

甘草 各五分

燈心三十莖食遠服。

定嗽湯 治小兒肺有寒痰咳嗽并作氣喘。

款冬花 杏仁 橘紅 各八分 桑白皮

枳實 各六分 瓜蒌仁 膽星 各五分

生薑三片不拘時煎服。

八卦舉症歌

乾宮屬大腸稠密背受殃。糞門多癢塌宜服保元湯。
坎宮屬腎水稠密陰疔起。腎腧似火燒七日歸泉裏。
艮宮屬腎經梅花甚不仁。若加紫黑色八日落牙根。
震宮乃肝木宜大不宜三。如品如串樣十四日歸山。
巽宮屬小腸稀疎宜帶黃。若還梅品赤淋閉還不妨。
離宮屬心火蟻形甚不可。四肢不容針遍身無你我。
坤宮屬命門生灰在其中。稠密終不好疎朗亦無凶。
兌宮屬肺金更多我不驚。若還無空地留背反相因。

耳紋看法一見吉凶皆自知

耳紋圖



歌曰

耳後筋紋淡淡紅疎疎磊磊決無凶。若然紫黑青白色任是軒岐枉費功。

耳後紅筋赤一條又無枝葉上面高。將來必主心經痘頭面若稀不必憂。

耳邊紫黑魚刺形紛紛却向裏邊行。將來必主肝經

痘。滿身班黑入朝冥。

耳後蒼筋痘主稀頭大尾尖人不知將來必主脾經
痘向外排行疎更奇。

耳後淡白亂如麻紛紛俱往外頭爬將來必主脾經
痘形如蠶種七朝嗟

痘疹忌觸十四款

腋下狐臭氣。溝渠濁惡氣。房中淫液氣。婦人經候氣。
諸般白腥氣。酒醉葷腥氣。硫黃毒藥氣。麝香臊穢氣。
痰汗蒸濕氣。悞燒頭髮氣。魚骨腥臭氣。蔥蒜葷蕪氣。

立煎油膩氣。坑廁尿糞氣。

治痘總論秘訣

痘之發與雜症不同。雜症只在一經。痘則五臟之症
俱見。古云似傷寒者亦大槩言也。寒由外入。痘自裏
出。故惡寒無汗。頭痛脊強。左額青紋。面色慘而不舒。
此傷寒之所有。而痘症之所無也。兩眼含淚。臭氣出
龕。睡中微驚。耳紋現。惡熱不惡寒。此痘症之所有。而
傷寒之所無也。五臟症已詳。

凡初熱時。睡中微悸。臭氣出龕。斯二者僅可作痘症。

驗有云中指獨冷耳尻冷等說不必信。痘者豈也。肖其形則生。不肖其形則死。形之不肖。元神竭矣。尖圓而凸。周淨而聳。形之有神者也。如麩如沸如疹如疥如蠶種如蛇皮如蚊跡如蚤斑如湯泡如火刺。形之無神者也。形而無神。可冀生乎。至如色也。欲如春花之在露。不欲如秋草之經霜。紅白兩分明潤光活。色之有彩者也。如膩粉如枯骨如紅米飯如猪肝色。色之無彩者也。形不有神。色不現彩。生意可知矣。嗚呼。神彩其生死之門戶也。

凡看痘先看元氣。痘兒元氣非有非無。唯心領意會耳。已如形色初善而終變惡者。元氣內竭也。形色初惡而終歸善者。元氣內強也。元氣本也。形色末也。故善者必求本。

人知痘藉氣血。不知痘之所藉。尤有超於氣血者。元氣是也。蓋元氣盛則氣血流通而領遂有負戴並行祛毒痘必應期而開落。元氣一虧則在外者內不續。在內者外不固。毒肆妄行。或出或入。而爲外剝內攻矣。調養真元。補益氣血。誠治痘完策。不得已而欲攻。

他症中病卽已。經日常毒治病十去其八。無毒治病十去其九。

夫包血成圓者氣也。氣能拘血制毒則痘窠必圓。尖而周淨附氣成暈者血也。血能附氣制毒則痘暈必光明而紅活。頂陷者氣之虛塌陷者氣之離。暈枯者血之虛根散者血之離。圓也暈也。氣血之所爲也。而所以成圓成暈者氣血不得專主也。

根窠者血之暈。膿者血之腐。故六日之前專看根窠。無根窠必不貫膿。六日以後專看膿色。無膿色必難

收靨。此理也。勢也。

無形者依有形。有形者附無形。互相依附。固天地之道。亦氣血之道也。氣之離不由血之散乎。故自氣血交後。常規根窠爲憑。準麓紫紅活。生意沛然。若微細而不現不斂。且黯淡則氣將飛去。而必不克制毒矣。是故內攻根散者死。內攻而根血猶附。非毒作楚。必三因致之。頂白根紅。氣血分也。在四五日間不分。則後必作癢。頂冲根附。氣血交也。在六七日不交。則後必有變。至是而根白地清。起勢勃勃。可不藥而愈。若

深紅壯熱。疔將作也。四日用清。六日用補。乃治常痘。繩墨。

氣血有常而不能盈於常。而能自虧於常。然亦有盈者。何也。毒壅於氣。火搏於血。耳班者。血有餘也。泡者。氣多甚也。經曰。邪氣甚則實。精真氣奪則虛。

凡形色大惡。氣血不交。漿不成。似爲成症。若精神爽。朗。便食如故。而天庭上有一二顆。悅目者。猶可發毒。作臭爛而愈。何者。毒在外不在內故也。

毒停肌肉則發腫。毒滯皮膚則作臭。肌肉陽明主之。屬土。皮膚太陰主之。屬金。癰腫土象。疔臭象金。亦各從其類也。

書謂紅班生紫班者死。黑班藍班百不救一。亦有紅死而紫班藍班得生者。班血熱也。失於解利則發班。惡痘班出勢所必然。無論顏色。

但天庭疎朗形色善而班出。又當別論。昔一班症。諸醫莫治。召予視之。已七日矣。班分上中下。上紅班中紫班。下青班。視其痘則綻凸疎朗。內含清水。色雖黑黯。而精神爽健。視唇舌則多苔燥。予曰。失解故也。進

以清涼自愈。後果然由是。書不可拘也。察形色驗唇舌。是準疔之結也。亦熱毒壅甚。失於解利。內不能入而結。隨道空隙之所。惡疔結逆轉為順矣。但結前後心者死。結耳門喉下者死。辨疔有法。慎無以黑毒作疔。黑痘猶痘也。疔則陷入肉中。形如螺蓋。捏之有核。割不知痛。其白根或長寸許。醫多誤認。曆後疔爛。生肌散治之。

痘之所恃者血為養而氣為充也。故眼鼻必欲封合。眼合則神不馳。鼻封則氣不逐。神氣內榮而毒不為制伏者鮮矣。抑又有微甚寒而有涕。美之微也。鼻塞而竅外乾黑者死。封而有淚生之兆也。眼封而沿眶塗煤者。死。眼封當在五六日間。若未腫過而封後必有眼疾。痘少者不封。或封而纔靨即退。

氣血之分猶清濁之本乎。上下也。氣血之交猶陰陽之互為依附也。當分不分。毒結之當交不交。毒隔之知升陽散鬱。何不分之患。知清熱解毒。何不交之患。痘之形症有四。曰毒壅。曰血熱。曰氣虛。曰血虛。又虛實有四。表裏虛實是也。見點稠密。形不尖聳。色慘黯。

而皮間欲出不出。此毒壅也。見點深紅而漸變紫黑。夾疹夾斑。血熱也。頂陷皮薄平塌不振者。氣虛也。色淡根散。或痘色與肉色無異。血虛也。身微熱而有汗。曰表虛壯熱無汗喘促面浮皮毛焦肌膚痛。表實也。精神困倦唇舌淡白。曰裏虛。狂亂氣甚渴飲善食唇燥而舌見黃白苔者。裏實也。毒壅也。血熱也。同爲表裏之實。血虛也。氣虛也。同爲表裏之虛。此又一而二。二而一者也。壅者疎之。熱者涼之。虛者補之。實者瀉之。不實不虛以平調之。明此八者。思過半矣。雖然辨寒熱虛實。尤當用舌作綱領。

大都症候相似。氣運使然也。彼與此一般。症狀無殊。非氣運而何。故乾涸者。火鬱勝。吐瀉而肉腫者。土鬱勝。枯燥喘促。金鬱勝。彼此凝伏。水鬱勝。鬱而不出。木鬱勝。火則清之。土則平之。金則潤之。水則溫之。木則發之。書云。責之於症。求之於經。其此之謂乎。

諒形體用藥。上工也。小兒臟腑。易虛易實。體實劑過。猶爲之損。況弱乎。凡痘極光澤極榮灌。至回謝日而忽變逆。誰之咎。欵形體素虛。理宜補益。不察而爰行。

攻劫使人元氣一驅而出。外雖榮灌。內實耗蠹。欲不
歿者得乎。諒形體者非泥於形。而審形。形之神也。痘
陷有五。有白陷。有紅陷。有灰陷。有紫陷。有黑陷。皆責
氣虛。而後人責以用補誤矣。彼之論陷。有深究其源。
脣舌滋潤。身不壯熱。唯痘色遷變而陷。故責以氣虛。
若脣燥舌苔壯熱。燎人焦紫其色。而凹陷不起。果虛
乎。抑毒耶。妄執補益。猶按圖索驥耳。予治陷不然。有
外實則解之。有內實則清之。下之內外無症。則平劑
以調之。不惟治陷。卽始終亦然。藥隨舌轉。症由舌痊。
嗚呼。舌之功大矣哉。

舌通五內。人知之而莫之用。不由指示。臨局必迷。孰
知此乃用藥樞紐也。藥有寒者涼者。溫者熱者。令之
樞紐在手。則縱橫顛倒。一自我出。而是非而利害。皆
置勿論。且易虛易實。小兒也。使無定見。而謂不枉人
命。吾未知前信。

治痘有四節。次務要不紊。紊則氣血顛倒。火毒肆虐。
而諸症蜂作矣。故驚者狂者。吐者瀉者。班者疹者。腰
疼腹痛者。肉腫痘不腫者。水滄錯喉者。皆當發。發

毒鬱三焦。停滯氣道也。焦紫者。枯黑者。渴者。燥者。發疔毒者。胃爛口臭者。皆當清。不清陽明內熱所致。當補不補。則爲白陷。爲泄瀉。爲癢塌。爲倒靨。外剝內攻。中氣虛也。

當滲泄不滲泄。則反壯熱。或少食或瀉不止。或肌肉作疰癢。而疤爛。何者。脾濕內淫也。

標離而異。本合而同。藥當其節。變症息矣。不應四法。必三因乘之。六氣外襲。爲外因。驚恐內動。爲內因。調攝失宜。爲不內外因。四法正也。三因奇也。奇正互用。兩得之矣。

治痘症不治雜症。萬古秘論也。雜症有日。痘症止而七耳。且痘中之症。緣失治而作。今猶治症不治痘。將症愈甚。而痘愈憊矣。

發熱三日訣

夫痘不熱不發。猶五穀之不熟不結。身有熱也。乃毒與時氣相觸。而動內傳百脉。外注皮膚。痘未見而先兆。此乃必至者。但熱有輕重。毒輕則熱輕。毒重則熱重。又有熱五。六日出者。有熱一日。卽出者。太過則正。

不勝邪。愆期則氣血凝滯。唯三四日身涼痘出爲正。凡發熱肌膚溫平潮潤唇舌滋潔無苔聲音清亮睡中微驚便食如故。或少食貪睡皆吉兆也。重則反是一發熱卽唇裂舌坑煩躁狂亂口渴惡寒兩耳灼熱兩睛紅。二便結方內加玄明粉或千里馬下之。惡熱者單下以苔爲增減不可拘在初熱當發之說。此亦百中一二。又毋執以爲常。如唇舌滋潤雖見惡症切不可妄下損人。

發熱時腹疼腰痛四肢酸痛皆重症若表過痛止者吉痛加甚者凶。

發熱吐瀉切不可行止法惟吐瀉酸臭可加消導藥佐之是傷食也。驚發痘前者吉何也。由驚陽痘痘屬陰陽被陰冲則壅遏之患息故吉。照前加減治之。母服驚藥誤服而水其毒釀害匪淺亦有一驚卽然此必中惡。

發熱時譫語顛狂見神見鬼躁亂不寧是熱甚失表外邪內毒兩相搏激也。重發之則愈舌見黃苔非下不可。

衆聖丹

陰酥如田

山甲

用河

不中者

外麻湯

調服

凡臟腑鬱毒非微汗則不解故一發熱必用汗藥也。身熱四五日不退者知毒猶在內務要熱退為佳。身熱四五日不退痘影焦紫鬱鬱不出此必寒氣外鬱閉塞鬼門也令服驚蟄丸發出臭汗則熱自退痘自出也。

一發熱頭面中有大痘數點餘不出復不除熱此名日報痘急用銀針剔破不去則領敗正氣為雷連之禍。

初發熱即頭溫足冷之渴大便澹面皖白或瀉痢清

穀咽食不化虛症也

凡熱時燈照肉肉有隱隱紫紅塊者重而紅唇白赤重再加形色不善死必矣。元竅流血者死日閉無聲。舌黑聲啞胃高而凸掌文出血皆死症不治。

見點三日訣

見點三日死生判矣。斷於此時方稱高列關竅唯面部為喫緊。面者諸會之首。天庭印堂尤面部最緊要者。天庭為看痘把柄。何者元神所歸也。元神者元氣也。小兒出痘不過氣血毒三字。氣血又元氣所統也。

元氣勝毒開落應期。毒勝元氣內攻外剝。毒既勝矣。又安望元氣之復勝哉。故此處先見先起。先貫先曆。密而瘳慘而黯。皆死症也。毒從虛發信矣哉。

凡見點磊落。摸得礙手。色潤澤。眼部以下先見身熱。漸退吉症也。磊落礙手稀而有神者也。色潤澤謂有彩也。天庭後見元氣固也。反是者逆。

痘初出時三五相連者。後必密。單見者稀。毒之淺深。於此預見矣。

形屬氣色屬血。兩者均可驗吉凶。決生死。人何專言血而不及氣。氣無形難知。血有色易見。故見點三日。色如猪肝者。死。如紅米飯者。死。如洗過舊紅袖者。太重。雖然面部上有數十顆有神彩者。亦可救活。不慮形惡。慮無神。不慮色惡。慮無彩。神綻而凸。彩潤而明。惡痘中見有一二紅活可愛。雖凶亦吉。何者元氣猶存也。大都自眉以上幾點悅目可愛。又不瑣屑。又不歪斜。雖遍體稠密。雜症百出。終不至於死。悅目二字。卽予筆舌難盡。罄在學者意會。

見點頭焦。面色或紫者。血分毒熾也。滿天秋治之。脣

燥舌苔熱見愁黃苔起者千里馬蓋焦紫雖血熱而未必不由內熱也審之以舌藥斯當矣
見點白如水珠者重若稀疎不密其人平素色黃而兼痘起發氣至而血不至也當與散火倘神不內寧痘日增多頭尖作痞子形毒太甚也恐非藥可愈矣若見點色白不紅不可便作虛治白而無神脣舌淡白或吐或瀉虛症也若白而起眈色脣舌赤紅非虛也是伏火痘也三日後必漸變紅紫倘作虛治其誤人不淺見點腳冰冷者不必慮氣未下行也

見點兩日而大便尚秘舌上無苔知是血燥非毒癰也急行清解枳殼玄明粉治之恐貫時咽痛作瀉而不起方內歸芎宜倍用

初見時大小不一有色點如痧者日夾疹救苦丹治之又一等瑣屑紅點隱隱肉間日夾痧治亦同前丹症亦然但有此症必正痘悅目可愛方爲痧疹之夾不然皆痘也識者詳辨之

又有痘出數顆而夾疹遍身圓淨疎朗顏色紅活現兩日而盡沒衆醫莫不驚愕予曰疹也非痘也痘沒

必悶亂煩燥。此則寧靜。且正痘依然。予故知其爲疹也。治以平劑。後漸愈。未沒。特亦難辨焉。

點見身熱毒未盡也。但所感不同。有寒氣外鬱者。有熱毒內鬱者。兩者均且散之。救苦丹是其治也。內鬱黃苔加千里馬。其色漸焦紫。隱隱不出。而身熱壯盛。或肌膚腫亮。再加賽春雷發之。

見點自汗。有生者。有死者。丹溪謂自汗無妨。指形色善者言也。若汗出而形色日變必死。不可不辨。但治症不須以此慮。虛症也。又須看舌用藥。

凡痘出不快。須審時令藥之。冬則寒鬱。主賽春雷。夏則熱鬱。主滿天秋。然亦有虛實之別。唇舌滋潤無苔。當從虛治。

一見點色白。不甚起發。唇舌淡白。或吐或瀉。或腹膨。或自汗。肢冷。神氣怯弱。表裏虛也。治從虛例。

一見點在臍。在肛門。四圍成堆者。皆重症。

一出數點。卽發數粒。山根上者重。纔出而聲遂變。或焦或啞者尤重。

痘出數點。而面目卽光亮如瓜。口中氣臭勃勃。衝人。

其死甚速。後必發斑。吐血而死。

一見點先於眉上。或兩太陽出數粒。突起光亮。少頃即沒。此疔痘也。必死。

又有初出。愛人皮薄光亮。一兩日即大長。是未至而至。癘氣使然也。後必變癢塌而死。認爲順症。則醫殺之。謂斷乎難免。

凡患諸瘡毒未愈。或瘡毒新愈。而見點於此者。重此陽毒也。但瘡不乾紅。雖重決不死。

謂爲於可爲之時。則從爲。於不可爲之時。則凶。指險

症也。至見點如蛇皮。如蠶種蚊跡。蚤斑。湯泡。火刺。青黑藍斑。身如被杖。發斑而脣腫。口臭。頰項蒙頭。斷腰。無根色粉白如枯骨。胃高氣喘。七孔流血。面斜視如橘皮。形色不正。而驚狂。併腰疼。腹痛不止。可爲乎。不可爲乎。

凡謂斷腰無根。必諸痘形色不善。如形色圓澤。即腰脚無痘。何妨。

起脹三日訣

日起脹。是點已定。毒氣盡出時也。本乎上者。上之本。

乎下者下之。氣血定位。毒被制伏成膿矣。若白不泛。頂紅不斂。窠氣血毒混而爲一元氣弱也。苟能察形色。驗脣舌如轉柁迴流。一持而正。後段如破竹矣。凡痘三日先見者先起脹。後見者後起脹。根紅頂白。面與目漸浮腫。鼻寒流涕。口角涎出。而眼蒙不欲開。順候也。卽不然而兩腮間有一二起脹。悅目頂白根紅亦順候也。

凡起脹時色焦紫者毒甚也。形大皮薄而起縐紋者毒甚氣虛也。滿頂紅者血滯也。滯者活之。焦者清之。氣虛毒甚。補而兼解散之。但面部有一二悅目可愛。用藥當節。則枯者潤。薄者厚。而生意自勃勃矣。

起脹時諸痘未起。而其中先有起虛大色如黃金者。名曰賊脹痘。痘至五日而內外症平。宜諒起發。退紅。若不起發。不退紅。正氣虛也。方內倍人參。加黃芪。古人以此爲喚漿法。

當起脹時有一等光活可愛。嬌嫩艷觀。手捺之則破。燈照如琉璃。此假脹。又名空歡喜。急救表。或可幸治。遲則必癢塌而歿。

又四日起大駛亦非吉兆。何者。表虛毒甚也。七日後腫退倒靨。皆此之變。遇此須分虛實預防之。又有一等至五日而即帶黃色。假漿也。不信請以神彩辨之。有神有彩者為真漿。此則無也。或補或瀉。唯舌是準。

起脹時。痘上有小孔。不黑不白。曰炷痘。用保元湯加丁桂服之。其孔一密。其痘自起。

痘出五六日。眼不封鼻不塞。而大孔時下氣者。逆也。輕痘無妨。

大都痘出五六日。氣血不分。顏色焦紫。面紅腫如瓜。而痘伏。或猶烟雲罩定。或舌白至脣。濕處者。曰內潰。或遍身發紫泡。或悶亂不寧。叫哭不已。腰腹猶痛。皆死症也。雖然亦有形色本善。調理失宜而然者。又有誤餌湯藥而致者。

貫膿三日訣

痘出七日。陰中之陽盡付於外。內則空虛。如釜中甑內之氣。妙不可言。陽起一分。陰亦長一分。故其漿也。則宜漸而黃。根下血暈亦宜漸而緊。如線圍定。不鋪

散。不灰黯。晝夜痛楚。飲食倍常。大便少。身微熱。吉症也。反是者逆。至是欲決生。死唯視血暈聚散。膿色真偽耳。真者寶色。焯燁。手捏粘絲。偽則土黃也。聚者氣拘血而化毒也。散則氣虛散而真氣將竭。血暈全無者。死膿者。毒所化也。訣曰。六日以後。專看膿色。故膿有者生。無膿者死。使或有或無。而脚根不紅。或連肉灰紅。作癢煩燥。目閉復開。作瀉乾嘔。不食少睡。氣虛不能拘血化毒也。急峻補之。倘此時尚見黑苔。有刺生意絕矣。不唯不容補。卽補之何益。

漿行七日。腫要過頸。漿要過胃。腫者毒外出也。言過胃者。從上下也。至陽物亦要貫。乃宗筋之會也。兩脚不貫不妨。又兩臂亦宜滿。不然臨收時。必不食而生他變。手臂脾所主也。

痘出七日。或大瀉者。氣陷也。急補澀之。若漿色正。而根血一線緊繞。定雖瀉無妨。漿色不正。血散不斂。毒在內也。七日毒尚在。如命何。

若正痘。依然根暈紅。活精神。飲食清健。而瀉。此陽症也。不妨。但看舌用兼止之藥而愈。

至八九日漿行似足忽眼開而陷毒內攻也內攻者必悶亂煩燥根暈飛散若無是而唇舌潔淨方內加桂附治之唇燥舌赤內加連芩解毒治之
有一等至八日充灌飽滿撲摸不破而剔破無膿毒陷伏也不可作順痘誤人服賽春雷是正法也若數服而猶硬無膿根暈不活生意可知矣然此必神不內寧若神寧痘少不必藥治
貫膿時作癢十常六七並準以唇舌藥之但爬破成坑者或乾而無水者皆不治

痘行漿作痛火熱也亦吉兆也丹溪曰諸痛爲實是氣滯作痛方內加枳殼山查治之血熱作痛方內加芍藥生地治之

八九日寒戰咬牙虛極也唯峻補而已此外無法若頭搖牙顫目閉無覓者不治

又八九日有等土黃而硬者往往作正漿目之不知此爲陰陽失政致漿注於中板臑歿塞而黃硬也俗呼日板黃痘須急辦舌治之古有日珠不在大在乎體之明漿不在足在乎色之正土黃者黃而無彩者

也。又有貫膿充足至九日大便忽欲去不去陽明血燥也。方內倍加當歸以潤之。不治則靨落之後非滯下必乾熱而死。

灌膿發泡氣過甚也。本方加白朮茯苓滲利之。擦破水出而不能包者。敗草散揅之。八九日最忌皮薄漿清皮薄則嫩而易破。漿清則水而不膿。書曰漿假毒成。毒從漿化。若此而幸成者未之有也。凡皮薄漿清至九日而躁亂不寧。生死可隔壁斷矣。周歲半歲者。又不必至九日。若七日便蹬打不定。措破不乾。萬不

救一何者。痘以七日爲界。七日前氣血外行。七日以後氣血內入。外行時尚不欲留毒。內入時乎。故七日後躁亂者。毒攻也。毒攻內者必死。

凡灌膿時額上如湯泡皮肉盡赤而乾者死。諸痘纒貫而兩脣先黃硬者死。

擦破無膿血者死。擦破而瘡痕隱然有生意者。穢觸也不當作死症論。

結靨三日訣

痘至十日毒解矣。膿亦轉黃作蒼蠟色。元氣實者。痂

必循次而結。如口角與陽物先結，正收也。身漸輕快，腫漸清解，眼矇矇而欲開，食倍常便，如故。從上至下，而收結痂厚，色紅，大事畢矣。不然，猶未可以爲喜。結痂時，忽忽發熱者，蒸漿作膿也，不必慮。

凡一時痂盡，一痂卽落者，毒火燥也，急解之。此症必膿未充足，若聲啞煩悶喘促不食，死期迫矣。否則必發癰毒而解。

痘至十日，正收靨之期，靨而不靨，非氣虛必血熱也。氣虛方內加參芪丁桂，治之。血熱方內加芩連解毒。治之。氣虛血熱，唇舌紅不紅，辨之也。亦有時令致然者，時之寒也。用溫劑以歛之。時之熱也。用涼劑以清之。

凡不及期眼開者，重輕症不拘。又過期眼不開者，亦重。十二日眼開期矣。

當結靨時，渴飲無休，津液竭矣。方內加生脈散主之。若渴甚而下瀉，尤重者爲難治。凡治渴切勿利小便，便愈利而渴愈甚矣。

十日九日半痂，半不痂作瀉者，不必慮。乃陽氣內回。

非貫膿時比也。方內倍白朮茯苓治之。切忌澀劑。倘不知誤用後必不食而作痢。

十二十三日有形如火燒烟薰者。生死最決。若音不清。食不入。破處乾枯煩亂不寐。死症也。音清能食。睡臥安寧。爬破淋漓。神舒氣爽。生症也。又當分虛實治。唇舌潔淨。溫補兼清解之。唇燥舌苔。單解之。解而苔去。繼以平和則攻補兩盡矣。

凡當靨時而流漿不已。爲過表故也。然亦有飲水。濕致然者。兩者皆方內倍白朮茯苓。加防蒼燥之。或腐爛而和皮脫去者。倒靨也。方內加人參丁桂。主之破者。復灌消者。復腫。空處復出一層。治功也。俗呼曰翻空痘。逆症有此大吉也。靨後腮紅唇乾。面色帶紫者。肺癰將作也。連翹飲治之。桔梗知母百合麥冬。宜常服。

痘至結靨未及結痂時。必定作氣息者。第腥臭者佳。尸臭者死。全無氣息。知有餘毒也。須解之。

額與足遲靨者。獨陰獨陽也。額與足先靨者。重反陰背陽也。當靨之時。凡見腹脹氣喘咽爛不食。或唇白。

至舌泄瀉悶亂昏沉不省作坑尸臭目中無神寒戰
噤牙手足搖動皆死症也間有一二不死亦幸活耳

浴痲餘毒訣

痘至落痲一大事。上案了手矣。子尚有言否。曰是何
言也。末路難恃。功虧一簣。正此之謂也。如痲久不脫。
或堆如雞屎。薄如竹膜。泡發丹纏。癰腫疔潰。或疹或
痲。或嘔吐作渴。或赤白痢。或咳嗽。或虛煩不眠。坐立
微顫。唇不蓋齒。咽啞腹痛。或熱或發癢。而形色粉紅。
非險乎。又如破而不貫。坑陷乾枯。驚搐無覓。走馬牙

疔。目睛吊白。或胷高而喘。戰掉不休。疤痕之色。皆粉
白。不紅。非逆乎。且氣血初定。相火易煽。卽靨後疤紅。
而不禁辛熱。猶致目疾。不避風寒。猶發瘡癩。不節飲
食。猶成吐痢。諸症。子何以無事。目之。

靨漸結。漸落。色明而厚。順也。或粘肉不脫。或嵌入肉
中。或半粘半揭。或痲半有衣。或薄如竹膜。色煤黑者。
險也。有虛實寒熱。實而熱者。連翹飲主之。虛而寒者。
方內加參芪肉桂治之。治癩色亦然。紫紅者實也。粉
紅者虛也。粉白者氣血衰也。氣血衰服藥不轉者死。

痘後癰毒非痘之過。乃醫之過也。當發不發則成癰。不當補而補則成癰。癰者壅也。元氣內實。毒不能留。故尋竅而出。經曰。營氣不從逆於肉裏則生腫是矣。曲池委中三陰交會之地。毒多壅此。虛故也。然有實者有虛者。形體怯弱。食少微熱。腫處不痛。虛也。形體壯盛。身熱能食。痛叫不已。實也。虛者流氣。飲實者連翹飲外。並以必勝膏貼之。潰而出膿。大補湯久不收口者。生肌膏塗之。凡多癰不食。嘔瀉不休。睛慢唇白。而膿出清水者。死。曆後病目。俗皆謂目中出痘。如果痘也。胡不見報。痘成膿而遂結痂。卽此症亦醫之過也。古云。熱蘊於肝。則目病。確言也。有赤腫而痛不能開者。赤腫涼肝散。翳膜涼膈散。切忌點藥。睛突瞳陷不能治矣。痘初出而卽用護眼法。烏有後患。凡口疳皆胃熱致之。有輕者重者。有死不治者。滿口白糜。或紅點簇。輕症也。靈棗丹吹之。唇舌腫硬。牙齦黑爛成疔者。重也。內服甘露飲。外吹靈棗丹。爛入喉者。亦以藥吹之。色如乾醬。臭爛口甚。而鼻發紅點者。死。俗名走馬疔。然此亦醫之過也。

痘後腹痛甚重。須分治之。傷食和中丸。餘毒連翹飲。血虛本方去翹桔。加參芪乾薑治之。腹痛見舌白者。死。元氣竭也。

驚發痘後。書云。莫救者是。日閉無魂。更兼吐瀉。唇白肢冷。如熱甚。小便閉塞。或素有驚疾。又非不可治者。痘後出瘡。名曰痧。蓋痘落發此吉兆也。不可作尋常痧瘵治。只消疏風之劑。丹與癩疹亦然。痘後浮腫。囊大如鉢。毒匿皮膚。以連翹飲加腹皮茵陳。主之。有加枳殼。倍柴胡。

立方

三莖湯 治天行時氣。廣出痘瘡。日日服之。出時必少。

小赤莖

黑莖

菜莖

各五錢

甘草節

一錢

水煮熟。任兒食之。久服則不出矣。

胡荽酒 治痘瘡初發。噴之。

胡荽一握。酒煎一二沸。去渣。乳母含口內噴之。從頂至頤。身足塗擦。週遍滿房門戶。灑之。

解肌敗毒飲

治痘瘡初起。二日內服。

柴胡

防風

獨活

前胡

荆芥

各八分

蟬脫

桔梗

薄荷

川芎

紫蘇

紫草

各六分

蔥白三莖胡荽一握煎服

鼠粘子湯

治痘疹稠密身熱等症

鼠粘子

當歸

甘草

柴胡

連翹

黃芩

黃芪

地骨皮

各等分

水煎不拘時服

人參透肌散

治虛而有熱雖能出快長不齊整隱

於肌膚者

人參

白朮

白茯苓

紫草

當歸

白芍

木通

蟬脫

甘草

糯米

各五分

水煎不拘時服

犀角地黄湯

治血熱痘初出太熱大便黑糞或鼻

衄小便出血

方見傷寒門

保元湯

治痘疹初出圓暈成形乾紅少潤然毒尚

淺急服此劑

人參 二錢 黃芪

甘草 各二錢

水煎不拘時服。

紫草散 治痘瘡黑陷氣血虛弱痘疹不起。

紫草 甘草 黃耆 糯米 各一錢 五分

水煎溫服。

益元散 治痘疹煩燥作渴調下二錢。方見傷寒門

流氣飲 治虛而結癰者。

當歸 川芎 赤芍 黃耆

人參 各五分 甘草節 廣木香 紫蘇

烏藥 各三分 桔梗 厚朴 枳殼 各三分

水煎服。

十神解毒湯 治見點三日身熱等症。

丹皮 紅花 赤芍 川芎

當歸 生地 木通 桔梗

連翹 甘草 等分

淡竹葉十片煎服。

生脉散 治氣虛口乾舌燥。方見中醫門

連翹飲 治熱毒蓄內痘不肯出齊。

黃芩

黃連

黃柏

山梔仁

大黃

石膏

蟬蛻

牛蒡子

紅花

各八分

升麻

三分

燈心三十莖煎服舌上無苔去大黃

和中丸 治痘後傷食腹痛等症

陳皮

厚朴

枳殼

麥芽

山查肉

各一兩五錢

白茯苓

白木

各一兩

神麴

三兩

右爲末神麴打糊爲丸每服二錢滾白湯下。

醍醐飲 治見標太重以此托之

當歸

桔梗

白木

川芎

各一錢

熟地

一錢二分

桂枝

六分

水煎溫服。

大補湯 治毒流膿不止氣血兩虛

人參

白木

白茯苓

草甘

當歸

川芎

白芍

熟地

黃耆

肉桂

白芷

連翹

金銀花

各等分

水煎溫服。

救苦丹 自發熱至見點多獲其効。四日前毒甚者服。

羌活

防風

升麻

麻黃

生地

吳茱萸

黃柏

連翹

各五分

當歸

黃連

各三錢

川芎

藜蘆

酒苓

生苓

蒼朮

各二錢

細辛

甘草

白朮

陳皮

紅花

各一錢

右爲末。蜜丸龍眼大。每服量人大小加煎劑內同

服

滿天秋 自發熱至起脹時有熱症者皆可服。

石膏

煨一兩

茜草

寒水石

人中白

各三錢

甘草

紅麴

各二錢五分

鬱金

紫草茸

辰砂

各二錢

右爲末。每服三錢。燈心湯調下。

賽春雷 治紅紫焦枯或因風寒痘不起發。內熱壅

甚痘鬱不出。皂畏熱。七日前皆可服。

麻黃

紫草

各一兩

甘草

白附子

各五錢

蠶蠶

蟬蛻

各三錢

穿山甲

一分五錢

蟾酥

一錢

蜈蚣

一條

全蝎

八分共

右末另以麻黃二兩紫草紅花各一兩酒水各一碗煎去渣再熬成膏入蜜三兩再畧熬同前末搗丸如龍眼大每服一九燈心湯化下

熱見愁 凡見唇燥舌苔即宜服之

燒人糞

兩

黃芩

黃連

黃栢

山梔

俱酒炒各一兩

升麻

三錢

右爲末每一二錢量人大小加入煎劑同服

千里馬 疏瀉之劑無舌苔不可服

大黃

一兩酒浸過

紅麴

五錢炒

川芎

烏藥

各三錢

蚯蚓

去泥土一兩

右爲末另以大黃四兩熬膏加蜜少許爲丸如龍眼大每服一二丸入煎劑同服

一九春 治一切頂陷不貫者

天麻

蠶蠶

天花粉

各三錢五分

全蝎

各二錢

象皮

光烏

各三錢

礞石

硃砂

狗寶

各一錢

牛黃

五分

麝香 三分

右為末元米飯為丸如龍眼大硃砂為衣每服一丸臨臥時酒漿化下

歛膿散 治當靨不靨以此收之

黃耆

蜜炙

枸杞子

白芷

甘草

何首烏

各一兩
蜜炙

右為末每服二錢米飲調下

護眼膏

治見點兩眼腫赤肝脾二經熱甚以此塗之

甘草

黃柏

大胭脂

各一兩
共為末

菘苳

五合水五碗浸
一晝夜去苳

以菘苳水加紅花四兩煎至二碗去渣入前末成

膏塗眼眶上下

涼膈散

治痘後羞明怕日翳膜遮睛

當歸

川芎

柴胡

黃連

龍膽草

防風

蟬蛻

密蒙花

各六分

右為末以獾猪肝一兩切片同煮服

四聖丹

治七日外有疔以此點之

珍珠 三分

莞荳 四十粒

男髮 煨灰存

性一錢

雄黃 六分

冰片 一分

右為末以紫草二兩蔬油髮膏調點

必勝膏 揣貼腫毒每日兩換

蔥白不拘多少搗爛入蜜和作餅貼患處

靈棗丹 治走馬牙疳并一切口疳吹之立効

小青蝦蟆 一錢

生礬 一錢

南棗 五枚

去核

銅錄 一分

麝香 三釐

右共搗爛鹽泥封固火煨存性去泥為末吹之

綿鹽散

治痘後爛不收口

綿鹽二十箇以生礬裝滿為度火燒炙乾為末

每一兩蜜陀僧五錢白芷二錢

右為末白蜜調敷

生肌散 治靨後疔潰成坑內見筋骨者

赤石脂

伏龍肝

輕粉

黃栢

血竭

杭粉 各一錢

黃丹

髮灰

乳香

沒藥 各五分

冰片 三分

蜜陀僧 一錢

五分

右為末摻上如有臭氣加阿魏三分

薰癢法

茵陳

白芨

荆芥

各等分

為末以紙條薰之。

逐蛆法

以絲瓜搗汁噴痘上其蛆自出。

又方

以柳葉鋪床又有皮厚不能出者用銀針挑

破滴油入內蛆見油即出外用花椒水浴之。

痧麻

夫痧麻出自六腑先動陽分而後歸於陰經故標屬陰而本屬陽也如未出時或已出而出之不暢者即

當發散必先明其歲氣如時令溫煖以辛涼之藥發之時令暄熱以辛寒之藥發之時令嚴寒以辛熱之藥發之時令或寒或熱以辛平之藥發之但發得出則毒盡解若發不出再加藥發之要其大綱雖是熱症然不可驟用涼藥恐過絕邪氣於內而不得出多有不救者宜解毒發散為主若發熱之時遍身汗出者此毒從汗散有鼻中血出者此毒從血解若上吐下利則毒從吐利解俱不可遽止若太過斟酌止之痧已出其色喜紅潤極忌紫黑如有咽喉腫痛不能

飲食者。此毒火拂鬱。上薰咽喉也。咳嗽口乾心煩者。此毒在心肺發未盡也。痧已出而瀉尤不止者。最為惡候。出已遍身而尤拂拂煩熱。頻作嘔吐者。此毒未盡。畱連於脾胃之間也。

立方

解毒湯 治痧症初起。天時溫暖。

防風

薄荷

荆芥

石膏

知母

各八分

桔梗

甘草

牛蒡子

連翹

木通

枳殼

各六分

淡竹葉 甘片煎服

清毒湯 治初起夏月大熱。

黃連

黃芩

防風

荆芥

各一錢

桔梗

石膏

玄參

木通

山梔仁

各八分

淡竹葉 甘片煎服

化毒湯 治痧症初起冬月寒冷。

桂枝

麻黃

赤芍

防風

各八分

荆芥

羌活

桔梗

人參

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

川芎各五分 牛蒡子 一錢

生薑三片煎服。

清寧湯 治症汗出太多。鼻血不止。

當歸 連翹 石膏 黃連各二錢

生地 麥門冬 玄參各七分 甘草二分

浮小麥一錢煎服。

玄桔湯 治痧症咽喉腫痛。

玄參 桔梗 牛蒡子 連翹

天花粉 甘草各錢

淡竹廿片煎服。

清金飲 治痧症咳嗽。口乾心煩。

天花粉 桔梗 桑皮 知母各七分

玄參 連翹 乾葛各八分

燈心三十莖煎服。

必勝飲 治痧已出而瀉不止。

陳皮 厚朴 蒼朮 白茯苓

牛蒡子 澤瀉 木通各八分

生薑一片。食前煎服。

和榮散 治痧已出。渾身發熱。

當歸

川芎

生地

麥門冬

白芍

木通

甘草

各八分

燈心三十莖前服。

靈功飲 治痧後痢疾。

當歸

黃連

川芎

各八分

人參

三分

廣木香

枳殼

滑石

檳榔

各六分

甘草

一分

燈心三十莖食前溫服。

治痧發不出 蔥一握搗汁一盞入酒漿一盞同服。

又秘方 櫻桃核四十九粒甘草五分煎服。

痧出紫黑。急以人糞燒存性酒調五分立刻變紅。

瘡瘍科

諸痛癢瘡瘍皆屬心火。則瘡瘍之疾非外得也。而昔人列之為外科者。以形症在外。非若內症之無形可見也。然外之所成。皆內之所發。未有不由臟腑而出者。其可視以為外症而忽之乎。瘡瘍之中。癰疽為甚。而大疔之毒。尤甚於癰疽。故治大疔者。十活其一二。

治疽者十活其五六。治癰者十活其八九。惟毒有淺深。故治有難易耳。然何以辨其癰疽大疔哉。亦視其腫之高下。地之廣狹。脉之浮沉而已。蓋癰者。壅之義也。氣血爲毒所壅。瘀而不行。故發而爲癰。其初發之時。必灑淅惡寒。而身微熱。多生於背。與頂。在背之上部。或左或右。爲上搭手。在背之下部。或爲正發生於腦後者。爲對口。比之上下搭手。尤爲毒也。凡癰皆掀然熱而腫高。其勢易大。其根不甚深。從乎陽也。疽者。沮之義也。氣血爲毒所阻滯而不行。故發而爲疽。其

初發之時。亦灑淅惡寒。先覺麻癢。如痞癰之狀。按之內實。手推不能動。多發於背。腰肩隅之間。及小腹。胃傍。其發股足之間者。名附骨疽。凡疽皆腫不甚高。勢不易大。而其根反深。惟發於背心及股者。爲至重。乃五臟所發。從乎陰也。疔者。丁之似也。猶釘之在木。拔之不能出。搃之不能動。其根至深。其毒至甚。其頭至硬。其初發之時。反不知痛癢。但不覺麻木。外雖如麻裏則如瓜。及其勢甚。則痛苦異常。應心入膽。而不可忍。乃五臟六腑所發之火。煅煉已久。并合於一處。而

生疔者多見於面部骨節之間。而究其毒之所從來。多由於飲食服餌之中。經曰膏粱之變足生大疔。凡肥甘厚味炙煨煎熬之物最能助火嗜味之人恣供口腹醉之以酒勞之以色脾土於是乎燥烈腎水於是乎枯竭積之既久留於五臟佈於六腑火鬱而不散乘其氣血所虛之處而發之根抵於內而煩熾於外其毒甚於鳩鳥試割其肉以飼鷄犬立見其斃此大疔之所以多成也。若夫似疔而非疔者則俱以腫毒治之而無大害。然三者之脈何以辨之。蓋浮而數

者毒氣在表故知其爲癰沉而數者毒氣在裏故知其爲疽若沉而又滑數而弦急者必疔也此皆有形之可見者雖其治有難易猶可因其症而施之至於腸癰腹癰肺癰之類皆爲內癰其狀與癰疽疔瘡無異苟或以爲內科之症而進以削堅破結之劑所治非其所忍幾何而不殞人之命也。大法瘡瘍之在外者初發無如一灸艾烟一透其毒立效若延至六七日則不可灸矣毒之淺者點之毒之深者決之毒之尤深而針刀所不及者則烙之未成毒膿則用化毒

既成膿則用托裏此外在人之臨症機變矣。

發背門

陰發難治陽發易醫為治之法或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉或補隨其虛實寒熱而調治之又當辨其五善七惡如痛息自寧飲食有味一善便利調勻二善膿腫自消色鮮不臭三善神彩光明聲音清朗四善體氣平和為之五善腹痛而渴瀉利無度小便如淋一惡膿大潰掀腫猶甚臭敗莫近二惡喘齎氣促恍惚嗜臥三惡毒氣攻心藥食嘔逆四

惡聲嘶色脫面目如垢唇青鼻黑四肢浮腫五惡二便不通煩燥時咳六惡四肢沉重未潰先黑陷下為之七惡

立方

神授衛生湯 治發背并腦疽對口諸惡毒未成者即消已成者即潰藥性平和功效甚速

羌活

防風

白芷

穿山甲

沉香

紅花

連翹

石決明

各六分

金銀花

皂角刺

當歸尾

甘草節

天花粉 乳香各八分 大黃酒炒二錢

水煎食遠服。消腫托裏散。治發背不拘上下左右並一切癰疽

腫毒。

人參	赤茯苓	白朮	滑石
桔梗	金銀花	荆芥	山梔
當歸	川芎	黃耆 <small>各一錢</small>	赤芍
蒼朮	麻黃 <small>各七分</small>	大黃 <small>三錢</small>	黃芩
防風	甘草	薄荷	連翹 <small>各八分</small>

石膏 芒硝各一錢五分

水酒各一鍾煎服。

灸法 如發背初起時背上微有紅腫重墜。卽是發背。以此法立時消散。屢屢効驗。

用河邊水中泥先挖去一尺許。再取一大塊。同人糞杵極熟。做一餅。如碗大。頂上以針通一細孔。放在患處。外用艾火灸之。如痛灸至不痛。不痛要灸至痛住。

薰發背奇方 治發背七日後未成者自消。已成者

自潰不起發者卽發。不腐潰者卽腐。

雄黃

硃砂

血竭

沒藥

各二錢

麝香 五分

右爲細末。每用三分。綿紙裹藥爲撚。長尺許。以麻油潤透。炤火離瘡半寸許。自外而內。周圍徐徐炤之。初用三條。加至五條。候毒勢漸消。漸減散毒飲。治發背三五日間。身上灑浙惡寒疼痛急。脹如未成膿卽消。已成卽潰。調氣血和脾胃。使毒不攻心。

乳香

沒藥

天花粉

黃芩

防風

各一錢

當歸

白芷

桔梗

穿山甲

各一錢二分

皂角刺

連翹

陳皮

金銀花

牡丹皮

川芎

各八分

水煎食後服。

蠟礬丸

治發背癰疽並一切腫毒。服之能護心膜。

毒氣不能攻心。

黃蠟

一觔

明礬

八兩

硃砂

八錢

研末研細

先以蠟鎔開。入明礬末。攪和投水中。衆手丸如棗。

苴大硃砂爲衣。每服百丸。白滾湯下。

生肌丸 治一切發背疽毒。服此長肉收功。

黃蠟 一觔 乳香 研細 沒藥 研細 血竭 各二兩 研細

象牙末 四兩

先用蠟鎔化。再入乳沒等藥。和勻投水中。衆手丸

如菜苴大。每服百丸。一日二服。

吸毒竹筒 治發背癰疽腫毒。以此拔出膿血惡水。

蒼朮 白欵 厚朴 艾葉

白芨 烏柏皮 芽茶 白蒺藜 各等分

如法用竹筒六七箇。長二寸。一頭留節。削去青。令極薄。隨大小用之。以藥煮筒十數沸。煮乾爲度。乘筒熱。按上緊吸。瘡口膿水滿。自脫落。不然用手拔脫。更換別箇竹筒。如此三五次。毒盡消矣。

托裏定痛散 治發背潰後。血虛餘毒未盡。作疼。

歸身 熟地 各二錢 乳香 沒藥

川芎 白芍 各一錢 酒炒 肉桂

粟殼 各一錢五分 泡 去筋膜蜜炒

水煎食後溫服。

五寶飲 治發背不肯收口。作疼作癢。服去即收功。

金銀 黃耆 甘草 歸身

人參 各二錢

水二鍾煎八分。食後服。

生肌神秘散 治發背將收功。搽上腐肉即去。新肉

即生。

白昇藥 兩一 輕粉 鉛粉 各一兩

銀硃 珍珠 豆腐內煮過各四錢

右為極細末。搽於瘡口。

十全大補湯 治發背已潰。寒熱往來。或作疼痛。膿

多。或自汗盜汗。氣血兩虧。神思倦怠。瘡口不斂。

人參 黃耆 川芎 白芍

當歸 肉桂 各二錢 熟地 白茯苓

白朮 甘草 各一錢五分

黑棗五枚。食前煎服。

癰疽門 附腦癰 肺癰 腎癰 附骨疽

凡癰疽緣陰陽相搏而生。蓋氣屬陽。血屬陰。血行脉內。氣行脉外。相並週流。寒與濕搏之。則凝滯而行遲。

爲不及。熱與火搏之。則沸騰而行速。爲太過。氣得邪而鬱。津液閉結。爲痰。爲飲。積久滲入脉中。血爲之濁。血得邪而滯。隧道阻隔。或溢或結。此陰陽不能和暢。則癰疽惡毒。從此生焉。

立方

真人活命飲 治一切癰疽腫毒。初起服此。止痛立消散毒。

- 當歸尾 赤芍 防風各一錢 白芷
- 天花粉 穿山甲 乳香 沒藥各一錢

- 皂角刺 浙貝母 陳皮 金銀花

甘草節 各一錢五分

頭生酒水各一碗煎隨其疽毒上下以分饑飽服。服後再飲酒數椀。

飛龍奪命丹 治一切癰疽并發背疔瘡對口無名惡瘡未成者服之立消已成者服之即潰疼痛者服之立止。此丹乃惡症中至寶。

- 蟾酥酒化開 乳香 沒藥 硃砂爲衣
- 銅綠各二錢 明雄黃三錢 膽礬 寒水石各一錢

麝香

五分

蝸牛

連殼用

輕粉

五分

血竭

一分

蜈蚣

一條

白芷

一分

右爲末以蝸牛研爲泥加蔥汁和丸如棗葢大每

服三丸先用蔥白三寸令病人嚼爛放手掌中將

丸裹在蔥白內蒸熟送下於被覆暖取汗如木

有汗又飲酒數鍾以助藥力

立潰按青膏 點破諸般惡毒癰疽瘡癤

糯米

一斤

好石灰

一斤

硃砂

一分

黃燐

一斤

好石灰

一斤

桑柴灰

一斤

黃燐

一斤

皂角灰

一斤

毛白

一斤

右以五樣灰淋汁鍋內慢火熬之面上起白霜爲

度調前四味點於患處

人乙神應膏 治發背癰疽疔瘡疔毒跌打損傷心

疼腿痛一切外科百病無不效驗

川烏

一斤

草烏

一斤

黃柏

一斤

赤芍

一斤

白芍

一斤

玄胡索

一斤

良薑

一斤

木鱉子

一斤

蕭薑

一斤

紫荆皮

一斤

地龍

一斤

石南藤

一斤

升臺玉案

一斤

六卷

試

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

白芷	川芎	白牽牛	槐花
五倍子	地骨皮	杏仁	花椒
大茴香	茅香	玄參	蒼耳子
桂皮	南星	瓜蒌仁	苦參
蒼朮	五加皮	防風	熟地
蜜陀僧	丁香	內消	生地
藁本	何首烏	細辛	各二錢
江子	三十粒	草薺子	三十粒
早蓮草	人參	百藥煎	黃芪

甘草節 羌活

五靈脂 獨活

地蜈蚣根 各二兩

前藥各為阻片用麻油一觔半浸二宿入銚內文武火熬至黑色濾去渣却將後藥為末次第加入。

廣木香	安息香	琥珀	麝香	各二錢
乳香	沒藥	血竭	降香	
韶粉	自然銅	各一錢五分	桑白皮	
白芨	白斂	雄黃	各五錢	黃丹
				六兩夏月加二兩炒黑色

右各為末。入油。次下黃丹。以槐柳條不住手攪。滴。

水成珠為度。諸品要選真正道地者。虔誠煎熬。自然應驗。

千金內托散 治癰疽惡毒未成者速散。已成者速

潰。此方活血調氣祛風解毒和脾補虛。

黃耆

人參 各二錢

厚朴

當歸

白芷

薄桂

川芎

甘草

桔梗 各一錢

酒煎溫服。

紫金錠

治一切癰疽瘡癤發背惡毒每服三錢酒

磨送下外以磨敷上其毒漸漸消散

附腦癰

立方

黃連救苦湯

治腦癰初起增寒發熱頭面耳項俱

腫服之立消。

黃連

赤芍

桔梗

金銀花

各一錢五分

升麻

八分

柴胡

乾葛

川芎

當歸尾

各一錢二分

連翹

防風

羌活

黃芩

甘草

各二錢

水二碗煎八分臨服加酒一鍾食後服。

保安湯 治腦癱已潰流膿內痛飲食減少

黃耆 麥門冬 藿香 各一錢

當歸 白茯苓 川芎 各一錢

桔梗 半夏 陳皮 白朮

甘草 人參 各一錢

黑棗五枚。食後煎服

飛龍奪命丹 治腦癱初起灑淅惡寒頭腦脹痛日

服二次。方見前

十全大補湯 治腦癱已潰之後膿水出多氣血兩

虛精神短少飲食少進煩燥不眠日晡潮熱。方見

發背門

附肺癰

立方

平肺飲 治肺癰初起咳嗽氣急胃中隱隱作痛嘔

吐膿痰

人參 麥門冬 赤芍 檳榔

赤茯苓 陳皮 桔梗 各一錢 甘草 五分

水煎食遠服。

清肺飲 治肺癰咳吐膿痰。胃膈脹痛。上氣喘急發熱。

銀柴胡 玄參 陳皮 桔梗 各錢

白茯苓 地骨皮 麥門冬 薏苡仁

人參 甘草 瓜蒌仁 各八分

燈心三十莖煎入分食遠服。

排膿散 治肺癰已吐腥臭之痰服此排膿補肺。

黃芪 白芷 北五味 人參 各三錢

右為細末每服三錢食後白滾湯調下。

八寶飲 治肺癰咳嗽日久痰帶腥臭身熱虛羸。

白茯苓 桔梗 貝母 人參

北五味 天門冬 胡黃連 熟地 各等分

水煎食後服。

附腎癰

腎癰生於小腹之後位遠僻奧氣亦罕到血亦少來凡生是癰者乃濕熱凝滯聚結而成此毒也。

立方

活血散瘀湯

治臀癰初發。紅赤腫痛重墜如石及

大便秘澀。

川芎

當歸

防風

赤芍

各二錢

蘇木

連翹

天花粉

皂角針

紅花

黃芩

枳殼

各一錢二分

大黃 三錢

水煎食前服。

十全大補湯

治臀癰出膿後服十餘劑。外貼太乙

膏

方見發背門

內消沃雪湯

治臀癰未得出膿。堅硬腫痛不可忍

者。

青皮

陳皮

乳香

沒藥

連翹

黃耆

當歸

甘草節

白芷

射干

天花粉

穿山甲

貝母

各一錢

白芍

金銀花

皂角刺

各八分

廣木香

五分

大黃

三錢

水酒各一碗煎服。

附骨疽

立方

黍米寸金丹

治附骨疽并諸腫毒神效。

乳香

沒藥

雄黃

狗寶

輕粉

烏金石

各三錢

蟾酥

礪砂

各四錢

白粉霜

水銀

黃蠟

各五錢

鯉魚膽

三箇

狗膽

一箇

白丁香

四十枚

金頭蜈蚣

七條

人乳

頭胎者佳

右為末。先以乳蠟二味熬成膏。同藥為丸。如葶苈

大人三丸。小兒一九。重者五丸。葱湯送下。衣被

密蓋。出汗為度。

當歸拈痛湯

治附骨疽。因濕熱下注。腿脚赤腫。痛

不可忍。

羌活

當歸

防風

茵陳

蒼朮

各一錢

苦參

升麻

白朮

各七分

葛根

甘草

黃芩

知母

澤瀉

猪苓

人參

黃柏

各五分

水煎溫服。

托裏黃耆湯

治附骨疽。初起腫痛。外貼太乙神應

丹臺玉案

六卷

音症

金

膏。方見本門

黃耆

當歸

柴胡

木瓜

連翹

羌活

肉桂

生地

黃栢各等分

水酒各一鍾煎服。

羌活防已湯。治附骨疽。初發於太陽太陰厥陰分

者。

羌活

川芎

蒼朮

防已

木香各一錢

連翹

射干

甘草

赤芍

木通

歸尾

蘇木各一錢二分

水酒各一鍾煎服。

黃連消毒飲。治附骨疽在腿外側堅硬漫腫作痛

不能行步。

黃連

羌活

黃栢

黃芩各一錢二分

防已

生地

防風

歸尾

知母

獨活

陳皮

黃耆

人參

蘇木各一錢

水煎溫服。

十全大補湯 治附骨疽將愈時服十餘劑永無他患。
方見發背門

乳癰門 附乳巖 腸癰 囊癰

夫乳病者。乳房陽明胃經所司。乳頭厥陰肝經所屬。乳子之母。不善調養。以致乳汁濁而壅滯。因惱怒所傷。氣滯凝結。而成癰毒。又有憂鬱傷肝。思慮傷脾。積想在心。所願不得。志者致於經絡痞澀。聚結成核。初如荳大。漸若碁子。半年一載。二載三載。不疼不癢。漸漸而大。始生疼痛。痛則無解。日後腫如堆粟。或如覆

碗。紫色氣穢。漸漸潰爛。深者如巖穴。凸者若泛蓮。疼痛連心。出血作臭。其時五臟俱衰。四大不救。名曰乳巖。凡犯此症。百無一生。宜清肝解鬱。益氣養榮。患者清心靜養。無掛無礙。服藥調理。苟延歲月而矣。

脉云

乳癰之脉。多於弦緊。弦數鬱火。弦滑鬱痰。

立方

牛蒡子湯 治乳癰結腫疼痛之甚。服此立散。

牛蒡子 陳皮 山梔 金銀花

瓜蒌仁 天花粉 黃芩 青皮 各一錢

連翹 柴胡 各一錢 甘草 三分

水煎臨服加酒一鍾同服。

消癰散毒飲 治乳癰惡寒發熱焮腫疼痛服此立

消

青皮 浙貝母 天花粉 各二錢

蒲公英 開黃花卽滿地金 連翹

鹿角屑 當歸 各一錢

水酒各一鍾煎服。

飛龍奪命丹 治一切乳癰已成未成者 方見癰疽

散腫湯 治乳癰未成功一服立消外貼太乙神應

膏 方見癰疽門

青皮 石膏 各二錢 甘草節 瓜蒌子

沒藥 蒲公英 卽滿地金 金銀花

當歸尾 各一錢五分 青橘葉 二十片

水酒各一鍾煎服。

附乳巖

立方

青橘飲 治婦人百不如意。久積憂忿。乳內有核。不
癢不痛。將成乳巖。

青皮 五錢 醋炒 橘葉片 三十

水煎食遠服

神功飲 治婦人乳內一核。初起如錢。不作疼痛。三
五年成功。紅腫潰時無膿。惟流清水。形如巖穴之

凹

忍冬藤 蒲公英 甘草節 金銀花 各二錢

瓜萼 一個 連殼

生酒煎服

十六味流氣飲 治乳巖赤腫疼痛

人參 黃芪 當歸 川芎 各一錢五分

肉桂 白芷 厚朴 甘草

桔梗 防風 烏藥 檳榔 各一錢

赤芍 枳殼 廣木香 蘇梗 各八分

水煎食後服

附腸癰

腸癰。因濕熱流入小腸而成。小腹急脹。按之則痛。小

便淋數時時出汗惡寒發熱腹皮堅實高腫透臍生瘡是也。

立方

神通散 治腸癰不拘已成未成服之膿血皆從大便中出。

便中出

出過蠶蛾 燒灰

大黃 各六錢 穿山甲 炒

牙皂 各五錢

右為末每服一錢酒調下。

化毒飲 治腸癰腹癰初起小腹腫痛急脹。

木通 四錢

黃連

青皮

乳香

沒藥

大黃

各三錢九 各三錢九 各三錢九

生薑三片水二碗煎服。

牡丹皮湯

治腸癰腹濡而痛以手按之則止或時時下膿。

時下膿

人參

丹皮

白芍

赤茯苓

黃耆

桃仁

去皮

薏苡仁

白芷

當歸

川芎

各一錢

廣木香

甘草

官桂

各五分

水煎食前服。

排膿湯 治腸癰小腹脹痛裏急後重時時下膿。

黃芪 穿山甲 白芷 當歸 各一錢 二分

金銀花 防風 川芎 瓜蒌仁 各一錢

水煎食前溫服。

十全大補湯 治腸癰小腹脹痛膿下無時 方見發背門

附囊癰

囊癰者乃陰虛濕熱流注於囊結而為腫至潰之後。 羣九懸掛猶不傷人其毒從外發治當補陰清利濕

熱為主。

立方

如意黃金散 敷囊癰初起紅赤腫痛發熱墜重者。

天花粉 黃栢 大黃 薑黃 各五兩

白芷 三兩 厚朴 陳皮 甘草

蒼朮 南星 各二兩

右為末以蔥汁同蜜調敷患處。

清肝滲濕湯 治囊癰肝經濕熱結腫小水不利發

熱焮痛。

丹臺玉案

六卷 囊癰

在

川芎

當歸

龍膽草

生地

白芍

柴胡 各一錢五分

天花粉

山梔

黃芩

木通

澤瀉 各一錢

燈心三十莖。食前服。

滋陰內托散

治囊癰已成。腫痛發熱。有膿服之。卽潰。

潰。

當歸

川芎

白芍

黃耆 各一錢五分

熟地

皂角刺

穿山甲

炒 澤瀉 各八分

水煎。食前服。

懸癰門

懸癰者。乃三陰虧損。濕熱結聚而成。此穴在谷道之前。陰器之下。又謂之海底穴也。初起如豆。少癢多痛。日久漸大。赤腫掀痛。潰膿後。輕則成漏。重則瀝盡氣血。變為癆瘵多矣。

立方

內消沃雪湯

治懸癰初起。增寒疼痛。

方見癰疽門

琥珀蠟礬丸

治懸癰。并一切癰疽發背。已成未成。

之際。恐毒不能出。必致內攻。預服以護心膜。亦散。

毒止痛。

明礬

一兩五錢

黃蠟

一兩二錢

琥珀

硃砂

雄黃

各二錢

乳香

一錢

蜂蜜

三錢

臨入

前藥俱為細末。將蠟溶化。再末藥并蜜攪勻。衆手急丸。如棗莖大。硃砂為衣。每服三十九。白滾湯下。病重早晚日進二次。神効。

神功內托散 治懸癰日久不潰。高硬腫痛不可當者。

人參

白朮

各二錢

白芍

當歸

附子

陳皮

穿山甲

木香

各一錢二分

川芎

枳殼

皂角刺

黃芪

各一錢

生薑三片。煎八分。食前服。

透膿散 治懸癰并一切疽毒已成。不肯穿破者服之即潰。

穿山甲

炒

當歸

各二錢

黃耆

川芎

皂角刺

各一錢五分

水酒各一碗。食前熱服。

生肌丸 治懸癰不能收口。每日早晚服之即愈。

丹臺玉案

六卷

在

見發背門

疔瘡門

附癰瘡

膿瘡

夫疔瘡之初生也。人多不覺。生於頭面手足。肚脇腰腿間。亦無定處。一二日必作寒熱。似瘧。頭疼體痛。不可忍。其痛法異於尋常之症。須遍身覓之。有小瘡頭腫黑根赤色。而其形壯者。卽外疔也。又有內疔。與外疔同。亦發寒熱。但瘡形不見。過數日一處腫起。卽內疔也。

立方

追毒飲 治一切內外疔瘡神効

歸尾

川芎

各八分

荆芥

乾葛

烏藥

獨活

赤芍

各六分

白芷

升麻

各四分

羌活

甘草節

防風

枳殼

紅花

蘇木

各七分

水二鍾。煎八分。食遠服。

金蟾丸 治一切疔瘡

草烏

雄黃

硃砂

海金沙

輕粉

各二錢

蟾酥

三錢

酒

丹臺玉案

六卷

疔瘡

卷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右爲末。以蟾酥爲丸。如茱萸大。每服三九。用蔥白一寸。夾藥在內。灰火中煨。令香。取起。帶蔥連藥嚼下。白滾湯送之。被蓋出汗。

拔毒丹 治一切疔瘡。

蜣螂 一個去翅足

礪砂 五分 白砒 三分

右爲末。以蔥汁爲丸。如茱萸大。先以三稜針刺破瘡。將此丸以頰簪脚捺入。須臾大痛。變作黃水而出。

解急飲 治一切疔瘡。

野菊花搗汁一盞。滾酒送下。一日連進三服。

又方 馬齒莧搗爛。加醋少許。敷在疔上。立刻拔出。

又方 醬板草搗爛。加醋少許。鹽三分。敷患處。神效。

紅玉散 治疔瘡不收口。

輕粉 血竭 各三錢 珍珠 甘草

黃連 鉛粉 各二錢

右爲細末。搽上即愈。

代針膏 治疔瘡堅硬作痛。並諸毒難潰者。點上即

時出膿。

鹹水二碗入硃砂五分煎至一碗加入番灰二兩待化過再熬至乾入白砒末三錢銀銷末三錢仍入好醋研和收貯器中。

神驗方 治一切疥瘡初起一敷即散。

爛鷄糞 蝸牛 七個 荔枝肉 一個 杏仁 七粒

銀硃 三分

右四味同爛鷄糞搗勻貼在患處。

附癬瘡

立方

擦光散 治一切頑癬。

斑猫 足去翅 大楓子 各二錢 川槿皮

枯礬 輕粉 各三錢 白砒 五分

右為細末醋調擦患處。

又方 治陰癬。

川槿皮 二錢 檳榔 番木鱉子 各五個

以上三味用陰陽水三碗煎至一碗入後藥 全蝎

巴豆 大楓子 肉 斑猫 各十個 麝香 四分

輕粉 三錢

右爲末。以前藥水調和。將穿山甲刮微破。用筆蘸塗之。六日全愈。

浮萍丸 治一切陰陽頑癬。

紫背浮萍

蒼耳草

蒼朮

各二兩

苦參 三兩

黃芩

蠶蠶

鉤藤

葶藶草

防風

各一兩五錢

右爲末。酒法爲丸。每服二錢。白滾湯送下。

効妙散 治一切頑癬并楊梅癬亦効。

蜜陀僧

雄黃

各三錢

白砒

二錢

枯礬

五錢

硫黃

火煨。入燒酒。煮過。埋土中一宿。一兩。

右爲細末。抓破患處。以煨熟薑切開。蘸藥擦上。七

日全無。

附 疔瘡

立方

萬金膏 治疔瘡久不收口。

黃連

粉霜

各三錢

輕粉

鉛粉

各二錢

樟腦

銀硃

各五分

冰片

三分

右爲細末。以猪脂溶化。入前末。留冰片。候冷加入。

和勻攤貼神效。

赤玉膏 治內外臃瘡。

血竭

黃丹

血餘

煨灰

寒水石

煨過各一兩

珍珠

一錢五分

黃蠟

六兩

猪脂

一兩

右為極細末先以黃蠟猪脂溶化再入前末攪勻。

攤貼瘡上。

洗方

黃栢

花椒

杏仁

防風

苦參

荆芥

各等分

右藥水煎去渣洗瘡以絹拭乾再貼赤玉膏。

瘰癧門

附湯火

金瘡

瘰癧皆猶於痰毒風熱所致先起之於少陽一經因不守禁忌延及陽明經緣是食味之厚鬱氣之積故發此症也。

立方

真人活命飲

治瘰癧未潰連服五劑立消

方見癰疽門

紫金錠

治瘰癧初起磨五錢滾酒下外以井水磨

敷

方見痰症門

飛龍奪金丹 治瘰癧已潰未潰。每服三丸。蔥酒送

下。方見癰疽門

蠟礬丸 治瘰癧未潰時。滾湯送下三錢。漸消止痛。

生肌神秘散 治瘰癧潰爛不得收口。搽之。二方俱

見發背門

附湯火

玄妙飲 治湯火所傷。先服恐火毒攻心。

川黃連 天花粉 玄參 陳皮

桔梗 山梔 各一錢

淡竹葉廿片煎服

黑龍散 治一切湯火傷。以此敷之。

山木炭 黃連 大黃 各等分

右為末。以生桐油敷患處。

附金瘡

秘驗桃花散 治刀刃所傷。出血不止。

石灰 一斤 大黃 五兩切片同炒

右炒過石灰。以水牛膽汁拌勻。復裝入膽內。陰乾。

為末。搽患處。

廣瘡門

附結毒

便毒

疔瘡

蛙疔

夫廣瘡者即楊梅瘡也。總猶濕熱邪火所化。氣之傳染者。輕精化。慾染者重。

立方

托毒飲 治廣瘡初起。

當歸尾

金銀花

天花粉

連翹

各一錢

赤芍

皂角刺

殭蠶

蟬蛻

各六分

芒硝

穿山甲

大黃

各二錢

蜈蚣

一條

水煎空心服。

靈奇飲

治廣瘡一服神効。

麻黃

去節 春夏六錢 秋冬八錢

大黃

蟬蛻

威靈仙

白芷

各一兩

以羊肉一觔水五碗煮去肉。雷湯煎藥。熱服出汗。

化毒湯 治一切廣瘡。

川黃連

木瓜

金銀花

苡仁米

各二錢

肥皂子

七箇

皂夾子

七箇

土茯苓

半觔

猪胰子

一箇

水七碗。先煎胰子。取汁煎前藥。空心服。

點藥

杏仁 取霜 二錢 膽礬

輕粉 各八分 冰片

麝香 銀硃 各三分

右為末醋調點上

十全大補湯 治廣瘡將愈多服以補元氣日後無

患 方見發背門

附結毒

結毒神效方 治一切結毒并筋骨痛

當歸 川芎 各二錢 肥皂子 七箇 防風

生地 白蘚皮 赤芍 金銀花

牛膝 人參 防已 威靈仙 各二錢

土茯苓 四兩

水四碗煎二碗溫服服後飲酒以助藥力

八寶奇秘散 治一切結毒

鍾乳石 牛黃 各三錢 麝香 冰片 各六分

蟾酥 鴉片 各半分 珍珠 硃砂 各三錢

右為細末收貯臨用時取藥一錢加飛麵三錢同拌勻分作十服每一服加土茯苓一觔水四碗煎

湯調服

生肌散 治結毒流膿水不得收口。搽患處。方見發背門

附便毒

祛毒飲 治便毒初起。一服即消。

金銀花 穿山甲 各二錢 瓜蒞仁 帶殼一個

全蠍 五個 大黃 五錢 牛膝 甘草 各一錢

水酒各半煎服。

飛龍奪命丹 消腫定疼。方見癰疽門

吸毒竹筒 治便毒已潰膿出不盡用此。

生肌散 治出膿難於收口。搽患處。二方見發背門

附疔瘡疔疔

龍膽瀉毒湯 治一切疔疔。

柴胡 龍膽草 山梔 各一錢 大黃

黃連 滑石 木通 各一錢五分 甘草 五分

加燈心三十莖。食前服。

長肌散

珍珠 一兩 乳香 血竭 各三錢 頭髮 煨灰

絲綿 煨灰 木片 各一錢

右為末。搽患處。

碧雲散 治蛙筋疔先以杏仁煎湯洗。

象牙 洗畏煨
存性

雄黃 煨

鳳凰衣 煨各
一錢

雞肫皮 五箇
煨

南棗 煨

面粉

珍珠 煨灰各
二錢

右為末搽患處。

痔瘡門 附痔漏

夫痔不分男婦小兒皆有緣富貴之家多患此疾皆因嗜飲麪酒過貪色慾併厚味肥甘椒薑炙博等物以致濕熱流注大腸之經積而成痔蘊蓄日久則變

為漏矣

立方

和榮清火湯 治痔瘡疼痛

槐角子

連翹

枳殼 各一錢

川連

當歸

川芎

桃仁

生地

赤芍 各一錢
五分

加燈心三十莖煎服

壯氣收腸湯 治番花痔腸落不收

黃耆

人參

當歸

川芎

廣木香 金銀花 川連 各一錢 升麻 七分

黑棗二枚煎服

蝟艾丸 治一切痔瘡出血裏急後重

艾葉 槐角 地榆 當歸

川芎 刺蝟皮 貫衆 各一兩 頭髮 煨存性三錢

猪後甲 十箇炙焦

右爲末蜜丸每服三錢空心米飲下

熊永散 治內痔

熊膽 水片 蘆薈 雷丸 各二錢

銀殊 五分

右爲末以胡蘿蔔煨半熟綿裹薩藥入幽門

附痔漏

清潤湯 治一切痔漏

防風 秦艽 各一錢五分 生地

當歸 川連 阿膠 各二錢

水煎食前服

秘靈丹 治一切遠年近日痔漏神効

血竭 乳香 沒藥 全蠍 去頭足

蟾蠶

蟬蛻

各三錢

大黃

酒蒸

當歸

象牙

挫末各八分

穿山甲

酥炙

頭髮

煨

珍珠

各四錢

川連

槐花

琥珀

各五錢

青黛

刺蝟皮

各二錢五分 醋浸去刺炙

右爲末以黃蠟八兩溶化入蜜一兩同前末攪勻

衆手爲丸每服二錢空心清茶送下

耳瘡門

附諸蟲入耳

大耳瘡皆緣三焦濕火肝經風熱並腎家虛火妄動而成瘡者是也

立方

清肝抑火湯

石菖蒲

川連

各三錢

龍膽草

山梔仁

柴胡

當歸

各一錢五分

龍眼肉五枚空心煎服

珍奇散 治耳瘡並耳內流膿

珍珠

蘆甘石

煨

紫草茸

各三錢

麝香

枯礬

各二分

右爲細末吹入耳內

附諸蟲入耳

蠅蚊諸細蟲入耳以麻油滴數點入竅蟲自死取出
蜈蚣蜜蜂等大蟲入耳以肉炙香安耳邊其蟲聞香
自出

有蟲夜間暗入耳者宜正坐點燈光向耳邊其蟲自
出

諸蟲咬

蜈蚣咬取蜘蛛一枚於上卽吸其毒立愈
壁鏡咬醋磨大黃塗之

毒蛇咬雄黃爲末藍葉搗汁調敷內以半枝蓮取汁
入酒和汁服

蜘蛛咬毒入肉取芎苢汁塗之

蚯蚓咬人形如大痲風眉鬚皆落以濃鹽湯浸浴數
次愈

蝎咬白礬一兩爲末醋半碗煎滾入礬末浸螫處外
以并泥敷之

蠅虻迺妖蟲也隱於牆壁間尿射人影遍體生瘡如
湯火傷以鷄翅毛燒灰麻油調敷

咬取地下青苔擦之。又方以耳末搽上其痛立止。

諸獸傷

馬咬獨顆栗燒灰搽上。

鼠咬麝香爲末唾調塗或用貓毛燒灰裹之。

貓咬薄荷汁塗。

猪咬松脂鎔作餅子貼。又方屋溜中泥塗。

虎咬明礬爲末摻傷處裹之止痛立愈。

狗咬花椒煎水洗茵草爲末麻油調塗。

狂狗咬番木鱉磨水服三分。

火刺之

再服雷橫散。

雷橫散 治狂狗咬一服即愈行。有胞衣包之一

串約六七箇先看如頭上有紅髮一根已傷五臟

不可救矣。

白丑

黑丑

大黃

各六錢 雄黃一錢

右爲末大人二錢小兒一錢黑砂糖湯調下。

野馬牙
大黃量以文
干薑
方細末姜汁
拌作餅貼之
百金