

醫方類聚卷之一百七十六

癰疽門七

聖濟總錄



腸癰

寒濕

腸癰由恚怒不節憂思過甚腸胃虛弱

不調邪熱交攻故榮衛相干血為敗濁流滲

入腸不能傳專蓄結成癰津液腐化變為膿

引其候小腹鞭滿按之內痛小便淋數汗出

惡寒身皮甲錯腹滿如腫動搖轉側聲如裏

水或遶臍生瘡膿從瘡出或膿出臍中或大便下膿血宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救矣診其脉洪數者膿已成設脉遲緊雖膿未就已有瘀血也

治腸癰少腹堅腫大如掌而熱按之則痛其上色或赤或白小便稠數汗出憎寒其脉遲緊者未成膿如脉數則膿已成大黃湯方

大黃剉牡丹皮 消石研桃人湯浸去雙

芥子各半

右五味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至壹盞去滓空心溫服以利下膿血為度未

利再服三三

治腸癰牡丹湯方

牡丹皮青芍藥白丹參半生乾地黄各二

兩薏苡人剉桔梗剉麥門冬去心焙栝

草剉赤茯苓去黑皮敗醬各

右壹升味麤搗篩每服五錢匕水二盞

生薑五片煎至一盞去滓空心日晚溫服

治腸癰犀角丸方

犀角屑壹兩巴豆拾粒去皮心大黃三分

度蜀椒去目并閉口黃芩去心防風去人

參當歸切黃耆細切藜蘆去蘆頭山梔子去

黃連去鬚甘草炙升麻各半

右壹十四味擣羅為末鍊蜜丸如梧椰子

大每服三九空心米飲下加至四五九利

下黃水為度

治腸癰裏急隱痛大便祕濕梅入湯方

梅核人四拾九箇大黃兩牡丹皮壹兩

瓜人兩犀角銹壹兩芒消兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二

盞煎至壹盞去滓溫服以下膿血三兩行

為度

胃脘癰

內經謂人病胃脘癰者當候胃脉其脉沉細

者氣逆氣逆者人迎其盛其盛則熱人迎者

胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃

腕為癰也夫陰陽升降則榮衛流通氣逆而
 隔則留結為癰胃腕癰者由寒氣隔陽熱聚
 胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故
 胃脈沉細以陽氣不得下通故頸人迎甚盛
 令人寒熱如瘧身皮甲錯或欬或嘔或唾膿
 血觀伏梁之病亦有俠胃腕內癰者以其裏
 大膿血居腸胃之外故也

治熱聚胃腕留結為癰連翹升麻湯方

連翹 升麻 射干去蘆 獨活去蘆 桑寄生

木通剉各二兩 大黃剉微炒二兩 木香以

沉香剉 薰陸香剉 丁香 麝香各等分以

末細 右壹十二味每抄前藥五錢匕水二盞煎

至好盡溫服日三服以快利為度

治胃府實熱留結為癰陽氣不得下胃脈沉

細者犀角湯方細者犀角湯方

犀角剉 梔子入 赤芍藥剉 赤茯苓去黑

皮去黑

皮去黑

黃芩

去黑射干去毛大黃一兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至膏盞去滓入蜜壹匙攪勻再煎壹兩沸

食後溫服

治榮衛不流熱聚胃口血肉腐壞胃腕成癰

射干湯方

射干

去毛梔子人赤茯苓皮大黑升麻各壹

赤芍藥

白朮各壹兩半

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水壹

盞半煎至八分去滓入生地黃汁壹合蜜

半合再煎三沸溫服不拘時候日二服

治熱氣留聚胃腕內結成癰麥門冬湯方

麥門冬

去心犀角鎊萎蕤薺芫其赤芍

藥

石膏各壹兩半甘草炙紅雪各壹

右八味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓入竹瀝壹合再煎三兩沸溫

服

治胃脘蓄熱結聚成癰芍藥湯方

治胃脘蓄熱結聚成癰芍藥湯方

芍藥

赤芍藥 犀角 鎊 木通 剉 石膏 碎 升麻 各

兩廿草 生 朴消 玄參 麥門冬 去心焙 各一兩

右九味龜擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓溫服不計時候

緩疽

緩疽者以寒氣客於經絡榮衛凝滯其寒氣盛則腫痛深伏其狀無頭尾大如拳小如桃李與皮肉相附著其腫與肉色相似赤不甚赤積日不潰久乃變紫黯色皮肉俱爛如牛

領瘡以其初勢緩慢故名緩疽以其腫色與肉色相似故亦名肉色疽

治緩疽木占斯散方

木占斯 乾薑 炮 桂 去 蠶 細 辛 去 藟 敗 醬

防風 去 桔梗 炒 栝樓 去 皮 各 甘草 炙 一

參 一 厚朴 大 麤 皮 薑汁 分

右壹十壹味擣羅為散每服二錢匕空心

溫酒調下日晚再服

治緩疽芍藥湯方

芍藥 當歸 各一兩 黃耆 剉 生乾地黃 焙赤

茯苓 去黑皮各一兩半 人參 甘草 炙各三分

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服晚再服

治緩疽及諸癰腫膿血結聚皮肉堅厚日久不潰疼痛黃耆湯方

黃耆 沉香 薰陸香 連翹 各三分 羚羊

角屑 壹兩 雞舌香 漏蘆 去蘆頭 黃芩 去黑心 梔

子人 甘草 生剉 防風 去枯樓根各半

右壹十二味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓不計時候溫服二日

治緩疽蛇牀散方

蛇牀子 末 杏仁 湯浸去皮尖雙入研細 黃連 去須末

香 細切各壹分 鹽 壹分 蔓菁根 三兩切爛研

右六味以蔓菁根和藥末細研令勻塗傅腫上乾即易之

治瘰癧石疽

石疽與石癰之證同比石癰為深以寒客經絡氣血結聚而不得散隱於皮膚之內重按如石故謂之石疽癰疽皆熱氣所作今寒氣為梗故凝結不化其毒內著結鞭如石治宜溫其經絡使熱氣得通其毒外泄故能腐熟而發散化膿血而出也

治石疽堅鞭皮色紫赤惡寒壯熱一二日未膿者下之升麻湯方

升麻 連翹 玄參 人青 大黃剉散炒各

壹兩 敗醬 絡石 白欽各半兩 生地黄二兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕小壹盞半前至七分入芒消壹錢去滓空心溫服常微利三兩行未利再服
治石疽堅鞭不消地黄煎方

生地黄淨洗三斤

右壹味剉碎細研以布絞取汁入銅器內盛重湯上煮柳篋攪勻如糖以瓷合盛每日空心取一丸如彈子大溫酒調下日午

晚間再服卽差

治石疽堅如石不作膿商陸根貼方

生商陸根半斤

右一味爛搗如泥於故帛上塗貼乾卽易

之

治石疽狀如瘰癧而皮厚者煮楮實塗方

楮實不以多少

右壹味搗羅爲末以醋調如糊塗患上乾

卽易之

治石疽堅韃皮色紫赤惡寒壯熱全日未

成膿者下之後宜用木香散貼方

木香 大黃生升麻 白斂 芒消 赤

小豆各半兩

右六味搗羅爲散以榆白皮汁入水少許

調和如糊以故帛上塗貼日二上卽差

又左鹿角

右壹味於石上水磨如泥塗患上日三五

度卽差

又方半夏一兩

右壹味搗羅為末以水調如糊塗患上日三五度即差

治石疽塗傅方

蜀漆幹者桑根白皮二兩

右二味搗羅為末鎔牛膠更以酒調和塗傅腫上日三五度即差

又方蛇蛻皮

右壹味燒灰細研以醋調如糊塗腫上乾

仰易之

大附骨疽

骨疽者由風入骨解與熱相搏復為冷濕所折風熱伏結不得發散蘊積成毒故附骨而為疽喜發於大節解間按之應骨皮肉微急洪洪如肌而不外見是也治之宜急稍緩則膿不得清而肢體變青黯者不可治

治附骨疽漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

升麻

連翹

麻黃

去根節大各一兩

黃剉炒一分 防已 木香 白斂 沉香各三分

右九味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入竹葉一七片煎至八分再入芒消壹錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服治附骨疽連翹湯方

連翹 射干 升麻 附已 黃芩去黑心
大黃剉炒 甘草炙 芍藥 杏仁湯浸去皮尖雙入各一兩
芫胡去苗二兩

右壹十味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分入芒消壹錢匕去滓空心溫服

治附骨疽敗醬湯方

敗醬二兩 大黃剉炒一兩 桃人二兩

右三味麤搗篩每服五錢匕先取皂莢刺壹兩剉碎以水二盞煎至壹盞半漉出下藥及朴消壹錢同煎至八分去滓空心溫服

治附骨疽亂髮湯洗方

亂髮灰半兩杏仁十一粒甘草寸槐花兩
 右四味以漿水五升煎至三升濾去滓通
 手洗疽上若有膿血洗取淨後以絹帛縛
 定每日三兩徧洗

治附骨疽瘡及陰瘡久不差天靈蓋散塗傳
 方

天靈蓋酥炙一兩拘骨燒灰一兩白礬燒灰一兩麝
 香研一錢
 右四味搗研為散乾傅瘡口日三五上以

差為度

治附骨疽天南星散塗傳方

天南星炮附子炮裂去皮臍黃蘗去蘗皮各半兩鉛丹
研分麝香研分

右五味除麝香鉛丹外搗羅為散入二味
 和勻乾傅瘡上日三五度

治附骨疔久不差麝香散塗傳方

麝香研分騏驎竭 蜜陀僧各一兩
 右三味細研為散先用塩湯洗瘡拭乾取

活鱖魚一條剉細研搗瘡上壹宿明日搗看有蟲即去再拭乾塗傅散子日三五度即差

治附骨疽內消小豆散方

赤小豆一糯米五合

炒黑

右二味搗羅為散水調如糊攤故帛上塗

貼乾即易

治附骨痛騏驎竭散塗傅方

騏驎竭

檀榔

黃連

去

馬腸根

各一

兩

右四味搗羅為散先以油炒葱鼓入膩粉半錢和搗捻作餅子一片川監漿水洗瘡後用餅搗瘡上以生帛縛定三日後再用鹽湯洗即塗傅散子日三五次

治附骨疽久不差骨從瘡口出烏雞散塗傅

方

烏雞雞骨

燒

牛楛木

刮

燒

灰

炊單

燒

灰

三

家者各

兩

右三味合和研細塗傅瘡上日三五度碎

骨出即差

治附骨疽久不差或差年歲再發秦芎散塗
傅方

秦芎去苗

右壹味搗羅為散塗傅瘡上以帛縛定日

三三次

治附骨疽積年發膿骨出不差牛膠散塗傅
方

水牛皮膠炙

右壹味細研為散塗傅瘡上用生鯉魚破
開外面貼定時看有小蟲出更以塩湯洗
傅上藥再以魚貼蟲出盡更傅藥

治附骨疽

黃丹研膩粉各三錢雞子五枚煮熟

右三味先將雞子黃於銚子內以慢火炒
令黑候自然為膏瀝於盞內入黃丹膩粉
和勻用時先以米泔煎湯洗患處拭乾用
藥傅之妙

治附骨疽腫痛有膿久不差天靈蓋散方

天靈蓋壹兩 燒灰 拘頭骨半兩 白礬半兩 燒麝

香壹錢 黃連壹分 黃蘗壹分

右六味搗羅為細散入麝香令勻每用先

煎甘草湯洗拭乾用生油調塗之

風疽

風疽者本山風濕之氣入於腠理流注血脉凝澀不利攣曲腫起發作瘡疽所以疼痛經久不差者是也蓋風勝則動故其疽留止無

常得之醉卧汗出當風風入膚腠客於經絡與榮衛相搏而成

治風毒中人留血脉不散與榮衛相搏結成

風疽身體煩熱昏冒腫痛防風湯方

防風去 羌活去 白芷去 桔梗炒 木通剉 當

歸切 羌活各 羌活去 麻黃去 附子去

炮裂去 山草去 麻黃去 附子去

不煮斗味咬咀如麻豆每服五錢匕水豈

豈半煎至八分去滓溫服食後臨卧各

如欲出汗空心併兩服後以熱糞稀粥投蓋覆取汗慎外風

治熱每風結成疽腫痛行履不得海桐皮浸

酒方

海桐皮剉五加皮剉獨活去蘆頭防風去乾

蠍炒杜仲去麤皮切牛膝去酒浸切焙薏苡人炒各

牛乾地黄焙三

右九味麤搗篩生絹囊貯以好酒壹斗五升浸於瓷瓶中密封秋夏三日春冬七日

開取食前溫酒三合加至四五合不拘時

其者常令酒氣相續

治熱毒風腫成疽日夜熱痛大豆酒方

大豆緊小者麻子人研碎烏蛇一條去頭尾皮骨重

四兩推碎

右三味相和令勻就甌內蒸臨熟去甌底

湯將好酒壹斗五升就甌中淋候酒熱又

淋凡七八徧入瓷瓶內密封候冷量性飲

之常帶酒氣佳

治醉酒汗出風入經絡成風疽麻黃湯方

麻黃去根節三兩 五加皮一兩 防風去 獨活去

頭桂去 當歸切 芎藭 乾薑炮 附子炮

生去皮一枚 牛膝二兩 杏仁去皮尖

右帶十壹味各細剉以水九升先煎麻黃

掠去沫內諸藥煎取三升絞去滓每用壹

蒸溫服併三服溫覆微汗慎外風

治風毒氣客經絡成風疽秦艽丸方

秦艽去 苦參 升麻 黃芩去 松殼去

麩防風去 惡實炒 烏蛇酒浸去 蒺藜子

炒各五分

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

早晚食後以蒺藜子煎湯下二水丸

治酒醉汗出風入經絡久成風疽黃耆丸方

黃耆剉 犀角鎊 黃連去 茯苓去 當歸切

防風去 芍藥 升麻 黃芩去 木通

八分 甘草生剉 麝香別研

右壹十二味搗研為末拌勻鍊蜜丸如梧

桐子大每服二十丸空腹生薑湯下食後
再服卽煎麥門冬湯下

治風疽搔之黃水出大豆汁塗方

大豆

壹升

馬尿

二升

白蜜

半斤

右三味拌令勻用青竹筒盛實築架在炭
火上當中慢燒將瓷椀兩頭盛取汁先用
汁清入鹽少許和溫洗瘡上拭乾後以藥
汁塗日三五度

癰疽

字書凡字從票皆有疾轉之義癰疽爲病毒
發疾轉不旋踵而害人故其字從票音同於
飄風之飄治之不可稍緩也古人謂人受惡
風入於肌脉變戾斯病蓋厲氣蘊伏初未知
覺毒鬱旣發則若火之熾烈不可嚮邇是以
其狀隱小而深實黯黑而不明其痛復應於
心毒氣已深故其證如此惟痛取利可以僅
存欲頓飲藍青升麻葵根竹瀝之類以沃其
熱毒其則斷指割肉灼肌以除之凡以毒氣

藥學

十一

疾轉稍緩則入藏故也

治癰疽初覺宜速取利犀角丸方

犀角屑一斤人黃炒黃芩去黑心防風去

人參小當歸切黃耆剉梔子人黃連去

乾藍剉甘草炙巴豆拾貳粒去

右壹十二味除巴豆外擣羅為末研入巴

豆令勻鍊蜜丸如梧桐子大每日空心米

飲下三丸如未利加五七丸以利為度

治癰疽熾甚消毒散方

藜蘆剉大黃剉黃蘗去黃連當歸

甘草各一兩

右六味咬咀如麻豆以水壹斗煮至五升

去滓浸淋瘡處即差

治癰疽潰後皂莢散方

皂莢二挺去皮

右皂莢味細研為散用鹽湯洗瘡令淨乾摻

肉傅日三

瘡癰疽潰後蝕惡肉

癰疽已潰久而良肉不生者由氣血未平惡肉有以害之也惡肉雖得於風氣外搏亦以餘毒未盡故死肌敗壞侵蝕良肉治宜以藥蝕去之

治發背癰疽及諸惡瘡生惡肉麝香膏方

麝香研雄黃研真珠研各豬脂量

右四味研勻鎔豬脂調如糊塗傅惡肉上日再

治癰疽諸瘡惡肉藜蘆散方

藜蘆去蘆蘭茹各半馬齒莩研石硫黃研

雄黃研麝香研各

右六味除研者外擣羅為散再和勻每用少許傅瘡日三五次以惡肉盡為度

治癰疽瘡大黃蝕肉膏方

大黃炮裂去附子皮臍莽草肉芎藭雄黃

研雌黃研真珠研白欬研白礬研黃芩去

心蘭茹兩各一豬脂二

右書十二味除研者并豬脂外剉碎先煮

類聚頭方
二十

指令沸下諸藥煎候赤黑色絲濾去滓下
研者藥攪勻傾出瓷器盛每日塗瘡日三
五次以惡肉盡為度

治發背癰疽及惡瘡不生肌肉敗壞其色黑
蝕惡肉白礬散方

白礬研半兩 蘭茹末一兩 膩粉研一分 雄黃研當

歸才各一兩

右五味合研勻取少許傅瘡日三次

治癰疽瘡蝕惡肉硫黃散方

硫黃研 馬齒礬研 蘭茹末 丹砂研各半兩

香研一錢 雄黃研 雌黃研 白礬研各半兩

右入味合研勻每用少許傅瘡日三兩次

以惡肉盡為度

治癰疽敗壞生肉生地黃膏方

生地黃四兩 辛夷 獨活去蘆 當歸切 大黃

芎藭 黃耆 白芷 芍藥 黃芩片黑心各

半續斷一兩 豬脂二斤 薤白二七

右壹十三味除豬脂外並剉碎先熬脂令

頁及頁二

二二

沸下諸藥煎候白芷赤黑色以絲絞去滓
瓷合盛塗瘡日三兩次

治癰疽始作便壞熱毒發瘡羊髓膏方

羊髓壹兩甘草壹兩胡粉各二兩大黃壹兩豬脂壹兩

斤壹

右五味除羊髓豬脂胡粉外剉碎先熬羊

髓豬脂令沸下甘草大黃煎令赤黑色絲

濾去滓下胡粉攪令勻瓷合盛每用塗傳

瘡日三四次

治癰疽敗壞生肉莽草膏方

莽草壹斤當歸壹斤薤白壹斤黃芩去黑心甘草壹斤

白芷壹斤大黃壹斤續斷各壹斤豬脂二斤

右九味除豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸

藥煎候白芷赤黑色以絲絞去滓瓷合盛

塗瘡日三次

治癰疽惡肉瘡蝕盡生肌芍藥膏方

芍藥壹斤大黃壹斤黃耆壹斤獨活去蘆白芷壹斤

當歸各壹兩薤白三兩生地黃壹兩半豬脂壹斤

半

丸九味將八味剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色絲濾去滓每以少許塗傅瘡日三五度

癰疽大小便不通

癰疽之人經絡壅閉氣血結聚榮衛津液因以虧燥邪熱內鼓流注於大小腸氣不踈通故大小便俱不通治法宜通其閉塞導去邪毒使勢無深入穿通府藏茲治之要也

治發背一切惡瘡及乳癰結聚腫鞭熱痛藏府餘毒閉澀可服通泄調氣解毒木香丸方

木香壹兩檳榔生剉三分芎藭羌活去蘆頭各半兩大

黃剉炒附子炮裂去人參各半兩枳殼麩炒

三牽牛壹兩半陳橘皮湯去白

右壹十味搗羅爲細末鍊蜜爲丸如梧桐

子大以瓷合內盛之每日空心粥飲下三

十丸通利壹兩行如不利加至四十九五

十丸以通踈爲度甚者夜臥時更服二十

五九

治發背諸癰腫丹石藥毒頭痛壯熱大小便不利玄參丸方

玄參壹兩升麻 梔子人 黃芩去黑心黃各半兩

者細判三分大黃剉炒壹兩半吳藍半兩犀角三分木

通剉二分連翹三分朴消研壹兩半

右壹十壹味先以十味擣羅為細末再同朴消研勻鍊蜜和丸梧桐子大每日空心米飲下十五丸如不利加至二十九取快

利三兩行為度瀉下膿化為黃水即差

治癰疽瘡發大小便秘澀不通朴消丸方

朴消研大黃剉炒杏仁湯浸去皮尖雙炒研葶藶子

微炒各二兩

右四味先以三味擣羅為細末入朴消和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每食後煎黃耆湯下二十九以通利為度未利再服

治癰疽取利下後熱微退小便利小麥湯

方

類聚要方

二十四

小麥三合 人參 甘草炙 芍藥 石膏碎生

乾地黄焙 黃耆細 木通剉 升麻 黃芩去黑

心前胡去蘆頭 麥門冬去心 焙

右壹十二味 麤搗篩 每服五錢匕 用水壹

盞半入竹葉七片大棗二枚擘破同煎至

膏盞去滓空心溫服日晩再服

諸癰疽托裏法

癰疽諸瘡氣血虛微肌寒肉冷濃汙清稀虛氣不出瘡久不合或聚腫不赤結鞭無膿外

證不見者並宜托裏邪氣外散膿汁早成毒有所泄而不內攻也

治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛托裏黃耆湯

方

黃耆細剉 白茯苓去黑皮 桂去麤皮 麥門冬去心

當歸切 人參 甘草炙 遠志去心 各壹兩 五味

子壹兩

右九味 麤搗篩 每服四錢匕 水壹盞半煎取膏盞去滓溫服不計時候日二

治發背癰疽久冷不差托裏生肌芎藭散方

芎藭二兩黃耆細制壹兩白芷半兩赤芍藥壹兩桂去

皮三分人參丁香當歸切焙各半兩

右八味搗羅為細散每服二錢匕粥飲調

下空心日晚再服以差為度

治癰疽袖珍方外科精義發背膿血穿潰疼

痛托裏止痛當歸湯方

當歸切焙黃耆細到人參各壹兩桂去赤芍藥

甘草炙生乾地黄焙各三分○外科精義各壹兩

右七味麝搗篩每服五錢匕以水壹盞半

煎取壹盞去滓溫服不拘時候日二夜壹

○袖珍方水二盞煎至壹

盞去滓通口服食後

治發背癰疽一切瘡腫托裏排膿木香散方

木香細切黃耆細切白欵木占斯芎藭

當歸切細辛去苗桔梗炒赤芍藥切檀榔

敗醬切甘草炙桂皮去羌活去白芷

兩各一分

治發背癰疽一切瘡腫托裏排膿木香散方

木香細切黃耆細切白欵木占斯芎藭

當歸切細辛去苗桔梗炒赤芍藥切檀榔

敗醬切甘草炙桂皮去羌活去白芷

藥身身身

右壹十五味擣羅為細散每服二錢匕甘
草煎酒調下空心午時日晚各壹服以差
為度

治一切瘡內托散方

甘草炒人參甘菊花一玄參兩

右四味擣羅為細散每服二錢匕煎菘豆

湯調下

治諸瘡熱退膿不止托裏內補防風散方

防風去白茯苓心白芷桔棧遠志

去心甘草炙人參芎藭當歸切黃耆各

一兩附子炮裂去皮厚朴去薑汁赤小

豆酒浸一宿桂半兩

右壹十四味擣羅為細散每服壹錢匕溫

酒調下日二夜壹

治癰疽潰後膿而太多托裏除虛熱黃耆茯苓

苓湯方

黃耆細麥門冬去心焙芎藭小白茯苓各

波桂各二兩五味子二兩

頁及頁

二七

右六味龍搗篩每服三錢匕以水壹盞入
生姜棗煎取七分去滓溫服不拘時候

治癰疽托裏六倍散方

黃耆細剉一兩一分赤小豆三分芎藭半兩

并肉末白飲三分枳椇去皮三分當歸切焙一兩

右六味搗羅為細散溫酒服方寸匕日三

夜二凡癰疽大堅者未有膿半堅半有膿

當上薄皮都有膿便可破之所破之法宜

下逆上破之令膿易出膿深難見上肉厚

宜火針之若外不別有膿可當上按之內

便隱痛中央堅者未有膿按之更疼於前

者已熟也

治癰疽口漸歛長內塞散方

熟乾地黄入續斷人參芍藥附子

去枳殼去甘草炙芎藭細辛

葉去枳殼去枳殼去枳殼去

兩蜀椒炒出汗半兩者肉蓯蓉酒浸切

兩蜀椒炒出汗半兩者肉蓯蓉酒浸切

兩蜀椒炒出汗半兩者肉蓯蓉酒浸切

右壹十五味持羅爲散每服三錢匕空心
溫酒調下日再服

治諸癰疽踈轉後宜補虛助氣飲方

黃耆兩 人參二 白茯苓去黑皮 甘草炙

味子 芎藭 獨活去蘆頭 桂去皮 青橘皮

湯浸去白 麥門冬去心 當歸切 杏仁尖雙

人炒 熟地黃焙 壹兩

右壹十三味麤搗篩每服五錢匕水壹盞
半生薑三片大棗二枚去核煎至八分去

滓不拘時溫服

治癰腫瘡癤排膿連翹飲方

連翹 防風去 玄參 白芍藥 薺苳

黃芩去黑心 桑根白皮剉 前胡去蘆

人參 甘草炙 桔梗剉 白茯苓去黑皮 黃

耆兩

右壹十三味麤搗篩每服五錢匕以水壹
盞半煎取八分去滓溫服日二

治癰疽等瘡內消法

治病必先求其本而後治其標癰疽諸瘡雖發於外而本乎中熱之所出始覺經絡壅滯氣血悶鬱有瘡瘍之證則熱氣初作榮衛未礙肌肉未腫腫而未腐之時特可疎滌風熱通導而去之逮其毒氣已結則不可論內消法恐熱毒不出反以內攻適所以傷之先後遲速之用不可不審

治癰背癰疽腫毒痛苦不可忍者內消散方

車螯壹枚背土紫色光厚者是用黃泥煎定火煨通赤炒冷去泥擣為末

右壹味以括樓壹枚打碎用酒壹碗於銀不鍋內慢火熬及壹盞濾去滓入膩粉壹錢匕同以酒調晚後服之取下如魚涎為

驗

治癰背癰腫腸癰乳癰一切毒腫內消化毒

犀角丸方下

犀角屑壹兩升麻壹兩黃芩壹兩黑大黃壹兩防

風大人參壹兩當歸壹兩黃耆壹兩藜蘆壹兩黃

連去須甘草壹兩梔子壹兩巴豆十二枚去皮心炒令

黃細研

右壹十三味除巴豆外搗羅為末入研了
巴豆和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每日空
心粥飲下五丸以利為度末利加至七八
丸利下黃沫惡物為効
治瘡腫久不愈內消散方

皂莢刺皮壹兩乳香研二錢

右二味末和勻每服二錢匕酒壹盞煎七
分溫服其毒內消或微利是効

治瘡癰癰腫內消漏蘆煮散方

漏蘆去綿白欽去黃芩去麻黃去根白薇

洗枳實炒升麻炒芍藥炒大黃炒甘草炙

一兩香兩小煉餅散黃藥對兩白白粉

右壹十味搗羅為散每服二錢匕水壹盞

煎至七分溫服大以此散令內消此香消

治癰疽始發未變膿令內消花藥石散方

花藥石煨黃蜀葵花煨竜骨去烏賊魚

骨去梔子人去草龍膽去爵金剉胡粉剉

大黃剉各壹兩

右九味搗羅為散量多少以津唾調成稀

膏傅之類以唾潤日一易

治諸癰腫初發及火灼乳癰令內消乳香散

方治諸癰腫初發及火灼乳癰令內消乳香散

乳香兩半水銀粉壹分黃藥壹兩半白及壹分白斂

鈔丹兩大黃各壹兩

右七味搗羅為細散水調貼之有膿時乾

摻

治癰疽發背一切熱毒氣結腫疼痛府藏壅滯

枳殼去瓢青橘皮去白焙牽牛子壹半生

共三分木香壹分甘草壹分大黃壹兩皂莢不

者三挺推碎以酒壹升浸按取汁滷濾去滓

右七味除皂莢外搗羅為末先以皂莢汁

於火上煎成膏即入藥末攪和為丸如梧

桐子大空心服二十九葱茶下以利為度

未利再服○外科精義治瘡疽熱癰腫瘰

橙枳殼去麩炒牽牛頭末木香青皮各壹兩甘草

右為細末用皂角長壹尺許者三錠約三

兩炮焦槌碎以好酒瘡科精義煮軟按取

汁熬膏稠粘和前藥末為丸如桐子大瘡科

小豆每服三五十九食後葱茶下日進二

服

治癰疽內消防風散方

防風去升麻白欽黃芩去黑猪苓去

黃芩去瞿麥各薏苡各當歸

切甘草炙各人參三赤小豆一合醋

焙右壹十二味搗羅為散每服二錢匕空心

溫酒調下早晚再服水二

治癰腫內消升麻湯方

升麻炒大黃炒黃芩去黑當歸切枳殼去

麩炒各甘草炙芍藥一兩

右七味麝搗篩每服五錢匕以水二盞煎

至膏盡去滓空心溫服且晚再服

治癩疔始作赤焮熱長甚速木香搭方

木香 犀角屑 大黃 升麻 黃芩去黑

心 梔子 人參 黃連去須 甘草 芒消 射干

黃蘗去麤皮炙 紫檀香 羚羊角屑 白斂各一

兩地黃汁合五 麝香一分研入

右豈十六末咬咀以水二升煮取壹升用

故帛兩重內湯中蘸搭腫上乾卽又蘸搭

之日夜數百度

治一切癩疔瘡癰焮腫未穴先踈通藏府牽

牛子散方

牽牛子二兩一分半 木香 青橘皮湯浸去白

陳麴炒各半兩 右四味搗羅爲散每服三錢匕五更初以

生姜茶調下至天明通轉三兩行自小便後

以薤白粥補之

發腦

發腦者六府不和經絡否澀氣血不行壅結

所成也此皆藏府蘊積熱毒或乳石發動毒

類聚專方

氣上攻於腦發於皮膚頭如黍米四畔嫩赤
腫鞭徧於耳項寒熱疼痛若不急治毒氣傷
于血肉血肉腐壞化為膿水從腦中出血肉
既竭必致危殆

治發腦始結疼痛妨悶欲成癰疽燭之令內

消方

消石研二兩木通剉紫檀香甜葶藶隔紙炒

白斂各一兩莽草各一兩大黃三兩

右七味搗羅為末每服漿水旋調得所塗

於腫上乾即易

治腦疽初生如黃枳實破後如盞底深半寸

許乳石散方

花乳石研赤石脂研滑石研礪甘石研蜜

隨僧研各半兩乳香研一分

右六味搗研為細散未破者醋調傅之已

破者即乾貼

治癰疽腫疼癸腦發背方

柳樹上白木耳去黃連去須乳香去杏人去

尖各一分 塩花許少 新蔓菁根一握不得用 隅旬者如無以菘菜代之 蛇床子許少

右七味擣羅為末似覺有腫以溫水調傅乾即易之

發背

發背者熱毒之氣發於背俞為癰疽是也此內本於五藏外傳諸府故熱氣攻發必生於府俞之間得之乳石發動及肥甘滋味之過藏府壅熱經絡為之不通毒氣凝滯必因俞

穴而出是以服石之人於居處衣食嗜慾喜怒尤宜節慎一有過舉則毒氣乘隙而發初如芥粟治之稍緩則盈尺寸而難圖故始覺熱搏於分肉痛傷於經絡宜速治之蓋其脉不通則腫毒增其經所謂榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是也血敗肉腐為患不一實則為癰浮則為腫深則為疽然發於背者兩脚間初起甚微或痒或痛往往忽之數日遂致不救昔人治此始則度其腫之止中而灸之

壯數逾百使惡氣外出次以藥踈利府藏決其邪毒則有可治之理治癩背腫癰疽惡風結膿血連翹散方

連翹子去蘆木香射干各三分

桑寄生剉升麻雞舌香沉香

乳香研 大黃剉炒各一分 麝香研一分

右壹十二味籠擣篩每服五錢匕水壹盞

半煎至八分入淡竹瀝半合去滓空心溫

服快利三五行為度未利再服

治發背癰腫消膿桔梗散方

桔梗去蘆頭炒 木占斯 防風去叉 甘草剉 敗醬

厚朴去麤皮 桂皮去麤皮 人參 細辛去苗葉 乾

姜炮各一兩

右膏十味搗羅為散每服二錢匕空心溫

酒調下日三以差為度

治初發背似琴絃抽痛有頭射干湯方玉機

微善治癰疽發背諸癩腫痛脈洪實數者

射干 犀角鎊 升麻 玄參 黃芩去黑心

麥門冬去心 大黃剉炒各壹兩 山梔子人兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半淡

竹葉二七片煎至八分入芒硝末壹錢匕

去滓空心溫服快利三兩行為度未利再

服

治初發背上似琴弦抽痛有頭犀角湯方

犀角鎊 人參 黃芩去心 山梔子 木

通連翹 升麻 芍藥各三分 甘草炙大

黃剉炒各半兩

右一十味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半

煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治發背乳癰已服利湯後服此麥門冬湯方

麥門冬去心 黃耆剉 芍藥 生乾地黃各壹

兩 前胡去蘆頭 黃芩去心 升麻 遠志去心 栝

樓去皮各三分 當歸半兩 小麥壹合

右壹十壹味麤擣篩每服五錢匕水壹盞

半棗二枚擘破生姜壹棗大拍碎竹葉二

七片同煎至八分去滓空心溫服日晚再

服

治發背人參當歸散方

人參 當歸 蜜陀僧 沒藥 雄黃各半

兩丹砂錢一 枯樓二箇去瓢取子生用

右七味研為散每服三錢匕用甘草煎

酒放溫調下日三

治發背

玉機微義治發背諸瘡腫

金鍼散方

皂莢鍼 春時取一半青一半黑者○微義春取一半新採壹半黑者

右壹味不拘多少暴乾擣羅為散先任意

飲食訖用藥三錢匕酒調服之立差未退

再服

治發背欲結不結四肢寒熱消毒散方

車螯壹箇可盛 朴消二兩消者

右二味以消入車螯內濕紙裏黃泥固濟

麻皮纏之煨赤候冷去泥同研如麵將絹

鋪地薄攤藥末於上盆蓋一倉久入乳香

地龍末各壹分白殭蠶甘草末各半分和

勻每服半兩酒調去滓服能飲酒者多與

之其滓塗患處壹食久即轉下惡物只兩服或消或破別服補藥

治發背熱盛速用此止痛藥方金櫻根洗去

麤皮判擣壹盞生甘草半兩同杵用水三

椀煎至壹椀半入酒壹椀或壹盞更煎至

膏椀又入童子小便壹椀煎至八分椀去

滓旋入銀盞內溫服取盡如心中覺逆食

少白梅則止次服後藥

大黃生甘草生各壹兩麝香研壹字木香一分丹砂

研壹錢鬼腰帶根洗金櫻根洗剉各

右七味都用水五椀煎至兩椀半入酒壹

椀半更煎至壹椀去滓旋入銀盞內溫服

令盡取下惡物如覺差即去甘草大黃餘

藥依前分兩入水四椀煎至兩椀入酒壹

椀更煎至壹椀去滓旋入銀盞內溫服令

盡如未差更依前方合壹料服之無有不

差者若瘡已破用生肌膏藥貼及搽後藥

欽瘡口龍骨散方

龍骨

煨赤地上去火毒研

赤芍藥

為末各半兩

鈎丹

一分

粉

半錢

右四味同研勻細先以葱湯洗瘡後拭乾

以藥摻之

治發背瘡如葡萄破後瘡孔無數狼毒膏方

狼毒

藍根

龍膽

各半兩

定風草

兩

乳香

水銀粉

抄一錢

右六味為末蜜調成膏攤帛上貼瘡

治背癰如斂底又如蒲扇疼痛不止藍根膏

方

板藍根

黃芩

去黑心

黃連

去須

大黃

各一分

白

乳香

兩半

右六味搗研為末用新汲水調成膏量大

小貼之日四夜二

治一切發背救生膏方

蜜陀僧

炒碎

黃蘗

傍根

金州厚者用

黃蘗

一

烏賊魚骨

白者去甲

三味

搗研極細

膩粉

半錢

右四味和勻每用新汲水調攤紙上先令

患人口溫酸漿水洗瘡然後貼每日壹換

治發背疼痛日夜不可忍塗傅大黃膏方

大黃剉雄黃研芎藭研黃連去須白芷去檳

榔剉當歸切木香去桂去麝去黃蘗去芍

藥附子附子去乳香研麒麟竭各雞舌

香麝香香各一豬脂斤水調膏量大

右壹十七味搗研十六味為末拌勻先於

銀器內熬豬脂令沸去節膜下諸藥末調

成膏塗患處日三上以差為度

治發背瘡神金膏方

白及研蜜陀僧研甘草研黃蘗去黃連去

去須膩粉各麝香研字一

右七味搗研為末用津唾調成膏以無灰

白薄紙看瘡大小塗紙上貼之無力即換

治發背金線膏方

楸葉五斤加無即馬齒莧貳斤去

右二味以水五升熬至壹升去滓入鐺內

以柳枝攪熬如飴盛在瓷器內先以荆芥

湯洗瘡次用雞翎掃藥於瘡上令勻以薄紙貼之更用酒調二錢七服之

治發背癰瘡化毒散方

白礬灰研 鉛丹研 蜜陀僧研 木鼈子一各

右四味同入瓷合煨赤放冷地上紙襯盆

蓋一時辰細研以菜子油調貼其冷如水

治發背瘡腫痛牛齒膏方

水牛牙齒煨 太陰玄精石各一分 乳香一錢

右三味搗研為末每用緋絹量瘡大小剪

以津唾調藥攤絹上貼之

治發背瘡衝破疼痛不可忍麝香散方

麝香研半錢 蒺藜子各半 紫背荷葉各半

右三味搗研為散每量瘡大小臨時乾貼

瘡上

治發背生肌肉止痛五倍子散方

五倍子去 地竜去 黃連去 乳香研各一分 木香

中蜜陀僧研 檳榔一錢

右七味搗研為散每用少許乾貼瘡上

治發背熱毒結聚炊赤疼痛消腫解毒金花

散方

雌黃研細黃連九節者檳榔剉麝香各一分

鬱金剉大黃各半

右六味搗羅四味為散入麝香雌黃同研

勻細每取生油調如糊塗患處日三上即

差

治發背五靈脂散方

五靈脂半烏賊魚骨去甲

右二味搗研為散凡患者初覺時以水調

掃腫處如已大作者入醋麪同調傅之

治發背瘡黃石散方

麝黃石如鵝卵大

右壹味猛火煨赤投醋中因有屑落醋中

再煨再投石盡為度取屑暴乾搗散以醋

調傅背上無不愈

治發背成瘡龍葵根散方

龍葵根兩 麝香研壹分

右二味先將龍葵根搗羅為末入麝香同

研令勻水調塗於瘡上衛生易簡方同

治發背癰疽瘡金粉膏方

錫四兩 用板瓦盛炭火安錫蜜陀僧 在

罐子內以蓋子蓋口鹽泥固濟勿令透

右二味同研極細量瘡大小臨時入膩粉

少許以雞子黃調如膏攤在瘡上以緋帛

蓋

治發背已結成膿枯樓塗方

生枯樓根

右壹味細剉搗研如糊塗之日三五度即

差

治發背瘡癰疽桃花汁方

桃花不拘多少

右壹味於平旦承露採取以醞醋研絞去

滓取汁塗傅瘡上有蟲即出無花但桃葉

亦得以臘月豬脂和塗亦佳

治發背瘡腫方

白麵

右壹味取泥拌和圍腫四畔令童子七入尿圍中浸腫處即差

又方新馬糞

右壹味厚塗腫上乾即易之亦療發乳

治發背乳香貼方

乳香初黃蠟者好

右二味等分同入銚子鎔化瀉入水內斟

酌瘡大小取劑再於火上鎔化攤於帛上或紙上貼之不住以手按令著肉為此藥易乾故也一日三易腫消痛止如已有頭欲破者亦漸縮減

治發背麥餅方

大麥炒熟甘草生用

右二味同為末用如酥少許和勻微有酥氣仍以百沸湯拌和作餅劑方圓大小如瘡腫大熱傅之以油單并故紙密裏勿令

通風冷即換之常須喫黃耆米粥甚妙

治發背赤爛疼痛消石搨方

消石五兩

右壹味用湯壹斗浸消待冷取故青布兩

片更采浸搨日三五度

治發背神効薜荔散方

薜荔葉

右壹味不拘多少陰乾擣羅爲散每服三

錢匕水壹盞煎五七沸溫服更用葉煎湯

洗瘡甚妙

又方茄種甘草等分爲末每服二錢匕溫酒

調下立差

又方糯米不拘多少炒熟細研以井華水調

塗四面乾即易之

又方木芙蓉葉自落者經霜然後收之碾末

淡醋調於掌上如青苔色爲妙絹帛塗貼

令瘡上

治諸發背腦疽及一切惡瘡先須用托裏藥

使毒氣皆出然後用藥上傅粗工不知便以
 冷藥傅貼趕逐毒氣投歸于心十死八九世
 俗謂發背無生人殊不知初覺之時多服大
 黃甘草等藥踈轉藏府導其毒氣次以傅藥
 消之

治發背內潰及諸惡毒衝心嘔痛托裏湯方

玉機微義治諸疔腫發背曾經汗下毒氣投
 心迷悶嘔吐而痛可服二三次又名內托散
 乳香通明者壹兩用水
 外浸以乳鉢研細真菜豆粉研四兩
 微義
 云一方只
 用二兩

右二味合研極細每服壹錢匕新水調下

微義每服壹錢或
 二錢甘草湯調下水不可多要藥在胷

上也次用壹醉膏

一醉膏方方見三次用紫雪膏傅之以收其

暈

紫雪膏方方見三

治發背初欲作腫宜服大黃散方

川大黃一兩剉
 碎微炒梔子一兩
 剉川升麻一兩黃芩

甘草壹兩
 剉玄參壹兩

右六味搗篩為散每服四錢匕水壹中煮煎至六分去滓溫服不計時候

治發背似覺但是熱腫令內消皂莢膏方

皂莢壹挺棟肥長者刮去黑皮及子者栗子壹十枚大獨顆者去殼曝

乾桑根白皮壹兩

右三味同為細末用生油調成膏塗瘡上

治發背癰疽瘡瘦乳香膏方

油二斤桑枝各四兩槐枝慢火煎令黃熟去桑槐枝後下諸藥

蜥蜴三條當歸芎藭白芷細辛去苗葉

烏蛇肉各三分麝金香木香沉香各半兩

桂去麤皮壹兩半藁本去苗土一兩以上十一味

瀉出澄濾取清油二十兩入鍋中徐徐火煎次下後藥末

雄黃別研二兩乳香研末沒藥研末麒麟竭末各兩

香研一分水銀粉兩半

右二十二味次第煎熬用文武火再煎前

項膏先下鉛丹蠟不住手攪次下諸藥末

候成膏入合內盛封閉於井底出火毒七

日應患一切毒瘡攤帛上貼三日壹換次

服連翹湯前第一方

治發背初覺腫恐不知定處以濕紙貼之先乾處即是若病根多速覓水蛭濕令入病處食血數易其良治一切癰腫及發背疼痛不可忍但未成膿者犀角丸方

犀角鎊三兩 大黃剉 黃芩去黑心各一兩一分 升麻

防風去人參 當歸切焙 黃耆剉 梔子人

甘草剉 黃連去須 乾藍各一兩 巴豆二十一枚去皮心熬

右壹十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大空腹米飲下五丸取利即愈覺虛即減丸數

治癰疽發背一切毒腫宜服化膿為水犀角丸方

犀角鎊三兩 大黃剉一分 巴豆去皮心膜炒黃研出油三

升麻去目并合 蜀椒口炒出汗 黃芩去黑心 防風

人參 當歸切焙 黃耆剉 藜蘆 山梔子

皮黃連去須 甘草炙剉各一兩

右壹十四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服三十九米飲下食前服微利為度

治癰疽發背虎牙散方

虎牙 乾姜炮 附子炮裂去皮臍 當歸切焙 防風

去王不留行 甘草炙 桂皮去蘆 白茯苓去黑皮

皮各一兩

右九味搗羅為散每服三錢匕米飲調下

治發背癰腫一切惡瘡膏方

牛烏麻油 鈇片研 黃蠟各四兩 熊脂 松

脂各一兩 水銀 硫黃研 芒消研各半兩

右八味取五月四日早於淨室中用銀石

器炭火上微煎至初五日早勿令息火膏

成看瘡腫大小以故帛攤貼之未作膿便

消無不差者合時忌婦人雞犬見臘月臘

日合亦良其水銀熊脂於掌中研入諸藥

治發背發鬢乳癰及諸毒腫神方

黃連去 蛇牀子 乳香別搗各一兩 杏仁三七

皮尖雙 蔓菁子 棉花各一撮 人糞少

右七味搗和作餅子厚如五錢麤布攤貼

之每日三四度易夜亦然每易時以甘草湯洗藥便撮作頭如已穴及膿水亦貼肌漸生膿自出

治發背癰疽一切膿腫還魂丸方

膩粉水水銀小硫黃各一分巴豆人肆拾同研

右四味將巴豆單覆排銚底以三物按上巴豆令平以瓷盞蓋之四面濕紙搭合勿令氣洩炭火四向緩燒之時於水中蘸銚底少頃又燒又蘸其蓋上底內滴水壹點

如大豆乾則復滴以三滴乾為度候冷研陳米飯丸作二十三丸每服壹丸熟水吞下疎下惡物以白粥補之此藥壹丸活壹人曾無失者才取下即時不痛其瘡亦乾治發背癰疽一切瘡熱痛不可忍者百草霜

方

百草霜生蟻螬分

右二味同研細貼之如冰痛即止

治發背初覺腫痛方

赤小豆

右壹味搗羅為末和豬膽汁塗之乾即易

癰疽發背發渴

癰疽煩渴之證由熱氣熏灼五藏津液不足於內也蓋榮衛氣血腐化為膿血則津液不得耗津液既耗熱氣復盛則心神內煩而引飲不止然或為嘔噦下利者以五藏虛熱飲水過度氣不足以勝之故氣逆於上則嘔噦腸胃不固則變下利也此屬癰疽惡證

治諸瘡腫發渴托裏黃耆湯方

黃耆兩 甘草一兩

右二味並剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎五七沸去滓溫熱隨意服不拘時候

治癰疽虛熱大渴地黃湯方

生地黄 芍藥 升麻 木通 甘草炙

大黃炒 知母 赤茯苓去黑皮 人參 當歸

黃芩心 黃耆各兩半 小麥半 栝樓

根二兩 前胡去蘆頭

右膏十五味咬咀如麻豆每服五錢匕用
水壹盞半入竹葉七片煎至八分去滓空
心溫服如小便利除木通大熱加入參晚
再服以差為度

治癰疽執盛口燥發渴除熱止渴黃耆湯方

黃耆 栝樓根 生乾地黄 焙升麻 各一

麥門冬 去心焙 梔子 人兩 芍藥 半兩 黃芩

去黑心 一兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水壹盞半

煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治發背癰疽熱渴悶亂枸杞湯方

枸杞枝葉 兩 石膏 末 栝樓根 黃連 去甘

草 各 一兩

右五味咬咀如麻豆每服五錢匕用水壹

盞半煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治發背乾嘔吐此因先患熱渴飲冷太過胃

寒所致宜服溫脾平胃陳粟湯方

陳粟米 微炒 乾姜 半兩 甘草 兩 川木

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕用水壹
盞半煎至八分去滓空心温服口晚再服
當以差為度

治發背癰疽發大渴口乾不可止凝水石煎

方本正和列

凝水石 石膏 蜜各半

右三味先搗二味石藥羅為末以水五升
煎令稠即下蜜更煎成煎用瓷合盛每日
空心取膏棗大含化嚥津日五七服

治癰疽發背四肢虛熱大渴竹葉湯方

竹葉一握淨洗剉生地黃二兩黃芩去黑心

參十芍藥二知母二甘草炙赤茯苓去黑皮

麻半升麻半黃耆半栝樓根半麥門冬去心

右壹十二味除竹葉外剉如麻豆每服三

錢匕以竹葉汁壹盞入棗三枚擘破同煎

至七分去滓温服壹日三服早晨午時夜

各壹

治癰疽發背兼渴竹葉黃耆湯方

淡竹葉

一握

黃耆

剉

甘草

炙

麥門冬

去心

石膏

碎

芩

去黑心

炒藥

各三兩

當歸

切

人參

焙

石膏

碎

芎藭

半

夏

湯洗

各二兩

生

地黃

切

焙

右壹十二味麤擣篩每服五錢匕以水壹

盞半入生姜壹分柏碎大棗五枚擘破竹

葉七片煎取八分去滓溫服日三夜壹○

外科精義治諸癰疽發背煩渴及一切惡

瘡發大渴者

玉機

發熱而渴

腫諸瘡

淡竹葉

二兩

○瘡科精義三兩

黃芪當歸川芎甘草黃芩

心

藥人參麥門冬

去心

半夏

湯洗

石膏

已上

各三兩

○微義

各二兩

生

地黃

右為

麤末

每服

五錢水壹

盞半竹葉五片

拔

生

姜五片

瘡科

三片

拔

煎至壹盞去粗溫服

微義

吹咀每

服一兩水煎

治諸癰腫藏府壅滯口乾脚冷寒熱頭痛嘔

逆不下食煩渴引飲麥門冬湯方

生麥門冬

去心

焙

葛根

剉

蘆根

石膏

碎

犀角

鎊

菱

薈

芍藥

淡竹葉

切甘草炙到各一兩

右壹十味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半

煎至壹盞入消不壹錢匕去滓溫服不拘

時

癰疽發背作寒熱

癰疽發背病為急切然五藏腑皆在背發於

何部宜精詳之其作也邪毒內鼓寒熱交攻

氣血壅滯陰陽相干故令人身熱而惡寒也

當以療癰疽之法治之

治癰疽發背時作寒熱疼痛不食解毒地黄

丸方

生乾地黄焙二兩黃耆剉栝樓根剉黃芩去

麥門冬去心焙各一兩半桑螵蛸拾五枚剉炒大黃

炒人參 梔子人 肉苳蓉焙前胡去蘆頭

升麻 芍藥 知母焙王不留行各一兩遠

志去心敗醬 地脉草各半兩乾棗一拾五枚湯浸去皮

移以蜜一升和蒸成膏

不壹十九味搗羅十八味為末入棗膏和

如梧桐子大每服三十丸加至五十丸
空心米飲日晩再服

治癰疽始作便敗壞發寒熱疼痛羊髓膏方

羊髓 甘草剉搗各二兩 胡粉研 大黃剉搗各一兩

豬脂斤半 肉桂半斤 肉苁蓉一斤 鹿角一斤

右五味先熬脂髓令沸下甘草大黃煎候

甘草黑色絲漚去滓入胡粉以柳篋攪勻

瓷合盛每日三五度塗傅瘡上以差為度

治癰背癰疽一切瘡腫乳癰口乾脚冷發作

寒熱頭痛嘔噦不下食葛根湯方

葛根剉 麥門冬去心焙 犀角鎊半 萎蕤

薺芫剉 芍藥剉 甘草剉 蘆根剉 石膏剉 石膏剉

右九味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分下竹瀝半合紅雪壹分更煎三兩

沸去滓空心日晚溫服

治癰疽始作堅鞭皮色紫赤惡寒壯熱一二

日未成濃者升麻湯方

升麻 黃芩 芍藥 甘草 麻黃 杏仁 石膏 知母 升麻湯方

升麻 連翹 大黃炒 生地黃切 木香各

兩 白欬 玄參各 右七味 麤擣篩 每服五錢匕 水二盞 煎至

膏盡 入芒消末半錢匕 去滓 空心溫服 取

利為度 未利再服

治發背癰疽 一切瘡腫 木穴時攻 刺疼痛 或

發寒熱 渴躁不食 解毒 勻氣 犀角散方

犀角鎊 人參 大黃炒 栝樓實焙 甘草

炙 葛根剉 赤茯苓去 檳榔剉 木香

半兩 各半兩 右一十味 搗羅為散 每服二錢匕 空心晚

各三 葛藟

間粥飲調下 以差為度

治發背未成 膿身體寒熱 人參散方

人參 當歸焙 蜜 隨僧蝦 沒藥研 雄黃切

半丹砂研 青 栝樓實二枚 去瓢 取

右七味 擣研為細散 每服二錢匕 用甘草

煎湯放溫調下 日三

治發背未潰 身體寒熱 黃藥散方

治發背未潰 身體寒熱 黃藥散方

治發背作寒熱車螯酒方

右二味為細散每服二錢匕茅根煎湯調

下仍用生薑汁調藥傳之二錢匕

治發背作寒熱車螯酒方

車螯紫色光厚者以黃泥固濟膩粉壹錢

枯樓實壹枚

右四味先將前三味和勻次將枯樓用酒

二盞煎至壹盞去滓調下前藥三錢匕取

下惡物差

治發背未潰身體寒熱苦茄散方

苦茄種甘草各一兩

右二味為細散每服二錢匕甘草湯調下

治熱毒癰腫血不散初覺憎寒乾渴四肢煩

悶能令速消芫胡煎方

芫胡去苗一兩知母一兩木通一兩淡竹葉一百

斤瞿麥穗一兩連翹一兩防己二兩大黃生二兩

生麥門冬汁三合生藕汁三合甜消四

湯成

右一十壹味先將八味剉如麻豆大以水三升煮取壹升半去滓下甜消令散次入麥門冬藕汁等共分為八服空腹兩服以溘利為度餘藥食後緩緩服之

發背潰後

發背已潰毒氣外泄或有逆證難治者蓋以府藏之傷也有白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是為五逆其餘熱渴利嘔與膿潰不愈皆以餘毒攻

擊榮衛傷壞津液未復惟當隨證治之

治發背已潰去膿汁理虛勞內補黃耆湯方

玉機微義治諸瘡腫發背已破後虛弱無力體倦懶言語食無味少睡脉瀼自汗口乾並宜服之

黃耆細剉麥門冬去心焙熟乾地黄焙人參

白茯苓去黑皮甘草炙剉各三分當歸剉

芍藥剉芎藭剉桂皮去麤皮遠志去心各半兩

右壹十壹味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至五

分去滓空心溫服日晚再服

治發背已潰痢下不住白石脂湯方

白石脂炮 龜骨炮各壹兩 當歸剉 桔梗剉炒各

女萎各壹分 白頭翁各壹分 黃連去須半兩 乾薑炮

草炙剉各三分 右九味各壹分 去心各壹分 煎取汁

五分去滓空心溫服日午晚後各壹服

灸發背後服大黃湯方

大黃 朴消各三錢

右二味麤搗篩水壹盞濃煎熱服即瀉出

毒氣

治發背先穿破出膿水不作傷外風冷毒炊

痛淋洗當歸湯方

當歸剉 甘草炙 芍藥炙 葛根剉 細辛去葉

黃蘗去蘆皮 麻黃去根節 苦參 白芷 桂去

皮蜀椒去目并閉口者炒 防風去叉各一分

水壹十二味各壹分 搗篩以水六升煎取三升

濾去滓溫洗瘡上日再

煎

煎

煎

煎

煎

治發背癰疽已潰積毒惡肉未去豬蹄湯淋

洗方壹十二和煎餅餅以水六代煎以三次

豬蹄一隻黃耆黃連去須芍藥黃芩去心各

一分狼牙根薔薇根各半兩

右七味剉碎先以水煮豬蹄令熟取汁五

升下藥煎至三升去滓放溫淋洗瘡候水

冷即貼菴蓉膏痛不止加當歸半兩甘草

半兩和煎洗瘡

治發背癰疽已潰不生肉煖肌乾瘡菴蓉膏

方驗法三氏家錄中錄此方

肉菴蓉去皮半夏生剉熟乾地黄各一兩當歸

蜀椒去目并開口細辛去苗烏喙去皮蛇蚶

草壹白芷煎甘草各半兩桂去麤皮薤白七豬

脂三斤和煎餅餅令熟以水六代煎以三次

右壹十三味除豬脂外剉碎以醋半升拌

藥壹宿先熬脂令沸次下諸藥煎候白芷

赤黑色漉出懸濾瓷合盛取塗瘡上日三

次立効

治癰疽發背瘡腫或已潰或未潰連翹飲方
 連翹炒 山梔子炒 人參炒 黃耆炒 防風去 升麻
 羚羊角鎊 漏蘆去蘆頭 甘草炙 大黃炒 枸杞
 根皮各二兩 剉碎以酒半升
 和二十味籠搗篩 拌令勻每服五錢匕用
 水壹盞半煎取八分 去滓空心溫服
 治發背發腦疼痛侵潰 黑錫煎方 黑錫一斤
 先鎔令 浮乘熱研成泥以無灰酒壹斗煎
 錫至三升瓷瓶中盛 每服壹盞調生甘草

末二錢 七日三服 甚者五七徧差

居家必用

十七味流氣飲子治癰疽發背一切惡腫毒
 無論病證大小悉皆治之此方屢用其功不
 可具述

人參去蘆 當歸洗淨 黃芪去蘆各二兩 芍藥 防風
 桔梗去蘆 厚朴去蘆皮切碎 姜汁 白芷 桂
 皮 甘草去皮 木香 烏藥 人椒 殼 芍藥
 檳榔者 紫蘇葉已上各一兩

右件爲吹咀晒乾令燥碾爲麤末每服半
 兩重水酒各膏蒸煎至壹大盞去滓溫服
 玉機微若初發腫脊便高者勢雖急而毒
 義同去氣却淺其證屬陽加生大黃與人參同若
 初發至微如粟粒甚則如豆許與肉俱平
 或作赤色時覺微痒病勢雖緩而至重其
 證屬陰加炮過附子川者與人參同若尋
 常病只依前方服之極効
 必用全書

雞清散治癰疽發背丹毒惡腫時行熱毒發
 作赤色癰瘰初發吹妳腫痛急敷此藥並皆
 內消更不成膿
 而赤少豆黃藥子大黃盆硝皂角
 大味或磁木鱉子分
 右爲細末用雞卵清調鴛翎蘸藥敷之立
 効必用之
 拔粹加器其可其刺炎其其撥收貯於
 東南瀉之則脹已汗之則瘡已

東南二方者在人則爲內小腸熱甲膽風小腸與膽皆居其下其性炎上其瘡外有六經之形證內無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裏非疽瘡也止癰癢也小則爲癰大則爲癰其邪所受於下風濕之地氣自外而來侵加於身者也經云營氣不從逆於肉理乃生癰腫諸痛痒瘡皆屬心火此瘡自外而入是丙小腸左遷入於膽作痛而非痒也此三方皆主血血爲病必痛此元氣不足營

氣逆行其瘡初出未有傳變在於肌肉之上皮毛之間只於風熱六經所行經絡地分出矣宜瀉其風濕熱醫者只知陰覆其陽則汗也此宜發汗者乃濕熱鬱其手足少陽致而脉凝逆使營衛周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色必赫赤而腫微黯色東方青埋沒之也風木之性上衝顏必忿色其人多怒其瘡之色赤赫赤腫硬微帶黯色其瘡之形勢亦奮

然高起結硬而作痛也其脉止在左手左手主表在寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在於血脉之上皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪氣去矣以托裏榮衛湯主之

黃耆兩紫胡二錢羌活二錢防風一錢當歸身各一錢

半連翹二錢炙甘草一錢人參各一錢○玉機一錢

蒼朮三錢生黃芩一錢紅花一錢桂枝各五錢

右咬咀都作壹服水酒各壹大盞同煎至膏去滓大溫服○微義右咀咬咀服膏

兩水酒各半煎此方

沉香海金沙丸續隨子丸海金沙散此方

見水腫門以瘡瘍證此方

如聖散治惡瘡背膈疽寒癰吹妳打撲損傷

並治之此方

甘草一兩半皂角三錢燒存性此方

右為細末每服三錢熱酒調下無時此方

救苦黃耆散治諸惡瘡癰癤張郎中傳

黃耆 甘草 當歸 芫蕪根 芍藥 各

分一兩 懸壘 對一熟地黃 不以少 金銀花 兩 皂

角棘針為引

右咬咀每服五錢無灰好酒壹升同引子

裝於磁瓶內將瓶用箒葉封坐於鍋內上

以大盆覆鍋口盆外用黃土封之母令出

氣煮之外聞藥香為度取出瓶澄定飲清

將藥滓再添酒壹升依前者煮服若不飲酒

者以水煮服若酒少者酒水各半煮服瘡

在上食後臨卧在下空心服之神効

萬應針頭丸治一切腦背疽惡毒大瘡欲死

者壹粒即愈 武昌關千戶秘收此藥大都治可者八十餘人

麝香 三錢 血竭 三錢 蟾酥 三錢

粹者 輕粉 三錢 硃砂 三錢 腦片 一錢 蜈蚣 一對

右為極細末煉蜜和為劑如瘡有頭者用

針挑破微有血出將藥壹黍米大放於挑

開瘡口內上川紙花周圍唾津濕沾瘡上

其藥不過時刻即愈 如兩腋見無頭瘡

者卽是暗丁俗云要胡是也卽將兩手虎
口內白土紋用針挑破如前用藥封蓋忌
雞鵝酒濕麵一切發熱之物木入效驗特

瑞竹堂方

瘡腫

內托千金散治腦背癰疽乳便等惡瘡

鄭善明御

史救人驗

人參 當歸 黃耆 芍藥 川芎 防

風 甘草 瓜蒌 白芷 官桂 桔梗

已上各 三錢 金銀花 三錢 ○秘傳外科各等分
沒藥 痛甚者加當歸芍藥乳香

右為咬咀每服須秤藥七八錢重水一大
盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚
者倍加當歸芍藥或加乳香二錢日進三
服兩服之後瘡口內有黑血出者或遍身
汗出皆藥之功效也如病勢猛惡須秤藥
壹兩水壹大椀煎服外科入酒服未成膿者卽
散已成者不用針砭自透此藥累經功效

不可不傳普救衆苦

搜膿散瘡內有膿不能自出如是透深者用

紙撚蘸藥入於瘡口內吸膿盡即能平藥

白芍藥

三錢

川芎

二兩

香白芷

兩

輕粉

右爲細末瘡平者摻藥在上二錢

生肌散治瘡以不合

沒藥

壹錢

黃丹

壹錢

赤歛

壹錢

枯白礬

膠

二錢

黃柏

壹錢

乳香

壹錢

麝香

右爲細末先煎葱白湯洗淨搨乾敷藥

末於瘡口上

青露散治背疽一切惡瘡圍藥不胤開

白及 白欵 白薇 白芷 白鮮皮

朴硝 青黛 黃柏 大黃 天花粉

青露散 即芙蓉葉 老龍皮 即老松樹皮

右件各等分爲細末用生姜自然汁調圍

敷如乾時再用姜汁潤

吸筒以慈竹爲之削去青

五倍子 多白礬少用

右二味和筒煮了收起用時再於沸湯煮
令熱以筋箕筒乘熱安於患處

二烏散治發背蜂窩疔瘡便等證

川烏頭壹草烏頭壹

右將新瓦壹箇汲新水壹桶將川烏頭草

烏頭併瓦俱浸於水桶內如無新瓦於房

上取淨瓦亦可候透瓦將川烏草烏於瓦

澁面磨藥成膏就磨藥手挑藥貼於瘡口

週圍如未有瘡口一漫塗藥如三四重紙

厚上用紙條透孔貼蓋如藥乾用雞翎蘸
水掃掃如此不過三

搽藥治諸瘡口膿水不乾

白龜骨二寒水石三號丹飛一

右為細末乾貼瘡壹料以六分為率衛七
易筒

方同

黃連獨活散治背疽一切惡瘡初發腫甚者

服三四服即消散

羌活半錢獨活半錢防風半錢藁本壹錢君黃

芩乙錢黃連半錢知母乙錢酒當歸身三錢

地黃二錢酒防風梢半錢酒連翹三錢黃芩

一錢人參半錢甘草身壹錢半陳皮半錢蘇

木半錢當歸梢半錢桔梗一錢澤瀉七分甘草梢半錢

黃蘗壹錢漢防已半錢

右為咬咀只作壹服水壹碗煎至五分入

好酒半盞臨卧服便將滓煎服之前後節

續服即瘥

十全內托散托裏成膿服之

人參二兩當歸二兩黃耆二兩官桂一兩甘草一兩製

厚朴一兩桔梗壹兩川芎壹兩白芷一兩防風一兩

右為咬咀每服三五錢水二盞生姜五片

煎至八分去滓通口服南北經驗方

善應膏治惡瘡癰疽腫癩發背癩癧寒濕氣

冷刺痛皮膚頑麻手腫打撲腰骨閃肭血氣

毒氣鐵器所傷杖瘡小兒頭瘡蜂蝎猪狗蛇

虫所傷湯火漆瘡下注賺瘡婦人吹妳元桐

子大新水送下二十九產前產後腹刺痛溫

酒送三十丸此藥並不得犯葷手火止鎔開

用好紙攤成膏藥貼之立効

黃丹五斤乳香二兩沒藥二兩木鱉子一兩白芷

一兩白芨一兩白斂一兩當歸一兩官桂一兩杏仁一兩

血竭一兩清油五斤柳枝一尺截三寸槐條經方

少許或丹內有沙石用油五斤如丹淨用油六斤

右件除乳香沒藥血竭黃丹外其餘藥油

內浸三日炭火上成鍋內熬令黃色濾去

藥滓不用次下黃丹以新柳條小錢籠長

五六寸勻桷黃丹褐色掇下鍋子在地

只管用柳條勻桷候藥煙盡下乳香沒藥

而蝎在鍋再桷候冷傾在磁器內收頓修

合宜春三月七月

治發背諸惡瘡疼不可忍用糞缸內底上青

泥取出陰乾為細末用新水調付其痛立

止衛生易方同

透膿散永類治諸癰瘡及貼骨癰不破者

不用針刀一服不移時自透累有効驗

蛾口蠶

用出了蛾兒蠶兒玉機政義大蚕蠶兒

右將蠶兒一個燒灰用酒調服即透切末可兩個三個蠶兒燒服若服壹个只壹个瘡口若服兩個三個即兩個三個瘡口切勿輕忽南北經驗方油珍方承類鈔方秘傳外科衛生易簡方同神效回生膏治癰疽疔毒遠近兼治打撲跌折傷損暗毒發背刀斧所傷箭頭在肉蛇犬所傷並皆治之其效如神年深愈效張提舉救人累效

槐柳 桃 榆 桑 枸杞 酸棗

右將前六件樹條嫩者每件各二十條每條長二寸通計一百二十條剝取嫩皮用清油三升文武火於大砂鍋內煎令嫩皮津液盡為度將油濾過

白芷 白芫 白斂 當歸 大黃 黃

栢 赤芍藥 杏仁 草麻子已上各一兩半重

右將前藥九味剝砂再下於前油內浸透又用慢火煎炒去藥滓再用油濾過

黃口十二兩煎過去藥渣再出所煎散

右用黃丹十二兩重分作三次下於油內熬令黑色將筋背離藥油滴入不散為

度並白艾 白粉 當歸 入黃 黃

血竭雄黃 乳香 沒藥已上各輕粉

三錢 由三代文 九火 入 煎內煎令燥又

右為極細末放油微溫下前藥於油內以

瓦甑盛之蓋以埋土內三日去火毒任意

攤貼患處二日外自覺病退其効如神

膏藥方汴梁寶梵院

川當歸去蘆芍藥 川芎 黃耆 香白芷

黃芩 黃連 黃蘗皮 桑白皮 白芨

白歛 蓬朮 南木香 皂角子去子升麻

栝樓根 木鱉子去殼檳榔 杏仁 藿香

沒藥各半巴豆一錢川山甲二兩肉桂半錢白膠

黃蠟各一兩

右已上三十四件剉為籠末和勻以好澄

清油半斤連黃蠟白膠於鐵鑊內煎溶却

下前藥於內煎令焦黑使棕皮濾去滓再
 以熟藥油入淨鐺內却用
 黃丹四兩乳香末五錢麝香半錢
 右用前藥逐時挑在油內不住手以箭幹
 大楊柳枝攪火上煉至黑色時復滴些在
 冷水盞內若成珠子不粘手即傾出瓷器
 內盛之任意攤用此方得之方士凡有疾
 病用之無不愈者除灸瘡有癩痕外其餘
 惡瘡貼之並無癩跡修煉之時須於淨室

忌婦人僧尼雞犬猫畜大有神効

膏注

當歸 附子 川芎 防風 白欽 升
 麻去蘆 細辛 側柏 革藤 甘草 桑白
 皮 黃白及 垂柳枝 桃仁 黃芪 白
 芷 姜蠶 杏仁
 右件十八味並細剉研以清芝麻油二斤
 於新瓷器內浸藥膏宿後納鐺中用文武
 火煉候稀稠得所以篩子濾去藥滓後入

藥 雄黃半兩 朱砂一分 麝香半兩 硫黃一分
細研 黃丹五兩 入油內再煎須臾便息火然後
 入黃蠟兩 凝藥候稍過傾入瓷器內盛之
 勿令塵污其藥滓可再用清油浸壹宿再
 煎候稠入諸藥少許為膏用之小可瘡癩
 只此可療右具病狀于后 發背用好酒
 調兩匙日進兩服外貼二日壹換 瘰癧

漏瘡見骨者貼之 疽瘡風腫痺癩腸癰
 發鬢發牙馬墜磕破一切無名之瘡皆貼
 之 折傷筋骨好酒調半錢服之 箭入
 骨貼之自出 蛇虫毒物咬並貼之 側
 產橫生好酒調半兩服之 難產好酒調
 服立見喜氣婦人血氣衝心不可忍者用
 生姜自然汁加小便同煎再下壹錢同調
 服之 但諸惡瘡不問十年五年不痊者
 以鹽湯貼之 喉閉含化曠津液下 胎

死腹中温酒調壹分服之收效如神

王氏集驗方

癰腫

治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何

處發眉發頤或頭或項或背或腰或脇或

婦人發乳或發手足服之皆有爭功金銀

花甘草二味濃煎湯服氣弱者加黃芪血

弱者加當歸尾用酒煎服

醫方大成

癰疽

黃耆建中湯加附子治氣體虛弱之人患背

瘡頸疽不知痛痒瘡勢不作急宜服此以

生血潰膿有熱者不可服醫方集成南北

承類鈔方同方見諸汗門

治發背已潰未潰者最有神效

厚朴二錢姜汁製○承類鈔 陳皮三錢 蒼

朮五錢米 甘草二錢

右入桑黃菝五錢同為末瘡潰則乾摻之

朱清則油調塗之

袖珍方秘傳外科同

乳香散治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人嘔吐應于毒瘡並皆治之

菜豆粉

四乳香好者二兩

右同研極細每服二錢新汲水濃調食後

服

醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方衛生易簡方同

○外科集

驗方治發背內潰及毒氣攻衝嘔逆惡心

內攻危證凡惡疽疔瘡癰宜日進壹二服

便毒出外不攻臟腑之證乳香

別研真菜豆

粉

菜豆去皮亦可

研為極細末每服壹錢重新

汲井水少許調服細細呷之要經絡發背

大疽自肩下連腰脇腫盛其堅如石極紫

黑鑿以陳藥敷之中夜大嘔乃連進此藥

三四服嘔遂止既而瘡潰出赤水淋漓四

十日而愈又有一患癰瘰者疼痛輒嘔服

此嘔逆即止草節煎湯調服亦可

治外腎疔瘡

醫方集成袖珍方外腎疔瘡

用抱雞卵殼鷹

爪黃連輕粉各等分為末煎過清油調塗

南北經方同

南北經驗方

癰疽

張子和方懸萎散治發背惡瘡

懸萎一分大黃兩當歸兩金銀花兩皂角刺

壹兩

右判碎用酒壹椀煎至七分去滓溫服如

有頭者加黍粘子油珍方神效名方

袖珍方

南癰疽

神効奪命丹治一切發背疔疽及破傷風陰

証傷寒

朱砂三錢為衣枯礬壹錢蝸牛二十介血竭二錢

輕粉二錢上二味全研銅綠字蟾酥一錢四味同研

右用小兒母乳汁和丸如桐子大朱砂衣

遇此病令患人自嚼生葱壹二根爛吐

裹藥壹丸在內吞下前藥恐藥未嚥逆之

狀即吞藥却以熱酒三二盃送如重車行

斗里路遍身汗出既氣斟酌衣被蓋湯汁
 出毒氣腫自消如病臥昏沉冰代嚼葱白
 如前服今患人自覺坐蒸壹二匙服也出
 治腹內肚癰腫厚竹味水吹麻子入米炒
 木黃膏兩取末破救紙壹兩取牛嘔子壹
取末率牛二錢取末血二錢
 右和作二服蜜水調空心以利為度
 消膿飲治肺有癰膿腥氣上衝嘔而咳嗽
 南星生知母 貝母去心生地黃 阿膠炒

川芎 桑白皮炒甘草各三分防風 射香
 桔梗 天門冬去心薄荷 杏仁不去皮半夏
 製 紫蘇 白芷 白芨各半
 右峻阻每服膏兩水二盞生姜七片烏梅
 壹介煎至八分去渣食後溫服
 治一切發背發疽等惡瘡用蝦蟇全介同老
 鴉眼睛藤葉搗傅即散神驗
 一切惡腫無名及發背高起未被膏藥方
 草麻子壹百粒 男髮雞彈壹九

右油熬膏入丹成膏貼之只壹介便消加
黃蠟少許

秘方奪命散治一切癰疽無名惡瘡皆可治
之其効不可盡述此方不可亂傳

川山甲 用蛤粉炒黃 當歸尾 壹錢 乳香 壹錢 皂

角針 燒 陳皮 各三錢 貝母 壹錢 赤芍

藥 甘草節 各六錢 沒藥 二錢 花粉 八錢 防風 五錢

白芷 五錢

已上十三味為咬咀每服壹兩用無灰酒

壹大碗煎至半碗紙糊口勿令走透氣熬

藥用迴避雞大婦人病在上食後病在下

食前真入妙訣世間希一切癰疽總可醫

消膿如同湯沃雪化膿立見肉生肌

當歸連翹飲治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不

利舌腫喉閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澁

大小便結滯消癰腫解風毒活血脈保真

秘方保真氣 宣通遍身結滯 施圓端効方治腦疝

裏 真氣 宣通遍身結滯 癆背諸惡瘡瘍內淡

連翹

當歸

瘡科通玄論去渣

大黃

梔子

芍

藥

金銀花

秘方一方不用當歸芍藥加獨活黃芪甘草牡蠣壹兩不

煎用姜

味右各等分水二盞生姜三片煎至壹盞去

滓熱至甚者加大黃○端効方右為麤末

每服三錢酒壹盞半煎去六分去滓溫服

食後日二三服量力加減熱實加倍以利

之陰證者減大黃秘方右為麤末每服五

七錢水壹大盞生姜五七片同煎至七分

去滓溫服量力加減熱甚者加以利之簡

方由秘方同通玄論如瘡熱其加大黃亦利之

承類鈴方

肺癰

葶歷湯治食炙燔飲酒致肺壅喘不得臥及

肺癰咽燥不渴濁唾腥臭川甜葶歷炒桔

梗瓜萎仁川升麻薏苡仁桑白皮炙粉葛

冬壹兩甘草半兩姜煎食後

肺癰咳而經効馬兜令桑白皮地骨皮並蜜微炙

類聚

卷三

類聚

卷三

類聚

卷三

桔梗薏苡仁食後粳米一搯入生地黃汁少許

補肺散人參北五味黃芪用羊肺猪肺瓦器煮食醃好鍾乳粉

酒毒肺熱咳紅四黃元宣連大黃山梔仁黃芩此略炒為末蜜丸噙化

肺熱口臭口中如膠瓦乾發渴小便多地骨皮桑白皮生黃芪山梔仁馬兜令甘草煎

食後噙嚙

癰疽

選奇云排膿止痛芍藥當歸牡丹皮黃芪是也膿盡消肌內寒白芷括樓藁本石斛是也生肌長肉傅痂血竭白欵是也

又癰疽已有眼膿不出痛甚用巴豆乙个去皮膜不去心油搗豉十四粒口中含去皮令軟爛研入麝香少許薄糊捏作小麥豆大用紙撚引入瘡口內必痛則少忍良久膿出

塗貼法牛耳楓根葉搗酒飲以滓貼塗是三
叉葉面光無毛者赤腫用白芷大黃作末
蜜醋調塗 又千金用朴硝香豉生地黃
汁搗煮地黃令爛熟敷貼馬鞭草及猪膽
皆可塗貼 又括樓末或赤小豆末苦酒
和貼又革麻子熟搗傅之 諸癰只以生
麻油乙斤黃丹四兩蠟四分三味臈日前
日午用火煎至明早下丹蠟成膏忌女人
六畜見集成用平胃散末黃桑菰爲末油

調傅凡塗貼以蜜和生姜自然汁潤而通
氣

澹寮有發渴而後作疽有先疽而後發渴專
服加減八味元効疽愈尤宜服載川藥次
第好方甚多

又籀瘡令不潰詩云諸等惡瘡不可治京墨
好醋生姜汁猪膽搥梅調塗上明朝恰似

鬼神吸並天傳

棗膏元肺積在右脇下大如杯發爲癰疽

陳皮 桔梗 葶藶別研

右各等分前二味為末入葶藶煮棗肉和元梧子大每五元米飲下

濟生葶藶散治肺癰咳膿血喘急一方止用

黃芪二兩生用為末水煎溫服吐膿後用

此甜葶歷二兩半隔紙炒冷紫色為末每

二錢煎六分溫服

治肺癰咯血以薏苡仁為末熟煮猪胰切片

蘸藥食候空時食之蓋以仁補肺猪胰引

入經絡中

懸癰

生穀道外腎之間醫書不載初發其痒狀如

松子四十日後赤腫如桃若破而大小便

自此出不可治大甘草節貝母白芷為末

小酒調兼治弩氣諸瘡癰虛弱人加當歸

壹半大黃煨壹半又凡貼癰腫用生地黃

忍冬藤芭蕉等自然汁調藥尤有功

瘡科通玄論

解毒圓治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘
攣痲汗咬牙驚悸一切熱毒並宜服之

大黃 大黃連 山梔子 黃芩 各五錢 牽牛

滑石 各一

右為細末滴水經驗秘方酒水為圓如梧桐子大

每服三四十圓秘方每服三四丸溫水送下加減

服之簡奇方與秘方同

乳香黃耆散治一切惡瘡癰疽發背疔瘡疼
痛不可忍者或瘡毒氣入腹神昏不醒嘔吐

者或米成膿者速散之已成膿者潰敗膿不
假刀砭其惡肉自下又治打撲損傷筋骨疼
痛或婦人產後腹痛惡物不下並宜治之

黃耆 當歸去蘆 川芎 陳皮 麻黃

甘草 芍藥各一兩 經驗 人參 米殼

二兩 乳香 沒藥各五錢

右為籠末每服三錢水壹盞煎至七分去

滓溫服如瘡在上食後服瘡在下食前後

簡奇方

通開散治一切癰瘡無頭腫痛宜通立愈

大黃二兩 易簡方一兩 衛生一兩 牡蠣半兩 燒石易 山梔

子三錢 龍二錢 易簡方一錢 甘草三錢

易簡方一錢 艾葉一錢

右為釐末每服五錢水壹大盞同煎至六

分經驗秘方 絞去滓溫服以利為度簡奇方同

麝香蟾酥圓治一切癰疽發背疔瘡內毒不

被却用針刺破熬藥在內上用膏藥貼之其

瘡即潰如類考

蟾酥半明 信一錢 雄黃一錢 巴豆拾箇 去皮油

錢一 輕粉半錢 乳香半錢 寒食麵三錢 麝香少許

右為細末滴水為錠子如麥粒大量瘡用

度簡奇方同

乳香拔毒散治一切癰腫瘡癤消毒止痛

黃蘗二兩 去皮 黃芩二兩 去腐 地骨皮一兩 乳香三錢

另沒藥三錢 另研

右為細末井花水調作膏子攤於紙花上

貼於瘡腫處經驗秘方

類聚

水瓜味木其芬小陽非膏于繼效派法主

類聚

醫方類聚卷之青膏七兩共甘又兩片香三

片香通毒端余一以繼融然融隨持止前

類聚

水瓜味木其芬小陽非膏于繼效派法主

類聚

融糟斗則計一取黃一豆