

辨證奇聞卷一

山陰陳士鐸遠公父原本

文守

江南紀氏敬述

寧鄉

男先五建中氏

傷寒

一冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴人謂太陽症誰知太陽已趨陽明若徒用乾葛湯治陽明則頭痛不能除徒用麻黃湯治太陽則汗不能止口渴不能解勢必變症多端法宜正治陽明兼治少陽

蓋邪入陽明留于太陽者不過餘邪治太陽反傷太陽矣故太陽
不必治宜正治陽明蓋陽明多氣多血邪足恣其凶橫如賊入通
都大邑其搶掠之勢較窮鄉僻壤自不同所得之物足以供其跳
梁故邪入陽明挾其腑之氣血炎氛烈焰徃二然也然豈可以輕
小之劑望其解散必須大劑涼藥始可祛除其橫暴用石膏兩知
母錢二麥冬兩二竹葉片二百伏苓人參錢三甘草柴胡枝子錢一劑頭痛
除二劑身熱退汗止口不渴此卽白虎變方用石膏知母泄陽明
火邪柴胡枝子斷少陽路徑妙在用麥冬至二兩以清補肺氣使

火邪不上逼更妙用茯苓引火下趨膀胱從小便出太陽餘邪盡
隨外泄至于人參甘草竹葉取其調和臟腑所謂攻補兼施也

或懼前方太重則清肅湯亦可兼載以備選用石羔五錢麥冬一兩知

母甘草人參柴胡枝子各一錢獨活半夏五分○集中末註煎法者俱

係水煎服各卷倣此

一冬月傷寒發熱口苦頭痛不欲飲食腹中時痛人謂太陽症誰
知是少陽症乎傷寒未有不從太陽入者由太陽入陽明由陽明入
少陽者傳經次第也何以初入太陽即越陽明而入少陽人謂陽

經之傳孰知不然蓋少陽乃胆經胆屬木二最惡金肺屬金主皮毛風邪之來肺金先受肺欺胆木之虛卽移邪于少陽故太陽往二多兼少陽同病者此耳然此症乃二經同感非傳經之症治法似亦宜聞二經而治而又不然單治少陽太陽之病自愈方用柴

胡二錢白芍

五錢

甘草陳皮黃芩神曲

一錢

白朮茯苓

三錢

一劑熱止二劑

腹不痛頭不疼口亦不苦此卽逍遙散之變方何治傷寒如此之神不知病在半表裡逍遙散解散實邪表裡之邪旣解太陽膀胱之邪何能獨留况方原有白朮茯苓三錢以利膀胱通膀胱之氣乎

余所以止加神曲黃芩少解胃火和脾氣諸症所以尽除

此用舒經湯亦佳薄荷白朮錢二白芍伏苓錢五甘草八分黃芩錢一桂

枝三錢

一冬月傷寒發熱口渴譫語時發厥人謂熱深厥亦深疑厥陰症

誰知太陰症乎太陰脾土與陽明胃相表裡表熱裡亦熱此胃邪

移于脾經也此症最危蓋人以脾胃為主脾胃為火邪燥腎水

有不熬乾乎宜急救脾胃然救脾而胃火愈熾救胃而脾土立崩

此中消息最難然終何以救必速救腎水之枯玄參三兩甘菊熟地

一麥冬二兩 芡實五錢 名救枯丹用玄參以散脾胃浮遊火甘菊以消

胃邪麥冬以滋腎液熟地生腎水庶幾滂沱大雨自天而降大地
枯焦立時優渥何旱魃之慮哉又恐過于汪洋加欠實以健上又
仍是腎經藥則脾胃相宜得其灌溉之功絕無侵凌之患此立方
之所以神也故一劑譖定再劑渴除三劑厥止身涼

原評云此條須參

此症清上散亦效石羔麥冬生地

一兩

甘草

一兩

銀花

五兩

白朮

三兩

一冬月傷寒大汗熱未解腹又痛不可按人謂邪發在外未盡內

結腹中陽症變陰之候余謂不然傷寒汗大出邪必隨出宜無邪
在中何又腹痛此乃陽氣盡亡陰亦盡泄腹中無陰相養有似邪之
內結作痛此陰陽兩亡急症夫痛可按爲虛不可按爲實何以此
不可按又謂虛不知陰陽兩亡正在將絕不按痛且難忍况按又
傷腸胃安得不重增其苦所以不可按也此症急不可緩用急救
陰陽湯人參白朮熱地二兩當歸一兩甘草三兩黃芪三兩
熱解汗尽止方用人參芪補氣使陽回于陰內歸地補血使陰攝于
陽中朮草和脾胃而通腰膈使陰陽歸于氣海關元則亡者不亡

絕者不絕倘認是陽症變陰純用溫熱加肉桂姜附雖能回陽手
傾刺然內無陰氣陽回陰不能攝亦旋得旋失

用救亡湯亦效人參當歸熟地各一兩甘草二錢附片一

原評云後方更穩

此等方石脫市醫俗套在不知徑者一見便稱穩當流毒石步可嘆

一冬月傷寒大汗熱解腹微痛腰不可俯仰人謂邪在腎經欲用
稀菴丸加防已不知此乃發汗亡陽二虛陰不能濟也陰陽互爲
其根無陽陰不生無陰陽不化此症汗泄過多陽氣無幾陰又自
顧不遑不敢引陽入室陽無所歸故行干腹孤陽無主而作痛腎

中之陰因陽氣不歸孤陰無伴不敢上行干河車之路故腰不可

俯仰用引陽湯杜仲甘草

錢一

山藥

錢五

伏苓

錢二

欠實

錢三

肉桂

錢三

分

白朮

錢五

一劑腹痛止二劑腰輕三劑俯仰自適方妙在助陽氣不

去助陰蓋陰之所以杜陽者欺陽衰也譬之夫婦好合豈忍永絕

良人因夫不慎外侮相爭焦頭爛額狼狽逃回因羞變怒杜絕不

許入房倘夫得良朋之益捆載而歸見金多有不色變者乎知必

開門迎笑所以助陽兼助陰者此耳倘用稀葢防已重損陰陽則

夫貧婦貧彼此成仇終身反目清陽湯亦可

杜仲

錢二

山藥

錢二

甘

草故並錢一人參白朮五錢原評云加故並甚當

一冬月傷寒大汗氣喘不能息面如硃紅口不能言呼水自救人謂熱極欲用白虎解陽明火而不知此乃戴陽症上熱下寒若用白虎雖多加人參下喉卽亡用八味地黃湯牛筋煎湯恣其渴飲必熟睡半日醒來汗必止氣必不喘面必清白口不渴此原不必汗而汗必致大汗二旣大出陽邪尽泄陽尽散陰亦隨之上升欲盡從咽喉外越以皮毛出汗陰氣奔騰不得盡隨汗泄故直趨咽喉大路不可止抑陰旣上升陽又外泄不能引陽回氣源元陽亦隨

陰而上陰氣逼之不可上故氣喘不能息且陽在上火亦在上者
勢也况陰盡上升腎宮寒極下既無火上火不歸源故面赤上火
不散口亦渴呼水自救者救咽喉熱非救腸胃熱實熱多成胃火
胃熱必號咷狂呼今雖喘形症尚寧口欲言而不得非虛熱而何
此真上假熱下真寒八味湯妙在補水仍補火下喉火得水而解
入胃水得火而寧調和上下灌溉肺腎實有妙用夫發汗亡陽本
是傷氣何以治腎而能奏功不知亡陽症內無津液致內火沸騰
大補真陰胃得之而息焮胃火息腎之閔門閉矣腎閔閉胃土氣

自生。胃氣生。肺氣不囚而得養乎。肺氣生。清肅之令行。母呼子歸。同氣相招。勢必下引。腎經自歸子舍。腎氣既歸腎中。又有溫和春色以相薰。且得汪洋春水以相育。則火得水生。水得火悅。故奏功近火湯亦神。

熟地

三兩

肉桂

三錢

棗皮

一兩

一冬月傷寒發厥面青手冷兩足又熱人謂直中陰寒宜理中湯不知此乃肝氣抑鬱不散風邪在半表裡若用理中必發狂死夫直中陰寒未有不從足先冷者今足既熱非直中肝經明矣邪既不在肝似不可徑治肝然邪雖不在肝經內未嘗不在肝經外邪

在門外與主何與而現發厥面青手冷不知震隣之恐猶且警惕
豈賊在門外主人有不張皇者乎勢必執鎗刀思禦侮此時而能
登高號召勸諭高呼賊知內有防護外恐有應援自易解散倘用
理中是以火攻殺賊二未擒房舍先焚賊且乘火突入殺主而去
法用小柴胡湯加減以散半表裡之邪肝氣自安外邪化爲烏有
柴胡錢二白芍錢五甘草黃芩半夏錢一當歸錢半一劑手溫再劑厥止身
熱面青自愈

一冬月傷寒身熱汗自出惡寒不惡熱人謂陽明之症欲用石膏

湯不知非陽明也汗出似陽明然陽明未有不惡熱者今不惡熱而惡寒此陽氣甚虛邪欲出不出內熱已解內寒未散必因誤汗所致用補中湯人參黃芪三錢白朮當歸二錢柴胡甘草陳皮一錢升麻四錢桂枝五分一劑汗止身涼寒亦不惡補中湯東垣用治內傷實有神功以治傷寒不見譏長沙張使君乎不知傷寒亦有內傷不可拘于傷寒不思治變症之方况症因誤汗而成汗已出邪存于經絡者必淺即畏寒二邪亦不重是外感而兼內傷此方補正有祛邪故兼用成功况又加桂枝散寒乎倘作陽明症用白虎少投石

羔鮮不寢虛寒而死

溫正湯亦可

人參當歸

五錢

黃芪

一兩

柴胡神曲

一錢

甘草

五分

桂枝

三分

一冬月傷寒身熱五六日不解譫語声低口渴小便自利欲卧人謂陽明餘熱未解余謂不然夫譫語雖屬胃熱然声必高拂意必怒今譫語声低非胃熱既非胃熱何口渴欲飲水自救耶然口渴飲水不能化痰上湧直奔膀胱小便自利其非胃熱又明矣陽明火盛多發狂今欲卧豈是胃熱但非胃熱何譫語口渴不解至五六日耶不知此乃心虛症心虛神不守舍而譫語火起心包而

口渴心與小腸相表裡水入心二卽移水于小便而自利用清熱

散茯苓

錢五麥冬

兩一丹皮

錢二柴胡

錢一甘草

分五

一劑譫止二劑渴除熱

解用麥冬補心伏苓分消火熱柴胡丹皮甘草和解邪氣心氣足

邪不能侵盡從少陽以泄中心寧靜津液自生故渴除腎氣上交

于心精神自長不思卧倘疑胃熱而用白虎解不取芎

涼解湯亦可伏神

錢三

玄參

兩一

柴胡

錢一

甘草

分二

砂仁

錢二

麥冬

五

一冬月傷寒五六日往來寒熱胸脇痞滿或嘔吐或渴或不渴或

煩或不煩人謂少陽症宜小柴胡和之小柴胡少陽藥小陽居表

邪之問邪入而併于陰則寒邪出而併于陽則熱故痰結于胸而
痞滿欲吐不吐欲渴不渴煩悶生用之自易奏功然不可常用何
也蓋少陽胆木最喜水其次喜風柴胡風藥得之解溫然日以風
投之枝葉條達終必乾燥一旦大雨則鬱二蔥二其扶疎清翠爲
何如耶故用柴胡湯後必須補水用濟生湯熟地玄參五錢麥冬白
芍三錢 棗皮一錢 山藥伏苓二錢 柴胡五分 神曲三分 竹茹一團 一劑煩滿除再
劑寒熱止三劑愈方多直補腎水直補其胆水之源則胆汁不枯
足以禦侮况加柴芍仍散半表裡之邪安得不收功速乎倘疑傷

寒後不宜純用補腎藥恐胃氣有傷難以消化不知少陽之症由
大陽二明傳來火燥水潤不但邪逼胆汁致熬乾五臟六腑人多火

燥是各經無不喜盼霖雨非惟少陽胆木喜水也補水之藥又何

有停隔故和隔散亦妙柴胡一錢白芍一兩生地五錢玄參三錢麥冬伏苓

二竹茹一錢芥子一錢水煎

一冬月傷寒發熱至六七日晝則了二夜則譫語如見鬼狀按腹
痛欲死人謂熱入血室然不止此雖因經水適來感寒而血結故
成瘧狀然未傷寒前有食未化血包其食而爲瘧毋論理小柴胡

爲正治然此湯止能解熱使熱散于血室中不能化食使食消于
血塊內一方最神治熱入血室正相宜用兩消丹柴胡炒枝仁二錢
丹皮白芍五錢鱉甲當歸三錢查肉甘草一錢只壳五分桃仁十一粒一劑痛輕
二劑鬼去譫語止腹安杳無寒熱此方既和表裡血室之熱自解
妙在用別甲直攻血塊內以清宿食所謂直搗中堅瘿母何由而
作崇乎服吾藥實可依無鬼論

清白散亦妙丹皮當歸伏苓三錢柴胡前胡青皮炒枝仁二錢白芍一兩

白朮五錢人參半夏甘草一錢

一冬月傷寒項背強几几汗出惡風服桂枝加葛根湯不愈人謂
太陽陽明合病舍前方無藥治不知太陽邪既入陽明自宜專治
陽明不必又顧太陽况葛根湯仍用桂枝以祛太陽邪是太陽邪
輕陽明邪重方用竹葉石羔湯以瀉陽明火前症自愈但不必重
用石羔石羔麥冬三錢知母八分半夏甘草二錢竹葉五十一片一劑汗止再
劑項背強几几去風亦不畏倘仍用前方病雖愈消燥津瀝必
多余更示方法使治傷寒者宜思變計不可死千古人文內

清胃湯亦佳玄參生地

五錢

知母仁

半夏

甘草

五錢

一冬月傷寒頭痛凡二下利頭痛大陽症凡二陽明症二經合病無疑似宜兩解然不可兩治以其下利耳陽明胃土今挾胃中水穀下奔其勢欲驅邪而尽入于陰經若不專治陽明急止其利則陽變爲陰熱變爲寒害不可言方用解和湯葛根二錢伏苓五錢桂枝三錢一劑利止二劑頭痛凡二愈蓋葛根乃太陽二明聖藥况加桂枝足散太陽之邪伏苓不獨分消水勢得桂枝且能直趨膀胱夫膀胱太陽本宮得伏苓淡泄葛根亦隨之同行祛逐其邪尽從小便出小便利大便自止此不止利正所以止利不泄陽明正所以泄

陽明兩解之巧無過于此

葛根桂枝加人參大妙葛根

錢三

桂枝

分五

人參

錢一

一冬月傷寒六七日後頭疼目痛寒熱不已此三陽合病法不可

合三陽統治然治何經三陽之邪尽散邪之來者大陽邪之去者

少陽欲去者使歸來者使去必須調胃氣胃氣一生陽明之邪自

孤勢必太陽少陽之邪尽趨陽明以相授可因其象而使散如賊

散四方擒勦甚難誘其蟻會一城合圍守困一牽受縛用破合湯

白芍石羔粉葛伏苓

錢三

柴胡陳皮甘草

錢一

方治陽明十七治大陽

十一治少陽十三雖三經同治實專治陽明故一劑目愈再劑頭痛除三劑寒熱解皆胃氣得生故奏功速倘不治陽明惟治少陽損傷胃氣少陽且引二經之邪入滯陰經反成變症

和陽湯亦妙石羔五錢葛根白芍二錢麻黃三分柴胡甘草一錢花粉五分

一冬月傷寒五六日吐泄後又大汗氣喘不得臥發厥此因誤汗人謂壞症不可治大汗後宜身熱盡解今熱不退現此惡症誠壞症也欲于不可治中施治庶幾于不宜汗中救其失汗傷寒正吐泄後上下之邪必散熱未解者邪在中焦也理宜當時用柴胡湯

和鮮自然熱退身涼無如悞汗何悞汗熱仍不退身仍不涼邪仍
在中焦此時用前方則虛虛不死何待必大補中氣使汗出亡陽
仍歸腠理少加柴胡以和鮮則轉敗爲功寔有妙用救汗回陽湯
人參三錢當歸二兩柴胡一錢白芍一兩陳皮五分甘草一錢麥冬五錢一劑汗散

再劑喘定三劑厥不作去柴胡將此方減十之六漸二調理此救

壞症一法也人見人參多用未必不驚不知陽已盡亡非多用參
何以能回熱參回陽不能回陰故又佐當歸助參奏功至于多用
白芍麥冬恐參歸勇猛使調和臟腑二經不相戰尅陽回陰中陰

攝陽內听柴解紛有水乳之合也何必以多用參歸爲虞哉救敗

散亦妙當歸麥冬人參一白芍五柴胡甘草五比味五神曲三

一冬月傷寒汗吐後加大下身熱如火發厥氣息奄二欲死人謂

壞症然亦有可救者以悞下也夫悞下必損胃氣未必不增風寒

之勢必須救脾胃又不助邪乃爲得方用援下同生丹人參伏苓

五白朮一柴胡五甘草赤石脂一水煎調服一劑泄止厥定再劑

身熱解思飲食此時止可少與米湯漸加米粒若驟用飲食必變

結習斷難救同是壞症何前多用參此條少用蓋大汗亡陽勢甚

急大下亡陰勢少緩亡陽者陽盡散亡陰者陰雄尽亡陽遍身之陽皆泄非多用參不能挽回于傾刻亡陰脾胃之陰尽而後及于腎故少用參卽救死于須臾方妙參朮以固脾胃伏苓分消水濕柴胡甘草以調和于邪正之內赤石脂收澁其散亡之陰此又救壞症法也

定亂湯亦神人參山藥一伏苓苡仁五甘草黃連五陳皮神曲三

砂仁一

粒

一冬傷寒汗下後又加大吐吐後遂嘔逆飽悶胸中痞病時二發

厥昏暈欲死譫語見鬼且知人出入此亦壞症也然因悞吐以成
于悞吐後思安吐之方舍轉氣救吐湯不可方用人參一旋覆花
石脂末錢一伏神錢五一劑氣逆轉另用招魂湯麥冬人參伏苓山藥
欠實錢陳皮神曲三柴胡錢一白芍錢五一劑身涼神魄寧前症尽愈
汗下後身熱未解者邪在半表裡宜和解乃不用而妄吐邪隨氣
湧氣升不降者汗下後元氣大虛又加大吐五臟反覆自然氣逆
不能順氣既逆嘔吐何能遽止胸中無物而作虛滿虛痞神不守
舍隨吐越出故陰陽人鬼尽見似宜追魄招魂爲急何必先轉氣

蓋氣不轉則神魄終不能回所以必先轉氣二順而神歸也况轉氣仍佐定神之品安得不奏功如响至後反用招魂者非神魄用此招蓋氣虛極用藥順之苟非平和之劑調之未必不仍變爲逆招魂湯健脾理胃土氣既生安魄定魂神自長處于心宮然則招魂湯卽養神湯也此又救壞症一法也

救逆湯亦可人參兩白芍伏苓各一兩故並附子一兩麥冬五錢牛膝一兩一冬傷寒身重目不見人自利不止此亦壞症此乃悞研一悞再悞較前三條更重本不治內有生機者以胃未經吐胃氣宜未傷

扶胃氣以回陽助胃氣以生陰未必非可救方用漸生湯人參三

白芍黃芪

白五
朮錢

伏苓山藥欠實

一兩

甘草

一錢

砂仁

三粒

一劑目見二劑

利止三劑身涼体輕方妙在緩調胃氣胃氣生臟腑俱有生氣陰陽衰者生其陰陽夫衰與絕不同壞症乃陰陽絕非衰也衰易生絕難救不知一線未絕仍是生氣非壞極此正在欲絕未絕故用參苓芪朮得以回春倘陰陽已絕安能續乎此又救壞症一法

一冬月傷寒悞吐悞汗悞下身熱未退死症俱現人謂必死法在

不救吾再傳一方名追魂丹人參山藥生朮仁

一兩

伏神

五錢

附子

一分

甘草一劑或大便或汗吐三症止一便有生機蓋陰陽未絕得一相接自能相生如星二之火引之可以焚山悞吐悞下悞汗陰陽未絕因其悞而亡耳陰陽之根自在故得一相引生意勃然服之大便止腎陰未絕吐止胃陽未絕汗止臟腑之陰與陽未絕何不可生倘三不一應是陰陽已絕無方可救或問方中純回陰回陽絕不顧邪者豈無邪可散乎使無邪宜熱盡退何又熱如故嗟乎經汗吐下後邪在身熱未退者因陰陽之虛耳使早用補劑何至如此故止大補其陰陽陰陽回已無餘事若顧邪用解紛之

藥又安能回陰陽

一冬月八九日腹痛下利便膿血喉痛心內時煩本少陰症治法
不可純治少陰然舍少陰必生他症將治便膿用桃花湯則心煩
不宜治喉痛用吉更湯則腹痛不宜我謂二方未嘗不可選用酌
定一方名草花湯甘草赤石脂紅糯米撮一劑腹痛除二劑喉痛
止三劑利愈煩安蓋少陰症脾氣拂亂也故走下便膿血奔上傷
咽喉今用甘草和緩之則少陰之火不上後以赤石脂固滑又糯
米之甘以益中氣則中氣不下墜滑脫自止又何必用寒涼瀉火

而化膿血膿血既化中焦又有何邪作祟使心中煩悶乎

一冬傷寒一二日卽自汗咽痛吐利交作人謂太陰病不知此乃少陰腎寒非太陰脾虛也蓋傷寒初起宜無汗今反汗出者無陽固外故邪不出而汗先出此症實似太陰以太陰亦有汗自出之條但太陰出汗因無陽自泄少陰出汗因陽虛自越夫少陰邪既不出腎經不能從皮毛分散勢必隨任督上奔咽喉咽喉之竅甚小邪如奔馬不能盡泄又下大腸下焦虛寒復不能傳送以達肛門又逆冲胃脘作吐用溫腎湯人參三熟地白朮一肉桂一一劑

汗止吐瀉愈咽痛亦除此下部虛寒溫其經可也用參朮回陽肉桂助命門火則虛火自歸經安於腎臟然肉桂辛熱雷火速甚有助熱之虞得熟地相制則水火既濟

一冬月傷寒五六日腹痛利不止厥逆無脈乾嘔人謂直中陰寒不知直中乃冬月一時得之身不熱腹痛嘔吐發厥者爲真今身熱五六日後見前症乃少陰傳經非直中也雖傳經陰症可通以治直中辨症終不可不清此症自然用白通加豬胆汁湯本陰寒何以加人尿胆汁不知白通湯純大熱以治陰寒反相格而豈藉

人尿胆汁爲鄉導乎正陰盛格陽用以從治之爲得也蓋違其性則背順其性則安此症在二脉伏不見服此脉暴出者大非佳兆緩出轉有生机何也以病是真熱藥是假寒取其相畏相制有調劑不取其相爭相逐竟致敗亡

一冬月傷寒四五日後腹痛小便利手足沉重而疼或嘔嘔人謂少陰症宜真武湯是矣然所以用此湯之故世尚未知四五日後腹中作痛此陰陽入腹犯腎也小便利膀胱腎氣尚通可消寒邪從小便出倘小便不利則膀胱內寒無腎火之象矣火微不能運動

四肢手足所以沉重作疼火既不能下通膀胱引寒邪下出勢必上逆爲嘔爲嘔真武湯補土藥土健水不泛濫仲景製此方火中補土二熱水亦溫消陰攝陽神功不可思議

一冬月傷寒四五日後手足逆冷惡寒身倦脈不至燥擾不寧人謂少陰陽絕不知陰亦將絕蓋惡寒身倦脈更不至陽已去矣陽去不加燥擾陰猶未絕尚可回陽以攝之今燥擾不寧基趾已爛何以回陽然人陰陽未易遽絕一線未泯可援可救陰陽有根非後天有形之物實先天無形之氣補先天而後天自續用參附湯

人參配附子紅雖此方難必效然寧尽心不濟不可置方听死况
參能回陽於何有之鄉附子奪神功于將離之際魂魄重歸陰陽
再長原有竒功烏可先存必死之心

一冬月傷寒六七日經傳少陰而息高人謂太陰症未除作喘不
知太陰之喘與少陰之息高狀似實殊太陰喘氣息粗盛邪盛也
少陰息高氣息緩漫細小真氣虛不足以息若高非高也故太陰
喘宜散邪少陰息高宜補正何也少陰腎火衰腎氣不能藏于氣
海上奔欲散症至危宜朝宗湯人參麥冬熟地配一東皮山藥一故一

和胡桃一枚。一劑息平，再劑息定。此補氣填精，不消息自平者，氣得補有所歸也。如敗子田，齒消盡，逃外豈不欲歸計無復之耳。倘驟獲多金，自然營糴鄉里，寧其乞食，戚黨或曰：下寒火必上越，此息高獨非腎氣虛寒乎？何不用肉桂引火歸源，嗟乎！腎氣奔騰實本，因腎火上冲所致，然不用桂附，亦有說。腎火必得腎水以養，不先補水，遽助火，二無水濟，龍雷反上升，轉不収息，所以先補水不急補火。况故並亦補火，更能引氣入氣海，又何必用桂附之跳梁哉。

一冬月傷寒太陽麻黃湯症，元氣素薄，尺脈遲緩，不敢用前方。

辨作身門
卷一

謂宜建中湯如國弱兵微宜戰不宜守健中能守不能戰且賊盛

圍城二中又有奸細安能尽祛而出症本太陽傷寒榮舍麻黃終非

治法加人參一則麻黃湯散邪人參助正攻補兼施正不傷卻盡

去或謂麻黃症不得已而用參可少用否不知元氣大虛非參不亦

勝任故必用一兩庶元氣無太弱之慮且能生陽于無有之鄉可

以禦敵逐寇倘不多加人參則邪留胸中元氣未復安能背城一

戰乎或曰元氣大虛直用參何以又用麻黃似麻黃斷不可少何

不以麻黃為君嗟乎麻黃為君人參為佐使必僨事今人參一兩

麻黃只一錢是以人參爲君麻黃轉作佐使正二奇二並而用之
此兵道可通医道

一冬月傷寒汗吐下後虛寒脉微八九日心下痞硬氣上冲咽喉
眩冒經脉動揚必成痙症人謂太陽壞症然不止太陽之壞傷寒
經汗吐下後虛煩虛之至也况脉微非虛而何宜現各症痙症責
在陽明豈未成痙前又置陽明不問乎治陽明火宜用人參石羔
湯然汗下後石羔峻利恐胃確受方用青蒿防痙湯人參兩青蒿
伍半夏乾葛一陳皮伍連服二劑胃氣無傷胃火自敗諸症漸愈

痿症自可免蓋此症不獨胃火腎肝之火亦起青蒿去胃火且散
肝腎火一舉三得然非芎藭青蒿力微不能分治臟腑尤妙在佐
之半夏陳皮否則痰未能全消氣不能遽下痞硬脇痛烏能尽除
然恐青蒿力微故佐乾葛以共瀉陽明火則青蒿更能奏功况乾
葛散邪不甚散氣得人參以輔青蒿尤有同心之妙

一冬月傷寒譫語潮熱以承氣下不應脈又微澁是裡虛仲景謂
難治不可更用承氣豈承氣固不可用乎既用承氣不大便是邪
盛燥乾津液故脈澁而弱非裡虛表盛明驗乎倘攻邪二未去正

益虛故難治此時不妨明言壞症有一法或可望生恐難必效病家請治則用人參大黃湯救之人參及大黃各一劑得大便氣不脫卽生否則死矣苟大便氣不脫再用人參甘草三陳皮三芍藥三煎服二劑可全生

一冬月傷寒發熱而厥二後復熱厥少熱多病當愈厥後熱不除必便膿血厥多熱少寒多熱少病皆進也厥少熱多邪漸輕熱漸退傷寒厥深熱亦深何厥少熱反深此邪不能與正爭正反凌邪作崇譬賊入人家與主鬪賊弱逃遁主人愈加精神以壯威正氣

旺邪勢自衰故病當愈至于厥後熱不除如賊首被獲餘黨未擒
賊知勢敗勢必帶傷而戰賊既受傷主亦必損故熱勢雖消轉不
盡散更堅無生之氣雖不敢突入經絡必至走竄腸門血汚狼藉
成膿血法不必用大寒藥止用和解賊自化爲良民何有餘邪成
群以作崇用散群湯甘草仁黃芩紅當歸白芍一兩只壳一劑
未成膿血必無既成膿自止妙在歸芍活血加甘草黃芩和血涼
血所以邪熱盡除非單用枳壳之攻散耳至于厥多熱少無非正
氣之虛正虛則邪盛邪盛凌正二敵與戰安得不病進治法宜大

補正氣少加祛邪自然熱變多寒變少用祛厥湯人參當歸紐自
尤兩甘草紅柴胡分一附子分一劑轉熱二劑厥定寒除熱深厥亦
深似消熱卽消厥何以反助熱不知此二症非熱盛而厥乃熱衰
而厥熱衰正衰非邪衰吾以參助正氣非助邪熱也正旺則敢與
邪爭作熱一戰而勝故寒熱盡除方加附子尤妙參朮未免過于
慈祥非附子將軍則仁而不勇難成逃掃之功加一分以助柴胡
則無經不達寒邪同風尽散所謂大勇濟至仁

一冬月傷寒四五日下利手足逆冷無脈人謂厥陰寒症急灸之

手足不溫脈不還久作微喘人謂死症吾謂可救蓋因無脈耳人必死後無脈今未死乃脈伏不現非真無脈無脈固不可救脈伏有可救用灸亦救其無脈今灸之脈不還久作微喘者正生機也蓋脈欲應灸無如內寒極止藉艾火何能驟達是微喘脈欲出明矣急用參附湯助陽氣脈自出但宜多人參二兩附子三錢一劑手足溫再劑脈漸出三劑利正附子斬關奪門人參回陽續陰然非多用則寒邪勢盛不能隔陣突圍遇此症必信深見到用勇任大始濟倘徒施灸法或參附不多用皆無識也死臺號寃慎之

一冬月傷寒身熱一日卽譫語人謂邪傳陽明誰知素有陽明胃火風入大陽胃火卽沸騰矣兼治陽明瀉胃熱亦無差然太陽邪熾不專治大陽則衛邪不能救營邪不能解先治陽明必引邪入門反助騰燒不若單治太陽使邪不深入陽明火不治自散用爭先湯桂枝三麻黃甘草花粉一青蒿三一劑熱退譫止此桂枝少麻黃多以寒輕熱重也青蒿爲君者能退熱又散寒且入膀胱又走胃旣解膀胱邪又解胃火不特不引邪以入陽明且散邪出陽明加花粉以譫語必帶痰氣花粉消兩中痰復無增熱之慮入諸

藥中通上達下消痰消邪又何譖語

一冬月傷寒身熱二日卽如瘧人謂證傳少陽誰知少陽原有寒邪一遇傷寒因之並見小柴胡亦奏功但法非宜必重治陽明兼治少陽爲是蓋陽明火邪未散雖見少陽症邪仍留陽明寒熱譖狂必因而起惟重治陽明則胃火自散使邪不走少陽少陽原存之寒邪孤立何能復煽陽明之煽陽明火息少陽之邪自解用破邪湯石膏芍藥伏苓紅柴胡半夏甘草陳皮芩麥冬兩一劑熱解瘧狀愈方妙在石膏芍藥治陽明火尤妙在用麥冬滋肺燥恐肺燥不

能制肝胆且肺燥必取給于胃則胃枯火愈熾今多用麥冬使肺
潤不藉胃土肺氣得養自能制木少陽之邪何能附和胃火作祟
况柴胡足抒少陽氣苓草二陳調和陽明少陽邪無黨援安得不
破

一冬月傷寒身熱三日腹滿自利人謂陽傳于陰孰知腹滿自利
少陽大陰皆有不辨陰陽辨不悞事夫太陰自利寒極而痛少陽
自利熱極而痛手按愈痛者少陽按不痛者太陰此仍須和解少
陽邪不可誤認太陰用加減柴胡湯柴胡陳皮甘草紅白芍紐伏

神枝子紅當歸紅只壳大黃狂一劑腹滿除二劑利止此和解寓
微攻分消兼輕補所以火邪易散正又不傷若大承氣過於推蕩
大柴胡重于分消故定此方以治少陽腹滿自利

一冬月傷寒身熱四日畏寒不已人謂大陰轉少陰誰知仍是太
陰症太陰脾少陰腎似不同然脾乃濕土二中帶濕則土原有水

象故脾寒即水寒所以不必邪傳于腎早有畏寒法不必治腎專
治脾寒症自消用理中湯加減治白朮耐人參伏苓狂肉桂附子

子一劑寒熱解方用桂附似仍治少陰腎然參朮爲君仍治脾况

脾腎原可同治參朮治脾亦治腎况得桂附無經不達安在獨留
于脾

一冬月傷寒身熱五日卽發厥人謂邪入厥陰誰知腎水乾燥不
能潤肝厥本厥陰症邪未入厥陰何發厥蓋肝血燥極必取給于
腎二水枯又受風邪肝無所養故發厥母病子亦病法但治腎厥
症自定母安子亦安用子母兩快湯熟地麥冬玄參牡蠣當歸伏苓
山藥紅朮皮欠寔紅一劑厥定再劑身熱愈方純補腎惟當歸滋
肝血治腎肝在其中所以不用芍藥者過于酸收不若單用補水

二足制火爲更勝耳故子母兩快湯不用白芍單用當歸也且當歸善助地氐生水生水滋肺卽補腎制肝

一冬月傷寒身熱五六日汗不解仍有太陽症人謂邪反太陽誰知邪欲反不能反乎邪不能反太陽當無太陽症宜不治太陽然不治太陽轉多變蓋邪旣不能反窺門而入勢也太陽曾已傳過用藥引歸邪走原路反易散少用桂枝湯散之一劑邪尽除倘多用則焦頭爛額曷勝祛除此用藥机權不可不知

一冬月傷寒至七日熱猶未解譫語不休人謂復傳陽明誰知邪

欲走陽明陽明不受乎陽明已經前邪見邪則拒似乎難入然切
膚之痛前已備經見邪再入太陽震鄰之恐號呼譫語非若前邪
實作譫語者比治法不必專治陽明以截陽明之路散太陽之邪
斷不復入陽明用桂枝湯一劑譫語自止何必用石膏湯重傷胃
氣

一冬月傷寒至八日潮熱未解人謂邪再傳少陽誰知邪在陽明
欲出未出乎陽明多氣多血氣血既多藏痰亦不少痰在胃鬲自
發潮熱不必假借少陽况邪又將出少陽前受陽明貽害未免寒

心故現潮熱其實未入少陽法不須治少陽邪宜解陽明熱陽明
熱解少陽邪自散用解胃湯青蒿麥冬紐伏苓仁甘草紐玄參仁
竹葉紐十一劑胃熱解再劑潮退不必三劑此方息陽明煩又解
少陽氣倘徒治少陽二明愈熾倘息陽明少陽又燥有偏勝必有
獨乾自然輕變爲重邪傳無已今單治陽明已有少陽治法故収
全功

一冬月傷寒九日利不已人謂邪入太陰陽變陰症誰知是陽辭
陰症乎變陰辭陰何辨變陰陽傳于陰辭陰陽傳出於陰也九陰

自利豈出陰亦自利不知陰陽不接多瀉利不已但入陰自利腹
必痛出陰自利腹不痛至九日利不已腹不痛者離陰自利也切
戒太陰止利藥用之邪傳入陰危矣法仍治少陽解表裡則利止
寒熱之邪亦散用小柴胡湯加減治之柴胡甘草分伏苓紅陳皮
紅一劑利止寒熱解此專治乎表裡邪又分消水濕既不入陰又
善治陽故取效獨捷

一冬月傷寒十日惡寒嘔吐人謂邪再傳少陰誰能知邪不欲入
少陰乎不入少陰何惡寒嘔吐不知傳經再入太陰中州之氣已

經刺削脾氣已虛必耗腎中火氣腎又曾經邪犯自顧不遑故邪入脾二甘自受惡寒嘔吐不待傳少陰始見法單治太陰脾土嘔吐可止然不治腎二火不生脾土惡寒終不愈寒不除嘔吐亦暫止用脾腎兩溫湯人參巴戟欠實山藥紅白朮紐肉桂紅丁香肉寇一枚一劑寒止二劑嘔吐除方用人參朮補脾巴戟欠寔山藥補腎肉桂丁香闢寒氣旺腎火以生脾土則土氣自溫

一冬月傷寒十一日熱反更盛發厥不寧一日三四見人謂邪再傳厥陰誰知邪不能傳肝乎少陰寒水未入厥陰何以發厥見熱

症然欬似熱非熱也丙寒甚逼陽外見發厥故不待傳入厥陰先
發厥此本死証仲景無方非無方也以灸法神奇示人以艾灸少
陰者正不必治厥陰也雖灸之可湯藥又安不可用回生至神湯
人參配肉桂紅白朮配姜汁合葱附用姜葱汁同水煎服一劑厥
止二劑身熱解方用參朮雖多苟非姜葱不能宣發邪伏腎中不
得出惟參朮得姜葱導之出外不必走肝厥自安此治之巧也
一冬月傷寒身熱十二日熱不退不見發厥人謂傷寒至厥陰不
發厥熱自退誰知虛極欲厥不得乎熱深厥亦深者元氣足以致

之此熱深不發厥元氣不足以克也傳經至十二日已入肝厥不
應者非熱之不深乃元氣甚困焉可因不厥卽疑陰之不熱治法
補其肝氣輔以解熱則厥陰不燥木氣又舒邪不能留非惟熱解
而見厥抑亦邪散而消厥用解厥散白芍當歸紐丹皮黑荆芥紅
生地花粉紅甘草人參炒支子各一劑厥止再劑厥定此補肝涼
血以治傳經傷寒世無其胆然肝燥內熱因虛厥伏非滋肝血則
熱深者何能外見故必補虛而發厥隨可棄厥而散熱人可聞吾
言而放胆

一冬月傷寒十二日後忽厥去如死狀但心中大熱四肢如冰至三四日体不腐人謂尸厥誰知火邪犯包絡堅閉其氣以護心乎傷寒未有傳心者傳心卽死然邪傳心因包絡虛不能障心也若包絡無損邪雖直搗心宮膻中膜膈自足相拒然邪遍傳六經各二損傷包絡相臣出死禦賊號召勤王絕不一應惟堅閉宮門與昔同殉各臟腑見君相號令不宜自然解體所以肢体先冷如死苟有將斬闕奪門掃華妖救君相外藩響應自必歸誠治法惟助包絡加祛邪可回死爲生用救心神卅人參白芍兩黃連半夏行

葛蒲紅伏苓紐附子分一水煎以竹筒通喉中令人含藥送下無不

受一劑氣甦再劑心熱自解肢溫厥症多熱肢冷如水正心熱如

火也熱極反為寒顛二極人死心實未死方以人參固生氣黃連

清心中包絡火附子為先鋒葛蒲為向導引參連突入心中又得

芍苓半夏平肝不助火利濕共消痰則聲援勢盛攻邪尤易或疑

黃連消熱何用人參即用參何必許多孰知六經遍傳以攻心臟

腑自虛用連不用參則有勇無謀必斬殺過甚反傷元氣王弱臣

強雖救君不能衛君不幾虛用奇兵哉

必治中寒

一嚴寒忽感陰冷直入腑肢體皆冷目青口嘔清水腹中雷鳴胸脇滿
逆體寒發顛腹中有冷氣一服直冲而上猝不知人此寒氣直中
七腑也中寒與傷寒大異蓋傷寒由表入裡中寒由腑入臟雖入
腑入臟同是直中治法終不同蓋入腑寒輕治入腑之寒烏可重
以治臟哉惟腑有七中腑葉似宜別然陰寒中人必乘三焦之寒
而先入溫三焦七腑之寒盡散然三焦所以寒又由胃氣虛使溫
三焦不急補胃氣則氣虛不能接續烏能回陽于頃刻用救腑回

陽湯人參弼附子肉桂和巴戟兩方用參扶胃桂附回陽更借巴
戟補心腎火心腎火旺三焦火更旺且生胃氣回陽故用爲君尤
統三位健將掃蕩祛除所以一劑奏功陽回陰邪立散

一嚴冬忽感陰寒唇青身冷手足筋脈拘急吐瀉心腹痛囊縮指
甲青腰艱俯仰此陰寒中臟中臟重於中腑寒入五臟似宜分治
然不必分直溫命門火諸臟寒盡散蓋命門爲十二經主二不亡
心君無下殿肝木無遊魄肺金不爲魄散脾土不崩解惟命門旣
強中寒逼越出腎外五臟不能獨安各隨陽而俱遁故中臟不

必治五臟溫命門寒邪可解雖然五臟苟虛大兵到處掃蕩辟妖
苟無糧草何以供命此命門宜溫五臟之氣亦當補用蕩陰救命
湯人參兩白朮熟地附子伏神各肉桂各棗皮各水煎服一劑陽
回再劑全愈何神速蓋寒入五臟由命門陽外出一回其陽寒氣
不留於臟方用人參朮爲君似救心脾附桂各皮腎亦救之肺肝獨
闕何以斬關直入回陽傾刺不知五臟爲寒邪所犯大約此腎之
後卽犯脾犯心至犯肺肝無多故專固心腎脾肺肝已寓况參附
並用無經不達有肝肺不入乎况補肝補肺皆收斂藥祛邪使出

烏可留邪使人倘用收斂補肝肺又掣參附之手不迭掃蕩此用藥不雜有秘義也或曰收斂既不可以補肝肺豈熟地棗皮又可補腎嗟乎此又不通之論也腎中水火原不相雜附桂大熱回陽未免腎中乾燥與其回陽後補腎水以濟陽何如用火之時防微之爲得所以少用熟地棗皮于附桂中以制火橫且火得水歸源水招火入宅

一冬月直中陰寒吐瀉身發熱人謂傷寒傳經症不知寒直中少陰非傳經也直中陰寒原無身熱茲何以熱此正陽與陰戰邪旺

正不安于弱以至爭鬪而成熱若傳經少陰症必數日後始吐瀉
未有初感一日卽身熱上吐下瀉者故乃直中非傳經也直中邪
卽入裡傳經由表入裡用人參附子伏苓湯人參配伏苓紐附子
各一劑吐瀉止身熱退何其速也此症原因陽氣弱陰氣盛故發
熱助陽氣陽旺陰自衰又佐附子勇猛突圍破敵轉易成功且伏
苓分消水氣胃土得安上下之間無非陽氣升降陰邪何能冲決
一直中陰寒腎獨受身顫手顫人謂寒入骨中誰知命門火冷不
能外拒陰寒蓋命門十二關主人有此火則生無之則死火旺運

用一身手足自溫。火衰不能通達上下。一身皆冷。何能溫手足。故命門火旺可拒寒邪。惟火衰極。陰寒內逼。直入腎宮。命門火畏寒邪盛。幾乎不敢同居。身顫難以自主。手顫難以外衛。法宜溫補命門。火主不弱而後陽氣旺。通達上下。陰消寒散。不致沖犯心宮。用直中陰臟第一方治之。附子丁香肉桂白朮紅一劑寒祛身手定。方盡陽藥以治陰症。固宜然。急症何以少用。分兩成功。至神。蓋因火欲外越。一助火即回宮。火既歸。又有餘火相助。則命門火旺。毋論祛寒。二已望火遁矣。

一少陰腎感中邪氣小腸作痛兩足厥逆人謂寒邪直入腎孰知
入腎兼入小腸腑乎腎臟也臟重于腑何必辨其邪入小腸然辨
症不清藥定寡效雖腎開竅于一陰又曰腎主大小便腎寒小腸
亦寒治腎小腸亦愈終不知小腸與腎同感寒也蓋寒客小腸則
腹痛脈不通脈既不通安得兩足不厥逆法不必治小腸仍治腎
治腎者溫腎也溫腎卽所以溫小腸用止逆湯附子和白朮和
子死吳干分五一劑痛除厥止方用附子祛寒吳干通氣加白朮專
前利腰臍消濕雖治小腸實溫腎宮命門熱小腸之氣化自行又

焉有不通故不治痛二除不轉逆二定

一猝中陰寒身不能動人謂寒中脾誰知寒中腎乎中寒手足不能動已是危症况身不能動乎蓋手足冷不動猶四隅病身僵不動中州之患脾主四肢身不獨属于人非火不生者非心火乃腎火腎火旺脾土自運于無窮腎火衰脾難轉于不息故腎寒脾亦寒脾寒身自不能動法不可徒治脾必須溫腎火用直中陰臟第一方治之附子乾姜肉桂和熟地仁一劑身動寒消方用桂附子姜直搗中堅迅掃寒邪命門火勃發寒邪自去然過用純陽未免

夫燥佐熟地使陽得陰而生水不至陽缺陰而耗水

人有猝犯陰寒而脇極痛至不可受如欲破裂人謂寒犯肝誰知
寒犯腎脇乃肝位犯腎宜病在腎何在肝因腎寒又畏外寒之侵
腎血逃肝子家受剝深重不敢復出肝因腎水道入見母受傷能
無復仇乎自然奮不顧身怒極欲戰而脇欲破正肝鬱難宣也法
以火熨外寒少濟其急用宜寬湯人參一兩熟地二兩附子一柴胡五
甘草三肉桂一劑痛定人見用參附回陽未必疑用熟地滋陰
必疑嗟乎腎遁入肝寒邪必乘勢逼肝二氣一怯非上走于心必

下走于腎走于心引邪上犯心君有下堂之禍走于腎引邪下侵
相位有同殉之虞故用人參補心使心不畏邪熟地補腎使腎不
畏邪肝瞻顧于子母而無足慮自然併力禦寒又益助火舒木之
品肝中之鬱火解故背城一戰而奏捷倘此藥不效是心腎兩絕
肝獨存何能生

山陰陳士鐸遠公父原本

文守江南紀氏

敬述

男先五建中

中風

一入室向火邊熱邊寒遂致在頰出汗偶出戶爲賊風所襲覺右頰拘急口喎于右人謂中風孰知向火二遍熱併一邊也惟和氣血佐解火則火平喎邪正用和血息火湯升麻秦芫甘草一黃芪

麥冬紅防風桂枝三當歸玄參五白芷五花粉二劑愈方補氣
血爲先何輔佐多用陽明藥蓋陽明脉起于鼻交額中循鼻外入
上齒中是兩頰與齒正陽明部位升麻白芷陽明經藥用之引于
齒頰秦艽能開口噤防風能散風邪桂枝實表固榮衛與黃芪玄
參同用善通經絡活臟腑縱有風邪何處存自應如桴鼓

一从利後猝昏仆手撒眼瞪小便自遺汗出不止喉作曳鋸人謂
中風孰知病在下多亡陰二虛陽暴絕木不治然灸氣海陽氣得
續亦有生者但陽回不用補氣陽氣隨回隨絕用獨參湯人參二

附子煎灌而人不死氣海前與丹田相通乃生氣之源故灸之而陽回非助以人參則氣回不能生二不息

一兩手麻面亦麻木人謂中風將現誰知氣虛不能運血頭乃六陽之經面乃陽之外見氣旺則陽旺氣衰則陽衰旺則氣行于面二乃和衰則氣滯于血面乃木面木陽衰可知何能運動十指治宜補氣通陽之閉手面之麻木解方用助氣通陽湯人參當歸茯苓白朮黃芪歲時杜仲防風杜花粉麥冬烏藥紅木香附子二劑手解四劑面解六劑不發此方大補氣二旺血行又何麻木

一身猝倒目緊閉昏暈不識人二謂中風危症誰知乃心氣乏絕
乎身中未有不痰盛痰盛則直走心經心氣乏絕則痰涎壅住膈
中不能開雖膈中爲心君相痰來侵心膈中先受所以障心而使
痰不入然膈中木衛心以障痰何友壅痰以害心不知心氣虛膈
中亦虛膈中既虛僅可障痰以衛心力難祛痰以益心况痰氣過
盛犯心甚急膈中堅閉夫膜爾使痰之不入心氣因之不通不能

通大背故目閉不識人治法急補君相火佐之祛痰心氣一通

自識用四君子加減治之人參兩白朮兩伏苓三附子

紅竹瀝姜汁合菖蒲三一劑日開再劑識人此方用參朮以救生
氣之絕然非附子斷不能破圍直入非竹瀝姜汁則痰涎間隔然
附子孤單又借菖蒲向導直達心宮也

一素性好飲兩臂作痛服祛風治痰藥更麻木痰涎愈盛體軟筋
弛腿膝拘疼口禁語澁頭目暈重口角流涎身如虫行搔起白屑
人謂中風已成抑知脾氣不足平人生賴飲食以養飲食過多反
傷脾氣脾氣傷有何益况酒散人真氣少飲則益多飲則損貪杯
則臟腑無非糟粕之氣欲真氣無傷得乎故體軟筋弛脾虛不能

連也痰涎加盛脾虛不能化也脘脘扣疼脾虛不能行也口噤語
濫脾虛氣難接也頭目昏重脾虛氣難升也流涎脾虛不能攝起
片脾虛不能潤不補脾氣烏能愈用六君子加味治人參伍白朮
一甘草和半夏和陳皮和附子和伏苓和十劑愈六君補脾兼治
痰然非附子不能走經絡通血脈或疑曰朮過多不知白朮健脾
又去濕多用始能利胃脘升陽氣陽不下隔脾得健其運化
一怒後吐痰胸滿作痛服四物二陳加苓連只壳不應更加祛風
反致牛身不遂筋漸羸縮四肢痰軟日脯益甚內熱口乾形体倦

意人謂風中于腑誰知鬱怒未解肝氣未舒所致誤用風藥損氣傷血致似中風法須仍解鬱怒佐補血補氣益陰益精之味用舒怒益陽湯熟地白芍兩當歸續伏苓麥冬丹皮紅甘草陳皮荊柴胡人參白朮紅十劑挛縮愈再十劑肢不軟後用六味湯煎飲二月半身皆遂方即逍遙散加味用參地麥冬實有妙義益逍遙爲解鬱聖藥散而得補二始有功用白芍一兩以平肝二氣平則木不尅土又健脾開胃輔佐相成反敗爲功

一懷抱鬱結筋挛骨痛喉間似有結梗不下服烏藥順氣等方口

眼歪料甚內不伸痰涎愈甚內執瞽執人謂偏枯之漸誰知肝木
不舒乎木既不舒木中之火又安得舒自然木來剋土脾胃兩傷
脾熱胃燥肉白生風正不必外風入始見前症也法自必補脾胃
然徒補脾胃肝來剋土脾胃仍不舒必須據肝以扶脾胃始得方
用舒木生土湯白芍熟地紐代苓白朮玄參山藥遠志鬱金人
參生束仁麥冬當歸紅甘草頰此心脾胃肺肝腎藥也何以謂
舒木生土湯不知治心者不耗肝氣治腎所以生肝治肺使不剋
用治脾胃使不仇肝群藥無非滋肝舒木二舒脾胃有不得其天

者乎此名實有微意

一一時猝倒口吐痰涎發狂號叫坐立不定目不識人身中發斑
數日後變成瘡癩此真中風蓋元氣未虛忽爲風邪所中正盛邪
又不弱而相戰不肯負于是痰涎出狂叫起心中如焚坐立不安
目不識人內熱旣盛由內達外故斑發皮膚火毒淫滑于肌肉因
變瘡癩如人家門戶旣牢至伯亞旅又健突來強盜劈門而入而
相格鬪大声咤叱戰鬪旣酣目裂背決竟不知同舟人非敵國士
矣回而火攻燒殺反成焦頭爛額法不必助正惟事祛邪用掃風

湯荆芥紅防風半夏伏苓紅陳皮蘇葉紅花粉黃芩紅一劑狂
定二劑痰消三劑斑化瘡癩愈此症萬甲生一人不知中風真症
吾獨表之使知真中風如此類中風者亦宜辨

一素多內熱一旦顛仆目不識人左手不仁人謂中風誰知腎水
不足養肝二木太燥木自生風顛仆若作風治立亡卽作氣虛治

陽旺陰愈消必補腎水以生肝木二得其養用六味湯加味治熟
地白芍兩東皮當歸紅山藥細伏苓丹皮澤泄白芥子紅柴胡紅
一劑識人四劑不仁愈十劑全愈六味丸治中風效者以其似中

風也六味滋水歸芍平肝木柴胡白芥子疏通肝氣消而脇之痰
水足木自條達痰去氣自疏通內熱頓除外體自適又何左手不
仁

一身忽目倒不能言語口角流涎右手不仁肌膚頽人謂氣虛中
風氣虛則有之中風則未也此乃心氣虛不能行氣于胃二氣又
虛胃自生熱蒸其精洩結爲痰涎壅塞隧道不能行氣于心卽堵
截其神氣出入之竅故神明瞽亂神明無主則舌縱難言廉泉穴
開則口角流涎一身運動全藉氣以行今氣大虛不能行于四肢

則手自不仁右氣所屬氣不行于肌膚則痛癢不知若作風治未有不死卽于補氣中加在邪藥或可苟延性命亦必成半體風症故半體之風皆錯治中風而成也宜六君加附子治之人參黃芪白朮黃芪兩半夏紅伏苓附子甘草陳皮紅一劑声出二劑痰涎收十劑尽愈參苓芪朮補氣聖藥加附子遍達諸經豈獨心胃相通痰涎不壅塞乎○原本未載附子分兩據愚酌定文守江

一無故身倒肉跳心驚口不能言手足不能動履痰声如鼾惟目能動人謂口痰中風孰知此痰病也怪病多生于痰二病多生于

濕痰濕結而不散有見鬼猝倒者此特其一耳醫謂中風悞矣然
不治痰而治風適招風生變卽不治風而治痰亦不能消痰弭災
必大補氣血用十全大補湯人參當歸伏苓白朮紐黃芪熟地兩
白芍紅甘草紅川芎肉桂絡二一劑能言二劑驚跳止三劑肝聲
息十劑手動足行又愈劑如無病人此症世以風治多僨事惟大
補氣血斷不生變

一一時猝倒痰涎壅塞成出如雨手足懈弛不收口不能言囊縮
小便自遺人謂中風急症誰知陰陽兩脫症至危刻不可緩作風

治下口立亡必三生飲救之人參配生附子一枚生南星狂生半夏
狂一劑囊伸小便止再劑能言始議他藥此病甚暴非斬問奪門
何能直入臟腑追散失之元陽故投于人参數兩始可奪命于傾
刻惟閔門既開再用濟急丹人参當歸熟地麥冬厚白朮配茯苓
炙皮紐半夏狂二劑元氣日旺虛汗不流手足運動無癱瘓之憂
如破城而守內無糧草土有肌色今閔門大開搬運而入倉糧足
兵馬飛騰賊自望風而遁倘用附子南星過于酷烈損傷元氣不
又多乎妙在用歸地炙皮麥冬資陰蓋前此斬殺大甚臟腑枯焦

一日賢財接濟直不啻恩膏之賜自然踴躍奮興手足踴
一口眼喎斜身欲顛仆腹中時鳴如囊裹糞狀人謂中風內有水
濕水濕之氣由于脾氣虛脾氣不能運化夫水二乃停積不化必
湧上湧于頭作暈湧于口眼爲喎斜水在上則頭重足輕故身欲
顛仆似中風實非中風方用分水止鳴湯人參紐白朮伏苓兩車
前于半夏紅肉桂紅四劑腹中鳴止口眼平復此原無風故不必
祛風單健脾氣土能制水又虞徒消膀胱恐水冷不化再補命門
火以生脾土二有先天之氣益足以分後天之瀾大地回陽溪澗

無非春氣則膀胱不塞尤能雪消水解無阻隔或曰口眼喎斜實
係風症安在水氣使然不知水寒成水口眼處于頭面之間一
經寒風而成喎斜似中風然風非在內風既在外不入腠理又何
必祛風

一猝倒後漸致半身不遂人謂中風成偏枯中風萬中間生一二

豈可因一時猝倒即作中風治此原無風邪既氣虛猝倒此時大
補氣血少佐消痰焉有偏枯症惟過于祛風耗氣必右身不遂耗
血必左身不遂猝倒時正氣不能主宰乃不補氣專耗氣欲氣之

通遍于身得乎天下至悞者謂中風可經絡臟腑之分自此言出
世遂信風初中絡不可引入經既中經不可引入腑既中腑不可
引入臟諸般風藥雜然亂投臆腑經絡未嘗有風強川風藥成偏
枯猶其幸也蓋臟腑無風元氣實尚不可用藥侵耗况羸弱搃二
靡定今不死成偏枯亦因補正中用祛風之劑猶存殘喘耳然已
成偏枯可再用風藥乎用全身湯人參白朮配茯苓兩半夏行附
子三神曲行四劑手足能舉八劑動履如故身臂皆輕
一猝倒後遍身不運手足不收入謂中風成癱瘓不知血虛氣不

順手得血能握足得血能走今手足不收正血虛耳氣血不相兼
使血虛氣順氣能生血尚供手足之用今氣不順氣血有反皆之
失欲血蔭手足得乎故不獨手足不收一身且盡不通手足猶在
四隅一身不通腹心之疾症名風痹實無風也用四物湯加治
熱地當歸白芍 伍川芎 人參半夏 仁黃芪 仁二 劑知痛瘳十劑
能步履再十劑全愈若用風藥耗燥其血二 乾氣亦不順氣既不
順血益加虛必爲廢人

一猝倒于地奄忽不知人二 謂中風重症然此氣虛不接續耳既

無口眼喎斜又無手足麻木若作風治必引風入室世謂中風必
須填塞空竅使風不能入今用風藥以治無風症安得不開奏理
奏理既開玄府土泄欲風不入得乎氣虛不能接續致猝倒奄忽
不知人是風懿病內未有風作中風治悞也用二陳湯加人參治
人參 白朮 甘草 陳皮 半夏 茯苓 一劑知人二劑全愈蓋
不治風自能奏功

一一時猝倒狀似中風自汗不止懶言語人謂中風誰知亦是氣
虛猝倒如自汗此虛極乃亡陽非中風也亡陽必用參附始有生

机誤用風藥立亡用參芪歸附湯救之人參當歸兩黃芪兩附子
一劑汗止二劑言出四劑神氣復或曰猝倒後無五絕症止汗
多語言懶似可緩治不知此症非輕緩凡初病易圖功久病難着
力亡陽症元氣初脫此時大補氣血實有無窮挽回苟因循退縮
坐失机宜日久百劑難效

一男子身未倒右手不仁言語蹇澁口流沫人謂半肢風然非外
風本氣自病名中氣二何有中因似中風又非中風故曰中氣乃
氣虛非中風故不中左而中右蓋左屬血右屬氣女子右爲血左

爲氣男子右手不仁非氣虛何惟極補氣隨效用至仁湯人參白

朮黃芪兩伏苓以仁半夏狂肉桂仁甘草各一劑語清二劑沫止

十劑不仁愈此補氣之妙也或疑氣虛補氣何加消痰豈氣旺不

能攝水氣盛不能化水耶至加肉桂助火不更多事不知氣虛未

有不脾胃寒脾胃既寒水穀難化不疲精而變痰故氣虛者痰盛

痰乘氣虛作祟上迷心旁及手足身欲仆手不仁口吐涎沫用參

芪補氣復用苓朮健土治濕痰無可藏之經更加半夏以仁逐已

成之痰猶恐脾胃入寒入肉桂補命明火二自生土二旺氣自醇

蒸氣有根帶臟腑無非生氣經絡皮肉何至不通

一身未顛仆左手半邊不仁言語塞澀口流涎人謂半肢風誰知
血虛血不養筋脈似中風耳中氣病速易效中血病緩難效中氣
陽症中血陰症陽速陰遲耳用生血起廢湯蕤蕤配熟地當歸兩
山藥嗣伏苓白芥子弍一劑語清十劑沫止三十劑不仁愈後再
加人參配黃芪弍減當歸弍再服二十劑不發或疑蕤蕤過中和
不若四物流動白芥子雖消膜膈痰起首口角流涎宜多用後可
少減何始終用五糸不知血病生痰消痰始能補血况中血病虛

極膜膈間皆痰非多用白芥子斷不能消白芥子消痰不耗氣且助補血藥生血故始終必需但力不及半夏貝母故必多用四物補血聖藥白芍非中血所宜川芎過于動故特用歲時生血又起廢同歸地用尤易奏功且歲時暫用難效久服易建功治緩病實宜况用二兩力更厚加以輔佐得宜故始終攸利

一頭面腫痛口渴心煩一旦猝中手足瀉溺言語不清口眼歪斜人謂中風誰知中火二生木中每藉風力中火似卽中風不解風火何由息抑知火所畏者水祛風息火二燭少戢火根未除滋水

救火二光白消况火中內實無風用祛風藥毛竅盡問反通火路
火路通風反得入風火互勢欲不變風症得平法貴補水用滅火
湯玄參配沙參配白芥子紅伏苓熟地兩棗皮麥冬紐北味各十
劑全愈玄參息浮游之火群藥補水添精自然水足火衰倘少加
風藥則拘牽其手足水轉助風反增火勢或曰不用風藥獨不可
用涼藥不知實火可寒涼直攻虛火斷不可用况玄參微寒補中
帶泄何必再用涼藥

一一時猝中手足掙搐口眼喎斜語言如故神思清人謂陽虛中

風陽虛猝倒必神昏今神思清乃陰虛之中耳陰虛非血虛蓋真
陰腎水乾枯不能上滋于心痰來侵心一時猝中及痰散心清如
故作中風固錯作中血亦非惟直補腎真陰精足腎自交心二液
流行各臟腑諸症自痊用填陰湯熟地兩棗皮兩北味牛膝兩紅麥
冬山藥兩白芥子兩故芷兩附子兩水煎服十劑全愈惠藥熟地
填精聖藥麥冬五味益肺仙丹單補腎水恐難速生故又補肺子
母相資更易滋潤又恐陰不下降用故芷牛夕下安腎宮則獨陰
不致上干真陰自然相濟然陰藥太多未免過干膩滯加附子一

分以行真陰氣非假以助火也水得火氣尤易生

一無恙覺手足麻木尚無口眼喎斜等症人謂風中于內三年後必暈仆勸預服搜風順氣藥以防猝中其論是所用方則非手足麻木乃氣虛非氣不順卽氣不順非風作祟人有中風來甚異豈待三年哉然氣虛何以手足麻蓋氣虛卽不能化痰二聚胸中氣不通于手足宜補氣中佐消痰用釋麻湯人參半夏白芥子陳皮紅當歸黃芪白朮紅甘草芍藥柴胡紅附子紅服四劑手足麻木倘仍麻木前方倍加再四劑必愈蓋手足麻木乃四餘輕病不必重

治人疑重病風藥亂投反致悞事苟知虛而非風何難之有

一遍身麻木不顛仆狀似中風然風則有之中則非此症不可不
治風又不可直治風不治風紅不能出直治風損氣血風又欺氣
血虛反客爲主不肯去必補氣血中佐祛風祛痰氣血不傷風又
易散用解縛湯黃芪葶藶兩當歸白芍人參白朮熟地紐花粉秦
芫花附子羌活和四劑麻木愈十劑全愈同一麻木何上條用藥
少此獨多且重蓋手足麻木無風入體週身麻木風乘虛入腑故
上條可輕治此條宜重治

一天稟厚素好飲酒一時怒激致口眼喎斜似中風身未仆且善
飲食脈洪大有力非中風乃火盛傷肝耳此症西北人多南人少
法不徒泄火又須養肝血用鮮苳湯酒蒸大黃白芥子炒枝仁仁
柴胡炒歸芍兩兩大黃泄酒毒枝子泄肝火但二味除祛未免迅厲
用歸芍大補肝氣蓋血足火自息尤妙加柴胡白芥子以舒肝葉
風以消膜膈痰二消肝氣益舒肝舒風自去若誤認中風妄加麻
黃羌活等藥愈祛風愈動火或不滋肝反補氣陽吐氣盛轉來助
火肝中血燥益足增怒勢必火坑自焚成瘁中

一猝中後手足流注疼痛久則麻痺不仁難屈伸人謂中風以致
風濕相搏關節不利不知先有水濕不治元氣衰去祛風利濕
以成中風既因虛成濕致中不治虛尚可治風濕乎然風濕既搏
擊一時但補氣不祛風利濕亦非救濟之道用兩利湯自朮伏苓
伍以仁白芍兩入參當歸半夏甘草防風疔肉桂疔四劑疼痛
止十劑麻痺愈二十劑屈伸利方中補多于攻用防風散風不用苓
瀉利水益因虛成風濕既祛風何可復利水况白朮以仁亦利水
藥于補水中行利水法則水無阻滯水濕去風難獨留故少用防

風孤子之風無水難于作浪

痺症

一兩足牽連作痛大便微溏夜不能寐卧則足縮不伸二則愈痛
人謂傷寒成痺誰知風寒濕同結大腸乎風入大腸日大便邪似
易下卽有濕氣亦可回散何以固結于中痛形兩足乎不知寒邪
入腹留大腸又得風濕相搏不肯遽散因成痺法必去風寒濕使
不留大腸痺病可愈使徒治大腸邪三氣轉難祛散又宜益大腸
氣腸中氣旺轉輸倍速三氣易祛用逐痺用人參兩白朮伏苓牡

升麻神曲疔甘草以仁疔肉桂疔一劑濕去二劑風寒散此方治
濕多治風寒反輕蓋水濕最難分消治其難易者更易况治濕不
傷元氣大腸自傳送風寒隨時同解

一嘔吐不寧胸膈飽悶吞酸作痛因而兩足亦痛人謂胃口寒謂
知風寒濕結胃而痺乎胃喜熱不喜寒胃口一寒邪因相犯風入
胃不散濕停胃不行三者合痺成法祛三邪仍調胃氣胃氣健三
者不攻自解用六君子加減治人參荆芥伏苓疔白朮疔生姜疔
半夏疔陳皮甘草肉桂疔十劑全愈此方開胃又喜分消加生姜

荆芥尤善祛散風寒

一心下畏寒作痛惕二善驚懶飲食以手按如水舌咽二人謂水
停心下誰知風寒濕結于心胞絡乎亦犯心則痛風乘心則痛母
論風寒濕均能成病重則必死今止畏寒作痛正心包絡障心二
包既能障心捍衛之勞心包獨當其銜心包安得不痛法當急祛
風寒濕三者使毋犯心包心君目冥然祛三邪不補心包氣則心
包太弱故必補心包兼治三邪用散痺湯巴戟自朮山藥蓮子獨
兎糸炒苳仁伏苓經柴胡半夏紅蓮志八甘草經十劑今愈此方

單治心以心包爲心相臣治心正治心包

一小便艱澁如淋下身生痛時上升如疝氣人謂疝或謂淋孰知
風寒濕人于小腸成痺小腸主泄水二出小腸何邪不去乃縮任
不流風寒作祟也必散小腸風寒濕不難去然宜兼治膀胱膀胱
利小腸無不利雖膀胱亦有痺症治小腸痺當以治膀胱者治之
用攻痺湯車前子茯苓以仁可肉桂芍木通仁白朮王不留
行分連數劑似淋不淋似疝不疝再數劑痛如失此方利濕不耗
氣祛寒風自散又何用逐風以損臟腑

一身上下盡作痛有時止痰氣不清欲嗽不能咽喉氣悶胸膈飽
脹二便艱澁人謂肺氣不行誰知風寒濕犯三焦乎三焦王氣二
流通于上中下風寒濕感一氣卽不宜况三者搏結毋怪其清濁
兩道閉塞因而作痛法宜急祛三者之邪然三焦不可輕治宜兼
治腎肺脾胃腎氣旺下焦氣通肺氣肅上焦氣降脾胃氣健中焦
氣始化理腎肺脾胃氣益散邪則三焦得令風寒濕不難去用理
本湯人參肉桂菴葦草紅白朮茨實山藥杜麥冬巴戟伏苓紅吉
更貝母牡白芥子紅防已紅四劑上中下氣通病盡解八劑諸症

全愈此方扶肺腎脾胃氣輕于祛風寒濕者正理本也理本標在中况兼蕩邪所以能神

一胸背手足腰脊牽連疼痛不定頭重不舉痰唾稠粘口角流涎
卧則喉中有声人謂痺症宜控涎湯庫雖合風寒濕三邪而成然
氣血不虛邪從何入既因氣血虛烏可徒治邪不補正控涎丹甘
遂大戟無補氣血藥用治痺不能收功坐此弊也法宜補正助祛
邪則百戰百勝名補正逐邪湯白朮以仁衞人參和桂枝死伏苓
兩白芥子紅十劑愈參朮苓以健脾補氣又利濕雖三者合成痺

濕爲最多濕在經絡腸胃間最難分化逐其濕風寒自化故佐桂枝數分已足旣用薏令參朮健脾利濕何慮痰爲患哉然三者每藉痰爲粵援用白芥子膜膈痰盡消各處之痰有不消乎痰消三氣無藪可藏或曰痺成氣血虛宜並補何方中補氣不益血不知氣旺自生血二有形之物補之恐難速生不若專補氣更捷

一肌肉熱極体上如鼠走唇口反裂久則縮入遍身皮毛盡發紅黑人謂熱痺風寒濕合而成痺未聞三者外更添熱痺此乃熱極生風似痺實非痺解陽明熱少散風則得矣不必更治濕至于寒

邪尤不必顧蓋既熱不寒矣用化炎湯玄參兩甘菊麥冬羚羊角
生地經炒荆芥升麻紅二劑熱少減四劑盡愈用玄參升麻生地
麥冬解陽明火更退肺金炎以肺主皮毛也然僅治肺與胃恐止
散內熱不能散外熱又用升芥導出外不使內留以亂心君外既
清涼內有不快乎羚羊角雖取散火毒亦藉其上引唇口使縮裂
愈或謂陽明火毒盡用石膏知母不知火熱外現于唇口皮毛肌
肉用大寒涼直攻必從下泄不能隨升芥外泄故用玄參甘菊于
補中表火爲得

一脚膝酸痛行步艱難按皮肉直涼至骨人謂冷痺紅曰冷正合
風寒濕三者之旨此雖合三邪寒爲甚蓋挾北方寒水之勢侵入
骨髓乃至陰寒非至陽熱不能勝然至陽熱又恐過虛恐邪未及
祛至陰之水先已熬乾真水涸邪水必泛邪水盛寒風助之何以
愈薄用真火湯白朮紅巴戟兩附子防風紅牛夕伏苓石斛紅葶
藶紅連服十劑症盡愈妙在用巴戟爲君補火仍是補水輔佐又
彼此相宜不用肉桂當歸濕血分實有意蓋補氣則生精最速生
氣既速溫髓亦速若入血分藥則滯遲滯欲速不達草藜原忌

防風使相畏而相使更復相宜所以同羣共濟

一肝氣常逆胸膈引痛睡卧多驚飲食不思吞酸作嘔筋脈攣急
人謂肝痺是矣而所以成者亦血氣不足肝血不足濕乘之肝氣
不足風乘之肝之血氣不足寒乘之三邪侵入肝經肝血氣益虧
耗于是魂不藏于肝乃越出作驚肝病何能生心二無血養安能
生胃三氣不生自難消化飲食強食必至吞酸作嘔飲食養臟腑
也既不消化不能變精以分布于筋脈則筋無所養安得不拘攣
烏可徒治三邪不顧肝經氣血用肝痺散人參芍當歸兩川芎伏

苓紐代赭石末仁肉桂杏仁紅活石水煎調丹砂末五分服十
劑全愈芎歸生血妙矣尤妙在加人參益氣以開血引代赭通肝
氣佐芎歸氣血開通又加肉桂辟寒伏苓利濕羌活祛風邪自難
留魂自不乱况益杏仁丹砂末收驚特速

一下元虛寒復感寒濕腰腎重痛兩足無力人謂腎痺腎雖寒臟
中原有火有火則水不寒風寒濕無從而人人過作強先天之水
已二奔泄火亦隨流而去使生氣之原竟成藏水之屈火不敢敵
寒二邪侵之寒既入以邪招邪風濕又至則痺症生法不必去邪

惟在補正補正補腎火也火非水不長補火必須補水但補水恐
增濕風寒有党未能遷去然腎火乃真火也邪真不兩立故補真
火實制邪火况水中有火何濕不去最難治者水邪水邪既去風
寒不治自散用腎痺湯白朮一兩棗皮伏苓以仁骨皮紐杜仲行肉
桂附子防已紐石斛行二十劑全愈妙在補水少去濕多况併
未補水于水中補火二無太炎于水中祛寒二無太利寒濕既去
風又安能獨留又有防已祛邪故風寒濕盡去
一喇嗽不寧胸膈窒塞吐痰不已上氣滿脹不能下通人謂肺痺

亦知肺痺因于氣虛乎肺相傳之官治節出焉統轄一身之氣無
經不達無臟不轉是肺乃氣主肺病則氣病氣病則肺病然則肺
痺卽氣痺治肺痺烏可舍氣不治但肺雖主氣藥不能直入必補
脾胃以生肺氣然生肺者止脾胃尅肺有心佐肺有肝耗肺有腎
一處生不敵各處尅此氣所以易衰邪所以易入且脾胃又能暗
傷肺金飲食入胃必由脾胃轉入十肺今脾氣既受風寒濕二亦
隨脾胃氣輸肺二乃受傷况多怒肝氣逆于肺多慾腎氣逆于肺
二氣受傷風寒濕填塞肺竅成痺用肺痺湯入參茯苓白朮白

芍藥蘇葉仁半夏陳皮和只壳黃連肉桂仁禪曲五劑諸症盡
愈或謂人參是矣但多用恐助邪何用之咸宜不知肺氣因虛成
痺人參畏實不畏虛况有蘇葉治風半夏消濕肉桂祛寒邪何能
作崇苓朮健脾開胃白芍平肝連桂交心腎肺氣安寧自然下降
正不必陳皮之助

心痛

一久患心痛時重時輕大約飢則重飽則輕人謂寒氣攻心詎知
虫傷胃腕乎蓋心寧靜之宮寒熱皆不能到倘寒犯心立死安能

久痛凡痛久皆邪犯心包胃口但輻痛不常痛斷無飢重飽輕惟
虫飢則覓食頭上行無食克飢止撮口齧胃脘之皮症若心痛不
殺虫痛何能止用化虫定痛湯生地二水煎汁二碗入白薇紅煎
汁一碗淘飯食之非吐物如蝦蟇卽瀉物如守宮大凡胃濕熱人
多生虫飲食倍常皆有虫此方皆效蓋生地殺虫于有形白薇殺
虫于無形合用最神虫死痛除非藥能定

一一時心痛倏久不痛已而又痛日十數遍飲食無碍晝夜不寧
人謂虫二痛非一日而成豈有無端一時心痛乎或謂火二必終

日痛必非時痛時止此乃氣虛微感寒濕邪冲心胞作痛不冲卽
不痛心痛不一此卽古云去來痛也痛無補法獨此必須補然徒
用補不祛寒祛痰亦不能定痛用去來湯人參伏苓紅二朮紐甘
草川烏紅半夏紅一一劑痛止再劑不發方用二朮爲君最有微意
蓋痛雖由氣虛畢竟濕氣侵心包二朮去濕又健脾胃以佐參苓
補氣利濕二去氣更旺川烏直入心包祛逐寒邪半夏行中脘消
敗濁痰甘草調停邪正以奏功干眉捷

一心痛極苦不欲生徹夜呼號涕泗滂沱人謂火邪犯心莫智故

蓋肝氣不舒鬱火犯心二屬火二極反致焚心往二自焚而死故
心火太旺爲心所惡又肝木助則心不能受必號呼求救自然涕
淚交垂且肝木又係鬱火尤非心所喜故入心二不受然火勢大
旺不能遏抑雖心宮謹閉心包掩護未易焚燒然肝火龍雷之火
每從下冲上霹靂震天火光所至焚林燒木天地且爲動蕩能遏
止乎此肝火冲心所以直受其害法必泄肝火解木氣鬱少佐安
心二痛自止用救痛安心湯白芍兩炒枝子蒼朮紅柴胡貫仲紅
甘草乳香沒藥各一劑止二劑愈柴芍解肝鬱枝子貫仲泄肝火

乳香沒藥止痛甘草蒼朮和中消濕故二劑奏功

一真心痛法不救其痛不在胃脘間兩脇處恰在心窩中如虫咬
蛇鑽飲食不入手足冷面目青紅是也真心痛有二一寒邪犯心
一火邪犯心寒犯心如直中陰經病立死二後手足盡紫黑甚則
遍身青非藥能救以至急也倘家存藥餌用人參一附子一二

豕急救之否則必死若火犯心猶緩可覓遠物故不可不傳方但
同是心痛寒熱何辨益寒邪舌必滑熱邪舌必燥辨是火邪用救
直湯投之炒枝子三炙草菖蒲一白芍一麝木香一一劑全愈但

須忍飢一日斷不再發慎之既是心痛宜用黃連治心火何以治
肝不知肝爲心母泄肝木則肝不助火心氣自平正善于治心火
也倘直泄其心二必受傷雖暫效脾胃不能仰給心火則生氣遏
抑必至中脘虛寒又變他症此黃連不用反用枝子

一心痛百藥不效得寒得熱皆痛謂熱不止于熱謂寒不止于寒

蓋非痛心乃胃痛既胃痛何任心痛不止不知寒熱俱能作痛不
可執諸痛皆火之言疑心痛盡是火非寒夫熱能作痛寒何以作
痛耶因寒熱相擊痛生矣寒熱不並立同乘于心胃兩相攻戰勢

均力敵治心胃受傷治胃心受損所以治寒治熱而無效法宜兩
治心痛自愈用双治湯附子黃連甘草和白芍各一劑立愈用黃
連清心火附子除胃寒妙在芍藥甘草爲君使兩家和解入肝平
木肝既平自不尅胃反去生心調和心胃實有至理

一心痛難忍氣息奄奄服姜湯少安按之能忍日輕復重痛甚則
幾不欲生人謂寒邪痛益寒有不同凡心君寧靜由于腎氣通心
心腎不交寒邪中之心遂不安而痛徒去寒不補腎則腎火虛不
能下熱于腎二水虛不能上交心此救心須救腎補腎火以救心

尤須補腎水以救腎用補水救火湯熟地兩一兩皮山藥三巴戟白
朮五肉桂各一匙味分五二劑愈十劑不發此絕非治心痛用治心腎
不交之心痛實竒蓋腎中水火不交邪直犯心補腎使水得火相
生火得水相養陰陽既濟心腎之陰陽安得有乖故不必引其上
下之相交腎自通心二自降腎又原無寒邪所以奏功

脇痛

一兩脇作痛經年累月時少止後又痛二時發寒熱不思飲食人
謂肝病尚未知所以成之故大約多因拂抑欲怒不敢不怒不能

忍耐吞聲未得舒泄肝氣鬱胆亦鬱胆氣既鬱不能取快于心二
中依熱外反交寒二熱交蒸肝血遂淤停住兩脇作痛順境時肝
氣少舒痛少愈若遇不平觸動怒氣前病興痛更重法須解怒氣
解怒要在平肝用遣怒湯白芍配柴胡甘草木香末乳香末和白
芥子生地紅桃仁粒只壳三十劑痛除平肝舍白芍實無第二味
世人不敢多用孰知必多用而後效用至二兩力倍尋常遍舒肝
氣况柴胡疏泄甘草調和桃仁芥子攻瘀乳香廣木止痛
一橫逆驟加大怒叫號罵詈致兩脇大痛聲啞人謂怒氣傷肝然

人必夙有火性肝脉必舌大無倫跟必紅口必大渴呼水舌必乾
燥開裂急平肝泄火方舒暴怒倘不中病或稍遲必觸動其氣嘔
血傾盆用平怒湯白芍配丹皮當歸兩炒枝仁紅炒黑荆芥花粉
香附紅甘草紅三劑痛如失用白芍平肝甘草緩急肝氣平緩加
當歸荆芥之散枝子丹皮涼泄然徒散火二爲痰氣所結未能還
散又加香付通氣花粉消痰怒雖甚有不知而解或疑藥太重涼
藥過多詎知人素有火加大怒五臟無非熱氣非大劑涼藥何以
平怒解火

一跌仆後兩脇脹痛于不可按人謂瘀血用小柴胡加枳實芍藥散

愈次年左脇復痛仍用前藥不效蓋瘀積不散入而成痛小柴胡

半表裡藥能入肝舒木脇正肝倍何以不效蓋能散活血不能散

死血活血易于推動行氣瘀滯可通死血难于推移行氣沉積莫

滌用抵當丸以水蛭虻虫下有形死血一劑必便黑血愈後用四

物湯加減調理熟地白芍丹皮三七根末紅川芎各當歸芍

既下死血不用四物補血所舍空虛又因虛成痛惟補血則死去

新生肝氣快暢何至再痛又加三七根止血者蓋水蛭虻虫過于

下血死血行後新血隨之不其無益所以旋補旋止始奏萬全

一右脇大痛腫如杯覆手按益甚人謂肝火誰知脾火內伏瘀血
成積不散血雖肝主肝尅脾二受肝尅則脾亦隨肝作痛然無形
之痛治肝乃止有形之痛治脾後消今作腫必有形之痛乃瘀血
積脾中鬱而不舒乘肝隙外腫于右脇法須通脾中伏熱下其瘀
血痛可立除用敗瘀止痛湯大黃當歸紅桃仁十四粒白芍兩一柴胡
甘草黃連紅厚外紅水煎服一劑瘀下二劑痛除腫消此妙在大
黃二連柴

掃瘀去陳開鬱逐火

然非多用白芍肝氣難乎

脾中之熱受制于肝甚不易散是病在脾治仍在肝也

一過房勞又惱怒因而氣府脹悶兩脇痛人謂恣慾傷腎惱怒傷肝宜兼治不知肝腎于腎足肝易平腎虧肝血燥肝惡急補血以制急不若調水以安急况肝血易生腎水難生所以肝不足輕補水得養腎水不足非大補水不能長况一房勞後兩脇痛甚虧精更多用填精益血湯熟地兩山藥白芍紐當歸沙參地骨皮白朮紅柴胡紅丹皮伏苓紅十劑全愈方重補腎輕舒肝妙在治肝腎復通腰臍氣腰臍氣利兩脇有不同利乎故精血生痛止

頭痛

一頭痛連腦目赤紅如破裂此真頭痛一時暴發不治蓋邪入腦髓不得出也猶不比邪犯心與犯臟也苟得法亦有生者蓋真頭痛雖必死非卽死症傳一奇方名救腦湯辛夷紅川芎當歸兩細辛紅蔓荊子紅一劑痛止細辛荊子頭痛藥得辛夷導引卽入腦然三味皆耗氣同川芎用頭雖愈過于辛散故加當歸之補血補氣二血週通邪自不能獨留于頭所以合用

一頭痛如破去來不定此飲酒後當風卧風邪乘酒氣出入而中

之酒氣散風邪遂留太陽經本上于頭二爲諸物之首陽邪與陽
戰故往來經絡間作痛二既得之于酒似宜兼治然解酒藥轉耗
氣愈不能效不若直治風邪奏功尤速用救破湯川芎一細辛白
芷一一劑愈蓋川芎最止頭痛非細辛不能直上頭頂非白芷不
能盡解邪氣遍達經絡如藥本等藥未嘗不止痛然大傷元氣終
遜川芎散中有補

一頭痛不甚重遇勞遇熱皆發倘加色慾頭岑二欲卧此少年過
酒色加氣惱頭重藥不效蓋此症得之腎勞無水潤肝二燥木中

龍雷之火冲擊一身上升腦頂故頭痛且暈法宜大補腎水少蓋
補火水足制火二歸腎宮火得水養不再升爲頭痛用八味地黃
湯加減治之熟地川芎一蕪皮山藥一伏苓丹皮澤瀉一肉桂一
十劑全愈後去川芎加歸芍各五分再十劑不發蓋六味補精肉
桂引火川芎治頭痛合用奏功但頭痛在上蒸補腎在下焦何治
不而上愈且川芎陽藥入至陰中偏能取效不知腦髓腎水原相
通補腎二氣田河車直入腦未嘗相格川芎雖陽藥然補血走腦
頂獨不可入腦內乎况肉桂助火二陽也因氣相合故同群共濟

入于腦中又能出于腦外使宿積寒邪盡行祛散寒既散腎火永
藏下焦水火既濟何至再冲後去川芎者頭痛痊恐耗氣耳加歸
考腎肝同治尤善後

一半邊頭風或左或右大約多痛左百藥罔效此鬱氣不宜又加
風邪襲少陽經至半邊頭痛時重時輕大約順適輕遇逆重遇拂
抑事更加風寒則大痛不能出戶外後眼必縮小十年後必壞目
急須解鬱解鬱解肝胆氣也風入少陽胆似宜解胆然胆肝爲表
裡治胆必須治肝况鬱先傷肝後傷胆肝舒胆亦舒用散偏湯白

芍伍川芎兩郁李仁柴胡甘草紅白芥子紅香付紅白芷伍一劑
卽止痛不必多服川芎止頭痛然同白芍用猶于肝氣以平肝血
肝血生胆汁亦生如是胆無乾燥郁李仁白芷自上助川芎散頭
風况柴胡香付開鬱白芥子消痰甘草調和滯氣肝胆盡舒風于
何藏故頭痛頓除後不可多用者頭痛久不獨肝胆虛臟腑陰陽
盡虛若單治肝用舒鬱未免消除其陰風雖出于骨髓外或勞或
感風又入于骨髓中愈後須補氣血善後策也

一遇春頭痛晝夜不休昏悶極惡風寒不喜飲食人謂風寒之故

不知內經云春氣者病在頭氣弱陽氣內虛不能隨春氣上升于頭故頭痛昏悶凡邪在頭發汗解表可愈今氣不能上升是無表邪若發汗虛二清陽之氣益難上升氣不升則陽虛勢難外衛故惡風寒氣弱力難中消故不喜食法宜補陽則清升濁自降內無所怯外亦自固用升清固外湯芩朮紅人參當歸紅白芍芎藭草五陳皮紅柴胡蔓荊子川芎花粉各一劑愈卽補中益氣變方去升麻用柴胡者以柴胡入肝提木氣也木旺于春升木以應春氣則木不陷於肝清氣騰于頭况參芩歸芍補肝氣二旺上榮亦氣

旺自固又何頭痛

一頭痛雖盛暑必以帕蒙頭二痛少止苟去帕少受風寒痛卽不可忍人謂風寒已入于腦誰知氣血兩虛不上榮於頭夫腦受風寒用藥上治甚難祛風散寒藥益傷血氣痛愈甚古有用生萊菔取汁灌鼻者以鼻竅通腦中萊菔善開竅分清濁故可愈頭風然不若佐生姜自然汁蓋萊菔長于祛風短于祛寒二汁同用則姜得萊菔祛風萊菔得姜治寒生萊菔汁廿之生姜汁三之和勻令病人口含凉水仰臥以二汁匙挑灌鼻中至不能忍而止必眼淚

口涎齊出痛立止後用四物湯加羌活甘草數劑調理斷不可發此巧法也

腹痛

一腹痛欲死按之更甚此火痛也但火有胃脾大小腸膀胱腎胃火必汗多渴口中臭脾火走來走去無定處大腸火大便閉結肛門乾燥後重小腸火小便閉澀如淋膀胱火小便閉澀若急腎火陽強不倒口不渴面赤水竅澀痛既辨明後因症治病今一方治火腹痛無不愈各導火湯玄參兩生地狂車前子紅甘草和澤瀉

紅二劑皆愈火有餘水必不足玄參生地滋陰則陽火自降况前
瀉滑利甘草調和尤能導火解紛辨知胃火加石膏脾火加知母
大腸火加地榆小腸火加黃連膀胱火加腎火加黃芩尤效

一腹痛得食則減飢則甚面黃消瘦日加困頓此虫痛也蓋因飢

食難化物不消渴飲寒冷不化久變虫然虫生于腸胃倘陰陽氣

旺雖驟生必隨滅惟陰陽氣衰不能運化虫乃生不死初食物後

漸飲血腹痛作安可單殺虫不補氣血用衛生湯人參紅白朮

白薇兵部于葛甘草紅樞子史君子樹一劑腹轉痛二劑痛除轉

痛拂虫意也切戒飲茶水一飲茶水虫不盡殺禁半日虫盡化水
從二便出妙在參朮爲君升騰陽氣陽升虫不自安必向上覓食
所佐盡殺虫藥虫又安能不死倘飲茶水虫得水翻波鼓浪死中
得活虫活根未除雖暫安久必虫多

一腹痛至急脇覺脹滿口苦作嘔吞酸欲瀉又不可得此氣痛也
寒熱藥俱不效蓋肝木氣鬱下尅脾土二畏木尅陽不敢升因下
行而無可舒瀉復轉行于上作嘔從此牽掣痛無已時必疏肝氣
升脾胃之陽則土不畏木痛自止思道遙散加減最妙柴胡白朮

甘草陳皮神曲紅白芍芩伏苓紅當歸紅二劑痛止逍遙散解鬱
此痛又須緩圖不必用重劑可奏全功所以不更立方

一多食生冷燔炙或難化物積腹內作痛按之疼痛更甚此食積
腸中閉結不出燥屎作痛也法宜逐積化滯非藥下之不可然下
多亡陰又當先防人能食陽旺也能食不化陰衰也陽旺何物不
消安有停在大腸必陰血不能潤大腸陽火焚燥遂致大腸熬乾
食物結爲燥屎不下陰陽不通變成腹痛治宜滋陰佐祛逐則陰
不傷食亦下用逐穢丹歸尾紐大黃丹皮紅甘草只壳紅一劑燥

屎下腹痛頓除不必二劑用大黃只壳逐穢丹皮歸尾補血生陰
攻補兼施何患亡陰

一腹痛從右手指冷起漸上至頭如冷水淋灌由上而下腹大痛
已而遍身大熱二退痛止或食或不食或過于食皆痛初一年一
發外一月一發後至旬日發用四物加解鬱四君加消積二陳加
消痰破氣和中藥俱不應人謂有瘀血誰知陽氣極虛蓋四肢陽
未頭爲諸陽之會陽虛惡寒陰虛惡熱陰勝發寒陽勝發熱今指
冷上至頭明是陽不敵陰失其健運痛乃大作後大熱者寒極變

熱及寒熱兩停陰陽俱衰故熱止痛亦止法單補陽陰自衰受陽
旺則氣旺氣旺血自生氣血兩旺又何爭戰作痛用獨參湯人參
兩加陳皮分甘草分十劑痛止獨參湯補氣仲景曰血虛氣弱以
人參補之故附止痛或曰四君補氣何以不效蓋四君有朮苓分
人參之權不若獨參湯功專力大况加消積藥無積用消雖服人
參止可救失

腰痛

一腰重如帶三千文不能俯仰人謂腰痛腰痛不同此房勞行役

又感風濕而成既房勞行役傷腎必須補腎無疑何愈補愈痛蓋
腰臍之氣不通風濕入腎不得出耳法宜先利腰臍之氣祛風利
濕後大補腎中水火自愈用輕腰湯白朮以仁耐伏苓紐防已紐
水煎服二劑腰輕方妙全在利濕不治腰一方而治然忌多服以
腎有補無瀉防已多用必致過瀉腎邪損傷正氣故腎中有邪瀉
去腎邪而腰輕至邪盡過瀉腎水而腎病另用二聖湯杜仲耐白
朮紐棗皮耐水煎服此方補腎水火仍利腰臍腎中有可通之路
則俯仰皆適矣

一動則腰痛自覺其中空虛無着乃腎虛腰痛也夫腎虛有水火不同經謂諸痛皆屬火獨腎虛腰痛非火腎中有火則腰不痛然治腎虛腰痛宜補腎火耳然火非水不生不補水火無水制痛亦不止必于水中補火水火既濟腎足痛自除熟地兩杜仲白朮狂故脂各水煎連服四劑自愈用熟地補腎水白朮利腰脂熟地不至呆補杜仲故脂補火止腰痛得熟地則不至乾燥調濟相宜故效最捷

一腰痛日重複輕小水艱澁飲食如故人謂腎虛誰知膀胱水閉

膀胱爲腎腑膀胱火盛則水不能化水反轉入腎中膀胱大陽經也水火雖犯于腎之陰病終在陽不在陰故不治膀胱而治腎用補精填水或添薪益火增腎氣之旺然陰旺陽亦旺腎熱膀胱亦熱膀胱之水不流膀胱之火愈熾必更犯腎宮而腰痛莫痊用寬腰湯車前子仁苡仁白朮伏苓鈺肉桂分水煎服一劑膀胱之水大泄二劑腰痛頓寬車前伏苓利膀胱水以仁白朮利腰脇氣則膀胱與腎氣內外相通加肉桂一分引腎氣外熇于膀胱直建于小腸從陰外泄不反入腎宮則腰痛速愈豈偶然哉

一大病後腰痛如折久成偃偻者此濕入腎悞服補腎藥而成者
夫腰痛本腎虛補腎正宜何反受其損乎不知大病後腰痛如折
者乃脾濕非腎虛也脾濕當去濕乃用熟地山藥等味濕而加濕
正其所惡匠工不悟疑藥能輕益加分兩遂致腰臍河車之路竟
成泛濫之鄉偃偻之狀成矣用起偃湯以仁三白朮兩黃芪兩防
風兩附子分水煎日服一劑三劑全愈此方利濕不耗氣水濕自
消加防風附子于芪朮中有鬼神不測之機相畏而相使建功實
奇萬不可疑藥劑之大小減昂味使廢人不得爲全人也

一跌打閃折腰折莫起似偃僂狀人謂不可作腰痛治腰已折其痛自甚何不可作腰痛治或謂中有瘀血宜于補腎補血中加逐瘀和血爲當不知皆非腎有補無瀉加人逐瘀轉傷腎臟折腰內傷腎臟非外傷陰血活血藥不能入腎中必須專補腎惟藥小用不能成功用續腰湯熟地斤一白朮脾數劑如舊熟地接骨不但補腎白朮善通腰膝氣二通接續更易但必多用使入大黃白芍桃仁紅花等三敗事若加杜仲故芷胡桃等藥轉不能收功。氣通瘀自去日久血死恐難治然瘀死在腎中終是廢人

文守正

一露宿感犯寒濕腰痛不能轉側人謂血凝少陽胆誰知邪入骨
髓之內乎夫腰腎堂也至陰之絡霜露寒濕至陰邪也以至陰之
邪入至陰之絡故搖極作痛也至陰之邪易入難散腎又有補無
瀉散邪必致損真用轉腰湯白朮兩杜仲巴戟紅羌活防己五肉
桂紅蒼朮紅桃仁甞水煎服一劑輕再劑止用白朮爲君利濕通
腰筋氣杜仲相佐宮端中有補腎氣無虧且益巴戟肉桂祛寒蒼
朮防己消水羌活桃仁逐瘀行滯雖瀉實補至陰之邪去至陰之
真無傷矣 腰痛終