

明辨證治准繩二之一



漢書門類	一〇〇	二〇〇	三〇〇	四〇〇
函號	〇	〇	〇	〇
架冊	二	二	二	二
冊	〇	〇	〇	〇

內閣文庫	漢
函	〇
架	〇
冊	〇
號	〇

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (75)
函號	301 64



釣藤飲子

治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤

朱錢

蟬殼

防風

去蘆

人參

去蘆

麻黃

去節

白殭蠶

炒黃

天麻

蠍尾

炒去毒

甘草

炙

川芎

各貳錢
伍分

麝香

壹錢
另研

一方有蟻螂參


筒去頭足炙黃

右為末每服一錢水一盞薑三片煎六分溫服量

多少與之寒多者加附子半錢服無時

羌活膏 治脾胃虛或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒

無不効



效為慢驚慢風

方計二

五十一

防風 去蘆

川芎

人參 去蘆

白附子 炮

赤茯苓 去皮各半兩

天麻 壹兩

白僵蠶 湯浸炒黃

乾蠍 炒去毒

白花蛇 酒浸焙各壹分

川附子 炮去皮臍

麻黃 去節各叁錢

肉豆蔻

沉香

母丁香

藿香葉

木香 各貳錢

輕粉

真珠末

牛黃 各壹錢伍分

龍腦 半字

麝香

辰砂

雄黃 各壹錢已上七味各另研 菴活 半兩

右為細末煉蜜作劑旋丸如荳大每服一二丸食前服或薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服

性温故也

海藏返童丹

治小兒諸癩癩潮發瘰癧口眼相引

項背強直牙關緊急目直上視及諸病久虛變生

虛風多睡者因荏苒不解速宜服之

烏犀 剉屑

水銀

天麻 酒洗焙乾

檳榔 各半兩

僵蠶 去絲嘴微炒

硫黃 半兩研末入水銀置

磁石 右蓋內慢炒成沙火要着緊慢

白附子 炮

川烏 炒通赤留煙少許入碗內以蓋子蓋上新土圍之待冷取出

獨活 去蘆

乾蠍 炙

草薺 炒各壹兩

肉桂 去麁皮

當歸 酒浸焙乾炒

細辛 根

文身慢驚風

切十二

五三

防風 去蘆

藿香 洗去土

沉香

白花蛇 酒浸一宿炙熟去皮骨

半夏 薑汁浸三宿炒

天竺黃 研

乾薑 炮

晚蠶沙 微炒

桑螵蛸 炒

虎骨 酒醋塗炙黃

天南星 姜汁煮軟炒黃

烏蛇 酒浸一宿炙熟去皮骨

槐膠

獐羊角 鑄

木香

茯苓 去皮

敗龜板 醋酒炙黃

白芷

砂仁

阿膠 碎

羌活

麻黃 去根節

陳皮 去白炒已上各壹兩

人參 去蘆

蔓荊子 去白皮

藁本 去土

何首烏 米泔浸一宿煮焙

白朮 泔浸一宿切焙

枳殼 炒去白

蟬殼 炒

石斛 去根

雄黃 研水飛

麝香 另研各壹錢

瓦瓶固濟火煨赤候冷取出研用

丁香

川芎

肉苳蔻 去殼微炒

硃砂 研水飛各壹兩

烏雞 壹隻去嘴翅足

厚朴 去皮薑汁塗炙各叁分

附子 水浸泡去皮尖

龍腦 另研

膩粉 另研

狐肝 叁具二味臘月內入

金箔 叁拾片為衣

右藥五十八味炮製如法煉蜜合和搗三五千下
丸如桐子大金箔為衣每一歲兒溫薄荷自然汁
化下無時

右間氏宗錢氏治慢驚法脉無方者宜之其法以

青州白丸子兼與功散羌活膏温白丸釣藤飲子
之類服之至有徃徃死中得生者

湯氏法

凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白丸子木煎
如稀糊入蜜調控下涎後服祛風醒脾等藥
奪命散方見後通治急慢驚下
治虛風八仙散風盛者服之

- 白天麻
- 防風
- 冬瓜子
- 白附子
- 南星
- 全蠍各等分
- 花蛇肉
- 半夏
- 加川烏

右咬咀每服一錢水半盞薑二片棗半枚煎三分
熱服加薄荷尤佳
醒脾散 昏困者服之

- 白朮
- 橘紅
- 半夏
- 南星炮兩枚
- 人參
- 茯苓
- 木香各壹分
- 陳倉米貳百粒夏加蓮肉壹錢亦可
- 白附子炮肆筒
- 甘草
- 全蠍各半兩

右為末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎二分
漸漸服之不可頓服頓服必吐

釀乳方

女烏慢散馬慢脾風

人參

木香

藿香

沉香

橘皮

神麴

麥芽各等分

丁香減半

右咬咀每服四錢水一椀薑十片紫蘇十葉棗三枚煎至半椀乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如嘔定一日急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前件藥俱用不効危困可憂須診太衝脉未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊

不審有雙頂者又有旋毛不正者庸醫之輩習循舊本誤人多矣灸後即當控涎用青州白丸子末再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散昏困服醒脾散常令減乳乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有稟受不堅五行數短者雖神聖工巧不能奪其造化矣若涎已離膈但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法捺之兼搐鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

療痰方

女醫傳

刀針二

五三

川烏尖

白附尖

各柒箇去皮生用

蠍蚘 朱攷

石綠

少許

右為末一處和勻用軟雞翎蘸藥入喉中逐漸抽出頻用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如危極者却灸百會及擦痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東垣益黃散相兼服之可也

陳氏法

治慢驚風先服芎蝎散用手法幹出寒痰冷涎自不

癡呆次服油珠膏後服益真湯温壯元氣時服前杜散寬上實下

芎蝎散 治小兒腦髓受風顛顛開解皮肉筋脉急脹腦骨縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色沫或嘔吐痰涎欲成慢驚搐足脛冷者

川芎

革撥 各壹兩

細辛

半夏

酒浸一宿湯洗焙各貳錢

蠍蚘 去毒壹錢

右細末一週兒抄一銅錢用數沸湯調稍熱饑服如痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若目上直視不轉睛者難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒

喉膈膈中探入就幹去痰涎氣稍得通次用補脾
益真湯或以油珠膏選用此方累世活人多矣

油珠膏 治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂 硫黃中棟
取如蠟者 滑石 各半

黑附子 炮去皮臍 半夏 酒浸一宿湯洗七次焙乾

南星 醋浸一宿湯洗七次焙乾各壹錢

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油一點
如錢抄藥在油珠上須臾墜下却去薑汁與兒服
之更用清薑汁三五口嚥下肚饑服服訖後一時
方與乳食

補脾益真湯 治胎弱吐乳便清而成陰癩氣逆涎

潮眼珠直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤
服涼藥所作

木香 當歸 人參

黃耆 丁香 訶子

陳皮 厚朴 薑製 甘草 炙

肉苳蔻 麩裹煨 草菓 茯苓

白朮 桂枝 半夏 湯泡

附子 炮各半兩 全蠍 炒每服加壹枚

右咬咀每服三錢水一盞半姜五片棗一枚煎六

分稍熟饑服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻瀉者加丁香訶子肉嘔吐加丁香半夏陳皮腹痛者加厚朴良薑咳嗽加前胡五味子去附子官桂草菓肉蔻足冷加附子丁香厚朴惡風自汗加黃耆官桂痰喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草菓氣逆不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

前朴散 治心腹結氣或嘔噦吐瀉腹脹痛驚悸

前胡

白朮

人參

陳皮

良薑

藿香

甘草

厚朴各等分

右剉每服三錢水一盞煎七分稍熟空心服小兒誤服涼藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響小兒面少血色常無喜笑不省上而視下小兒顛顛高急頭縫青筋時便青糞小兒肥壯糞如清涕或如凍汁小兒時時扎眼糞便青白沫有時乾硬已上五證忽然嘔吐者必成陰癘俗謂慢驚是也小兒頭雖熱眼珠青白而

文島

小兒

五

足冷或腹脹而足冷或瀉而足冷或嘔而足冷或渴而足冷頭熱目赤痰塞鼻喉咽皆無根之火逆也已上五證忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益真湯一服三錢重加蠟一枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重加附子前胡各半錢同煎

右陳文忠治慢驚法其治之次第自成一家故另錄之以備採用其醫案所言芍蠟散油珠膏累累取効

曾氏方
冲和飲 治感冒風寒頭疼發熱肩背拘急惡心嘔

吐腹痛膨脹兼寒濕相搏四肢拘急冷氣侵襲腰足痛疼

蒼木 米泔水浸一宿去麤皮剉 人參 去蘆

前胡 去蘆 桔梗 炒各伍錢 枳殼 去穰炒微黃色

麻黃 去節 陳皮 去白各叁錢 川芎

白芷 湯洗七次薑汁浸曬乾炒

當歸 酒洗 薄桂 去蘆 白芍藥

赤茯苓 去皮各壹錢半 乾薑 炙半 厚朴 去蘆皮薑汁浸一宿

甘草 炙半

右剉每服一錢水一盞薑二十片葱十根煎七分無

各貳錢 慢火炒乾

時溫服傷冷惡心嘔吐煨薑同煎開胃進食加棗
子煎空心溫投寒疝痛入鹽炒茱萸藜香同煎
七寶散 治時氣傷風傷寒頭昏體熱咳嗽及脾胃
肺臟不和口中腥氣異常或牙縫微有鮮血兼調
理諸病後小證得中以其品味不僭不燥為佳

紫蘇去老梗

淨香附各參兩

甘草

陳皮去白

桔梗剉炒各兩半

川芎

白芷各壹兩

右咬咀每服一錢水一盞薑二片煎七分無時溫
服痰嗽加梨半夏口腥氣入鹽煎調理諸疾加棗

子煎

六柱散 治吐痢泄瀉胃虛脾慢手足俱冷六脉沉

微

人參去蘆

白茯苓去皮

熟附子

南木香

肉荳蔻

白木六味各半兩

右碎每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎七分不

拘時溫服

日生湯 治吐瀉痢後將傳慢驚慢脾神昏脉弱飲
食不進睡露揚睛晝輕夜重急宜投服

北南星壹兩剉碎瓦器盛東壁土同醋煮少時瀉乾切片焙

醫方

初月

六

人參去蘆

冬瓜子仁剉碎各伍錢

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分候溫無時少與緩服投之急必吐

固真湯 主吐瀉痢後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沉

困不省人事

人參去蘆

附子湯浸泡裂去皮臍 白茯苓去皮

白朮各貳錢伍分

山藥去黑皮 黃耆蜜水塗炙

肉桂去麩皮

甘草濕紙裹煨透各貳錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服或無時

醒脾散 主醒脾養胃止吐痢進飲食及調理病後

神昏目慢貪睡多困脉弱微有痰涎並宜投服

人參去蘆

白茯苓去皮 藿香葉

白朮

甘草炙各伍錢

丁香肆拾粒不見火

大南星搗錢剉作小塊紙裹水透濕炮過用

硝砂仁肆拾粒

右碎每服二錢水一大盞薑三片冬瓜子仁伍拾

粒搗碎慢火煎七分空心緩投服之急必吐

沉香飲 治吐痢後神昏倦怠飲食減少脾胃氣虛

水穀不化或隨時直五心煩熱盜汗常出或聞食

心惡

沉香

丁香

南木香

藿香葉

各貳錢半

陳皮

去白

白木

半夏

湯洗七遍薑汁製

白茯苓

去皮

肉苳蔻

各伍錢

粉草

炙叁錢

右除沉香丁香木香不過火餘七味或曬或焙仍

同三味研為細末每服半錢至壹錢用紫蘇木瓜

煎湯空心調服棗湯亦好

天麻飲 治諸般風搐不省人事

天麻

明亮者

川烏

炮製去皮臍各叁錢

右剉每服二錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無

時勤與溫服

薛氏方

木附湯 治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不

渴大便堅硬小便自利及風證頭目眩重等證

白木

肆兩

甘草

炒貳兩

附子

炮去皮臍壹兩

右為末入附子每服三錢薑五片棗一枚水煎服

愚按附子溫中回陽為慢脾之聖藥也如元氣未

脫用之無有不應須用每隻重壹兩叁肆錢端正

不尖底平週圍如蓮花瓣者佳否則悞用川烏也

製法切去皮尖以童便浸之秋冬七日春夏五日

每日一換浸畢切作四塊以濕草紙包數層微火煨半日取出切開無白星為度如急用炮至裂紋即投童便中良久浸透切片如色白再微炙之氣脫甚者急生用亦効

太乙保生丹 治慢驚尚有陽證者

全蠍青者拾肆箇 白附子生用 真殭蠶

牛膽南星 蟬殼 琥珀

防風 朱砂各壹錢 麝香伍分

右為末米糊丸桐子大金箔為衣每服一二丸薄荷湯化下

聚寶丹 治慢驚

人參 茯苓 琥珀

天麻 真殭蠶 全蠍炙

防風 牛膽南星 白附子生用

烏蛇肉酒浸焙壹錢 朱砂半錢 麝香少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一二丸菖蒲湯下

金箔鎮心丸 治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇

焦頰赤夜卧不安譫語狂妄

朱砂壹兩 白茯苓 人參

甘草各半兩 山藥壹兩 片腦

牙硝 各壹錢半

麝香 伍分

金箔 拾貳貼

草紫河車 貳錢半 黑豆煎者

右為末煉蜜為丸每用五錢作五十九丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得

天南星散 治慢驚驅風豁痰

南星 重捌玖錢者青箇掘地坑深尺許先用炭伍觔燒通紅以好米醋一碗灑坑中即投南星以火炭密蓋又用盆覆時許取出

右為末入琥珀全蠍各壹錢每服二字煎生薑防風湯下

烏沉湯 治慢驚驅風助胃

天麻 貳錢

人參

真川烏 生用

全蠍 焙

南星 焙

木香

沉香 各壹錢

甘草 炒半錢

右為末每服三五分薑水煎服

沉香散 助胃氣止吐瀉

茯苓 貳錢

沉香

丁香

木香

藿香

厚朴 製

甘草 炙各壹錢

右為末每服壹字米飲湯調下

蘇青丸

女馬

切丹

六五

蘇合香丸 壹分 青州白丸子 貳分

右和勻每服五分薑湯調下

銀白散 治胃虛吐瀉

糯米 炒貳兩 伍錢

扁豆 蒸貳兩

藿香 貳錢

白木 炒壹兩

丁香 貳錢

甘草 炙叁錢

右為末紫蘇米飲調下直指方加炮白附子全蠍

木香石蓮薑水煎

釣藤散 治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鈎 貳錢

蟬殼

天麻

防風

蝎尾 去毒

人參 各半兩

麻黃

殭蠶 炒

甘草 炙

川芎 各貳錢 伍分

麝香 伍分

右為末水煎服虛寒加附子壹錢

黑附子湯 治慢脾風四肢厥冷

附子 炒去皮 叁錢

木香

人參 各壹錢半

白附子 壹錢

甘草 炙伍分

右為散每服三錢薑五片水煎若手足既温即止

後服

生附四君子湯 治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與

數服以正胃氣

治為慢為慢脾風

切斗二

六五

人參

白朮

附子

木香

茯苓

橘紅

甘草各等分

右為末每服五七分薑棗水煎服

辰砂膏 治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐者

黑附子

壹枚重壹兩以上者去皮臍頂上空壹孔入辰砂末壹錢仍用附子塞之炭火燒存性

牛膽南星兩半

白附子炮

五靈脂

蝎稍各貳錢半

右為末煉蜜九桐子大每服二三錢生薑汁泡湯

下

七寶辰砂丹

治風痰奇効慢驚慢脾以辰砂為主

木香佐之用開元錢一箇背後上下有兩月片者

放鐵匙上炭火內燒少頃成珠子取入盞中作一

服用木香煎湯送下人參湯亦可

觀音全蠍散 治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉

不止遂成慢驚等證

全蠍貳拾壹箇

天麻炮

防風去蘆

羌活各半錢

川白芷

甘草炙

扁豆薑製

黃耆蜜炙各參錢

砂仁

赤茯苓各伍錢

驚風慢脾風

切

六

右同為末每服壹錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散 治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參 白朮 木香

白茯苓 白附子 天麻

全蠍炒 殭蠶去絲嘴炒

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至

五分不拘時服

雜方

世治慢驚神効用壹粒丁香壹箇蠍壹字辰砂壹點血已上俱為末男用男左手中指血女用女右手

中指血蘸末擦唇上愈

本醒脾丸 治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲

生風癇

厚朴 白朮

天麻 全蠍 防風

官桂 人參各壹錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如雞頭大每十丸搥碎

温米飲下

嗽梢丸 治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜卧或

湖搖上

治慢脾風

治小兒

治小兒

全蠍微炒

白附子煨裂各半兩

硫黃

半夏

薑汁製焙乾各壹兩

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十丸荆芥湯

下量兒大小加減服之

世治小兒慢驚風身冷瘈瘲方

天麻

防風

川烏

全蠍

去翅足薄荷葉包炒南星

右咬咀等分水煎服

湯氏治慢驚方

真川烏

薑救去皮生用

全蠍等分

右二件咬咀分二服水二盞薑十片煎半盞旋旋滴入口中

無陰瀉即慢驚風

黑附子

生用去皮臍

南星

半夏

各貳錢

白附子

壹錢半

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂貳錢麝香壹錢研勻每服壹字薄荷湯調下量兒加減一方用黑附子生去皮臍為末每服貳錢以水壹盞半生薑貳片煎至半盞分二服量兒加減吐者入丁香伍箇同煎空心服或水浸炊餅為丸

如粟米每服貳拾丸生薑湯下亦可

錢回生散 治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成慢驚大南星重搗錢已上者用地坑子壹箇深叁寸許用炭火五斤燒紅入好酒半盞在內然後入南星却用炭火叁兩條蓋在地坑上候南星微裂取出剉碎再炒勻熟不可稍生放冷為末每服半錢濃煎生薑防風湯調下

又方梓朴散

厚朴

半夏

湯洗七次薑汁浸半日曬乾壹錢

右米泔三升同浸一百刻水盡為度如百刻水未

盡少加火熬乾去厚朴只將半夏為末每服五分或一字薄荷湯調下無時

荳卷散 治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之

有驚未退而別生熱證者有因病愈而致熱證者有反為急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大荳黃卷

水浸黑荳生芽是也曬乾

管仲

板藍根

甘草各壹兩

右為末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油數點煎又治吐蟲服不拘時

右諸家雜治慢驚其首一方用人血蘸藥末擦唇者甚効後一方解藥太過之毒尤見錢氏憂入之切也

黃耆益黃散 治胃中風熱

黃耆 貳錢

人參

甘草 半生

陳皮 不去白 各壹錢

白芍藥 柒分

黃連 少許

白茯苓 肆分

右為麤末每服水二盞煎五沸去渣溫服

丹治而有熱者

人參

茯苓

白芍藥 酒炒

白朮

右入生薑煎服暑月加黃連生甘草竹葉煎服

陳明遠治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡

寒而食少方

白朮 貳錢

茯苓 壹錢

右煎湯入竹瀝熱下龍薈丸二十九保和丸二十

丸

生氣散

丁香 參字

白朮

青皮 各貳錢

甘草 炙

木香

人參 各壹錢

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑方調氣散亦可

參苓白朮散見不能食

理中湯見吐瀉

王氏惺惺散

治小兒吐瀉脾弱內虛生驚

人參

茯苓

木香

天麻

扁豆

全蠍全炙

陳米炒各等分

右剉散每服二錢薑棗煎服

醒脾散治吐瀉脾困不食痰作驚風

人參

白茯苓

白附子炮

天麻焙

甘草炙

石菖蒲一寸九節者

木香

石蓮肉

白朮各壹錢

全蝎焙半錢

右為末每三二字薑棗煎服有熱去木香或加南星

半夏陳皮陳米

大醒脾散治吐瀉脾困不能食痰作驚風

南星

白茯苓

淨陳皮各壹分

全蝎焙

甘草炙

白附子炮

蓮肉

人參

木香各半分

陳倉米貳百粒

右為末每服三字姜枣煎駢風醒脾二方通用亦可釀乳小兒胃虛不消乳食尤須節約

演山觀音全蝎散 因吐後傳慢驚候清神固氣補虛益脉開胃止吐

大黃耆 人參 各壹分
 蓮肉 炒
 扁豆 炒
 白茯苓 各壹分
 白芷 各壹分
 全蝎 各壹分
 防風 各壹分
 羌活 各壹分
 天麻 貳錢

為末每錢棗半箇煎無時服慢脾尤宜服

湯氏醒脾散 吐瀉不止痰作驚風脾困不食

白朮 人參 甘草 炙
 淨陳皮 白茯苓 全蝎 各半
 半夏麩 木香 各壹分
 白附 肆箇 炮
 南星 壹箇 炮
 陳倉米 貳百粒
 演山加天麻殭蠶無陳皮半夏陳米
 右為末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎時時服頻則吐

直指星香全蝎散 治慢驚風已傳昏迷痰搐

南星 貳錢 濕紙煨
 木香
 人參
 淨陳皮 各壹錢
 全蝎 貳箇
 甘草 炙半錢

女醫傳

卷十一

十一

剉細每服一錢入紫蘓薑棗濃煎旋以匙送下有
熱加防風

烏蝎四君子湯

四君湯加生川烏焙過全蝎為末各少許每服半
錢薑棗煎服如再服即去川烏

調氣散 治小兒慢驚之後以此調之

木香 香附子 人參

陳皮 藿香 甘草各等分

右剉散每服二錢薑三片棗一枚水一盞溫服

定志丸 見前
急驚

右方皆以參耆白术甘草為主乃治慢驚之正藥也

黑附湯 即前黑附子湯無入參

金液丹

舶上硫黃 拾兩研細用磁合盛冷搗分水赤石脂封縫鹽泥固濟曬乾地上理

小觀子盛承滿安合子在上一又以鹽泥固濟以炭火煨三日三夜候冷取出為末

右以柳木槌乳鉢研極細每服二錢生薑湯下

生附四君子湯

右以四君子湯加生附子四分之一厥逆者對加

每服一錢薑三片煎一匙送下

異功散

人參

甘草

右剉散每服三字薑棗煎一方無木香

天麻飲

大醒脾散 治慢脾風內虛昏悶不省

人參

全蝎焙

陳皮

丁香

茯苓

橘紅

六柱散二方並見前

茯苓

南星炮

石蓮肉

砂仁

白朮

木香各等分

木香炮

白朮

甘草炙

白附子炮各等分

陳米壹撮炒

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服量兒大小加減與服

實脾散 治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參

砂仁

陳皮

良薑炮

丁香

白茯苓

麥芽

石蓮肉

青皮

木香

白朮

神麩

乾山藥

冬瓜仁各伍錢

薏苡仁炒

扁豆 姜炒

杏附子 炒

甘草 炙

陳米 炒各 貳錢

肉豆蔻 煨 貳枚

右為細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

固真湯 方見前

右皆慢脾風之主藥也

通治急慢驚急驚合涼瀉慢驚合溫補此定法也其

間有急驚涼瀉而不愈變為慢驚有慢驚溫補而不

愈變為急驚者宜用通治急慢驚藥

湯奪命散 大能控風涎不問急慢驚風痰潮壅盛

塞於咽喉其響如潮名曰潮涎潮藥不能過咽命

在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪

天地之造化也

青礞石 壹兩入甘窩子同煨兩炭火煨

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自

然汁入蜜調微溫服之良次其藥自裹痰墜下從

大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風

截驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上塞住咽喉藥食

俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以

青州白朮再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即

墜入腹次服花蛇川烏全蝎蜈蚣等藥

大黑龍丸 治小兒急慢驚風神效方見急驚條

琥珀 辰砂 真珠母

青皮 甘草各貳錢半 青黛

蘆薈 柴胡 天竺黃 天麻

乳香各壹兩 雄黃壹錢半 膽星各貳兩

右為朱甘草膏丸如雞頭大慢驚參朮湯下急驚

薄荷薑蜜湯下

曾氏鎮驚丸方見急驚

小兒急慢驚風

全蝎肆拾枚箇

辰砂半兩研極細

右取蚯蚓拾條洗淨入小瓶內以溫火煨蚯蚓化為水和丸如胡椒大每服三丸用順流水化下

小兒急慢驚風

僵蠶叁條 辰砂壹粒 全蝎壹箇

真珠末壹撮

右末取蓬蒿中小蟲兒每壹箇研作壹丸如麻子大每一粒用乳汁下

保命丹本治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎

不正

虎睛

壹對安瓦上以瓦蓋之慢火逼乾

硃砂 半兩

全蝎

麝香 各半

天麻 壹分

蜈蚣

貳條去頭尾赤脚者

右為細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝

甯定急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各三

丸

溫驚丸

一名粉紅丸

南星

為末入臘月牛膽中陰乾百日為末肆兩

硃砂 壹錢半

天竺黃

壹兩

坏子臘脂

半錢

龍腦 伍分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸

沙糖水下

抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅

嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小

兒宜時與服之 丹溪云抱龍丸心肝藥也

南星

如無牛膽者只將生者剉炒熟用肆兩

天竺黃 壹兩

雄黃

水飛

辰砂 另研各半兩

麝香 另研壹錢

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百

日小兒每丸分作三四服五歲兒一二丸大人三

五丸亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二丸新

汲水送下臘月雪水者甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸南星二日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末搗兩以甘草貳兩半拍破用水二碗浸一宿慢火煮至半碗去渣漸漸傾入南星末內慢研令甘草水盡方入餘藥

琥珀抱龍丸會氏

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木水生火所謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰

抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒溫疫邪熱致煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投其藥性溫平不僭不燥常服祛風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

真琥珀

天竺黃

檀香細剉

人參

去蘆

白茯苓

去皮各壹兩半粉草參兩去節

枳殼

水浸去穰微炒

枳實

水浸去穰微炒

硃砂

伍兩先以磁石引去鐵屑次用水乳鉢內細杵取浮者飛過淨器內澄清去上餘水

如此法二般精製見硃砂盡曬乾用

山藥去黑皮壹斤剉作小

塊慢火炒令

南星

壹兩剉碎用臘月雄黃牛膽釀經一夏

金箔

百片去護紙取見成藥一兩同在乳鉢內極細杵仍和勻藥末用

右前拾貳味除硃砂金箔不入碾內餘拾味檀香不過火外玖味或曬或焙同研為末和勻硃砂金箔每壹兩重取新汲井水壹兩重入乳鉢內略杵勻隨手丸如雞頭子大陰乾晴霽略曬日色燥甚則拆裂宜頓放當風處取其自乾治法並用葱湯無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下痘瘡見形有驚溫淨湯下心悸不安燈草湯下暑夫悶迷麥門冬熟水下百日內嬰兒每丸作三次投二歲已上者止壹丸或貳丸其品劑修合之時但缺一

味不依製度必無効矣常用瓦瓶入麝香同收毋使散泄氣味入珍珠末壹兩合和名金珠散蓋珍珠能鎮心寧肝墜痰尤効治法湯使同前

又琥珀抱龍丸

專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作

搐痰喘驚悸生薑薄荷湯下

時行痘疹發熱嘔

吐驚跳白湯下

傷風發熱咳嗽鼻塞驚哭葱湯

下因著驚發熱睡卧不寧燈心湯下

夏月發

熱嘔吐麥門冬湯下

因母發熱過乳溫熱不寧

甘草湯下

脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下

週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無

不効驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同思

琥珀貳錢半包在精猪肉內煨過取出研末貳錢

牛膽南星壹兩陸錢臘月用牛膽作成者妙

雄黃 辰砂 人參 僵蠶貳錢炒

白茯苓各叁錢 天竺黃伍錢 釣藤全用鈎子壹兩伍錢

真正牛黃伍分 真麝香壹錢

右各味不可短少分釐碾為極細末用粉甘草入兩剉碎以水四大碗熬膏一盞入藥末為丸每一丸五分重金箔為衣外用黃蠟包之一料二百丸

又琥珀抱龍丸 治病法如前

琥珀壹兩伍錢研 牛黃壹錢研 人參

檀香 白茯苓各壹兩半 硃砂研

玳瑁各伍錢研 枳殼 枳實

牛膽南星 天竺黃各壹兩 山藥拾兩

甘草叁兩以上各為細末 金箔肆伯片 蜂蜜貳斤

黃蠟二十五斤

此藥一料五百丸每丸五分專治嬰孩小兒諸驚四時感冒瘟疫邪熱煩躁不寧痰嗽氣急瘡疹欲出發搐並皆治之其藥性溫平不寒不燥驅風

化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神蔥
白煎湯或薄荷湯下痰壅咳甚生薑湯下痘
疹見形有驚白湯下心悸不安燈心湯下並不
拘時服初生數月者每丸作四次服或三分之一
或半丸數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用
可也

世奪命散 治急慢驚風諸藥無効此藥隨手奏功

白附子 參錢
黑附子 炮去皮臍半兩
南星 炮壹兩
天麻 參錢
辰砂 另研貳錢半
半夏 各半兩
全蝎 去毒壹枚

蜈蚣 炙壹條

麝香 半錢

僵蠶 炒 慢驚不用

右為末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸
湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

太乙保生丹 見慢驚

湯治慢驚其驗

赤脚蜈蚣 酒炙壹條

白僵蠶 炒 壹條

辰砂 另研壹字

全蝎 用薄荷葉包炙米枚

青州白丸子 參拾丸

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急
驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯調下

羅天麻散 治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半

身不遂言語艱澀不省人事

半夏 朱錢

天麻 貳錢半

甘草 炙

茯苓

白朮 各叁錢

右用水一盞入磁罐內煮藥令水乾將老薑二錢

同煮候乾為細末每服一錢五分薑棗湯調下

雄黃散 主暴中急慢驚風齁胎痰涎滿口及兩侵

閉汗不通或涼或熱坐卧生煩

雄黃 紅亮者 貳錢半

白藥 去黑皮

川烏頭 炮裂去

草烏頭 炮裂去皮

天麻 明亮者

川芎 伍味各半兩

右除雄黃外五味剉焙同雄黃為末驚風痰湧每

服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗薑葱薄荷

水煎併投三服取効

經治驚風墜涎天南星壹箇重壹兩者換酒浸七伏

時取出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗末入

朱砂貳錢半研為細末每服五分荆芥湯空心及

午時各調下一服

田天麻防風丸 治小兒驚風身熱喘急多睡驚悸

搐掣神昏痰涎不利等證

天麻

防風

人參 各壹兩

蝎尾 去毒半兩

甘草

硃砂

救馬治急慢驚

川芎

人參

雄黃

牛黃

麝香 各壹錢

僵蠶 炒半兩

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄荷湯下一十九丸

雲七味羌活膏治急慢驚風壯熱

羌活

獨活

天麻

全蝎 去毒

人參

僵蠶 炒各半兩

烏蛇肉 酒浸壹宿焙乾壹兩

右為末煉蜜和丸如皂子大每兩作五十九丸每服一丸荆芥湯下

難與
速者
釀乳

經治小兒驚風全蝎一錢不去頭尾用薄荷葉裹炙

乾同研為末作四服白湯下

衍治小兒驚風僵蠶蝎稍等分天雄尖附子尖共一

錢炮過為末每調一字薑湯調下

羅小兒驚風釀乳方用白羊頭一箇丁香同熬至熟

乳母空心盡食之

丹孫女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作

一次未半週難與藥且釀乳飲之

白朮

陳皮

半夏

芍藥

青皮 各伍分

人參

痰積
痼者
攻積

川芎
木通各參錢
黃連貳錢
甘草 灸壹錢

右分八服薑五片與乳母煎服

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽
並用涌法重劑以瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末酒
酸蘆汁調服之後用通神散蜜丸服之間以桑牛
陰乾研末調服以平其氣

平福銀丸 治小兒急慢驚風積痼

青黛 叁錢

水銀 一皂角子大同

寒食麵

黃明膠 炒焦為末 輕粉 炒豆

雄黃

粉霜

硃砂 各壹兩

巴豆 貳拾壹粒去油

腦麝 少許

右研細滴水為丸如麻子大捏扁曝乾堯盒盛之
壹歲壹丸隨意加減煎棗子湯送下不得化破
博治急慢驚風乳香甘遂各半兩同研細每服半錢
用乳香湯調下或用童便調下尤妙

劫風膏 治急慢驚搐臍風撮口牙關緊閉痰涎壅

盛咽喉腫痛

歲靈仙 去蘆壹兩半細剉焙研為末

右用皂莢參兩去皮弦槌損挪溫水壹盞絹濾過

慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候
冷用前藥末亭分乳鉢內杵勻丸芡實大先用鹽
梅肉擦牙根次以此膏壹丸或貳丸溫白湯濃調
抹入左右牙關內即開續進別藥熬時得瓦器為
上銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少
與含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯
以上諸方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互
出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於
痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞
石之屬瀉痰青黛之屬瀉火硃砂之屬瀉火皆治

氣實之劑參草之屬補土天麻全蝎之屬補木烏
附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實
通治之法也

霹靂散 解急慢驚風不省人事

豬牙皂角 叁錢 細辛 川芎

白芷 叁味各 貳錢 躑躅花 壹錢半

右剉晒為末每以少許用大燈心叁寸長蘸點鼻
內得噴嚏為驗前藥不可焙焙則不應

目睛瞶動 瞶目者肝之竅也肝膽屬風木二經兼為
相火肝藏血血不定則風火内生故目睛為之瞶動

本為月潤

切中二

下三

經曰曲直動搖風之象也宜用四物益其血柴胡山
梔清其肝陰血內榮則虛風自息矣若因肝經血燥
而自病者用六味丸以滋其源因肺金尅肝木者用
瀉白散以平金邪若眼眶瞤動者肝木乘脾土也用
抱龍丸若愈後驚悸不寐或寐中發搐咬牙目睛瞤
動者血虛不能榮筋脉也用補中益氣湯或歸脾湯
加茯苓五味蓋有餘者邪氣實也不足者真氣虛也
凡病氣有餘當認爲不足此證兼屬肝脾多爲慢驚
之漸

唇口蠕動 唇爲脾之華口乃脾之竅又陽明之脉

環唇口而交人中陽明胃也是以脾胃虛者多有此
證不獨病後而已夫脾主涎脾虛則不能收攝多兼
流涎或誤認爲痰而用祛逐之藥則津液益枯不能
滋養筋脉遂致四肢抽搐病勢愈甚原其治法與慢
脾風相同當用大補脾胃之藥加升麻柴胡切勿用
青皮龍膽草之類兼察其色黃者脾弱也青者肝勝
也青黃不澤木來尅土也青赤相兼水火風熱也黑
爲寒水反來侮土白爲氣虛亡陽凡此宜用六君子
湯加小柴胡湯若四肢微搐或潮熱往來或泄瀉嘔
吐面色痿黃皆脾胃有傷也宜用白朮黃芪川芎當

歸人參陳皮肉豆蔻神麴乾葛白芍藥黃連炙甘草
白茯苓以補胃氣若脾胃虛弱者用五味異功散虛
寒加木香炮薑若脾氣下陷者用補中益氣湯以升
其陽作渴者用七味白朮散以生津液若肝木侮脾
者用補中益氣湯加茯苓半夏芍藥以制肝補脾
目直視 醒小兒忽然驚搐目直者皆肝之風熱也若
肝虛生風則目連劄而不搐及多次咬牙若肝經風
實則目直大叫呵欠項急頓悶若肝經有熱則目直
視不搐得心熱則搐氣熱則外生氣溫則内生其證
手尋衣領及亂捻物宜用瀉青丸壯熱飲水喘悶宜

用瀉白散凡病之新久皆能引肝風風內動則上入
於目故目爲之連劄若熱入於目牽其筋脉兩皆俱
緊不能轉視故目直也亦有飲食停滯中焦致清陽
不升濁陰不降肝木生發之氣不得升致生虛風者
須詳審之若胸滿腹痛嘔吐惡食輕則消導化痰重
則採吐滯積更須審其所傷寒物熱物亦有因感冒
吐瀉致使土敗木侮而生虛風者不可遽服驚藥宜
用六君子加芍藥木香柴胡制肝補脾若因脾土虛
而自病者用五味異功散凡飲食停滯痰涎壅滿而
見驚證者實因脾土虛弱不能生金金虛不能平木

驚

刀斗二

八二

故木邪妄動也宜健脾胃消食其證自愈若輒用驚風之藥反成其風而益其病也况臟腑脆嫩不可投以峻厲之劑治者慎之

睡中驚動 醒小兒睡中驚動由心腎不足所致蓋心主血與神肝藏血與魂肺主氣與魄腎主精與恐小兒臟腑脆弱易為驚恐則氣下驚則心無所依神無所歸且夫人之神氣寤則行於目寐則棲於腎今心腎既虛則不能寧攝精神故睡中驚動也治宜清心安神用茯苓補心湯加酸棗仁茯神五味子亦有驚嚇而作者因擊動其肝故魂不安也治宜鎮驚定

魂用安神鎮驚丸若飲食間因驚而停滯者用六君子加神麩厚朴食既消而驚未定用茯苓補心湯若木火太過而心神不寧者用導赤散風熱相搏者用柴胡梔子散食鬱生痰驚動不安者用四君以健脾神麩半夏以化痰山梔芍藥以清熱

目動咬牙 醒小兒驚後目微動咬牙者皆病後亡津液不能榮其筋脉也亦有肝經虛熱而生風者當審其氣血有餘不足而治之其日中發熱飲冷而動者氣有餘也用瀉青丸夜間盜汗及睡不寧而動者血不足也用地黃丸或因肝經風邪傳於脾腎者亦令

咬牙先用柴胡清肝散次用五味異功散六味地黃丸若因脾胃虛熱用補中益氣湯加芍藥山梔實熱用瀉黃散蓋牙牀屬手足陽明故也若肝腎熱用六味地黃丸

泄瀉 小兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳尅於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚則嘔血及殮泄法當平肝補肺慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚甚至抽搐反張者亦肝火熾盛中

州虧損之變證也凡見驚證即宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡平肝引經以杜漸則必不至瀉搐而自安矣今已見瀉吐驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之其亦去生遠矣

腹痛 蟬蛻釣藤飲

治壯痰驚啼

釣藤鈎

天麻

茯苓

川芎

白芍藥

甘草

蟬蛻 各壹兩

右入燈心水煎服

煩渴閻氏云驚風或泄瀉等證煩渴者皆津液內耗

也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

清心丸 治驚熱煩躁

人參 茯神

防風

朱砂

柴胡 各叁錢

金箔 叁拾片

右為末煉蜜丸如桐子大每服一二丸竹瀝調下

神芩丸 治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳

蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大便

澀滯或積熱腹滿驚風潮搐等證

大黃 生

黃芩 各貳兩

生牽牛末 壹兩

滑石 肆兩

黃連

薄荷葉

川芎 各半兩

右為末水糊丸桐子大每服三四丸溫熱水下

潮熱似瘧曾又有急驚天釣之後變作潮熱手足逆

冷有似瘧疾蓋因病瘡之時不善將護外感風邪乘

虛而入於經絡再未解散以致如此經曰重陽必陰

又曰亢則害承乃制此其義也宜服柴胡加桂湯及

當歸散氣實者則以烏犀丸水晶丹略與通利勻氣

散止補後以參苓白朮散調理自然平瘡此證所用

藥品間使苦寒之味務在消陽盛之火肺金得勝肝

木自平而風邪亦散斯為良法

柴胡加桂湯 見傷寒

烏犀丸

勻氣散 見腹痛

參苓白朮散 見泄瀉

水晶丹 並見癖積

當歸散 見痢

雜證類驚 海藏云心神不安四君子加辰砂半分棗

湯調下 又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐

搦此非驚風當用發散藥 曾暑風一證因夏月感

冒風熱太甚致面垢唇紅脉沉細數忽發驚搐不省

人事治用消暑清心飲辰砂五苓散及琥珀抱龍丸

自安切勿以溫劑調補

消暑清心飲 解伏熱中暑煩躁作渴神氣不清及

有驚搐名暑風證投之即効

香薷 去老梗 澤瀉 去麤皮 扁豆 炒熟去殼研

淨黃連 羌活 猪苓 去皮

厚朴 去粗皮薑汁浸透炒 白朮 乾葛

赤茯苓 去皮 升麻 川芎 各半

甘草 叁錢

右剉每服二錢水一盞煎七分無時帶涼服治暑風證先投此劑得効次服却暑丹其搐不發矣

薛氏於急慢驚癇之外又出驚風一證其候虛惕怔

仲氣怯神散痰涎來去泄瀉色青蓋驚之輕而虛者也若驚入心則面赤夜啼用梔子清肝散加黃連入肝則面青眼竄用柴胡清肝散入脾則面黃嘔吐虛汗嗜卧用六君加柴胡山梔入肺則面白喘急用異功散加柴胡桔梗入腎則面黑齧牙用六味地黃丸若因乳母恚怒肝火或膏梁積熱遺兒為患或兒吐瀉傷脾清氣不升風木陷入太陰傳變等因皆能致此當隨主治否則必成慢脾也須預慎防為善

針灸小兒急驚灸前頂二穴三壯取法在百會前一寸若不愈灸兩眉心及鼻下人中一穴炷如小麥大

小兒慢驚灸尺澤穴各三壯在肘中橫紋約上動脈中炷如小麥大若睡中驚掣灸足太指次指之端去爪甲如韭葉許各一壯若角弓反張身強灸鼻上入髮際三分三壯次灸太樞下節間三壯若睡中驚不合眼目灸屈肘後橫紋中三分各一壯

診錢咬牙甚者發驚目直面青身反折者生驚呵欠面青者驚風呵欠面黃者脾虛驚目赤兼青者發搐

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證生云男

驚季

卷之二

九

為木故左視木位无聲右視金位相擊則有聲女為金故右視金位无聲左視木位亦相擊有聲

李寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大呼哭錢見曰此逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金木相擊而有聲也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋時同肺無旺位當大瀉其肺若病在春時同此肝旺之時尚不能勝肺是肺強而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏時同

日中肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬時同此肺旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛也當補其肺大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反女證故稍易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯主之二日不悶亂知病退也後用地黃丸補腎三服後用瀉青丸各二服以瀉心肝五日而愈又肺虛不瀉者何也曰假令男目右視木克金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當補其肺慎勿瀉也湯凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治

驚季

卷之二

九

脉訣啓蒙曰小兒脉促急爲虛驚 直指云浮數洪
緊爲急驚 沉遲散緩爲慢驚 虎口脉紋青紫爲
驚風 紅者風熱輕 赤者風熱盛 紫者驚熱
青者驚積 青紫相半驚積風熱俱有 主急驚風
青而淡紫伸縮來去主慢驚風 紫絲青絲或黑絲
隱隱相雜似出而不出主慢脾風 形勢灣入裏者
順 出外者逆

不治證 搐而不休 休而再搐 驚叫發搐 汗出足
冷 痰滿胸喉 口開目直 急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹搐動或神

緩而摸體尋衣或證篤而神昏氣促噴藥不下通關
不嚏心中執痛忽大叫者不治 慢驚四肢厥冷吐
瀉咳嗽面黯神慘鴟聲胃痛兩脇動氣口生白瘡髮
直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎頭軟大小二便不禁手
足一邊牽引者皆爲不治 慢脾身冷粘汗直卧如
尸喘嗽頭軟皆直口噤搖頭痰如牽鋸之聲面無潤
澤之色縮唇氣粗者不治

禁忌 治小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖
靜乃危病也急驚方搐時但扶持之不可擒捉蓋風
氣方成豈流筋脉或至手足成拘攣也

卷之二 幼科 九

珠母丸夢寐不寧肝魂失守也用定心丸恐畏不能
獨處膽氣虛冷也用茯神湯睡卧煩躁膽氣實熱也
用酸棗仁丸眩運驚悸風痰內作也用本事辰砂遠
志丸思慮鬱結脾虛氣滯用歸脾湯前證雖曰屬心
與肝而血之所統實主於脾脾之志曰思思慮多則
血耗損而不能滋養於肝心者脾使之也思慮內動
未嘗有不役其心者夫心爲君火之藏十二官之主
也夫君之德不怒而威無爲而治故宜鎮之以靜謐
戒之以妄動動則相火翕合煽爍陰精精血既虧則
火空獨發是以驚悸怔忡之所由生五志之火心所

不能制者矣故治脾者不可不知養心養心者不可
不知鎮靜而寡慾然人孰無思也思之正則無妄動
之慾矣朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每
聽命焉此善養於心者也

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致

心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣
悸乏或復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏 湯洗 竹茹 枳實 麩炒

橘皮 去白各 甘草 炙壹 白茯苓 壹兩

右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食

煎服

寧志丸 治心虛多驚若有痰宜吐之

人參

白茯苓

茯神

栝子仁

琥珀

當歸

酸棗仁

溫酒浸半日去殼

遠志

炒各半兩

乳香

朱砂

石菖蒲

各參錢

右為末蜜丸桐子大每服三十九食後棗湯下

茯神散 治五藏氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神

定志

茯神 去木

人參

龍齒

另研

遠志 去心

桂心

防風

獨活

酸棗仁

細辛

白朮

炒各參錢

乾薑

炮參兩

右為末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

治要茯苓補心湯 治心氣不足喜悲愁怒衄血面

黃五心煩熱或咽喉間痛舌本作強

茯苓

肆錢

桂心

甘草

炒各參分

紫石英

煨

人參

麥門冬

去心各壹錢

大棗

貳枚

右水煎服

卷之

卷之

卷之

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨

處胸中煩悶

茯神去木

酸棗仁炒

黃耆炒

梔子仁炒

白芍藥炒

五味子杵炒

桂心

熟地黃自製

人參各壹兩

甘草伍錢

右每服五錢薑水煎

酸棗仁丸 治膽氣實熱不得睡卧神志不安驚悸

怔忡

茯神去木

酸棗仁炒

遠志去心

栝子仁炒

防風各壹兩

枳殼麩炒

生地黃杵膏各半兩

青竹茹貳錢伍分

右爲末蜜丸梧子大每服七八十丸滾湯下

定志丸 治心神虛怯所患同前或語言鬼恠喜笑

驚悸

人參

茯苓各壹兩伍錢

菖蒲

遠志去心各壹兩

右爲末蜜丸如梧子大每服七八十丸滾湯下

治要茯苓散 治心經實熱口乾煩渴眠卧不得心

神恍惚

扶神

麥門冬 各一兩半

通草

升麻 各一兩 貳錢半

紫苑

桂心 各半錢 伍分

知母 壹兩

大棗 拾貳枚

淡竹茹 伍錢

赤石脂 壹兩半 錢伍分

右每服壹兩水煎

朱雀丸 治心病怔忡不正

白茯苓 貳兩 沉香 半兩

右為末蜜丸小豆大每服三十丸人參煎湯下

世傳蜜陀僧散 治驚氣入心絡不能語者昔有人

為狼及大蛇所驚皆以此而安

蜜陀僧 研極細末如粉

右茶清調一錢匕

丹溪朱砂丸 治勞役心跳

朱砂 當歸身

白芍藥

側柏葉 各叁錢 川芎

陳皮

甘草 黃連 炒各壹錢半

右用豬心血為丸粟米大每服百丸龍眼湯下

本事辰砂遠志丸 消風化痰鎮心安神

人參 石菖蒲 去毛 遠志 去心

茯神 各一兩 川芎 山藥

白附子

麥門冬

細辛

鐵粉

辰砂各一錢

右為末用生薑汁入水糊丸菉豆大以朱砂為衣

每服一二十九臨睡生薑湯下

加味歸脾湯去丹皮山梔即歸脾湯 治脾虛弱損

健忘驚悸等證

人參

黃耆

茯神去木各壹錢

甘草伍分

白朮炒壹錢

木香伍分

遠志去心

酸棗仁炒研

龍眼肉

當歸

牡丹皮

山梔炒各壹錢

右水煎服

愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾虛不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調哺熱內熱或重唇流注等證致兒為患者令子母俱服之

辰砂膽星膏 治小兒痰熱氣熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂壹錢

牛膽南星一兩

琥珀

青礞石末各一錢

天竺黃二錢

甘草伍分

麝香 少許

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生薑湯化下

木通散 治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降

心火利驚熱

羌活

山梔子 各貳錢 大黃 煨

木通

赤茯苓

甘艸 各壹錢

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分不拘時服

