

重訂產孕集

附補遺

全

中國醫學大成第九集

婦科類

訂重

產

孕

集

全

上海大東書局印行

訂產孕集提要

清張曜孫撰。曜孫字仲遠。陽湖人。以名孝廉服官楚北。所至有聲。幼精醫理。奉母
湯。太夫人命。著產孕集。卷分上下。爲類一十三門。上卷列辨孕、養孕、孕宜、孕忌、孕
疾。下卷列辨產、產戒、用藥、應變、調攝、懷嬰、拯危、去疾。條析病狀。援據方書。臚列治
法。約略已備。包興言云。因孕疾子癩一症。應變雙胎一症。病皆危急。載方較少。續
增子癩二方。雙胎一方。皆經驗有效者。因而補之。又云。仲遠生前曾向予言。此集
雖已行世。所惜遺漏尙多。今後有暇。續作補遺。因循未果。每以爲憾。今集重訂刊
成。予據所見所聞。博採約收。更作補遺一卷。以續其後。雖症變百出。方難悉賅。云
是書刻本有七八種之多。以包氏重訂者爲足本。

謹產孕集序

陽湖張氏仲遠。以名孝廉服官楚北。所在有聲。幼精醫理。奉母湯太夫人命。著產孕集。其卷分上下。爲類一十三門。條析病狀。援據方書。臚列治法。約略已備。茲因孕疾子癩一症。應變雙胎一症。病皆危急。載方較少。續增子癩二方。雙胎一方。皆經驗有效者。因而補之。仲遠生前曾向予言。此集雖已行世。所惜遺漏尙多。今後有暇。續作補遺。因循未果。每以爲憾。今集重訂刊成。予據所見所聞。博採約收。更作補遺。以續其後。雖症變百出。方難悉賅。然事皆已經。則無所可疑。法可互求。則不病於執。由是窮鄉僻壤。凡屬孕婦嬰孩之症。悉可參酌前後各方。按症照治。庶各保其生全。而無苦難夭折之患。藉踐前言。或可稍慰良友濟世之志也。夫爰書顛末爲敘。

同治七年歲次戊辰七月涇縣包誠書於湖北省寓

產孕集目錄序

辨孕第一

養孕第二

孕宜第三

孕忌第四

孕疾第五

辨產第六

產戒第七

用藥第八

應變第九

調攝第十

懷嬰第十一

拯危第十二

去疾第十三

凡十三篇。爲上下二卷。敘曰。產孕者。天地之大化。生人之本始。而難產之患。自古有之。左傳。莊公寤生。驚姜氏。寤生。卽逆產也。然古者持胎教。寡嗜欲。生理順。而難產少。故生民之詩曰。誕彌厥月。先生如達。不圻不副。無災無害。列女傳。述文母之胎教。終之曰。洩於豕牢。而得文王。言生之易也。後世不知胎教。務自縱恣。生理旣逆。難產實繁。於是設方法以治之。處湯液以救之。而方藥愈備。難產益衆。遂有婦

媪羣起。妄造謬法。剖胎出嬰。使無知之赤子。無罪之婦人。櫻屠磔之刑。懼鋒刃之慘。生人之禍。莫此爲甚。夫人命至重也。父子至愛也。而戕賊生命。剗剔人子。旁觀不以爲非。主者不以爲怨。何哉。醫無救之之術。不能不望救於婦媪。假令扁倉在左。婦媪在右。則雖至愚。必知所擇。故婦媪之殺人。醫者之過也。雖然。產孕之事。非醫事也。難產之疾。皆自致之。非本然也。故欲湯之滄而揚之。不如勿熯也。欲絃之固而續之。不如勿斷也。欲難產之安而藥之。不如勿致也。不揣其本。而齊其末。不絕於彼。而救於此。良吏勿能爲治。良醫勿能爲功。然則欲治難產。先理胎教。欲理胎教。先明禮則。禮教隳廢。內儀不修。晏私曠於幣帷。勤情愆於厥職。以苟適爲便。以傲恣爲高。蓋自搢紳浸於編戶。女德日敝。難產日多。競哀其末。莫知其本。君子之道。造端乎夫婦。記言其不信矣夫。歲在己丑。家君宰館陶。余隨侍官廨。民有疾苦。踵門求治。輒爲除之。而難產之患。同於江左。有婦逆生。醫者莫救。太孺人聞之。命褻藥遣僕。馳往治之。至則死已竟日。以貧故未收。耄姑幼子。號泣於室。強飲之藥。旋即蘇活。又巨室張氏婦。孕五月。動而漏下。醫不知治。十日而隕。血注不止。因而暈絕。余聞藥之蘇。又治百日乃瘳。其他慘酷。大都相類。由此觀之。無辜而死者。

蓋多已。夫殺卵殀夭。先王所禁。況在人類。體仁利物。儒者之事。況在斯民。用是考核原委。該約大旨。著爲此書。冀以絕其流弊。豫其常變。窮理之士。或無誚焉。

道光庚寅冬十二月陽湖張曜孫

訂重 產孕集目錄

卷上

辨孕第一……………一

養孕第二……………四

孕宜第三……………二

孕忌第四……………四

孕疾第五……………一六

卷下

辨產第六……………一

產戒第七……………三

用藥第八……………五

應變第九……………七

調攝第十……………一三

懷嬰第十一……………一六

拯危第十二……………二二

去疾第十三……………二八

補遺

養孕篇……………一

孕疾篇……………一

辨產篇……………五

產戒篇……………六

應變篇……………六

產 孕 集 目 錄

調攝篇……………七

拯危篇……………七

去疾篇……………八

重訂 產孕集

清 陽湖 張曜孫仲遠纂輯

涇縣 包誠興言增訂

鄆縣 曹赤電炳章校刊

卷上

辨孕第一

二氣相感。合而生神。兩精相搏。聚而成形。陽奇而施。陰偶而承。陽施而靜。陰承而動。靜則陽凝。動則陰攝。動靜互根。形神交倚。而孕以成。易曰。天地絪縕。萬物化生。男女構精。萬物化醇。故乾坤消息。而變萬類。日月運行。而生寒暑。鳥獸草木昆蟲。鱗介之屬。莫不附陰化陽。因氣成質。其生雖不同。而所以生者一也。人爲萬物之靈。得天地之正。具五德之全。經緯蕃變。與上下參。男稟陽得乾道。女稟陰得坤道。乾主動而生靜。坤主靜而生動。乾動則陽施。坤靜則陰承。陽生靜則氣化而神生。

陰生動則精融而形成。神裕其始。而形要其終。故孕者始于神而終于形。生于陽而成于陰也。凡物生易而成難。未孕之先。兩氣相感。如磁引鍼。如芥黏珀。適然而合。其動以天。非陰陽離決。氣僊精涸者。鮮不凝合。自然生化。絕無人功。既孕之後。積氣成形。分別百體。營建藏府。條理絡脈。灌漑筋骨。閱三百餘日。乃成爲人。日滋月遂。盡取給于母氣。苟失其道。或生而不育。形體不具。氣血薄弱。壽命夭折。譬之果實之屬。風雪侵之。非立見萎落。卽不適于口。故未孕之先。無俟人力。既孕之後。半由人功。攝養以安之。藥物以助之。調其陰陽以煦之。絕其賊害以固之。祛其疾痛以衛之。皆人力之所爲也。古者婦人別立治法。以有月事產孕之異。而產孕尤重。蓋產孕者生人之始。而保護又產孕之始也。愚者不察。或誤孕爲疾。而肆其攻擊。或誤疾爲孕。而養虎貽患。小則傷體。大則傷生。深可憫焉。辨孕之法。素問曰。陰搏陽別。謂之有子。又曰。足少陰脈動甚者。妊子也。脈經曰。脈滑疾而重。按之散者。胎已三月。脈重按之不散。但疾不滑者。五月也。又曰。三部浮沉正等。按之無絕者。妊也。千金方論曰。脈平而虛者。乳子法也。手少陰脈動甚者。妊子也。尺中之脈。按之不絕者。法妊娠也。諸家論脈。其說不一。要不外滑利和平。不偏不弊。所謂身有

病而無病脈。身無病而有病脈。爲簡而易明。經閉吐逆。體怠惡食。而脈反平和。是有病而無病脈也。外無吐逆諸病。體旺如昔。而脈反滑利動疾。是無病而有病脈也。脈象微妙。驟不易知。差之毫釐。謬以千里。善診者。心領神會。毋事固執。斯爲善也。懷妊之候。必病惡阻。苦沈重憤悶。不欲飲食。又不知患所在。頭重眩暈。四肢惰懈。不欲執作。喜噉酸鹹果實。多臥少起。氣逆嘔吐。蓋由經血既閉。水漬於藏。藏氣不宣。血脈不行。故有此候。察其候。合其脈。孕之是非。無所遁矣。若兼有表裏諸疾。脈不可辨。則別有驗之之法。以雀腦芎藭一兩。當歸七錢爲末。分二服。煮艾湯。或醇酒下之。二三時間。覺腹中臍間微動。卽爲有孕。或以醋煮艾湯半盞服之。有孕必大痛。無孕則否。妊娠四月。男女可分。脈法。左疾爲男。右疾爲女。左右俱疾。爲產二子。左手沉實爲男。右手浮大爲女。左右俱沉實。生二男。左右俱浮大。生二女。左尺偏大爲男。右尺偏大爲女。左右尺俱大爲產二子。又法。左尺中浮大者男。右尺中沉細者女。若脈不可知。則有辨法。令人按其腹。加覆杯者。男也。如肘項參差起者。女也。左乳房有核者。男也。右乳房有核者。女也。孕婦行坐。自後急呼之。左迴首者。男。右迴首者。女。蓋左右者。陰陽之道路也。陽親其左。陰親其右。自然投託。各就

其所氣血因之。故脈象應之。盛於左則左疾而大。盛於右則右疾而大。其有異孕。無所歸屬。則兩者皆見。尺中者腎部也。腎主胞門。孕之所在。陽具於左。故浮大。陰具於右。故沉細也。男形常伏。女形常仰。故揣腹可知。乳爲陰府。下通胞門。陰盛則結。各就其位。氣血偏盛。則身有偏重。視其迴首可知者。必慎護其重也。千金方又言男子左乳房結核者生男。右乳房結核者生女。婦有孕而驗其夫。原其所始。理亦可通。而所以結核之故。終不可解矣。

養孕第一

妊娠一月。名始胚。足厥陰脈養之。其經內屬於肝。肝主筋及血。是時血行否澀。母爲力事。必令安靜。嗜酸鹹。食宜麥。毋食腥辛。若曾孕一月而墮者。宜預服補胎湯以養之。

補胎湯 乾地黄一兩

白朮一兩

生薑一兩

防風六錢

大麥二合

烏梅三合

細辛三錢

吳茱萸一合

八味以水三升。煮一升。分三服。熱而渴者。去吳茱萸。細辛。加括蕒根三錢。

見千金方。

二月名始膏足少陽脈養之。其經內屬於膽。主精。是時精成於胞裏。若曾孕二月而墮者。宜預服黃連湯以養之。

黃連湯 黃連三錢 人參三錢 吳茱萸五合 生薑一兩

生地黃六錢 共五味。以水三升煮一升。分四服。日一。若覺不安。加

烏梅三合 見千金方。

三月名始胞。未有定儀。見物而化。手心主脈養之。其經內屬於心。當靜謐以定心氣。食穀宜稻。羹宜魚。若曾孕三月而墮者。宜預服扶神湯以養之。

扶神湯 扶神丹參龍骨各三錢 阿膠當歸甘草人參各一兩

大棗二十枚 赤小豆二十枚 九味水三升。煮一升。分四服。七日

後更作腰痛者。加桑寄生六錢 見千金方。

四月始受水精。以成血脈。手少陽脈養之。其經內輪於三焦。是時形體已具。當盛其血氣。以通耳目而行經絡。若曾孕四月而墮者。宜預服菊花湯以養之。

菊花湯 菊花如雞子大一把 麥門冬三合 大棗十二枚

人

參 五錢

當歸甘草 各六錢

阿膠 一兩

生

薑 六錢

入味。以水三升。煮半。內清酒一升。并膠。煎取一升。分二服。若受寒者。加麻黃。

見千金方。

五月始受火精。以成其氣。足太陰脈養之。其經內屬於脾。是時四肢皆成。宜適飢飽。其食宜甘。羹宜牛羊。和以茱萸。養氣以定五藏。若曾孕五月而墮者。宜預服安中湯以養之。

安中湯

黃 芩 三錢

當歸芍藥乾地黃人參 各六錢

甘草芍藥 各一兩

生 薑 二兩

麥門冬 三合

五味子 一合

牡 蠣 大棗 五枚

十二味。以水二升三合。清酒一升五合。煮取

一升。分四服。日三夜一。七日後更作。見千金方。

六月始受金精。以成其筋。足陽明脈養之。其經內屬於胃。主口目。是時口目皆成。身欲微勞。以變腠理。紉筋以養其力。以堅背脊。若曾孕六月而墮者。宜預服麥門冬湯以養之。

麥門冬湯 麥門冬 三合

人參甘草黃芩 各六錢

乾地黃 一兩

阿膠三錢 生薑二兩 大棗十五枚 八味。以水二升

三合。煮減半。內清酒六合。并膠煎一升。分三服。中間進糜粥。見千金方。

七月始受木精。以成其骨。手太陰脈養之。其經內屬於肺。主皮毛。是時皮毛已成。

宜勞身動作。以運血氣。食穀宜粳稻。避寒就燥。以密腠理。以養骨而堅齒。若曾孕

七月而墮者。宜預服葱白湯以養之。

葱白湯 葱白長二寸者十四莖 麥冬三合 旋覆花六勺

黃芩三錢 人參五錢 甘草當歸黃耆各一兩

阿膠三錢 生薑二兩 十味。水二升六合。煮減半。內清酒

一升。及膠煎一升餘。分四服。日一服。溫進。見千金方。

八月始受土精。以成膚革。手陽明脈養之。其經內屬於大腸。主九竅。是時九竅皆

成。無使氣極。以密腠理而澤顏色。若曾孕八月而墮者。宜預服芍藥湯以養之。

芍藥湯 芍藥三錢 生薑二兩 厚朴六錢

甘草當歸白朮人參各一兩 薤白三合 八味。以水一升六

合。酒一升。煮一升。分三服。日一。見千金方。

九月始受石精。六府百節莫不畢具。足少陰脈養之。其經內屬於腎。腎主續縷。是時經脈續縷皆成。穀氣入胃。毋犯冷濕。飲宜醴。食宜黍。緩帶自持。以養毛髮。致才力。若曾孕九月而墮者。宜預服猪腎湯以養之。

猪腎湯 猪 腎 一 具 茯 苓 桑 寄 生 乾 薑 乾 地 黃 芎 藭 各 一 兩

白 朮 三 兩 附 子 三 錢 大 豆 一 合 麥 門 冬 三 合

十味。以水三升。煮腎令熟。去腎。納諸藥。煎取一升。分三服。日一。見千金方。十月。足太陽脈養之。其經內屬於膀胱。五藏完備。六腑齊通。納天地氣於丹田。使關節人神皆備。待時而出。宜服滑藥以速其生。以杜本徐說。若曾孕十月而不產者。宜預服八物湯。

八物湯 人 參 三 錢 白 朮 三 錢 茯 苓 三 錢

甘 草 一 錢 陳 皮 二 錢 芎 藭 五 分 錢 當 歸 三 錢

熟 地 黃 三 錢 白 芍 五 分 錢 共 作 一 服 以 水 一 升 煮 四 合 日 一

服。見萬病回春。

凡孕十月。三陰三陽各養三十日。內輸五精。外受五氣。惟手少陰太陽不養。心為

君主統攝百脈。下主月水。上爲乳汁。手太陽合之。故不專養。天氣盛於東南。地氣盛於西北。故萬物之生。始於東南。而成於西北。養孕之脈。始於足厥陰。東方木。生氣之原也。繼之以手心主。南方火。長氣育之也。繼之以足太陰陽明。中央土。化氣宣之也。繼之以手太陰陽明。西方金。收氣堅之也。繼之以足少陰太陽。北方水。藏氣成之也。天一生水。故始受水精。土載萬物。故終受土精。氣以順養。精以逆受。相生無不及。相尅無太過。猶之四時遞嬗。自春而夏。而長夏。而秋。而冬。而一歲成。五氣互生。自木而火。而土。而金。而水。而一人成。其理一也。孕之生也。陰陽相合。氣含陰陽。則有清濁。清者浮升而善動。濁者沈濁而善靜。動靜相交。陽中之陰。沈而下。降。陰中之陽。浮而上升。陽之升也。自東而南。陰之降也。自西而北。陽升於東。則魂具而化神。陰降於西。則魄藏而凝精。神化則氣生。精凝則質結。故孕一月如露珠。太極也。陰陽之未判者也。二月如花蕊。太極生兩儀也。陽升陰降。陰陽之已分者也。三月至五月。形體具而四肢成。陽自東而南。陰自西而北。五神既宅。四維乃張。兩儀生四象也。六月以後。筋骨皮毛。九竅百節。無不畢具。陰陽交育。精氣旋生。四象生八卦也。八卦生而天道備。十月盡而人道具。所謂萬物一太極。一物一太極。

也。知孕之所以生。則知所以養之之道矣。凡孕三月。體虛者宜常服滋生湯。

滋生湯

熟地黃三錢

白芍甘草芎藭當歸阿膠各一錢

黃芩六分

砂仁一錢

糯米百粒

或參朮養胎飲。

參朮養胎飲

人參一錢

白朮三錢

茯苓二錢

甘草八分

歸身白芍各一錢

阿膠二錢

陳皮八分

體過實者。宜金匱當歸散。

金匱當歸散

當歸川芎藭黃芩白朮白芍各一兩

治為末。每服一錢。百沸

湯調下。見丹溪心法。

挾寒者。宜加味保胎丸。

減味保胎丸

白朮熟地阿膠各二兩

當歸杜仲各一兩

川斷川芎藭各一兩

艾五錢

八味。搗末杵棗為丸。每服五十

丸。

挾熱者。宜黃芩散。

黃芩散。黃芩一錢

搗末。濃煎白朮湯調下。日一。見丹溪心法。

或芩朮湯。

芩朮湯。黃芩三錢

白朮一錢五分

二味作一服。見丹溪心法。

或白朮丸。

即前方十倍為丸。如桐子大。日三十丸。

見丹溪心法。

將產體實而旺者。宜達生散以速之。

達生散

大腹皮二錢

甘草五分

當歸白朮白芍各一錢

人參陳皮紫蘇枳殼砂仁各五分

青蔥五寸

十一味。作一

劑。孕九月後服之。日一服。體旺者。至產而止。見丹溪心法。

凡孕。無論虛實。皆宜服便產方。三四月後。三十日服一劑。八九月。二十日服一劑。

將產之月。日一服之。是方制合精良。無可增減。俗傳謂宮中十二味。係明嘉靖間

太醫所作。如法服之。絕無難產之患。真良方也。

便產方

當歸五分

芍藥三分

厚朴七分

枳殼六分

兔絲子酒洗

艾葉羌活各五分

貝 母一錢

荆 芥八分

黃 耆七分炙

白 芍一分錢二炒

甘 草五分

水煎隨宜服之。

見保產輯要。

孕宜第二

人有清濁厚薄之異。智愚善惡之殊。揆其所始。皆由祖氣。祖氣者。先天之氣也。氣清則善。氣濁則惡。清則聖哲。濁則昏愚。然而凶頑之質。亦生聖人。賢哲之嗣。或多昏昧。何也。是豈祖氣之有所變易乎。蓋生成有消息之理。長養寓補救之方也。凡物陽生而陰成。生人之初。稟氣於父母。兩氣既合。胚胎以凝。自此以往。日滋月遂。至於成人。皆由母氣。蘊爲五神。發爲五氣。育爲五精。結爲五藏。開爲五官。氣以煦之。血以濡之。得其道。則氣厚而神清。失其道。則氣濁而神昏。清則可以反濁。濁則可以害清。自然之理也。譬之稼穡。良莠不同。由於種之美惡。然使土瘠氣薄。暘雨不時。灌溉失度。則雖美種。不如莠稗。土沃氣厚。燥濕均平。種雖不良。亦必大熟。故祖氣者。稼穡之種也。母氣者。土氣也。氣煦血濡者。暘雨也。攝養之道。灌溉之力也。稼穡不能專恃天時。因有灌溉之法。生人不能專恃父氣。必有補救之方。調之使

均攝之使平。反味爲哲。易濁爲清。精微之道也。子居母腹。以母氣爲氣。以母血爲血。母呼亦呼。母吸亦吸。善心生則氣血清和。而子性醇。惡心生則氣血渾濁。而子性劣。而母氣之清濁善惡。又隨時而遷。觸物而變。非有一成不易之常。氣主於心。心之神。主內而應外。外有所接。則神動而氣隨之。所接善。則陽氣動而爲清。所接惡。則陰氣動而爲濁。故妊子之時。必慎所感。人生而肖萬物者。皆母之感而肖化也。古者婦人妊子。寢不側。坐不邊。立不蹕。不食邪味。割不正不食。席不正不坐。目不視邪色。耳不聽淫聲。則生子端正。才德過人。昔太任有身。能以胎教。乃生文王之聖。君子美之。列以上本女傳。故舊說謂受孕三月。逐物變化。使妊母常觀犀象珠玉寶玩之物。禮樂鐘磬俎豆之事。誦詩書箴誡琴瑟詠歌。欲得賢人長者。論述古今忠孝之事。盛德大業之人。則生子多男。氣正而質純。賢良而壽考。亦不過欲和其心志。絕其嗜欲。使心靜於內。慮謚於中。清氣充滿。濁氣自消。卽胎教之道也。夫草木之生。其形色臭味。皆秉天理自然之化。而何以遷地則形色皆殊。而技者又有栽種灌溉之法。可以轉白爲赤。易苦爲甘。草木尙然。況人之至靈者乎。至男女之分。定於祖氣。非人力所能轉移。舊有轉女爲男之法。如繫弓弩弦。一枚千金方取弓弩弦絳囊盛帶左

日。或繫腰下百。佩雄黃。兩絳囊。或帶黃一。置斧牀下。牀下刃向上。勿令入。妊母。或驗。或否。會其適然。然亦可以祛邪辟惡。以衛陽氣。無損於事。若欲服藥物以改之。無是理也。妊母常食松子。令子堅實。常食砂仁。可令速產。達生編云。常以麻子油和腐皮食。可令滑胎。又云。始覺有妊。以布一幅。橫束之上。緊下寬。至臨產始去。可令易生。蓋使腹中偏窄。胎不上長。乍去則驟寬。產時便利故也。大凡攝養之道。在善調其心氣。此非醫者所能爲。夫生子不善。人之所惡。人之不善。雖由習欲。實本性生。孔子曰。惟上知與下愚不移。推原其故。皆由未生以前。理微而顯。事小而大。在智者心知其意。而變通之。教於已生之後。莫若教於未生之時。以可爲者。責之人。以不可爲者。聽之天。是亦爲人父母者。所當究也。

孕忌第四

生人誕育。天理自然。陰陽滋化。本無災害。而每有孕而不固。固而不育。育而輒夭者。豈生化之理。有所異哉。攝養有乖。逆其滋生之道也。古者婦人有孕。卽退居別室。謹持胎教。故彌月而生。無災無害。今人不然。或有孕而不知。不事養護。其知者。

又不知所忌。不慎起居。勞役失宜。舉止違理。欲其無患。不亦難乎。夫人有富貴貧賤之異。而誕育則皆同。而產孕之變。多起於富貴之家。人與禽獸。各稟氣血以生。而禽獸之生。初無墮落難產之患。豈非嗜欲有多寡之異。生理有順逆之分乎。懷孕之後。首忌交合。蓋陰氣動而外泄。則分其養孕之力。而擾其固孕之權。且火動於內。營血不安。神魂不密。形體勞乏。筋脈震驚。動而漏下。半產難產。生子多疾。而夭淫濁而鈍。甚至孕猶未固。輒動而墮之一再墮後。胞室寒滑。隨孕隨墮。終身無子而不自知。亦可慨矣。居處動作。最易損傷。起於細微。人所不覺。體候虛羸者。尤宜慎之。毋登高。毋作力。毋疾行。毋側坐。毋曲腰。毋跛倚。毋高處取物。毋向非常處大小便。毋久立。毋久坐。毋久臥。毋犯寒熱。毋冒霜雪露霧。暴雨酷日。烈風疾雷。毋視日月薄蝕。虹霓星變。毋觀土木工作。及怪獸異鳥奇詭之物。毋入神廟寺院。睹猙獰險惡之狀。一舉一動。必謹飭之。五志之發。鮮能和平。而產孕最宜調攝。孕藉母氣以生。呼吸相通。喜怒相應。一有偏倚。卽至子疾。宜和其心志。毋暴喜。毋過思。毋怒。毋恐。毋悲。毋憂慮。毋鬱結。顏無忤色。口無惡聲。心無雜念。使血氣和平。德性凝定。不特孕安。且生子英賢。無疾而壽矣。其飲食。則以冲和澹泊爲正。節厚味。

禁腥濁。毋飲醇酒。毋食異味。千金方云。食山羊令子多疾。食兔令子缺脣。食犬肉令子無聲。食桑椹鴨卵令子側出心寒。食雀令子性淫。食鼈令子項短。食薑芽令子多指。雞合糯米食。令子生寸白蟲。雞及乾鯉魚食。令子生瘡。食鮮菌令子驚風。食水漿令胎絕。食騾馬驢肉無鱗魚螃蟹皆令難產。食薏苡莧菜蒜葱麥芽皆令墮胎。其藥味則宜和平調攝。毋犯金石。毋近毒藥。大熱大燥。大攻大表。大寒大涼。走竄迅疾泄利之品。咸宜禁止。卽需施用。宜詳酌而慎處之。凡妊娠起居飲食。惟以和平爲上。不可太逸。逸則氣滯。不可太勞。勞則氣衰。五月以前宜逸。五月以後宜勞。冬毋太溫。夏毋太涼。食毋過飽。飲毋過多。養孕之經。不可灸刺。無故不宜服藥。調之攝之。務使無偏。則得之矣。

孕上疾第五

妊娠諸疾。與常人殊。故治法亦異。子居母腹。藉母氣固之。母氣不順。子不得安。必有墮落之患。子氣旣損。母氣亦傷。治之者。或僅護胎孕。不敢攻疾。或亟於治疾。不顧子氣。致子母交損。大小殞亡。慘烈之禍。於此爲甚。素問曰。婦人重身。毒之何如。

曰。有故無殞。亦無殞也。大積大聚。可犯之也。衰其大半而止。夫大積大聚。病之重者。苟不亟治。立見危迫。故必毒之。使邪去而孕安。然恐藥勢太過。正氣易傷。故衰其大半。即止不治。古人立法。動出萬全。不可不究也。

懷妊之後。必患惡阻。惡阻者。謂惡心阻其飲食也。由於經脈既閉。藏氣不宣。津液停淤。水濕爲患。故其候四肢沉重。惡食嘔吐。偏嗜一物。頭痛眩暈。多臥少起。若面色如故。脈象和平。此不須醫。但調其飲食。適其寒溫。緩緩可愈。其甚者。大嘔吐血。食飲不下。寒熱往來。心中憤悶。惡聞食臭。肢節疼痛。倦怠自汗。色萎肢瘦。勢若危殆。或施治不善。逆其胎氣。致暴作吐下。困頓欲絕。則宜服橘皮茯苓湯。

橘皮茯苓湯

橘皮一錢

茯苓二錢

蘇梗八分

歸身五分

白芍一分

砂仁五分

生薑三錢搗去汁

青竹茹八分

炙甘草五分

作一服

三四服不愈。宜半夏茯苓湯。三五服必愈。

半夏茯苓湯

半夏茯苓各三錢

乾地黄生薑各二錢

橘皮旋覆花細辛

人參芍藥芎藭桔梗甘草各一錢

十二味。以水三升。煮取一升。分

三服。若客熱煩渴。去細辛。加前胡知母。各一錢七分。

若冷痢者。去乾地黃加

桂心。一錢七分。

熱服後。忌生冷醋滑油膩等物。

見千金方。

妊娠傷寒。以安胎為主。無犯胃氣。不可妄汗吐下。泄利小便。其候輕者。頭痛煩熱。宜芎蘇飲。

芎蘇飲 芎藭紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛各一錢

甘草五分

生薑三片

葱白三莖

十味。作一服。

見東醫寶鑑。

甚者。壯熱不解。欲汗之。宜葱白湯。

葱白湯 葱白十莖

生薑六錢

二味。以水一升。煮五合。作二服。

見千金方。

不解。宜拭身法。

拭身法 麻黃二兩六錢

竹葉三合

石膏一升

三味。以水二升

六合。煮取一升。去滓。冷拭身體。以故布掩頭額。心腹燥則易之。見千金方。

熱病者。宜豆豉湯。

豆豉湯 豆豉三合

葱白一兩六錢

二味。以水二升。煮一升。分三服。取

汗。見千金方。

大煩熱宜葛根汁飲解之。

葛根汁飲。葛根汁六合

分三服。間四刻許。進一服。見千金方。

皆須用固孕法。以安其孕。

固孕法。取鼈中黃土。水和塗臍。乾復塗之。見千金方。

又方。萍朴硝大黃蛤粉藍根等分貼臍上。見得效方。

妊娠煩懣悶瞢。謂之子煩。此由痰濕壅鬱。熱氣薰蒸。上焦之氣。不得流暢。熱鬱過

甚。則胎動漏下。宜竹瀝湯。

竹瀝湯。竹瀝三合。麥門冬。防風。黃芩。茯苓各一兩。五味。以水一升。煮

六合。分三服。日一。見千金方。

中風口噤。項背強直。筋脈拘攣。發搐不止。痰盛昏迷。或時作時止。名曰子癇。宜四

物湯。量加驅風逐飲之藥。甚則宜羚羊角湯。

羚羊角湯。羚羊角錢。棗仁。獨活。五加皮各二分。錢。防風。薏苡仁。當歸

芍藥。茯苓。神杏仁各七分。甘草。木香各五分。生薑三片。作一服。

見醫學正傳。

若因冬月。外感風寒。壅於肺絡。內風煽熾。故痰氣升逆。昏迷不醒。手足筋脈拘攣。右手脈閉。左手脈數而瀉。妊娠已七八月之間。症屬子癇。先用開肺氣清肝風之品以救之。宜鈎藤生地竹瀝飲。

鈎藤生地竹瀝飲

鈎藤三錢後入

大生地三錢酒炙

炒當歸三錢

炒白芍二錢

明天麻一錢煨

川芎五分

川貝母一錢去心

製半夏五分

蘇梗一錢

陳皮八分

川朴七分薑汁炒

桔梗二錢

竹瀝三茶匙沖服一劑不效再服一劑。

若服前方。拘攣發搐減輕。痰去人稍明白者。用滋木清熱以息風。宜竹茹阿膠湯。

竹茹阿膠湯

青竹茹二錢薑汁浸

阿膠二錢蛤粉炒

炒當歸三錢

黑山梔八分

大生地四錢

生白芍二錢

川芎一錢

明天麻一錢煨

石決明三錢煨

陳皮八分

焦朮二錢

右十一味。為一劑。

水腫脹滿。謂之子腫。其候或遍身浮壯。或手足攣腫。或肚腹壅大。高過心胸。氣逆

喘急甚則損胎。此因水氣過甚。正氣不化。溢於皮肉。輕者產後即愈。不必施治。甚者宜鯉魚湯。

鯉魚湯 鯉魚一頭重十兩

白朮生薑各一兩六錢

芍藥當歸各一兩

茯苓三錢

六味。以水四升。煮魚熟。澄清。取二升六合。內藥。煎取

一升。分三服。見千金方。

或苓朮湯。

苓朮湯 茯苓白朮各一兩三錢

黃芩杏仁各一兩

旋覆花三錢

五味。以

水二升。煮八合。分三服。見千金方。

小水淋痛。謂之子淋。此由下焦氣化壅閉不行。故水道不利。鬱而為痛。宜葵子散解之。

葵子散 冬葵子赤茯苓各等分為末。每服二錢。米飲調下。見金匱要略。

若便閉不通者。謂之轉胞。乃胎氣陷下。壅遏過甚。氣道梗阻。故水不得通。虛人多

有之。宜參朮飲。

參朮飲 人參白朮半夏陳皮芍藥當歸芍藥乾地黄各一錢

法。甚者。宜腎氣丸。

甘草五分
生薑三片

作一劑。服後探吐之。見丹溪心

腎氣丸

熟地八兩

山茱萸四兩

山藥四兩

丹皮三兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

附子一兩

肉桂一兩

丸如桐子大。每服十五丸。米飲下。見金匱要略。

若遺溺者。白薇散主之。

白薇散。白薇芍藥各等分爲末。酒服一錢。見千金方。

久嗽不止。謂之子嗽。此外感風寒也。甚則動胎。宜百合湯。

百合湯 百合三錢

紫苑一錢

貝母一錢

白芍一錢

當歸五分

前胡五分

茯苓二錢

桔梗五分

蘇葉五分

九味作一服。

下痢赤白。謂之子痢。其候腹中疼痛。裏急後重。不得以尋常治法施之。宜薤白飲。

薤白飲 薤白三合

石榴皮黃連各六錢

阿膠一兩

地榆一兩

以水二升。煮六合。分三服。見千金方。

若注下不止。宜膠艾湯。

膠艾湯。阿膠艾葉石榴皮各六錢。

以水二升。煮六合。分三服。見千金方。

若下膿血。宜白朮湯。

白朮湯。白朮當歸黃芩各三錢。

作一服。見醫學正傳。

寒熱往來。一日一作。或間日一作。若有定期。謂之子瘧。發當夏秋。宜香薷保安湯。

香薷保安湯。香薷八分。

柴胡羌活各五分。

陳皮六分。

白朮二錢。

黃芩一錢。

炙甘草四分。

當歸五分。

生薑一片。

棗二枚。

作一服。

在冬春。宜驅邪湯。

驅邪湯。白朮藿香砂仁茯苓各一錢。

橘紅草果各八分。

甘草五分。

薑三片。

作一服。見丹溪心法。

胸滿腹脹。氣逆上千。謂之子懸。此由中焦氣結之故。多得之憤鬱驚惶。宜紫蘇飲。

紫蘇飲。紫蘇葉五分。

人參大腹皮芍藥陳皮白芍當歸各一錢。

甘草五分。

薑三片。

葱三莖。

作一服。

或葱白湯。

葱白湯 葱 白二十

以水一升五合。于銀石器內。煮取半升。頓服。并食葱。

見婦人良方。

若心痛者。宜竹皮湯。

竹皮湯 青竹皮三合

以酒六合。煮三兩沸。頓服。見千金方。

腹痛者。宜芩朮湯。

芩朮湯 黃 芩 一兩

芍 藥 一兩 白 朮 六兩 以水二升。煮取

一升。分三服。見千金方。

腰痛者。大豆酒主之。

大豆酒 大 豆 三合

以酒三升。煮取六合。頓服。見千金方。

妊娠下血。謂之漏胞。甚則崩決不止。陰氣不固。熱動於內。傷其脈絡。故營血內溢。

血盡則死。宜地黃飲。

地黃飲 生 地 黃 二兩

清酒一升。煮三沸。去滓。頻頻服之。或入雞血少許。

見千金方。

或地黃散。

地黃散 乾地黃搗末。酒服三指撮許。三服瘥。見千金方。

若胎動不安。腹痛繞臍。腰背皆痛。卒有所下。或叫號口噤。四肢厥冷者。宜艾葉湯。

艾葉湯 艾葉阿膠芎藭當歸各一兩。甘草六錢。以水二升六合。煮

一升。分三服。見千金方。

若因交合而動胎者。宜八物膠艾湯。

八物膠艾湯 人參白朮茯苓各二錢 芎藭五分 當歸五分

白芍二錢 乾地黃三錢 阿膠二錢 艾葉八分 見醫

學入門。

因飲酒而傷者。宜黃芩湯。

黃芩湯 黃芩白朮當歸砂仁各一錢 作一服。日二。見得效方。

因喜怒而傷者。宜佛手散。

佛手散 當歸五錢 川芎藭三錢 作一服。見丹溪心法。

因鬱悶而傷者。宜葱白湯。見前子懸下。

因勞役而傷者。宜安脈湯。

安脈湯 人參白朮各二錢 當歸五分 阿膠三錢 炙甘草陳

皮各五分 芎藭一錢 兔絲子黃耆各五分 杜仲二錢

因跌墮而傷者。宜續杜丸。

續杜丸 續斷杜仲各二兩 棗肉搗為丸。如梧桐子大。每服五十九。米飲下。

見醫學入門。

若腰痛損傷。下血不止。宜馬通湯。

馬通湯 馬通汁三合 乾地黄阿膠各一兩 當歸艾葉各一兩

以水一升六合。煮取八合。內馬通汁及膠合烱。分三服。見千金方。

若胎奔上搶。心危急之候。宜艾葉地黃湯。

艾葉地黃湯 艾葉一兩 阿膠芎藭芍藥甘草當歸各六錢

乾地黄三錢 以水一升六合。煮取一升。內好酒一升。內膠令消。分

三服。見千金方。

甚者。血從口出。逆不得息。宜蟹爪湯。

蟹爪湯。蟹爪三合。

甘草桂心各三錢。

阿膠六錢。

以東流水。

三升。煮一升。內膠分二服。口噤不能服者。格口灌之。藥下便活也。生胎卽安。死胎卽下。見千金方。

若因毒藥攻胎。胎動欲墮。血逆衝心。悶亂喘促。大汗不止者。宜白扁豆散。以解其毒。

白扁豆散。白扁豆爲末。新汲水調下二三錢。口噤者。斡開灌之。見得效方。若

因高取物。胞系有傷。兒啼腹中。則令妊母曲身。向地拾物。須臾卽止。

若腹中作鐘鳴聲者。取鼠穴中土噙之。

八九月瘖不能言者。不須治之。產後卽愈。

凡胎動無故而動。及體素羸弱者。乃衝任脈虛。不得固攝。當大補之。腹痛者。宜行

其氣。損傷者。宜行其血。餘各因其所由治之。

未及期而產。謂之半產。卽墮胎也。損氣耗血。甚於正產。二三月猶輕。六七月爲最

重。譬之果未熟而強摘之。其根蒂必傷也。故凡半產。當與正產同其調養。而尤加

意焉。宜因其所傷而補益之。以善其後。前列諸法。皆可參用。若輕易視之。則一次

半產後遂習以為常。不得謂非失治之過也。半產後治疾之法。與正產稍異。蓋正產惡露多。半產惡露少也。若有腹痛等疾。宜溫補之。逐瘀破血之藥。用宜審察。若數日後大熱而渴。面紅眼赤。欲飲涼水。晝夜不息。此大虛也。寒涼下咽。即死不治。宜當歸補血湯。

當歸補血湯 黃耆一兩

當歸二錢

水煎。作一服。見內外傷辨。

若血崩不止者。宜攝陰湯。

攝陰湯 黃耆五錢

阿膠三錢

歸身二錢

白朮二錢

甘草二分

櫻櫚皮炙一錢

烏賊骨分炙五

荊芥炒一錢

其他諸症。並詳正產。相時度勢。消息用之。未可拘泥為也。

謹產孕集

清 陽湖 張曜孫仲遠纂輯

涇縣 包 誠興言增訂

鄞縣 曹赤電炳章校刊

卷下

辨產第六

孕滿十月。待時而生。自然之道。無所勉強。而世俗不察。或未產而強速之。致有橫逆之變。推其故。由於未明其理。不辨其候。而然。故初覺腹痛。遂謂欲生。稍事遲延。遂謂難產。方藥以攻之。非法以擾之。使氣脅神亂。子母俱死。富室巨家。其弊尤多。本安也。而自危之。本生也。而自殺之。可憫也已。辨產之法。脈經曰。娠婦月滿。則脈離經。離經者。難經所謂一呼三至。曰離經。一呼一至。亦曰離經也。又曰尺脈轉急。如切繩轉珠者。欲產也。千金方論曰。將產者離經。離經者其脈浮。朱彥修曰。離經

六至。沉細而滑。按切繩轉珠。動疾之象。卽一呼三至之義。一呼三至。一吸三至。呼吸定息。脈七至。閏以太息。脈入至。疾之甚也。朱說與千金方不同。當以難經脈經爲正。要之胎動欲產。無論浮沉遲速。皆有動象。無動象者。非正產也。

正產腹痛。必連腰及臍。或牽引脊背。胎氣陷下。或目中生火。穀道挺迸。漿血下後。腹痛愈緊。乃爲欲生。若漸痛漸緩。或乍緊乍慢。卽漿血交下。皆非正生。達生編言試痛正產之辨。誤以試痛爲正產之害。推勘極精。多可采者。達生編云。初覺腹痛。第一以忍痛爲主。無論爲正產。爲試痛。痛久自生。更宜養神惜力。以安睡爲妙。不可輕易臨盆。蓋子居母腹。端坐不動。至生時轉身向下。妊母安臥。腹中不至偏窄。易於轉身。若未及轉身。遂使坐草。則嬰兒難於轉運。復用力以注之。則足先出而成逆產。轉身未定。用力逼之。則手先出而爲橫生。或首骨偏礙而爲偏產。種種弊端。皆基於欲速之故。故臨盆以緩爲正。卽使過遲。亦無妨礙也。又曰。孕至八九月。或妊母有火。起居不時。令孕不安。因而作痛。所謂試痛也。但須照常眠食。甚則服安胎藥一二劑卽止。若誤作欲產。遽令坐草。卽使勉強能生。母氣必損。子亦多天。猶之剖卵出雛。裂繭取蛹。安望生耶。又曰。腹痛有感寒傷食之候。亦宜辨別。傷食

者。當臍而痛。手按轉加。或臍旁如有臍起者。不連腰及脊。寒痛多在臍下。綿綿延延。無所增減。得緩少安也。凡此皆極言欲速之害。而歸於辨產未明。蓋妊母多畏難產。而欲速產者。在主者察脈晰理。明辨而調攝之事。常而易變。苟不慎察。戕害生命。亦非俯育之道。慎毋謂闈房瑣屑之事。非丈夫所宜知。而忽略視之也。

產戒第七

產育順事。而俗人多擾亂之。致反順爲逆。此雖習俗使然。亦不知之過也。輯產時所當戒者。著於篇。使覽者凜焉。妊母將產。率多疑懼。腹痛緊急。氣血下注。神不能安。易於驚惶。初次產育。尤爲易擾。而不知者。稍有不順。輒恐懼無主。大事張皇。致妊母心亂神散。氣憊而逆。氣逆則血湧。氣憊則力衰。嬰兒之生。雖自能轉動。亦藉母氣助之。氣逆力衰。何以能下。惟宜溫慰妊母。使勿驚疑。卽有不順。勿使知覺。俾心定氣凝。神安力旺。無論本屬順生。卽遇惡候。亦可反逆爲順也。千金方論云。產事雖係穢惡。然不得令死喪污穢之人視之。犯者多致難產。又忌

多人瞻視。惟得一二人。在室。產後乃可告人。亦以人衆則易於驚擾。致妊母心神不定故也。

室中宜適溫涼。夏暑過甚。勿掩門戶。以器貯新汲水石許。置室中。以辟熱氣。免致昏暈。天寒宜置火暖之。母得大熾。令火氣熏灼。室中人毋大聲。毋多語。毋差咨太息。毋訝駭。毋叱咤。毋祈神問卜。宜安靜如常。

妊母宜惜力。宜安臥。臥宜正。不可左右。毋摩腹。毋按腰。毋妄動。毋輕坐草。初產及天寒尤忌。美其飲食。頻頻與之。若虛羸者。不能多食。以糜粥雜人參末飲之。毋亂服方藥。毋輕試異術。必辨明正產。胞水已下。交骨不開。或交骨已開。而子久不下。擇平和之藥。稍稍助之。要之產前調攝既善。亦無須此。

接兒老嫗。俗謂穩婆。宜預擇妥善者用之。蓋隱曲之事。非此輩不能爲。而愚蠢奸狡之輩。或妄爲動作。故事恐嚇。戕人性命。以炫己之術。不可不慎。大率以年老爲佳。蓋年老則歷事多而性稍醇也。

產後勿問男女。須收拾既定。然後告人。世有急於求嗣者。墮地得男。而產母暴喜。遂致昏暈。得女。則產母不悅。家人又從旁懊惱之。致有鬱厥血逆之患。宜豫防也。

大凡產厄。誤於張皇者半。誤於怠忽者亦半。產育固生人常事。然苟主者不察。而漫然聽之。則產母無主而驚疑。爲害亦大。往見拘迂者。矯張皇之弊。謂嬰兒可以自由。無藉乎人。因閉門安臥。勿令人知。而產母體素羸弱。氣血虛少。又性本嬌怯。不能忍痛。曲腰護之。偏倚妨之。轉輾欹仄。致嬰兒不得轉動。交骨不得開張。氣血下注。久無泄路。勢必逆而上行。一日之間。而子母俱死。如此者。何啻無故而自殺之哉。此皆不明其理。不究其道。愚而自用。殘賊人倫。夫產孕者。生生之本。天理之原。似續攸關。斷宜詳慎也。

用藥第八

產時用藥。有二弊焉。方伎之士。多取速效。肆用峻利之藥。以炫己之術。其效者。藥甫入口。而難產卽下。衆人駭服。推爲神奇。而不知一時便利。子母大傷。至產後發疾。遂至不起。嬰兒或墜地不舉。或舉而輒夭。而又委之天命。歸咎後醫。日殺生命。而人莫之知。深可痛惜。古方如兔腦鼠腎蛇蛻回生諸藥。只堪備至急之用。安可妄試。尤有甚者。挾不經之術。無稽之方。轉轉傳布。謬爲仙授。乘人之急。以脅人之

利。功則歸己。過則歸人。世俗憤憤。多為所愚。不可譬曉。此一弊也。而矯其弊者。遂謂產孕本無須用藥。常變順逆。悉靜而聽之於天。斯言誠善。然必自懷妊至臨孕。攝養無乖。然後可也。苟或不善。即可反順為逆。而仍執勿藥之說。以自愚。是何異未能辟穀。而謂人可勿食耶。此二弊也。且天下亦有生而難產者。或未孕之先。即有宿疾。或氣血羸弱。骨格緊密。脈絡堅緻。皆令難產。亦藉臨時藥力以扶助之。但宜斟酌盡善。擇平和之命。醇正之法。相不得不用之時。而後用之。如加味芎歸湯。佛手散。味和而力厚。氣平而效速。斯為善也。

加味芎歸湯

當歸一兩

川芎七錢

龜板

手大一片 醋炙研

婦人髮如雞卵大一枚 瓦上焙存性

水一升。煎四合服之。

見醫學入門。

佛手散

當歸五錢

川芎三錢

作一服。

見丹溪心法

富貴之家。產後必服人參。而致死者多。矯其弊者。并倡產後無補益之說。而致死。者亦多。蓋不明其理。左右皆誤。夫產後諸疾。多出於虛。人參非不可用。而用之亦自有法。得其法。益身而卻疾。不得其法。致疾而促生。不可不辨。服參之法。在子方墜地。參已入口。一刻之間。過此一刻。便不可服。蓋產時氣血下注。上中二焦。盡屬

虛寒。產後氣復上行。下焦惡血填湊。血道梗塞。氣道亦滯。驟加補中之藥。血道未開。氣道益阻。遂有惡露不行。淤血上逆之患。若當兒甫墜地。一刻之間。氣血猶未上行。藏府空虛。脈絡困乏。人參入腹。甘溫之性。宅中土而運脾精。輔正氣而逐惡血。灑播精微。灌溉經脈。氣強則行速。脈潤則道通。惡露順下。乳汁流通。焉有他患。且新產之後。百脈皆動。而下行。自下而上。淤濁者去。精華者留。有更新之象。婦人宿疾。多在血內。平時所不能除者。此時可以除之。卻病益身。非妄說也。

凡欲服參者。將產時即宜製就。汁宜濃厚。可以一飲而盡。或以人參一二錢。研爲末。另以錢餘煮汁調服。

亦令一人司之。俟兒首既出。即與服之。參盡而兒適墮地。乃爲合法。苟失其法。爲害非小。而復歸咎於參之不可用。豈不謬哉。

產時應變。皆倉卒之際。所有藥物。亦宜豫籌。有備無患。不可渴而掘井。鬪而鑄兵也。

應變第九

產育本順事。不幸而至於逆。變起倉卒。安危係於片時。亦人生至急之事。極難之

治也。應變之術。宜切究焉。凡產之變有五。曰橫產。曰逆產。曰偏產。曰礙產。曰盤腸產。

橫產者。兒橫腹中。手臂先出。治法。令產母仰臥。囑收生嫗。徐徐推兒下身。令直上。以手中指摩其肩。推上而正之。又以手摩其耳。令頭正。自生。或以小鍼刺兒手。入一半分。徐徐送入。不入以鹽塗之。

逆產者。兒未轉身。兩足先出。以鹽塗兒足心。鍼刺如上去。或以爪搔之。并以鹽摩母腹。兒得痛痒。驚縮而轉。自當迴順。

偏產者。產時兒首偏柱一傍。雖近產門。只露額角。終不得下。治法。令收生嫗。以手徐徐正其頭。若因腦骨偏柱。穀道當以綿衣炙火令熱。裹手於穀道外。徐徐推之。俟正。然後坐草。若產時兒不向產門。直趨穀道者。宜熬鹽令熱。以紬裹於穀道外。熨之。

礙產者。兒首正抵產門。久而不下。此必轉身時。臍帶攀掛兒項。或肩當急令安臥。令收生嫗。推兒近上。徐徐通手。以中指按兒兩肩。理脫之。然後坐草。蓋此候最爲險惡。慎毋輕易用力。若纏繞於項。復用力以注之。則其纏愈緊。致子死腹中。不可

不慎。凡橫逆諸產。如法拯救。皆宜內服加味芎歸湯。佛手散。加味芎歸湯見用藥篇。佛手散見孕疾篇。

以助之。若不能用法。但令靜心安臥。服前藥一二劑亦效。

盤腸產。子腸先出。兒即隨下。或腸隨兒下。此由下焦素虛。不得收攝。氣血下注。無

以固之。或用力太過。一次如此。凡產皆然。宜以溫湯潤之。溫諭產母。勿令驚慌。以

好醋半盞。新汲水如醋十之七。調和。驟喫。產母面或背三喫。則收。或以磨刀水微

潤腸。煎磁石湯一盞飲之。或以草蓆子搗敷產母頂心。視收入。速洗去。遲則為害。

內宜服補益升提之藥。慎護其腸。勿令見風。若遭風侵。多有不能收入者。

產時交骨不開。最為惡候。此由陰氣大虛。血液衰少。宜加味芎歸湯。方見前甚者。加

肉桂少許。

子死腹中。其候心腹脹悶。重墜異常。產母面赤舌青。指甲皆青。或口出惡臭者。是

也。若面舌唇口俱青。口沫出者。子母俱死。面青舌赤者。母死子生。宜佛手散。方見前

或平胃散。

平胃散。蒼朮厚朴薑汁炒陳皮各三錢。甘草二錢。水煎加朴硝二錢。

化服。其效頗速。

或蟹爪湯。

蟹爪湯

蟹爪一升

甘草一只

阿膠一兩

以東流水三升。

煮蟹爪甘草得一升。去滓。內膠令烊。分二服。見千金方。

若雙胎。一死一生者。服之能令生者安而死者出。若乾燥著脊不能下者。宜葵子湯。脂蜜酒以滑之。

葵子湯

葵子三合

阿膠六錢

以水一升六合。煮六合。頓服。未效。

再作一服。見千金方。

脂蜜酒

猪脂白蜜各三合

醇酒六合

合煎取六合。分二服。見婦

人良方。按無猪脂。以麻子油易之。亦可。

又治雙胎一死一生者。先生一胎。腹中尚有一胎不下。或手先出。將手推入。或足又出。推之不入。生至三日。兒足不動。知胎死。三日中服催生方。葵子湯。加味芎歸湯。皆不效。產婦腹不痛。不起陣。房內夏宜涼。冬宜煖。室中一二人。宜寂靜。切不可驚慌。不要親戚來看來問。以安產婦之心。若旁人驚慌。言語張皇。產婦聞之心慌。則生恐懼。必至誤事。凡危急之際。更宜安靜用藥。非土牛膝葵子湯不能下也。

土牛膝冬葵子湯

土牛膝五錢

冬葵子一兩

二味。宜買三服。用罐三個。

盛藥煎好。一刻時候。連服三劑。死胎即下。何以要用三劑。一刻時候連服者。若服一劑。產婦腹痛一陣。即止。死胎送不下來。連服三劑。腹痛緊而血來猛。產門即開。將死胎送下。胞衣隨胎而出矣。因經驗用藥如此。故注明以救危急之症也。

產時用力太過。水衣早破。漿水盡下。產戶乾澀。或坐草日久。為風所久。因而腫脹。多致難產。或產時子忽不動。是妊母力乏之故。勿誤為死。肆用攻逐。皆宜加味芎

歸湯。方見前

產時。妊母忽猝然氣痿暈絕。目翻口噤。面忽唇青。口沫流出。子母俱殞。若兩顴微見紅色。子死母生。此至危之候。宜霹靂丹救之。

霹靂丹。蛇蛻一條。蠶退紙。并燒存性。各用二錢

男子頭髮燒灰。路旁左足草鞋

燒存性。各用一分

乳香五分

黑鉛二錢五分

水銀七厘

以

鉛和水銀。入鍋中。火上鎔化。結如砂子。研治為末。和諸藥。以獾猪心血和丸。如梧桐子大。金箔為衣。每用三丸。流水下。或煎化灌之。見醫學入門。

嬰兒既生。胞衣不下。亦多危險。達生編云。用力太早。交骨強開。兒甫出而骨即隨閉。以致不下。急宜斷臍帶。以麻線將臍帶繫緊。又雙折之。再繫一道。勿令風入。以輕物墜之。但令產母安心定氣。稍遲當痿而下。慎勿令收生嫗。妄用手取。致損及臟腑。因成惡疾。若血流入衣中。爲血所脹。致不得下。腹中脹滿。上衝心胸。疼痛筋急者。宜佛手散。方見前

若以手按之。痛稍緩者。此氣虛也。宜益母湯。

益母湯 益母草一兩 酒煎。加童便一杯服之。見達生編。

若危者。宜牛膝湯。

牛膝湯 滑石二錢研末 木通當歸牛膝瞿麥各一分

冬葵子二錢

共作一服。見局方。

若急上搶心者。或死胎上搶心者。宜用熨法。

熨法。取蟻垤土一升。熬熱。囊盛。熨心下。令不得上。見千金方。

若輕者。以草紙燒烟。熏產母之鼻。令納氣卽下。或以髮入口作嘔。亦佳。千金方。載產時襪法。雖未明其理。而頗有效驗。并附著以備用。凡欲產。宜脫尋常

所著衣。籠竈頭。及竈口。令至密。卽易生。若逆生者。以手中指取釜底墨。畫兒足下。作人形。卽順生。或書父名於足心。或以車轄脂如上法書畫。若胞衣不下。取夫內衣蓋井上。卽出。本草載臨產取赤馬皮鋪身下。又以海馬石燕兩手持之。皆令速產云。

凡應變皆以凝神息慮爲主。毋得張皇以擾產母。心欲細而定。智欲敏而速。法欲簡而捷。藥欲峻而安。毋取劫功。毋貽後患。凡遇危急。無不皆然。不特產孕之一端也。

調攝第十

產後調攝。最宜詳慎。蓋產後氣血虛少。絡脈空乏。肢節懈怠。腠理開張。皮毛不實。營衛不固。血道易塞。氣道易滯。故致疾之易。而去疾之難。莫甚於此。產後致疾。皆起於纖細易忽之間。其源甚微。其發至鉅。闡房瑣屑之事。主者所不及檢。醫書所不能詳。不識避忌。不知防範。或致疾而終身不愈。或疾作而危在片時。往見一婦。產時至速。不及告人。遂產於地。產後人知。始扶臥於榻。三日後。大熱不止。醫以爲

血淤也。而以桃仁承氣投之。數日而死。一時不謹。爲害如此。況其大焉者乎。故善調攝者。不使致疾。并可去宿患之疾。不可不知也。

凡產後。產母勿令安臥。宜以高枕倚之。膝宜豎起。勿得伸直。須閉目靜神。勿令熟睡。歷十二時。乃可安臥。少須八九時。若倦怠者。宜頻頻呼之。常令欲醒。亦毋高聲急語。致使驚恐。蓋產後氣血上行。若遽令安睡。則氣逆而血壅。多致昏暈。必豫防之。膝宜豎者。膝伸則筋骨內掩。恐礙惡露也。

嬰兒墜地。卽取鐵秤錘。或石子。入火燒紅。以醋向產母焯之。使氣入鼻。不特可以辟穢。且能收斂神氣。散解惡血。以杜血暈。或日焯一二次。三日後止。更佳。

室中宜避風。絲毫罅隙。必掩塞之。宜適溫涼。毋犯寒暑。將寒卽衣。驟煖毋易。夏雖大暑。勿得解衣。毋浴。毋以扇招風。寧失過煖。毋失過寒。產後宜益母草煮汁。和童便服之。或和清酒。日三五服。三日而止。自產之次日始。

日服生化湯一劑。

生化湯

川

芎一錢

當

歸五錢

甘

草五分

乾

薑五分

桃

仁十粒去

以水二盞。煎一盞。入清酒一合。溫服。

五日而止。淤未盡者。七日止。大虛者。可加人參少許服之。二三日後。或寒熱交作。此骨合也。虛人多有之。但診無他患。如法服生化湯。勿妄用他藥。十二日後。惡露將盡。氣血更新。體虛者。宜服補虛湯。

補虛湯 人參白朮各三錢 當歸川芎黃耆各二錢 炙甘草陳皮各八

分 乾薑五分 入味。作一劑。日一服。見醫學入門。

十數服。有宿疾者。宜服永安湯。

永安湯 人參一錢 熟地三錢 當歸三錢 芎藭二錢

阿膠五分 白朮二錢 續斷五分 桃仁烏賊骨各

一錢 吳茱萸四分 十味。作一服。食前溫進。日一

或澤蘭湯。

澤蘭湯 澤蘭二錢 香附二錢 當歸芎藭各一錢

芍藥烏藥各一錢 人參一錢 阿膠黃耆白朮各三錢

紅花五分 生薑二錢 作一服。食前溫進。

羊肉湯。

羊肉湯

羊 肉 十 兩

黃 耆 一 兩

大

棗 三十

茯苓甘草當歸

麥冬地黃芍藥 各六錢

肉桂心三錢

以水六升。煮羊肉。取三升。內

藥煎取一升。分三服。溫進。見千金方。

相疾之輕重。體之偏寒偏熱而用之。或十餘服。或數十服。可使宿疾盡去。體弱反強。

飲食宜澹泊。毋食鹽。犯之令無乳。毋食生冷堅硬一切異物。毋食炙煨煎炒。毋過於肥膩。皆令致疾。十日內。毋食猪肉。一月內。毋食豬脂。犯之令經絡壅塞。凡食肥甘之物。皆宜去油脂。以清淡爲上。清本乎陽。可以益神而育精。濁本乎陰。足以致滯而成積。而酸鹹之味。凝血阻脈。尤爲切忌。

產後一月。俗謂之滿月。二月謂之大滿月。此二月內。不宜力役動作。不宜交合。心志宜和。思慮宜絕。悲恐憂鬱。大喜大怒。皆不可犯。七情傷人。甚於六氣。世有產後羸瘠。謂之蓐勞。多至不治。皆不知調攝之故也。

千金方論曰。嬰兒初生。當卽舉之。舉之稍晚。則令中寒。先浴之。然後斷臍。斷臍不得以刃。令人隔衣咬斷之。以煖氣呵之。然後纏結。所留臍帶。須令至小兒足趺。短則兒腹中不調。常下痢。若先斷臍。然後浴者。則臍中水。令常腹痛。其臍斷訖。連臍帶中多有蟲。宜急撥去之。不爾。則入兒腹成疾。裹兒臍法。椎治白練。令柔軟。方四寸。新綿厚半寸。與帛等合之。調其緩急。急則令兒吐。若十許日。兒怒啼。似衣中有刺者。此或臍燥。還刺其腹。當解之。易衣更裹。裹時。閉戶下帷。燃火令溫煖。仍以溫粉粉之。若臍不愈。燒絳帛末粉之。若臍中水。當炙粉絮以熨之。不時治護。浴兒法。湯須調冷熱。冷熱失宜。令兒驚。凡兒冬不可久浴。久則傷寒。夏不可久浴。久則傷熱。浴兒者。以猪膽汁一枚。取汁投湯中。以浴之。終身不患瘡疥。兒生三日。宜用桃根湯浴之良。

桃根湯 桃梅李根各三兩

以水三升。煮二十沸。去滓。無根。枝亦可。

生男。宜用父故衣裹之。生女。宜用母故衣裹之。皆勿用新帛衣。不可過厚。令傷兒皮膚。害血脈。嬰兒始生。宜時見風日。凡天氣和煖。無風。宜令乳母將兒於日中嬉戲。則血凝氣剛。肌肉牢密。堪耐風寒。不致有疾病。

達生編云。兒生三日。浴之。俗謂之洗三。如冬寒。切不可洗。然千金方謂小兒不浴。令毛落。則不浴亦非良法。宜如上法。蔽風燃火。下帷而浴之。又云。斷臍必以艾煎油爲燃。燎斷之。令煖氣入腹。常視之。勿令濕。較千金法爲佳。南中收生。嫗斷臍。多於連胞衣處斷之。并留胞衣少許。先繫緊。然後斷之。雖臍帶稍長。易於妨礙。然可免入風泄氣之患。亦可用也。

嬰兒甫生。氣欲絕。不能啼。以煖水灌之。不啼。以綿絮包裹之。勿斷臍。以紙撚蘸油。燃火於臍帶下。熏之。令煖氣入腹。更以熱醋湯盪洗臍帶。令氣回。啼哭如常。方可斷臍。

若面青身冷口噤者。乃胎寒也。宜殭蠶散急救之。

殭蠶散 白殭蠶木香肉桂陳皮炙甘草檳榔各五分

水煎取汁。以帛蘸入

兒口中。見醫學入門。

若因臍纏喉管礙產者。急去其所纏之臍。輕按其背俞及胸口。徐摩其喉管。卽氣復而啼。

初生有卽死者。急看兒口中懸雍。前腭上有泡。如石榴子。以指摘破出血。以帛拭

去。以髮灰糝之。若令惡血入口中卽死。初生撮口不飲乳。名曰馬牙。不治則死。馬牙之候。兒齒齦有小泡。如粟米狀。急以鍼挑出血。用墨磨薄荷汁。斷母髮裹手指。蘸擦口中令遍。勿飲乳。一時許卽瘥。

初生穀道無孔。不得大便。急用金玉簪。揣其是孔處刺通之。以蘇合香少許。作小錠。納孔中。或以油紙絛之。勿令復合。

若非無孔。而大小便不通者。氣脹欲絕。令婦人以溫湯漱口。吸啞前後心。并臍下。手足心。共七處。每啞三五次。漱口更啞。取紅色爲度。須臾自通。不爾則死。或以葱汁乳汁各半調勻。抹兒口中。與乳吮下。亦通。

若小便不通。不欲飲乳者。以葱白一寸。四破之。以乳汁入銀石器內煎灌之。

若生鵝口瘡者。其候口內白屑遍生。舌上鼻上皆有之。不能吮乳。急以亂髮纏指。蘸薄荷汁。或并華水拭之。三日當脫。若不脫。可煮菝木汁。令濃。以帛纏筋頭拭之。無菝木。粟木亦可。或以白楊枝燒瀝塗之。

初生遍體無皮者。以白早米粉撲之。候生皮乃止。若如魚泡如水晶。碎則水流者。以蜜陀僧爲末糝之。

初生患連舌。以爪摘斷之。微有血出。無害。若血出不止。以髮灰傅之。連舌者。舌下有膜。如榴子中隔。連接舌下。令兒言語不轉也。

生六七日後。氣血收斂成肉。則口舌喉頰清淨。若喉裏舌上有物。如蘆管中盛水狀者。或如脹起者。可以綿纏長鍼。留刃如粟米大。刺決之。令氣泄。去青黃汁。日一刺之。不過三刺即愈。著舌下者。名曰重舌。著上腭者。名曰重腭。治如前法。

初生感風。鼻塞不通者。取皂角草烏等分爲末。薑汁調敷顙門。或以薑汁調天南星末敷之。又方。用生薑二片。葱二根。搗爛烘熱。貼顙門。

外腎縮入。不得出者。以硫黃茱萸各五錢。爲末。以蒜汁調塗臍腹。仍以蛇床子燒烟熏之。

初生遍體發丹毒。赤腫游走。若入腹即死。名曰赤游。乃胎熱也。宜以細鍼。隨赤暈周匝。刺出惡血。仍以芭蕉汁或蟻螬汁塗之。或以赤小豆末。和雞卵白塗之。亦良。初生二三日。面目繞鼻左右皆黃。閉目撮口而啼。口中乾燥。四肢不得伸縮者。乃血脈不斂也。血氣沮敗。不成肌肉。故有此候。宜龍膽湯。

龍膽湯 龍膽草鈎藤皮柴胡黃芩桔梗芍藥茯苓甘草各八分 以水二合。

煑二合。兒生一日至七日。以三勺分三服。八日至十五日。以四勺分三服。十六日至二十日。以六勺分三服。二十日至三十日。以一合分三服。三十日以外。以二合分三服。凡寒熱驚掣。變蒸不解。客忤驚癇。食積皆可服之。見千金方。

凡嬰兒甫出。先以綿裹指拭口中。及舌上惡血。若啼聲發。便入腹中以成百病。斷臍後。宜與甘草湯。

甘草湯。以甘草如手中指一節。打碎。以水六勺。煑取三勺。見千金方。以綿裹沾取與兒吮之。計得一蜎殼許入腹止。兒胸中有惡物者。當快吐之。若不吐。須臾更與。盡之。若不吐。是無惡物。勿更與也。

凡母乳兒不欲太飽。飽則嘔吐。如太飽。則以空乳乳之。自消。夏不去熱乳。令兒嘔。冬不去寒乳。令兒咳且痢。甫交合。卽乳。令兒羸瘠。交脛不能行。將乳。當先去宿乳。又用力極按之。勿令乳急出。令兒噎。若急出。以指按夾之。噎則奪之。令得息。然後乳之。兒若臥乳。母當以臂枕之。令乳與兒平。令兒不噎。欲寐。則奪其乳。恐填塞口鼻。且或致過飽。母臥。毋以口鼻向兒。恐氣吹其顛頂。母有熱。勿乳。犯之。令兒變黃。

母怒勿乳。犯之令生驚發疝。上氣顛狂。母醉勿乳。犯之令身熱腹痛。母新吐下勿乳。犯之令兒虛羸。皆所當慎。

富貴家多置乳婦。而愚蠢之輩。不知慎護。不識避忌。寒煖失候。饑飽違理。因而致疾者最多。故善懷嬰者。當自乳爲善。必欲置乳婦。宜擇氣血清和。肥白壯盛之婦。毋犯胡臭。癭癭。癆疥。癢癢。白禿。癰瘍。耳聾。鼈鼻。癩癩之疾。夫乳者。血氣之所爲也。兒之性情未定。藉血氣以涵養之。苟飲以惡濁之乳。則氣血日昏。性情日劣。變清明而爲愚蠢。爲患實深。又不特致疾之一端也。

大凡嬰兒氣血薄弱。施治難於常人。小有不慎。卽生重疾。愚醫不察。拘執謬說。肆用毒藥。往往而殤。夫疾作而治之於後。曷若未疾而慎之於先。未生則調之於母。旣生則適其飢飽。量其寒溫。疾從何生。而煩廣設謬方。遍倡邪說耶。集懷嬰一篇。有心保赤者。所當覽也。

拯危第十一

產後諸疾。危迫者多。頃刻生變。有延醫治藥所不及者。孫子所謂發於秋毫。廣於

嵩岱也。而世俗治此。恆昧其道。稍有不順。輒謂不治。治之不善。又不啻下石而殺之。蓋能起死而定亂者鮮矣。著拯危一篇。以政惑焉。產後血暈。最爲危急。其候兒甫墮地。母卽昏絕。不省人事。急令婦女。以膝裹綿軟舊衣。曲抵產戶。勿令氣泄。一人以一手挽頭髮。一手掩口鼻。俟稍轉動。乃可用藥。若不醒。以韭菜一把。細切瓶盛之。灌以熱醋。以瓶口向產母鼻管薰之。仍以鐵石器。火燒。焯醋。令室中常得醋氣。或以醋噴其面。或以漆器燒之。用藥宜辨虛實。虛者。其候昏悶煩亂。卒然暈倒。口張手撒。遺尿。鼾聲。四支厥冷。寸口脈微細散亂。或伏匿不至。此正氣大虛。微陽欲脫。陰離陽決。危在俄頃。救之稍遲。則氣不復返。宜清魂散。

清魂散

人參澤蘭各一錢二分

炙甘草一錢

當歸芍藥各二錢

荆芥穗一錢

作一服。水煎。加清酒引。

見婦人良方。

定氣飲。

定氣飲

人參白朮阿膠各三錢

炮薑熟附子各一錢

大棗五枚

炒粳米一撮

濃煎。分二服。溫進。

獨參湯。

獨參湯 人參四錢 長流水濃煎厚汁灌之。見醫說。或加炒米一撮

炮薑一錢 尤妙。

六味回陽飲。

六味回陽飲 熟地黃五錢 當歸三錢 炮薑二錢

熟附子二錢 肉桂二錢 人參三錢 見幼幼集成。

相度用之。實者心下滿急。神昏口噤。腹脹氣粗。兩手拳握。脈無虛象。乃下血過少。

惡露上逆。當破其惡血。宜黑神散。

黑神散 肉桂當歸白芍炮薑各二錢 乾地黃炒黑大豆各五錢 見幼

幼集成。

奪命散救之。

奪命散 沒藥血竭各等分。治為末。每用三錢。童便清酒各半。煎數沸服。神效。

見丹溪心法。

若舌強不語者。敗血壅其脈絡也。宜四味散。

四味散 當歸延胡索血竭沒藥各一錢。每用二錢。童便或清酒調下。或并煎作

湯亦可。見丹溪心法。

若見鬼譫妄。言語顛倒。眼見黑花者。宜辨虛實。誤者即死。體素虛弱。下血過多。昏迷不省。瞑目無所知。甚則尋衣摸空。錯語失神者。虛也。又謂之鬱冒。暴亡其血。陽神無所依附。宜安神飲治之。

安神飲

人參 柏子仁

去油各三錢

黃耆 阿膠 當歸 茯神 各二錢

肉桂 炙甘草 各一錢

共作一服。

體素壯實。下血未多。發狂見鬼。面青口噤。角弓反張者。實也。敗血干心。亂其神明。宜蘇合香丸一錢。童便調服。或奪命散。四味散皆宜。方俱見上血崩不止。是謂重傷。其候血暴下如注。急若山崩。故名曰崩。唇青肉冷。汗出目瞑。此由陽氣大虛。不得收攝。故直下無制。潰決而不可止。宜朝宗湯。

朝宗湯

歸身 一兩

芎藭 乾地黄 各五錢

芍藥 三錢

人參 黃耆 肉桂 炙甘草 各二錢

分二服。

補氣養血湯

補氣養血湯

人參 黃耆 當歸 白朮 芍藥 阿膠 芎藭 各二錢

艾葉青皮香附甘草各五分

熟附子一錢

縮砂仁一錢

共作一服。見萬病回春。

或攝陰湯治之。若少腹滿痛。肝藏已壞。不可治矣。

攝陰湯

熟地黄五錢

人參三錢

黃耆二錢

當歸五分

荆芥穗炙

棕櫚皮炙

甘草一錢

熟附子五分

作一服。

衄血者。口鼻血出不止。口鼻起黑色如烟煤。是胃絕也。氣血散亂。多不可治。急以

緋線一條。并產母頂心髮二莖。合繫產母手中指節。令極緊。仍用荆芥散治之。

荆芥散 荆芥穗為末。每服二錢。童便調下。口噤開灌之。見婦人良方。

產後大喘。乃死候也。此由陽氣素衰。所下過多。血竭於下。氣留於上。無所依附。獨

聚肺中。孤陽絕陰。命在呼吸。宜獨參湯。方見上定氣飲。方見上六味回陽飲。方見

上輕者。小參蘇飲。

小參蘇飲 濃煎蘇木汁。調人參末二錢。或三錢。作一服。見東醫寶鑑。

若血下少。而作喘者。其喘不甚。由於瘀血入肺。窒礙氣道。宜桃仁湯治之。

桃仁湯

桃

仁二錢

杏

仁二錢

當歸貝母各一錢

茯苓

苓三錢

乾薑人參各五分

若咳逆不止欲死者。以肉桂五錢薑汁三合同熬。稍服半合許。以手摩肺俞令熱。

以餘汁塗之。時摩時塗。汁盡即愈。見婦人良方。

陰脫者。子宮脫出。或脫出如脫肛者。蓋產時努力所致。宜當歸黃耆飲。

當歸黃耆飲

黃耆三錢

人參當歸各二錢

升麻五分

甘草八分

右作一服水煎。日二。見丹溪心法。

若脫出如線。長三四尺。手觸之則痛甚者。宜慎護之。不可令斷。斷則死。以薑三斤。

連皮搗之。清油二斤和炒。以油乾為度。以熟絹五尺許。疊數層承其線。屈曲作圓。

形。納戶口。以絹袋盛薑溫熨之。冷即易。一日夜當入其半。二日當愈。仍內服失笑。

散助之。

失笑散 五靈脂蒲黃等分為末。每服二錢。童便或酒調下。見局方。

凡產後危症。皆屬虛寒惡血為患。僅十之三四。而昧者多以去瘀破血該之。肆用。

攻伐。復雜寒涼。邪說盛行。古法晦昧。夫血已亡而復破之。陽已衰而復泄之。危如。

轉燭。正救猶恐不及。而尙妄謬爲之耶。有識者尙其慎之。毋爲邪說所惑也。

去疾第十二

產後治疾。當以溫補爲主。去瘀次之。千金方論曰。婦人產訖。五藏虛羸。惟得將補。不可轉瀉。若其有病。不須駛藥。若行駛藥。轉更增虛。就中更虛。尙生路遠。朱彥修曰。胎前毋滯。產後毋虛。亮哉斯言。不易之法也。而方今醫者。用法多殊。陽虛發熱。妄用滋降。氣逆作喘。謂之痰火。豈未見千金諸說耶。朱氏爲滋陰降火之祖。而於產後大熱。亦用乾薑。雖說理未明。而用法則合。而宗其說者。并此而背之。可異也已。

脈經曰。產後之脈。洪實不調者死。沉微附骨者生。又曰。沉小者生。實大堅強急者死。蓋產後當虛。沉小而微。虛寒之象也。當虛反實。則陰陽相并。氣血瞀亂。素問所謂氣并則無血。故脈象反盛。猶之真藏之脈。多屬堅強。絕無生意者也。知脈理則知治法。知治法則知病情矣。

大凡產後諸疾。虛寒者十之六七。瘀滯半之。內傷外感又半之。而總不外溫補二

法。常有之候。曰惡露不行。曰發熱。曰尿血。曰無乳汁。曰頭腦心腹腰脇痛。曰嘔逆。曰淋瀝。曰遺溺。曰泄痢。曰便秘。曰陰腫痛癢。曰交骨不合。其甚者曰傷寒。曰中風。曰浮腫。曰虛勞。凡此數者。世俗犯之。有終身不愈者。至中風虛勞。多歸不治。由古法久廢。下士多愚。非必死之症也。

惡露之後。產後下血過少。腹滿而脹。痛引少腹。牽掣腰背。宜加味生化湯。

生化湯 加澤蘭二錢 延胡五分 益母草三錢

甚者逆搶心胸。手足厥冷。脣乾腹大。短氣促喘。宜甘草湯。

甘草湯 甘草芍藥桂心阿膠各一兩 大黃二錢兩 以東流水三升。煮

一升。內膠令烱。分三服。見千金方。

若敗血不下。成塊作痛。俗謂之兒枕痛。乃血瘕也。宜失笑散。方見拯危篇立效散。

立效散 五靈脂爲末。每服二錢。溫酒調下。見局方。

古鐵酒

古鐵酒 古鐵五錢 火燒令赤。以酒三合。入烱之。溫服。見千金方。

烏賊骨湯治之。

烏賊骨湯

烏賊骨三錢

桃 仁二錢

當歸 芍藥 阿膠 各一錢

肉 桂五分

五靈脂一錢

作一服。

產後發熱。其候大熱煩躁。晝輕夜重。或譫語神昏。脈虛大者。虛也。宜當歸補血湯。

方見孕疾篇

腹內痛。有塊者。瘀也。宜生化湯。方見調攝篇

感冒者。宜補虛加乾薑湯。

補虛湯

加乾薑一錢

作一服。見丹溪心法。

四物炮薑湯

四物炮薑湯

芍 藥五分

芍 藥二錢

乾地黃三錢

炮 薑二錢

當 歸三錢

若因蒸乳而熱者。乳必脹痛。去乳汁即愈。若往來寒熱者。宜柴胡湯主之。

柴胡湯

柴 胡八錢

黃芩 人參 甘草 各一兩

生 薑六錢

大 棗十二枚

半 夏三合

以水三升。煮一升五合。分三服。

見千金方。

新產無乳。其故有二。陽虛陰盛。無以化之。營血不得溫升。故不能生乳。體素羸弱者。多有之。舊說所謂血虛無乳者。即此候也。宜益陽以化陰。溫經以通絡。宜營湯。

主之。

宣營湯

當歸黃耆阿膠各三錢

人參五錢

芎藭芍藥各二錢

川貝母一錢

炮薑一錢

紅花甘草各五分

十味作一服。

氣滯血阻。脈絡不通。乳道壅閉。亦無乳。宜猪蹄湯。

猪蹄湯

猪蹄二枚

通草二兩

以清酒三升。浸之。加水一升。煮一

升。飲之。見千金方。達生編無通草。加生黃耆一兩。

當歸五錢

白芷五錢。名通脈湯。

或貝母湯主之。

貝母湯

貝母五分

連翹二錢

當歸川芎藭各二錢

桔梗白芷各一錢

赤芍川續斷各一錢

紅花五分

頭痛者。血虛也。其候痛連巔頂。掣引腦項。緊急欲死。厥陰少陽陽明之脈。會於巔。

絡於額。貫於腦。驟亡其血。脈絡不安。故震動而痛。宜小補血湯。

小補血湯

川芎藭三錢

黨參一兩

阿膠五錢

生薑二錢

即少挾風邪。不可發散。宜一奇散主之。

一奇散 川芎 藟當歸 各二錢 荆芥穗 一錢 作一服。 見東醫寶鑑。

心腹疼痛。多由血瘀氣結。挾寒而起。宜芎歸理中湯。

芎歸理中湯 芎 藟五分 當歸 黨參 白朮 各三錢 炮薑 枳實 各一錢

桃 仁 五分

湯。若虛羸而腹痛。少氣不得息。少腹拘急。牽引腰背。不能飲食者。宜內補當歸建中湯。

內補當歸建中湯 當 歸 一兩 芍 藥 一兩 甘 草 三錢

生 薑 二兩 桂 心 六錢 大 棗 十八枚 以水三升。煮一

升。分三服。見千金方。

腰痛者。下焦虛寒。血滯不行也。宜續斷飲。

續斷飲 續 斷 三錢 當歸 阿膠 各二錢 杜 仲 三錢 桃仁 延胡

各一錢 肉 桂 五分

脇痛者。肝虛也。宜四物乾薑湯。

四物乾薑湯 當歸 乾地黃 芍藥 各三錢 川芎 藟 乾薑 各一錢

棗五枚

冬月產後臍下痛者。宜羊肉湯。

羊肉湯 羊肉四兩

當歸陳皮各二兩

生薑一兩

水一升。酒

五合。煮八合。分三服。

見醫學正傳。

嘔逆之候。腹脹懣悶。食入即吐。此敗血瘀阻。胃氣不降也。宜抵勝湯。

抵勝湯

赤芍藥半。夏澤蘭人參陳皮五分

甘草五分

薑七片

作一服。見醫學正傳。

淋瀝遺溺。由於下焦虛寒。或產理不順。妄用謬法。損傷府絡。宜桑螵蛸散。

桑螵蛸散

桑螵蛸十五枚

鹿茸黃耆各一兩

牡蠣人參赤石脂厚朴各

一兩

治為末。每服一錢。米飲調下。

見東醫寶鑑。

鹿角霜飲。

鹿角霜飲

鹿角霜五錢

熟地黃八錢

黨參黃耆各三錢

韭子一錢

肉桂一錢

兔絲子二錢

損者。宜參朮膏。

參朮膏 人參白朮黃耆各二斤 熬膏每服二錢米飲下 見丹溪心法

或參朮飲然宜速治緩則無及矣

參朮飲 人參^{二錢}朮^{五分} 甘草五分 白朮二錢 黃耆^{五錢} 陳皮桃仁茯苓

各一錢 以猪羊脬一個煮湯入藥再煎去滓作

一服 見丹溪心法

尿血者血隨溺下滲瀝不已甚則溺孔作痛宜竹茹湯

竹茹湯 竹茹^{六合} 人參芍藥桔梗芎藭當歸甘草桂心各三錢

乾地黃^{三錢} 以水三升煮取一升分三服 見千金方

若渴或淋而渴者宜竹葉湯

竹葉湯 竹葉一升 生薑半夏各一兩 大棗^{十四} 小麥^二

合 甘草茯苓人參各三兩 麥門冬^{六錢} 以水三升煮竹葉小

麥取二升內藥煮取九合分三服 見千金方

產後泄痢多因脾虛感寒其候雜下五色或赤白膿血日十數行腹痛困頓宜芍

藥湯

芍藥湯 芍藥 乾地黃各一兩 甘草 阿膠 艾葉 當歸各六錢 以水二升。

煮八合。內膠。分三服。見千金方。

甚者。桂蜜湯。

桂蜜湯 桂心 甘草各六錢 乾薑六錢 附子三錢 蜜三合

當歸一兩 赤石脂三兩 以水六升。煮一升。內蜜。煮數沸。分

三服。日一。見千金方。

禹餘糧湯。

禹餘糧湯 禹餘糧五錢 白朮 乾薑各二錢 黨參一兩 茯苓

三錢 陳皮 川芎 藟各一錢 炙甘草 木香各一錢 分二服。

久不已者。宜豆麥飲。

豆麥飲 大豆 微熬 小麥 蒲黃各三合 吳茱萸一合 以水三升。煮一升。

分三服。見千金方。

泄瀉者。宜安中湯。

安中湯 白朮二錢 當歸 黨參各二錢 炙甘草 陳皮 砂仁 麥芽各一

生 薑七片 大 棗五枚

或補中益氣湯。

補中益氣湯 黃 耆一錢 人參 白朮 當歸各五分 甘 草三分

陳皮 升麻各四分 柴 胡五分 薑 三片 棗 三枚

作一服。見脾胃論。

便秘不通。多由津虧之故。或誤發其汗。陽泄於外。胃氣不降。宜澤府湯。

澤府湯 阿膠 當歸各三錢 桃仁 麻仁各二錢 黨 參三錢

紅 花五分

降胃湯。

降胃湯 人參 陳皮各一錢 作一服。

陰腫痒痛。木鬱下陷也。宜溫肝湯。

溫肝湯 柴胡 白芍 川芎各一錢 當歸 首烏 白朮 苡仁各三錢

葱 白七枚 外以蛇床子煮湯熏洗之。

交骨不合。陽氣大虛也。宜十全大補湯。

十全大補湯 人參 茯苓 白朮 各二錢

乾地黃 黃耆 當歸 各三錢

白芍 川芎 各一錢

肉桂 一錢

甘草 五分

或加味芎歸湯方見前

產後傷寒。治法與產前同。產前宜安胎。產後宜補血。小柴胡湯主之。

小柴胡湯 柴胡 三錢 黃芩 一錢 人參 半夏 各一錢

甘草 五分 薑 三片 棗 二枚 作一服。見醫學入門。

若因傷寒時疾。熱入血室者。宜小柴胡加桃仁五靈脂湯。小柴胡湯加桃仁五靈

脂 各一錢

或柴胡地黃湯。

柴胡地黃湯 柴胡 地黃 各三錢 人參 半夏 黃芩 各二錢 甘草 五分

薑 三片 棗 二枚 作一服。見得效方。

熱渴者。熟地黃湯。

熟地黃湯 栝藋根 三錢 人參 麥門冬 各一錢 熟地黃 一錢

甘草 五分 糯米 百粒 薑 三片 見得效方。

人參當歸飲治之。

人參當歸飲 人參熟地黃當歸白芍藥麥門冬各一錢

桂皮五分

青竹葉十片

粳米一合

薑三片

棗二枚

見醫學入

門。

中風之候。舌寒唇急。手指振動。甚則牙關緊急。手足痠癱。背項強直。一身皆重。或痛或癢。嘔逆直視。角弓反張。名曰蓐風。此因虛氣冷濕。及勞傷所為。千金方論曰。凡產後諸風。不得用毒藥。不得發汗。特忌吐利。犯之必死。蓋陽虛陰僂之候。中氣未定。乙木不得溫升。鬱而生風。播煽藏府。外則風冷襲之。束其皮腠。表氣壅遏。激烈愈增。內外交煽。津液消亡。筋脈攣縮。故手足痠癱。牙關緊急。項背強直。角弓反張。諸症作焉。較之尋常中風之候。其甚十倍。治亦如之。非可忽略為也。千金大豆紫湯。

大豆紫湯 大豆二升

清酒三升

以鐵錡猛火炒豆焦。令煙出。以酒

沃之。去豆。服三合。一日盡之。見千金方。

獨活湯

獨活湯。獨活三兩。大豆二升。舊酒三升。以漬獨活再宿。

若急用。微火煮令減一升。另炒大豆焦。以此沃之。去豆。分五服。日三夜二。見千金方。

華陀愈風散。

華陀愈風散。荊芥炒為末。每服三錢。豆淋酒調下。見得效方。按豆淋酒。

即上大豆紫湯。每服一合。

海藏防風當歸散。

防風當歸散。防風當歸芎藭熟地黃各二分。作一服。見東醫寶鑑。

皆精當可用。若中柔風者。舉體疼痛。自汗出。宜獨活當歸湯。

獨活當歸湯。獨活二兩。當歸三錢。以酒二升六合。煮取一升三合。分

四服。見千金方。

若夏秋。宜用浴法。

浴法。鹽六升。雞毛一把。燒。以水三斗三升。煮鹽作湯。內雞毛灰浴之。

見千金方。

產後浮腫。乃大虛也。脾恃中氣以運陰陽。中氣者陽氣也。產後亡血。陽氣大虛。脾無所恃。失轉運之正。水氣停蓄。津液阻梗。木鬱於左。無升達之力。金逆於右。無下
行之路。氣位於上。水位於下。肺不降則水上逆。肝不升則氣下陷。上逆則腫頭目。
下陷則腫肚腹。四肢者。諸陽之本。脾之所屬也。血亡陽散。失所依附。漁於四末。而
水濕隨之。無所泄越。故壅阻而為腫。前人論此。謂惡血流入四肢。夫惡血淤滯。能
為痿痺。而不為浮腫。淺小之見。無足深辨。前人諸方。精者絕少。宜馭中湯。
馭中湯 黃耆人參白朮各五錢 茯苓當歸各三錢 炙甘草一錢

陳皮一錢 苡仁一兩 肉桂一錢 生薑三錢
大棗十二枚 作一服。

小腎氣湯。

小腎氣湯 熟地黃當歸人參各三錢 澤瀉五分 白朮五錢

熟附子二錢 肉桂一錢 茯苓三錢 作一服。

若因中風而腫者。宜大豆酒治之。

大豆酒 大豆一升 以水八升。煮取一升半。去豆。更煎減半升。內白朮二

六附子製一兩。獨活一兩。生薑六錢。添水三升。煮二升。內好酒六合。再煎。取一升。五合。分五服。見千金方。

產後虛勞。名曰蓐勞。其候乍起乍臥。飲食不化。時作咳嗽。目昏頭痛。口渴盜汗。寒熱往來。喘乏自汗。少氣驚悸。此由攝養不善。內傷七情。陽陷陰逆。升降倒置。藏府交病。表裏均虧。誤用寒涼。即死不治。宜羊肉湯。

羊肉湯 羊肉去脂 當歸 桂心 甘草 各六錢 芎藭 一兩 芍藥 生薑 各一兩 乾地黄 六錢 以水五升。先煮羊肉。取二升三合。

內藥。煮取一升。分三服。見千金方。

猪腎湯。

猪腎湯 猪腎一具。去脂。香豉。裹。白粳米。葱白。各三。水一斗。煮取二升。任意服之。見千金方。或加當歸人參各六錢。見廣濟方。

濟方。

羊肉黃耆湯。

羊肉黃耆湯。

羊肉黃耆湯 羊肉十兩 黃耆一兩 大棗三十 茯苓甘草

當歸桂心麥門冬乾地黄芍藥各六錢
內諸藥共煮六合分三服一日盡 見千金方。 以水六升煮羊肉取三升。

鹿肉湯。

鹿肉五斤 乾地黄甘草芍藥黃耆芍藥麥門冬茯苓各六錢

人參當歸生薑各三錢 半 夏三合 大棗二十枚 以水

八升煮肉取四升內藥取一升六合分四服 見千金方。

當歸芍藥湯消息治之。

當歸芍藥湯 當歸二錢 芍藥人參桂心生薑乾地黄甘草各三錢

大棗二十枚 以水二升煮取一升分三服 見千金方。

若流汗不止者宜鯉魚湯。

鯉魚湯 鯉魚十兩 豉葱各三合 乾薑桂心各六錢 以水三升

煮魚取二升內藥煎六合去滓分二服 見千金方。

虛煩者人參湯。

人參湯 人參當歸麥冬乾地黄桂心各三錢 大棗二十枚 粳米三

合 芍藥三錢

淡竹葉一升

以水四升。先煎竹葉及米。

取二升六合。內藥。煮一升。分三服。見千金方。

甘竹茹湯。

甘竹茹湯 甘竹茹三合

人參三錢

茯苓甘草各六錢

黃芩

一兩

水二升。煮六合。分三服。見千金方。

兼見大熱者。宜知母湯。

知母湯 知母一兩

芍藥黃芩各六錢

桂心甘草各三錢

水二

升。煮八合。分三服。見千金方。

胸中逆氣者。宜薤白湯主之。

薤白湯 薤白半夏甘草人參知母各六錢

石膏一兩

栝蒌根一兩

麥門冬五合

以水四升。煮取一升三合。分五服。

見千金方。

若因交合過早。勞損下血者。宜熟地黃湯。

熟地黃湯 熟地黃一錢

當歸蟹爪鹿角膠男子視襠燒存性各一錢

伏龍肝七分

白茯苓芍藥各五分

桂心甘草各二分

作

一服。見醫學正傳。

凡此諸候。皆常見之疾。達其理。通其法。無有不瘳。外此則有跌仆損傷。一切非常異候。皆不具著。明其大旨。推廣而貫通之。亦可無所窒滯矣。

產孕集補遺

涇縣 包誠興言纂輯
鄆縣 曹赤電炳章圈點

養孕子篇

凡孕三四月。體氣素虛者。宜服保孕丸。固胎散以養之。

千金保孕丸

杜仲入兩糯米煎湯拌勻炒斷絲

川續斷三兩

二味為細末。以淮

山藥五兩。煮爛作糊為丸。米飲下。忌酒醋。

丹溪固胎散

熟地五錢

歸身一錢

人參一錢

炒白芍錢一

白朮錢五分

川芎五分

陳皮一錢

條芩五分

甘草二分

川連少許

黃柏少許

桑寄生酒炒

糯米七十分

水二盞。作一劑。下血加阿膠三錢。胎氣痛加砂仁分

孕子疾篇

若患惡阻。大嘔吐血。食飲不下。寒熱往來。肢節疼痛。疲倦自汗。惡聞食臭。勢甚危殆。服橘皮茯苓湯。半夏茯苓湯。不效。或兼外感咳嗽而嘔吐血者。宜前蘇半夏柏葉飲。止嘔止血。服二三劑。自能飲食矣。

前蘇半夏柏葉飲 前 胡八分 蘇 葉五分 製半夏五分 側柏

葉五分 阿 膠二錢 蒲 川貝母五分 桔 梗五分

當 歸分炒五 茯 苓三錢 紫 苑一錢 甘 草五分

陳 皮一錢 生薑搗去汁。用渣一錢。淡竹葉十片。水二盞煎服。

治妊娠傷寒。頭痛壯熱。肢節煩疼。石膏大青湯。

石膏大青湯 石 膏二錢 大 青二錢 黃 芩一錢 葱 白四

莖 煎。去滓溫服。此方既可散邪。又能安胎。見醫通。 梔子仁一錢 七味水

若體虛者。妊娠心煩。熱鬱不解。悶膈氣結。口破舌乾。起臥不安。宜加味竹葉湯。

加味竹葉湯 白茯苓二錢 麥 冬三錢 黃 芩一錢 人 參一

錢 粳 米一撮 竹 葉片二十 水煎空腹熱服。肥人加半

錢 粳 米一撮 竹 葉片二十 水煎空腹熱服。肥人加半

夏一錢製

生薑二片

見醫通。

孕婦有水從陰戶出不止者。用千金鯉魚湯加肉桂人參。

千金鯉魚湯

加肉桂五分

人參一錢

鯉魚湯見孕疾篇。

治妊娠腹痛不能行動者。通氣散。

通氣散

破故紙不拘多少。瓦上焙令香。右為末。嚼胡桃肉半個。空心。黃酒服

二錢。

治氣血兩虛。下血不止。胎動欲下。宜萬密齋膠艾湯。桑寄生湯。河間二黃散。丹溪

條芩湯。皆可選用。

膠艾湯

阿膠三錢蒲黃炒

艾二錢

川芎一錢

甘草八分

當歸五分

白芍二錢

熟地二錢

水酒各一盞煎

服。

桑寄生湯

桑寄生三錢酒炒

川斷二錢

熟地三錢

人參二錢

白朮二錢

艾一錢

川芎一錢

當歸三錢

作

一服。

河間二黃散 生地黃黃芩等分煎服。

丹溪條芩湯 條芩三錢 白朮一兩

砂仁阿膠 各三錢

右為末。每服三錢。艾湯下。治血熱漏下。

治妊娠忽下黃汁如膏。或如豆汁。胎動腹痛。用黃耆一兩川芎一錢糯米一合

煎服。見醫通。

妊娠跌仆。凝血作痛。欲服活血藥則恐傷胎。不服藥則傷不去。治之當辨胎之死生。如無別症。只用黑糖熬枯。入紅酒童便調服。細嚼連皮胡桃肉過口。死胎當下。生胎能全。其痛即止。若傷去而胎氣未安。宜紫蘇飲加砂仁童便。若跌仆傷疼痛。紅腫不能行動者。宜七星散外敷之。

紫蘇飲 紫蘇當歸白芍炒 川芎 各一錢 人參 一錢 陳皮 八分

甘草五分 大腹皮一錢 生薑二片 葱白

四莖 加砂仁 八分 童便和服。

七星散 川烏三錢 草烏三錢 桂枝當歸甘松紫荊皮 各五錢

細辛二錢

右七味研細末。加飛麵一兩五錢。用高粱燒酒調和。隔水燉熟。數傷處。輕者一次即愈。重者兩次。痛止腫消。

若因勞碌胎動血崩者。宜生熟地湯。

生熟地湯

生 地酒炒

大熟地各三

人參當歸白芍各二

阿膠

蒲黃炒

棗

仁各三錢炒

艾八分

川

斷五分

桑寄生錢五

酒炒

櫻櫚皮一錢

杜

仲三錢薑汁斷絲

黃酒一杯和服。

辨產篇

凡胎未足十月。忽然腹痛。或作或止。或痛不甚者。名曰弄胎。或腹雖痛甚而腰不甚痛者。或胎高未陷者。或穀道未挺進者。或水漿未破者。或漿水雖出而腹不痛者。皆屬氣虛。並非正產之候。惟宜獨參湯助之。慎勿妄投藥餌。致產母驚恐而妄亂用力。直待子逼產門。腰重極痛。眼中如火。穀道挺進時。方可用力。兼服催生藥。如千金方用阿膠三兩。車前一兩。滑石一兩。爲末。飲方寸匕。不下。少頃再服。此藥臨時服之。不可先服。

產戒篇

臨蓐飲食宜調。不可不食。受饑。使母無力。尤不可過食太飽。使兒氣不能運。多致子母受傷。因而產後發熱泄瀉。中脘結痛。皆緣飲食所傷。即湯水亦宜少用。往往有膀胱破損。良由引飲過多。尿脬脹滿所致。種種危候。尤忌飲酒。每致血逆上奔。急與熱童便壓之。然多有不救者。

應變篇

產婦或不順理。以致胎逆不下。即用葶藶子十四粒。硃砂雄黃各五分。蛇蛻一尺。燒灰。麝香一字爲末。將水和作一丸。先用川椒湯洗臍中。置藥於內。再用紙數重覆蓋。以帛繫之。胎下。下即去藥。切勿遲緩。見醫通。

若冬月胎死堅硬。腹中覺冷。用香桂散加烏頭。及黑神散。琥珀黑龍丹。皆可應用。

香桂散 肉桂三錢

麝香三分

生川烏三錢

酒煎。和滓服。

黑神散 見前拯危篇。

琥珀黑龍丹。五靈脂酒浸。去砂。當歸川芎地黃良薑各三兩。五味入陽城罐

內。鹽泥封固。炭火煨通紅。去火候冷。研細。入下項藥。

琥珀百草霜。硫黃花蕊石煨。乳香各三錢。五味研細。同前藥和勻。米

醋和丸。如彈子大。臨服將丸以炭火煨紅。投入生薑汁內。浸碎研化。以無灰

酒入麝香少許。不時頻服一口。加童便尤宜。

胞衣不下。古法用蛇蛻一條。香油燈上燒研。入麝香爲末。童便調服。或加蘄艾阿膠蘇木各一錢。麥芽末打糊爲丸。名烏金丸。童便服之。兼治難產死胎不出。單方用草蘇子肉。研塗產母右脚心。胞衣下。急洗去。緩則腸亦出矣。

調攝篇

產後九禁。一禁臥。二禁酒。三禁浴。四禁寒。五禁汗。六禁下。七禁利小便。八禁寒涼。九禁起動作勞。

拯危篇

產後血暈。最爲危急。無暇延醫。卽問收生婆產婦下血多少。如下血太多。陽脫陰離。危在頃刻。藥煎不及。用人參三五錢。口嚼喂之。隨卽用清魂散。六味回陽飲。以救之。遲則不及矣。曾見一婦人頭生。素常嬌養。體弱不能忍痛。腹稍痛。張皇坐草。而痛不連腰。以爲正產。至四五日而胎不下。祈神服藥。至六日胎下。產婦上床而臥。卒然暈倒。四肢厥冷而氣絕矣。

敗血上衝有三。或歌或舞。怒罵談笑。口咬拳打。病如顛狂者。此敗血衝心。多死不治。醫通用花蕊石散最捷。琥珀黑龍丹亦效。症屬極危。非用峻厲之藥。不能起死回生。切勿因係石品棄之。

花蕊石散 花蕊石 五兩

硫 磺 二兩

二味研末。入陽城罐內。鹽泥封

前。固。煨一伏時。研如麵。每用二錢。童便調服。

見醫通。琥珀黑龍丹 見

若衝胃者。用平胃散加薑桂。若衝肺者。面赤嘔逆欲死。用參蘇飲。甚者加芒硝蕩滌之。

平胃散

蒼

朮四兩米泔浸再
用麻油拌炒黃

厚

朴三兩去皮
薑汁炒

陳

皮三兩炮去
浮白

甘草三兩

四味為散。每服四五錢。加肉桂五分炮薑五分水煎

溫服。

參蘇飲 人

參五錢

蘇

木五錢

加芒硝三錢

水煎。入童便熱服。大

便澹泄者禁用。

見醫通。

去去疾篇

或因小兒鼻孔吹乳。名曰乳吹。致乳腫脹而痛。用錫茶壺一把。去蓋。將乳塞在茶壺內。叫人吸茶壺嘴。用力吸久。其乳汁吸出。即腫消不痛矣。

治乳吹結核腫痛。輕者用生鹿角尖酒磨二錢煎服。即消。重者腫硬。恐成乳癰。用蚤休三錢。大貝母三錢。研末。黃糖拌藥末。黃酒調下三錢。蓋被取汗可消。外用油梳烘熱熨乳亦可消。

產後呃逆者。胃寒所生。因受風冷搏氣逆上。乃胃氣虛寒之極。宜理中湯加丁香末。應者急投。參附遲則不救。

理中湯 人

參三錢

白

朮三錢

乾

薑三錢

甘

草三錢

加丁香八分。分三服。

產婦尿胞損破。致病淋瀝者。法當峻補。用天然黃絲二兩。白芨三錢。人參三錢。水煎。至絲爛如錫。服勿作聲。作聲則泄氣無效。各補胞飲。又方。用參耆朮草四味。熬膏。猪羊胞煎湯。饑時調服。月餘胞長。淋止。

金匱云。少陰脈滑而數者。陰中生瘡。陰中蝕瘡爛者。狼牙湯洗之。狼牙草。市中少有之物。非狼毒也。

又方。治陰癢痛甚者。苦參蛇牀子各一兩。煎湯洗之。頗效。能去濕熱也。外用柳花散。搽患處。

柳花散 黃蘗末 五錢

青 黛 八分

肉 桂 五分

冰 片 一分

共研細末。搽患處。

產後麻木者。症因去血過多。氣無所附。是以遍身手足俱麻。木枯風動。賊傷脾土。是以少腹大痛。頭暈欲死。此非惡露凝滯。乃中虛氣血虧損之故。宜六君子湯。加歸耆肉桂。再服十全大補湯。加阿膠鹿角膠。其病則安。

六君子湯 人參 白朮 土炒 茯苓 各二錢

甘草 炙 半夏 製 陳皮 各一錢

十全大補湯 生薑三片 大棗三枚 加當歸三錢 黃耆二錢 肉桂去皮一錢
見前去疾篇加阿膠三錢 鹿角膠三錢 黃芩炒

產孕集終

產孕集補遺去疾篇

產 孕 集 補 遺 去 疾 篇

