



小兒衛生總微論方卷第十六

寒熱論

小兒寒熱者由風邪外客於腠理飲內漬於藏府致血氣不足陰陽更勝而所作也陽勝則發熱陰勝則發寒陰陽交爭邪正相干則寒熱往來時發時止然此症與瘧相似而發寒不致戰慄發熱不至悶亂所以異也今叙方于後

人參前胡散治寒熱往來

人參去芦

柴胡

去苗各一兩

前胡

去芦一兩

桔梗

去

地骨皮

去骨

半夏

湯洗七次焙乾

甘草

炙各半兩

右為細末每一錢水一盞入生姜二片煎至半盞

去滓服無時

秦艽湯治如前

秦艽去芦

鱉甲一兩醋炙

大黃半兩判

竹筴一分

麻黃去根節

甘草一分

右為粗末每服一錢水一盞入葱白二寸煎至五

分去滓溫服無時

又方治如前及治赤氣中人

右以猪後蹄燒灰研末以乳汁調服一錢治中熱

亦佳

香甲散治寒熱肌瘦

木香一兩

鱉甲一兩酥炙

川大黃半兩判

檳榔三個

當歸去芦洗淨

陳皮湯浸去白

柴胡去苗

知母半兩

甘草半兩

右為粗末每服一錢水一盞生姜二片煎至六分

去滓溫服無時

二姜圓治痺疾發寒熱似瘡

乾姜

良姜各等分

右細剉同炒黃為細末餛餅和圓菜豈大每服三

五圓煎楊枝湯送下空心服亦治瘡

冬瓜汁治生下至五月以裏乍寒乍熱往來無時

右以冬瓜炮熟絞汁與服或剉柳枝煮汁浴兒

瘡病論

瘡病者由夏傷於暑客於膚裏致肌腠虛隙至秋又寒濕乘之動前暑熱邪正相搏陰陽交爭會遇有時更相勝負陽勝則發熱陰勝則發寒陰陽互勝則發寒熱熱則煩躁悶亂寒則慄慄戰悚陰陽會遇交爭已過邪正相離則寒熱俱歇若邪動氣至又復發作故瘡休作有時也其發晏者邪正會遇遲也其發朝者邪正會遇早也其間日發者邪氣入深而行差遲不能日作故間日乃發也今叙方于後

飛仁湯治小兒發瘡不止

飛仁

湯浸去皮尖并雙仁者煮炒黃一兩

鱉甲

一兩酥炙黃去裙爛

桂心

半兩

黃芩

半兩

川升麻

半兩

赤茯苓

去黑皮半兩

右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服無時

靈豆膏治如前

大蒜

一枚去皮研

巴豆

三箇去皮心

右同濕紙裹煨熟一處研為膏圓麻子大每服二三錢圓醋湯送下吐瀉即差後用藿香湯補之

藿香湯

藿香去土

肉豆寇

麩裏煨

甘草

各一分

右為細末每服半錢水一盞煎至七分溫服連服三服無時

朱衣使者治如前

砒

半兩細研

菴豆末

一分

黑豆末

一分

右同研勻細滴水研黍米大辰砂為衣間日發者於好日夜臨臥時面北冷醋水送下二圓頻日發

者只於當日夜服如上法兒極小者與一圓端午日合佳

又方如前治 右以生鹿角為細末發已前乳汁調服一字

又方治如前 右以鷄脰中黃皮炒極燥為末乳汁服之男雄女雌

又方治如前 右以蛇蛻皮一兩取每條長五寸以上者燒灰存性研細末每服一錢新水調下未發前服三歲上半錢下者一字

又方治如前 右以黃丹二分蜜水和之與服如冷者以酒和冷服

萬金丹治痰盛挾積癰瘡久不差

阿魏 一錢湯化去砂石和麩作餅煨熟對細末炒干 朱砂 一分研水飛

砒霜 一錢用醋半盞慢火上熬醋盡 丁香 半兩 巴豆 七個去皮膜油尽取

木香 半兩 相思子 十四個

右為細末煉蜜和圓黍米大末發前所水下一二粒一歲加一粒至十歲上止十粒絕早服忌熱物一辰時

知母圓治瘡疾熱甚者 知母 一兩微炒

鱉甲 一兩酥炙焦去裙攔 川大黃 一兩細剉微炒 朱砂 一錢水飛研

赤茯苓 去黑皮一兩 川芒硝 半兩 川升麻 半兩

龍腦 一錢研

右為末拌勻細煉蜜圓黍米大每服五七圓生薑湯送下得利即愈量大小加減

小兒溫瘧灸兩乳下一指三壯如小麥大恒山湯治小兒瘧疾

恒山 一兩到 小麥 三合 淡竹葉切一升

右為粗末水煎去滓臍中兒服一規殼半月者二規殼滿月者半小合以意增之

烏梅圓治瘧疾寒甚者

烏梅肉 一兩 焙乾 母丁香 半兩 桂心 半兩

當歸 去須洗 焙半兩 乾漆 半兩炒烟出令

右為細末入研細射香末半錢拌勻煉蜜和圓黍

米大每服十圓粥飲下

茶清散治諸瘧疾

用人言 一兩 黑豆 一升 河水 四升

右同煮至水盡炒乾為末每服一字或半錢熱多者臍茶清調下寒多者草茶清調下間日者投發夜臨臥服頻日者但臨臥忌熱物一辰時此方宜斟酌

鬼見愁治乳妳嬰小患瘧無計可治用此的驗神應

草葉 代赭石 用丁頭五粒火煨 朱砂 透明塊子 半錢水飛

砒霜 皂子大 右三味用濕紙七重同裏慢火

內煨至紙乾取出頓地上出火毒次入腦射各半

字金箔五片同研共為細末每一字於發日早以麻油一滴調藥傅鼻尖上立止

草菓子湯治脾寒發瘡

草菓子 三個 甘草 五寸 大棗 七個

右並剉碎分三服水一盞煎至半盞放溫服更量

大小加減

符法治諸瘡 倦 捺 謹

右於發日不得梳頭洗面漱口及弄水漿日出時用朱砂書上第一字於淨紙上剪下於兩脚心於兩手心兩頰上并額上并前後心共九處帖了

然後喫飲食如未止書第二字永除根本鮮有

書及第三字者

弄舌論

小兒弄舌者其症有二一者心熱心繫舌本熱則舌

本乾澁而緊故時吐弄舒緩之二者脾熱脾絡連

舌熱則舌亦乾澁而緊故時吐弄舒緩之皆欲飲

水心熱則發渴脾熱則津液耗皆引飲二症相似宜

加審別心熱者面赤睡即口中氣熱時煩躁喜就

其冷啖牙上竅治宜退熱脾熱者大便稠硬赤黃色

面黃身亦微黃宜微導之不可用冷藥又不可轉下

若悞下之則脾胃虛津液耗又加五心煩熱面黃肌

瘦变为疳也若大病未已用藥弄舌者大凶也今叙

方于後

人參知母散治心熱弄舌

知母一兩 藍葉半兩 人參去芦半兩 鈞藤一分

川升麻一分 乾葛一分 黃芩一分

右為細末每服一錢水八分入竹瀝三兩滴煎至

五分去滓溫服無時

瀉黃散治脾熱弄舌

藿香葉去土七錢 山梔子仁一兩 石膏半兩

甘草三兩 防風去芦并了枝切焙四兩

右並剉以蜜酒洒拌勻炒香燥為細末每服一錢

水一盞煎至六分去滓放溫取清汁服一方有山

藥二兩

鬼音病論

小兒鬼病其論有二一者聖惠云小兒生十餘月已

後母又有娘因以乳兒令兒生病其候精神不爽身體

痿痺骨立髮落名曰鬼病又曰繼病又曰交妳二者

巢氏云小兒在母胎妊之時其母被惡神導其腹中

胎氣至兒生下往々疳羸微々下利寒熱往來毛髮

焦豎多嗔不悅其候頗似於疳今叙方于後

虎骨丹治鬼病 虎頭骨塗酥炙 鬼臼一兩末

香草龍膽去芦 鬼箭取刺 琥珀半兩令研

白膠香半兩令研



右為細末同研勻煉蜜和圓黍米大每服十粒乳香湯下無時乳香湯送下

又方治如前右取伏翼蝙蝠是也燒灰研細末粥飲調下半錢日三若多令香熟嚼爛哺兒亦効如得重一斤者尤佳又得黃精自然汁塗灸之最良又方治如前

右取百勞鳥毛與兒帶之又名博勞又名鴟

### 骨蒸論

小兒自周晬已上至十餘歲血氣隆盛因厚衣溫煖將養過宜食羊肉肥甘果食諸物臟腑生熱熏蒸肌骨身體發熱夜有盜汗漸瘦悴乃成骨蒸若不即

治則為急勞今叙方于後

秦艽散治潮熱瘦減食

秦艽去芦切焙

甘草炙

各一兩

乾猫兒薄荷葉半兩不見火

右為粗末每服一二錢水一中盞煎至七分去滓

溫服食後

地骨皮湯治骨蒸體熱肌瘦

地骨皮去骨

胡黃連各一兩

鱉甲炙

去垢

柴胡去苗

犀角銹取

嫩宛枝剉

川大黃炮

知母各半兩

右為細末每服一大錢水一盞煎至五分去滓服

無時

麥煎散治童男室女骨蒸肌熱盜汗成食痿瘦

鱉甲

醋炙去裙爛

大黃

紙裏煨熟

恒山柴胡

去苗

赤茯苓

去黑皮

乾生漆

炒烟

當歸

去芦洗淨酒浸一宿

白朮

石膏

生地黄

一兩

甘草

半兩炙

右為末每服二錢水一盞入小麥五十粒煎至六

分去滓溫服食後臨臥有虛汗者加麻黃根兩

連芫散治骨蒸肌瘦漸為急勞

黃連

去須一兩

秦芫

去苦

天靈蓋

一枚塗酥炙黃

甘草

半兩炙

右為細末每服半錢粥飲調下無時

腹皮青黑論

小兒腹肚皸虛薄為風寒邪氣所乘而真氣微弱不

能滋其血氣失榮養之致邪氣著而不去故腹皮卒

然青黑也此候危惡今叙方于後

二聖散治腹肚皮膚忽然青黑

右以胡粉苦參各一兩為細末每服一錢溫酒調

下兼塗患處

又方治卒腹皮青黑不能喘息宜急用此方

右以大青為末納口中酒送之

又方治卒腹皮青黑不急治頃臈即死

右以酒和胡粉塗之乾則再塗仍於臍四邊各半

寸其鳩尾下一寸共五處各灸三壯

難乳論

小兒難乳有二一者兒初生客風邪熱中臍流入心脾之經即令舌厚唇燥而急口不能乘乳故乳而不能啞飲也二者兒初生時拭掠口中穢血不及嘔而入腹則令兒心腹痞滿短氣促急故口不能吮乳飲之也今叙方于後

五福化毒丹治心脾經熱舌厚唇燥急不能乘乳

生乾地黃焙秤各半兩 熟乾地黃焙秤各半兩 天門冬去心秤

麥門冬去心秤 玄參去芦 甘草炙

甜硝各三錢 青黛一錢半

右先六味為細末後硝研入硝黛拌勻煉蜜和圓鷓頭大每服半圓或一圓食後水化服之無時

又方治兒飲乳不快喉舌似緊不相從順

右以沙牛角燒灰存性研細末塗乳上放兒口中

捻汁飲吮嚥下

又方治膏腹痞滿短氣促急不能飲乳

右取鷓子殼燒灰酒服半錢

又方治心胃熱痞飲乳不快

右以生葛根杵爛絞汁飲灌之如無以乾葛者

灌之亦得

浴小兒不能乳

右以雀矢四枚末之著乳上令吮之兒大增服

浴小兒初生不飲乳及不小便

右以乳汁二合葱白一寸四破於銀器內煎取一合藥注灌之立效

### 大小便論

小兒大便有秘澁者有不通者皆由府臟有熱乘於腸胃、熱則津液少、則糞燥結實而鞭大便難下則為秘澁甚者則不能便乃為不通也小便有滴瀝者有不通者由小腸與膀胱有熱二經俱主水水入小腸傳於膀胱循水道出而小便也熱氣乘之則水耗少而行澁故滴瀝而下也甚者水道乾而不通也若熱入小大二腸則雍滯不得宣利故大小便俱不通也

金花散治大便秘澁便難

皂角仁炒一錢

檳榔生一個

甘草一錢

右為細末每服一字或半錢沙糖熟水調下

栢子仁膏治如前

栢子仁棟淨

松子仁

胡苑仁各等分

右研和膏每彈子大熱湯化下未快再服

人參荆芥湯 右以人參荆芥各自為末每用人參

末半錢荆芥末一錢和勻水一盞煎至七分放冷

量大小時、與服

木香麝散治 大便不通

木香 訶子煨取皮等分

右為粗末每半錢或一錢水煎去滓放溫時服  
又方治如前 右以猪苓一兩為末水少許煮雞矢  
白湯調下一錢差

又方治如前 右以醇不拘多少先搗乾曝為末麩  
糊為圓菜豆大每服五七丸至十餘丸量大小米  
飲下

木通散治小便澁滯滴瀝不得通快

木通 滑石 甘草 炙 煇硝 研各半兩 三葉草 一分

右為末細勻每服一字或半錢沸湯點服乳食前

滑石散治如前 滑石 瞿麥 葵子炒 芸薹子

甘草 炙 山梔子仁 蔚金 海金沙炒各一錢

右為細末每服半錢煎燈心葱湯調下乳食前

如聖散治如前 海金沙炒 滑石 并分

右為細末每服一字或半錢煎燈心湯調下乳食前

八正散治如前又治心經邪熱又治熱淋

瞿麥 木通 山梔子仁 地篇蓄

車前子 甘草 滑石 各三錢 大黃 一錢半

右為細末每服一錢水七分入薄荷二葉同煎二

分去滓溫服無時

治小兒小便不通三日欲死

葵根 一握 壁魚 七枚 別研

右以水一大盞煎葵根取汁六分入壁魚末再煎

三五沸去滓放溫服

治小兒小便赤澀不通 蒲黃 滑石 各半分

右研勻細每服一錢煎燈心湯調下沙糖水亦淨

亦治淋痛乳食前

治小兒卒不得小便 以鹽安臍中灸之

治小兒小便赤澀不通

滑石 二兩 木通 二兩 葵子 一合

右為粗散每服一錢水一小盞煎五分去滓溫服無時

冬葵子散治小兒卒小便不通小腹急悶

冬葵子 一兩 木通 半兩

右為粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓不

拘時候

捨頭散治小便不通 延胡索 去皮 川苦朮 去核

右為細末每服半錢或一錢捨頭湯調下如無捨

頭即於湯中滴油三兩點食前服一方車前草小

麥各一升水二升煮取一升二合去滓煮粥服日

二量兒大小加減

葶藶散治如前 葶藶 半兩炒 青皮 去穢炒

右為細末每服半分或一分空心姜湯調下乳食

疆蚕散治如前 白疆蚕 炒去絲嘴 當歸 去黃洗淨

右為細末每服半錢或一錢煎車子湯調下亦治

血淋若沙淋者煎羊蹄草湯調下無時

又方治如前 右以綿黃耆為末每服一錢水一盞煎至五分溫服無時

又方治如前 右以烏梅肉為末勿服一錢水調服神効 又方 右以地扁竹煎湯放溫服飲如熱水

白朮膏治小便澁滯不通脘腹痞滿

白朮 半兩 白茯苓 一分 澤瀉 半兩

人參 一分 滑石 一分

右為末煉蜜和膏每皂子大米飲化下亦治脾胃不和 不美乳食

朱砂散治小便赤澁不通心神煩躁

朱砂 兩 滑石 半兩 犀角屑 半兩

黃芩 一分 車前子 一分 甘草 一分

右為散拌勻每服半錢煎竹葉湯調下乳食前

葵石散治小便不通悶亂 葵根 一握 剉

滑石 一兩 木通 一兩 牽牛子 半兩 炒

右為粗散每服一錢水一大盞入燈心葱白各少許煎至六分去滓放溫食前服

鷄腸草散治小腸膀胱有熱小便難澁服冷藥過多

却致小便不能禁止 鷄腸草 一兩

牡蠣粉 三分 龍骨 半兩 麥門冬 半兩 焙

白茯苓 半兩 去黑皮 葉燹蛸 半兩 煮 半兩 水

右為粗散每服一錢水一盞入生姜二片棗一個

煎至六分去滓温服亦治遺尿乳食前

郁李仁丸治大小便秘瀉不通

郁李仁二兩湯浸去皮 大黃一兩 檳榔三兩 青皮去穢半兩

右為細末煉蜜和丸菘豆大每服十九至十五丸

姜湯下無時

芎藭散治如前 芎藭一兩 川大黃三分剉碎

郁李仁三分湯浸去皮微炒黃

右為散每服一錢温水調下乳前食

朱粉丹治如前心神煩腹脇悶臥中多驚

朱砂半兩研細水臈粉一錢 續隨子半兩

右為末研拌勻煉蜜和丸黍米大每服七粒温水

送下食後

木通剉散治大小便不通 木通

瞿麥

滑石 山梔子仁各三錢 茯苓去黑皮

甘草各四錢 續隨子三錢 車前子一分

右吹咀每服一錢水一盞煎至半盞去滓温服更

量大小加減乳食前

紅綿散治如前 朱砂研水飛 蔚金 輕粉各一分

馬牙硝半兩 右入射香少許研勻細每服半

錢薄荷蜜水調下無時

又方治如前 右以滑石為末每服半分清油調如

稀糊再入好酒一茶脚許攪勻服之通如再服之未



又方治如前 右以不蚰皂角去皮核生為末用二錢取獨頭蒜一顆沙盆內同皂角末磨擦蒜及以醋米醋少許和之捻作餅子如香花子貼臍中通立又方治如前

右以露蜂房燒灰研細酒調一錢或半錢日二

郁○李仁膏治癰禰小兒大小便不通

郁李仁去皮兩浸 滑石 半兩研

大黃炒去粗皮實者一兩剉碎酒浸半日控乾

右先將郁李研為膏和二味九黍米大每服一二十圓量大小與小者乳汁下大者薄荷湯下要疎風熱痰實服但微澹極穩

### 五淋論

淋病有五一日熱淋淋血二曰寒淋淋膏三曰氣淋四曰

勞淋五曰石淋五淋之中小兒有所患者惟寒熱氣

之三症外勞石二症虛極所致小兒未親色慾故無

患者內石淋恐兒本怯腎弱者有之亦千金中無一

矣今並具五淋之症于下熱淋者因熱乘小腸膀胱

二經皆主水入小腸傳於膀胱行於水道出於陰

中而為小便也故陰為水液之路膀胱為津液之府

熱則水道燥燁水液行澀致水道不利小便淋瀝因

名曰淋其候出少而起數小腹急痛引臍連莖中痛

也熱甚者溺血故亦曰血淋血得熱則疏散滲入於

胞隨淋溺而下也。寒淋者因寒冷干於二經而作其候先寒戰而後溺之是邪氣與正氣交爭也寒氣勝則發寒戰正氣勝則寒戰解而得溺溺則出少澁滯小腹連莖中而痛寒甚者溺白如稀膏故亦曰膏淋亦如痢下熱則便血寒則便膿也痢下者寒熱搏於大腸也今淋者寒熱搏於小腸也。氣淋者小兒因怒而啼氣入二經留滯不散邪正相搏胞內氣脹其候每溺則臍下慙膨水道澁不能下莖中相引而痛常有餘瀝也。勞淋者因房事過度腎虛精竭氣通於陰水道乾澁之所為也腎與膀胱為表裏今腎虛則膀胱亦虛不能約制其水故水液頻數而下水道乾燥則不能通利其候尿留莖內數起不出引小腸連莖而痛也。石淋者小者為沙大者為石皆云腎主水水為熱結化而為石其言雖近而不知其本也且腎有二藏左者為腎右為命門土水而為壬聖濟經云壬者一水一石之謂歟不知一水一石之道告未達生化之妙本太一精真在上兆於水立於石是腎中本有真之物也患者乃真精化而真物出焉其候沙石從水道中出塞痛悶絕故痊者鮮矣

琥珀圓治熱淋疼痛

琥珀兩研

乳香半兩研

桃膠半兩研

右拌研勻糊為丸菜豆大每服一二十九煎萱草

湯下

又方治如前 右以黃芩二兩絹袋貯之用水二升煮取一升時服無時

蒲黃散治血淋澀痛

蒲黃半兩 冬葵子半兩 生地黄半兩

右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服無時

又方治如前 右以雄鷄屎尖白如粉者炒微黃研

細末酒糊圓菜豆大酒下三五九日連服四五服

取効

玉粉丹治寒淋膏淋如神又治下痢

牡蠣粉四兩研 乾姜末二兩炮

右拌勻麩糊為丸麻子大每服一二十九米飲送

下無時

二膠散治氣淋小腸慙慙不通 菀膠 李膠等分

右為末每服半錢葱白湯調下無時

又方治氣淋 右以蚕退紙燒灰研細每服半錢或

一錢煎去心麥門冬湯調下無時

又方治如前 右以馬兜鈴炒焦黃為細末每服半

錢或一錢射香酒調下溫酒亦得無時

葵子散治沙石淋痛不可忍 冬葵子一兩 石南葉

榆白皮去末 石葦去毛 木通剉各半兩

右為細末每服半錢葱白湯調下一方只煮冬葵

子汁服

二石散治如前 滑石 石葦去毛各一兩一方 更有瓜樓根一兩

右為末每服半錢煎大麥湯清調下無大麥米飲亦得

治小兒淋閉 露蜂房 亂髮灰等分

右為末每服一錢水調服之日二

又方治如前 以冬葵子一兩杵粗散每服一錢水

一小盞煎至五分去滓溫服無時

又方 以衣中白魚摩臍下及小腹

又方治如前經効小兒諸淋

治小兒遺尿 瞿麥穗 龍膽草去 皂莢去皮弦

桂心各半 人參去 雞腸草一兩 車前子一兩

石葦去毛

右同為末煉蜜和丸小豆大每服五丸食分日三

又方 以小豆葉搗汁服之 以雞腸燒灰研末漿

水調服一錢面壯斗服日三

小兒衛生總微論方卷第十六

小兒衛生總微論方卷第十七

癩疔論

小兒癩亦由怒啼軀氣衝擊腎經氣下通於陰囊故  
令腫大堅硬 又偏腫者氣乘偏虛而作也共有水  
者腎主水下通陰因怒啼軀氣腎水隨氣而下作  
海蛤散治氣擊於下陰腎腫大而堅硬

海蛤三分

懷香子

三分炒

薏以仁半兩

白朮半兩

檳榔

半兩炒裏炮

右為細末每服半錢溫酒調下早晚乳食前

又方治外腎腫硬漸欲成癩

右以乾地龍去土盡為細末唾調塗之常避濕地

勝金龜仁膏治疔癩腫大

右杵去皮尖龜仁為膏傳之

川練子丸治疔氣偏墜一大一小

川棟子去核取肉一錢 續隨子去皮淨 輕粉二錢

右為細末麪糊和丸黍米大每服十丸葱白湯下

不過十服愈

荆三稜散治如前 荆三稜炮 斑蝥去足并翅

右為細末每服半錢米飲調下

三香昆布丸治如前 薰陸香三分 青木香三分

藿香葉去上兩 昆布三分洗去鹹味 牽牛子半兩微炒

右為細末棗肉和丸麻子大每服十九空心牡蠣

湯下

治小兒狐疔傷損生癩

地膚子一兩半 白朮一兩三分 桂心三分

右為末煉蜜圓如小豆大酒服七圓量大小增減

又方治如前 芍藥 茯苓各三分 防葵一作防風

大黃各半兩 半夏 桂心 蜀椒去目并閉口者一分

右為末煉蜜和丸如大豆每服一圓日三四

五等圓治小兒外核堅癩或陰外偏大

黃蘗炒 香豉 牡丹去骨用皮 防風去芦桂心各半兩

右同為末煉蜜和圓如大豆許三歲兒每服三丸

又方治小兒癩

石以蜥蜴二条燒灰研為末酒服之一二歲用分  
治小兒卵腫以鷄翅大莖燒灰服之隨在左右取  
翅能治陰大如斗

治小兒氣癩 土瓜根 芍藥 當歸去頭洗焙各一兩  
右吹咀每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服量  
大小加減

又方治如前 以三月上除取白頭翁去芦槁之隨  
左右偏處傳一字作瘡二十日愈亦治腎

癰又方治小兒卵腫 搗墻衣傳上

治小兒偏癩或氣攻小腹疼痛

蛇床子為末半兩馬鞭草取汁一合

右相和如膏塗病處

又方治如前 以枳殼去穢三兩微炒杵為細末每  
用煎至栢枝濃汁調膏厚塗腫處良妙

治小兒陰癩腫大不消

以鴈沙一分以水研化塗之立効

治小兒陰癩偏大氣脹

以雄黃一兩研極細甘草一錢剉同煎湯淋凜  
又方治如前 牡丹皮去心 防風去芦并人枝等分

右為末每服半錢米飲調服無時

治小兒卒卵腫痛而脹 赤小豆末中 桂心末一

右以生牛蒡取汁二大盞煎稠入二味相和為膏

塗病處即消

治小兒陰囊腫痛虛熱以丘蚓屎用甘草汁調塗之  
又方治疝氣腫痛連小腹如刺

右以生財干杵汁服之亦可作丸服

又方治如前 右以藜葉煎濃一升煮七合每服半  
合頓服量大小加減

蜘蛛散治癩疔或腫堅或偏墜或大小時上下

蜘蛛焦炒四個

桂心半兩

右為散每服一字或半錢米飲調下或蜜丸服

玉粉散治水癩上下不定

煨熟牡蠣粉二兩

炮烈乾姜末一兩

右拌勻冷水調稠得所塗病處以小便利即

愈此方若用糊為圓服之治冷淋膏淋下痢膿血

及婦人帶下

陰腫生瘡論

小兒有陰腫及生瘡者由腎經虛而邪氣乘之腎氣

通於陰邪搏衝於下則陰為腫甚者衝攻以生瘡又

有因風濕外干皮膚則陰為之痒搔之以成瘡者並

叙方于後

苑仁圓治小兒陰腫 白蒺藜半兩炒

苑仁

三分湯浸去皮尖并嬰仁者 炒黃

牡丹

去心半兩

桂心半兩

郁李仁

一分湯浸去皮炒



右為細末煉蜜和丸黍米大每服十圓溫酒下  
胡連散治陰腫生瘡

胡黃連

半兩

胡粉

半兩

白礬灰一分

右為細末每用少許油調塗患處一方只用黃連  
胡粉等末香脂油和傳

又方治如前 右以人屎或狗屎燒灰傳之

又方 右以馬骨或狗骨燒灰研細傳之

治小兒陰腫 以狐莖炙焦黃杵細末服之

以蕪青鴛傳上 以衣中白魚傳之

以斫取棗白皮汁塗上

治小兒陰瘡痛痒搔之黃赤水出不差

五倍子

鴨茶等分

右為末更入膩粉少許先以漿水葱白椒煎湯洗  
之帛子拭乾用藥傳之

治小兒陰上生癰瘍醫不能療

右以鰲甲一枚燒灰研末鷄子白和傳之

治小兒陰瘡

右以黃蘗水煮汁洗了拭乾白蜜塗之

治小兒惡毒瘡腫生於陰髀間痛牽入腹不可忍一

宿殺人 右以茴香苗葉鴛取汁量大小與服日

二三其滓傳腫處冬月無苗葉取根用

又方治小兒陰腫生瘡

又方治小兒陰腫生瘡

右膿煎狼牙草湯洗之冬月取根用或搗爛傳之

治小兒卒然陰腫痛脹

赤小豆兩 肉桂末 生牛蒡根取汁一盞

右先將牛蒡汁煎稠後入二末和膏傳病處

治小兒陰腫虛熱作痛

以蚯蚓糞用甘草汁調熱熱塗上

治小兒陰頭忽生腫瘡此名尿灰瘡

以黑豆皮嚼爛傳之以伏龍肝研末和鷄子調敷

又方治陰頭生瘡

右以蜜煎甘草塗之若陰頭生瘡不痒不痛但潰

蝕者此名下疔瘡方具于後

又方治陰腫癢搔之成瘡

蛇床子

細辛 吳茱萸去芦梗各一兩

右為末每用一匙水一大碗葱白三莖煎至數沸

通手淋洗三五遍極妙

又方治陰痒生瘡

胡椒半兩 紫稍花一兩

右為粗末水煎浴洗如前

又方治如前

腋氣論

小兒腋氣者血氣不榮腋下有孔一如毛孔而稍大

臭穢之氣從其中出若狐氣之臭故俗呼曰狐臭也

亦有父母遺體相傳者又有乳養之人而有染著者  
今叙方于後

綠銀散治腋氣

銅綠

密陀僧

各三錢

白及

一個燒存性九錢

右為細末每用半錢津唾調塗腋下三五日一次  
以効為度

又方右以輕粉一錢七分兩處射香酒調一半服  
之好酒調一半塗腋下以不臭為度

又方右以左挑開通錢五文火燒通赤內醋中淬  
之凡七次杵羅為末老生姜一塊刀背斫斷將生  
姜以斫斷處擦腋下有毛擦不倒者乃是病也拔  
去其毛以生姜自然汁調藥塗之屢驗若此小腋

氣汗氣只以生姜擦塗腋下亦可

### 顛門腫陷論

小兒初生皆有顛門者藏氣未充骨髓未完滋養未  
備故也臟腑皆以脾胃為養兒自生以後得五穀  
所滋則臟氣充而骨髓完所以兒至能食則顛門合  
也顛門者繫於脾胃聖濟經言衛顛之天五者土  
也脾胃屬土小兒有顛腫者由脾胃不和冷熱不調  
或怒啼飲乳或喘急咳嗽致陰陽氣逆上衝而顛腫  
也熱則腫而軟冷則腫而硬又有顛陷者或因瀉痢  
或小便頻數或曾服清藥以利小便或本怯氣弱或  
別病纏綿使藏虛而不能上榮於顛故令顛陷也

此皆小兒惡症得愈者鮮矣

治小兒顛腫軟

右以青黛冷水調傅之及蕪服化毒丹方已具前

治小兒顛腫硬及陷

乾熟地黃

八錢培拜

山茱萸

去肉

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

去心

白茯苓

去皮各三錢

石為末煉蜜和丸菜豆大三歲下者三五丸溫水

化下空心及蕪服錢氏益黃散

治小兒顛陷以狗頭骨炙黃杵末鷄子清調傅

滯頤論

小兒滯頤者脾冷所致也脾之液為涎脾冷則不能

約制故涎常從口角流出滯清於頤頤

浸久生瘡名曰滯頤

治小兒滯頤涎從口出浸清頤頤口角下生瘡以桑

白皮汁塗口中

又方治如前以東行牛口中沫塗兒口及頤上

治小兒口角下黃肌瘡以殺羊鬚燒灰和臘月猪

脂傅上以羊角燒灰和臘猪脂傅

溫脾圓治脾冷多涎流清頤下生瘡

丁香

木香

半夏

用生薑六兩同杵碎炒黃

色各一兩

青皮

去穢

白朮

乾姜

剉碎微炒各半兩

右為細末煉蜜和丸黍米大每十九米飲下無服時

温脾散治如前 丁香 一兩 肉豆蔻 麩煨 棗

半夏 白礬水浸 去滓炒焦 白朮 乾姜 炮 人參 去芦

甘草 各半兩 右為末每服一錢水八分生姜

二片煎至五分去渣温服食前

又方治口中涎出流瀆頰下不乾

右以白羊屎內口中服前藥仍更洗瘡淨以燒錫

末傳之

腸癰論

小兒腸中有癰瘡者由寒熱之氣搏於腸間氣血結

滯而生也其候食少腹中痛悶小腸微強者是也

治小兒腸生癰瘡 右以鯉魚腸煮令食之

針刺誤傷論

小兒有因動作誤被針刺骨竹木簽刺傷而入肉或

已折在內不出者叙方于後

右以白梅肉爛杵和象牙末傳上若針即以象牙

屑水調傳之或以磁石末傳之仍更以瞿麥為末

水服方寸匕或者煮汁飲之日三

又方以松脂如乳香者末傳之帛裏三五日不覺而

出落

諸物梗喉論

小兒有誤吞諸物在喉中不能下不能出妨碍飲食

氣出不快甚者塞刺疼痛時霎不任便致危殆

磁石治悞吞針刺喉中

右以磁石如棗核大磨令光鑽作竅子以線穿繫定令兒含之針則自出若悞吞錢者用棗大

又方治悞吞竹木入喉

右燒秤鍾通赤漬酒飲之

又方治悞吞金銀銅鐵錢物在喉中不下

右以南天燭根燒灰研細熟水調服一錢立下

通氣散治如前及治釣繩之類在喉

鷲毛一錢燒灰 磁石一皂子大塊 象牙一分燒存性

右為細末每服半錢新水調下

又方治悞吞金銀銅鐵錢等物在腹內不下

右以石灰一皂子許硫黃半皂子許同研為末酒服之

又方治如前 右以胡粉一兩水調分服量大小加城

又方治魚骨鯁喉不下

右以礪砂少許口中咀嚼嚥之立下

又方治如前 右以故魚網覆頸項則下未可煮汁

飲之立下

又方治如前 右鷓鴣毛燒灰水調服量大小與

又方治一切諸般骨刺竹木簽刺梗不下

右於臘月取鱖魚膽比簷下陰乾每用少許酒煎

化溫呷得逆便吐梗乃隨出未吐再服其梗刺雖

嚥在腹內久痛黃瘦者服之亦出極妙無鱖魚取

青魚鯉蝨魚膽亦可并治喉痺

又方治苑李果梗 右以狗頭煮湯摩頭上

又方治一切諸物梗喉

右以瞿麥為末水調半錢或一錢服

大聖王屑無憂散治諸物梗喉及一切咽喉諸病解

毒治百疾 玄參去芦 貫衆 白茯苓炒黃

縮沙仁 滑石 荆芥 川黃連去頭

山豆根 甘草炙 鵬砂 寒水石三兩火煨埋土中出大毒

右同為末每用半錢抄口中新汲水一口嚥之治

誤吞叫子骨刺棗核金銀銅鐵瓦石麥稻針刺等

諸物梗喉及治咽喉一切諸疾喉痺乳齧等疾又

解已立杏仁諸藥之毒能殺人者又治蛇蝎諸虫

咬蜚毒氣入腹并心腹脹滿脾積癥塊風涎妳癖

他藥不能治者但服此藥立見効驗能潤三焦消

五谷除九虫益五藏辟温疫無所不治

治小兒一切珠璫錢等梗喉

右以弩銅牙燒赤內水中放冷飲之

### 疣子論

小兒有附貼皮膚生核如麥豆大其色與皮肉無異

謂之疣子有一兩個生者又有數個連續生者割破

其裏狀如結筋亦有微血亦與肉相似此由風邪搏

客血氣变化所生又有一種初生核小日久漸長滋

益而大名曰痛子亦由邪搏血氣变化所生則氣血  
順活故漸長大也今叙方于後

以針或小刀子決疣子四面微出血出取患瘡人  
瘡中膿汁傳之莫得近水三日外膿潰其根動落  
以白梁米粉於鮑肉炒令赤色用農唾相和傳上  
厚一寸許即消

治疣子連續生十數个者

以艾炷一枚如麥豆大灸最生者一个名疣母餘  
即自消核 大者稍增艾炷

治瘤子

以稻科上卷蜘蛛十餘个取頓於桃科子  
枝上放之候絲垂下取東邊撚為線子擊定瘤子

上七日後換其瘤自落沈丹宗待制有老母病瘤

如拳用此法

擊之至三換遂乾落於枕畔淨之

一似乾粟

諸虫咬蜇論

小兒為諸毒虫咬蜇者多於夏熱之時取涼解脫就  
地坐臥忽然悞有觸遇因被咬蜇其痛不可忍直至  
終夜乃歇甚者連引一邊痛無少止又有毒瘡瘡中  
腫潰苦楚或有虫因臥悞入耳中不出者竝叙方後  
治蛇咬所傷

以生猪血調雄黃末傳之如倉卒間只用猪血  
若用雄黃即不驗以冷水先洗瘡了搵乾用茱萸



一合水半碗研取汁服之將渣傳瘡上  
一方用酒調茱萸末服之油調末傳瘡上  
治蛇咬毒氣內攻腫痛不任

以人屎厚傅之用綿裏即消 以白礬雄黃等

分研末於刀頭上煨令熔便滴瘡上即自差

治蝎蜇 以吃勒藤令患人自嚼爛塗之

以乾姜令患人自嚼爛塗之

治蜈蚣咬 以醋磨生缺汁塗之亦治蜘蛛咬以獨

頭蒜磨咬著處痛止為度以活蜘蛛一個安口在

咬著處則自然吸嘔其毒痛乃即減至蜘蛛肚脹

待放之別取如前用不爾則直脹死不休恐傷生

命故放之又同將用過蜘蛛放水申即解其毒不

死 治蜘蛛咬 以活蚯蚓入葱葉筒中緊捻兩

頭勿令泄氣頻一搖動則自然化為水滴在咬著

處又治蜈蚣入耳不出點藥滴入即化為水

治壁鏡咬

以生姜汁調皂角末塗之破者取烏梅肉貼

治蜈蚣入耳以醎醋灌耳中即出以小蒜汁灌之以

馱乳汁灌之以龍腦大豆許線繫左入塞右入

塞左立放以香油灌之

又方治如前 道人頭 棟葉 車前子 各半分

右為末唾調置耳門中則自出傳方人直尋蜈蚣

自送入耳用此藥試之乃出

治百蟲入耳 以椒末醋調灌耳中如行十里久自

以猪肉炙香熟掩耳虫聞則出

又方治如前

白礬

雄黃

各半兩

右研為細末生油調成膏用皂子許塞耳虫自出

### 撲墜損傷論

人之血氣循身周流而無停止小兒有因落床或從  
高墜墮或打撲損傷致血氣失度隨損處停留或流  
行入腹痲蘊不散致羸瘦痿黃時作疼痛當微寒  
翕微熱重者有至筋傷骨損舉動不能叙方于後  
蒲黃散治小兒因打撲墜墮血氣停滯或敗血入腹

不散作痲痛寒熱羸瘦痿黃

蒲黃

當歸

去頭

生乾地黄

各一兩

琥珀

另研

赤芍藥

桂心

各

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去渣温

服無時

茯神丸治如前

茯神

當歸

去頭

麥門冬

去心

人參

去芦

黃芩

草龍膽

去芦

菝葜

湯浸洗去皮

熟研細末

後入

各半兩

右為細末拌勻煉蜜和丸黍米大每服十圓用生

地黃汁少許同酒送下無時

三黃散治小兒因損傷敗血不出但傷不斷者服之

立効

黃連

去頭

黃芩

三分

甘草

半兩

玄胡索去皮半兩 右為末每服一分用童子小便  
半小盞酒三分之二同煎四五沸熱服取下惡物  
立差

靈龜散治撲墜內有傷損

當歸去芦洗淨三分 白芷 漏芦去芦各半兩

右為末每服一錢溫酒調下食前

又方以生地黄不拘多少杵爛絞汁用溫酒調服量

大小與之其効如神如內損熱血衝心甚者氣

絕不認人下咽即醒取下惡物遂好

沒藥丸治撲墜損傷骨節痛痠或已可而有時發作

痛不可忍時發赤腫數服立効永除根本

沒藥 澤蘭葉 香白芷 骨碎補

草烏去皮尖 破故紙炒 敗龜酥炙黃 虎骨塗酥炙黃

續斷 白頭翁去芦 烏金石各一兩

自然銅燒赤醋淬過七次二兩

右為細末醋糊圓桐子大焙乾醋磨濃墨為衣生

姜溫酒下三五圓筋骨損者用虎骨散帖之

虎骨散 虎骨塗酥炙黃一分 金毛狗脊去毛一兩

穿山甲一兩燒 骨碎補一兩

右為末以倉米煮粥臨熟更入米醋煮如糊攤紙

上然後摻藥在上包裹貼損處如大股損折即以

杉夾正不過二上即安此二方屢用大効亦治人

四黃散治落床墜地瘀血在腹陰、寒熱不乳啼哭

蒲黃 大黃 黃芩各十銖 黃連去須十銖

麥門冬銖 甘草八銖 芒硝七銖 後入

右以咀以水二升煮取一升去滓內硝令半生看大小分服羸瘦者忌冷食大小便血即愈

藥毒論

小兒腸胃怯弱藏腑嫩軟血氣未壯因服不驗其味之毒致煩燥悶亂或口舌麻木或如針刺甚者吐利有至宛血也

玄胡索散 解諸藥毒煩躁悶亂吐利嘔血

玄胡索去皮 甘草半生 白礬生 各半兩

右為末每服半錢水一小盞煎至六分去渣放溫

服時以呷

礬茶散 治諸藥毒煩躁口舌麻木或如針刺痛

草茶 一兩 北礬 一兩

右為末每服半錢或一錢汲新水調下立解

又方解百毒藥 以白篇豆為末水調一二錢服以

出了蚕者故紙燒灰細研冷水調下半錢頻服

龍腦散 治藥毒吐血如神 大黃蒸 甘草炙

半夏湯洗七次薄切 金星石 銀星石

寒水石 禹餘糧火煨醋 不灰木

青蛤粉 各半兩青蛤粉即青黛也

右為細末入細研龍腦末一字拌勻每服一字或半錢新水調下錢乙更有甘松藿香葉末各一錢或大黃一半

小兒衛生總微論方卷十七

小兒衛生總微論方卷第十八

頭上諸病論

頭瘡 小兒頭瘡者由藏腑有熱上衝於頭外被風濕復相乘之搏於血氣而生其瘡故曰頭瘡此候與禿瘡特異且禿瘡者有白有赤硬痂遍滿其頭此頭瘡者但一兩處生其痂並不白硬而乾時常有膿血濕汁俗呼為長頭瘡小兒失於沐髮者便生此瘡也

玄精石散治小兒頭瘡 太陰玄精石

寒水石

各一分

輕粉

射香

各少許

右為細末先以淡漿洗去瘡痂拭乾油調藥塗之

甚者不過再

栝樓散治如前

栝樓一枚 鹽豉一合入栝樓 研中和

全下黃土一分 膩粉一分

右為末入射香一字拌勻每用少許油調塗之濕者乾搽

淡豉散治如前

淡豉炒黑 絳礬各一兩 膩粉二錢

右上二味先末入粉研勻先以棗柴灰淋汁熱洗瘡淨用甘草末搽瘡上後以生油調藥塗之濕者

乾搽

黃連散治如前

黃連去須二兩 胡粉一兩

右為細末先洗去瘡垢乾傳即差再發用

胡粉膏治頭瘡久不差經隔年歲

松脂 苦參 黃連去須各一兩半 大黃生

胡粉各一兩 黃芩 水銀各一分 白礬半兩

蛇床子三分

右為細末以臘月猪脂和研至不見水銀星為度傳之

又方治頭瘡久不差 膩粉少許

胡苑和皮 灯上燒過存性用椀蓋出火毒研末

右為細末以生油調塗仍剝去瘡上髮塗之只一

二次差

又方治如前 以屋上塵和油脚塗之仍先用皂莢

湯洗訖塗藥以馬骨燒灰研末醋和傅之  
以虎脂梢令凝塗之日三四次以藜末蜜和塗  
之有虫出而愈不作癩

又以雞卵七枚去白皮於銅器內熬和油塗之亦治  
乾秃不出汁者以雞卵殼燒灰研末猪脂和之  
又以雞屎研末傅之以醋少許和淨水洗去瘡痂  
再以溫水洗之梔乾用百草霜入輕粉研細用少  
許生油調塗以兔絲煎湯洗之以竹葉燒灰研  
細拊脂和塗以黑豆炒烟盡杵為末入膩粉研  
勻細生油調塗之

治頭瘡出膿水不差而復發

以杏仁一百枚燒灰入膩粉一分同研勻細生油  
調塗

治頭瘡漸引不較

以烏油麻嚼爛塗之亦治浸淫瘡及乾瘡

治頭上惡瘡以黃泥裹豆豉煨熟放冷取豉研末以  
純菜油調傅上

軟癩

小兒頭上生軟癩者由風邪冷熱之氣客於皮膚持  
於血氣壅滯經絡蘊結而生亦如身上生癩無異  
但生在頭上始則赤腫而硬其邪微者散則自消  
其邪甚者腫赤內搐潰膿血作痛以頭上皮緊至

熟多不能去膿根中有惡汁不盡因而復發或在根邊別生連續不差常以烘膿故名曰軟癬

如聖膏治軟癬

菜油

一兩

黃臘

半兩

歷青

一錢

黃丹

半錢

羊筒骨內髓

一筒

右一處熬成膏於紙上攤貼患處上用冷鐵一片於瘡口上壓定四面封破如膿出不快以紙擦任之熬藥不得把銅鐵器

又方以青澁柿子連皮薄切焙乾杵為細末每用時先以溫湯洗捻去其膿血用藥少許入輕粉三分之一拌勻以薄牛皮膠水調成膏攤熟帛子上貼之

又以炒油麻銚子中取乘熱嚼爛傳之

以生油餅劑子一筒捻薄留一竅於癬上數來日膿自出便較屢驗

又以兔毛皮不拘多少燒灰研細入膩粉少許調用油又方用枳殼去穰週圍用糊合於瘡上去膿生肌屢驗極效

治頭皮虛腫如蒸餅裏水之狀以口嚼麩傳之

禿瘡

小兒頭有禿瘡者按九虫論云是蟻虫動作與風邪相乘上于頭之皮膚搏於血氣傷其榮衛而所生也榮為血受病則為赤禿為氣受病則為白禿榮在內邪稍難干故患赤禿者少衛在外邪易得著



故患白禿者○多其始生如癬之斑點上有皮屑  
漸作痂以成其瘡遂至滿頭髮落逮盡若刮去  
其痂則瘡皆是孔眼大小不等如虫之窠有濃汁  
出不痛而痒乃不可禁是知有虫為風也又一  
種俗呼為鬼舐頭小兒有頭瘡過夜被鬼舐之則  
引及滿頭有赤痂或云便赤禿也

治小兒白禿頭上團然以蒜搗白處早朝傳之

治小兒白禿乾殼不出汁

以鷄子七枚去白皮銅器中熬和油塗之

治小兒白禿以葶藶子杵末湯洗去痂塗之

以陳香薷煮濃汁少許同脂和胡粉傳之

以白頭翁根杵爛傳一宿已作瘡者二十日愈以

榆白皮杵末醋和塗虫當出以鷄窠中草和白

頭翁花一處燒灰研細用鴈月猪脂和勻先用醋

泔洗瘡後傳之

又以椿楸莖三般葉心取汁傳之大効一方只用楸

葉杵汁傳以人屎燒灰末之用鴈月猪脂和傳

治赤禿以白馬蹄燒灰細研鴈月猪脂和傳以其

滓傳之

治鬼舐頭以兒糞臈脂猪和傳以鴈月猪屎燒灰末傳

以屎燒灰研細和鴈月猪脂塗傳

耳中諸病論

耳聾小兒有忽患耳聾沉听者由風邪乘於手太陽之經也邪隨其經入於耳內邪正相搏氣停寒滯則令耳聾不能聰听於音声也經者則為沉听謂耳中沉々然輕小之音則不辨重大之声緣聞也通鳴散治風邪惡入耳今見耳聾

菖蒲一寸九節者良遠志甘草水煮去心各一兩柴胡去苗

麥門冬去心防風去根各半兩細辛去苗

甜葶藶炒磁石大煨醋一分杏仁十四個湯洗去皮尖

雙仁者炒黃

右為細末每服半錢煎葱白湯調下乳食後日二三服

烏麝湯治如前 大川烏頭一個重二錢上者以酒洗

面二塊子只刮去皮盡切碎拌羅為末

通草半兩薄切作片子相似以糯米粉作稀糊拌勻焙乾拌羅為末

右二味入射香末少許研勻每服一錢水一小盞入薄荷二葉棗一枚煎數沸放溫服或以溫酒調服

菖蒲圓治如前 菖蒲一寸 巴豆一粒去皮心

右二物合杵為劑分作七丸用一粒綿裹塞耳中

一日一易

又方 菖蒲末一分 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁者

右二物合杵如泥每服用一麻子許綿花裹內耳

中一日一易

單麻膏治如前 單麻子 十枚去皮 棗肉 七枚

右同研為膏每用麩核許綿裹內耳一日一易

治新久耳聾 以巴豆一粒蠟裹針 令通透塞耳

中 以猫兒捉住老鼠奪之取其鼠膽汁灌病耳

中一云只以鼠膽用之亦可 以地龍一條鹽少

許俱貯葱筒中時動搖則化為水用點耳中

又以米醋一碗用鐵一塊彈子大燒赤投醋中令病

耳就上使氣薰入耳中即效三二日可治

又以葱白於灰火中煨令熟將葱白頭內耳中一日

三易以芥菜子杵爛人乳汁和綿裹內耳中一日

一易 以荊子中蚰虫白粉和油滴耳中日二亦

治沉听新聾耳 以驢脂和生椒杵爛作瓦綿裹

塞耳中治久聾

又以醇醋微火煎附子至軟削令尖塞耳中

耳中鳴痛

小兒有耳中或鳴或痛者由風邪入耳與正氣相干

搏於血氣者即為鳴搏於經絡者即為痛也

治耳中痛 以乾百合為末溫水調下一錢乳後

以柳樹蚰虫糞水化取汁調白礬末少許滴耳中

為妙 以鹽二三升蒸熱包裹以耳枕之冷即易

亦治烘、声

治耳鳴如流水或如風聲 以生烏頭緣搗得乘

濕削 如棗核塞耳中旦用夜易夜用旦易不過

三日愈及治耳痒无即用乾者

治耳中常鳴 以生地黃截塞病耳數易之或以

紙裏微煨用

耳中腫瘡出膿汁

小兒有耳中腫或生瘡出膿汁者由風濕相乘入於

耳邪正相干搏於氣血傷於經絡輕則為腫重則

生瘡若津液結潰變為膿血汁出

又有因水或眼淚入耳停搏正氣亦為膿汁俱名停

耳又名膿耳也

治耳中腫及生瘡出膿汁或只痒痛虛鳴應耳中一

切諸病悉皆主之 龍朱散

龍腦研一字 朱砂一錢研 竹箭幹內蚰虫糞研三錢

坯子臘脂研半錢 射香一字研

右勻研細末以幹耳子挑藥入病耳中如有濃水

者先以新綿撚子纏之爭盡方傾入藥每夜臨臥

時一次

治耳中腫或生瘡 以白礬燒灰研細每用少許以

葦筒吹耳內日三四次或以綿裹塞耳中生瘡者

胡菘油調藥著耳

治小兒聾耳內生瘡或有膿汁

礬香散 白礬燒一兩 蛇床子一分為末

右相和入射香末五分同研細每用一字搽入病

藍花散治如前 紅藍花一兩洗 黃蘗兩對 烏魚骨兩

黃芩半兩已 雄黃半兩 飛兩 射香一分研

右拌勻每用少許以新綿子纏攪子搵藥塞耳中

一日二易

射香散治如前 蜘蛛一 坯子一 臘脂半錢 射香半字

右曬極乾研勻細末每用半幹耳許以戴毛管吹

入耳

飛紅散治如前 白礬一字 坯子一 臘脂一錢 射香一字

右研勻細每用少許以綿攪子攪耳中膿盡搽藥

入耳內

箭艸散治如前 箭竹內蛀虫二錢 蜚蠊二錢

坯子二錢 凌霄花乾者 海螵蛸二錢

射香一字 研後入 右為細末拌勻每用時先以

綿攪子攪耳中膿盡乃以紙攪蘸藥入耳中日三

紅綿散治如前 信砒一錢 坯子三錢 臘脂三錢

射香一字

右為末拌勻以柳絮滾和勻每用黃米許搽入耳

中如速耳生瘡膿不差者依此傳瘡上紙片封之

油引散治如前 石鷲子鳴堆一對 用磚壘一盆 炒

號丹 飛等分 膩粉 射香 各少許量入

右同研勻先以綿撚子振耳中膿汁盡時側臥搽藥一字許入耳中以油一滴彈下立效

綿裏散治如前 桂心一分青羊屎一分炒令轉色

右同末每用一字綿裏塞耳中

治小兒停耳膿汁出

以硫黃細研每用少許摻入耳中日一次夜一次

以白礬末一錢射香一字研勻少少摻入耳

以桑木上毒蜂房炙黃杵末溫酒調下半錢空白

以炷爛糞研細吹耳中極效

治小兒耳上生瘡 以鷄子白傅之

眼目病論

小兒眼目生病者多因恣食并酸藏生邪熱熏炙肝經衝發於目或為赤腫痒痛或眵淚隱澁或生赤脉或生翳膜又痰飲毒氣漬肝致臟氣不得宣通者則精華不得明審故黑睛雖全而視物眊眊此名睛盲若昼日明至瞑不見物者此邪干經之陰也謂之雀目言如鳥雀之目瞑時無所見也又有障眼者乃氣毒障縵其睛也又有疔肝之氣衝於目者亦能生其翳膜以為遮障也

博金散治眼赤腫痛不可忍

白藥子 半兩

黃芩 一錢半

右為末每用一字沸湯點洗之

又方治如前右取嫩槐芽或嫩葉煎湯放溫洗之白  
睛如血淚多者最宜用

又方治如前治赤眼腫痛繞覺便截

右以銅碌研細抄二錢半用乳香皂子大二塊同  
研勻極細點之立效

又方治赤目 右以黃芩為末煎湯洗脚神效

又方治如前 天南星一分去皮乾蝎一分半

右為末每用一字茶調下服了搖頭數次立效

又方洗熱毒眼右以細朴硝沸湯浸澄去乘熱洗之

又方洗風毒熱赤 銅碌一錢滑石二錢

右研極細每用少許沸湯點洗

洗心散治心藏邪熱目赤腫痛 大黃一兩煨

荆芥穗半兩甘草半兩生麻黃一兩去節

右為細末每服半錢或一字蜜水調下

洗肝散治三焦壅熱眼目赤腫隱澁多淚

芍藥一分羌活去芦一分防風去芦一分大黃半分

甘草半分

右為細末嬰小一字二三歲半錢上者一錢水半

盞入燈心黑豆各少許煎數沸食後放冷服須銀

石沙鈿中煎仍與四順散間服并用青涼膏貼大

四順散 當歸去芦芍藥 大黃紙裏甘草炙各

右為末每服一錢水一盞煎至半盞去渣溫服更

量大小加減無時

清涼膏治眼赤腫痛貼太陽穴

右須立秋日已後取芙蓉葉陰乾為末每一字或半錢井花水調貼太陽穴

地黄散治癰熱目赤腫疼或赤脉白膜四邊散漫者

猶為易治若遮黑睛多致失明宜用此

生乾地黄

切焙秤

熟乾地黄

切焙秤

當歸

去芦焙秤各半分

黃連

去須

大黃

去皮取實處剉焙秤

防風

去芦并义枝秤

羌活

去芦

生犀屑

蟬殼

去土

沙苑蒺藜

炒去刺

木賊

穀精草

去根

白蒺藜

炒去刺

玄參

去芦半錢

木通

甘草

剉炒各一錢半

右為細末每服一字或五分煮羊肝湯調下日三乳食後

玄精石散治眼生赤脉

玄精石

一兩

甘草

半兩

右為細末每服半錢竹葉湯調下

羌菊散治眼生浮翳障膜

羌活

去芦一分

菊花

揀淨半兩

防風

去芦并义枝一分

山梔子

去殼分炒

甘草

一分半炒

白蒺藜

炒去刺半兩

右為末每服半錢或一錢蜜湯調日三與决明丸

間服八决明圓

决明子

揀淨

車前子

菊花

揀淨

川芎

宣連

當歸

去芦洗淨各一分

大黃

黃芩

各一分



右為細末煉蜜和丸麻子大每五歲下三五丸上者七八丸煎桑枝湯或麥門冬湯送下

又方治目生黑花浮翳澁痛

右以貝子一兩燒灰研細入龍腦末少許點之

又方凡小兒數歲眼中生膚翳未堅者不可妄用但

以珊瑚研如粉每日少少點之三日見效

鎮肝散治痰熱眼生翳膜 胡黃連 梔子仁各一分

甘草微炒 馬牙硝 青箱子以上各半兩 真珠一分另研

牛黃一分別研

右為末拌勻每服一錢水八分入荆芥薄荷各少

許煎至半盞去滓溫服食後

又方治目睛上生白膜

右以白礬一分水四合於熱銅器中煎取半合下

白蜜調之用綿攪過每用芥子許點之日三

又方治腎膜重厚 右以猪膽白皮曝乾合作小繩

如鹿釵股大燒作灰放冷研細點腎上三五度差

真珠膏治眼眵不見物睛育者 真珠末一分研

甘菊花揀淨一分 香豉炒一分 井泉石一分

右為末拌勻用白蜜一合鯽魚膽一枚同藥於石

銀器中慢火熬成膏次入好龍腦末一錢攪勻每

少許時時點之

又方治目育 右以猪膽一枚取汁微火上煎之可

又圓、黍米大或芥心大每用一九肉眼中食後  
又方治睛盲神法也如用之視物如鷹鵠有神效

右於正月八日二月八日三月六日四月四日五  
月五日六月二日七月七日八月二十日九月十  
二日十一月二日十二月晦日每過上件神日用

桑柴灰一合煎湯於磁器中澄令極清稍熱洗之  
如覺冷即重湯煮令得所不住手沃之如遇上件  
神日不得不洗此神日本法也

復明散治雀目至瞑不見物

蒼朮

二兩米泔浸  
去皮切焙乾

穀精草

一兩

地膚子

半兩

決明子

半兩

黃芩

半兩

右為細末每服一錢水八分入荆芥少許煎至五

分去滓溫服食後

又方治如前 右以黃蠟不拘多少器內熔成汁取

下入蛤粉相和得所團成毬子每用以刀子切下

一二錢許以猪肝一二兩批開摻藥在內麻縷扎

水一碗銚內煮熟乘熱氣熏眼至溫時并肝食之

神效日二服

又方治如前 右以豆豉於新瓦上炒令黃色入椎

黃半兩同研為細末每用藥一錢攢猪肝一片批

開摻藥裹合陳米飲者煮熟與食之

又方治如前 右石膏為細末每用一錢猪肝一片

薄批摻藥在中麻縷纏定入砂瓶中煮熟切作塊

子與食此方治諸藥不效者服之如神

千金僊朮散治氣障眼又治肝熱目赤生病

蒼朮

四兩未泔浸七日逐日換泔至日足取出刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒色黃去鹽

木賊

二兩童子小便浸一宿水陶淨焙乾一方又有甘草一兩

右二味同為細末每用米飲調下一錢服之甚效

四仁膏治氣障眼亦治疳眼

薤仁

四個去皮尖

杏仁

四個去皮尖

薤仁

五個去皮尖

郁李仁

五個去皮尖

蕪荑

五個取內

海螵蛸

取中心半錢北亭末

小豆大一塊礪砂是也

右於乳鉢內研細將白蜜看多少攪勻絹或綿摠

過別入龍腦細末輕粉細末各少許點之

治小兒雀目

以夜明沙炒過為末猪膽汁和丸菴豆大每服十

丸米飲下

并泉石散治疳熱攻眼生障醫致損睛瞳

甘泉石

一兩

決明石

半兩

甘菊花

揀淨半兩

夜明沙

半兩

黃連

去頭半兩

晚蚕沙

半兩微炒

右為細末每用一錢米泔一盞入猪肝少許煎至

肝爛熟為度放溫時服

又方治疳眼右以烏鰂魚骨牡蠣各等分研為細末

糊丸皂子大每用一丸用猪肝一葉同藥入清米

泔煮至肝熟為度和肝食之汁送下

目病引論

小兒有腦熱注目則眼澁常閉不開又有諸物因入眼眯之不出又有悞被諸物衝觸傷損目睛者叙方于後

治腦熱注目常閉不開

右以大黃一分鹿到以水三合浸一宿一歲兒每日分半合餘塗頂上乾即更塗兒大以意加服

治悞飛麥芒入目不出

右用新布覆目上持蟻螬於布上摩之其芒出著布上甚良

又方治諸物入眼眯之不出者右用好黑清水研汁

銅筋點之即出

又方治悞被諸物衝觸傷目

右以牛屎點之日二仍避其風雖黑睛破損亦愈

鼻中病論

肺氣通於鼻氣不和謂風冷所乘停滯鼻中搏於津液使涕凝結壅氣不通快不聞臭香謂之鼻塞若風冷搏於血氣而生息肉塞滯者謂之艱鼻若風濕相搏則鼻内生瘡而有膿汁出也若腦熱攻鼻中乾燥或生瘡痂鞭而無膿汁也

辛夷散治鼻塞

辛夷葉

一兩洗焙乾

細辛

去苗半兩

木通

半兩

白芷 半兩

木香 半兩 上為末

杏仁 一分 浸去皮

右為末拌勻用羊髓猪脂各二兩同諸藥於石銀器內慢火熬成膏赤黃色入腦射各少許攪勻放冷每用少許塗任鼻中乳下兒因母吹着顙子鼻塞者只塗顙上

菊花散治鼻塞涕濁

甘菊花 揀淨

防風 去芦并枝 前胡 去芦各一兩

細辛 去苗

桂心 各半兩 甘草 炙一分

右為末每服半錢入乳香少許煎荊芥湯調下食後服

痰藥子散治鼻塞不聞香臭水出不止

右以痰藥子半掬為細末以水一小盞煎至減半令患人仰臥滿含飯一口以藥汁灌鼻中不過再即嚏病出兒大者有此病小者未有

治鼻中生瘡有膿右取黑牛耳中垢兔糞鼻中 臘書

犀角升麻散治腦熱攻鼻燥燁生瘡鼻中乾硬

犀角屑 一兩

馬牙硝 半兩 研 川升麻 半兩 研

黃連 去頭半兩 朱砂 半兩 研 牛黃 一分 龍腦 一分 研

右拌勻細每服半錢溫蜜湯調下

清柿膏治鼷鼻不聞香臭出氣不快或生瘰肉

瓜蒂 半兩

赤小豆 一分

細辛 去苗一分

甘草 一分

附子 一個 炮

右為細末入龍腦少許拌勻煉蜜和凡皂子夫綿裏納鼻中

又方治鼷鼻有宿肉出氣不快不聞香臭

右以白礬末和面脂綿裏塞鼻中數日宿肉隨藥自出

### 面上瘡論

小兒面上忽遇有經絡虛隙謂風濕寒熱所乘搏於氣血則生其瘡或如火燒或出膿或出黃水日久不能痊差今叙方于後

治面上生瘡如火燒

右以赤薜荔葉杵末生油調傅一名山喬麥

又方治如前

右以黃梁米一升杵末蜜水和傅以差為度

又方治面上生瘡出膿汁

右以蛇蛻皮炙焦為末和猪脂傅上

又方治面瘡出黃水

右以鯽魚頭燒灰研末和醬清汁傅上一日易

又方治面上生諸般瘡 右兔絲湯洗之

又方以大麥燒存性為末生油膩粉調塗神效大麥

只炒焦黑亦得

又方治面瘡出黃水

豆豉一合炒

黃蘗一兩剉

右為細末每用先以熱灰汁洗瘡淨拭乾傅之亦

治身生如此瘡

又方治面瘡赤腫焮痛 以地榆八兩細剉水一斗 煮至五升去滓適寒溫洗之

唇口病論

風毒濕熱隨其虛處所著搏於血氣則生瘡瘍若發於唇上生瘡乍差乍發謂之緊唇又曰潘唇其發頻者唇常腫大脫厚或上有瘡不效甚者以至唇腭若發於唇裏連兩頰生瘡者名曰口瘡若發於口吻兩角生瘡者名曰鷺口俗云因乳食看視燕子則生鷺口瘡也竝叙方于後

紫根散治緊唇

紫根一兩

烏蛇半兩

黃蘗半兩

鱉甲二兩

右為末每用半錢猪脂少許和塗唇上時時用青液散治赤口瘡 以青黛一分研末入腦子少許拌勻少傳上

治小兒及老人虛人口瘡咽痛

吳茱萸去枝梗 地龍去土等分

右為末米醋入生麪調塗足心

治小兒口傍瘡久不軟

亂髮燒灰 故絮灰 黃連去頭 乾姜各等分

右為末每少許用傳上不過三次愈

治小兒緊唇

右以馬芥汁即大刺芥是也先刺唇血出以汁傳之日七次

治小兒熱口瘡 以故綿燒灰研末傳瘡上

治小兒諸口瘡 以五月五日蝦蟇炙燥為末傳瘡上

兼治蓐瘡 治小兒唇口邊肥瘡

白礬燒一兩 蛇床子一兩為末

右為末乾摻瘡上立效亦治耳瘡頭瘡癢瘡

綠雲散治如前 黃蘗半錢 螺青二錢

右同研勻細每服一字或半錢摻患處

又方治口中赤爛 右取黏羊生乳含之

又方治白口瘡 右以黃丹一兩入龍腦少許研勻

蜜和調傳瘡上

又方治口中瘡通白者或白漫之然亦治疳蝕

右以白僵蚕炒黃色拭去毛盡為末蜜和傳之立

效或以父髮拭口中淨漿汁塗

又方治諸口瘡 右以大天南星去皮只取中心龍

眼大一塊為細末醋調塗脚心

又方治如前 右以香白芷銅綠等分為末立摻上

又方治如前 右以湯瓶內減為末臨臥時以好醋

調於脚心底明書箇十字立驗

檳榔散治如前

檳榔

銅綠

貝母各等分



右為細末如患乾瘡生蜜調掃之若應濕口瘡乾  
搽

血餘散治驚口瘡吻兩角生

又右以亂髮燒灰研細和猪脂傅之

又方治如前 右以白錫燒灰傅之

牙齒病論

小兒牙齒病者由風熱邪毒干於手太陽之經陽經

入於斷齶搏於血氣則生宣爛又云因恣食酸

甘肥膩油麵諸物致有細粘漬著牙根久不刷

搽去之亦發為疳宣爛斷作天氣出血者風濕

相搏則為牙癰如風毒入於牙出与正氣交者

則為風痛有虫動齧齒則為虫病更有一証疳

齧口鼻牙齒者名曰走馬疳別具疳瘡門之下

收之外叙方于後

治牙齒宣爛臭氣有血

皂角一挺肥好 羊脛骨一鉢

右並於炭火內燒烟尽以盆覆之候冷用紙一張

鋪濕地上頓藥出火毒一夜為末如常措牙用

或取之三上差

又方治如前 蕪荑半兩炒黑 白礬半兩生

右為細末入射香少許拌勻先以水漱口齒淨然

後用少許措牙

又方治如前 右以夙化石灰一塊大火中煨通赤  
取出放冷為末每用少許旋入射香少許傅牙  
根瘡上

赤紅散治牙癰腫爛膿血

朱砂一錢 硃砂一錢 藜豆粉一兩 鵬砂半錢 腦射各一

右為末每用一字傅患處或措貼之

射香散治如前 銅綠半錢 藜豆粉一兩

膽礬半錢 火煨過用 腦子一字

右為末入射少許研勻每服一字擦貼患處有涎

即吐

甘露散治小兒胃熱牙齦宣露出血口臭臉重赤眼

燕口瘡不斂乳食肌體煩熱及瘡疹已未發皆服

熟乾地黄 生乾地黄 天門冬去心

麥門冬去心 枇杷葉刷去毛盡 枳殼麩炒去穰

苦參 石斛去根 山茵陳 甘草各等分

右為末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服食

後量大小加減

治小兒牙宣常有鮮血斷縫臭穢

砒黃一錢 射香半錢

右同研細紙條子生油塗過摻藥在上少用

末煮作小紙碁子看大小用插在病處縫內

治小兒牙齒宣痺 以黃連為末入射香研勻貼病

處亦治口瘡

治風疔牙疼 右以馬鞭草煎湯含漱之

又方治如前 莽草 升麻 細辛去苗甘草各一分

右麤剉水一椀煎數沸盪漱之冷即吐別含漱

藁本散治如前 藁本去芦 白附子 川芎

莽草各半兩 青黛 一錢 盧會 一錢 射香各研

右拌勻細每服一字或半字搯患處

又方治如前

右肥皂一個去子滿填鹽在內炭火燒煙盡放冷

研細每用一字或半錢搯患處有涎即吐

舌病論

小兒舌上偶生瘡腫者由風毒邪熱搏於血氣隨其

虛處著而生病也發於舌上紫腫者名曰紫舌脹若

腫麗大木悶而鞭者名曰木舌脹若風濕相搏而生

瘡者名曰舌瘡若風多而舌腫如吹胞者名曰鼓舌

其紫舌水舌鼓舌腫甚者則滿口溢出塞閉氣門皆

能殺人

治紫舌腫 右取羊乳飲之

又方治如前

右以新鯽魚薄起肉片子頃舌上數易之

治舌上生瘡不能飲乳

右以白礬研末和鷄子置醋中塗兒足底一七愈

又方治如前 右以蒲黃傅之  
又方以桑白皮汁塗乳上吮服

又方治如前 右以胡粉細研用猪筒骨中髓調傅  
之日三

治木舌腫鞭滿口邊巡氣閉則殺人

右以釜底煤和鹽等分以酒調表裡塗舌須臾即  
消無酒亦得

又方治如前 川朴兩半 真紫雪 一分 白鹽 半分

右和研勻細每用半錢入竹瀝三兩滴白湯少許  
調塗舌上咽津不妨

治舌卒腫如吹胞滿溢出氣不得通無可治柰

右以半夏十數枚湯洗去滑盡以苦酒一升煮取

五合稍含漱之不得咽津戟人咽喉加以生薑

一兩同煮亦得

又方 右煎甘草濃汁含之 又方以糖醋滿口含

之良 又方治紫舌木鼓腫滿閉氣諸藥不效當

用此救 又以舌兩邊以指刮破或以鉞刀決破

出其毒血慎勿傷舌下中央脉也若血出不止已

及數升者燒鐵篋烙瘡數過已絕之燒鐵篋約度

不可大過

小兒衛生總微論方卷第十九

咽喉病論

小兒咽喉生病者由風毒濕熱搏於氣血隨其經絡  
虛處所著則生其病若發於咽喉者或為喉痺或為  
纏喉風或為乳鵝重者或為馬喉痺又或懸癰腫或  
腮頰腫或喉中生瘡一切諸病隨症具方于後

治喉痺腫悶 以露蜂房燒灰研細末每服一錢乳

汁調服 以蛇脫皮燒灰研細末每服一錢乳汁

調服 以鯉魚七枚和竈底土塗患處

以川升麻令含一片

以韭一把杵爛熬傳上冷即易

以白礬棊子大含之

以陳白梅一個取肉裏白僵蚕一枚含咽津

以地龍一條研爛內鷄子白和勻便墮入咽喉中

以繩纏扎手大指屈於節上針挑刺出血即差

鐵粉散治如前 鐵葉粉一分 鵬砂一分 白礬半兩

右為末每服半錢冷水調下連二三服

蛇脫散治如前 蛇蛻一分 白梅肉一分炒

牛蒡子半兩炒 甘草一分生

右為散每服一錢匕綿裹湯浸少時含咽津汁小

兒吮之

又方治喉痺咽腫出氣不快

右以鼠粘子二兩炒焦甘草半兩炙黃同為細末

每服一錢新水調下更入蜜少許

又方治喉痺不能語 以大豆煎汁放冷含之

以龜膽少許生薑薄荷汁化服得吐便愈

青魚膽亦得收得以青黛釀之 當歸去芦焙各半

治纏喉風束氣不通 蛇蛻炙令焦 當歸去芦焙各半

右為末温酒調下半錢得吐良

又方治如前 單麻子去皮朴硝 二錢

右為末新水調下一錢未效再服

又方治如前 天南星生 白僵蚕生去絲嘴

右為末每服一字或半錢生薑自然汁調下

又方治如前

右以白僵蚕二箇去絲為末生姜自然汁調更入蜜少許拌勻分二三服或只用半錢一字旋調之服

定命散治纏喉乳鷲等病

川大黃 剉炒

黃連 去酒

白僵蚕 直者炒去

絲者炒去

甘草 生各兩

五倍子 一分

膩粉 五筒子

右為細末每用一字竹葉筒子吹入喉中如毒氣攻

心肺喉中生病燕飲不得者以乳孩兒乳汁調藥

一字雞羽蘸之深探入喉中得吐者活不吐者死

又方治纏喉乳鷲喉痺咽喉頰項腫悶閉塞氣不得

通者右令患人先呷好麻油少許後以茶葉燒

灰研細末水調下半匙立效大者增之

犀角散治馬喉痺其候如喉痺更加連咽喉頰腫甚

咽喉閉塞但數噴氣此症極惡

犀角屑 半兩

射干 三分

桔梗 大者二分

馬蘭根

升草

半兩

川升麻 半兩

右為粗末每服一錢半水盞入竹葉五片煎至

六分去滓入馬牙硝半錢攪勻細細含嚥

又方治如前右以馬嚼一具水二盞前至半量大

治懸癰暴腫妨悶以乾姜半夏等分為末少以

筋點藥著上半夏以白礬湯洗數次去滑以桐砂

半錢綿裹含之細細嚥津

又方治懸癰忽倒

右以白礬灰蓋各半兩研細筋頭點上擦正亦治

腫悶日七八遍

治咽喉腮頰悶 右以蒜塞耳鼻中

又方治如前

右以馬鞭草根截去兩頭取在中者搗汁服之

又方治如前 右以黃蘗寒水石等分為末量腫處

以薄荷水調藥用雞羽掃上乾即再掃

綠雲散治喉痺馬喉纏喉驚心重舌木舌一切咽喉

之疾 螺青 盆硝 生油黃 生甘草 各等分

右為細末每服一錢生薑自然汁調細含咽若已

閉塞不通者用葦筒入藥吹入喉中重舌木舌生

姜汁調塗處腫痛咽頷者依此用之 口瘡舌上

生瘡用此藥塗之最效李方叔閻孝忠皆以此方

救人甚多以磁合密封收貯

如聖湯治咽喉一切諸疾

甘草二兩 桔梗 去芦一兩

右為粗末每服一大錢水一盞煎去滓放溫時

呷煎六分

龍石散治如前并治口舌瘡腫

寒水石 煨通赤 朱砂 研飛 一兩 腦子 研半分

右為細末每用少許搽患處病在咽喉者吹入喉



內細、燕津日五七次臨臥一兩次用妙  
如聖圓治咽喉一切諸病

川大黃一分末 白礬一分末 馬屁勃一分末

蝸牛十四箇 陳白梅肉十分

右於五月五日午時取蝸牛以白梅肉同研爛入  
藥和丸如練子大每用一丸綿裹含化燕津若病  
重不能開口即研藥作末葦筒吹入喉中滴水三  
兩點送之或以淨水磨藥灌之立差

通關散治如前

枯白礬 雄黃水飛 藥芦微炒

白僵蚕去絲 猪牙皂角去皮弦

吹入喉中涎  
山或血出立愈  
細末每用一字鼻內插之甚者常倚

治小兒咽喉腫

以葦上螻蛄  
末一兩燒灰馬屁勃半兩同研勿細

煉蜜和丸桐  
十大三歲下煎犀角湯研下者加之大

治小兒乳飲不

伏覺似喉痺  
可取灰塗乳上吮鬼嚙下即差

射干湯治如前

射干 小麻各一 馬牙硝 馬屁勃各半兩

右為末每  
一錢水一盞煎至六分去滓溫服

金露膏治如  
寒水石四兩研 雄黃水一兩研

鵬砂研

甘草末

腦子一字研

右拌勻煉蜜

和丸桐子大食後含化一圓

荆芥桔梗湯治

喉中生瘡

荆芥穗

桔梗

甘草生

牛蒡子

炒各等分

右為細末

每用一錢水一小盞煎至六分去

滓溫服之

又方治如前

桔梗

去芦

甘草生

牛蒡子

炒各一兩

右為粗末

每用一錢水一小盞入青鹽少許煎至

六分去滓

溫時呷

又方治如前

右以葱須陰乾為末又別以膽礬為

末並各自每

用以葱末二錢膽礬末一錢和

一字或一字

常筒吹入喉中病處

項癭論

小兒項癭由啼怒未定遽以乳飲致氣逆不散留結

而生其狀在項壘然漸長大而分有瓣又云葛

根在地泉流浸之人因取其水以食飲則生項癭故

近山居人多有之以為生在山中故也

昆布圓治項癭

昆布

鹹

兩洗

海藻

去鹹

兩洗

草龍膽

去芦

兩檳榔

半兩

甜葶藶

一兩

研細

炒

牽牛子

半兩

炒

右為細末麪糊和圓黍米大每服十圓入參湯下

又方治或生項癭已及一二年

右以黃蘗子半斤須萬州緊重者為上若輕虛者

即是別州所出力慢須用一倍取無灰酒一斗入  
藥固瓶口以糠火煨燒一伏時不可極酒不可有  
灰待冷即開瓶令患者時飲半合一合不可令  
絕酒氣經三五日看之覺消即止飲不尔便令兒  
項細也劉禹錫亦著效驗其驗如神唯燒酒候香  
氣出瓶頭有津出便止不必須待一伏時也仍禁  
喜怒但以線子逐日圍度乃知其效也

惡核癰癧論

小兒腑臟不和及遇項邊經絡虛隙為風熱毒氣所  
干與血氣相搏於項邊結成核子復遇風寒所加則  
不消不潰名曰惡核若更風溫相加搏於津液與腑  
臟相乘則清化膿血或較而復發或相傍則生以至  
數十連續不羞名曰癰癧俗呼癰子此府藏血氣內  
外相屬之病也

皂角膏治項邊生核子不消

皂角大者一椀 小者一椀 糯米一合 草烏頭二錢 生  
黃皮二錢 炒 黑色

右為末量多少以井花水調貼核上未消與水晶  
丹下之利過以觀音散補之仍再貼之即消

水晶丹 天南星洗淨生為一分 滑石生為末二錢

水銀粉秤半錢 蕪荑取仁一分 巴豆五粒 去殼

右先研巴豆極細次入蕪荑仁復研方入衆藥研

勻爛飯和圓黍米大每服三五圓量大小加減臨  
臥稍飢葱白米湯送下利過忌生冷硬物仍以觀  
音散補之方已具前

如聖散治如前

綿黃耆 一兩 連翹 一兩 鴿糞 半合 燒灰

川大黃 肆兩 糯米 半兩 用斑毛七箇 犀角屑 兩

右為細末每服一錢水八分入酒三四滴同煎至

五分去滓放溫時下

紫檀散治如前 紫檀香 木香 川朴硝

卷柏 各一兩 赤芍藥 川大黃 各半兩

右為細末每服少許以鷄子白調稀稠得所塗處

取瘰癧內消

右以長三寸鯽魚一箇去腸以和皮巴豆填滿麻  
皮扎定以一束稗草燒烟盡取出放冷研為細末  
爛稠粥和圓黍米大每服一丸粟米飲下臨臥未  
利加一丸以利為度

又方治如前

右以斑猫 兩 去翅足用粟米一升同炒至米焦  
去米不用只以斑猫為細末入薄荷細末四兩拌  
勻烏雞子清和丸黍米大空心茶清下一丸一日  
加一丸至五丸止一日却減至一丸以後每服九

胡麻圓治瘰癧 胡麻 炒四兩 羊躑躅 一兩 焙

右以為末煉蜜和丸麻子大每服七圓漸加至二十  
十一圓熟水下日二見效為度已破者更用黑母  
牛糞燒灰研末傳之

治一切瘰癧經效方

右以牡礪火煨通赤取出濕地上紙襯出火毒一  
宿每四兩用玄參三兩同為末麩糊和丸菴豆大  
早晚食後酒下各下三十丸藥盡則病除根本

又方治瘰癧已破未破其效如神

右以如前煨過牡礪四兩用甘草二兩同為細末  
每服一錢麩茶點服日二

治小兒瘰癧以蝸牛殼一兩用牛乳半升銚子中

慢火熬令乳盡取蝸牛殼研如粉入大黃末一分  
更研勻每服半錢皂莢子仁湯調下大小便中出

惡物差

又方治如前

以白僵蚕去絲嘴炒過為末每服半錢溫水調下

龜膏論

小兒有龜膏者因乳母有宿乳惡汁不捨去之仍以  
飼兒忽遇風熱邪毒相干乘傷於肺經致肺氣滯停  
重墜骨鬲骨漸高起狀如龜殼故曰龜膏

百合圓治小兒龜膏百合一兩

川朴半兩 杏仁半兩湯浸 木通半兩

葉白皮 半兩 川大黃 半兩 天門冬 去心半兩  
右為細末煉蜜和圓黍米大每服十圓米飲下  
又方治如前

右以龜尿摩擦膏骨取龜尿法以蓮葉內頓一物  
安龜在上用鏡照之則尿自出流蓮葉以物盛用甚佳

### 龜背論

小兒有龜背者由九在嬰小時鶻骨未成強令獨坐  
則背隆阜而偶為風邪干襲與血氣相搏入骨髓雍  
滯不散致背高隆起若龜殼之狀白龜背又名隆背  
若如陀有峯塊起者是名駝背乃胎孕之病不可治  
松葉丹治兒龜背  
松花焙乾只殼麩炒去穰一兩

獨活 去芦一兩 防風 去芦并叉一兩 川大黃 半兩炮

前胡 去芦半兩 麻黃 去根奇半兩 桂心 半兩

右為細末煉蜜和九黍米大每服十粒米飲下

又方治如前 右以龜尿摩背脊骨取尿法在前

### 手足拳攣論

小兒有手脚拳攣者由本氣不强筋骨力弱血氣不  
榮而為風邪所乘搏於經絡則筋脉縮急骨本無力  
則手拳而不能展用脚攣而不能伸舉也若生下便  
拳攣者此孕胎中病不可治也

薏苡仁圓治手拳不能展開

薏苡仁 洗一兩湯浸當歸洗焙乾一兩秦艽去苗二

防風

去芦一兩

羌活

去芦一兩

酸棗仁 去皮一兩

右為細末煉蜜和丸雞頭實大每服一圓射香荆芥湯化下兒大增之

海桐皮散治脚掣不能伸舉 海桐皮

當歸

去芦洗

牡丹皮

去心

熟乾地黄

牛膝

去芦酒浸

山茱萸

補骨脂

各半兩

右為細末每服一錢水八分入葱二寸煎至五分去滓温服

風痲癩疹論

小兒風痲癩疹者小兒肥膚嫩血氣乘弱或因暖衣而腠理疎開或天暄而汗津潤出忽為風邪所干搏於血氣藏液於皮膚之間不能消散而成碯成疥相連而生其狀如生姜片輕者名曰風痲不致改色重者曰癩疹改赤紫發搔痒搔之不解甚者使人心神悶乱

右先看其色澤白者以牛膝酒浸一宿焙乾為末每服一錢或半錢温酒調下若色赤者以灶下黄土研細末生薑蜜水調下一錢或半錢

又洗方治如前 荆芥 細辛 白芷 薄荷葉 各等分

右為粗末每用兩大匙水一桶取羊蹄菜一科連根葉枝莖細剉同煎至葉爛傾盆中先以尋常熱湯煖處浴身體候有汗出即用藥湯淋洗畢避

風忌海鮮鮓醬毒物

又塗方治如前

右以白礬一兩二錢煖酒化用馬尾搗塗之

防風湯治如前

防風去芦鼠粘子去枝荊芥穗

人參去芦各二錢 甘草炙 天麻各半兩

右為細末每用一錢水八分入生姜薄荷各少許

同煎至五分去滓溫服

治卒發風疹

右以石灰不拘多少和酸漿水調塗之隨手搥

治小兒癩疹若不治入腹即能殺人

以鹽湯洗了用蓼子按爛傅之又以枳殼剉末煎

湯洗之又以蚕沙二盞水二椀煮一椀洗之

又方治如前

以吳茱萸半升酒二升半煮取五合以綿蘸拭

三奇散治風痲癢疹遍身指之不認痛痒

凌霄花 白匾豆 甘草各半分

右為細末每用一字或半錢蜜湯調服

又方治風痲癢疹心神迷悶

右以巴豆二兩槌破用水七升煮取三升綿蘸之

麝犀丹治風疹不差甚者如癩服之神驗

犀角屑一兩 烏蛇肉半兩 酒浸去皮 天麻半兩

白附子半兩 白僵蚕半兩 朱砂一兩 研



龍腦

射香

各一錢研

右拌勻煉蜜和圓黍米大每服十粒煎金銀湯下  
又方治風疹入腹身強舌乾亦能殺人

右以蔓青子為末温酒調下一錢或半錢又以蚕  
沙二盞水二椀煮一椀洗之

疥癬論

小兒血氣熱為風温所干搏於血氣散於皮膚之間  
而生疥癬又云蟻虫作動內外相乘之所生也

雄黃膏治小兒遍身疥癬如粟痒而搔之血膿出

雄黃水一兩研

雌黃水一兩研

松脂一分研

川烏頭一箇去皮 亂髮一分

右以猪脂六兩於鈿子中煎成熟油入烏頭松脂

亂髮煎至髮消盡以綿濾去粗入二黃末攪勻盛

磁器中候冷成膏每用少許塗擦瘡上日三亦治

又方名同治同

雄黃錢末 黃丹一錢 膩粉一匣

蠟一塊

巴豆十粒去皮

葱五根切碎

右用油一兩入葱巴豆煎黑焦濾去滓入餘藥攪

勻候蠟熔取下磁器中盛放冷成膏每用抓破疥

瘡塗擦

碧粉散治如前

蛇床子微炒

狼毒半兩

硫黃半兩

青黛半兩

右為末膩粉少許拌勻好油調塗擦神效

又方治如前

大腹子 二分

蛇床子 二分

硫黃 一分半

右為細末入輕粉少許好油調勻臨臥抓破擦疥上及以藥少許塗手心脚心手擦極熱甚者不過兩次上

治癬新生

右以砂糖硃砂各一小塊同爛抓破之

又方治諸癬

右以蛇床子為末和猪脂為膏塗之

又方治濕癬

右以桃樹青皮為末和醋傳之

又方治圈而癬

右以羊蹄根乾生為末與醋等分

研細同好醋調塗

又方治諸癬

右以決明子為末入少水銀粉研勻

以物擦破癬上塗之立差

又方治如前

斑蝥 五箇去翅

鹽豉 四十九粒

砂糖

皂子大一塊

右先研斑蝥已將細入二味同研成膏每用一大

豆許湮津調塗上大效

又方治妳癬

黃連 去頭

赤芍藥 等分

右為細末入輕粉少許嚼芝麻採汁調藥先洗淨拭乾以藥傳之不過數次而愈

治下練癬瘡常對在兩脚

右以白犬血塗之立差

治上練癬常在頭上

右以盧會一兩甘草半兩同為末先以溫漿水洗

之以帛子拭乾用藥傅之立乾便差甘草炙過用  
又方治如前

右以大梔子不限多少燒存性為末好油調傅之  
又方治疥癬因用硫黃砒霜藥病愈後毒之氣不歇  
歌去之又以藁本煎湯浴之及用浣衣

金瘡論

小兒有誤被尖刀硬物傷其肌膚其輕淺者雖有血  
出不至危殆其重深者有損傷於經脉血出不止又  
有因傷中風者則口噤身強俗云破傷風也

治諸金瘡 檳榔 黃連 去頭各一兩 木香 半兩

右為細末如治一切金刃所傷血出疼痛以末傅

之血定不痛不膿如斫下指來血未定速將藥裏  
便得連接

又方治諸金刃所傷血出不止

檳榔

石膏

黃連 去頭各一兩

黃蘗 半兩

右為細末隨多少搽傅瘡上血定便入水不妨

又方治如前

右以白芍藥為末貼傅即住

又方金瘡深者不可以藥速令則肉潰傷肉

右以黃丹滑石等研細末傅之

天蛾散治諸金瘡 右以晚蚕蛾不拘多少為細末

搽傅傷上用絹帛封裹隨手血止瘡合大妙

又方治如前

右以五倍子刷淨為末掩傷處血立止較即無痕

又方治如前右磁石末燒礬灰醃帶燒灰千金石灰

未若倉卒之間得一味傅之皆可

治破傷風口噤身強

右以天南星一個防風二寸同為末先用童子小

便洗瘡口後用藥傅之追出赤水是效

又方治如前 右以肉蓯蓉切作片子懸乾用一小

盞子底上穿一孔合著火燒藥如香煙從孔中出

熏瘡口果驗

又方治如前 右以好鱉膠二錢火上炙焦為末熟

湯調下分二服連服一方用一仰一合瓦內燒鱉

至爛斷研細末熟酒調下汗出愈

又方治破傷風腰脊反張牙關噤急四支強直

右以鷄糞白半升大豆二升半和炒令變色乘熱

用酒沃之微煮令豆味出量性飲之

追風散治破傷風 草烏頭四箇二箇生用二箇炮熟

椒二十八粒 右為末貼瘡上風毒自出

又方治如前 右以黑豆四十粒朱砂一字同研為

末酒半盞調下一字差

又方治如前 右以白麵鹽各一撮新水調塗瘡

又方治如前 右以蘓木剉煎濃汁灌瘡中十數盞

不令絕候瘡中黃水出是效

又方 瘡口作白痂無血者殺人最急以雄雀直糞

研熟酒調下一字或半錢

又方治破傷風經驗 右以狗頂上毛燒灰貼瘡上

### 湯火傷論

小兒有偶被湯盪火燒成瘡者輕則初乃炮起破有

黃水而為瘡也重則便皮破肉傷而為瘡也切不可

便用冷物泥蜜之類塗之恐令熱氣不出伏留

潰爛深傷經脈宜加慎之今叙方于後

麻子膏治湯火瘡經驗 大麻子一合生地黃二兩

栢木白皮一兩香白芷一兩甘草一兩

右為麩末以猪脂八兩同藥熬色黃以綿濾去滓

盛磁器中成膏每用少許塗瘡上

又方以洗麪脚日熬乾炒焦黑研細好麻油調塗更

解熱毒以菸葉燒灰研細油調塗之止痛無癢經

驗以水煮大豆汁塗之易差無癢以醋和泥傳之

孫光憲家婢抱一孩兒誤落炭火上燒瘡便以醋

和泥傳之較無癢痕

以栢子房熬乾通風處掛之要用時旋為末好油調

雞翎掃上如鋪水痛便止  
以蛤蜊殼為細末油調塗之如水無癢

以小麥麩炒焦黑研如粉生麻油調塗雞羽掃上  
大妙又以風化石灰不拘多少銚子中炒黃色地  
上出火毒畢研細末生麻油調塗凡傷至重愀痛  
不已敗壞筋骨皮肉者皆治

又以捉一大活鼠先用銚子煎芝麻油一斤至熱  
旋打死鼠候冷頓油內煎直至毛骨俱散濾去滓  
不用入乳香末沒藥末各半兩攪勻上炭火熬成  
膏磁器盛封繫定掘一坑深一尺許窖之候三月  
取出凡遇湯火傷塗之立效亦治金瘡

小兒衛生總微論方卷第二十一

疳瘡論

小兒有諸疳瘡者由內有疳氣因而虫動外被風毒  
所干內外相乘搏於血氣蝕發之所作也若發於口  
鼻牙齒者初則瘡小漸々蝕大其蝕有緩急緩者名  
曰常疳急者名曰走馬疳有至鼻口蝕爛牙齒脫落  
者若發於緣身四支者只名疳瘡若發於陰物者名  
曰下疳其疳皆不甚痛但微痒而已不覺之間蝕以  
深大若不早治皆能為害也

澤瀉散治疳蝕其鼻生瘡及鼻下赤爛

澤瀉

川鬱金生

甘草炙

山梔仁炒各

右為細末每嬰小一字二三歲半錢五七歲一錢  
甘草湯調下日二及用青金散傳之

青金散 銅青 白礬 生各一錢

右為末每少許傳瘡上

黃連散治如前

右先以米泔水洗瘡訖用黃連細末傳之日三四

盧會散治如前

右以盧會為末吹鼻中鼻下有瘡即傳

又方治如前

右以熊膽半分湯化塗患處

又方治如前

右以黑土耳中垢傳瘡上

又方治如前

右以鯽魚膽滴鼻中連三五日甚效

石膽散治疳蝕口鼻上瘡亦爛

石膽兩 亂髮燒灰兩 葭宕子半兩 地龍洗去土淨

分

右為細末入射香半錢同研勻細每用一字貼瘡

又方治疳瘡口齒蝕透

右以白僵蚕去絲絹炒黃為末蜜和傳之

又方治疳蝕牙齒斷爛瘡潰

右以髮不拘多少燒作灰麝末少許同研細勻搽



上立効

龍骨散治走馬瘡蝕口齒瘡爛

砥霜字一

粉霜錢半

龍骨

錢一定粉

半錢

蟾酥字一

右先研砥細入龍骨研細方入諸藥入龍腦半字

同研勻細每用少許傅上

治小兒牙疳蝕斷肉潰血出

人中白

取法用一瓦盆盛衆人尿向盆內至滿

去其清取白脚至乾

研半兩

而

至滿

而

至滿

麝香

半錢

石為細末入糯米飯研勻和劑搓細小短條子臨

時隨牙縫大小割在病處縫中甚効一方只用

傅之

治小兒走馬牙疳

右以雄黃不拘多少研細以連紙條子捲上撚作

紙燈上燒過入鉢中同麝香少許研細捲上

治小兒走馬疳蝕牙斷損爛

以膽礬為末薄切蘿蔔作片子反覆搵末於火上

炙令乾研更入麝香研勻傅患處立安已驗

以五倍子中虫末研細更於麝香拌勻先用漿水

漱口小兒未能漱者以帛子搵漿水挹之頃令留

漿水氣以藥傅之若斷爛即病已深矣若小兒面

上或骨節生赤瘡無頭如爛梨靨者即用此藥貼

之一方用五倍子燒存性為末傅之

又方以不虫皂荚一挺烧灰膽礬四錢為末鹽一彈子大用紙包了黃泥固濟炭火煨清煙起為度頓冷地上椀覆一宿出火毒三味同研勻細每用先以鹽湯漱口了以藥於病處搯至痛復用鹽湯漱之妙以楊花少許燒灰存性入麝研勻傳之

治小兒急疳蝕口鼻數日至盡欲死以文蛤燒灰鴈月猪脂和傳

治小兒疳蝕鼻爛

以膽礬一塊燒令煙盡研末搽疳處一二日差

治小兒疳蝕口鼻作瘡黃瘦

石膽一分 盧會一分

右同研細末搽病處但頻用即爛肉自然成膿便

生好肉亦不別損漸差愈

治小兒疳蝕鼻下兩道赤者名曰疳鼻

以黃連去鬚為末先以米泔洗淨用末傳之日三四次

四次

又方治如前 石膽一分 黃連 云皮末 分

右同研勻細生油調塗之

又方治如前 五倍子 三分為末 黃丹 一分 炙飛

右同研勻細以綿裹貼病處或塗之亦得日四次

治小兒疳蝕滿口徹鼻 麝香 一錢 研末

蟾酥 慢三片 煉如柳葉大 別於研末

五靈脂

去砂石末一錢

蜜半兩

右相和於銚子內慢火熔成膏每用先去却瘡上爛物後以藥塗之日夜四五次

治疔瘡

以胡粉熬八分猪脂和傳油亦得

又方

以蛆殼洗淨焙乾為末每用先以葱湯洗瘡

拭乾用藥摻之以粟子嚼爛傳之

龍腦膏治走馬急疔蝕口鼻

龍腦

一字

射香

一字

砒

一字

白歛

一字

右為細末用獾猪膽汁調藥適稀稠以任子塗上

即差

又方治走馬急疔蝕口鼻數日間欲死

右以藍淀傳之令遍日十次夜四次取差

又方治走馬急疔蝕牙齒斷透損骨

右以天南星一箇當心取作坑子安雄黃一塊在

內用麩裏燒之候雄黃作汁取出以盞子合在淨

地上出火毒了即去麩裏研為細末入射香少許

勻之傳瘡上量多少用

熊膽膏治走馬急疔蝕口鼻牙齒

熊膽

半兩

研

蚺蛇膽

一分

研

盧會

一分

牛黃

一分

研

龍腦

一錢

研

右同末更入射香末一錢拌勻以井花水一小盞

攪和藥勻入磁器中重湯慢火熬煮成膏每服一

豆大薄荷湯化下無塗瘡上一方更有黃礬一分  
治緣身疥瘡用少許塗之

蟾蜍散治走馬急疔虫傷府藏上蝕口鼻牙齒赤爛

乾蟾燒灰秤 葭苈子半兩炒 白礬半兩

生硫黃一分上 熊膽半兩 雄黃一分研水飛

盧會一分研 射香一分研

右拌勻細末每用一字煎荊芥湯調下及傳瘡鼻  
中痒生瘡者以少許吹入鼻中日三

蘭覆散治走馬急疔蝕口齒惡血臭氣不喜所聞牙

齒脫落 黃連末去須三錢 銅絲一錢

水銀一錢用煑枣肉一個同研 射香一字研

石同研勻細先淨漱口了以藥傳瘡上用生蘭香  
葉覆之蝕肉成坎者一傳肉生

三白散治走馬急疔蝕唇口牙齒臭爛遠巡狼狽者

砒霜二物先 石灰研細末三次用

右相合先左研干下却右轉研干下當極細賦如

粉每用以雞羽尖撫少許掃瘡上其瘡便乾慎勿

多用恐毒入腹無令噤津此藥兒小者難用

治疔瘡立效方

黃連去須一分 膩粉二筒 麝香少許

右為細末先含水洗瘡淨乾貼之

又方治如前 大糞內蛆 踏洗淨懸乾

又 蝦蟇

脚只用四

蜜陀僧

史君子去殼

右各等分為末先以溫水洗瘡淨用藥搽貼之及以滴水和元菜豆大煎史君子湯下五七圓

又方治急疔瘡

右以蚘蛇膽研細末水調傅之

治下疔定効散

訶子一兩去核好鴈茶一兩

臙粉十筒

射香少許

右同為末先用漢葱木賊川椒三味煎湯乘熱熏瘡候通手洗澡令膿血淨將藥量多少傅之

又方治如前

右先以韭菜根打碎百沸湯泡洗瘡淨帛子搵乾

用蜜陀僧不以多少研細末入輕粉和勻乾搽傅之効

又方治如前

右以朝生暮老花一錢為末入臙粉十文同研極勻生油調塗仍先以葱椒湯洗瘡離帛子搵乾然後用藥忌酸辣鮓醬等毒物

癰癤論

小兒生癰癤者由六府不和風毒邪熱干於皮膚搏於血氣入客經絡之間留結而生小而有頭者為癰大而無頭者為癰初生則赤腫漸腫起外則皮薄而光內則肉腐敗潰皮而為膿無頭者須針刺破有

頭者不必刺也熟則捻去膿血得盡者即便差若膿血不盡瘡口合者雖時暫得差終須更發或根邊別生若邪毒入深附骨留結者則為附骨癰若出膿血復遇風冷所乘傳搏日久不差者則為疽瘡若外面皮膚雖合而毒氣入裏攻潰轉深只有瘡孔時出惡汁者此變瘦瘡也

右以甘草一兩剉各二寸長用水八分一椀將甘草蘸水文武火上炙至水盡為粗末別用水一椀煎至半椀放溫時量性服取微利其毒自消未利再服

又方治癰癤欲成未見其頭但腫痛不已

官桂 陳皮 等分 右杵末水調傳腫處

又方治如前

右以大黄朴硝等分為末每用三錢入麪一錢新水調塗

雄黃膏治癰癤發赤腫作痛便用龍角散忍冬散

三方大妙 雄黃 半兩 研 天南星 半兩 生末

寒水石 兩 煨 過 一 黃丹 一分 乳香 半兩 研

右拌勻細蜜調成膏攤帛子上貼之

龍角散 地龍 去土 秤 荆芥穗 一兩

甘草 一兩 炙 角刺 三兩 取紫色不枯者 洗淨擣去骨只用皮

右為粗末每用一合水三盞酒一盞煎至二盞半

去滓再至二盞入研細乳香末一錢匕調勻量大  
小旋與服五七歲兒半盞已下分二服日三神驗

忍冬散 忍冬草乾者一兩 甘草節半兩 大黃半兩生

右同為細末每用三錢匕水一大盞煎至七分調  
乳香末半錢匕服如上法

又方治癰癤無頭要生

右以葵菜子一粒新汲水吞下即生頭破而膿出  
要兩處破服二粒要破處即逐粒加之

又方治癰癤無頭

右以川山甲猪牙皂角去皮絃各一兩共炙焦黃  
為末每用一錢熱酒調下服藥畢其瘡便破甚妙

仍以冬辰藤為末傳瘡乾即水調傳之諸癰瘡皆  
可用

乳香膏貼癰癤

乳香 一兩研 膩粉 半兩研

松脂 半兩研

蜜陀僧 半兩研

生地黄汁 半兩

右拌勻先用一銚子煎好油四兩黃蠟二兩至熔  
熟下諸藥攪勻入射香細末一錢熬成膏取下磁  
器盛之窰一宿每用看大小剪絹子攤藥在上貼  
之一日兩換

散治癰癤

沉香 半兩

黃耆 半兩

白欬 一分

川朴硝 一分

川大黃 一分炮

甘草 一分

右為粗散每用一錢水一小盞入射香少許煎至

五分去滓温服

又方治背上生癰瘡凡瘡生背上者非善瘡也

右以多年煙熏壁并黃蘗二味等分為細末生姜自然汁調成膏攤紙上貼之更以茅香湯調下一錢匕大妙

治附骨癰

右以槲皮燒末每服一錢匕以破者以蟻娘七枚和大麥爛搗貼封之

治癰瘡久不差敗壞成蟲

大蝦蟇

一枚

死者

自亂髮

一塊

雞子大

猪脂

一升

右同煎之至消尽上二物時取下入鹽令各攪勻

放冷成膏每用先以龍骨研作粉圍瘡四面厚三

分許以膏藥着瘡中日二易有虫出如髮出盡愈

又方治如前

右以白楊葉杵末傅之

又方治如前雞舌香散

雞舌香

木香

沉香

各一兩

麻黃

去根

海藻

洗去味

大黃

半兩

右為粗散每用一大錢水一盞入竹瀝二三點煎

至五分去滓温服兼煎滴温熱淋溼其瘡

又方治癰疽瘰癧瘡餘治癩瘡方並在後

石綠

濕生虫

右同研細末每用芥子心許紙摺蘸藥任入瘡口



惡瘡論

小兒有緣身生諸惡瘡者由府藏有熱衝發於外  
被風濕所干內外相乘搏於血氣隨其經絡虛處停  
滯留結而生或大或小或痒或痛破潰成瘡或膿或  
血或腐或敗挾毒所作者久而不差皆曰惡瘡若毒  
行攻裡亦皆能變癩瘡也

治兒身生小瘡作痒痛

宣連

去頭一兩

膩粉一分

白及一兩 蕪荑去皮

右為細末先洗瘡淨拭乾生油調塗

治生大瘡作焮痛

黃丹一兩

膩粉一錢

右研勻細嚼杏仁取汁調傳

治生瘡如火燒

右以赤萍蒡葉杵末油調塗之

治肺毒風瘡如癩

右以好桑葉洗淨蒸一宿日曬乾為末每服一錢

溫水調下無時

治惡瘡不識者

右以蠅蛆杵爛絞汁傳之亦治痒瘡

治諸惡瘡

右以黃牛蹄甲燒灰須再三燒令極細末入射香

少許拌勻乾搽瘡上

又方治如前

右以地骨皮先刮取浮皮別收之次取浮皮下白皮如粉者為細末又以其下赤堅皮細剉共浮一處相和為粗末粗細各貯之每用一粗末一合煎濃汁乘熱洗瘡直候湯冷以軟帛拭乾用細末傅之每日洗傳一次取差

又方治如前

右炒鼓焦煙絕為細末傅之不過數次差

又方治如前

右以陳小麥半升不犯鐵器中炒黑色枯白礬灰半錢同為細末每用少許貼瘡上

又方治如前

黃藥如皮

黃連去頭

山梔子

去殼

甘草

各一兩

右各剉如豆大於沙石鉢子內炒令煙絕如敷炭樣放冷研細入射末一錢拌勻先以溫漿洗瘡去血膿淨軟帛拭乾搽藥在瘡上以紙片子蓋了軟帛子包繫護之隔日再用不得入水昔衛州一老兵患瘡九年潰爛見骨得此藥効愈

治久惡不完

右以

猪筒骨

內髓膩粉和為劑却入骨內泥裹火煨

熟取出先以鹽水洗瘡淨後乃傅之立効

追惡瘡膿血

右以巴豆二十粒槌碎用清麻油二兩煎至黑焦

去豆濾過入黃丹一兩以東引柳條數枝攪之煎成膏每用以絹帛攤藥貼之以菱節燒灰傳之治小兒魚臍瘡謂瘡形狀似魚臍也此亦惡瘡候以蛇蛻皮炙焦黃一兩燒灰細研用雞子清旋調少許塗之

治小兒魚臍瘡

以寒食餠燒灰研末傳之以白蒿苕杵爛絞汁先以針刺瘡四畔滴汁於瘡口上

治小兒風氣相搏身生瘡瘍

地龍去土二兩 白僵蚕去嘴一兩 川芎一兩 甘草兩並用生右為細末薄荷湯調下一錢或半錢

治惡瘡久不較肉黑爛膿色黑赤

右先以不灰木檳榔各一分為細末摻貼瘡上候肉紅膿黃即用後木香散

木香二錢 檳榔一錢 黃連去須四錢

右同為細末乾摻貼上用之必效

馬莧散治諸瘡久不瘥變癩瘡

馬齒莧一兩 牆烏蛇肉一兩 酒浸 蒺藜子半兩 炒去皮 亂髮半兩 燒灰

曲頭棘針半兩 燒灰 緋帛子半兩 燒灰

右為細末每量瘡大小用白酒調藥攤帛子上貼瘡上

貼火癩瘡

白膠香

赤石脂

黃蘗

蜜陀僧各半兩

右為細末乾貼瘡上

又方治諸癩瘡

右以蝸牛三箇磁合子內收入射香少許蓋了火內燒過研為細末水和小圓子每用一圓內瘡中

又方以牛膝末傅之妙

又方治如前

右以赤小豆黃連等分為末溫漿水入鹽洗瘡淨

搽藥或只以白膠香末搽之亦効

烏金散治癬瘡癩出膿水痛不止諸藥無効者有虫

右以羊羔兒骨不以多少入藏瓶內鹽泥固濟炭火燒合宜研細每用末五錢入射末一錢堆黃末一錢同研拌勻時看瘡大小先以通手湯洗膿血淨口含洗之軟帛拭乾將藥滿填瘡口當夜痛止生肉三日外瘡合

浸淫瘡

小兒生浸淫瘡者由府有熱熏發皮膚復為風濕相持搏於血氣而其瘡初生碎小後有膿汁浸淫漸大膿汁著處便生故謂之浸淫瘡也又一証風毒濕瘡頗似浸淫瘡亦膿汁浸引而生膿痂遍周比浸淫瘡稍大示

治浸淫瘡痛不可忍漢寒熱

右以刺薊為細末新水調傳瘡上乾則易之

雄黃膏治浸淫瘡經効 雄黃一兩研 水飛 雄黃一兩研 水飛

川烏頭 研一箇去皮臍 末 松脂 研一分 乱髮 一分燒灰

右以猪脂六兩於鈹子內熬成油後入下三味煎

至髮消盡以 綿 去滓入二黃末攪勻盛磁器中成

膏每用少許塗瘡上日三次

又方治如前

右以臈胭脂於灯下用鏡子照瘡口念呪曰浸淫

瘡好夜粧明鏡照紅粉粧每念一遍抹胭脂塗瘡

上如此七遍胭脂抹周遍其瘡愈此法極驗甚者

不過再

苦瓠散治風毒濕瘡

樛上塵半合

乾苦瓠 一兩 蛇蛻 半兩 燒灰 露蜂房 半兩 微炙

右為細末每用半錢生油調塗瘡多添之

四生散治如前

綿黃耆 白附子 羌活 去芦 蒺藜 各等分

右為細末每服一錢温酒調下

標漿瘡論

小兒生標漿瘡者由風熱毒氣客於皮膚搏於血氣

而所生也始生如火燒湯盪作泡而起尋即皮破漂

漿出以成瘡亦甚疼痛漸引相續而生有至遍身潰

爛皮肉不可救者故又曰爛瘡宜速治之又一証生瘡狹長如魚臍黃出水四面亦燍漿泡起此雖與燍漿相似而有少異燍漿瘡者先起漿泡破而成瘡此瘡先乃生瘡後即四面續生漿泡其狀狹長渾似魚臍故名曰魚臍瘡燍漿瘡即不似魚臍也

治燍漿瘡神效屢驗

右以栢葉洗淨切碎細研傳之隨手便乾更取汁半盞水解服之

又方以飛仁去皮尖熟研和面脂傳之

又方治燍瘡黃爛

右燒艾葉灰傳之一方燒馬骨灰傳之

生地黄膏治燍瘡毒甚發引遍身

生地黄洗去蘆 川升麻 藍葉  
梔子仁 大黃 各一兩

右研細以猪脂八兩同於鉢內慢火煎色變瀝去滓以磁合盛放冷成膏每用少許塗瘡上

治小兒面目緣身卒生燍泡

右以殺羊角燒灰研細末雞子白和塗神驗平無  
雕籽和亦妙

治小兒燍漿如魚胞赤爛成瘡熱痛不可忍

右磨家駝糞或塊結而不散者不以多少照乾地上堆定用手壘作屋狀以灯點着燒至欲過盆子

合殺令作黑灰勿令白研為末每用一錢和膩粉  
二錢殘灯油調塗如冰除熱痛甚妙

治小兒標漿瘡起如丁蓋發頭上一兩日後面上曾  
背綠身皆生其瘡熱痛

朱砂半兩飛兩研 胡粉 一兩半 水銀 半兩

右一處研入水二三滴研至水銀無星用臘月猪  
脂二兩於鉢內慢火熬熔去滓入藥末攪勻成膏  
磁合盛放冷即用少許塗之

治緣身生火標瘡如麻豆有膿汁作痒痛一身尺徧

甘草 芍藥 白欬 黃苓

黃連去頂 黃蘗去粗 苦參 各等分

右為細末用蜜和傅之日二夜一亦可作粗散煎  
湯洗之

治小兒標爛瘡

用鐵燒赤淬水中二七遍浴洗以燒艾熱灰傅之  
又以酒煎茱萸拭上又以菀仁杵爛和面脂傅又  
赤小豆煮汁冷洗不過三次差

凍瘡論

小兒有凍瘡者多生於耳倫或脚上由冬月嚴寒之  
氣傷容於肌膚搏於血氣所作初即腫痒須漸破而  
成瘡頗難得差至春暖時自可到冬月冷時復發故  
名凍瘡

黃蘗膏治凍瘡

黃蘗末

白歛

末八兩

白及

末半兩

生芝

麻

取汁

右同研勻細以蒸蘿蔔一枚好酒一盞一處杵爛成膏每用少許先以童子小便洗瘡了後以藥塗又方以雀兒腦髓塗之立差

痲瘡論

小兒夏月多生痲瘡此由盛熱汗津出而腠理開被風熱毒氣干於血氣所生其狀細碎苦菓如粟芥之類色赤而痒多生額頭背之上甚者徧身俗呼痲子痒而搔之亦能成瘡

治痲瘡

以兔絲子並按湯洗之亦治頭瘡及女人面瘡

治痲瘡痛不止

乾藕節末

三兩

生油麻

三合

右先杵油麻爛后下藕節末更入生蜜和調得所塗之三五次差

龍腦散治痲瘡

龍腦

一分

黃蘗

半兩末

白麩

二兩

臈茶

一兩研末

右拌勻每以新綿搵藥撲上破者傳之取差

又方

右以蚌粉研細用雪水稀調臨臥塗之能以熱湯



浴畢塗之更佳無雪水用新水  
又方以雪水磨檀香麝毛蘸掃上

漆瘡論

小兒有偶謂漆傷者本不耐漆或因見聞或因使新  
漆器被漆氣所觸便著其毒而生腫赤狀似癰疹破  
而作瘡微有濃汁亦頗疼痛俗呼為漆咬瘡也  
化毒散治漆瘡疼痛

木通

一兩

剉 藍葉

半兩

麥門冬

半兩

去心

犀角屑

一分

馬牙硝

一分

甘草

一分

炙微赤剉

右麋散每服一錢水一小盞煎至半盞去滓溫服  
垂柳膏治如前

垂柳枝

五兩

苦參

二兩

黃芩

一兩

右剉散每用三匙水兩椀煎至一椀去滓研入好  
墨汁半匙攪勻再熬成膏以磁合盛候冷用少許

塗瘡上

又方以好麻油生用塗上

以黃芩末剉碎煎膿汁放冷淋之

月蝕瘡論

小兒有月蝕瘡者或生耳鼻或生手指隨月生死世  
云月初生之時兒以手指月乃生其瘡故因以名之  
治耳伴生月蝕瘡

右以黃連為末傅之

治手指生月蝕瘡或腫或破隨月生死

右以生薤一把苦酒中煮數沸熟出以傳之

治諸處月蝕瘡

右於月望夕取兔屎內蝦蟇腹中同燒研細傳之

又方治如前

右於五月五日取蝦蟇燒灰研細末和猪膏傳之

又方治如前

右取蛇蛻皮燒灰研末和猪脂傳

又方治如前亦治月蝕九竅皆有瘡

右燒蚯蚓糞研末和猪脂傳

治月蝕瘡生兩耳出膿水不止

水銀

胡粉各一兩入水銀三兩點研至水

黃連

去須為末二兩

粉脂一兩研末

右並同研勻細以粉瘡上若乾即用煉成猪脂和

膏傳仍先以鹽湯洗瘡淨拭乾塗藥一方只用胡

粉和土傳之

又方治耳後月蝕瘡

敗鼓皮

一兩燒灰

蝦蟇

一枚燒灰

右同研為末以煉成猪脂和膏塗之

蠹螋瘡論

小兒生蠹螋瘡者因居處屋壁之間有其虫名曰蠹螋其形寸許脚甚多而細瘦其遊走之時偶遇人影

則尿之隨所尿著處人身則應而生瘡多在腰間初  
生赤小瘡癰如黍粟麻豆荏苒不已長出濃汁成瘡  
因其虫名而名之也北方人便為浸淫瘡也未知的  
否今兩存具之

### 治蠹蝮尿瘡

又右取胡鷲巢中土水和傅之或以猪脂苦酒和傅  
又方取白扁豆葉傅之最佳

又方治蠹蝮瘡繞身周匝則死一云繞腰腹

右取蒺藜葉搗傅之無葉用子

### 水毒論

小兒有諸般瘡瘍因洗面或洗手脚或澡浴等偶然  
水入瘡中則發腫而疼痛名曰水毒宜早治之不尔  
則潰發其瘡變出膿汁遷延時日久不能較也  
治湯水入瘡為水毒發腫痛

右以香附子乾姜各一分皆燒存性研細末傅之

### 赤遊論

小兒患赤遊腫痛者由內有積熱熏發於外被風  
毒所干內外相乘搏於血氣則皮膚赤腫其風邪毒  
氣隨經絡行遊不定故為赤遊也若重者隨血氣虛  
處流注為赤腫或片或渦毒漸引大疼痛難忍若遊  
至於心或毒入腹者皆能殺人

治赤痛遊遍身上下不定若至於心即危

右以芒硝投湯中取濃汁拭之亦治丹毒

又方治如前

右以葫蘆煎汁澆淋之

治小兒緣身赤腫漸引腫起

以米粉熬令黑色研細唾和傅之

治小兒半身赤漸長引不止

以牛膝甘草二味等分咬咀一方甘草減半每用

一兩水一盞煎五分去滓調伏龍肝末塗之大効

又方治如前

以亂髮燒灰同伏龍肝末用膏油和傅

治赤熱毒腫遊行身上下至心即死

以草鞋亂髮燒灰醋和傅之以伏龍肝研末雞子

白和傅乾即再又以生景天杵爛傅上亦治丹毒

一方用一握絞汁拭之以水中苔杵爛傅之又以

松葉杵爛傅之以白豆末水和傅之乾即易

治頭面緣身生赤毒腫起作片

以括樓根二兩伏龍肝半兩為末醋調塗之乾即

再傅

治赤流腫半身紅漸長引不止

以紅藍花末醋調傅之又以芸薹葉杵爛傅之

又方治如前赤腫遊行上下遍身不定

右以芭蕉根汁煎塗之

防已散治如前

防已 半兩

川朴硝

犀角屑

黃芩

黃耆

川升麻

各一分

右為細末每服半錢煎竹葉湯調下

木通散治赤遊成片過赤色如染腫毒漸引大

木通 一兩

川升麻

川大黃

炒碎微

川朴硝 各半兩

梔子仁

甘草

微炒各一分

右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫

服之

截毒散治如前

川大黃 生

欒金

赤芍藥

膩粉

猪牙皂角

去皮子絲各一兩

右為細散每用少許生油調塗之

又方治如前

右以五味子去枝梗焙乾為末熟酒調下一錢痛

自消神効

又方治如前

右以黃蘗寒水石等分為末用薄荷水稀調雞翎

掃塗之乾即再

治赤遊腫遍身入腹即殺人

右取竈下黃土研為末油調塗勿令乾若入腹及

入陰者以慎火草取汁一盞分服如無生者用乾

者末之水調服

赤毒論

小兒丹毒者由風熱毒邪容於腠理搏於血氣發於皮膚之所作也又千金論小兒黃丹惡毒皆熱積所成或冬間向火烘衣夜間蓋覆太暖或乳母愛食燒炙飲酒皆令兒病丹發處其熱如火輕者手近則痛不可忍又有五色丹雖赤色者最多皆焮熱作痛甚者遍身壯熱煩渴悶亂更有諸火丹其名証甚多不可盡述皆赤丹之異名也其毒入腹者亦能殺人宜速治之

治赤丹此熱毒所作其色純赤如丹塗之故名赤丹右以蕎麥麩醋和傳之一方用蕎麥麩用鳩腦和餅索串吊起放乾要用時研末雞子清調膏以雞

羽翎掃上効如神

又方以胡荽汁傳之又以寒水石半兩白土一分研細末米醋調傳以藍淀或慎火草水苔生地黃施子仁但得一味為末水調傳之皆可

治白丹虛腫如吹此風熱所作而風多者其色則白

香豉二合炒

伏龍肝一兩

右同為細末每用半錢生油調塗之

治黑丹痛腫此本熱毒復有冷以乘之互相瘀抑故

黑色川升麻

川芒硝

漏芦

去芦各二兩

黃苓

梔子仁各二兩

右為粗末每用兩匙水三盞煎至二盞去滓稍熱

以軟帛蘸塌患處以消為度  
治丹五色變易不常此風毒冷熱相搏盛衰不同故  
色無定也

棗木根 四兩丹參去芦 菊花 揀淨二兩

右細剉拌勻每用兩匙水二碗煎數沸滴溫熱避  
風處浴洗

又方治如前

右以蜜和乾姜傅之

治急丹引上

右以雞子白和赤小豆傅之

治赤丹

以葛勒藤蔓輕々摩破醋研訶梨勒汁塗之妙以

淬鉄水飲一合得打鉄處淬鉄槽中水澄清用

治黑丹此本熱毒搏於血氣熱輕而於風多故色也黑

以風化石灰二兩屋四角茅草三兩燒灰同研細

末雞子白調塗日三五次効以猪槽下泥塗之

治白丹此本熱毒搏於血氣熱輕而挾於風多故色

白也

以猪糞燒灰研末雞子白調塗

治殃火丹生於兩脇腋及髀上

以川朴硝研細竹瀝調下半錢更大小加減

治天竈丹發於髀裏尻間正赤流陰頭腫或血出

以蚕沙一升水煮去滓取汁洗之  
治廢竈火丹發足跌赤色

以赤小豆末一兩牛角二兩燒灰同研勻細雞子  
白和塗

治尿竈火丹發膝股起臍間走腹頭

以屋四角茅草燒灰研細雞子白和傳

治火燭丹發兩臂及背膝如火灸

以老雅眼睛草葉和醋研爛傳之亦治赤腫

治五色丹遍身壯熱如煎燒若逸臍即損人

以蒹藿葉杵爛水和傳之

治丹毒從臍中起

以伏龍肝研末用屋漏水和傳之乾即再用取効

為度如無屋漏水新汲水亦得

治丹腫起於兩脇心背不速治即殺入

以殺羊角屑八兩水五升煎至一升絹濾去滓入

煉了猪脂五兩和勻傳之

治丹毒忽生頭上皮膚赤腫起暈有碎瘡初發如錢漸

開及身一二尺良久遍体入口耳到臍府胃爛即死

此候可畏宜速治之

以甘草一兩擘破入水一大盞煎湯温令乳母

滿口呷含鼓漱徐徐吐洗病處以手掌摩皆不得

犯指甲恐傷破仍更甘草湯服之三用即差



治丹毒

以鯽魚肉細切五合小豆屑三合同杵如泥水和

傅

千金漏芦湯治小兒熱毒赤白諸丹癰疽癰瘡

漏芦

連翹

白欬

芒硝

甘草

各一分

升麻

枳實

麻黃

去根節黃芩各三分三字

右吹咀以水一升半煎取五分量兒大小增減服

治一切諸丹

以馬齒莧杵爛傅之治赤丹熱如火逸腰即損以

黃芩末水調傅之以華麻子五個去殼并皮研細

入麩一匙水調傅之以水煮棘根洗之以栗子刺

殼煎湯洗之以柳葉一斤水一斗煮取三升去滓

梘洗病處日五六次以坵蚓糞水和傅之以葫蘆

葉浮萍草五葉藤海藻葉但得一味為末水調傅之

又方治諸丹已破作瘡出黃水皸痛

右以豆豉炒焦煙絕為細末油調傅之

千金麻黃湯治諸丹惡毒發處如火輕手近則痛

不可忍急與砭針出血仍與此湯并塌湯治之

麻黃

去根節

升麻

葛根

各一兩

射干

雞舌香

甘草

各兩

石膏

半合

右吹咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日盡

塌湯治諸般數十種丹毒

大黃生

甘草生

當歸

芎藭

白芷

獨活去芦

黃芩

赤芍藥

升麻

沉香

木香

木蘭皮各一兩

芒硝三兩

右咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝覽

烱以綿搗塌之乾則易仍適溫熱用取差止

消毒散治諸丹發赤腫作痛甚久赤遊腫背

川升麻

黃芩各半兩

麥門冬

川大黃剉碎

川朴硝各一分

右為粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓

鱗體論

鱗體者謂皮膚之上如蛇皮鱗甲之狀故又名蛇體

此由氣血否澁不能通潤於皮膚矣又生下便有者

此兒在母腹形像未具之時母曾觀者或曾食喫或

服藥餌有犯鱗甲網罟穢毒之物兒胎中感而化之

故又謂之胎垢謂生下身皮黑垢若鱗者也此必難

治

治小兒身上皮膚若蛇皮之鱗

以白僵蚕去嘴絲為末煎湯適溫煖浴之一云與

蛇蛻同煎

疵醫論

癍靨者謂皮膚之上生赤色或黑色之點大小不等如滓粒之狀緣身猶可若生面上則多惡之女子尤甚此由風邪搏於津液之氣而作又言因傳胡粉皮膚虛而謂粉氣入於腠理化生又有生下便有者此由兒在胎中形像未具之時母食雜有毒感氣而化又有父母遺體所注者此 下二項不可治也

治小兒皮膚上生赤癍

以馬尿洗之日四五次

又方治小兒生赤黑癍

以針刺父脚中血滴癍上即消

又以狗熱尿傳之癍自卷落

保幼大全跋

保幼方刻於冊徒令徐公輯之

而貳守杜公序之序所為具具

徐公意其以喻治其以惠赤子

廷相得受簡讀焉作而言曰命

之矣曩先王盛時方春時和命

吏布德獨先諸萌而多者傳所  
載安萌芽養幼少存諸孤是已  
今  
聖天子生養之德通乎四海至於民  
萌荒忽天闕之病皆思有以救而  
起之而

天子之吏捧匭書宣德意問民所  
疾苦而旦夕親焉者宜莫如令  
令乃職惟醫之工惟我赤子有  
瘳令不職惟醫之庸惟赤子痼  
瘳罔脊以生令卑秩也若容保用  
汝作醫師令其敢忽乎哉公起宗

再為令令孔道敷政布德民萌  
清穆暨諸幼孤有庇無荒忽夫  
闕患則既舉若職矣又刻是書  
以傳傳者傳其已試之劑也惟  
我杜公寔惟長吏惟熟耳目令  
尹行事序所具誠善張之願廷相  
不敏而幸履公之後公所刻詒  
往詔來其將為我告乎夫以舊  
告新命之曰忠忠之一字寧謀人  
云耳其使後而有攷於斯者而為  
天子保赤子不倦忠莫有大焉者矣  
廷相今日坐公舊署據舊几舊窓

窓外舊所憩之對開卷有得拜  
天賜為多若乃奉職無狀而秦越  
我民者公方贊

冢宰簡天下吏治將無以庸醫人

奏遣之廷相即不敏敢不蚤夜以終

告新之賜

萬曆丁丑仲秋八月知丹徒縣

事楊廷相頓首跋

刻保幼大全跋

語曰不為良相則為良醫夫醫技術者流何至眇卿大夫而與相等要以  
搽濟世之具耳今

天官大夫賓梧徐公曩令寧國時偶  
閱保幼大全見其培植稚齒者最備  
因念孩提之童或未能言遇有疾往



往為庸醫所誤是書析理既精載方  
尤悉能家置一部復奚慮天年之夭  
哉因命刷氏用廣其傳甚盛心也迨  
擢繁丹徒謂丹徒為醫之淵藪欲加  
考訂而重刻之無何公且

矣迄今餘禩書之舛訛者校讐猶  
未幾以襲或久魚豕莫問所以保

生者不幾於傷生乎求生而反至  
傷生於是公之初意始戚矣不佞桓  
猥承公後遵其遺風餘範幸免罪戾  
辱命以是書見屬公求民之瘼殆痼  
瘵切身焉桓雖不肖靡知向往柰何  
能不因公而興起哉敬召諸醫殫力  
研究謬者刪之訛者釐之不使有毫

登之羞以詔來者以成公初意他日  
公晉秉台衡以良相加恩四海無一  
夫不獲是書其前茅乎刻既成謾綴  
數語簡末姑識大都云

萬曆丙戌孟秋之吉

馮進士第

文林郎知丹徒縣事會稽徐植跋



