

名医疑问集四

中卷

名醫叢問

內傷 瘰症 痢疾 黃疸 水腫 鼓脹 積聚癰瘕痞塊  
脾胃 嘔食 嘔吐 翻胃 喘膈 痘滿 惡心 吞酸  
嘈雜 咳逆 嘘氣 頭暉 頭痛 脘運 心痛 腹痛 脾滯  
腰痛

名醫疑問目錄

中卷

內傷門一

痢疾門三

水腫門五

積聚癰疽瘻塊門七

傷食門九

翻胃門十一

痞滿門十三

霍酸門十五

瘧疾門二

黃疸門四

鼓脹門六

脾胃門八

嘔吐噦門十

噎膈門十二

惡心門十四

嘈雜門十六

咳逆門十七

頭風門十九

眩運門二十一

腹痛門二十三

腰痛門二十五

嘔氣門十八

頭痛門二十

心痛門二十二

腸痛門二十四

## 內傷門

或曰內傷者傷于內也還是傷筋傷血脈傷藏府傷元氣精神全之治內傷者一皆破血消癥之藥何也

余曰內傷之說不輕易言也凡通俗指說內傷二字便認為跌蹣傷損筋骨死血之外傷反言為內傷槩用破血行血之藥害事殺人不少東垣云外感內傷者言內傷之形症一如外感傷寒相似恐日後錯醫誤治遂有內傷辨要細分析之也余今凡有病症似內傷者盡皆分別于後以破積年之誤

### 七 情內傷脉訟

憂愁思慮鬱怒矜持恐怖驚疑此皆情志抑鬱神思不能渙發意興不揚使精神氣血而暗耗形衰肌色而枯萎飲食漸減亦有虛寒假熱之症淺、

憔悴鬱々不快漸成否膈中滿瘡癥鼓脹諸病脉多沉弦濶數三五不調  
宣宣鬱醒神調氣和血之藥主治

主方 茯神錢 束仁三錢 遠志一錢 當歸錢半 益智仁一錢 半橘紅錢 水煎服  
情志之病本無形之氣抑鬱故藉茯神束仁當歸養血寧神為主遠志益智  
開鬱醒神貝母橘紅開鬱以消痰 如內熱加酒炒川連一錢  
再將寧志丸臨卧服

房勞內傷脈症

淫慾過度竭盡精神元氣頭目虛眩肢體倦怠立心煩熱食味不甘自汗乏力  
皮寒骨熱脚腰酸疼其脉虛大而空數或沉濡微弱無力以培補為主

主方 人參錢半 黃芪一錢 當歸一錢熟地錢半 茯神一錢 束仁三錢  
麥冬錢半

五味玄水煎空心臨睡服

以參芪益元氣歸地補精血棗仁麥冬五味生津如熱盛加知母一錢

如脾胃弱加白朮錢半去熟地參冬焦蜜膏不時噙化河車大造丸空心服  
勞煩內傷脉症

遇事繁冗勉強應酬費心勞形奔走勞碌飲食失節食旨不甘口乾舌燥  
寒熱交加腰膝酸軟其脈虛數或微弱或濡數以調精神氣血為主

主方人參錢半茯神棗仁三錢當歸錢半熟眼肉一錢麥冬一錢五味子

水煎空心臨睡服丹參口如自汗盜汗加黃芪錢半去丹參

曲運神机勞傷乎心遇事多言勞傷乎肺謀慮決斷勞傷乎肝右方皆三  
經養血和肝寧神滋肺益氣之良劑也臨卧服天王補心丹空心服虎潛丸

勞力內傷脈症

肩挑骨重動勞作務用力加一皆能傷筋動骨損氣耗血經絡不知肢體  
痛疼口苦舌燥下寒下熱其脉虛弱而濡數以調氣和血健脾強力之藥主治  
主方當歸二錢紅花五分牛膝一錢杜仲一錢羌活五分独活五分川芎一錢  
連胡索錢半陳皮一錢枳壳五分水煎午前後服後飲酒半盃以助行藥之  
力勞力者氣血不知以歸著補血以紅花胡索和氣血牛膝強腎二活節經陳  
皮枳壳順氣一如胸中不快加山楂二錢去牛膝杜仲

飢餓內傷脈症

因事煩受餓或因路遠失時或因年荒缺濟此皆致傷脾胃清絕之營氣  
反使心胃飽悶嘈雜痞痛肢倦怠虛寒假熱其脉空大無神或濡弱無

力宜和中養胃之藥主治

主方 白朮一錢 茯苓一錢 人參一錢 當歸錢半 白芍一錢 陳皮錢 神曲錢  
炙甘草不水煎午後服 必再服資生丸

失飢則傷胃過飽則傷脾 參木茯甘以益營氣 歸芍以和營血 陳曲以和中氣  
如作脹加山楂三錢 麥芽錢半去人參當歸 如發熱加柴胡一錢 莩根錢半  
去白芍人參 如病久者參木不可少

食物內傷脈症

胃強脾弱不及消磨 所以三脘脹滿不痛不舒 肢体壯熱惡食嘔逆飽嘔  
酸呃逆失氣其脈弦滑而有力頭不痛不惡寒知其非外感也當以和中消導為主  
主方山楂三錢 神曲錢半 麥芽錢半 陳皮錢 甘草不厚朴錢豆豉錢 姜三片煎服

因脾虛不能健運只宜平劑消磨忌用三棱蓬木枳榔過于剋伐反傷元氣  
不能消導矣。如傷生冷加藿香錢半木香五分如傷炙燙加川連三分枳實  
一錢去厚朴如傷火草酒與油膩加砂仁錢半木香三分再將保和丸食前服三錢  
過飲酒內傷脈症

夫脾喜燥而惡濕多飲傷脾酒性屬火善走而易傷心可以有酒客肺癰之  
疾酒作屬水受積而易傷脾胃所以嘔逆恶心暴泄腹痛之恙力不勝者  
甚肩神氣往來躁渴吐瀉之病其脉洪大而滑數以和中為主上下令清自愈  
主方茯苓一錢陳皮一錢 藥香三分蘇葉一錢葛根三錢澤鴻錢半半夏錢半  
豆蔻三分加生姜三片水煎午前後服。如脾泄加白朮一錢

和中理脾以茯苓陳皮半夏和中清胃以荳蔻藿香生姜透表汗以乾菖蒲


葉利水道以澤潤茯苓

外傷

跌打損傷負重閃腰挫氣筋結外則肌肉青紫皮膚破損內則筋骨疼痛不能展舒若瘀血不散寒熱交攻惡心脹滿氣短不行則吸氣串痛往絡不通則伸縮艱難此皆外傷之病今醫家病家誤為內傷禍不旋踵

主方 當歸三錢 紅花一錢 桃仁一錢 胡索錢半 防風錢半羌活一錢 山楂三錢  
陳皮一錢 酒水各半煎不拘時服

右方活血以消瘀當歸為主桃仁紅花順氣達痛兼之山楂為主防風  
陳皮佐之通經活血以防風羌活向導瘀血未盡加紫蘇五錢先煎然後入  
前劑 如大便不行加大黃三錢



瘡瘍門

或曰瘡之為病如何為瘡？發時怪異非常何也請言其詳

余曰經義顯名深而未悉前文已備論而未詳蓋瘡字從瘞者凌瘞之義寒則振慄鼓顙而戰抖熱則憊瘞引飲冷物而譖妄經謂陰陽相爭也及其病發任其寒熱不能禁禦聽其凌瘞瘞故名曰瘡

或曰瘡之所發受病必有其因所謂夏傷于暑；邪伏內而發謂之因也

余曰內經所云傷暑者非為暑時傷也夏天宜熱天時反涼為之夏行秋冬令暑氣不伸民病瘡痢是天下人共傷其時也非言一人受傷于暑也感冒之因不等有從外感者有從內傷者外感者先由足太陽膀胱經足少陽胆經足陽明胃經三經屬表病從風暑寒濕瘴氣傳染謂之外感之邪以

踈散表邪為先內傷者從足太陰脾經足少陰腎經厥陰肝經三經屬裏病  
從飲食積痰氣鬱怒房勞碌或素有瘧否者謂之內傷之邪緣內者  
未必不因外邪所感而發外感者未必不因內触而病臨患者用藥審明內外的確  
或外感為主兼治內傷或內傷為主兼治外感必竟辨明新久虛實三陰三陽  
與治傷寒熱症方法一般主治此論受病致病之因也

或曰瘧之發也如何而寒如何而熱；從何發寒從何來未解其義再乞詳示  
余曰所謂陰陽相爭者何謂之爭；者彼此亢拒而爭鬭也爭時各有勝故  
有寒熱之分所謂陰陽者非三陰三陽經絡之陰陽之正指營衛之氣而言  
也營為陰氣不與衛氣同行自行于脈中循脉上下左右四肢如循環而轉  
運也衛為陽氣不行血脉之中獨行于皮膚分肉之間內外出入者也前論受

邪固有內外表裏之分在外衛氣必先受之所受之邪固  
有風寒暑濕飲食房勞碌之因不同實皆痰涎由經絡府藏為致病之  
根淺論所云未必不無表裏之兼症而發但有盛衰之不同故發有寒多熱  
多之不等要之營衛彼此受病方有陰陽相爭之症若非營衛同病即有內  
外諸邪所感竟為感冒寒熱之別病矣不名陰陽相爭而為之瘧也其發也因  
瘧疾阻碍于經絡府藏募原之間彼時營衛之氣為痰涎之所混亂触發  
二氣有所交錯妄行彼此抗拒此時營氣偏盛反抵抗于外拒絕衛氣于內  
不容外出陰陽僭盛而為寒則振慄鼓顙顫抖畏冷重衣厚被烈日圍  
爐不能禁禦何也因衛氣閉于內而外無陽氣惟營經之陰氣獨盛故耳戰  
後陰氣自衰衛氣偏盛復仇而独亢于內少刻皆發于外表裏皆熱一則

內外壯熱煩渴諸妄頭疼体痛渴欲引冷不能濟其躁何也陰氣已衰陽氣孤盛故耳戰後陽氣亦衰營衛之氣方和痰涎由內嘔而盡汗邪由外透而解或一二時或五六時風恬浪靜雨散雲收而愈後飲食如故起居如常故謂之癰

或曰癰發時有一日者兩日者甚至三日其故何也

余曰此從邪之所腠有深有淺故有早晏之不同耳如痰涎盛于經絡血脉之中者為淺營衛易觸而易發則隨汗吐而易散易清所以易愈也若痰涎伏于六府募原之間者為重營衛不易觸發一日則晏發時痰涎必淡汗吐下三法而方散也若痰癰沉陷于五藏至陰之處者為深營衛更不易觸發触發則病至以其沉陷痰涎難盡不能隨汗吐下三法而盡故難愈也

或曰瘧之寒熱相爭由營衛不和至瘧之發時由營衛触動疾延疫  
延鼓動而發疾延有深淺故發日有早晏有易愈有難愈可謂明悉俗有  
胎瘧之說從古未聞書中未載原為一日一發其邪不高深甚有百日半年  
不能愈者何也

余曰所謂胎瘧者確論也書中未載先哲置之不論致後學茫然無知使病家  
失于調理只因瘧為微疾而竟忽之不知胎瘧失于禁忌治添錯悞傳變別  
症必死不可不分析而預為調治也蓋營衛之氣人身之大陰陽也天地之  
陰陽和萬物得以生長收藏人身之陰陽和精神氣血有所資生今瘧乍  
營衛不知不不知則氣血日衰而自病矣今人惟知執方治病不知病之深淺  
致病之理一槩亂治若或已經發過一次兩次者其邪不能久由于中隨發

而隨汗吐下而解或服寒或不服寒皆可速愈也若或胎瘡者何故難愈  
以其瘡疾禁固久而于中必藉脾胃之元氣以助營衛之陰陽使病發時易  
于透達在裏則腸胃要清虛在表則汗液要清微在中則痰涎要清盡  
如此則脾胃強健而易愈食易運即胎瘡之邪從表裏疎透而即愈矣余  
治瘡病必先問明先年已曾發過否彼云從未發者即以胎瘡治之禁忌論  
之外避風暑內禁葷酒麯食海味糟物先疎散在表風寒暑濕之藥二劑  
雜服表裏和解寒熱清理痰積之藥二劑或再服開胃健脾清痰之藥  
二劑宜禁服諸藥及內截外禁符術之屬法聽其自發一時只服淡姜湯  
以取汗一透如雨其知方盡須候面黃金之色目珠指甲皆黃其瘡欲發必  
輕待瘡初將輕即用麻黃六君子湯四劑而愈或加輕即不服藥而愈矣

今之胎瘡者因病家不知禁忌而心訟。速醫家隨順其性強欲止絕反致受累也。若胎瘡要在從幼早發者必輕何也真氣足而邪勢遠也。若中年發必重老年發者尤危真元已虛不能當此寒熱之凌虐也。服藥愈加謹慎方保無虞如枳榔青皮草窠不可妄投切忌々々

或曰常見瘡症有服藥而不愈者有不服藥以禁法而愈者禁而能愈人皆謂之邪瘡也。邪者鬼神偶爾附之藥力何能若非禁法終不能愈。

余曰邪者言外感六淫之為邪言瘡疾之淫膠固于中之為邪非真有鬼祟之為邪耳如何禁法而能止能止若其外邪原輕必固服藥之力將欲近愈之時也因禁而愈人以知禁法為神教不知藥力之有功蓋脾主信以其外用禁法此理已預信其今日必不發可以相忘而強禁絕其不發也。若遇胎瘡三陰之瘡

多受其禁絕之害反使瘡和乘其禁絕截一為二截二為四常使截其不得透發而變亂也其害不淺

或曰瘡固不宜截如此寒熱何以當之或寒多熱少或熱多寒少或先寒後熱或先熱後寒而重復又熱或有汗或無汗或日發或夜發或上前或落後其義何也

余曰陰盛則多寒少熱陽盛則熱多寒少營氣先爭則先寒後熱衛氣先病則先熱後寒終始藉陽邪外透重熱而汗出為解氣血足營衛和則有汗有汗易愈氣血虛營衛裏則無汗無汗難愈在陽少之表則日發日發者易愈在陰分之裏則夜發夜發者難愈由內而達外則日發早日早者易愈由外而傳裏則日遲日遲者難愈

或曰瘡之本義已悉當藉何法主治以俾速效

余曰數速則反遲何也陰陽錯亂使其不和愈加病矣惟順其病邪之所在以  
之解清和為主只以後法之平劑主治未有不速愈者也

諸瘡脉候

瘡脈多弦數則熱弦遲則寒浮弦為風浮緊為寒弦入實有食弦滑多  
痰弦濡血虛弦長則氣盛虛弦無力為虛脈來微滑平緩即愈

太陽之瘡現症

凡風寒暑濕為六淫之外邪由表而傳內者瘡發之時在表必頭痛項強周  
身周節酸疼惡風畏寒恶心欲吐寒多熱少六脉浮弦者為風浮緊者為寒  
浮數無力者為暑濡軟無力者為濕以後方疎解在表諸邪汗透為佳

治表主方 防風三錢 川芎一錢 羌活錢半 蘿蔔錢半 薏苡錢半 夏葛錢半

陳皮一錢 甘草亦加生姜三片 葱頭三個 水煎空心服

黎明午前陽分不拘日發間日發七日內可服七日外不宜服凡治瘧之藥必湏黎明午前陽分熟服其邪易退恐早不能得便湏隔夜先煎、好露在露天借天地之正氣以勝邪氣至黎明收來熟服以取其快便耳若瘧初來時正發時切忌診脈併服藥何也無燭之熱無診渾之脉無治瘧之汗言其陰陽交亂之際服藥反助其邪；餘盛也必待勢衰而後服可也右方羌活辛蘇皆辛甘發散在表之邪陳甘半豉辛甘平腐和中清胃之藥如風寒盛照方增損有暑邪脉必數而無力不惡風寒必多熱汗湏加葛根三錢者如錢去羌活川芎 有溫邪脉必濡軟無力頭重如裹癱瘓如在重室言侏瘦

而重著惡心嘔疾微；有汗宜加蒼朮一錢去川芎

少陽之癥現忘

或外邪之初病即感于少陽者頭微疼不惡寒周身不痛惟脅脇脹滿惡心嘔逆口苦或由太陽已罷傳併少陽者寒熱相半脉必浮弦二數而滑只宜後方和中清解

和解主方柴胡三錢前胡錢半防風錢陳皮錢半夏錢半甘草參

黃芩五分加生姜三片服法如前此方不拘日發間日發皆可服

邪在少陽為半表半裏汗吐下三法皆所禁者不論初起傳來及風暑寒濕皆用前方柴胡之辛而苦者清熱清解也以前胡清裏防風清表兼為和解之藥陳皮半夏生姜順氣消痰為和中之劑黃芩甘草清邪熱耳

如鼻乾口渴內熱者加葛根二錢去防風。如瘧已經十四日外者加人參一錢  
茯苓一錢當歸一錢減去前胡防風黃芩已便多服

### 陽明之脉現志

大熱大渴寒少熱多裏中火氣出頭痛頸躁惡心喜冷飲脈必浮洪弦長疾  
嗽薰之理當清解忘用燥熱之藥

清解主方 葛根三錢 柴胡錢半知母一錢貝母二錢 陳皮錢半甘草亥

茯苓一錢加生姜一片服法如前 即日發間日發皆可服如煩躁加知母一錢  
何首烏五錢如心急加半夏錢半姜一片茯苓五分去知母貝母 如虛加人  
參一錢如汗多熱極渴欲飲水加石斛一兩人參一錢知母一錢半柴胡

陽明者兩陽合明故熱多寒少躁熱發渴用前方清脾胃之劑以清解熱

邪易于發越耳

太陰之瘧現症

脾喜燥惡濕脾瘧三腕脹滿異常嘔吐不思飲食寒多熱少四肢畏寒肢多沉弦而微滑泄瀉腹痛理當用和中溫散藥主治也

溫中方 茯苓一錢陳皮錢半半夏三錢厚朴五分藿香一錢甘草三分防風錢半桂枝五分加生姜三片服法如前不拘日發間日七日之内皆可服

太陰之瘧大半屬濕痰脾土弱而胃氣薄者居多以二陳湯半夏為君燥湿消痰俗云無痰不成瘧防風桂枝生姜之辛溫以透達表邪藿香厚朴之辛苦以理脾胃之濁氣 如閏節有湿作痛加羌活錢半 如內熱渴得無汗加葛根三錢減半夏錢半本桂枝 七日後脾胃虛弱加白朮二錢人參一錢減半

夏錢半防風去厚朴

少陰之瘡現症

足少陰腎經受病者必因房勞肉傷元氣先虛故瘡邪得而陷之其藏遠其邪深必為三陰之瘡發于子午卯酉初起腎與膀胱為表裏湏先服升散之藥四劑後用補藥培補元氣其現症腰膝無力肢體虛倦形寒槁枯煩躁匪寧六脉虛微虛數虛強捲不外清升補益之劑主治

升散之劑 當歸二錢 川芎一錢 升麻二分 独活五分 陳皮一錢 甘草三分 焦羃茶半  
人參一錢 加生姜二片 東頭一个 水煎空心午前服

邪陷少陰用升麻獨活以升散邪陷血分以歸芎和血之藥為養正人參扶益元氣陳皮甘草以和中如有痰加半夏幾半如惡寒加桂枝一錢

補益之劑 人參一錢半 黃芪一錢半 知母一錢 當歸二錢 川芎一錢 柴胡一錢

升麻三錢 陳皮半錢 甘草三分 加生姜二片 水煎服添同前

養正可以勝邪 參芪以益元氣 當歸川芎以補血脉 升柴以舉發陷下之邪  
陳草以和脾胃之滞氣 如有痰加半夏 如脾虛加白朮 茯苓減歸芍 如  
陰虛加知母 五分 何首烏 三分

### 厥陰之瘡現症

厥陰者陰之盡也 痘淡勞傷勞役血虛氣弱 暴怒鬱怒其邪易陷而難愈  
瘡發于寅申正亥與少食多六脉虛弦無力 初發以小柴胡湯合四物湯  
先為清散後以補中益氣為主治

清散之劑 柴胡三錢 茯苓一錢 陳皮錢半 半夏錢半 甘草二分 人參一錢

升麻五分加姜二片服法如前。如肢体頭目煩痛加防風錢半錢人參升麻  
欽陰風木受病以柴胡為君升麻為使清散鬱結之邪。二陳湯加人參以益  
脾土不使反制庶知斟酌易解。

補益之劑人參錢半黃芪一錢白朮一錢紫荳一錢當歸二錢陳皮錢甘草  
二錢半夏錢半牛麻五分柴胡錢半川芎錢加東頭一枚水煎服法如前。  
此和苦為最也。二陳湯為健脾運痰之要藥升麻以達虛陷之清陽。如瘧  
經月餘不愈者前方加醋浸炒常山錢半即愈。

或曰有但熱而不寒有但寒而不熱者何也。

余曰有單寒而不熱者水瘡也陰氣偏盛元陽不足之証也以溫補之藥主治。  
如單熱而不寒者壯瘡也陽氣偏盛元氣虛極之候也以清補之藥主治。

溫補之劑 茯苓錢半 陳皮一錢半 夏一錢 炙甘草 玄肉桂 一錢 乾姜一錢  
防風一錢 差活一錢 加生姜三片 水煎服法如前

日久元氣虛極 加入參二錢 白朮三錢 氣虛則寒多此方溫中兼補益  
補益兼外散也

清補之劑 何首烏一錢 知母三錢 當歸錢半 人參一錢 具母錢半 桔紅一錢  
紫胡二錢半 水煎露五更熱服

如瘧久不止 加烏梅不 如陰虛則熱 煎伏于血分此方清補兼杜瘧之  
患耳

或曰無痰不成瘧 凡清瘧疾以桔梗 草薢 常山此治瘧之要藥 可以清脾飲  
四獸飲諸古方所遵守者也 前方置之不用何欵

余曰不然古方治今病今人用古方各有可長不必拘泥只要病好善用  
醫治若余三十年治瘧痢楡榔草果百人之中只不過一二入可用青  
皮常山只有四五人可用而也非置之不用苦無可服之人耳何也今人  
元氣不如古人之充足今人之腸胃不若古人之厚實耳

痢疾門

或曰痢者利也如何歟去不能去不歟太反裏重後急下迫窘痛刻不能緩及至登圓所去不過一二點又不卒矣何以為痢疾

余曰形言痢者正因其不利也以其不歟利而利耳內經謂之滯下歟下而滯結而不通之義援屬無形溫熱之氣下滯迫滯于肛門是火性急速之勢或曰所病之積垢或紅或白或黑或豆汁或醣魚酒者或即愈或難愈或至死者何也

余曰其積有府藏之分亦有表裏之因治痢之法慎之於初易愈若不善調治難愈若錯悞傳藏者死若因外感悞治者死其色之不同隨溫熱之毒論之傷于氣分則白者易愈傷于血分則紅則難愈紅白相兼氣血

兩干者難愈此皆小腸大腸六府受病謂之積滯積滯者雖云濕熱之氣  
蘊積而或名假水穀糟粕而成也故曰易愈若日久飲食日減熱毒日深  
由府而傳于藏其色不同其形亦異如魚脰者如醬豆汁者脾病也如醯  
魚鹹滯者肝病也如屋漏水者腎病也可謂傳五藏者危也

或曰下痢之病獨見于夏末秋初春冬則少可是夏傷于暑秋必瘧痢因暑  
毒久伏于府藏而成病也

余曰不然若有暑熱干于府藏從時則霍亂渴傷暑中暑之病立刻便  
發焉能久留于府藏名安能無恙之理內經所云夏傷于暑秋必瘧痢  
者非謂暑毒之所傷大凡夏令宜熱若從其熱而在外之汗液蒸透則  
無瘧矣在內不為冰水生冷所干謹慎飲食則無病矣今人畏暑貪涼

外受涼風而退汗液閉而不透至秋隨所感而為瘧內食生冷油膩冰水瓜桃使暑氣閉于大小腸薰蒸生冷之性混積于中鬱蒸為溫熱之毒至秋收之令其氣閉而不通隨所触而變痢此傷暑二字非外感之所傷實傷遺時之所傷也若長夏居處暖室夜不露生食涼忘食生冷油膩等二病可未杜也瘧痢二病皆從狠性不詳之咎也

或曰夏月炎暑之時人皆知其暑毒恐有其感伏後有瘧痢之患預服香薷飲六一散之類二病仍不能免者何也

余曰典其服香薷飲六一散不若散飲食慎起居遠房勞惜精神勝服香薷飲六一散多矣若身中果有暑氣在內服此可以去病若無暑氣在內是無病服反傷脾胃之元氣是招受其病也戒之慎之

或曰有病痢而噤口者死有老年如素而病痢者死何也

余曰前文所云致痢之因、于傷暑然而發病之痢各有形神不同。有外感內傷之分。病之体有性實有虛。腸胃有厚有薄之不同。若外感之痢。其傷寒之治法一同。須分三陰自利三陽自利。初起必頭疼發熱。嘔惡不食。若以平常六府之積滯醫治者死。蓋老人元氣虛。腸胃薄。初起不敢消導。隱忍而悞治。傷精神元氣必死。腸胃虛薄皆由如素人不能勝其濕毒。痢脫元氣者死。

凡治痢之法須慎。七日之內先辨外感內傷。審其性虛實。量其腸胃厚薄。察其胃氣何如。在表者先發汗。在裏者急為蕩滌之未盡。再為化導。必候腸胃清楚。只食穀食。忌用草腥滑腸之物。凡感外之症。利于湯藥。不

病于九散內傷之症利于九藥不利于湯藥如此亦治百無一效但今有病者不以病為重任性不醫後或危病指掌所處諸方不及再重九所未悟若略叙于後以裨採用

### 治外感之劑脉症

所云外感者外感風寒暑濕之邪不作表症隨秋收之令內陷于腸胃與暑濕之毒相伴而為病常人惟知治癆竟不知踝散之客邪先用硝黃湯滌有形之積滯積滯不行外感無形之邪乘虛陷裏閉于脾中否結不舒使胃氣久閉俗云噤口痢是也凡有頭重體熱或寒熱似瘧否滿嘔惡腸胃窘痛下痢濃積不思飲食其脈若浮弦為風寒浮數為暑浮濡為無力為湿此屬三陽自利急宜羌活湯先踝右表之邪假寒遠邪解作涼方可議服

香連道滯丸蕩滌積滯三日之後表裏皆清以柴葛解肌之藥和解以香連丸治癆七日之後可獲全愈矣若表裏一差變症不一也脉若微而沉滑或虛而無力乍寒乍熱恶心嘔吐四肢厥逆乍癆如豆汁魚膚瘡漏水者此三陰自利急宜桂枝湯解表之邪也透以香連丸化滯以略道其積滯健脾胃中湯溫消溫補及香連丸固本丸培補元氣為一定之理

治三陽自利味表之劑 防風三錢羌活錢半葛根錢半豆豉一錢神曲錢半陳皮一錢蘇葉一錢甘草二分加生姜三片水煎午前後服 如風寒照方

有暑加葛根錢半香薷錢半減防風去錢半再大豆豉 有濕加半夏錢半去葛根 右方防風去風羌活去湿蘇葉散寒乾葛清暑豆豉消食神曲化積陳皮甘草和中治三陽表症之要藥也

香連導滯丸姜湯空心送服二三錢如不行連服二三服以通快為主三日前皆用前方三日後皆用後方

治三陽自利和解之劑 茄根三錢 柴胡錢半 白芍一錢 川連一錢 陳皮一錢  
甘草二分 山楂錢半 厚朴七分 加姜一片 水煎午前後服 如有痰惡心加半  
夏去白芍 和熟尚在少陽、明之表以柴胡解散積滯尚在腸胃之間以  
山楂陳皮厚朴甘草分消黃連化溫熱 白芍和血脉 曬明白利厚朴者  
連九空心飲湯送服二錢旬日另當換調補之方

治三陽自利清表之劑 防風三錢 桂枝五分 羌活一錢 茶錢半 陳皮錢半  
甘草二分 蘇葉一錢 生姜三片 水煎午前後服

三日之前服此劑表熱清暑當繼後藥治積滯香連化滯丸空心姜湯送

服二三錢以通利為主不利再服 三陰自利多屬裏虛而外邪勝之宜  
溫中散寒三日之後以脉症早辨虛實則無力虛則急繼溫補以防  
發呃下利不禁之虞

治三陰自利清表之劑 茯苓錢半 白朮錢半 陳皮一錢 甘草二分 肉桂五分  
炮姜五分 澤鴻一錢 砂仁五分 姜二片 水煎午前後服

四肢厥冷發呃加附子五錢 下痢後重不禁加升麻三分 紫胡五分 黃芪錢半  
去澤鴻香連固本丸掌心用入參湯服二三錢

治內傷諸痢脈症

內傷者因無形暑濕之熱氣蘊積于大小腸偶為飲食失節併合于中鬱  
蒸為積胸腹脹滿壅迫為痛而下迫後重不通六脉或洪滑或弦滑或

弦數此皆初起積滯未行以煎丸同服攻逐為先三日之前表裏不利  
踈通為主

治內傷初起之劑 胃根一錢 香薷一錢 厚朴一錢 陳皮錢半 甘草三分 水通參  
木香 杏川連一錢 山楂三錢 加姜三片 水煎午前後服 白痢加半夏二錢去  
川連 紅痢加白芍錢半 當歸一錢 太厚朴木香 香連導滯丸空心白滾湯  
送服三五錢 不利再服以利為度

凡前初起知其脈症為有餘要在三五之前急用表裏攻逐以本病為先  
萬勿延緩元氣虧脫積毒猶盛不可治也

治內傷七日前後和中之劑 扁豆三錢 茯苓一錢 車前錢半 川連錢  
白芍錢半 陳皮一錢 甘草三分 升麻五分 水煎午前後服

表裏有餘之邪已經疎利相宜此方和脾胃以分利清暑熱為調理之平劑  
如氣虛加人參錢半減黃連五分白芍五分如紅積尚多加烏梅五分如腹痛  
異常加金银花一錢將香連丸空心服上三錢

治內傷半月前後調服之劑 茯苓一錢人參錢半 黃芪錢半 白朮三錢 陳皮一錢  
砂仁五分 甘草二分 升麻五分 水煎午前後服

小便不利加澤瀉錢半車前三錢 刺久中氣必虛飲食日減若非參芪朮茯  
不足以培補脾土 虛中氣否結以陳皮砂仁開胃氣虛則氣陷而後重以  
升紫柴其虛陷之清氣或積氣未盡以香連導滯丸或香連順氣丸煎服  
若元氣虛極以香連固本丸同煎劑治之

治內傷血痢之劑

暑毒服于衝脉其血因熱而內傷所以下皆鮮紅散血或瘀紫血死血其脉滑數可治若弦急或濤數不治此肝經之利與脾胃薰治可也此症若血是血壅是薑最難調治者

主方人參錢白芍二錢川連一錢烏梅五分牛麻五分甘草三分地榆錢半阿膠一錢水煎午前後服去刺者連丸空心白湯下三錢所謂血痢者衝脈受病肝經不能維持耳右方皆和肝益脾之要劑

或曰有患病數月半年不愈者如此久病不致傷生何也

余曰此為休息痢也以其痢久不休息耳皆因初起輕忽失于分利致濕熱之氣伏陷于衝任之脉氣血不和偏遠不休只宜調和氣血以培補元本不必顧其積與滯也人有胃氣者生無胃氣死者言休息病在衝任幸脾胃尚健

飲食雖減而日進故久病不死若胃氣絕而脾不運肢體浮腫氣逆而喘者死凡痢也經五十天外不必拘于治痢只是補脾胃之元氣元氣已復餘病不必治若再治痢未有不死者也

治休息痢之劑 人參錢半 白朮二錢 茯苓錢半 白芍一錢砂仁五分 神曲一錢  
陳皮五分 朴麻二分 甘草二分 漢鴻一錢 水煎午前後服

治久痢脾虛浮腫喘逆否脹之劑 茯苓三錢 人參錢半 藥皮一錢 車前一錢  
蘆梗一錢 白朮一錢 桔紅一錢 姜皮一錢 水煎空心午後服

經云必先歲氣無伐天和有其時必有是病未來時當預為之防病

山生時當早為之治一二分謹守明醫調治可免枉死

黃疸門

或曰黃疸之病本微淺之疾犯此症者甚多常服草藥一二服即愈矣甚有成中滿而死者何也

余曰正謂其病微輕淺而忽于早治故有中滿之後患益起病之因不同傳變  
亦不等若病只因飲食不調濕熱內蒸在腸胃之間者輕外感客邪病在肌  
表者亦輕若因內傷元氣勞損不足憂思失血房熱不詳病屬藏者重何  
也由府而傳陰也由表而傳裏也凡病一于藏也輕病必重一病必死根因病  
之輕重而輕忽悞治故也

或曰黃疸所發固有表裏輕重之分然而致病之黃何也

余曰黃乃土之色是脾土之熱內蒸閉而不透如會醬黃一般將濕熱鬱蒸之

氣抑鬱不透會而為黃只在肌表六府可以分利小水散表鬱熱使內外皆通即草藥亦可愈也若遇服寒涼或內傷不足使正氣愈虛在府藏血脈津液盡會而為黃表裏皆病復時表裏未必分清或神渴早晨失度不善調理而加病以致危篤者非病之必危以其病輕而易致于危也

或曰治痘之病有無分別否

余曰不獨治痘凡一聚雜病七日之前治表標七日之後標而本之半月之後又當標本而標之一月之後又當治本而已經云治者知標知本萬舉萬當不知標本是為妄行所謂知標本便知虛實也今將治痘之法分治于後

治外感表邪黃痘脉症

若外感寒濕之邪抑遏生陽之氣，鬱不透會而為黃。從外走內，越未盛，小便未黃者，頭重作酸，寒熱往來，其邪正淺，急用後方疎解，得汗而散，血脈自和，不滲于肉，其脉浮而微數，此為輕淺易治者也。當禁大葷，食海味、甜酸、糟粕之類。

主方 艾菖二錢 荆芥錢半 防風一錢 羌活一錢 泰凡一錢 茵陳三錢

淡豆鼓錢半 生姜二片 葱頭一个 水煎空心服。如胸中否滿加枳壳一錢。

如惡心加半夏錢半。濕熱鬱鬱，會于皮毛，謂之金鬱。金鬱則當泄之，故用茵陳羌活荆防，艾菖氣薄，味辛之劑，以發散在表之邪，抑遏為黃。濕熱在表，故用茵陳、秦艽、豆菖，氣平，味苦之藥，有利在表之效。

右飲食內傷黃疸脉症

若肉因生冷油麯茶酒為有形之物，傷不能久清于蘊積于腸胃之中化為濕熱之氣，其氣又不能清散蒸會而為黃。從內發小便先黃，即由內而滲于外兩目指甲皮色日漸而黃矣。胸膈脹滿惡心煩渴二便不利，此謂有餘之病，脉必沉滑或弦滑而有力。三日之前原宜前方先服三劑，即用後方湯滌有形之積滯。

主方 苦蔴五錢 山楂三錢 神曲錢半 紅曲一錢 枳實一錢 木通五分 陳皮錢半  
水煎十分另泡生大黃三錢熟服以利為度，不利再服。其下者引而喝之使  
溫熱之氣蕩滌而清。苦蔴本陳腐之氣，從治溫熱之性而為向導之君，以  
神曲紅曲化內熟，蒸之溫熱為佐，使大黃氣味苦寒以瀉腸胃之溫熱為  
臣，查枳陳皮木通之辛苦以利腸胃之積滯為佐。使如有瘀血者，脉必

弦濶而寒熱交加如小便利而大便秘結加桃仁二錢紅花錢歸尾一錢去神曲陳皮若干七日已前可服

治黃疸和解之劑 治七日已後表裏已清其黃未退胸膈不利二便未快猶有餘未盡之邪脉必滑而虛數而不清此劑加之首陳五錢神曲錢半紅曲一錢乾菖二錢半陳皮一錢澤鴻二錢猪苓一錢川連一錢加姜二片水煎午前後服退全啟脾丸空心姜湯服胸膈作脹加枳壳陳皮大便秘結加枳實山楂若干表裏上下内外久清以便多服耳

治內傷元氣表裏黃疸脉症

凡黃疸不論外感內傷有餘者多裏虛不足少若綿延日久不虛而虛須用後方斟酌主治脉必沉微濶弱或濶數不清者飲食不減肢體羸瘦顏


色焦黃中滿泄濁寒熱往來當從虛治如肚腹脹大氣逆而喘五臟之  
真氣已絕者不治茯苓三錢陳皮一錢半澤瀉錢半肉桂五分炮姜一錢首  
蓆五分防風一錢加姜皮一錢水煎午前後服如脾虛作濁加白朮一錢減  
茯苓錢半參木同用亦可如真陽不足加附子五分如元氣虛極加入參錢  
所謂內傷裏虛諸症發黃即陰黃也以溫補之藥主治非參木不能挽回  
若氣喘腹脹弦濶者不治理中丸空心白湯送下二錢

### 治女勞黃疽脈症

脾腎之元氣先虛偶犯房慾酒色併發而為疽此不足有餘之病也其  
色黃而帶黑色而枯萎六脉虛數此陰虛火盛之症以清補之藥主治  
乾葛錢知母錢半茯苓錢半半夏一錢牛膝三分丹皮五分茵陳三錢

廿四

水煎去前後服之七日後不愈加入參五錢至錢半止全匱腎氣凡白濁  
湯股三五錢



水腫門

或曰所云水腫者其水如何不外從小便中分利而反行于皮膚肢體之間而為腫為脹何也

余曰非水也氣也經云三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液出焉氣化乃能出也又云飲入于胃遊溢精氣上輸于脾氣散精上歸于肺氣通調水道下輸膀胱水精四布五行並行以經義論之皆由氣之施化通調若氣虛不能通調施化便成水腫也

或曰既云氣不能通調施化只宜否滿作脹如何為水腫其水只宜畜于腹中腸胃之間如何說氣不能通調施化其水不能自行氣得氣行而後行其氣既能行于皮膚不能通于腸胃耶

余曰所言水腫實非水也若有水其水自能下滲不致外溢為腫脹矣若  
脾肺腎三經真元之氣可以肺先虧方能成腫脹也營運在脾虛不能營運肺  
腎之氣何以交通可以肺不能施化即腎不能通調矣不運不化不通則三  
焦之氣閉而塞決瀆之官自廢州都之官亦危上下出入之机閏皆不利也不  
利水道不通津液皆閉血脉不流盡化為水因氣閉水因氣壅以致日渴  
日腫脹矣

或曰何以為腫何以為脹即腫即脹有所分別否

余曰腫與脹大不同也腫者因水瀆水積水蓄水溢水滲皆有形有質之水  
故曰腫；則腫于四肢頭面脹者無形無質之虛氣故只脹于胸腹之中  
四肢不甚脹即脹或左右四肢相代而腫脹也故另立一門

或曰腫屬水氣屬脹孰吉孰凶可澤問欽

余曰不同氣本無形既脹反致有形而難治夫水腫者因氣閉而水道不通若使肺脾腎三經之元氣能上下交通營運施化在皮者潰以為汗在膀胱者通以為溺實者利之虛者益之寒者溫之熱者清之無有不愈者  
只要分別虛實寒熱調氣為先分水次之

分治水腫脉症

指掌本治水腫脉症可謂明辨而俗悉矣前文已盡致腫之義下文不及多贅只以一方為主治以加減抽添為圓活變通之法耳


治水腫主方 茯仁三錢 茯苓二錢 葉皮錢半 陳皮一錢 姜皮一錢 南桂五分  
紫蘇一錢 滾鴻錢半 水煎日服二劑土能制水川茯苓米仁淡而燥者也陳

皮之苦生姜之熱、以行之苦以利之可以理脾胃非補益脾胃者也。辛皮之甘淡而鴻中有補喘利肺氣蘇葉之辛姜皮之辛熱以助透表所謂金撲<sup>所</sup>泄之開鬼門之義也。澤鴻鹹寒鴻中有補澤之性。喘利于腎以肉桂之溫潤茯苓之淡滲所謂在下者引而竭之以利小便也。營運轉輸在脾初起先理脾胃加蒼朮一錢陳皮一錢去苡仁服二日施化宣通在肺次則先理肺氣所主皮毛加荆芥一錢杏仁肉桂服二日決瀆通調在腎從而疏利膀胱加車前錢半猪苓一錢服二日

七日之內以盡三法無論寒熱虛實皆可服也

如氣逆而喘肺苦氣上逆急食苦以泄之加杏仁錢半枳壳五分。如中宮脹滿不覺脹滿者鴻之于內加腹皮錢半青皮五分。如日久中氣山虛脾泄倦

加白朮錢半 杏仁 糯米 煎服全匱腎氣丸。如虛寒體倦氣虛形萎  
日久不愈。加入參一錢、白朮一錢、附子五分、杏仁、糯米、煎服全匱腎氣丸。  
白湯送服三五錢。如內熱加乾葛錢半、黃連三分、肉桂  
如日久者用金匱腎氣丸、寧心服三五錢。



## 鼓脹門

或曰鼓者似鼓之形也又云脹者有虫蝕為脹章詳明之

余曰非也此兩個字皆比喻之義鼓者象其形也脹者似其義也無非虛假其氣耳氣運則寬氣滯則脹得陽生之氣則寬得陰凝之氣則脹也

或曰屢見鼓脹者生少而死多何也世無治此症之良醫耶世無治病之良方

耶世無道地之良藥耶

余曰世謂癰癧鼓脹實病難醫未常言不醫生鼓病也甚多未嘗不以待斂無有不為醫治者而苦者苦于病人不自知其受病之深致病之因性急欲速惟求一刻之寬為樂在醫家不知醫理之隱微元氣之造化執一已之見執盡一方謂之耑門治鼓往々試之初起有元氣不死之人得其洞泄而寬

如此愈者十無一二即寃後果能保養自重可保無虞若不善調攝卷復二次即死因此自謂此方可以通醫天下之人競病矣若試之久虛久病之人併元氣亡敗死之必至洞泄一次而愈脹渴至氣喘而死如此死者十居八九甚有醫家執一偏之見我自遵東垣從丹溪宗立齋以王道為主此只是補益元氣、能充滿其脈必寃初服無恙後服少有脹滿病家疑為補益脾胃之過也醫家多悔其補之甚也復用瀉藥渴之不效則補之不效則渴或病家歎遠之念逼迫其勢不得不朝更一醫暮換一醫彼云該補此云該渴彼曰該掌此曰宜和致病家方寸惑亂卜之于神明日卜之不應明日又卜搘無憑準矣所以愈治而愈加病也謂之不擇醫者不死于病而死于藥耳

或曰既不死于病而死于藥可不服藥而愈否。

余曰鼓脹之病顯明易見之病症第苦于病家醫家未及明悉致病之因成病之理徒用補鴻以求速愈反致速死若余臨症三十年水病鼓脹者已曾經歷千人所活者十之二三人之中實非藥力所為而治皆自知受病之因自知調理之法自醫自愈者實非醫家之功能也難言不服藥難言不補鴻全在病家知病善養醫家知藥善治主客相投而獲十全之效敢以平素得心應手方法備忘于後以俟高明印證倘能如法調治而獲效者以徵不肖習醫救世之本願耳

或曰既有十全善治之法何止于十之二三  
余曰鼓病初起原致于必死必死者或有生則十無一二但今人之情性不同受

先調情性

病迥異若病已成者即有奪命金不足以起精神神竭氣敗之人  
蓋歎病于情性急躁者情其強陽之性生平無和緩之氣元氣日漸而傷  
薰之狠激性暴使虛靈之神元和之氣無日不損加之酒色刑削愈甚一有  
暴怒鬱結不舒之氣忿不樂悶不快反藉酒色以自遣及至脹滿之病  
也甚有情性執滯者本訥不言心中無一刻之寧千思萬想日夜躊躇而不  
快生平絕少春生發達之氣悒悒不樂怏怏而鬱結者若有所外事相干不  
平之氣所加惟鬱怒而不發使氣內絕營衛閉塞反以酒色則氣為一月  
独任必成脹滿之病湏藉後法先調情性預知致病之因能知養病之法將  
昔日之情性自悔自釋毫無触發早明此病必死者竟以身心為必死之身

心以待之。凡身一死，萬事皆空。一切身外之物，世上之事，百日以後，其我無  
干。可謂先示之以死，而後生必先覓一靜室，潛心靜養，百日尋二三知己，代  
勞我事。且如後添服藥，調理庶有生机。  
次節飲食

蓋飲食本欲資生後天之生氣，在鼓脹之病，独在胃不納于脾不運全賴飲  
食之准則。准則之法，即以穀氣為主，葷菜次之。只宜少吃，毋使其飽，使  
其易飢而耳吃不妨。使穀氣不斷，生意不絕。

鼓脹脉忘

指掌已倦憊，今只叙治法耳。治鼓之法，以百日為期。如添調理，元神未復全  
復，再養百日，病根始拔，不致畱復。謹慎三年，可保無虞。

不眠治鼓之方

前叙鼓脹之症先從情志抑鬱意恚不暢營氣先病必由

中滿而至于鼓也

藥宜理脾爲主忌用剋伐之藥而置心脾腎之忌用大

補以輕清之藥和之

茯苓錢半陳皮錢半澤瀉一錢防風一錢炮姜五分

肉桂三分砂仁二錢白朮二錢當歸五分川芎三分煨姜三片水煎空心服

半月之前後宜服此方以白朮益營氣爲君服五日又加五分加至三錢止

以茯苓之淡滲同澤瀉以利尿爲臣陳皮砂仁和中氣爲佐防風姜桂

透其清陽之氣當歸川芎調營氣以和血脉

前方當服十劑繼服後方

白朮三錢人參錢半茯苓連皮錢半陳皮一錢防風一錢澤瀉一錢肉桂錢

附子三分加煨姜三片水煎午前後服

營衛之氣人身之陰陽氣也以參附益衛氣以木桂和營氣營衛一和癸

生之健運不息以扶菴陳後化中宮之滯氣防風外清溝濶利濶此方可  
俾常服白术加至五錢人参加至三錢肉桂加至錢半附子加至一錢或錢半  
四味為治散之要藥也空心健服後方丸藥三五錢

益氣丸人參一兩沉香三錢附子錢半肉桂錢半薄酒五錢丹皮五錢  
椒花三錢

人參益三焦元氣為君丹皮薄酒清三焦之火為臣沉香椒花化中宮凝  
濶之氣附子肉桂補命門生陽之火

日後鼓病全愈以金匱腎氣丸常服以收全功

或曰前方惟有補而無潤何也談云氣無補滋用補劑而愈脹奈何  
小曰元氣有餘而脹者元氣真實形神未傷方可以攻逐之藥下之下後必藉

前方加減調理可保無虞耳

### 積聚癰瘕在塊門

或曰積聚癰瘕痞塊其形始未有所分別治驗否

余曰名雖分六種然六種之中各有不同指掌不折已明余今另有所別有形無形屬氣屬血在府在藏宜守宜攻應補應瀉辨明于後

或曰指掌云積者積也日積月累而有形應五藏而分居本藏地位如何而生如何而治

余曰不然五藏屬陰主閉藏之氣其積始本無形之氣其氣因五藏之情志有所抑鬱而成其氣日閉日積久方有形則現病其形一定不易只在本位故名曰積此症極多初起尚屬無形之氣雖積而易散或日久成形根蒂固精神氣血因積為害日損日虛食減形枯氣脫而死

肺之積為息貴。肺主氣以司呼吸之息。因平日多悲；則氣消而耗素性多憂；則氣閉而氣結消耗。本經元氣先虛閉結。有所阻而不利故曰貴。貴者閉也。其息閉而不順。日積月累而成息貴之積也。其呼吸之息難如常。若喉下有所碍而不順。語言怯而費力。似喘非喘。似痛非痛。如物之所碍。如痰之所滯。實無物無痰。乃無形之氣。其脉沉而不數弱而無力。余治此症。以天氣不降。腎氣不納之義。主治溫補而愈。不用古法。古方。

茯苓一錢。澤瀉一錢。紫皮錢半。橘紅錢人參錢半。紫苑錢半車前錢水煎臨卧服。十劑加肉桂三五分。再加紫苑錢半人参加五分。再服十劑。又加附子三五分。人參加至三錢止。減本紫苑錢半。方內加當歸一錢。

肺主氣以人參益元氣為主。紫苑開鬱。紫皮瀉氣。橘紅順氣。澤瀉車前

引下氣歸附桂導火歸陰以散胃中癥結之氣服後繼服全匱腎氣丸  
加沉香一兩常服可能全愈

伏梁為心之積非心自有積此體中之積氣也經云體中臣使之官喜樂出  
焉因心氣不樂志意不快悒悒而鬱氣逆于體中不能生快樂積成癥氣  
初無形惟快；不樂以後方速治而愈如認為有形之積攻伐無憚愈傷神  
氣更使有根有形如臂之橫梗心胃之間如屋梁相似謂之伏梁從情氣抑  
鬱神志不暢而成脉多沉伏或沉弦而無力又急細數無神日久形寒憔悴  
飲食日減而無味虛寒虛熱心中如有所失而時常不禁嘆息之聲以後  
方服之而愈者甚多

茯苓神一錢丹參三錢東仁錢半遠志五錢人參錢半益智子菖蒲參

水煎午更黎明服之十劑人參加至三錢丹參減至一錢二十劑後服後方  
如血虛加當歸一錢如陽虛加附子五分如多鬱加真鬱金細末五分調服  
伏梁本心氣抑鬱而神志不足故以升參育心氣和心血以開鬱達志益智  
菖蒲化氣膻中否積自清茯神東仁人參當歸補氣血以安心主之神明所  
謂主明則下安主不明則甚危矣

肝之積為肥氣肥者易大易長之義此症甚多本鬱傷肝之氣不能條達便  
生陽之氣抑鬱于兩脇之間日積月累而戊者謂之肥氣久發瘧之時其  
邪透達痰涎留滯或不守禁忘瘧止發時偶吐生冷及水併飲食之類  
而生此積者謂之瘧母則輕易治若無病暴怒而生者謂之肥氣則重何  
也日漸至心脾地位其寒熱似瘧妨碍飲食嘔逆惡心窘迫為痛其脉

兩閨沉弦而急或沉滑而數以後方同丸藥從容調理而愈若或歎速以攻伐之藥先傷肝脾之元氣必成中病中病傳為鼓脹而死

煎方 柴胡一錢 橘紅錢半白术一錢半夏三錢川芎參查肉一錢人參七分加生姜一片水煎空心午前後服初服可加白芥子一錢青皮五分久則忘服伐肝之藥日久白术加至三錢人参加至錢半去查肉加肉桂三分可以常服丸方 白芥子七錢 生半夏一兩 龙稜子三錢 橘紅七錢木香三錢沉香三錢青皮

五錢人參一錢川芎五錢白术五錢以上磨末醋調神曲和丸午前後淡水下二錢肥氣與痞氣往往相似屢見肥氣初起在左漸移於中間其勢危矣是不臨土位所勝者妄行所不勝者受剋之義右方雖疎肝實益脾之要藥所謂服藥于未病之先

之積為痞氣痞否也。天氣不得降地氣不能升者降者皆積于中宮。如何而積。因多思傷脾。氣鬱結不舒。營氣先閉。則不能通以致于積。上下之氣與中宮之氣併積而成。故先痞而後滿。而後脹。其形甚大如盤也。若攻伐太過。遂成鼓脹。以其六陰之脉聚腹耳。寒凝而積。其脉必沉。而必弦滑以健運。多清之藥主治。

煎方 白朮二錢 人參一錢 藁朮五分 陳皮錢半 半夏錢半 枳實三分  
防風錢澤鴈一錢 肉桂三分 炮姜五分 加姜一片 水煎空心午後服  
當運轉輸在脾。虛則不能轉運。故有痞積之氣。必以益氣為主。伏升降  
之清之劑。兼治脾氣溫香燥。前人皆脾經所喜之藥。白朮加至五錢。人  
參加至三錢。日久漸愈。本枳實加茯苓。

腎之積名曰奔豚。奔豚者象江豚狀。凡遇陰晦風雨之天，其江豚起沒于水面，奔走也。發則以下攻上。攻上之時不覺累々之形，梗起微微之響，直攻于心上，攻于胸中，少噴隨響，依舊歸下，毫無影蹟之形也。此腎經虛極，命門無火，本經陰凝固結之氣日積而成此陰寒之病。其病常多早服藥無恙。如攻至心胸，無治何以治之？此水來犯心，主無權而失位也。六脈無神皆沉極，微極弱之脉，以後方主治。

煎方入參錢半，附子一錢，肉桂一錢，白茯苓錢半，沉香一錢，澤鴻三錢。

水煎，黎明午後服。日久人參加至三錢，澤鴻減至一錢，共九藥，煎服全愈。九方：白茯苓一兩，人參二兩，沉香七錢，澤鴻一兩，丹皮七錢，附子二錢，半肉桂一錢。椒桂五錢，吳茱萸二錢半，煉蜜為丸，每服三錢。

命門無久腎氣寒虛者多有此症。後時初似寒疝。入多忽之房勞不謹。遂成此病。非參附不愈。前方屢驗之。最忌破氣寒涼。苦泄及芪本歸。男當藥知柏之劑。日久。將八味地黃丸。兼虎賊則不發矣。

或曰六聚與五積如何相似否。

余曰五積本五藏之疾。初本無形之積。氣早治無恙。若綿延日久。真氣日損而日積之。成形便有性命之憂。所以俗主於前。今云六聚者。六府之濁氣也。其氣聚則有形。攻滯于腸胃。兩脅心胸之間。為痛。時有形痛。止自散。一如盜賊聚而劫奪。散則無踪。若善于調攝戒氣者。勞可以不藥而愈。若發時必因外触而發。以後方服之。即愈。隨時加減可也。

治六聚主方

陳皮一錢半、夏錢半、木香一錢、山楂三錢、枳實錢、砂仁五分、延胡索一錢  
加生姜一片水煎午前後服

如外寒触發，脉多浮緊或浮緊者必惡心畏寒，加葛葉一錢半、羌活一錢、防風二錢、本木香、砂仁如恐氣觸發者，脉必沉滑而惡心惡食，加酸梅曲錢半、麥芽二錢。

或曰癥瘕如何治？法消釋不能無害乎？

余曰：癥者徵而驗也。有物有形，有濕痰，有食積，死血之類。男婦小兒咸有偶然停滯，日久不消，典塊，其上以後方確服，捲以丸藥為主。

薰方：陳皮錢半、半夏錢半、山楂三錢、枳實一錢、本木香五分、砂仁一錢、枳榔參加生姜三片水煎午後服。

如湿疾脉必濡滑其塊軟而不痛或大或小加半夏錢半蒼木錢白朮錢  
太山楂木香如死血其脉必芤濡弦澁其塊按之覺痛加紅荳一錢桃仁錢半  
歸尾錢半瓜蒂夏木香

或曰瘕者何所成也甚有終身不愈者何故

余曰瘕者假也假物而成此病独在婦女或行經不謹或產後失于禁忌寒邪  
客于胞門子戶怒氣鬱于衝任之脉假血而成瘕多在小腹隱僻而痛只宜  
丸藥常服散藥兼之以補血調經順氣為主脉必沉弦濡數可憑也

丸藥方當歸四兩川芎二兩半紅荳一兩連胡兩半香附二兩半砂仁兩半

木香一兩艾葉一兩陳皮為丸空心飲湯送服三錢

痛止經通即止兼血瘕之病久遠不愈者聽其自然只要精神充足無恙

如一味尅削其癥不愈而九氣受虧其有因藥而死者戒之々

或曰痞塊復有分別否

余曰此痞即脾之痞積也本無形而空有形氣虛所積不必重論大塊者即癥之類也癥之為塊與瘕相似皆假借痰氣血積而病之在三焦腸胃之外空隙之間如在皮膚血脈之中有形有塊可據或疼或不疼此經絡血脈中有阻碍氣滯借精津血液日積月累而成無形動移服藥不應惟外用膏藥熨灸而消之與藏府元氣無干故六脉平和飲食如常惟外治可也若聽信外科內服消葉反傷元氣必增他病也若久遠無碍聽其自然切勿力針割刺致筋肉經脈腫起結塊反大硬而增痛不淺也慎之々  
曰前論何偪參于五精而斂于六聚癥瘕痞塊何也

余曰癥瘕痞塊若輕淺而初起者不妨醫治亦必賴有精神有元氣者方可  
醫治或平素虛弱之体及年深日久者以不治為主即有不害性命若一  
積之病初本無形之氣所積而成只因人之元氣先虛則生此積病若不  
亟治後傳中滿蠱脹浮腫元氣大敗而死故耑重而惱患也