





文祖正訂寒溫條辨 卷二

陽證

凡治傷寒溫病、最要辨明陰陽。若陰陽莫辨、則寒熱紊亂、而  
自多誤於人者、未之有也。如發熱惡寒、頭痛身痛、目痛鼻乾、  
不眠、脇痛、寒熱而嘔、潮熱譫語、詈罵不認、親疎面紅光彩、唇  
燥舌黃、腹胸滿痛、能飲冷水、身輕易動、常欲閉目見人、喜言  
語聲響亮、口鼻之氣往來自如、小便或黃或赤、或濁濁、或短  
數、大便或燥秘、或膠閉、或挾熱下利、或熱結旁流、手足自溫  
暖、爪甲自紅活、此陽證之大畧也。傷寒陽證、有表有裏、隨證  
治之、方論詳後、用宜分清、溫病陽證、有表證、無表邪、一於清

熱導滯而已，尤要辨明是傷寒，是溫病，斷不可溷而一之。傷寒得天地之常氣，由氣分傳入血分，溫病得天地之雜氣，由血分發出氣分，但其中證候相參，從來混淆，倘分別一有不清，則用藥死生立判矣。今人不辨寒溫，好用熱藥，而不知涼藥之妙，且難矣。

陰證

凡傷寒未傳寒中，而爲陰證，與陰寒直中三陰，而爲陰證，或惡寒戰慄，面時青黑，或虛陽泛上，面雖赤而不紅活，光彩身重難以轉側，或喜向壁卧，或跪卧欲寐，或閉目不欲見人，懶言語，或氣微難以佈息，或口鼻之氣自冷，聲不響亮，或時燥

擾煩渴不能飲冷或唇青或胎黑而滑手足厥逆瓜甲青紫  
血不紅活小便清白或淡黃大便不利或寒結或熱在肌肉  
之分以手按之殊無大熱陰勝則冰透手也雖是發熱與陽  
證不同不可以面赤煩渴誤作陽證須要辨別明白其用藥  
自是理中四逆白通一派溫病無陰證然或因損之人亦有  
虛弱之人但其根源原是溫病卽溫補藥中亦宜兼用滋陰  
之品若峻用辛熱恐真陰立涸矣仲景傷寒少陰病於附子  
湯真武湯中用白芍卽此義也景岳理陰煎大溫中飲自謂  
雲騰致雨之妙自我創始其實亦本仲景此義而爲之者也  
後人之千方萬論未有見出乎範圍之外者

理中湯 加炮附子一錢名附子理中湯 厥逆自利不渴而

嘔腹痛鴨溏此太陰有真寒也此方主之

白术

生炒一錢

人参

一錢

乾薑

炮二錢

甘草

炙二錢

水煎溫服

爲末煉蜜丸名理中丸日三夜一服治瘥後喜唾久

不了了者此胃有寒飲停留也

四逆湯 大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡

寒者此方主之

附子

生二錢

乾薑

生二錢

甘草

炙二錢

水煎溫服

一云冷服

經曰治寒以熱涼而行之否則戴陽者反增上燥耳目

口鼻出血者有之矣謹小慎微醫豈易言哉加人參卽

四味回陽飲

此方通治三陰脈沉惡寒手足厥逆之證故用附子之生者上行頭項外徹肌表以溫經散寒乾薑亦用生者以內溫藏府甘草獨用炙者以外溫榮衛內補中焦也

瑣言曰仲景云病發熱頭痛脈反沉若不瘥身體疼痛者當救其裏宜四逆湯此證出太陽篇又云少陰經病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯此證出少陰篇竊詳太陽病發熱頭痛法當脈浮今反沉少陰病脈沉法當無熱今反熱仲景於此兩證各言反者謂反常也蓋太陽病脈似少陰少陰病脈似太陽所以各謂之反而治之當異也深究其旨均

是脈沉發熱以其有頭痛故爲太陽病陽證當發熱脈浮今脈反沉以裏虛久寒正氣衰微所致又身體疼痛故宜救裏使正氣內強逼邪外出而乾薑生附亦能出汗而解假使裏不虛寒則當見脈浮而正屬太陽麻黃湯證也均是脈沉發熱以其無頭痛故爲少陰病陰證當脈沉無發熱今反發熱以寒邪在表但皮膚腠理鬱閉爲熱知在裏無熱故用麻黃細辛以發肌表之熱附子以溫少陰之經假使身寒無熱則當見厥逆吐利等證而正屬少陰四逆湯證也由是觀之正氣衰微脈沉之反爲重表邪浮淺發熱之反爲輕此四逆湯爲劑不爲不重於麻黃附子細辛湯也又可見熟附配麻黃

發中有補生附配乾薑補中有發此實治法之神奇處方之精奧學者其致思焉

白通加人尿猪膽汁湯 少陰病下利

藏寒不禁則下利  
不性趨下故也

脈微者

陽虛也

與白虎湯利不止

用方切當若猶不止

厥冷無脈

脈微而至

於乾嘔煩者

陽爲陰拒而不能入也

此方主之

反佐以和之也

服湯後脈

暴出者死

陽欲燼而忽焰勢必成灰

微續者生

氣漸回而微續機有更生

去人尿

膽汁名白通湯

葱白

二莖

乾薑

三錢

附子

生三錢

人尿

一小杯

猪膽汁

三茶匙

水煎去渣入人尿膽汁和勻溫服如無膽汁亦可用

葱白

通陽接陰

有升發之能

乾薑健脾暖胃有化穀之長附

子溫中散寒、有回陽之善、人尿膽汁性寒、而續真陰、引薑附而爲肝腎之向導、起死回生之方、造化神功之妙也。  
附子湯 少陰病、口中和、皆惡寒者、少陰病骨節痛、身體痛、手足厥脈沉者、並此方主之。

人參一錢 附子生二錢 白朮土炒二錢 白茯苓二錢 白芍一錢

水煎溫服

傷寒以陽爲主、上證皆陰證、幾於無陽矣、辛甘皆陽也、故用參附苓术以養陽、辛溫之藥過多、恐有偏陽之弊、故又用白芍以扶陰、經云火欲實、水當平之、此用白芍之意也、若溫病陽邪怫鬱、而厥逆脈沉、一用辛溫之藥治之、正如抱薪投火

矣

真武湯

太陽病發汗太過、仍發熱、汗雖出而表

不除之故也

心下悸、心

血汗爲心液

頭眩身瞶

音振振欲擗地

振搖欲伏

及少

多則心虛

頭眩身瞶

純振振欲擗地

地不能起

及少

陰病腹痛小便不利、四肢沉重疼痛、自下利者、此爲有

水氣或咳或嘔或小便利並此方主之

白术

土炒二錢

白茯苓

三錢

白芍

三錢

生薑

三錢

附子

炮一錢半

水煎溫服

少陰病加減法

咳加乾薑細辛五味

子

各一錢

去附子倍生薑小便利去茯苓下利去白

芍加乾薑

二錢

汗多而心下悸、此心亡津液、腎氣欲上而凌心也、頭眩而身

問此汗多亡陽虛邪不靖而內動也。真武北方之神司水火者也。今腎氣凌心虛邪內動有水火奔騰之象故名此湯。以主之白术茯苓補土利水之物也可以伐腎而療心悸附子生薑回陽益衛之物也可以壯火而制虛邪白芍酸以收陰用白芍者以小便不利則知其人不但真陽不足真陰亦已虧矣若不用白芍以固護其陰豈能平附子之雄悍乎。

理陰煎此理中湯之變方也。凡天一無根真陰不足或素

多勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散或發熱頭痛身痛或面赤唇焦或雖渴而不喜飲冷或背心肢體畏寒但脈見無力者悉是假熱之證涼藥不可入口宜速用

此煎照後加減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從陰達而寒邪不攻自散此最切於時用者也神效不可盡述

熟地

五七錢或一兩

當歸

或三五七錢

乾薑

二三錢炮一錢

甘草

炙一錢二錢水

煎熟服

加附子

炮二錢

名附子理陰煎

治命門火

衰陰中無陽

張景岳曰若風寒外感邪未深入但發熱身痛脈數不洪或凡內無火證素稟不足者但用此煎加柴胡二三錢連進二三服無不獲效若寒凝陰盛而邪有難解必如麻黃二錢放心用之或不用柴胡亦可此寒邪初感溫散第一要方惟仲景知

此義但仲景之溫散首用麻黃桂枝予之溫散卽以理陰溫  
中爲增減此雖一從陽分一從陰分其跡若異然一逐於外  
一托於內而用溫散則一也學者當因其所宜酌而用之又  
若陽勝之時寒邪深入脈沉細發熱惡寒或背惡寒乃太陽  
少陰證也加細辛一二錢甚則再加附子一二錢真神劑也或並  
加柴胡以助之或並加麻黃以發之若有陰虛火旺內熱不  
宜用溫而氣血俱虛邪不能散者宜去乾薑以三味酌加前  
藥與之或止加入參一味亦可按此正傷寒妙論也去溫病萬里學者宜詳辨焉

大溫中飲此可與理陰煎相參互用也凡患傷寒陽虛不足及勞倦感冒或兼嘔惡泄瀉等證身雖熾熱時猶畏

寒但六脈無力、邪氣不能外達者、此元陽太虛、正不勝邪之候、若非峻補、耗散則寒邪日深、必致不收、溫中自可散寒、卽此方也、

熟地

三五錢當歸二三錢

白术

土炒二三錢

肉桂

去粗皮一錢

乾薑

二錢

錢煨生薑亦可

甘草

炙一錢

柴胡

三五錢

虛加人參

一二錢

水煎

熟服覆取微汗

無汗加麻黃

有汗去肉桂

加桂枝白芍

氣虛加黃耆

寒甚陽虛

加炮附子

陽虛氣陷

加升麻

頭痛加川芎

白芷

泄瀉去當歸

虛氣陷

加升麻

頭痛加川芎

白芷

泄瀉去當歸

虛氣陷

加升麻

頭痛加川芎

白芷

景岳曰、古來傷寒之治、惟仲景之溫散、如麻黃湯、桂枝湯、是

也亦知補氣而散如小柴胡湯黃芪建中湯是也至若陽根於陰汗化於液從補血而散而雲騰致雨之妙仲景亦未言及予製理陰補陰溫中三方乃邪從榮解第一義也其功難悉所當深察

按景岳首開補血散寒邪從榮解之論得仲景不傳之秘治傷寒無剩義矣冀令人衣冠焚香望拜茅山不置也但傷寒不過感冬月烈風嚴寒之常氣而溫病得天地疵癘旱潦之雜氣世之凶惡大病死生在反掌間者非傷寒乃溫病也若於溫病出一走越前人之意見以啟後人之聾瞶豈不盡美又盡善乎而乃仍覆前轍曰溫病卽傷寒云云羽翼叔和一

樣糊塗噫若非王安道劉完素二公於治法辨別明白不幾  
蒙昧終古耶

陽證似陰

陽證似陰乃火極似水真陽證也蓋傷寒溫病熱極失於汙  
下陽氣亢閉鬱於內反見勝已之化於外故凡陽厥輕則手  
足逆冷涼過肘膝劇則通身冰冷如石血凝青紫成片脈沉  
伏濶甚則閉絕以上脈證悉見純陰猶以爲陽證何也及察  
內證氣噴如火譫語煩渴咽乾唇裂舌胎黃黑或生芒刺心  
腹痞滿脹痛舌捲囊縮小便短赤涓滴作痛大便燥結或膠  
閉或挾熱不利或熱結旁流或下血如豚肝再審有屁極臭

者是也粗工不察但見表證脈體純陰便投溫補禍不旋踵  
大抵陽證似陰乃假陰也實則內熱而外寒在傷寒以大承  
氣湯下之有潮熱者六一順氣湯熱甚合黃連解毒湯在溫  
病雙解涼膈加味六一解毒承氣之類斟酌輕重消息治之  
以助其陰而清其火使內熱既除則外寒自伏易所謂水流  
溼者卽此義也此與陽勝格陰例同王太僕所謂病人身寒  
厥冷其脈滑數按之鼓擊指下者非寒也余謂溫病火閉而  
伏多見脈沉欲絕不盡滑數鼓擊也要在詳證辨之

大承氣湯 陽明病痞滿燥實譖語煩渴腹痛便秘此方主

大黃

酒浸芒硝四錢

二錢

厚樸

四錢

枳實

炒五錢

大黃

炒數錢

水煎溫服

病有宜加倍者、仲景原方、大黃厚樸各四兩、芒硝枳實各二兩分三服、

大黃蕩熱、斬關破實於腸胃、芒硝潤結軟堅、化燥於肛門、厚樸導滯節制硝黃之太寒、枳實瀉滿輔佐厚樸之下氣、

六一順氣湯

少陰厥陰病、口燥咽乾、怕熱消渴、譫語神昏

大便燥實、胸腹滿硬、或熱結旁流、遶脅疼痛、厥逆脈沉伏者、此方主之、

大黃

酒浸四錢

芒硝

二錢五分

厚樸

一錢五分

枳實

一錢

柴胡

三錢

黃

芩

一錢

白芍

一錢

甘草

生一錢

水煎去渣入鐵繡水三

匙冷服

黃連解毒湯

大熱乾嘔、煩渴譫語、呻吟不眠者、此方主之。

黃連 一錢

黃芩 一錢

黃柏 一錢

梔子 一錢

水煎冷服

崔尚書曰：胃有燥糞，令人錯語。邪熱盛極，亦令人錯語。大使秘而錯語者，承氣湯；大使通而錯語者，解毒湯。

雙解散  
傷寒溫病表裏實熱，此方主之。此河間原方也。

防風

五分

荆芥

五分

薄荷

五分

麻黃

五分

當歸

五分

川

芎

五分

白芍

五分

白朮

土炒

連翹

去心

梔子

五分

大

黃

酒浸五分

芒硝

五分

桔梗

一錢

黃芩

一錢

石膏

四錢

滑石

三錢

甘草

二錢

水煎溫服

防風麻黃以解表、薄荷荆芥以清上、大黃芒硝以滌腸胃、滑石梔子以利水道、桔梗石膏以清肺胃之邪、而連翹又所以祛諸經之遊火、風熱爲患、肝木主之、芍歸白芍、和肝血以息風熱、而白芍甘草又所以健運脾土能勝濕熱、禦風火故也、方中倍用六一者、以伏氣所蒸之濕熱半從肌表而泄半從水道而利也、按此乃河間舊解耳、予謂麻黃性大熱、冬時正傷寒發汗之要藥也、溫病乃雜氣中之一也、斷無正發汗之理、於法爲大忌、卽河間亦未言及、不如易殼蠶蟬蛻得天地清化之氣、以滌疫氣散結行經升陽解毒、且鬱熱伏於五內、傷損正氣、脹悶不快、川芎香竄走泄真元、白朮氣浮填塞胃

口皆非溫病所宜、不如易黃連薑黃、闢邪除惡、佐歸芍涼血、散鬱以退蒸、則心肝和而風火自熄矣、因名增損雙解散、涼膈散、傷寒溫病火鬱上焦、大熱面赤、舌黃唇焦者、此方主之、此河間原方也、

連翹

二錢

黃芩

二錢

梔子

二錢

薄荷

二錢

大黃

酒浸二錢

芒硝

三分

柴胡

硝

三錢

甘草

生一錢

竹葉

三十片

水煎去渣入蜜冷服

加味六一順氣湯

溫病主治同前證、

白蘆薈

酒炒三錢

蟬退

十個

大黃

酒浸四錢

芒硝

二錢五分

柴胡

三錢

黃連

一錢

黃芩

一錢

白芍

生一錢

甘草

生一錢

厚樸

一錢五分

枳實

一錢

水煎去渣冲芒硝入蜜酒和勻冷服

解

承氣湯 温病三焦大熱、痞滿燥實、譖語狂亂、不識人

熱結旁流、循衣抹床、舌捲囊縮、及爪翹瘡瘍、溫上爲癰

下血、如豚肝等證、厥逆脈沉伏者、此方之個半夏二

錢名陷胸承氣湯治

胸滿兼有上證者

白蘆蠶

酒炒

蟬退

個全十

黃連

一錢

黃芩

一錢

黃柏

一錢

梔子

一錢

枳實

麵炒

厚樸

薑汁炒

大黃

酒洗

芒硝

五錢

三錢

另

甚至痞滿燥實堅結非常

大黃加至兩

人餘芒硝加至五七錢始動者大當知之

按此乃溫病要藥也、然非厥逆脈伏大熱大實、及熱結旁流舌捲囊縮、循衣抹床等證、見之真而守之定、不可輕投。予用此方救壞證危證大證、而愈者甚衆、虛極加人參二錢、如無

參用熟地一兩歸身七錢山藥五錢煎湯入前藥煎服亦屢有奇驗內經曰熟淫於內治以鹹寒佐之以苦此方是也加人參取陽生陰長所謂無陽則陰無以生加熟地等取血旺氣亦不陷所謂無陰則陽無以化其理一也

### 陰證似陽

陰證似陽乃水極似火真陰證也蓋傷寒傳變三陰而爲陰證或陰寒直中三陰而爲陰證陰勝於內逼其浮游之火發於外其脈沉微而遲或沉細而疾一息七八至或尺衰寸盛其證面赤煩燥身有潮熱渴欲飲水或咽痛或短氣或嘔逆大便陰結小便淡黃驚惶不定時常鄭聲狀類陽證實陰證

也粗工不察但見面赤煩渴咽痛便秘妄投寒涼下咽立  
大抵陰證似陽乃假陽也實則內寒而外熱急以白通附子  
通脈四逆湯之類加人參填補真陽以引火歸原但使元氣  
漸復則熱必退藏易所謂火就燥者卽此義也此與陰盛格  
陽例同王太僕所謂身熱脈數按之不鼓擊者非熱也但陽  
證似陰與陽證傷寒溫病家通有之而陰證似陽與陰證此  
值正傷寒家事溫病無陰證古人未曾言及後人多不知此  
吳又可其先覺乎

按寒熱有真假者陽證似陰陰證似陽是也蓋熱極反能寒  
厥乃內熱而外寒卽真陽假陰也寒極反能燥熱乃內寒而

外熱卽真陰假陽也、假陰者最忌溫補、假陽者最忌寒涼、察此之法當以脈之虛實強弱爲主、然洪長滑數、強實有力、真陽脈固多、而沉伏細濇、六脈如絕、假陰脈亦不少可知、不惟證之陰陽有真有假、卽脈之陰陽亦有真有假、死生關頭、全在此分毫、醫道豈易易哉、

吳又可曰、陰陽二證、古方書皆對待言之、以明其理、世醫以陰陽二證、世間均等、臨診之際、泥於胸次、往來惆悵、最易牽人誤揣、甚有不辨脈證、但窺其人、多薑少艾、或適在娼家、或房事後得病、或病適至行房、問及於此、便疑爲陰證、殊不知病之將至、雖童男室女、曠夫寡妻、僧尼閨宦、勢不可過與房

慾何涉焉、即使素多少艾、頻宿娼家房事、後適病病適至行房、此際偶值病邪、氣壅火鬱、未免發熱、到底終是陽證、與陰證何涉焉、況又不知陰證、實乃世間非常有之證、而陽證似陰者、何日無之、究其所以然者、不論傷寒溫病邪在胃家、陽氣內鬱、不能外布、卽便四逆、所謂陽厥是也、仲景云厥微熱亦微、厥深熱亦深、其厥深者、輕則冷過肘膝、脈沉而微、重則通身冰冷、脈微欲絕、雖有輕重之分、總之爲陽厥、因其觸目皆是、苟不得其要領、於是誤認者良多、况且溫病、每類傷寒、再不得其要領、最易混淆、夫溫病雜氣、直行中焦、分佈上下、內外大熱、陰證自何而來、予治溫病數百人、僅遇一二正傷

寒，卽令正傷寒數百人，亦不過一二真陰證，又何必纔見傷寒，便疑爲陰證，况多溫病，又非傷寒者乎？人亦可以憬然思翻然悟矣。按吳氏溫病無陰證一語開萬古之屯蒙，救無窮之夭枉。

按仲景曰：陽證見陰脈者死。類經註云：證之陽者假實也，脈之陰者真虛也。陽證陰脈，卽陰證也。夫證之陽，而曰假實，自是假陽證也。假陽證，自是真陰證可知矣。脈之陰，而曰真虛，自是真陰脈矣。真陰脈，自是真陰證更可知矣。此真陰假陽，所謂陰證似陽是也。卽王太僕所謂陰盛格陽是也。宜用溫補之藥無疑矣。今人一遇壯熱煩渴，譖語狂亂，登高棄衣，而聲音嘹亮，神色不敗，別無敗壞陽德之狀，但厥逆脈伏沉滯，

如絕便以爲陽證見陰脈而用溫補之藥禍不旋踵殊不知  
證現內熱外寒之象脈現沉伏微細之形火鬱亢極陽氣不  
能交接於四肢故體厥脈厥狀類陰寒此真陽假陰所謂陽  
證似陰是也卽王太僕所謂陽盛格陰是也乾隆甲戌乙亥  
吾邑連間數年溫毒盛行眼見親友病多陽證似陰用附子  
理中湯而死者若而人用八味丸料及六味丸合生脈散而  
死者又若而人醫家病家皆以爲死證難以挽回卒未有知  
其所以誤者余深憫焉因古人格陰似陰體厥脈厥之說精  
心研究頗悟此理溫病無陰證傷寒陰證百中一二庸工好  
用熱藥且多誤補其虛故患陰證似陽者少壞事亦不若陽

證似陰者之多也、每未酌古訓、又兼屢經閱歷、實驗得陽證似陰、乃火極似水、陽閉脈非仲景所謂陽證、陰脈也、輒用升降涼膈加味六一解毒承氣之屬、隨證治之、無不獲效、不必疑也、特書之以爲誤認陽證、陰脈之戒、可知仲景云、陽證見陰脈者、所謂戴陽是也、所謂孤陽飛越是也、所謂內真陰而外現假陽之象是也、非真陽證也、夫天之所以生物人之所以有生者、陽氣耳、脈證俱無真陽之氣、故曰死、豈若陰證見陽脈者之、尚有生機乎、如陽證陽脈、卽不藥亦無害生理、惟陽證似陰、乃火鬱於內、反見勝已之化於外、脈自亢閉、實非陰脈、此羣龍無首之象、證亦危矣、然猶在可死不可死之

問若早爲清瀉之、脈自復而愈至若貧賤人、饑飽勞傷家、酒色耗竭則此四損不可正治之輩、又當別論、甚至藏府久虛寒火久鬱、一着溫病、正不勝邪、水不勝火、暴發競起、一二日卽死者、其脈或浮洪而散、狀若金沸、或沉微而濇、狀若屋漏、每遇此等脈證、徒爲悼嘆而已、

附子湯 方見陰證門

通脈四逆湯 下利裏寒外熱、面反赤手足厥脈微欲絕、及  
脈不出、係羣陰格陽於外、不能內返也、此方主之、  
附子生三錢 乾薑生三錢 炙草二錢 水煎溫服一云冷服解見

四逆

湯下

按蘊要云、四逆湯、一名通脈、四逆湯、細玩傷寒通脈、四逆湯所治之證、裏寒外熱、其面反赤、陰盛於內、逼陽於外、而脈不出、較四逆湯所治之證爲更重、若通脈四逆湯、卽四逆湯、何故多加通脈二字耶、醫統及醫宗必讀、俱云、卽四逆湯加甘草一倍、然厥逆脈不出、反加甘草緩味、殊不近理、續論云、卽四逆湯加乾薑一倍、然回陽通脈、全賴生附子雄悍之力、豈宜單加乾薑耶、再按四逆湯原方、甘草炙二兩、乾薑一兩、附子五錢、此卽通脈四逆也、故通脈四逆湯方、甘草炙二兩、與四逆湯同、乾薑三兩、是爲

二枚  
生用

一枚

乾薑

三兩

附子

五錢

倍用附子大者一枚生用夫旣云大者其爲倍用可想而知而知細心較定通脈四逆湯卽四逆湯倍附子乾薑是也

仲景加減法 面色赤加葱白二莖腹痛去葱白加白

芍二錢 嘔加生薑二錢

咽痛去白芍加桔梗二錢利

止脈不出加入參一錢去桔梗

涼膈散方見陽證似陰門

升降散 溫病亦雜氣中之一也表裏三焦大熱其證不可名狀者此方主之如頭痛眩暈胸膈脹悶心腹疼痛嘔噦吐食者如內燒作渴上嘔下瀉身不發熱者如增寒壯熱一身骨節酸痛飲水無度者如四肢厥冷身涼如

冰而氣噴如火、煩燥不寧者、如身熱如火、煩渴引飲、頭面猝腫、其大如斗者、如咽喉腫痛、痰涎壅盛、滴水不能下嚥者、如遍身紅腫、發塊如瘤者、如斑疹雍出有似丹毒風瘡者、如胸高脇起脹痛、嘔如血汁者、如血從口鼻出、或目出、或牙縫出、毛孔出者、如血從大便出甚如爛瓜肉、屋漏水者、如小便濇淋、如血滴點、作痛不可忍者、如小便不通、大便火瀉無度、腹痛腸鳴如雷者、如便清瀉白、足重難移者、如肉瞯筋惕者、如舌捲囊縮者、如舌出寸許、絞擾不住、音聲不出者、如譫語狂亂、不省人事、如醉如癡者、如頭痛如破、腰痛如折、滿面紅腫、目不能

開者如熱盛神昏形如醉人哭笑無常目不能閉者如手舞足蹈見神見鬼似風癲狂祟者如誤服發汗之藥變爲亡陽之證而發狂叫跳或昏不識人者外證不同受邪則一凡未曾服過他藥者無論十日半月一月但服此散無不輒效

白殭蠶

酒炒二錢

全蟬脫

去土二錢

廣薑黃

去皮三分

川大黃

生用四錢

秤準右爲細末合研勻病輕者分四次服每服重一錢八分二釐五毫用黃酒一鍾蜂蜜五錢調勻冷服中病卽止病重者分三次服每服重二錢四分三釐三毫黃酒鍾半蜜七錢五分調勻冷服最重者分二次服每服

重三錢六分五釐黃酒二鍾蜜一兩調均冷服一時無  
黃酒稀熬酒亦可斷不可用蒸酒胎產亦不忌煉蜜丸  
名太極丸服法同前輕重分服用蜜酒調勻送下

按溫病總計十五方輕則清之神解散、清化湯、芳香飲大  
小清涼散、大小復甦飲、增損三黃石膏湯、八方重則瀉之增損  
大柴胡湯、增損雙解散、加味涼膈散、加味六一順氣湯、增損  
普濟消毒飲、解毒承氣湯、六方而升降散其總方也、輕重皆  
可酌用察證切脈斟酌得宜、病之變化治病之隨機應變、又  
不可執方耳、按處方必有君臣佐使而又兼引導此良工之  
大法也是方以殭蠶爲君、蟬脫爲臣、薑黃爲佐、大黃爲使、米

酒爲引、蜂蜜爲導、六法俱備、而方乃成。竊醫考諸本草而知  
殭蠶味辛苦氣薄、喜燥惡濕、得天地清化之氣輕浮而升、陽  
中之陽、故能勝風除濕、清熱解鬱、從治膀胱相火、引清氣上  
朝於口、散逆濁、結滯之痰也。其性屬火、兼土與木、老得金水  
之化、殭而不腐、溫病火炎土燥、焚木爍金、得秋分之金氣、而  
自衰、故能辟一切怫鬱之邪氣。夫蠶必三眠三起、眠者病也、  
合簿皆病、而皆不食也、起者愈也、合簿皆愈、而皆能食也、用  
此而治合家之溫病、所謂因其氣相感、而以意使之者也。故  
爲君、夫蟬氣寒無毒、味鹹且甘、爲清虛之品、出糞土之中、處  
極高之上、自甘風露而已、吸風得清陽之真氣、所以能祛風

而勝濕飲露得太陰之精華所以能滌熱而解毒也脫者退  
也蓋欲使人退去其病亦如蟬之脫然無恙也亦所謂因其  
氣相感而以意使之者也故爲臣薑黃氣味辛苦大寒無毒  
蠻人生啖喜其祛邪伐惡行氣散鬱能入心脾二經建功闢  
疫故爲佐大黃味苦大寒無毒上下通行蓋亢甚之陽非此  
莫抑苦能瀉火苦能補虛一舉而兩得之人但知建良將之  
大勲而不知有良相之碩德也故爲使米酒性大熱味辛苦  
而甘令飲冷酒欲其行遲傳化以漸上行頭面下達足膝外  
週毛孔內通臟腑經絡驅逐邪氣無處不到如物在高巔必  
奮飛沖舉以取之物在遠方及深奧之處更必進奔探索以

取之且喜其和血養氣伐邪辟惡仍是華陀舊法亦唐蘇之  
義也故爲引蜂蜜甘平無毒其性大涼主治丹毒斑疹腹內  
留熱嘔吐便秘欲其清熱潤燥而自散溫毒也故爲導蓋薦  
食而不飲有大便無小便以清化而升陽蟬飲而不食有小  
便無大便以清虛而散火君明臣良治化出焉薑黃辟邪而  
靖疫大黃定亂以致治佐使同心功績建焉酒引之使上行  
蜜潤之使下導引導協力遠近通焉補瀉兼行無偏勝之弊  
寒熱並用得時中之宜所謂天有覆物之功人有代覆之能  
其洵然哉是方不知始自何氏二分晰義改分兩變服法名  
爲賠賑散用治溫病服者皆愈以爲當隨賑濟而賠之也予

更其名曰升降散蓋取蟻蠶蟬脫升陽中之清陽薑黃大黃  
降陰中之濁陰一升一降內外通和而雜氣之流毒頓消矣  
又名太極丸以太極本無極用治雜氣無聲無臭之病也乙  
亥丙子丁丑吾邑連歉溫氣盛行死者枕籍予用此散救大  
證怪證壞證危證得愈者十數人餘無算更將此方傳施親  
友貼示集市全活甚衆可與河間雙解散並駕齊驅耳名曰  
升降亦雙解之別名也

加味六一承氣湯

方見陽證似陰門

解毒承氣湯

方見陰證門

生脈散

治夏月金受火囚絕寒水生化之源以致咳嗽喘

促肢體瘦軟脚弱眼黑口渴汗出者

人參二錢  
麥冬去心二錢  
五味子二錢  
水煎溫服

東垣曰、人參甘寒瀉火熟而益元氣、麥冬苦寒滋燥金而清  
水源、五味酸溫瀉丙火而補庚金、以肺朝百脈故名曰生脈  
散、今人因生脈之名用治脈微欲絕陽氣將脫之證誤人多  
矣、何如獨參一味。

### 陽毒陰毒

傷寒論曰、陽毒之爲病面赤斑斑如錦文、咽喉痛、吐膿血、五  
日可治、七日不可治、升麻籠甲湯主之、

傷寒論曰、陰毒之爲病面目青身痛、如被杖咽喉痛、五日可

治七日不可治、升麻鼈甲湯主之、按陰陽和、正氣也、陰陽偏異氣也、正氣者、四時錯行之氣也、異氣者、四時不節之氣也、而雜氣非其種也、雜氣者、兵凶旱、潦、疵癘烟瘴、一切惡穢不正之氣也、此氣適中人之陽分、則爲陽毒、適中人之陰分、則爲陰毒、觀其所主之藥、二證一方、並不用大寒大熱之劑、可知長沙所謂陽毒陰毒、乃天地之雜氣、非風寒暑濕燥火之六氣也、豈若後人之所謂陽毒陰毒乎、要之後人所謂陽熱極盛、固是陽毒、陰寒極盛、固是陰毒、終非長沙所以立名之本義、此二證者、卽所稱溫病是也、卽大頭溫、蠅蠆溫、瓜瓢溫、以及痧脹之類是也、吳又可溫病

無陰證之論實本長沙陰毒陽毒中於雜氣之說受毒有淺深爲病有輕重一而二二而一者也王太僕曰此陽盛格陰而致之非寒也凡中此雜氣之人不止咽喉痛身痛甚至心腹絞痛大滿大脹通身脈絡青紫手足指甲色如靛葉口噤牙緊心中忙亂一二日卽死者此類是也但刺尺澤委中十指出血卽令服玉樞丸最妙撥正散尤爲奇方男左女右吹入鼻中雖危必甦以增損雙解散主之

升麻鱉甲湯

升麻一兩

甘草一兩

鱉甲

酥炙常歸

炒五錢

蜀椒

炒去沫

五錢

雄黃研二錢

水六鍾煎二鍾分二次連服之老小再

服取汗愈

玉樞丹

一名紫金錠

專治暴中雜氣病昏暈欲倒如霍亂吐瀉攬

腸沙

青筋脹心腹痛脹

諸般危證並一切山嵐瘴氣水

土不服解諸毒

療諸瘡利關竅通百病

奇效不可殫述

山茨茆

洪山出者洗去毛皮焙

川文蛤

一名五棓子製淨根破焙

紅芽大

戟

去淨骨焙一兩五錢

千金子

一名續隨子去壳去油一兩研末

硃砂

有神氣者研末

三錢明雄黃

鮮紅大塊者研末三錢

麝

揀淨皮毛乾者研末三錢

右七味稱準合研勻於石臼內漸加糯米臘飲調和燥濕得宜杵千餘以光潤爲度每錠重一錢每服一錠病重者連服二錠取通利後以溫粥補之

一治一切飲食藥毒、蠱毒及喫自死牛馬猪羊等肉、菌中毒並山嵐瘴氣、烟霧惡毒等證、昏亂猝倒、或生異形之狀、悉用涼水磨服。

一治陰陽二毒、瘟疫痧脹、或狂言亂語、或胸腹腫痛、並喉痺咽腫、俱用薄荷湯待冷磨服。

一治癰疽發皆對口天泡、無名腫毒、蛀節紅絲等疔、諸惡等瘡、諸風癰疹、久痔紅腫、及楊梅結毒、俱用無灰酒磨服外、用涼水磨塗、日夜數次、覺癢卽消、潰爛亦可少減。

一治男婦急病、癡邪奔走叫號、失心狂亂、羊兒猪癩等風、俱用石菖蒲煎磨服。

一治心胃痛、及諸般氣痛、及諸般血痛、並赤白痢泄瀉、急痛霍亂絞腸之類、俱用薑湯磨服。

一治中風、中氣中痰、口眼歪邪、牙關緊急、語言蹇濶、筋肢攣縮骨節、風腫遍身疼痛、行步艱難等證、用酒磨頭熱服之。

一治風犬毒蛇、澗溪諸蟲傷人、及注徧身、毒氣入裏、命在旦夕、俱用酒磨服、外用水磨塗之、再服葱湯、汗出自愈。

一治年深日久、頭脹頭痛、偏正頭風、及溫病後、毒氣攻注腦門作脹者、俱用葱湯磨服、仍磨塗太陽穴上。

一治小兒急驚風、五疳、五痢、黃疸、俱用薄荷湯磨、加蜜調服、一治小兒遺毒生下、百日內皮、塌肉爛、穀道眼眶損者、涼水

磨服並磨塗

撥正散 專治雜氣爲病、陰陽毒痧脹、及一切無名惡證、  
食厥、痰厥、氣厥皆驗

草撥

雄黃

精爲上

火硝

各二錢袋

麝

冰片各五

釐

五

右爲細末、男左女右、以筒吹入鼻中、卽甦

增損雙解散 溫病主方、溫毒流注、無所不至、上干則頭痛、

目眩耳聾、下流則腰痛足腫、注於皮膚則斑疹瘡瘍壅  
於腸胃則毒利膿血、傷於陽明則脣臉腫痛、結於太陰、  
則腹滿嘔吐、結於少陰則喉痺咽痛、結於厥陰則舌捲  
囊縮、此方解散陰陽內外之毒、無所不至矣

白礪蠶

酒炒三錢

全蟬脫

丁二枚

薑黃

七分防風一錢

薄荷

一錢

荆芥

一錢

當歸

一錢

白芍

一錢

黃連

一錢

連翹

去心一錢

梔子

一錢

黃芩

二錢

桔梗

二錢

石膏

六錢

滑石

三錢

甘草

二錢

大黃

酒浸三錢

芒硝

二錢

水煎去渣充芒硝入

蜜

三匙

黃酒

半杯

和匀冷服

按溫病本末身涼不渴小便不赤脈不洪數者未之有也河間以傷寒爲雜病溫病爲大病特立雙解散以兩解溫病表裏之熱毒以發明溫病與傷寒異治之秘奧其見高出千古深得長沙不傳之秘且長沙以兩感爲不治之證傷寒病兩感者亦少一部傷寒論僅見麻黃附子細辛湯一證惟溫病

居多以溫病咸從三陰發出三陽乃邪熱亢極之證卽是兩  
感、惜長沙溫病方論散佚不傳、幸存有五十九穴一法、惟河  
間雙解散解鬱散結清熱導滯可以救之、必要以雙解散爲第  
一方、信然、予加減數味以治溫病較原方猶覺大驗、戊寅四  
月商邑貢生劉兆平年八旬患溫病表裏大熱氣噴如火舌  
黃口燥譖語發狂脈洪長滑數予用原方治之大汗不止舉  
家驚惶急易大復甦飲一服汗止但本證未退改製增損雙  
解散方兩劑而病痊因悟麻黃春夏不可輕用因悟古方今  
病不可過執也所以許學士有云讀仲景之書學仲景之法  
不可執仲景之方乃爲得仲景之心也、旨哉斯言、河間雙解  
三黃俱用

麻黃仍牽引叔和舊說蓋溫病熱鬱自裏達表亦宜解散但以辛涼爲妙

表證

發熱惡寒惡風頭痛身痛項背強痛目痛鼻乾不眠胸脇痛耳聾目眩往來寒熱嘔而舌苦脈浮而洪或緊而緩或長而弛皆表證也在傷寒風寒外入但有一毫表證自當發汗解肌消散而愈其用藥不過麻黃桂枝葛根柴胡之類在溫病邪熱內攻凡見表證皆裏證鬱結浮越於外也雖有表證實無表邪斷無正發汗之理故傷寒以發表爲先溫病以清裏爲主此一着最爲緊要關隘今人一遇溫病便以爲傷寒遂引經論先解其表乃攻其裏之說此大謬也總因古今醫家

俱將溫病與傷寒看成一證、不分兩治、如王宇泰張景岳皆  
代名手也、其論傷寒證治、妙矣至矣、蔑以加矣、至說到溫病  
猶是老生常談、他何足道、人每以大劑麻黃葛根等湯強發  
其汗、此邪原不在經、汗之徒損經氣熱亦不減、轉見狂燥、蓋  
發汗之理、自內由中以達外、今裏熱結滯、陽氣不能敷布於  
外、卽四肢未免厥逆、又安能氣液蒸蒸以透表、如縛足之鳥  
焉能飛升、又如水注之器、閉其後竅、前竅焉能涓滴、惟用升  
降雙解、裏熱一清、表風自透、不待發散、多有自能汗解者、此  
中立妙、王劉二公、其先覺乎、

麻黃湯 太陽傷寒寒傷榮 頭痛太陽脈上 發熱表氣不通 身痛腰

痛寒凝血滯

腎主骨而

衛弱之故

榮強而

寒氣注之惡寒

寒氣注之故

無汗衛弱之故

榮強而

喘

寒、阻氣道故

喘脈浮緊者

寒注緊急之故

此方主之

麻黃

去節三錢

桂枝

二錢

炙草

一錢

杏仁

一錢八分

水煎麻黃

去沫次入羣藥煎服覆取微汗

足太陽經起目內眞循頭嶺腰膍故所過痛而不利寒邪外束人身之陽不得宣越故令發熱寒邪在表不復任寒故令人惡寒寒主閉塞故令無汗人身之陽既不得宣越於外則必壅遏於內故必作喘寒邪剛勁故令脈緊麻黃辛溫散寒故爲君佐以桂枝取其解肌佐以杏仁取其利器入甘草者亦辛甘發散之意抑太陽無汗麻黃之用固也若不量人品之

虛實時令之寒、暄，則又有汗多亡陽之戒。汗多者宜機粉亡。  
陽者宜附子湯大抵麻黃性熱，惟冬月正傷寒無汗者宜之。  
若溫病斷不可用，抑不獨溫病也。若傷寒脈微弱而誤用之，  
汗出不止，或病人頭髮披人盆中，再將糯米八兩  
炒研，龍骨壯  
蠣橐本防風各二兩  
研爲末合勻周身撲之，此良方也。汗出不止，汗  
多也，與亡陽不同。

葛根湯 傷寒標熱壯熱頭額痛目痛鼻乾不眠無汗尺寸  
脈俱長，及太陽陽明合病，脈浮而長必自下利者，此方  
主之。

葛根四錢 麻黃三錢 桂枝二錢 白芍一錢 甘草二錢 大

棗二枚 生薑三錢

水煎麻黃葛根去沫次入諸藥

煎服去麻黃名桂枝加葛根湯

太陽陽明合病下利猶屬表證世人多以爲漏底傷寒爲不治仲景以此方主之蓋以邪氣併於陽則陽實而陰虛陰虛故下利也與此湯以散經中表邪則陽不實而陰氣平不肚利而利自止也

升降散方見陰證似陽門

雙解散方見陽證似陰門

表裏兼證

表裏俱見之證疑似之間最宜詳辨蓋在表者宜汗在裏者

宜下今既兩證相兼如欲汗之則裏證已急欲下之則表證尚在傷寒自表傳裏通宜大柴胡湯兩解之在溫病自裏證表輕則增損大柴胡湯重則加味六一順氣湯主之大柴胡湯傷寒陽邪入裏表證未罷而裏證又急者此方

主之

柴胡四錢半夏薑汁炒一錢生薑二錢白芍一錢枳實麸炒一錢大棗一枚水煎溫服

表證未罷寒熱脹痛口苦而嘔尚在也裏證又急大便難而燥實也有表證故用柴芩以解表有裏證故用枳黃以攻裏白芍能和少陽半夏能止嘔逆薑棗又所以和中而調榮衛

也、少陽病、六七日至十餘日、大便不行、脇下濶濶汗出、方可  
用大柴胡湯微利之、緣胆無出入、瀉土所以瀉木也、如脇下  
無汗、爲胆未實、設誤下之、必犯少陽之本、則胸滿煩驚、小便  
不利、譫語、一身盡重、不可轉側、又宜用、

增損大柴胡湯、溫病熱鬱腠理、以辛涼解散、不至還裏而  
成可攻之證、此方主之、乃內外雙解之劑也、

柴胡

四錢

薄荷

二錢

陳皮

一錢

黃芩

二錢

黃連

一錢

黃

柏

一錢

梔子

一錢

白芍

一錢

枳實

一錢

大黃

二錢

廣

薑黃

七分

白蘞蠶

酒炒三錢

全蟬脫

十個

嘔加生

薑

二錢

水煎去渣入冷黃酒一兩蜜五錢和勻令服

加味六一順氣湯 方見陽證似陰門

裏證

不惡寒反惡熱、掌心並液下濺、濺汗出、腹中硬滿脹痛、大便燥結、或膠閉、或結熱旁流、或脇熱下利、譖語發狂、口渴咽乾、舌黃或黑、舌捲或裂、煩滿囊縮、而厥脈洪而滑、或沉實、或伏數、此裏證之大畧也、溫病與傷寒表證不同、裏證原無大異、亦須辨明治之、

按傷寒有表證、自當汗之、然脈有忌汗者七條、證有忌汗者十一條、有裏證自當下之、然脈有忌下者十四條、證有忌下者二十二條、此尤不可不知也、傷寒論三百九十七法、一百

一十三方詳且盡矣、兼以諸家闡發無餘、觀之自明、何須余贊、是集特辨溫病根源、脈證治方、與傷寒大異、令業醫者、分別清楚、不以傷寒混治溫病、是則余之志也已。

又按訥菴云、汗吐下和、古人之治病四法、景岳云、若無邪氣在上、不可輕吐、亦無多法、梔子豉湯、吐無形之虛煩、瓜蒂散、吐有形之實邪、一法以梔服子爲末、溫水調服一錢、良久即吐、和解有柴胡湯、加減足矣、二法之外、最切於病、無過汗下、正傷寒之當汗當下者、已逐條分斷矣、溫病無正發汗之理、惟下證最多、特爲指明、莫厭其煩、

梔子豉湯 汗吐下後虛煩不得眠

邪入腑中、挾飲生  
煩心爲水凌故也

若劇

者反覆顛倒

按轉反側之象

心中懊惱

悔憾也

此方主之

出無形

山梔子

生研

淡豆豉

四錢

水煎溫服得吐便止不吐

再作服

梔子湧膈上虛熱、香豉散寒熱惡毒、能吐能下爲傷寒汗下後、不解虛煩悶亂之聖藥、若嘔則加生薑以滌飲名梔子生薑豉湯、若少氣則加甘草以緩中、名梔子甘草豉湯、若心煩腹滿起卧不安、則去香豉而加厚樸枳實名梔子厚樸湯、又傷寒論曰、傷寒以丸藥大下之、身熱不去、微煩者、梔子乾薑豉湯主之、又曰、傷寒五六日、大下之後、身熱不去、心中結痛者、未欲解也、梔子豉乾薑湯主之、故凡欲湧虛煩必先顧慮

中氣所以病人素有微溏者、有不可吐之戒。

按梔子乾薑湯主之、當是梔子豉湯、梔子豉湯主之、當是梔子乾薑湯、斷無煩熱用乾薑、結痛用香豉之理、當移之。

柯韻伯曰、傷寒太陽以心腹爲裏、陽明以心腹爲表、蓋陽明之裏、是胃實、不特發熱惡熱、目痛鼻乾、汗出身重、謂之表、一切虛煩虛熱、咽燥口苦、舌胎腹瀉、煩燥不得卧、消渴而小便不利、凡在胃之外者、悉屬陽明之表也、仲景製汗劑、是開太陽表邪之出路、製吐劑、是引陽明表邪之出路、若太陽當汗水、不欲近衣等證、此太陽轉屬陽明之表、當梔子豉湯主之、而反吐之、便見自汗出不惡寒、饑不能食、朝食暮吐、欲飲冷水、不欲近衣等證、

陽明當吐而不吐反行汗下、溫鍼等法，以致心中憤憤、慄惕、懊憹、煩躁舌胎等證，然仍陽明之表，仍當梔子豉湯吐之。梔子苦能湧泄寒能勝熱，其形象心，又色赤通心，故主治心中上下一切證。豆形象腎，又色黑入腎，製而爲豉，輕浮上行，能使心服之濁邪，上出於口。一吐而心腹得舒，表裏之煩熱悉除矣。所以然者，二陽之病發心脾，此乃心脾熱不是胃家實，卽所云有熱屬藏者攻之，不令發汗之義也。急除胃中之熱，不致胃家之實，卽此一湯爲陽明解表裏之聖劑矣。

瓜蒂散

吐有形之實邪

病如桂枝證，頭不痛項不強，寸脈浮，胸中痞鞕，氣上衝，咽喉不得息者，此爲胸有寒也。寒者痰飲

也此方主之

甜瓜蒂

炒黃

赤小豆各等分爲末熱水二鍾入淡豆豉

三錢

煎

一鍾去渣和藥末

一錢

溫服之不吐再加得

快吐卽止或燒鹽熟湯調服以指探吐治霍亂宿食

熱痰冷痛十金曰凡病皆宜大勝用藥

小柴胡湯

少陽病五六日

邪傳半裏之時

往來寒熱

風寒邪出入於表裏之間

胸脇若滿

下膈循腸伏飲搏聚

默默不欲飲食

烟乾故然木乘心土

故不思食

喜嘔

伏飲作嘔上逆作嘔

或胸中煩而不嘔

煩乃熱悶也不嘔無伏飲之卦也

渴

津液不足

或腹中痛

血滯陰結

或脇下痞硬

邪熱與伏飲相搏於脇下

或心

下悸

水停心下

小便不利

水下行

或不渴

裏未結實

身有微熱

表未全罷

或咳者射肺

伏飲此方主之

半夏之邪

和解半表

加芒硝名柴胡

半裏之邪

柴胡

四錢黃芩二錢半夏二錢

人參一錢甘草炙一錢

生薑

二錢大棗二枚

水煎溫服若胸中煩而不嘔去

半夏人參

加桔梗實一枚

潤下泄滿

若渴者去半夏倍人參

生津潤燥

加天花粉

二錢微熱滋陰

若腹中痛去黃芩加芍藥

二錢收緩中

若脇下痞鞭去大棗加牡蠣粉

二錢軟堅

若心下悸小便不利去黃芩加白茯苓

二錢上行肺氣

下過膀胱若不渴外有微

熱去人參

固表

加桂枝一枚

微汗發散

若咳者去人參

棗薑加五味子

一錢

乾薑各一錢

寒濕以逐

肝

以逐

肝

以逐

肝

芒硝湯

邪在表則惡寒、邪在裏則發熱、邪在半表半裏則惡寒且熱、故令寒熱往來、少陽之脈起目銳、背故令目眩、膽者中精之官、五臟取決於膽、咽爲之使、故令口苦、咽乾、脈行兩脇、故令脇痛、膽者肝之腑、在五行屬木、有垂枝之象、故令脈弦、柴胡辛溫、辛者金之位、故用之以平木、溫者春之氣、故就之以人少陽、一云專主往來寒熱、謂其能升提風木之氣也、黃芩質枯味苦枯、則能浮苦則能降、君以柴胡則入少陽矣、一云味苦不沉、黃中帶青、有去風熱之專功、謂其能散風木之邪也、然邪之傷人、常乘其虛用參草、欲實其中氣、使邪不能復傳入裏耳、一云少陽氣血薄、全賴土膏滋潤、則木氣始得發榮。

卽經所謂胃和則愈之說，是以中氣不虛之人，雖有小柴胡  
證，而人参在可去也。邪初入裏，以風寒外邪，挾有形之痰涎，  
結聚於少陽之本位，所以裏氣逆而反嘔，故用半夏之辛以  
除嘔逆，邪在半表，則榮衛爭，故用薑棗之辛甘以和榮衛，亦  
所以佐參草以補中氣，使半表之邪，仍從肌表而散也。獨怪  
後世用小柴胡湯者，一概除去人参，豈仲景立方之本意哉。  
又少陽經當衝要之路，關係最重，小柴胡非套藥也。今人不  
論何病，但見發熱惡寒，便以小柴胡湯和解之，殊覺可笑。

本方加枳殼錢桔梗三錢黃連二錢名柴胡陷胸湯

本方加枳殼三錢桔梗三錢

四錢

名柴胡枳桔湯

面黃 身黃

以下共計溫病  
下證五十二條

黃者土色也、脾胃於五行屬土、陽明之脈榮於面、黃則濕熱鬱於脾胃之中、薰灼上蒸於面、甚則身黃如橘子色、此大熱之象、並宜茵陳蒿湯、令升降散再酌病情、合三承氣湯下之、後熱退汗自出、黃自消矣、或以溫酒洗之。

內經曰、能合脈色可以萬全、難經曰、望而知之之謂神、故看病者先要察色、然後審證、切脈參合、以決吉凶也、如肝熱則左頰先赤、肺熱則右頰先赤、心熱則額先赤、腎熱則頤先赤、脾胃熱則滿面通赤也、又面色黃爲溫爲熱、白爲氣不調、青爲風寒、黑爲陰寒也、自準頭年壽命宮法令人中皆有氣色

可

又若傷寒陰寒、內盛逼其浮陽之火行於面、亦發赤色  
非也。此爲戴陽、四逆湯加葱白、大陽已戴於頭面、不知  
者更用表藥、則孤陽飛越、危殆立見、可不慎哉。溫病無陰證、  
目暗不明、目赤、目黃、目瞑、目直視、目反折。

目者、至陰也、五藏六府、精華之所係、水足則明察秋毫、如  
常、而瞭瞭者裏無邪也。至於目暗不明、乃邪熱居內、焚灼  
腎水枯涸、不能朗照、若赤若黃、若瞑若直視、若反折、邪俱  
在裏也。若不急下、則邪熱愈熾矣、並宜加味涼膈散、加龍  
胆草。

薛氏曰、凡開目而欲見人者、陽證也、閉目而不欲見人者、陰

證也、目中不了了目晴不和、色赤熱甚於內也、目瞑者必將  
衄也、目晴黃者將發身黃也、或瞪目直視、或戴眼反折、或目  
胞陷下內多虛證或晴暗而不知人者亦有虛證皆難治也、

加味涼膈散 温病主方 余治溫病雙解涼膈、愈者不詳  
其數、若病大頭、瓜瓠等溫、危在旦夕、數年來以二方救  
活者、屈指以算、百十餘人、真神方也、其共珍之、

白殼蠶酒炒三錢蟬蛻全十二枚廣薑黃七分黃連二錢黃芩二錢

梔子二錢連翹去心三錢薄荷大黃芒硝各三錢甘草一錢

竹葉三十片水煎去渣充芒硝入蜜酒冷服若欲下之  
量加硝黃、胸中熱加麥冬、心下痞加枳實、嘔渴加石

膏小便赤數加滑石滿加枳實厚樸

連翹荷竹葉薄而升浮瀉火於上芩連梔薑味苦而無氣瀉火於中大黃芒硝味厚而鹹寒瀉火於下蘆蠶蟬蛻以清化之品滌疵癥之氣以解溫毒用甘草者取其性緩以和中也加蜜酒者取其引上而導下也

舌白胎 黃胎 黑胎

凡傷寒邪在表者舌無胎邪在半表半裏自胎而滑肺主氣而色白故凡白胎猶帶表證止宜和解禁用攻下有尖白根黃尖黃根白或尖白根黑及半邊黃白而胎滑者雖證不同皆屬半表半裏若傳裏則乾燥熱深則黃甚則黑

也然黑色止有二種、有火極似水者爲熱極、有水極似火者爲寒極、細辨之、黑色亦自不同、熱極者、色黑而胎燥、或如芒刺、再驗必小便赤濇、大承氣湯下之、寒極者、色青灰而胎滑、再驗必小便清白、或淡黃、理中湯加附子溫之、又溫病與傷寒舌色不同、傷寒自表傳裏、舌胎必由白滑而變黃變黑、不似溫病熱毒由裏達表、一發即是白黃黑諸胎也、故傷寒白胎不可下、黃則下之、溫病稍見黃白胎、無論燥潤、卽以升降散加味涼膈散下之、黑則以解毒承氣湯急下之、下後間有三二日、裏證去、舌尚黑者、胎皮未落、也不可忍下、務在有下證方可下、有一種舌俱黑而無

胎此經氣非下證也姪娠多有此陰證亦有此

又有一

種舌屢經汗下消導二便已通而舌上青灰色未退或潤或雖不濕潤亦不乾燥不可因其濕潤妄投薑附亦不可因其不濕潤而誤與硝黃此因汗下過傷津液其脈必虛微無力急宜救陰爲主炙甘草湯左歸丸料或六味地黃丸料合生脈散滋其化源又有二種舌真陰虧損火勝精枯乾燥涸極唇烈鼻燥舌黑宜以涼水梨漿治其標左歸六味治其本庶或可生若執用承氣涼膈則殆矣杜清碧三十六舌法三十五舌屬熱惟一舌屬寒大抵熱多寒少三十六法已覺其煩後廣至一百有餘真屬蛇足

大飴梨截薄片於新汲水中去渣飲汁卽梨漿是也

大承氣湯 方見陽證似陰門

理中湯 方見陰證門

升降湯 方見陰證似陽門

加味涼膈散 方見目暗不明門

解毒承氣湯 方見陰證門

炙甘草湯 傷寒脈結代心動悸此方主之

炙甘草 二錢 阿膠 二錢 麻仁 去皮 四錢 麥冬 去心 四錢 生地 八錢

杜枝 二錢 人參 一錢 生薑 二錢 大棗 二枚

水酒各

半煎去渣入阿膠化服

薛氏加當歸酸棗仁

炒各三錢

五味子

炒研一錢

脈結心悸由血氣虛衰不能相續也緣其以汗下不解、鎮陰衰竭津液枯涸滋陰之藥當倍於補氣故參草桂枝薑棗補益中氣調和榮衛阿膠麻仁麥冬生地藥味既多分兩既重所以潤經益血復脈通心也聖劑經曰津液耗散爲枯五臟痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之與水停心悸之治法不同汪訥菴曰千金翼用治虛勞寶鑑用治呃逆外台用治肺痿愚按開後人滋陰降火無窮之法門此方是也

左歸丸減兩爲錢大劑治真陰腎水不足不能滋養榮衛漸至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸元

煎飲名爲丸料

大劑

或氣虛昏暈、或眼花耳聾、或口燥舌乾、或腰酸腿軟、或遺淋澇痛、凡精髓內虧、津液枯涸等證、俱宜壯水之主、以培左腎之元陰、而精血自充矣。

熟地

八兩

山藥

四兩

山茱萸

四兩

蒸免絲子

四兩

酒炒

杞杞

四兩

鹿角膠

四兩

打碎炒珠

龜板膠

四兩

截碎炒珠

無火不用此味

牛膝

三兩

蜜蒸酒蒸熟滑

爲末

揀蜜丸任下

如真陰失守、虛火上炎

精者不用

去枸杞鹿膠加女貞子

三錢麥冬

者宜用純陰至靜之劑去枸杞鹿膠加女貞子

三錢麥冬

火燥灼金乾枯多嗽加百合

三兩

夜熱骨蒸加地骨皮

三錢

火燥灼金乾枯多嗽加百合

三兩

夜熱骨蒸加地骨皮

三兩

火燥灼金乾枯多嗽加百合

三兩

夜熱骨蒸加地骨皮

三兩

火燥灼金乾枯多嗽加百合

三兩

夜熱骨蒸加地骨皮

三錢

水不利不清加白茯苓

三兩

大便燥結去免絲加肉蓯

三錢

水不利不清加白茯苓

三兩

大便燥結去免絲加肉蓯

三兩

水不利不清加白茯苓

三兩

大便燥結去免絲加肉蓯

三錢

水不利不清加白茯苓

三兩

大便燥結去免絲加肉蓯

三兩

水不利不清加白茯苓

三兩

大便燥結去免絲加肉蓯

三兩

水不利不清加白茯苓

三兩

大便燥結去免絲加肉蓯

平無火而腎氣不充者去龜板膠加破故紙

炒香三兩蓮肉

去胡桃肉

各三兩

氣虛加入參

三兩

六味地黃丸料

加肉桂一錢炮附子一錢牛膝一錢

車前子一錢名

金匱腎氣丸料去牛前名腎氣丸

熟地

四錢

山藥

二錢

山萸肉

二錢

白茯苓

一錢半

丹皮

二錢

澤瀉五分

水煎

溫服加黃柏知母名知柏地黃丸

生脈散

方見陰證似陽門

舌白砂胎

舌紫赤色

舌上白胎乾硬如砂皮一名水晶舌乃自白胎之時津液  
乾燥邪雖在胃不能變黃急下之紫赤亦胃熱也亦宜

之下

舌刺

熱傷津液此熱毒之最重者急下之

舌裂

日久失火血液枯涸多有此證又熱結旁流日久不治在下則津液消亡在上則邪火毒熾故有此證急下之

裂自滿

舌短

舌捲舌硬

此皆邪氣勝真氣虧急下之舌自舒

唇燥裂

唇焦色

口臭

鼻孔如烟煤

此胃家實多有

此證急下之鼻孔煤黑溫毒在胃更甚急下之

口燥咽乾

氣噴如火

揚手擲足

小便極臭

小便赤

黑小便涓滴作痛此皆內熱之極急下之

潮熱邪熱在胃宜下之

善太息、此胃家實、呼吸不利、胸膈痞悶、每欲飲氣下行、故然宜下之。

心下滿、心下痛、心下滿痛、心下高起如塊、腹脹滿痛、腹痛按之愈痛、小腹滿痛、此皆胃家邪實、內結氣閉、急下之、氣通則已。

頭脹、頭脹痛、頭汗、頭痛如破、此皆胃家邪實、氣不下降、急下之、脹痛立止、頭汗亦宜下之、則熱越而徧身汗出矣。

譖語、發狂、畜血如狂、此胃家實、陽邪勝也、急下之、有氣血兩虛、燥煩如狂者、不宜下、須辨之。

溫疹 治法不外清散、增損雙解散加紫萍

增損雙解散

方見陽毒陰毒門

小便閉 此大便秘氣結不舒因而小便不通也急下之大便行小便立解

大便燥結 轉屎氣極臭此下之無辭但有血液枯竭者無表裏證虛燥不可下宜六味地黃丸料加麥冬五味煎成人入人乳減半飲之一方用白菜自然汁大麻仁汁生芝麻汁等分入蜜和服自通或用蜜煎導法

六味地黃丸料

方見上舌白脈內

蜜煎導法 陽明病自汗若發汗小便自利者此爲精液內

不竭便雖硬不可攻此仲景心法後人早知當自欲大時以此法導之乃承氣之變法也

蜂蜜 入銅勺內微火煎稍凝勿令焦入皂角末五分

併手作挺子長寸許令頭銳欲大便時入穀道中自

大便膠閉 其人平日大便不實一遇溫邪便蒸作極臭狀

如粘膠愈蒸愈粘愈粘愈閉以致胃氣不能下行溫毒無自而出不下卽死若得粘膠一去無不愈者

傷熱下利 其人大便素或不調邪熱乘胃便作煩渴一如

素日瀉泄稀糞而色不敗其敗色但焦黃而已午後潮熱

便作瀉泄子後熱退瀉泄亦減次日不作潮熱利亦止爲

病愈若潮熱復作利不止者以增損大柴湖湯徹其餘邪而利自止

增損大柴胡湯

熱結傍流此胃家實邪熱壅閉續得下利純臭水全然無糞日三五度或十數度急以加味六一順氣湯下之得結糞而利自止服藥後不得結糞仍稀水傍流及所進湯藥因大腸邪勝失其傳送之職知邪猶在也病必不減仍以前湯再下之或用解毒承氣湯如虛并加人參無參以熟地一兩歸身七錢山藥五錢煎湯入前藥煎服累效蓋血不亡氣亦不散耳

加味六一氣順湯

方見陽證似陰門

解毒承氣湯

方見陰證門

脈厥

體厥

脈厥

沉伏欲絕

體厥四肢逆冷

涼過肘膝半

死半生

通身如冰

九死一生

此邪火壅閉

陽氣不能四布

於外胃家實也

急以解毒承氣湯

大清大下之下

後而鬱熱已解

脈和體溫

此爲病愈

若下後而鬱熱已盡

反見厥

者爲虛脫宜補若下後鬱熱未盡仍見厥者更下之厥不回者死

按溫病厥逆皆下證傷寒厥逆多兼不利則陽熱變爲陰寒者十之五蓋木盛則胃土受尅水穀奔迫胃陽發露能

食則爲除中木盛則腎水暗虧汲取無休腎陽發露面赤  
則爲戴陽戴陽尙多可救除中十不救一所以溫之炎之  
以回其陽仍不出少陰之成法也但厥而下利陰陽之機  
甚微不可不辨也

解毒承氣湯方見陰證門

下後脈反浮

裏證下後宜脈靜身涼全脈浮身微熱口渴神思或不爽此  
邪熱溢於肌表裏無大留滯也雖無汗宜白虎湯若大下後  
或數下後脈空浮而虛按之豁然如無宜玉女煎加人參覆  
杯則汗解以其人或自利經久或他病先虧或本病日久不

瘡或反覆數下以致周身血液枯涸石膏知母麥冬辛涼除  
肌表散漫之熱邪人參熟地牛膝滋陰以助周身之血液於  
是經絡澤潤元氣鼓舞腠理開發此邪從榮解汗化於液之  
義也

白虎湯 傷寒論曰陽明傷寒脈浮滑此以表有熱裏有寒

此方主之

按裏有寒句之寒字當是熱字若  
是寒字非白虎證也宜改之

生石膏

八錢

知母

三錢

甘草

生一錢半

粳米

二錢半

竹葉

三十片

水煎冷服加人參

一錢五分

名白虎加人參湯

白虎西方庚辛金神也五行之理成功者退如秋金之令行

則夏火之炎息、名曰白虎、所以行清肅之令而除熱也。

按白虎湯乃溫病主方也、雖爲陽明解利之藥、實解胃本內蒸之熱、非徒治在經之熱也、以邪熱傷胃、所以必需、若在經之熱、自有葛根湯等方、治法並無借於白虎也、所以溫病誤用麻黃桂枝、傷寒誤用白虎黃芩、輕者必重、重者必危、設熱鬱胃裏、已成結燥、而徒用白虎、旣無逐結之能、且以剛悍而伐胃氣、反抑邪氣內鬱、致脈不行、因而沉伏微細、便謂陰脈益不敢議、下日惟雜進白虎解毒、以爲穩妥、愈投愈危、至死不悟、此承氣涼膈之所以必需也、明者自知之。

又按以石膏一物之微、入甘溫隊中、則爲青龍、從清涼同氣、

則爲白虎、設傷寒在表之風寒未除當用青龍而反用白虎溫病在裏之熱渴已逼當用白虎、反用青龍則用者之誤不  
小、熱結在裏白虎以匡青龍之不建誤犯少陰真武以救

青龍之妄投神乎其神矣、

玉女煎 治少陰不足、陽明有餘、水虧火旺、六脈浮而滑大、

乾燥煩渴、頭痛牙齦、血衄血者、

熟地五錢牛膝一錢石膏五分知母一錢麥冬去心三分水

煎服

按熟地牛膝補腎水之不足、石膏知母瀉脾土之有餘、而金則土之子、水之母也、麥冬甘以補肺、寒以清肺、所謂虛則補

其母實則瀉其子也。

下後脈復沉

下證脈沉而數、下後脈浮、當得汗解、以熱邪溢於氣分也。今下後、二三日脈復沉者、餘邪復瘀到胃也、宜更下之、更下後脈再浮者、仍得汗解、宜白虎湯、以白虎發汗、亦裏熱除、而表邪自解之義、非比麻黃桂枝發散風寒也。

白虎湯

方見下後脈反浮門

下後脈反數

應下失下、口燥咽乾而渴、身反熱減、四肢時厥、欲得近火壅被、此陽氣伏也、下後厥回身復熱、脉大而反數、舌上生津不

甚飲水此裏邪漸去鬱陽暴伸也柴胡清燥湯以和解之此證類近白虎但熱渴旣除又非白虎所宜也

柴胡清燥湯 治溫病陰枯血燥邪熱不退

柴胡三錢黃芩二錢陳皮一錢知母二錢花粉二錢蟬

脫全十個

白僵蠶酒炒

太棗三錢

一枚甘草一錢

水煎溫服

服加當歸白芍生地名柴胡養榮湯數下後餘熱未盡邪與衛搏故熱不能頓除宜此湯和解之

下後身反熱

應下之證下後當脈靜身涼今反發熱者此內結開正氣通鬱陽暴伸也卽如爐中伏火撥開雖焰不久自息與下後脈

反數義同。

下後反否

邪氣留於心胸、今人痞滿下之不應去、令反否者、以其人或因見他病先虧、或因稟賦嬌怯、氣血兩虛、下之益虛、失其健運、邪氣留止、故致痞滿、今愈下而否愈甚、若用行氣破氣之劑、轉成壞病矣、宜參歸養榮湯、中病即止。

參歸養榮湯

邪留心下、令人痞滿下之不應去、今反否者、

虛也、以其人或素稟嬌怯、或素病虧損、加失血崩帶等

證、因下益虛、失其健運、愈令痞滿再用行氣破氣之劑、

轉成壞病矣、

人參一錢

半夏二錢

生薑三錢

炮炙一錢

甘草一錢

酒炒一錢

白芍一錢

錢五分

當歸二錢

生地二錢

熟地三錢

水煎溫服

當歸二錢 生地二錢 熟地三錢 大棗二枚 水煎溫服  
果如前證一服痞如失若下後仍潮熱口渴脈洪大而不者投之禍不旋踵此有虛實之分須詳辨之

下後邪氣復聚

裏證下後脈不浮洪煩渴減身熱退三五日後復發熱者亦無傷食勞役乃餘邪尚有隱伏因而復發此必然之理不知者每歸咎於醫家誤也再酌前方下之慎勿過劑以邪熱微也

急證急攻

傷寒無此證治

雜氣流毒、怫鬱三焦其病不可測識、一發舌上白胎如積粉、譬如早服涼膈承氣等方下之、至午舌變黃色煩滿更甚、再急下之、至晚舌變黑刺、或鼻如烟煤、仍加硝黃大下之、所謂邪微病微、邪甚病甚、非藥之過也、此一日之間而有三變、幾日之法、一日行之、稍緩則不及救矣、若下後、熱渴除、胎不生、方愈、更有熱除胎脫、日後熱復發、胎復生者、再作前方下之、不必疑二也、嘗見溫病、有一二日卽死者、乃其類也、丁亥五月監生李廉臣女、年十八、患溫、體厥脈厥、內熱外寒、病滿燥實譖語狂亂、罵詈不避親疎、煩躁渴飲、不食不寐、惡人與火、晝夜無寧刻、予自端陽日、診其病、至七月初三始識、人熱退、

七入而思食、自始至終、以大承氣湯一方、雪水熬石膏煎服、約下三百餘行、黑白稠粘等物、愈下愈多、不可測識、此真奇證怪證也、廉臣曰、若非世兄見真守定、通權達變、小女何以再生、戊子秋舉人李煦、南長公、約年十五、患溫脈沉伏、妄見妄言、如醉如癡、渴飲無度、以加味涼膈散連下一月而甦、又予甥年二十一、患溫、初病便煩滿、囊縮、登高棄衣、渴飲不食、日吐血數十口、用犀角地黃湯加柴芩連梔元參荆芥穗灰、十劑、間服瀉心承氣湯七劑、諸證退而飲食進、越五日、小便不通、脹疼欲死、予細診問、脈仍沉贍、間按之、勁疼、予思此王實氣閉不舒、因而小水不利也、以大承氣湯、下黑血塊數

枚而病始痊此皆證之罕見者也可見凡下不以數計有是  
證卽投是藥但恐見理不明認證不透反致擔閣而輕重緩  
急之際有應連日有應間日下者如何多應如何少應其間  
不能如法亦足誤事此非可以言傳臨時酌斷可也此等證  
治亦少姑存以備參考

解毒承氣湯 方見陽證似陰門

加味涼膈散 方見目暗不明門

犀角地黃湯 傷寒溫病胃火熱盛衄血吐血咳咯血、衄

行清道吐行濁道以喉通天氣咽通地氣也循經之血  
走而不守隨氣而行火氣急逼故隨經直犯清道上腦

而出於鼻爲衄其從肺而出於咽者則爲咳咯其存胃  
中者爲守榮之血守而不走胃虛不能攝或爲火逼故  
嘔吐從咽而出也衄血之熱在經吐血之熱在府傷寒  
衄血爲表熱溫病衄血爲裏熱內經曰心移熱於肺則  
咳嗽而出也當詳細辨而治之便血蓄血如狂漱水  
不欲嚥傷寒便血爲傳經熱邪溫病便血爲裏熱畜  
血在上則喜忘在下則如狂漱水不欲嚥熱在經裏無  
熱也畜血發燥而內不渴故雖漱水不而不欲嚥海藏  
大凡血證多不飲水惟氣證則飲水經云陽明病口燥  
漱水不欲嚥者必衄傷寒當發汗而不發汗邪熱妄行

逼血外出故見此證及陽毒發斑

熱甚傷血發於

皮膚見紅點者爲疹如錦文者爲斑傷寒不當下而不下熱毒乘虛入胃則發斑疹溫病當下而不下熱留胃中亦發斑疹或誤服熱藥太過亦發斑疹並婦人血崩赤淋以火勝故治之此方並治之

懷生地

六錢白芍四錢牡丹皮三錢犀角礔

二錢磨汁或末大

水煎入犀角礔服瘀血甚者加大黃三錢以行之或因怒致血或熱極如狂加柴胡平少陽厥陰之火黃芩瀉上中二焦之火梔子瀉三焦之火也

生地甘寒涼血以滋腎水丹皮苦寒瀉血中之伏火犀角大

寒解胃熱而清心火，白芍酸寒和陰血，而散肝火以其平諸經之僭逆也。

大承氣湯

方見陽證似陰門

發熱

凡治傷寒溫病，當發熱之初，最爲緊要關隘，卽宜詳辨脈證治療。此時用藥稍不確當，必變證百出而成壞病矣。如溫病發熱，雜氣怫鬱，三焦由血分發出氣分，斷無正發汗之理。而發熱頭痛身痛而渴，爲熱之輕者，神解散小清涼散之類。如發熱氣噴如火，目赤舌黃，譖語喘息，爲熱之重者，加味涼膈散、增損三黄石膏湯之類。如發熱厥逆，舌見黑胎，則熱之極。

矣加味六一順氣湯解毒承氣湯大清大下之若正傷寒自當詳發熱之表裏虛實以施治如翕翕而熱者表熱也謂若合羽所覆明其熱在外也桂枝麻黃各半湯桂枝二越婢一湯葛根湯選用蒸蒸而熱者也裏熱也謂若薰蒸之蒸明其熱在內也白虎湯黃連解毒湯瀉心湯選用大陽經以表爲標膀胱爲本凡發熱頭項痛腰脊強脈浮緊無汗此寒在標也麻黃湯汗之發熱脈浮緩自汗此風在標也桂枝湯和之發熱脈緊而兼緩此風寒並在標也大青龍湯發之若脈浮發熱煩渴小便不利此熱在本也五苓散兩解之陽明經以肌肉爲標胃爲本凡發熱目痛鼻乾不眠無汗葛根湯熱甚加

黃芩知母主之者乃熱在標也。若表裏俱熱渴飲水漿汗出脈洪數白虎湯主之者乃熱在標本也。若不惡寒反惡熱或蒸蒸而熱內寶不大便脈洪數有力調胃承氣湯下之者乃熱在本也。少陽經主半表半裏從乎中治脈弦發熱頭痛口苦耳聾胸滿肋痛往來寒熱心煩喜嘔默默不欲食者小柴胡湯主之若標病止宜小柴胡加減若本病因邪深入不能傳散多以柴胡加芒硝湯或大柴胡湯大抵熱在太陽忌下熱在陽明忌利小便熱在少陽忌汗忌下忌利小便至傳入三陰則不發熱惟少陰經能發熱然少陰發熱有二證初病即見少陰證脈沉反發熱麻黃附子細辛湯若下利清穀裏

寒外熱、手足厥逆、脈微欲絕、身反不惡寒、此陰盛格陽、內寒而外熱也、理中湯加附子、或通脈四逆湯、蓋陽邪傳陰經而下利者、乃是熱利、陽陷入陰、外所以無熱、自是白頭翁湯、黃連阿膠湯、一派如陰邪入陰經而下利者、乃是裏寒自利、寒既在裏爲主、則陽氣必客於外、外所以反熱、非理中四逆、何以禦之、要知雖皆發熱、畢竟不同、發於陽而發熱者、頭必痛、發於陰而發熱者、頭不痛、此爲辨也、又太陽以惡寒、發熱爲病、進恐邪氣傳裏也、厥陰以厥少熱多爲病退、喜陰、蓋陽復也、然熱氣有餘、則又爲內癰便血之兆矣、發熱多端、不可不詳辨也、

按傷寒論之論內癰止於二句中卽以三證辨內癰爲極確文法精練不可不細玩之第一句諸脈浮數當發熱而反酒漸惡寒謂脈浮數本當發熱而反多酒漸惡寒者內癰也第二句若有痛處謂浮數之脈主邪在經當一身盡痛而痛徧着一處者內癰也第三句飲食如常謂病傷寒當不欲飲食而飲食如常者肉癰也讀仲景書可不於一字一句深求其義哉景岳治肺癰有桔梗杏仁煎治腸癰有腸癰秘方通治有連翹金貝煎外又有蠟礬丸皆神方也謹採以備用外科之法門亦仲景熟盛內癰之說有以開之

神解散溫病初覺憎寒體重壯熱頭痛四肢無力偏身酸

痛、口苦咽乾、胸腹滿悶者、此方主之。

白僵蠶

酒炒一錢

蛻脫

五個

神麴

三錢

金銀花

二錢

生地

錢

木通

一錢

車前子

一錢

黃芩

一錢

黃連

一錢

黃柏

錢

鹽水炒

桔梗

一錢

水煎去渣入冷黃酒半卜杯

蜜三

匙和勻冷服。

此方之妙不可殫述、溫病初覺、但服此藥、俱有奇驗、外無表藥而汗液流通、裏無攻藥、而熱毒自解、有斑疹者卽現、而內邪悉除、此其所以爲神解也、

小清涼散、溫病壯熱、煩燥頭沉、面赤咽喉不利、或唇口頰

脣腫者、此方主之、

白殭蠶炒一錢 漢蘭二錢 當歸二錢 生地二錢

石膏

五錢

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

梔子

一錢

丹皮

一錢

紫草

一錢

銀花

一錢

水煎去渣入蜜酒

童便冷服

黃連清心火、亦清脾火、黃芩清肺火、亦清肝火、石膏清胃火、  
亦清肺火、梔子清三焦之火、紫草通竅和血、解毒消脹、銀花  
清熱解毒、澤蘭行氣消毒、當歸如血生地、丹皮和血以養陰  
而退陽也、殭蠶蟬脫爲清化之品、散腫消鬱、清音定喘、使清  
升濁降、則熱解而證自平矣、

加味涼膈散方見裏證目贈不明內

增損三黃石膏湯 温病主方、表裏三焦大熱、五心煩熱、兩

目如火、鼻乾面赤、舌黃唇焦、身如塗硃、燥渴引飲、神昏  
譫語、服之皆愈。

石膏八錢

殭蠶三錢

酒炒

蟬脫十個

薄荷二錢

豆豉三錢

黃連二錢

黃柏二錢

知母二錢

黃芩二錢

連翹

水微炒

黃柏

水微炒

黃芩

二錢

梔子二錢

知母二錢

黃芩二錢

知母二錢

黃芩二錢

知母二錢

水煎去渣入米酒蜜冷服、或腹脹痛、或燥結、加大黃、

寒能制熱、故用白虎湯、苦能下熱、故用解毒湯、佐以荷梗、

蟬之辛散升浮者、以溫病熱毒至深、表裏俱實揚之則越、降  
之則鬱、鬱則邪火猶存、兼之以發揚、則炎炎之勢皆燼矣、此  
內外分消其勢、猶兵之分擊者也、熱鬱腠理先見表證、爲尤  
宜、

加味六一順氣湯 方見陽證似陰門

解毒承氣湯 方見陰證門

桂枝麻黃各半湯 太陽風寒兩感八九日如瘧狀發熱惡  
寒一日二三度面赤反有熱者表未解也以其不能得  
小汗出身必痺此方主之

桂枝三錢

麻黃二錢

白芍二錢

杏仁正錢

去皮炙甘草二錢

生薑三錢

大棗二枚

水煎

麻黃去沫入羣藥煎服

覆取微汗

此風寒兩感之輕劑也不比大青龍之峻險麻黃發汗祛水  
陽之寒邪桂枝止汗解太陽之風邪一發一止則汗不得大

洩矣

桂枝二越婢一湯

太陽病發熱惡寒、熱多寒少、風多脈微

弱者

微爲陽虛  
弱爲陰虛

此無陽也、不可發汗、此方主之

桂枝二  
風多用

以解之寒少用  
越婢一以發之

桂枝

二錢  
五分

白芍

二錢  
五分

甘草

二錢  
五分

麻黃

二錢  
五分

石膏

三錢  
三分

生

薑

四錢  
三分

大棗

二枚  
二枚

水煎

麻黃去沫入羣藥煎服

卽此一方、知仲景酌量脈證毫釐不差、因風多寒少、故用桂枝二以解之、越婢一以發之也、後世醫家那得窺其万一

葛根湯

附桂枝加葛根湯方見表證門

白虎湯

方見裏證門

黃連解毒湯

方見九陽經似陰門

鴻心湯

此方於各說鴻心湯選用

麻黃湯

方見表證門

桂枝湯

太陽中風

風傷衛

頭痛發熱

風邪鬱蒸

汗出

玄府陳也

惡風

衛虛

不勝風也

脈緩者

風性柔和之故

此方主之

桂枝

三錢

白芍

三錢

甘草

二錢

生薑

三錢

大棗

三枚

水

煎溫服覆取微汗、不可令如水流漓、病必不除。

風之傷人也、頭先受之、故令頭痛、風爲陽氣亦爲陽、同類相從、則傷衛、衛氣傷、則無以固津液、故令汗出、其惡風者、衛氣不能衛也、其脈緩者、衛氣不能鼓也、桂枝味辛甘、辛則能解

肌甘則能實表、辛甘發散爲陽、故用以治風爲君、然恐其走泄陰氣、故用芍藥之酸以收之、佐以甘草生薑大棗、此發表而兼和裏之意、然桂枝本爲解肌、若脈浮緊發熱汗不出者、不可與也、與之則表益實、而汗益難出也、故伸之以當須識此、勿令誤也、大抵桂枝性熱、惟冬月正傷寒有汗者宜之、若溫病斷不可用酒客亦不可用抑不獨酒病酒客也、凡服桂枝湯作嘔者、以胃熱而服熱藥、兩熱相搏故也、

大青龍湯 太陽中風脈浮緊

以中風而得緊脈  
知爲風寒兩傷也

頭痛發熱

惡寒身痛

皆表證也

不出汗

寒邪鬱於腠理

而煩燥

風作煩寒作燥

主此方

麻黃

四錢

桂枝

二錢

炙甘草

二錢

杏仁

泡去皮尖十枚

石膏

八錢

生薑

大棗

水煎

麻黃去沫入羣藥煎服

覆取汗愈若脈微弱汗出惡風者不可服

青龍者東方甲乙木神也主發育萬物方以發散爲義故名之仲景曰太陽傷寒治以麻黃湯太陽中風治以桂枝湯傷寒太陽證見風脈是有頭痛發熱無汗惡寒但脈來得緊而緩爲傷寒且中風矣與中風脈得浮緊一也故二方併而用之邪氣外盛人身之陽鬱爲內熱此石膏之所以加也大青龍其發表之重劑乎而亡陽狂燥之弊筋惕肉瞶之害則用青龍之過者也急以真武湯大溫大補之又仲景收壞之良方也許學士曰大青龍一證尤難用藥須是脈證諦當然後

可行故主實大證止用桂枝麻黃各半湯蓋慎之也按亡陽  
惕瞶之弊原因脈微弱誤用者之過非大青龍之過也

五苓散 太陽膀胱本熱小便不利發熱口渴脈浮者此方

主之脈浮爲表證仍在便祕熱渴

爲府證已急用此兩解表裏

澤瀉

二錢

猪苓

五分

白朮

一錢五分

茯苓

五分

桂枝

二錢

水煎溫服

合小柴胡湯名柴苓湯

注訥卷曰猪苓湯瀉熱勝故用滑石五苓散瀉濕勝故用桂  
苓傷寒太陽宜五苓陽明宜猪苓

曰太陽病發汗後若脈浮小便不利微熱消渴者五  
之又曰多飲暖水汗出愈成氏註曰桂枝之辛甘以

和肌表脈浮者表未解也、微熱消渴者、熱未成實上焦燥也、與五苓散、生津液、和表裏乃兩解之藥也、今之知用桂枝者少矣、殊不知兼治表邪必用桂枝專用利水則宜肉桂、以肉桂辛熱能引諸藥、直達熱邪畜結之處故澤瀉味鹹所以渴腎止渴也、二苓味淡所以滲水滌飲也、白朮味甘所以補脾逐濕也、兼以肉桂有化氣之功、內經曰、膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣、濁陰元自出下竅、則清陽自出上竅、又熱隨溺而洩、發熱口渴之證不治良愈、

調胃承氣湯

陽明病不惡寒反惡熱大便秘譖語主此方

大黃

三錢酒浸芒硝三錢

炙草二錢

水煎溫服

王海藏曰、仲景三承氣、有大小調胃之殊、令人不分大小上  
下緩急用之、豈不失立方本意哉、大熱大實、用大承氣、小熱  
小實、用小承氣、胃實燥結、用調胃承氣、以甘草緩其下行、而  
祛胃熱也、若病大用小、則邪氣不伏、病小用大、則過傷元氣、  
病在上而渴下、則上熱不清、病在下而渴上、則下熱不除、用  
方者豈可一概混施乎、

喻嘉言曰、傷寒陽明篇、總是以外證之解與不解、氣之轉與  
不轉、脅腹之痛與不痛、脈之弱與不弱、汗出之多與不多、小  
便之利與不利、邪熱之熾與不熾、津液之乾與不乾、而辨腹  
中燥屎、多與不多、溏與少溏、以消息微下之法、故惟手足濺

然汗出大便已硬者主之以大承氣湯其他一則曰宜用導法又則曰不可攻之再則曰少與小承氣湯再則曰明日再與一升再則曰宜大承氣湯全是商量治法聽人臨時斟酌以祈無誤所以不用主之二字此等處關繫安危最大蓋熱邪入胃不以苦寒攻之則胃傷然寒藥本以救胃也不及則藥不勝邪太過則藥反傷正況不勝其邪必盡傷其正徒傷其正未必盡去其邪仲景所以諱諱於二之間者恐傷寒裏未實也

按傷寒裏實方下溫病熱勝邪下其治法亦無大異但傷寒其邪在表自氣分而傳人血分下不厭遲溫病其邪在裏由

血分而發出氣分、下不嫌早其證不必悉具、但見舌黃嘔渴、  
痞燥滿痛、一二證便於升降增損雙解、加味涼膈加味六一  
解毒承氣等方、酌度病情上下輕重緩急下之以徹其邪毒、  
無不獲效、大凡溫病邪熱內熾、貴乎早治、乘人血氣未亂、  
肉未消、津液未耗、病人不至危殆、投劑不至掣肘、下後亦易  
平復、欲爲萬全之策者、不過知邪熱之所在、早拔去病根爲  
要耳、但要量人之壯弱、度邪之輕重、察病之緩急、然後用藥  
不至空投、投藥無太過不及之弊、是以仲景治傷寒自大柴  
胡以下、立三承氣多與少與、自有上下輕重緩急之殊、若溫  
病無拘傷寒下不厭遲之說、如應下之證見下無結糞則以

爲下之早或以爲不應下之證、紛紛聚訟殊不知仲景立三承氣本爲逐邪而設非專爲結糞而設也必俟其糞結而後下之則血液爲邪熱所搏變證迭起是猶養虎遺患也况多有溏糞失下但蒸作極臭如敗醬如藕泥至死不結者倘酌用前方穢惡一下邪熱自此而消脈證自此而退豈徒孳孳糞結而後行哉假如久病精枯血燥之人或老人血液衰竭多主燥結或病後血氣未復亦多燥結在經所云不更衣十日無所苦有何妨害是燥結不至損人熱毒之爲殞命也此辨溫病與傷寒下遲下早異治之要訣也

小柴胡湯方見裏證門

柴胡加芒硝湯註小柴胡湯內方見裏證門

大柴胡湯方見表裏兼證門

麻黃附子細辛湯

傷寒論曰少陰病

脈微細但欲寐

始得之反發

熱太陽表熱脈沉者少陰裏寒此方主之

麻黃

三錢夫節

附子

二錢炮

細辛

三錢水

煎麻黃去沫次入

附子細辛煎服

病發於陰者當無熱今少陰始病何以反發熱此乃太陽少陰之兩感病也蓋太陽膀胱與少陰腎相爲表裏寒邪感於少陰故裏有脈沉由絡達於太陰故表有發熱有太陽之表熱故用麻黃以發汗有少陰之裏寒故用附子細辛以溫中

三陰之表發、與三陽不同、三陰必以溫經之藥爲表、故麻黃附子同用、方是少陰表發之正也、

按傷寒病兩感者亦少、此卽太陽少陰之兩感也、麻黃附子同劑治法、悉是奇特、學者引仲觸類、可應無窮之變矣、且傷寒兩感、麻黃附子細辛湯、主之、此仲景傷寒兩感之治法、溫病兩感雙解散主之、此河間補仲景溫病兩感之法治、此二方者、乃辨溫病與傷寒、發表攻裏、兩感異治之要訣也、世之以溫病爲傷寒、以傷寒方治溫病者、觀此能無悔心乎、

理中湯方見裏證門

通脈四逆湯方見陰證似陽門

白頭翁湯

下利欲飲水

亡津液而內燥

以有熱故也又熱利下重

者

邪熱下利氣滯後重

並此方主之

白頭翁

二錢

秦皮

三錢

黃連

三錢

黃柏

三錢

水煎溫服

此胃與肝腎藥也白頭翁苦寒入胃經血分而涼血止澼秦皮苦寒性濇洗肝益腎而固下焦黃連清心涼血黃柏瀉火補水並能燥濕止利而厚腸濕熱除而利自止矣

黃連阿膠湯

少陰病二三日以上心中煩不得卧

此方主

之

少陰本欲寐今反煩不得寐者以風邪客於裏裏熱甚而不和也

此扶陰散熱之良方也並治邪

火內攻迫血下行者

用扶陰散熱之義以治利亦取

黃連

清膈消悶厚腸各三錢

阿膠

祛風養腎各三錢

黃芩

疏風泄熱各三錢

白芍

利脾制木各二錢

生雞子黃

逐風鎮一枚

水煎成去渣入阿膠烊盡少冷

入雞子黃攪勻服

桔梗杏仁煎 治咳嗽吐膿、痰中帶血、或胸膈隱痛、將成肺癰者、

桔梗一錢

杏仁一錢

甘草一錢

枳殼

炒熟一錢

麥冬

去心五分二錢

百合二錢

阿膠二錢

夏枯草二錢

金銀花二錢

連翹三錢

川貝母三錢

紅藤三錢

火勝兼渴者加天花粉二錢水煎溫服

連翹金貝煎 治陽分癰毒、或在肺膈胸乳藏府之間者、此方最佳、連用數服無有不愈、

連翹

去心七錢

紅藤

七錢

金銀花

三錢

蒲公英

三錢

夏枯草

三錢

土貝母

三錢

火勝

煩渴乳腫者

加天花粉

三錢

好酒二碗煎一碗服後

緩卧片時

若陽毒內熱或在

頭項間者水煎亦可

### 蠟礬丸

生白礬

二兩

白芨

二兩

爲細末用黃蠟

四兩

熔化去淨

渣入藥末爲丸白滾水送下一錢日三服護膜托裏

解毒化膿之功甚大

一方無白芨

一方有琥珀

### 惡寒

傷寒惡寒者不見風亦惡寒

身雖發熱不欲去衣被也

惡寒

屬表證而有虛實之分、以有汗者爲虛、無汗者爲實也、但有惡寒爲表不解、若欲攻其熱、當先解其表、麻黃桂枝之屬是也、不惡寒反惡熱、此爲表解、乃可清裏、白虎承氣之屬是也、然又有少陰之惡寒者、則踰卧足冷、脈沉細、四逆湯溫之不可發汗、心振寒脈微細者、內外俱虛也、真武湯主之、又有止稱背惡寒者、蓋人背爲陽、腹爲陰、陽氣不足、陰寒氣盛、則背爲之惡寒、陽微陰盛之機、已露一班、傷寒論云、少陰病一二日口中和、背惡寒者、當灸之處、以附子湯者是也、又有陽氣內陷入陰中、表陽新虛、有背微惡寒者、傷寒論云、傷寒無大熱、口燥渴心煩、背微惡寒者、白虎加人參湯主之者是也、蓋

微不甚也、若少陰則寒甚也、二者一爲陰寒氣盛、一爲陽氣內陷、蓋陰寒爲病、不能消耗津液、故於少陰病、則曰口中和、及陽氣內陷、則熱灼津液爲乾、故於陽明病、則曰口燥渴也、二者均爲背惡寒、要辨陰陽寒、熱不同、亦於口中潤燥可知、不可不仔細審之也、又有傷寒、惡寒全無發熱、六脈緊細、乃素稟虛怯而不能發熱、此太陽寒傷榮證、但極虛感寒、無止發汗之理、宜理陰煎、大溫中飲以滋其陰、而雲騰致雨之妙、則景岳有心得矣、若溫病惡寒、口燥咽乾舌黃唇焦、乃陽盛格陰、內熱則惡寒、非惡寒也、蓋惡寒表證也、得就緩處便解外寒、裏證也、雖近火烈、不除、輕則神解散、重則升降散增損、

雙解散 堪可與正傷寒惡寒同日語哉

四逆湯 方見陰證門

真武湯 方見陰證門

附子湯 方見陰證門

白虎加人參湯 方見裏證門

理陰煎 方見陰證門

大溫中飲 方見陰證門

神解散 方見發熱門

升降散 方見陰證似陽門

增損雙解散 方見陽毒陰毒門

惡風

惡風者、見風則惡、密室中、則無所惡也、雖屬表證、而發散又自不同、若無汗惡風、則爲傷寒、當發其汗、麻黃湯、有汗惡風、則爲中風、當解其肌、桂枝湯、裏證雖具、而惡風未罷者、皆當先解其表也、又有汗多亡陽、與風濕皆有惡風之證、蓋汗出漏不止、則亡陽外不固、是以惡風也、以桂枝加附子湯、溫其經而固其衛、風濕相搏、骨節煩痛、濕盛自汗、而皮腠不密、是以惡風也、以甘草附子湯、散其濕、而實其衛、若溫病惡風等於惡寒、陽伏於內、陰格於外、不過初病一二日後、則惡熱不惡風寒矣、要之邪熱內鬱、輕則發熱於外、而手足溫、重則內

外格拒而逼身涼死生關頭惟在識與不識耳神解芳香  
降涼膈等方斟酌得宜萬無一失

麻黃湯 方見表證門

桂枝湯 方見表證門

桂枝加附子湯 太陽病中風誤汗遂漏不止惡風

表虛則玄府疎

小便難汗多則亡津液

四肢微怠四肢爲諸陽之本陽虛則血滯筋骨

邪客之不和風此方主之

桂枝三錢 白芍三錢 附子生一錢 炙草一錢 生薑三分 三錢

大棗二枚 水煎溫服

誤汗亡陽則血滯兼有風入而筋急也故用桂枝湯疏風解

肌以和榮衛、加附子以助元陽而固表也、此中風誤汗而見此證、故以此湯救之、若濕家重發汗、必恍惚心亂、汗爲心液心無養血

故神不寧

小便以陰痛

水道乾涸故陰痛也

炙甘草湯加白茯苓

四錢

甘草附子湯

風濕相搏、骨節煩痛、掣痛不能屈伸、汗出短

氣、小便不利、

惡風不欲去衣身、微腫者此方主之○風

則上先受之濕、則下先受之迨、兩相搏激注、經絡流關

節、無處不到、則無處不痛也、風勝則衛氣不固、故汗出、

惡風濕勝、則水道不行、故便濇身腫、

甘草

二錢

附子

二錢

白朮

二錢

桂枝

四錢

水煎溫服

成氏曰、甘草桂枝之辛、甘散風邪而和衛、附子白朮之辛溫、

解濕氣而溫經

神解散

方見裏證門

芳香飲

溫病多頭痛、身痛、心痛、脇痛、嘔吐黃痰、口流濁水、

涎如紅汁、腹如圓箕、手足搐搦、身發斑疹、頭腫舌爛、咽喉痺塞等證、此雖怪怪奇奇、不可名狀、皆因肺胃火毒不宣鬱而成之耳、治法急宜大清大瀉之、但有氣血損傷之人、遂用大寒大苦之劑、恐火轉閉塞而不達、是害之也、此方主之、其名芳香者、以古人元旦汲清泉以飲芳香之藥、重滌穢也、

元參

一兩

白茯苓

五錢

石膏

五錢

蟬退

全十個

白殭蠶

須炒

三錢 荆芥 三錢 天花粉 三錢 神麪炒 苦參 三錢

黃芩

錢 陳皮 一錢 甘草 一錢

水煎去渣入蜜酒冷服

升降散

方見陰證似陽門

涼膈散

方見陽證似陰門