

永樂大典

卷一萬三千八百
七十七

永樂大典卷之一萬三十八百七十七 三未

痺

必忌効許慎說文脾溼病也从彑畀聲必至切司馬光類篇則營衛氣不至而頑痺也彼二反顧野王玉篇卑利切墮法言廣韻毗憲功脚冷司馬

光類篇或作疵疵此至切戴侗六書故病肌肉麻木也韓道昭五音類聚必寐切楊桓六書統幫母脾原聲辨脈或从比聲死錄韻會定正字切

幫計幫篆

行書

痺

徐鉉

并六

篆

韻海

書

統

書之

王羲

行

書

之

見杜从古集

行

書

之

徐鉉

并六

篆

韻海

書

統

諸痺證治

素問痺論篇黃帝問曰痺之安生

王水註

安猶何也

言何以生岐伯對曰風寒溼三氣雜至合而爲痺也

難合而爲痺發起亦殊矣其風氣勝者爲行痺寒氣勝者爲痛痺濕氣勝

者爲著痺也風則陽受之故爲痺寒則陰受之故爲痺病濕則皮肉筋

脉之故爲痺著而不去也故凡痺從風寒濕之所生也

帝曰其有五者

何也言風寒溫氣各異則三痺生有五而何氣之勝也岐伯曰以冬遇此

水樂大典卷一萬三十八百七十七

一

者爲骨痺以春遇此者爲筋痺以夏遇此者爲脉痺以至陰遇此者爲肌
痺以秋遇此者爲皮痺冬主骨春主筋夏主脉秋主皮至陰主肌肉故各
爲其勝也至陰為戊己月及土寄三月也帝曰內舍五臟六腑何氣使然
言皮肉筋骨脉痺以五時之外偶然內舍臟腑何以致之岐伯曰五臟皆
有合病久而不去者內舍於其合也肝合筋心合脉脾合肉肺合皮腎合
骨大病不去則入於是故骨痺不已侵感於邪內舍於筋筋痺不已侵感
於邪內舍於肝肝痺不已侵感於邪內舍於心肌痺不已侵感於邪內舍
於脾脾痺不已侵感於邪內舍於肺所謂痺者各以其時重感於風寒溫
之氣也時謂氣主之月也肝主春心主夏肺主秋腎主冬脾主四季之月
感謂感應也凡痺之客五臟者肺痺者煩滿喘而嘔以歲氣應息人莫脉
運猶胃口故使煩滿喘而嘔心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌
乾善噫厥氣上則恐心合脉火邪則脉不通利也邪氣內擾故煩之手心
主心包之脉起於胃中出屬心包下鬲手少陰心脉起於心中出屬心系
下鬲絡小腸莫支利者從心系上快咽喉其直者侵從心系却上肺故煩
則心下鼓滿暴上氣而喘嗌乾也心主為嘔以下鼓滿故噫之以出氣也
若是逆氣上乘於心則恐是也神體凌弱故肺肝痺者夜卧則驚多飲數

永樂大典

卷一三八七七

小便上為引如懷肝主驚駭氣相應故中夜則驚也肝之脉情陰收入包中環陰苦抵少腹伏胃屬肝絡將上貢屬布輔助循腰龍之後上入頸賴故多飲水數小便上引少腹痛如懷姪之狀腎痹者善脈尻以代踵脊以代頭腎者胃之間關不利則胃氣不得故善脈也尻以代踵謂足掌急也脊以代頸謂身踵屈也踵足跟也腎之脉起於小指之下斜越足心出於然骨之下循內踝之後別入踝中以上循內出腳內膚上枝內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者從腎上貫肝而入肺中氣不足而受邪故不伸展塞土王四季外主四肢故四肢懈惰又以其脉起於足循膀胱上膝股已然脾脉入腹屬脾絡胃上鬲伏咽故發咳嘔津解氣養肺胃復連咽故上為大塞也腸痹者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄人膀之脉入趺蓋絡肺下鬲屬大腸小腸之脉又入趺蓋必堵咽下鬲抵胃屬小腸今小腸有邪則脉不下鬲脉不小鬲則腸不行化而胃氣高熱故多飲水而不得不出也腸胃中陽氣與邪氣奔湍交爭得時通利以陽氣不化故時或得通則為飧泄胞痹者少腹膀胱接之內痛若沃以湯濕於小便上鬲清涕時膀胱為津液之府胞內含之少腹處潤元之中內藏胞器然膀胱之脉起

於自內背上升交腋上入絡脅還出列下項循肩鈞內伏脊絡腰下入循督絡督屬膀胱其支別者從腰中下貫臂入腦中令胞浸風寒濕氣則膀胱太陽之脉不得下流於足故夕後膀胱接之內痛若沃以湯濕於小便已小便既注太陽之脉不得下行故上燻其腦而鬲清涕出於鼻竇矣沃猶灌也林億新校正云按金元起本內病二字作兩汗陰氣者靜則神藏躁則消亡陰謂五神藏也所以說神藏與消亡者言人安靜不涉邪氣則神氣寧以內藏人殊動觸邪氣則神被害而離散藏無所守故曰消亡見籀皆謂適用越性則更其邪此言六腑受邪之為病也濁氣喘息癥聚在肺溼氣憂思癥聚在心濁氣遺溺癥聚在腎濁氣乏竭癥聚在肝濁氣犯絕癥聚在脾濁氣謂氣之妄行者各隨臟之所主而入為病也林億新校止云詳從上凡病之客五臟者至此金元起本在陰陽別論中此王氏之所移也諸病不已亦益內也從外不去則益深至於身內其風氣勝者其人易已也帝曰癥其時有死者或疾久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疾久其留皮膚間者易已入臟者死以神去也筋骨久以其深也皮膚易已以浮淺也由斯深淺故有是不同帝

曰其客於六府者何也岐伯曰此亦其食飲居處為其病本也四方雖土地溫涼高下不同物性則平陰居亦異但動過其分則六府效傷陰陽應象大論曰水數之寒熱感則害六府林億新校正云按楊東論曰物性則柔陰居太異六府亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞而入各舍其府也六府俞水謂皆俞也膀俞在十椎之傍胃俞在十二椎之傍三焦俞在十三椎之傍大腸俞在十六椎之傍小腸俞在十八椎之傍膀胱俞在十九椎之傍隨形分長短而取之如是各去脊同身寸之一寸五分並足太陽脉氣之所發也林億新校正云詳六府俞並在本椎下兩傍此注言在椎之傍者大差也帝曰以鍼治之柰何岐伯曰五臟有俞六府有合循脉之分各有所發各隨其過林億新校正云接甲乙經隨作治則瘳瘳也肝之俞曰太衝心之俞曰太淵肺之俞曰太列腎之俞曰太谿督經脉之所注也太衝在足大指間本節後二寸陷者中林億新校正云接刺腰痛注云太衝在足大指本節後內間二寸陷者中動脈應手刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯太陵在手掌後骨頭筋間陷者中刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側棱骨下陷者中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯。

本草大典卷一萬三千一百七

三

大列在手掌後陷者中刺可入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三壯大谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中刺可入同身寸之三分留之呼若灸者可灸三壯胃合入于三里膽合入于陽陵泉大腸合入于曲池小腸合入于小海三焦合入于委陽膀胱合入于委中三里在膝下三寸腑外廉兩筋間刺可入同身寸之一寸留十呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下一寸腑外廉外去肘端五分陷者中屈肘乃得之刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯曲池在肘外輔屈肘曲骨之中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯委陽在足膕中外廉兩筋間刺可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯屈伸而取之委中在膕中大約文中動脈刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯林億新校正云接刺熱注委中在足膝後屈處餘並用此故經言循脉之分各有所發各隨其過則病瘳也通謂脉所經過處林億新校正云詳王氏以委陽為三焦合接甲乙經云委陽三焦下轉俞也足太陽之刺絡三焦之合自在手少陽經天井穴為少陽肝之所入為合詳此六府之合俱引本經所入之尤獨三焦不引本經所入之丸者王氏之誤也王氏但見甲乙經云三焦合于委陽便說自

具彼又以大腸合于巨虛上廉小腸合于下廉此以少陽少陽易之故知當以天井穴為合也。帝曰榮衛之氣亦令人痺乎。岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟瀉陳於六府乃能入於脉也。正理論曰教入於腎脈道乃行水入於經其血乃成。人體根經曰榮氣之道內經為實。林德新校正云按別本實作實教入於胃氣傳與肺精專者上行經隧由此故水教精氣合榮氣運行而入於肺也。故循肺上下貫五臟絡六府也。榮行脈內故無所不至。衛者水穀之悍氣也。其氣慄疾滑利不能入於脉也。悍更謂浮氣之氣也以其浮盛之氣故慄疾滑利不能入於脉中也。故循皮膚之中分肉之間熏於肓膜散於肓膜皮膚之中分肉之間謂脉外也。肓膜謂五臟之間鬲中膜也。以其浮盛故能布散於肓膜之中空虛之處。蓋其肓膜全氣宣通也。育音荒逆其氣則病。從其氣則愈。不與風寒濕氣合故不為痺。帝曰善。痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也。岐伯曰痛者寒氣多也。有寒故痛也。从寒濕氣客於肉分之間迫切而為溼。得寒則聚聚則排分肉而聚則痛故有寒則病也。其不痛不仁者病久入深榮衛之行滯經絡時踈故不通。林德新校正校甲乙經不適作不痛詳甲乙經此條論不痛與不仁兩事後言不痛是數明不痛之為重也。皮膚不營故

永樂大典卷一萬三千首七

四

為不仁。不仁者皮膚不知有無也。其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒已病本生於風寒濕氣故陰氣益之也。其熱者陽氣多陰少病氣勝陽。遭陰故為痺。熱遭溫也。言遇於陰氣陰氣不勝故為熱。林德新校正云按甲乙經。遭作乘。其多汗而濡者此其遭濕甚也。陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也。丁未相應則相感也。帝曰夫痺之為病不痛何也。岐伯曰。仁在皮則寒故具此五者則不痛也。凡痺之類遭寒則蟲遭熱則熾。帝曰善。蟲謂皮中如蟲行蟻謂熾。故不相就。林德新校正云按甲乙經。蟲作急。總論宣明五氣篇邪入於陰則痺。五臟生成篇。外出而風吹之。血凝於土。弱霧露之所聚也。其民嗜酸而食膚故其民皆痏理而赤色。其病痺黃帝曰。刺素篇病在陰者命曰痺。刺節真邪篇虛邪留而不去則痺。五變篇至真要大論篇少陰在泉主勝則高。中眾痺皆作發於胠腋盡脛。天膺者為痺。異法方宜論南方者天地所長養陽之所盛處也。其他下水

則柔篇病在陰者命曰痺。刺節真邪篇虛邪留而不去則痺。五變篇黃帝曰。何以候人之善病痺者少。俞答曰粗理而肉不堅者善病痺。黃帝曰。痺之高下有處乎。少俞答曰欲知其高下者各視其部。九針篇岐伯曰。風者人之股肱八節也。八正之虛風八風傷人內舍於骨解腰脊節膝

理之間為深痺故為之治誠必長其身辨其不可以取深邪遠痺也。華陀中藏經痺者風寒暑濕之氣中於人臟腑之為也。入腑則病淺易治、入臟則病深難治而有風痺寒痺濕痺熱痺氣痺又有筋骨血肉氣之五痺也。大凡風寒暑濕之邪入於心則名血痺、入於脾則名肉痺、入於肝則名筋痺、入於肺則名氣痺、入於腎則名骨痺。感病則一其治乃異。痺者閉也。五臟六腑感於邪氣亂於真氣閉而不仁故曰閉也。入痺病或痛或癢或淋或急或緩而不能收持或掣而不能舒張或行力艱難或言語謇澁或半身不遂或四肢舉錯或口眼偏邪或手足欹側或行步而不能言語或不能行步而左偏枯或右壅滯或上不通於下或下不通於上或大腑閉塞或左石子疼痛或即瘓而即死或感體而未亡或喘滿不寐或昏冒而不能醒種種諸證皆出於痺也。痺者風寒暑濕之氣中於人則使之然其於脉候形證治療之法各亦不同為孫思邈千金要方諸痺由風寒濕三氣併客於分肉之間迫切而為沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則絕痺發發則如是此內不在藏而外未發於皮膚居分肉之間真氣不能周故為痺也。其風最多者不仁則腫為行痺走無常處其寒多者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗濶

本草大典卷一百三十五七

五

但隨血脉上下不能左石去者則為周痺也。痺在肌中更發更止左以應左右以應右者為偏痺也。夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也。諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也。久痺入深令榮衛濕經絡時踈則不知痛風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候形如風狀搏脉別之脉微浮狂以潤利湯劑時間疏解膜中諸痺疾當如形體諸病病狀常以風寒濕其證身體不仁素知傷寒新書治痺投大熱藥因大便結口乾舌燥者方為治不可一理扶升降氣藥而已聖濟總錄論曰飲天和食地德皆陰陽也。然陽為氣陰為血氣為衛血為榮氣衛血榮通貫一身周而復會。血環無端宣營閑而不流於夫惟動靜居處失其常邪氣未聞曾不知覺此之則所謂痺者可得而察矣且痺害於卑其為疾也初若無足治至其蔓而難圖則偏廢弗舉四體不隨皆自詣伊戚者也可不慎哉論曰痺雖異狀然皆本於三氣寒氣多者謂之冷痺其證令人脚膝瘦疼行後艱難四肢痺麻身體俱痛甚則有一身不隨者王曉濟世全生指迷方若始覺

永樂大典

卷一三八七七

肌肉不仁久而變生他證病名曰痺此由風寒濕三氣客於經絡全於血脉搏於榮衛故令皮膚痺而不仁有熱則肌肉骨節煩疼有寒則冷痛以春得之在筋夏得之在脉秋得之在皮冬得之在骨四季得之在肌肉久而不去各傳其臟筋痺不已舍之於肝夜卧則驚飲食多小便數上為引如惊脉痺不已舍之於心其脉不通煩滿心下歎。暴上氣肌痺不已舍之於脾其狀四肢懈墜發渴嘔汁上為大塞皮痺不已舍之於肺其狀煩滿而喘嘔骨痺不已舍之於腎其狀善脹尻以代踵脊以代頭右此諸證雖多必先肌肉不仁其始治當以增損小續命湯證狀小不同者當依本法病久入深則以曾公酒方見後陳無疇三方大風濕寒三氣雜至合而為痺雖曰合痺其用自殊風勝則為行痺寒勝則為痛痺溫勝則為著痺三氣襲人經絡入於筋脉皮肉肌骨久而不已則入五臟凡使人煩滿喘而吐者是痺客於肺煩心上氣嗌乾恐噫厥脹滿者是痺客於心多飲數小使小腹痛如懷妊夜卧則驚者是痺客於肝善脹尻以代踵脊以代頭者是痺客於腎四肢懈墜發咳嘔沫上為大塞者是痺客於脾又有腸痺者數飲而小便不利中氣喘急時發飧泄入胞痺者小便按

不便張子和儒門事親夫痺之為狀麻木不仁以風濕寒三氣合而成之故內經曰風氣勝者爲行痺風則陽受之故其痺行旦刺而夜靜世俗莫知反呼爲走注疼痛虎咬之疾寒氣勝者爲痛痺寒則陰受之故其痺痛一旦靜而夜劇世俗不知反呼爲鬼忤濕氣勝者爲著痺濕勝則傷筋脉皮肉故其痺著而不去肌肉削而著骨世俗不知反呼爲偏枯此病之作多在四時陰雨之時及三月九月太陽寒水用事之月故草枯水寒之為甚或瀕水之地勞力之人辛苦失度觸冒風雨寢處溼痺從外入况五土地寒暑殊氣則柔異烹食飲起居莫不相戾故所受之邪各有淺深或痛或不痛或仁或不仁或筋屈而不能伸或引而不能縮寒則蟲行熱則縮緩不相亂也皮痺不已而成肉痺肉痺不已而成脉痺脉痺不已而成筋痺筋痺不已而成骨痺久而不已內含其合若腑臟俱病雖有智者不能善圖也凡病痺之人其脉沉澁今人論方者見諸痺證遂作脚氣治之豈知內經中本無脚氣之說或曰諸方亦有脚氣統論又有脚氣方藥若止取素問則諸方皆非即曰痺病以溫熱爲源風寒爲薰三氣合而爲痺來何治此者不問經絡不分臟腑不辨表裏便作寒濕脚氣烏之附之孔之淡之種種燥熱攻之中脘炎之肺下燒之三里火之蒸之熨之湯之炕

水樂大典卷一萬三千言七十七

七

之以至便捷溫湯前後俱閩虛燥轉甚肌膚日削食飲不入邪氣外侵雖遇偏華亦難措手若此者何哉腎膈間有寒疾不去故也痺病本不死死者醫之誤也雖亦用蒸之法必先涌去其寒疾然後諸法皆効內經曰五臟有俞穴六府有合穴循脈之本分各有所發之源以砭石補之則痺病瘳此在內經中明白具載如之何不讀也陳下酒鹽魏德新因赴冬遷犯寒而行真氣元氣加之坐卧冷濕食飲失節以冬遇此遂作骨痺骨屬督也腰之高骨壞而不用兩膀似折而黑如炭前後腰痛瘻厥嗜卧偏問諸醫皆作腎虛治之余先以玲瓏窓熨蒸數日次以苦麻上消訖寒疾一二升下虛上實明可見矣次以淡齊使白木除脾濕令茯苓養腎水責官桂伐風木寒兼偏勝則加薑附否則不加入刺腎俞大鉛二穴二日一刺後一月平復如故僅嘗用治傷寒汗下吐三法移而治風痺瘻厥之法愈者多矣王好古醫疊元戎四時之正氣八節之風乘太乙也風氣安靜乃可利經脉調血氣故曆志忌之八節前後各五日不可灸刺風朝太乙其先天元玉冊八正者所以候八風之虛邪以時至者也四時者所以分春夏秋冬之氣所在以時調之八正之虛邪而避之勿犯也以身之虛逢天地之虛兩虛相感其氣至骨入則傷五臟故曰天忌君子不可不

知也。海歲云：宣八節風而已。凡七十二候中諸節之氣，寒暑溫涼應乎其變異，常者皆可避忌之。酒濕之為病，亦能作痺證。口眼喎斜，解更半身不遂，渾似中風舌語不正，當泄濕毒不可作風病治之而苦汗也。術義所論甚當，易簡所論與相同。孫少賢醫方集，成凡痺疾自有五種：筋痺、脉痺、骨痺、皮痺、肌痺是也。多由體虛之人，腠理空疏為風寒濕三氣所侵，不能隨時驅散，流注經絡，火而為痺，其為病也。寒多則掣痛，風多則引注，濕多則重著。其病在筋者，則屈而不能伸；應乎肝，其證夜卧多驚，飲食少，小便數。其病在脉者，則血凝而不流，應乎心，其證令人痿黃，心下鼓，氣卒然逆，喘不通，嗌乾善噫。其病在骨者，則重而不能舉，應乎腎，其證手足不遂，而多痛，心脹脹滿。其病在皮者，多寒遇寒則急，遇熱則縱，應乎肺，其證皮膚無所知覺，氣奔喘滿。其病在肌肉者，多不仁，應乎脾，其證四肢懈怠發咳，嘔吐，診其脉大而濡，或來急而緊，俱為痺之候也。治之當辨其所感，風寒濕三氣注于何部分，其未裏湏從偏勝者，主以藥餌，又有停蓄水飲，亦令人痺，又當隨證治之。至如白虎歷節遍身痛者，無非風寒濕三氣乘之。巢氏云：飲酒多風汗出入水，遂成斯疾。久而不愈，令人骨節蹉跌，恐為癲癇之病。如有此證，治之宜早，為貴。未當時大方論曰：原痺之為病，乃風寒濕三氣注于何部分，其未裏湏從偏勝者，主以藥餌，又有停蓄水飲，亦令人痺，又當隨證治之。至如白虎歷節遍身痛者，無非風寒濕三氣乘之。巢氏云：飲酒多風汗出入水，遂成斯疾。久而不愈，令人骨節蹉跌，恐為癲癇之病。如有此證，治之宜早，為貴。未當時大方論曰：原痺之為病，乃風寒濕三氣乘之。巢氏云：飲酒多風汗出入水，遂成斯疾。久而不愈，令人骨節蹉跌，恐為癲癇之病。如有此證，治之宜早，為貴。

永樂大典卷一萬三千首七

八

內診之時能識其經解大識其病所在。南陽郡縣山中有甘谷水。谷水所以味甘。谷上左右皆生甘菊。菊花墮其中。歷世彌久。故水味為變。其臨此谷中居民。皆不穿井。悉食甘谷水。食者無不老壽。高者百四五十歲。下者不失八九十無大年人。得此菊力也。故司空王暢太尉劉寔。太傅袁隗。皆為南陽太守。每到官常使郡縣月送甘谷水四十斛以為飲食。此諸公多患風痺及眩暎。皆得痊愈。盛弘之荊州記云。郡縣菊水。太尉胡廣。患風羸。常飲此水。後疾遂瘳。真誥云。李整採服石腦。療風痺虛損。而得長生。魏權治魯州刺史庫狄。竢風痺不能挽弓。權使鍛矢。嚮堋立鍼。其盾鵠一進曰。可以射矣。果如其言。類用方藥。靈樞天則柔篇。黃帝曰。寒痺之為病。柰何。伯高答曰。刺布衣者以火燬之。大人者以藥熨之。黃帝曰。藥熨柰何。伯高答曰。用淳酒二十升。蜀椒一斤。乾薑一斤。桂心一斤。凡四種皆㕮咀。漬酒中。用綿絮一斤。細白布四大升。內酒中。置酒馬矢。煜中。蓋封塗。勿使泄。五日五夜。出布。綿絮。曝乾之。乾後。清以盡其汁。每漬必晦。其日乃出乾之。并用粗與綿絮。櫟布為棧。中長六七尺。為六之中。則用之。生桑炭炎中。以熨寒痺所刺之處。今熱入。至于病所。寒後。灸中。以熨之。牛為主。

水寒大典卷三十三首七

九

三十遍而止。汗出以巾拭身。亦三十遍而止。起步內中。無見風。每刺必熨。如此病已矣。此所謂內熱也。張子和偶門事親。凡大人小兒。風濕寒三氣合而為痺。及手足麻痺不仁。內經曰。榮虛衛實。皮膚不仁。痺而不知。痺痛可用蔚金散。吐之。次服導水丸。經寒之藥。泄之。泄訖。次以辛溫之藥。發散。汗出後。常服當歸芍藥湯。為附行經和血之藥。則愈矣。凡男子婦人。小兒手足麻痺。肌肉不仁者。風寒濕三氣相雜至。合為痺。先用黃芩芍藥湯。吐之。吐訖。次用通解丸。通經而瀉之。瀉訖。更用辛甘之藥。汗之。汗瀉之後。可用當歸清涼飲子。兼烏荆丸。除濕丹。和血行經之藥。則愈矣。張子和活法心要。痺謂坐濕。當風客經。客經客淺。則皮膚深。則骨髓其本。謂濕去。濕甘速。辛。實告。痺也。肝脉微緩。為水瘕。痺。左手關前寸口。陽實者。小腸實也。若

脉

素問。脉要精微論。胃脉搏堅而長。其色赤。當病折髀。其變而散者。當病食痺。按之至骨。脈氣少者。腰脊痛而身有痺也。平人氣象論。脉滑曰痺。靈樞論。疾診。尺篇。血脉多黑。為久痺。王叔和。脉經。尺脉虛小者。痿痺脚疼。尺脉細而急者。筋掣痺。不能行。寸口中虛弱者。傷氣氣不足。大如桃李實。告。痺也。肝脉微緩。為水瘕。痺。左手關前寸口。陽實者。小腸實也。若

永樂大典

卷一三八七七

心下急癖 右手尺中神門以後脉陰實者是少陰經也。病苦癖。脾脉沉之而濡浮之而虛皆脉脉煩滿胃中有熱不嗜食食而不化四肢苦癖時不仁。巢元方病源論其脉尺中虛小者是腫寒痿癖也。巢永年高鶴脉體診脉大而滑者爲痹脉未急者爲癖。

方

楊子建萬全護命方治冷癖風其病狀腰膝間疼痛冷癖行履艱阻精神不足忽時疼痛兩足厥冷此病蓋因久坐濕地忽曾經冷處睡卧得但臨病發時覺多因少力精神不守渾身筋骨沉重無力然後發作宜服此方

石斛去根

五味子

茯苓

當歸

續斷

官桂去皮

附子炮去皮

木瓜

草薢各半兩

獨活

細辛各一分

川椒去黑子

木香各三錢

牛膝一兩

防風

羌活

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯酒任下四十九粒青苟方加減三五七散治八風五癖癱瘓掣曳口眼喎斜肩角牽引項背拘強牙關緊急心中憤悶神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰

勝不仁皮膚瞞動或如蟲行火治陽虛頭痛風寒入腦目旋轉有似舟之上耳內蟬鳴或如風雨之聲應風寒濕癖脚氣緩弱等疾並能治之即係大三五七散

永樂大典卷一三八七七

十

山茱萸

乾薑炮

茯苓去皮各三斤

附子炮去皮鹽三十五箇

細辛一斤八兩

防風去蘆四斤

右爲細末每服或錢溫酒調下食前

聖濟總錄天麻散治諸癖身體痺麻或多痿癖筋脉拘急言語謇澁手足不隨方

天麻

白附子炮

羌活去蘆頭

防風去火

芎藭

獨活去蘆頭

當歸切焙

桂去皮各半兩

白僵蠶炒

牛膝去苗酒浸切焙

草薢各三分

乾蠶去土炒

麻黃去根節各一兩

右一十三味搗羅為散每服二錢匕燮竹瀝半盞酒半盞調下不計時

巴戟天湯治冷癖腳膝疼痛行屐艱難方

巴戟天去心三兩

五加皮二兩

草薢

牛膝酒浸切焙石斛去根

甘草炙各一兩半

防風去火

白茯苓去黑皮各一兩三分 附子地蠶去皮脾

二兩

右九味㕮咀如麻豆每服五錢匕生薑三片水一盞半煎至一盞去津空心溫服

牛膝散治冷痺脚膝疼痛無力

牛膝

酒浸切焙一兩

桂去皮半兩山茱萸一兩

右三味搗羅為散每服空心溫酒調二錢匕日再服

草薢丸治風冷痺遊走無定處亦名血痺方

草薢

山芋

牛膝去苗酒浸焙

澤鴻各一兩

熟乾地黃焙二兩半

地膚子

乾漆炒煙出

狗脊去毛各三分

白朮半兩

茵芋一分

右一十味搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十丸日再

許叔微普濟本事方烏頭丸治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮膚龐澀及四肢麻痺宜服

永樂大典卷萬三千首七

十一

草烏頭一斤入竹蘿子內以水浸用瓦子於蘿內就水中龍洗如打菱角法直候瀝洗去大皮及尖腔起令乾用麻油四兩鹽四兩入銚枚劈破心內如米一點白恰好也如白多再炒趁熱杵羅為末用醋糊丸如梧子大乾之每服三十丸空心晚食前溫酒下 貢州資福大雜白老元祐間有此疾服數年肌體黑黯煩除腳力強健視聽不衰有一宗人遍身紫癥風身如墨眼痛年體恍澤教予服之亦得一年許諸風疹瘡瘍皆除然性差熱雖制去毒要之五七日作烏頭粥啜之為佳粥法用預章集中者

王曉濟世全生指迷方魯公酒

茵芋

川烏頭炮去皮臍

鄒瑞花各一兩一分

天雄炮去皮臍防已

石斛去根各一兩

細辛去苗

柏子仁

甘草去苗

通草

桂去皮取心

春羌去苗土

黃芩

附子炮去皮臍

附子炮去皮臍

杜仲去皮

澤鴻

王不留行

石南

防風

遠志去心

生乾地黃各半兩

魏八家藏方五婢湯治風痺寒痺氣滯濕痺血痺等五疾并皮膚頑麻肌肉酸痛手足不隨一臂無力腰脊強硬筋脉拘急發熱惡風不時汗出或飲酒當風肌肉頑麻臂痛舉物艱難紹興宋藏一丞相前後以錢數千繩并指使恩澤與國醫樊秀端死得於其子丞相之子元忠少卿以傳余云前後治人無一不立驗元忠家一園人因夏月大雨中治園中濕四肢發熱如火腰膝痛楚如刀剝直聲號咷祈死不能投之三服即安元忠總領淮東軍馬錢糧屯軍鎮江凡軍士及婦人病風寒濕血氣痺五者服之無不効驗前後合此藥幾千餘斤濟人真愈疾萬全神方也

片子薑黃四兩白朮四兩春月歲半炒

川羌活二兩

甘草一兩炙

右㕮咀每服三錢水一大盞生薑十片煎至七分去滓稍熱食前服陳肇家藏方治腰脚冷痺風麻肢節疼痛不思飲食服芍桂散

牛膝二兩去苗酒浸

白茯苓一兩去皮

桂心去蕊皮不見火

川芎

防風去蘿

永樂大典卷一百零五

十二

人參去蘿附子炮去皮鱗當歸去蘿剉微炒

川烏頭炮去皮鱗各一兩

羌活各三分

甘草一分炙微赤

白朮各半兩炒

計時候溫服

黎氏壽簡易方芎附散治五積脾腫并臂間發作不定此脾胃虛衛氣不溫分肉為風寒濕所著

川芎

附子

黃耆

白朮

防風

當歸

桂心

柴胡

甘草

熟地黃各等分

右烏頭末每服四錢水一盞半薑三片棗一箇同煎至八分去滓食

前日三服常服不生瘡熱兼消積冷

嚴用和濟生方茯苓湯治支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯炮心次赤茯苓去皮

橘紅各一兩

枳實去核剉炒

桔梗去蘿

甘草去心各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去滓溫服不拘時候

鈎痺湯治身體頑痺項背拘急或痛或重舉動艱難及手足冷痺腰腿沉
重筋脉無力

當歸去蘆酒浸赤芍藥黃耆去蘆片子黃黃

羌活各一兩半甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至八分去滓溫
服不拘時候

御藥院方熏蒸方治腎氣衰少脾腎肝三經受於寒濕停於腿膝使經絡
凝而不行變成脚痺故發疼痛此藥能和榮衛通經絡

小參麩約四五斤

小椒一把

酒一盞

葱白三大莖寸切

醋不計多少攪拌上件麩等溫潤

馬度

鹽一把

右件以銀器炒令極熱攤臘下將所患腿脚就臘薰蒸薄衣被蓋
得汗出勻遍約半箇時辰撤去炒麩止就鋪臘中臘待一兩時辰以
來覺汗稍解再用收陽粉撲拂汗孔畢然後出鋪臘中勿見風
淋渫烏頭散治一切頑痺不仁及筋骨疼痛掌急

澤烏頭生用不去皮

木鱉子去殼

白芥子

永樂典卷一百三十六

十三

鱉甲去橋欄火一兩

杏仁生用不去皮一拍薑

右為鹿豕都作一次用水三大椀煎數沸去滓乘熱淋渫患處冷即
再煖熱休前淋渫三五遍其藥無力不用

柳森可用方大風引湯治癥滿上氣遍身眼膝痛去風濕痛

大豆三升

附子三兩

枳實

澤瀉

陳皮三味各四兩

甘草

茯苓

防風三味各二兩

右為鹿豕酒二斗水二斗煮大豆取一斗內藥煮取三升分三服三

劑膾消去豆澤瀉更服三劑

趙素風科集驗細辛湯治諸痺

細辛去苗乾薑各三兩炮桂心

赤茯苓各五兩去皮

甘草二兩

右為細末每服三錢溫酒調下日進二服不拘時候

蒼耳散治諸風百痺

蒼耳葉五月初五日午時摘不拘多少洗淨暴乾

永樂大典

卷一三八七七

右爲末以酒調服方寸匕日三夜一服若吐逆練蜜爲丸服之。風輕則易治若身體有風處皆如粟顆或如麻豆大此爲風毒氣出也以針刺潰之出黃汁乃止量病輕重服之此藥能辟百惡舉家可服。致蟲痔進食七月七日九月九日亦可修合。

善應膏治諸寒痺骨節酸痛並宜服之。

兩頭尖

浮萍草

良薑各二兩

芸薹子

川烏各一兩炮去皮臍

當歸半兩去蘆乳香另研

沒藥三分許另研

右爲細末醋糊調成膏貼於患處

芸薹子散

右爲細末陳皮去白一兩白芥子各二兩陳皮去白一兩

有成功

危亦林得効方烏頭湯治寒冷濕痺流於經絡攀縮不得轉側

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍藥各七分

永樂大典卷一三八七七

十四

川獨活一兩三錢半

右剉散每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去滓空心食前服三瓣湯治血氣凝滯手足拘攣瘡風痺氣痺等疾

川續斷

杜仲去皮切姜汁炒

防風

桂心

華陰細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草各一兩

秦艽

生地黃

川芎

川獨活各半兩黃耆

右剉散每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去渣熱服不拘時但腹稍空服

秉當時大方魯公酒治諸痺諸風風眩心亂耳目聾暗淡出鼻不聞香臭口爛生瘡風腫瘰疬喉下生瘡頸熱厥逆上氣胸脇肩膊痛手痺不自帶木腰脊不能俛仰脚痺不仁難以久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋掣不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行皮膚中無有常處火灼不治入人五臟中或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹或覺肌膚不仁尻以代踵脊以代頭名曰痺病及一應

久寒積聚風濕五勞七傷虛損百疾並皆治之

山芋

腳踏花

烏頭各五分

茵芋

天雄土

防己

石斛各四分

細辛

柏子仁

牛膝

山茱萸

甘草炒

通草

秦艽
杜仲炒去絲

黃耆
天門冬去心

澤鴻

石楠葉

防風去叉

遠志去心

熟地黃

乾薑炮

桂心三兩

右件爲粗末酒五十大盞漬之十日每服一盞加至四盞可爲末服亦可爲丸酒下

沉香天麻煎治風氣不順骨痛或生赤點癰瘍熱腫久久不治則如癱弱骨緩弱

五靈脂

赤小豆

附子

白朮各四兩

天麻二兩

玄參

乾竭去毒

羌活

防風各一兩

地榆一兩

沉香一兩酒一升煎成膏

石以沉香膏和凡如梧桐子大荆芥酒服二十九春末夏初愛生赤

水華大典卷萬三千一百十七

十五

心痺

論

素問四時刺逆從論陽明有餘病脉痺身時熱不足病心痺靈樞邪氣篇府病形屬心脉微大爲心痺引背善淡出巢元方病源思慮煩多則損心心虛故邪乘之邪積而不去則時害飲食心中悶如滿蘊蘊而痛是謂之心痺

肺

素問五藏生成篇赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺王叔和經脉夫脉當取太過與不及陽微陰弦則背痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上肺所以背痺心痛者以其脉陰弦故也背痺之病喘息欬嗽背痛短氣寸口脉沈而遲關上小緊數者枯棲蘊白酒湯主之巢元方病源診其脉沉而弦者心痺之候也

方

葛洪肘後備急方治心痺心痛蜀椒一兩熬令黃末之以狗心血丸之如梧桐子大每服五丸生薑湯下日五服

太平聖惠方治心痺心中悶塞而痛不能下食木香散

木香三分

青橘皮三分湯浸去白瓤焙

半夏三分湯洗七

桂心三分

枳殼三分炒微黃去瓢

荳梨勒皮一兩

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候稍熱服

治心痺脣中滿塞心中微痛煩悶不能食赤茯苓湯

赤茯苓三分

人參三分去蘆頭

半夏三分湯洗七

通去滑

紫胡三分去苗

前胡三分去蘆頭

桂心三分

杏仁三分湯浸去

甘草一分炙微赤剝

桂心三分

杏仁三分湯浸去

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候稍熱服

治心痺滿急刺痛不可俛仰氣促欬嗽不利宜服此方

前胡三分去蘆頭

木香三分

五味子三分

赤芍藥三分

桔梗三分去蘆頭

當歸三分

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候稍熱服

治心痺脣中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦痛不能食方

枳實三分炒微黃

青橘皮一兩湯浸去白瓤焙

桂心三分

細辛二分

桔梗三分去蘆頭

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

治心氣虛損邪冷所乘脣舌塞心中痺痛飲不得青橘皮丸

青橘皮一兩湯浸去白瓤焙

桂心一兩

當歸三分

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

右件藥搗羅爲末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服以溫酒

下三十丸日三四服

橘榔三分

蘿蔔子半兩微炒

木香三分

蓬莪术三分

肝痺

論

素問王機真歲論肺傳之肝病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食四時利逆從論少陽有餘病筋痺脇滿不足病肝痺聖濟總錄論曰內經謂風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以春過此者為筋痺又曰筋痺不已後感於邪內舍於肝蓋五臟皆有合病久而不去者內舍於其合肝之合筋也故筋痺不已後感於邪則舍於肝也其證夜卧則驚多飲小便數上為引懷者是也

脉

素問五歲生成篇青脉之至也長而在右搏有精氣在心下支脉名曰肝脾得之寒濕與症同法腰痛足清頭脉緊靈相邪氣藏臟府病形屬肝脉微大為肝脾陰縮欬引少腹

聖濟總錄茯神湯治心痺神思昏塞四肢不利脅中煩悶時復恐怖

茯神去木

羌活去蘆頭

龍齒

麥門冬去心培

麻黃去根節各一兩

蔓荆實

人參

薏苡仁

防風去叉

遠志去心

犀角屑各三分

木樂大典卷一萬三千八十七

十七

赤芍藥

甘草微炙各半兩

右一十三味鹿茸篩每服三錢匕水一盞生薑五片同煎至七分去滓溫服不計時候

治心痺秦艽湯邪氣乘虛恍惚不樂身體強直面目變色

秦艽去苗土

菖蒲

桂去皮

當歸切焙

蔓荆實

人參

附子炮裂去皮臍

龍骨

赤石脂

遠志去心防風去叉各半兩

芎藷

防己各二分

右一十七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞同煎至七分去滓溫服不計時候

犀角散治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得睡卧志氣不定言語錯誤

犀角屑

牛黃別研

麝香別研

羚羊角屑各一兩

丹砂別研半兩

防風

天麻

獨活去蘆頭

人參

茯神去木

沙參去蘆頭

天竺黃別研

升麻

龍齒各一分

參門冬去心培半兩

永樂大典

卷一三八七七

白鮮皮一分 遠志去心一分 龍腦研半分 甘草微炙一分

右一十九味除荆研者外搗羅為散同研藥一處拌勻再研細每服

二錢匕煎麥門冬湯調下不計時候

薏苡仁湯治肝痺筋脉不利拘攣急痛夜尿多驚上氣煩滿方

薏苡仁

羌活去蘿頭

荊芥實

荆芥穗各二兩

白朮

木瓜去核

防風去叉

牛膝酒浸炒焙

甘草炙各一兩

右九味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至一盞去

滓稍熱服

人參散治肝痺氣逆脅脇引痛眠少驚筋脉掣急鎮肝去邪方

人參二兩

酸棗人微炒

杜仲去皮剉微炒

乳香研

各一兩

黃耆蜜炙剉

茯神去木各一兩

五味子

羌活去蘿頭

丹砂飛研

芎藭

細辛去苗葉

秦艽去苗土

熟乾地黃各半兩

右一十二味除丹砂外同搗羅為散入丹砂研勻每服一錢匕溫酒

調下不拘時候日三

永樂大典卷一萬三千首古方

十八

草薢凡治肝痺緩筋脉去邪毒調榮衛

草薢

羌活去蘿頭

天麻酒浸一省切焙各一兩

附子炮裂去皮鹽半兩

淡藥研

乳香研各一分

右六味將四味搗羅為末入淡藥乳香同研勻煉蜜和丸如彈丸大

每服一丸空心溫酒化下日再

補肝湯治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕四逆擔心腹痛目不明

白茯苓去黑皮一兩二錢

乳香研

桂去皮各三分

柏子仁研

防風去叉

細辛去苗葉各二兩

山茱萸

甘草炙剉半兩

右十一味剉如麻豆入研藥拌勻每服五錢匕水一盞半大棗二

枚擘破同煎數沸去滓取一盞服不計時候

細辛湯治肝虛氣痺兩脇脹滿筋脉拘不得喘息四肢少力眼目不明

細辛去苗葉

防風去叉

白茯苓去黑皮柏子仁研

桃仁去皮去尖雙仁炒做黃

蔓荆實

木瓜去核

甘草炙剉各三分

枳椇去核炒各半兩

右一十二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞大棗三枚擘破同煎數沸去滓取七分溫服不計時候

防風湯治肝脾頭目昏塞四肢不利腎膈虛煩

防風去叉一兩芎藭

黃耆剉

五味子

甘草炙各半兩

茯神去木

活去蘆頭

羚羊角鈎骨

前胡去蘆頭各三分

細辛去苗葉

酸棗仁微炒

右一十二味鹿搗篩每服三錢匕水一盞大棗三枚擘破同煎數沸去滓溫服不計時候

牛膝湯治肝脾筋脈肢體不隨方

丹參

前胡去蘆頭各二兩

石斛去根二兩半

杜仲去虎皮鹽附子剉

秦艽去苗土

續斷各一兩半

陳橘皮湯洗去白焰一兩

大麻仁研一合

右一十味除大麻仁外鹿搗篩每服五錢匕水一盞半煎五匕沸別

本草大典卷一百三十六

十九

茯神散治肝脾多驚悸神思不安方

茯神去木 酸棗仁微炒 黃耆剉 人參各一兩

白芍半兩

附子一兩炮去皮臍

右九味除丹砂外搗羅為散入丹砂末再研勻每服一錢匕以溫酒調下不計時候

趙素風科集驗白欬散治肝脾腫痛筋脉展轉並宜服之

白欬半兩

附子一兩炮去皮臍

右烏桑木每服半錢溫酒調下不拘時候日二夜一服之以熱行為度若不覺者加至一錢服

脾痺

論
素問四時刺逆從論太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺聖濟總錄論曰

風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以至陰遇此者為肌痺肌痺不已復感於邪內舍於痺是為脾痺其狀四肢解惰發欬嘔汁上為大塞經所謂諸

痺不已。亦益內者如此。

方

聖濟總錄治脾痺。肌肉消瘦。心腹脹滿。水飲不化。食即欲嘔。飲食無味。四肢急憤。或時自利。黃耆丸。

黃耆剝

石斛去根

附子炮裂去皮臍

附子炮裂去皮臍

肉蓯蓉酒浸切焙

益智去皮

附子炮裂去皮臍

人參各一兩

桂去皮

厚朴去皮生薑汁炙各一兩半

附子炮裂去皮臍

白豆蔻去皮

沉香剝

高良薑

附子炮裂去皮臍

阿梨勒根去核二兩

枳實

丁香各半兩

附子炮裂去皮臍

右一十八味爲細末。米煮肉和搗五百杵丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前溫酒下。

白术湯治脾痺。心腹脹滿。不欲飲食。食則氣滯。體重四肢無力。

白术

人參

草澤茄

附子炮裂去皮臍

白茯苓

丁香

黃耆

附子炮裂去皮臍

沉香

陳橘皮

附子炮裂去皮臍

木香各三分

枳實

附子炮裂去皮臍

右十五味剝如麻豆。每服三錢。水一盞。生薑五片。棗二枚。擘破煎至七分。去滓溫服。不拘時。

黃耆酒治脾痺。肉極虛寒。體重急憤。四肢不欲舉動。關節疼痛。不嗜飲食。

黃耆

桂去皮

巴戟天去心

附子炮裂去皮臍

澤鴟

白茯苓去黑皮

柏子仁

附子炮裂去皮臍

人參各二兩

天雄炮裂去皮搗芍藥

獨活去蘚頭

山茱萸各一兩

烏頭炮裂去皮臍

附子炮裂去皮臍

右二十三味㕮咀。以清酒三斗。漬之。秋冬之日。春夏三日。初

眼三合。漸加之以微麻。木爲効。日再

大半夏湯治脾痺。四肢急憤發熱。

半夏馬尿土薑汁和作餅。暴乾。任兩

白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮臍

陳橘皮湯 漬去白皓各二兩 桂去皮三兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至一盞去滓

溫服日三

麻黃湯治肺痺四肢解惰肉極肌熱方

麻黃去根節 枳實去瓢炒防風去叉
細辛去苗葉各三兩 石膏碎八兩 附子炮裂去皮研

四兩

甘草 夏

桂去皮各二兩

右九味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至一盞去滓

溫服日三

治肺痺四肢解惰皮膚不通外不得泄風引湯

獨活去蘆頭四兩

乾薑炮

當歸切炒

白茯苓去黑皮各

三兩

黃耆 防風去叉各二兩

桂去皮

附子炮裂去皮研各一兩

大豆二升熬去皮

右十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞酒半盞煎一盞去滓溫

服日三夜一

永樂大典卷萬葉八夏七

法麴丸治肺痺發嗽嘔汁溫中

法麴炒

吳茱萸湯 渥桂炒

小麥蘖微炒各五合

甘草炙

枳實去瓢桂去皮 厚朴去皮夾薑汁炙

當歸切炒

白茯苓去黑皮各三兩

細辛去苗葉

乾薑炮

麥門冬去心炮各一兩

人參

桔梗炒

肺痺

右一十五味為細末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸食前熱水下日三

論

素問四時利逆從論少陰有餘病皮痺隱疼不足病肺痺聖濟總錄論曰
風寒濕三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺皮痺不已侵感於邪內
舍於肺是為肺痺其候骨背痛甚上氣煩滿喘痺嘔是也治肺痺

脉

素問五藏生成篇曰脉之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在肓中喘而
虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也靈樞邪氣臟腑病形篇肺脉微大為
肺痺引胃背起惡日光

永樂大典

卷二三八七七

聖濟總錄橘皮丸上下否塞不能息

陳橘皮湯(沒去白楂)

桔梗炒

乾薑炮製

厚朴去皮生薑汁丸

枳實去瓢炒

細辛去苗葉各三分

胡椒各二兩

蜀椒去閉口及目炒汗出

烏頭炮製去皮尖

當歸切炒各二兩

附子炮裂去皮牌

芍藥各一兩

白茯苓去黑皮

前胡去蘿頭

防葵

橘榔剉一兩

葶苈子

桂去皮

白朮熟半兩

吳茱萸湯洗培乾炒各一兩半

大黃酒炒裏煨香

紫蘇子炒二兩

甘草尖

當歸切培各二兩

杏仁丸

赤茯苓去黑皮

防葵各二兩

右二十五味橘羅為末

陳橘皮湯(沒去白楂)

桔梗炒

棗蜜丸

杏仁去皮火炒仁微炒

白朮

當歸切培各二兩

吳茱萸湯洗培乾炒

澤鴻各一兩

白朮

當歸切培各二兩

射干

紫蘇子微炒

白朮

當歸切培各二兩

枳實去瓢炒微黃各一兩半

右十四味橘羅為末

陳橘皮湯(沒去白楂)

桔梗炒

澤鴻各一兩

白朮

當歸切培各二兩

人參各一兩

黃芩去黑心一兩

白朮

當歸切培各二兩

半夏湯洗去滑一兩五兩

黃芩去黑心一兩

白朮

當歸切培各二兩

右十一味鹿橘羅每服四錢匕水一盞入生薑一斤來二枚擘破

同煎至六分去滓溫服不計時候日三夜二

五味子湯治肺脾上氣發欬

紫蘇子炒八兩麻黃去根節

細辛去苗葉

當歸去苗土

黃芩去黑心

甘草炙各二兩

人參

當歸切培

防風去叉

黃耆細剉各二兩

當歸

梢各一兩半夏湯洗去滑七個三兩

杏仁一兩去皮尖

右一十一味麻搗篩每服四錢匕水一盞入生薑五片同煎至六分

去滓溫服不計時候上氣病亦單煮紫蘇子及生紫蘇葉久月煮乾

枝莖葉服

紫蘇子湯治肺痺胷心滿塞上氣不下

紫蘇子炒八兩半夏湯洗去滑七個五兩

陳橘皮湯洗去白焙

白朮各二兩

甘草尖

人參

右七味鹿搗篩每服四錢匕水一盞入生薑五片棗二枚擘破同煎至六分去滓溫服不計時候

腎痺

論

素問四時刺逆從論太陽有餘病腎痺身重不足病腎痺聖濟總錄論曰內經謂風寒濕三氣雜至合而爲痺人曰以久遇此者爲腎痺腎痺不已復感於邪內舍於腎是爲腎痺其證善脹尻以代踵脊以代頭益腎者胃之關關閉不利則胃氣不行所以善脹筋骨拘迫故其下掣急其上踴屈

永樂大典卷二萬卷之十七

二十三

所以言代踵代頭也治驗張果醫說齊王黃姬兄黃長卿家有酒召客召淳于意諸客坐未上食意望見王后弟宋建告曰君有病往四五日君腰痛不可仰又不得小溲不亟治病即入濡腎及其未合五臟急治之方今客腎濡此所謂腎痺也宋建曰然建故有腰脊痛往四五日天雨黃火諸情情者女婿也見建家京下方石京者合庫之屬即弃之建亦欲效之效之不能起即復置之暮腰脊動不得溺至今不愈建病得之好持重所以知建病者臣意見其色太陽色乾腎部上及界腰以下者枯四分所故以往四五日知其發也意即以柔湯使服十八日所以病愈

脉

素問五臟生成篇黑脉之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺

方

聖濟總錄遠志丸治腎臟虛之火感寒濕而成痺補益氣

遠志去心

山芋

肉蓯蓉去穢皮酒浸切帖

牛膝去苗酒浸切帖各一兩

石斛去根

天雄炮裂去皮臍

巴戟天去心

人參

茯神去木

覆盆子

永樂大典

卷二三八七七

| |
|--|
| 續斷 甘草去莖 白茯苓去黑皮 蛇牀子 防風去叉 附子炮製去皮 生乾地黃 附子炮製去皮 杜仲去皮 桂去皮 鹿茸酒浸去毛 牡丹皮 |
| 右二十六味搗羅為末煉蜜和酒數百下丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九丸加至三十九丸 |
| 防風丸治腎臟虛冷邪氣乘虛身體冷痺不仁手足牽強舉動艱難或肌肉瞶動引腰脊及左右偏及不能飲食或因房室發動 |
| 防風去叉 白茯苓去黑皮 附子炮製去皮 桂去皮 甘草去莖 桔梗根各三分 紫苑去苗 山茱萸 熟乾地黃 山芋各一分 芍藥 牛膝去苗酒浸切焙 半夏湯浸之偏去 黃耆各一兩 白朮 澤鴻各半兩 |
| 右一十八味搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空腹溫酒下十九日再服未差更加丸數此藥宜久服 |
| 茵芋散治腎臟中風濕腰痛脚癆偏枯皮膚癆痺語聲塞澁兩耳虛鳴來體羸瘦 |
| 體之力而無顏色志意不樂骨節痠疼 茵芋去莖 石龍芮 當歸剝炒 赤箭 天雄炮製去皮 木香 草薢剝一兩 白附子炮製 天雄炮製去皮 獨活去蘆頭 丹參 白花蛇舌去皮 白花蛇酒去皮骨失 乾蟾微炒 防風去叉 黃耆剝 當歸剝炒 補骨脂 桂去皮 天麻 草薢 海桐皮 仙靈脾各三分 安息香 |
| 右二十一味搗羅為散每服二錢以食前溫酒調下日再服 白附子丸治腎臟中風脚膝麻痺腰背強直疼痛言語不利面色萎黑肌體羸瘦 |

永樂大典卷之萬三千八百七十七

永樂大典卷之萬三千八百七十七

二五

牛膝去苗酒浸切焙各一兩雄黃研水飛通麝香研各半兩
右二十味搗羅爲末煉蜜和搗三百下丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下日再服

石龍芮湯治腎經藏氣虛外邪雜至脚膝緩弱腰脊不可轉側日加疼痛
石龍芮杜仲去皮炒半兩獨活去蘆頭防風去叉茯神去木草薢丹參

羌活去蘆頭五味子細辛去苗葉牛膝酒浸切焙
當歸炒人參各三分天雄炮裂去皮殼

麻黃去根節煎掠去沫焙桂去皮皮各一兩
枳殼去瓢炒半兩

右一十七味剉如麻豆每服四錢匕水一盞入生薑五片同煎至六分去滓溫服不計時候

麻黃湯治腎虛中風濕腰脚緩弱頑痺不仁顏色蒼黑語音渾濁志意不定頭目昏腰背強痛四肢拘急體重無力

麻黃去根節煎掠去沫焙羌活去蘆頭桂去皮
附子炮裂去皮殼側子炮裂去皮殼各一兩

永樂大典卷之萬三千八百七十七

二五

牛膝甘菊花當歸炒海桐皮牛膝酒浸切焙
甘草炙剉半兩防風去叉茵芋去莖五加皮各三分
桂去皮獨活去蘆頭丹參白术各三兩

右一十六味剉如麻豆每服四錢匕水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服不計時候

牛膝酒治腎氣虛冷侵感寒濕為痺

牛膝秦艽去苗土芎筋防風去叉
桂去皮獨活去蘆頭白荻芩去黑皮各二兩
石斛去根麥門冬去心乾薑炮裂附子炮裂去皮殼各一兩半
五加皮五兩薏苡仁一兩大麻仁炒半兩

右一十一味剉如麻豆以生絹袋盛酒一斗浸春夏三日秋冬五日每服半盞空心溫服日再