

漢書門
類號函架冊
一三六〇八
一六〇九〇八

內閣文庫
漢書
類號冊架
一三六〇八
一六〇九〇八

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (139)
函號	300 211

百七十八



新校勘於德經卷一百七十八

讀傳注卷兩經全形也身圖

我 對 讀 校 訂

小兒門

小兒疳積

小兒驚風

小兒赤白痢

小兒血痢


小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積 小兒驚風 小兒赤白痢

小兒疳積 小兒驚風 小兒赤白痢



重校聖濟總錄卷一百七十八

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

小兒門

小兒冷痢

小兒熱痢

小兒赤白痢

小兒血痢

小兒膿血痢

小兒蠱毒痢

小兒冷痢

論曰凡痢皆由乳食不節傷動胃氣腸胃虛弱清濁不分因虛而泄滯久不散故為痢也虛而冷者

則所下青白或如凝脂久不差則陳寒結痼或下
黑瘀診其脈沈而遲者冷痢也

龍骨飲方 治小兒五歲以下百日已上冷痢

龍骨 黃連 去須各一兩半 人參 甘草 炙 乾薑

炮裂 半夏 湯洗十遍焙乾 厚朴 去麤皮生薑汁炙剉 赤石脂 各一兩

右八味麤擣篩一歲兒每一錢匕水半盞入棗
一枚擘破同煎至三分去滓分溫二服空心午
後各一服量兒大小以意加減

訶藜勒散方 治小兒秋後大腸挾冷下痢不止

訶藜勒 煨去核半兩 肉豆寇 去殼二枚 當歸 焙切 赤石

脂 蜜陀僧 別研如粉 枳殼 去瓢麩炒 龍骨 乾薑 炮裂

厚朴 去麤皮薑汁炙各半兩

右九味擣羅為散一二歲兒每服半錢匕米飲
一調空心午後各一服更量兒大小以意加之

黃耆湯方 治小兒下痢白膿

黃耆 剉 芎藭 乾薑 炮裂 人參 黃芩 去黑

心當歸 焙切 甘草 炙各半兩 桂 去麤皮一分

右八味麤擣篩一歲兒每一錢匕水半盞同煎至三分去滓分溫二服空心日晚各一服量兒大小以意加減

陳橘皮湯方

治小兒冷痢心腹脹滿乾嘔不止

陳橘皮

湯浸去白

人參

一分

甘草

炙半兩

右三味麤擣篩一歲兒每一錢匕水半盞生薑二片同煎至三分去滓分溫三服食前日再隨兒大小以意增減

白丸子方

治小兒虛冷臟腑滑泄不止

硫黃

半兩

附子

炮裂去皮臍取末稱半兩

消石

研

鍾乳

研

白龍骨

研

寒食麪

各一分

右六味同研令勻細麪糊丸如麻子大每服三五丸量兒大小加減米飲下疾愈即止

艾香散方

治小兒冷痢腹痛

艾葉

炒

木香

黃連

去須各半兩

龍骨

研

訶

藜勒

煨取皮

當歸

切焙各三分

乾薑

炮裂一分

右七味擣研為散每服半錢匕米飲調下食前服

蜀椒丸方 治小兒秋深冷痢止腹痛

蜀椒 去目及閉口者 炒汗出一兩 乾薑 炮裂 一分

右二味擣羅為末鍊蜜和丸小豆大一歲兒空心麪湯下五丸未止日午再服量兒大小以意

加減

木香丸方 治小兒冷痢白膿臍下絞刺痛

木香 一兩 訶藜勒 煨去核 一兩

右二味擣羅為末以粳米飯和為丸如麻子大一二歲兒三丸五歲兒五丸米飲下食前服

人參湯方 治小兒白痢

人參 二兩 半 厚朴 去麤皮生薑汁炙一兩 甘草 炙一兩 白茯苓 一分

苓 去黑皮一分 檉皮 炙二兩 桔梗 炒一分

右六味麤擣篩一二歲兒每一錢七水半盞煎至三分去滓分溫二服乳食前量兒大小以意

加減

訶藜勒丸方 治小兒冷痢

訶藜勒 煨去核 半兩 桂 去麤皮 一分 赤石脂 半兩

右三味擣羅為末鍊蜜和丸更入白中擣三五

百杵丸如麻子大一二歲兒三九三四歲兒五
丸空心午後各一服米飲下

阿膠飲方 治小兒白痢

阿膠炙令燥一兩一分 黃芩去黑心一兩 黃連去須半兩

右三味麤擣篩一二歲兒每一錢七水半盞煎

至三分去滓分溫二服空心日晚各一服量兒

大小以意增減

茯苓飲方 治小兒冷痢白膿

白茯苓去黑皮一兩一分 人參一兩半 厚朴去麤皮生薑汁炙剉

一兩半 桔梗炒一兩 檉皮炙一兩

右五味麤擣篩每一錢七水半盞煎至三分去

滓分溫二服食前日二量兒大小以意增減

調中人參飲方 治小兒下痢色白小便赤

人參三分 龍骨一兩 厚朴去麤皮生薑汁炙剉一分 當歸

切焙 乾薑炮裂 白茯苓去黑皮 甘草炙各一兩

右七味麤擣篩一二歲兒每一錢七水半盞煎

至三分去滓分溫二服空心日晚各一量兒大

小以意加減

龍骨湯方 治小兒冷痢腹痛

龍骨 甘草炙 黃連去須各一兩 乾薑炮裂 當

歸切焙各三分

右五味麤擣篩一歲兒每半錢七水半盞煎至三分去滓分溫二服日再量兒大小以意加減

當歸湯方 治小兒冷痢

當歸切焙 黃連去須 赤石脂 乾薑炮裂 龍

骨 酸石榴皮微炙 厚朴去麤皮生薑汁炙到各三分

右七味麤擣篩每一錢七水一盞煎至五分去

滓分溫二服食前日一量兒大小以意加減

豆寇散方 治小兒腸胃虛弱清濁不分痢下青

白或如凝脂陳寒痼冷或下黑痰

肉豆寇去殼一枚 縮砂去皮七枚 訶藜勒去核三枚 鉛丹炒

胡粉炒 龍骨各二錢 白礬一分 天仙子一分

與白礬和令勻入在椽斗子內合定用麻線纏定炭火內燒黑存性細研

右八味擣研為散再研令勻每服半錢七米飲

調下乳食前服

丁香丸方 治小兒冷痢心腹痛悶不美乳食嘔

逆不止

丁香 硫黃 胡椒 桂 去麤皮 各一錢 陳橘皮 去白

焙 附子 炮裂去皮 臍各一分 肉豆寇 去殼 一枚

右七味擣羅為細末用生薑汁煮麩糊和丸如菜豆大每服五丸生薑艾湯下妳食前服量兒大小加減服

厚朴丸方 治小兒脾胃虛弱清濁不分因成冷痢其色青白甚則色黑

厚朴 去麤皮生薑汁製炙黃色一兩 肉豆寇 麩裏炮裂一兩 訶黎勒

三枚麩裏炮用皮 龍骨 半兩 木香 一兩

右五味擣羅為細末水浸炊餅心和丸如麻子大一二歲兒每服十丸溫米飲下日三服

厚朴湯方 治小兒冷痢便下青白或如凝脂或下瘀黑

厚朴 去麤皮生薑汁炙剉 蒼朮 米泔浸切焙 陳橘皮 去白焙 各一兩

甘草 炙剉 半兩 乾薑 炮三 右五味麩擣篩每服一錢匕水一盞入生薑二片棗一枚擘煎至五分去滓溫服

補脾丸方 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或如凝脂

肉豆寇

炮去殼一枚為末

龍骨

燒研

乳香

研

蕪荑

仁

炒研

麝香

研各一錢

右五味同研勻軟飯丸如麻子大每服五七丸陳米飲下

草節丸方 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或如凝脂

烏頭

炮裂去皮臍去

黃連

去鬚

吳茱萸

湯洗焙炒

乾薑

焙

一錢

右四味搗羅為末醋煮麪糊和丸如黍米大每服七丸草節湯下

小兒熱痢

論曰小兒挾熱痢此由邪熱在於腸間因胃氣不和乳食傷動故令腹痛腸鳴下痢黃赤名熱痢香連丸方 治小兒熱痢下重或下痢如血汁

木香

黃連

去須各半兩

右二味搗羅為細末醋浸炊餅和丸如菉豆大

每服二十九丸米飲下不計時候

犀角丸方 治小兒赤痢經時不止

犀角

鎊屑一兩一分

黃連

去須一兩半

女萎

一兩

白頭翁

去蘆頭

茜根

三分

枳殼

去瓢麩炒黃三分

甘草

炙半兩

赤石脂

一兩一分

黃芩

去黑心一兩

乾藍

半兩

檉皮

炙三分

分龍骨

一兩

黃蘗

去蘆皮炙半兩

右十三味擣羅爲細末鍊蜜和擣五百杵丸如麻子大一二歲兒每服三丸三歲至六歲兒可四五丸空心午後各一服米飲下

赤石脂散方 治小兒卒下熱痢

赤石脂

一兩

黃連

去須

石膏

碎

甘草

炙

龍骨

知母

焙

前胡

去蘆頭

赤茯苓

去黑皮

桂

去蘆皮

芍藥

各一分

右十味麤擣篩一二歲兒每半錢匕入棗一枚擘破水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

黃連白頭翁湯方 治小兒熱毒下痢如魚腦手

足壯熱

黃連去須一兩 白頭翁 醋石榴皮炙 犀角鎊屑

各半兩

右四味麤擣篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午間日晚各一服

牡蠣丸方 治小兒熱痢

牡蠣煨 黃連去須 黃蘗去麤皮炙 龍骨 赤石

脂 人參 甘草炙各一兩

右七味擣羅為末鍊蜜和擣千餘杵丸如麻子大一二歲兒每服三丸四歲至六歲兒五丸米

飲下空心午後各一服

梔子丸方 治小兒熱痢不止

梔子仁七枚 黃蘗去麤皮炙三分 白礬熬汁枯各一兩 棗大者

四枚燒令黑色

右四味擣羅為細末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸三四歲兒每服五丸米飲下空心午後各一服

熊膽散方 治小兒熱痢壯熱全不食乳食乳即

吐

熊膽兩半 黃連去須三分 馬齒莧乾者炒一兩 無食子

煨一枚 蚺蛇膽兩半 犀角鎊屑一兩

右六味搗羅為細散一二百日兒每服一字匕

新汲水調服空心午後各一服

黃芩知母湯方 治小兒熱痢不止

黃芩去黑心 知母焙一各一兩 萎蕤三分 黃蘗去籠皮炙

半兩 甘草炙半兩

右五味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎

至四分去滓分溫二服空心午後各一服

羚羊角湯方 治小兒熱毒痢下膿血

羚羊角鎊屑三分 地榆一兩 吳藍三分 黃連去須一兩

黃芩去黑心半兩 茜根二分 當歸切焙 阿膠炙燥

赤石脂各一兩 炙甘草半兩

右十味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎

至四分去滓分溫二服空心午後各一服

黃連飲方 治小兒熱毒痢下血

黃連去須一兩半 白蘘荷根一兩 犀角鎊屑一兩 黃芩

去黑心一兩 白頭翁去蘆頭三分 茜根剉一兩 藍青乾者三分

甘草 炙半兩

右八味麤擣篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

烏梅湯方 治小兒熱痢壯熱多渴而痢

烏梅肉 去核二枚焙 黃連 去須 藍葉 各一分 犀角 鎊

阿膠 炙各半兩 甘草 炙各半兩

右六味麤擣篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

黃連湯方 治小兒熱痢

黃連 去須一兩 黃蘗 去麤皮炙半兩 阿膠 半兩炙燥

右三味除阿膠外麤擣篩每服半錢匕酒半盞入阿膠一片同煎至二分去滓空心日午近晚各一服

黃連湯方 治小兒熱痢腹中疼痛或血痢

黃連 去須 山梔子仁 各三分

右二味麤擣篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

訶藜勒散方 治小兒赤痢血痢

訶藜勒

煨去核

梔子

去殼各一兩

右二味搗羅為細散一二歲兒每服半錢匕米飲調下空心午後各一服

三物湯方 治小兒久熱痢不下乳

大黃

生剉

甘草

炙剉

麥門冬

去心焙等分

右三味麤搗篩每二錢匕水一盞煎至五分去滓分溫三服空腹量兒大小加減服

小兒赤白痢

論曰小兒痢下赤白由脾胃不和乳食所傷留滯

腸中與津液相搏腸虛則泄故為痢也虛而有熱則赤虛而有寒則白冷熱不調則赤白相兼膿血雜下故名赤白痢

赤石脂丸方 治小兒赤白痢腹肚疴痛不思飲食羸瘦

食羸瘦

赤石脂

白礬

燒令汁盡

訶藜勒皮

白朮

黃耆

耆

厚朴

去麤皮生薑汁炙剉

醋石榴皮

乾木瓜

焙各半兩

肉豆寇

去殼一枚

乾薑

炮一分

右十味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服五丸

溫米飲下空心午後服量兒大小加減

當歸丸方 治小兒赤白痢不止

當歸切焙半兩 黃連去須 龍骨 人參各一分 無食

子炮二枚 鹿角鎊 豉炒各一分

右七味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服五丸

溫米飲下空心午後服量兒大小加減

鹿角丸方 治小兒下痢赤白

鹿角鎊 蕪荑仁炒 附子炮裂去臍皮各一兩 赤石

脂半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服五

丸溫米飲下空心日晚各一服量兒大小加減

白朮湯方 治小兒赤白痢日夜三五十行

白朮一兩一分 乾薑炮一分 白茯苓去黑皮 甘草炙各一兩

附子炮裂去皮臍半兩

右五味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去

滓分溫二服空心食前服量兒大小加減

人參湯方 治小兒赤白痢

人參一兩半 厚朴去麤皮生薑汁炙一兩 白茯苓去黑皮 桔

梗剉炒各一兩一分 檫皮去麤皮炙二兩 甘草炙一兩半

右六味麤擣篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓早晨午後服量兒大小加減

厚朴散方 治小兒赤白痢腹痛日夜頻數

厚朴去麤皮生薑汁炙三分 人參半兩 赤石脂 龍骨

各一兩 地榆 乾薑炮 當歸切焙各半兩 黃連去須

一兩

右八味擣羅為散每服半錢匕空心米飲調下午後再服量兒大小加減

犀角湯方 治小兒赤白痢日夜數十行腹痛後

重

犀角鎊 苦參 黃連去須 地榆 黃蘗去麤

皮炙各一兩

右五味麤擣篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服空心午後服量兒大小加減

黃蘗散方 治小兒赤白痢久痢成疳

黃蘗去麤皮炙 黃連去須 桃白皮炙剉 胡粉炒

白茯苓去黑皮各一兩 丁香一分

重刊聖濟總錄 卷一百一十五 五 燕遠堂

右六味搗羅為散每服半錢匕米飲調下空心
午後服量見大小加減

藍葉湯方 治小兒赤白痢挾熱多渴宜服

藍葉一分 黃連去須半兩 白茯苓去黑皮一分 冬瓜子炒半兩

右四味麤搗篩每一錢匕入蜜少許水一小盞
煎至五分去滓分溫二服空心午後服量見大
小加減

鹿茸散方 治小兒赤白痢

鹿茸去皮毛酥炙 甘草炙 訶藜勒煨去核各半兩

右三味搗羅為散每服半錢匕食前日三米飲
調下量見大小加減

黃連散方 治小兒赤白痢

黃連去須 檳榔剉

右二味各搗羅為散如患赤痢黃連末二錢匕
檳榔末一錢匕白痢黃連末一錢匕檳榔末二
錢匕和勻每服半錢匕米飲調下量見大小加
減

重刊聖濟總錄 卷一百一十五 小兒門 六 燕遠堂

木香黃連散方 治小兒赤白痢腹內疼痛煩渴

木香 黃連 去須各半兩 訶藜勒 炮去核十二枚 肉豆寇

去核二枚 甘草 炙半兩

右五味搗羅為散每服半錢匕米飲調下

麝香丸方 治小兒赤白痢及水瀉

麝香 研半錢 巴豆 七粒去皮水半盞用蛤粉一匙頭同煮水盡去心膜細研

丹砂 研 硫黃 各一分研 草烏頭 炮去皮取末一錢 砒霜

研半錢

右六味搗研為末用棗肉和丸如黍米大每服

一丸水瀉并痢秋後蛤粉水下夏至後新汲水

下赤白痢生薑湯下更量兒大小以意加減

神捷散方 治小兒赤白痢

大棗 四枚 梔子仁 五枚 乾薑 半栗子大

右三味並燒黑色研為散每服半錢匕米飲調

下

治小兒赤白痢方

糝麻子 一兩炒

右一味搗羅為散蜜水調下半錢匕食前加減

服

龍骨散方 治小兒赤白痢

龍骨研 白石脂研 胡粉炒 白礬枯過

兩 訶藜勒皮二兩 黃連去須 陳橘皮去白 阿

膠炙 當歸切 人參 厚朴去麤皮生薑

半 右十一味擣羅為散每一錢七空腹煮白粥飲

調下日二

黃連丸方 治小兒赤白痢

黃連去須 龍骨 赤石脂 當歸剉炒各白

石脂 烏梅肉炒 黃芩去黑心

右七味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五

丸空腹煮白粥飲研下日二服漸加至十丸

訶藜勒丸方 治小兒赤白痢裏急後重

訶藜勒煨去核 地榆去苗 醋石榴皮炙 高良

薑 赤石脂各半 吳茱萸湯洗焙乾 黃連去須

三分

右七味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服七

丸溫米飲下空心午後各一看見大小以意加減

中黃散方 治小兒下痢赤白乳食減少腹痛滿悶

定粉 鉛丹 二味銀器內同炒令赤 海螵蛸 龍骨 各一

錢 訶藜勒 炮去核二錢

右五味搗羅為散每服半錢匕紫蘇木瓜湯調下量兒大小加減服

黃連湯方 治小兒赤白痢腹痛

黃連 去須一兩 乾薑 炮 艾葉 炒各半兩 烏梅肉 三枚

右四味咬咀每服二錢匕以水八分一盞煎去滓取三分空腹溫服

小兒血痢

論曰熱痢不差則變血痢由痢久腸虛熱毒留滯血脈妄行流滲腸間腸虛則泄故為血痢也

茜根飲方 治小兒血痢

茜根 剉一兩 地榆 根剉三分 馬蘭子 微炒一分 黃連 去須

黃蘗 去麤皮微炙 黃芩 去黑心各一兩半 當歸 切焙一兩

右七味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水七分入
生薑二片同煎至四分去滓分溫二服空心晚
食前各一服更隨兒大小以意加減

黃連湯方 治小兒血痢無度

黃連去須一兩半 艾葉微炒一分 阿膠炙令燥半兩 豉十粒炒令焦黃

右四味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水七分入
葱白二寸并須切同煎至四分去滓分溫二服
空心午後各一服量兒大小以意加減

黃連湯方 治小兒血痢無度

黃連去須半兩 甘草炙剉半兩 黃藥子一分 吳藍葉一分
梔子仁二枚 犀角屑一分

右六味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水七分煎
至三分去滓分溫二服食前日二隨兒大小以
意加減

樗根湯方 治小兒瀉血不定

樗根白皮炙香剉三分 無食子一枚 肉豆蔻去殼一枚
茜根剉半兩 茶末一分

右五味麤擣篩每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服早晨晚後各一量兒大小加減

麝香散方 治小兒血痢不止

麝香錢一

鹿角

屑半兩 炒微焦

亂髮灰

半兩

右三味同研為散每服半錢匕粥飲調下日三四服量兒大小加減

地榆湯方 治小兒血痢

地榆

剉

黃蘗

去麤皮 微炙

黃連

去須

黃芩

去黑心 各

一兩

馬蘭子

微炙 半兩

茜根

剉一兩

右六味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水半盞入

生薑一片同煎至三分去滓分溫二服食前日

再隨兒大小以意增減

薤白飲方 治小兒血痢

薤白

十莖 切

香豉

一合 半

山梔子仁

五枚

黃連

去須

半兩

右四味除香豉薤白外餘麤擣篩一二歲兒每一錢匕水七分入香豉二七粒薤白一莖切同煎至三分去滓分溫二服量兒大小增減

固腸丸方 治小兒臟腑虛滑瀉血腹痛

槐鵝牛兩炒 肉豆蔻三枚麪裹燒香 乾薑炮裂 枯礬半兩

一分

右四味搗研為細末麪糊為丸如麻子大乳香湯下一二歲兒每服十丸日進二服

蝟皮散方 治小兒脾毒瀉血

刺蝟皮剉 陳槐花 白礬 鹿角屑各一兩

王瓜半兩

右五味同入沙盒子內用鹽泥固濟令乾燒令

通赤取出為細散每服半錢匕入生薑自然汁兩三點用臘茶清調下

地榆丸方 治小兒腸虛腹脹瀉血不止

地榆一兩 草豆蔻三枚炮 黃耆剉一兩 枳殼炒

去瓢半兩

右四味搗羅為細末麪糊為丸麻子大一二歲兒每服十丸草節湯下日三服

胡黃連丸方 治小兒血痢不止

胡黃連 黃連去須各半兩 丁香 盧會 五靈

脂 乾薑炮裂 賓榔剉各一分 木香 麝香研各一錢

右九味搗研為末用炊餅丸如麻子大每服三五丸量兒加減溫米飲下

犀角飲方 治小兒血痢

犀角鎊末半兩 檉皮去麤皮微炙四兩

右二味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服量兒大小加減

香鼓飲方 治小兒毒熱血痢

香鼓微炒一分 梔子五枚去皮 黃連去須一分

右三味麤搗篩每一錢匕水七分入薤白兩莖切同煎至四分去滓分溫二服空心日晚各一量兒大小加減

黃芩丸方 治小兒血痢腹痛減食四肢瘦弱渴不止

黃芩去黑心 地榆 龍骨 人參 白朮 厚朴去麤皮生薑汁炙剉各一兩 白茯苓去黑皮 漏蘆去蘆頭各一兩 半 酸石榴皮切焙三分

重校聖濟總錄 卷之二十一 三 燕遠堂

右九味擣羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服七丸空腹米飲下日二更量兒大小加減服

青橘丸方 治小兒熱痢不差血脈妄行變成血痢

青橘皮 去白 焙 黃連 去須 等分

右二味擣為末用獾豬膽汁和却入膽內以米泔煮熟取出入麝香少許研勻丸如黍米大每服十五丸米飲下

治小兒血痢煩躁方

右取藍青汁量兒大小分減服之

小兒膿血痢

論曰小兒膿血痢者由腸胃虛弱冷熱不調寒多則色白或如凝脂與膿兼下熱多則色赤或似梔子汁甚則純下鮮血冷熱交攻膿血雜下治法當分其冷熱疳蟲而治之則無不差矣

赤石脂散方 治小兒下痢膿血腸鳴腹痛

赤石脂 研 龍骨 研 地榆 黃連 去須各一兩

厚朴 去麁皮生薑汁塗炙五遍 人參 去須各三分 當歸 剉 焙 乾

重校聖濟總錄 卷之二十一 小兒門 三

薑炮裂各半兩

右八味擣羅爲散每服半錢匕用米飲調下日二如要丸鍊蜜丸如麻子大乳汁下五丸至七丸空心午後各一服隨兒大小以意加減

石榴皮散方 治小兒膿血痢

醋石榴皮微炒

乾薑炮裂

黃連去須

訶藜勒

煨去核各一分

右四味擣羅爲細散每服半錢匕空心午後各米飲下一二錢隨兒大小以意加減

乾薑散方 治小兒下痢膿血腹痛腸鳴

乾薑

炮裂一分

黃連

去須三分

人參

三分

肉豆蔻

去殼一枚

當歸

剉焙一枚

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙五徧半兩

右六味擣羅爲細散每服半錢匕以粥飲調下

空心午後各一服量兒大小加減

肉豆蔻散方 治小兒膿血痢

肉豆蔻

二枚去殼

當歸

剉焙

蜜陀僧

研

訶藜勒

煨去核

黃連

去須

枳殼

去瓢麩炒各一分

龍骨

半分

乾

薑

炮裂半兩

右八味擣羅為散每服半錢匕空心米飲調下
隨兒大小以意加減

黃連丸方 治小兒膿血痢

黃連去須 龍骨研 黃芩去黑心 白石脂研

當歸剉焙 赤石脂研各三分 烏梅肉微炒各半兩

右七味先以四味擣羅為細末入研藥和勻鍊
蜜丸如麻子大每服五丸空心晚食前米飲下
量兒大小加減

肉豆蔻丸方 治小兒下痢膿血腹痛虛煩

肉豆蔻去殼 木香 訶藜勒炮去核各三錢 蜜隨僧

一錢 人參 白茯苓去黑皮各一分

右六味擣羅為細末用燒粟米飯丸如棗豆大
每服七丸溫米飲下

乾藍湯方 治小兒百晬內下痢如魚腦赤白雜
痢腹痛多啼

乾藍葉 升麻 芍藥各一兩 梔子仁四枚

右四味麤擣篩百晬至二百日兒每一錢匕以
水半盞入香豉七枚薤白一莖拍破同煎至三

分去滓分溫三服食前隨兒大小以意增減

當歸黃連湯方 治小兒膿血滯痢

當歸剉焙黃連去須皮桂去麤皮赤石脂一兩

人參三分乾薑炮裂龍骨一分白頭翁三分

甘草炙三分附子炮裂去皮臍

右十味剉如麻豆每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服兒大以意加之久冷者去白頭翁加牡蠣三分

白石脂散方 治小兒腸澼下膿血

白石脂燒令赤亂髮燒灰甘草炙令赤

右三味擣研為細散每服一字至半錢匕早晨午後各一服米飲調下隨兒大小以意加減

如聖散方 治小兒臟毒久痢下膿血

右用好棗一枚去核入鉛丹半錢匕硃砂一皂莢子大膩粉炒一錢匕三味細研入在棗內用大麥麩裹煨灰火燒香熟為度去麩爛研為粉每一枚棗分兩服煎槐花湯調下二服定

鮓湯丸方 治小兒純痢膿血

粉霜 膩粉 丹砂 硃砂 各一錢 白丁香 一錢

乳香 半錢 巴豆 去皮心半錢 不出油研

右七味研為細末煮棗肉和成劑每服旋丸如

粟米大二丸量兒大小加減煎魚鮓湯下次用

調胃藥和之

蠟蜜丸方 治小兒下痢膿血寒熱不除

豉 八十粒炒 大豆 炒令黃香 黃連 去須一分 巴豆

二十枚去皮心麩 炒令香出油盡 芫花 醋炒 消石 各一分

右六味擣羅為細末入容蠟一分并鍊蜜和丸

如黍米大一二百日內兒每服二丸一二歲兒

每服可五丸三四歲兒每服七丸米飲下空心

隨兒大小加減服之

丹砂丸方 治小兒一切痢疾

丹砂 研半錢 砒霜 研半錢 巴豆霜 研 硫黃 研

麝香 研 菜豆粉 研各一分

右六味同細研令勻用燒飯為丸如菜豆大每

服二丸血痢煎黃芩湯下白痢煎附子湯下疳

痢蛤粉湯下

羚羊角湯方 治小兒熱毒痢下膿血

羚羊角屑 茜根 吳藍各三分 黃連去須 赤

石脂炒 地榆 當歸炒 阿膠炙 一兩 黃

芩去黑心 甘草炙 各半兩

右十味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎去滓取五分空腹分溫三服

小兒蠱毒痢

論曰小兒下痢瘀血如雞鴨肝片隨痢而下者蠱毒痢也此由歲時寒暑不調有毒厲之氣中兒腸

胃其邪與血氣相搏變而成痢血毒氣盛熱則傷損腑臟如中蠱之狀故名蠱毒痢

黃連飲方 治小兒蠱毒痢下血體羸

黃連去須 一兩 犀角鎊 白蘘荷根 黃芩去黑心

茜根各三分 敗鼓皮炙 焦 藍青 甘草炙 剉 白

頭翁去蘆頭 各半兩

右九味麤擣篩一二百日兒每半錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服更量兒大小加減

犀角飲方 治小兒蠱毒痢下血不止

犀角鎊 地脈草各一兩

右二味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水一盞煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加減

地榆飲方 治小兒蠱毒血痢

地榆去麤皮炙 黃蘗去麤皮炙 黃連去須 馬芹子炒 黃

芩去黑心 蔓菁根洗切

右六味麤擣篩一二歲兒每一錢匕水一盞入生薑少許煎至五分去滓分溫二服

犀角散方 治小兒蠱毒血痢發甚心神煩悶腹

脹不欲飲食

犀角屑三分 白蘘荷根三分 地榆三分微炙剉 桔

梗三分去蘆頭 蘇枋木三分剉

右五味擣羅為散每服一錢匕水一盞煎至五分去滓溫服不拘時候量兒分減服

又方

葱白三兩 香豉三合 梔子七枚 黃連一兩

右四味擣篩為散每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

犀角榨皮散方 治小兒蠱毒血痢

梁州榨皮 二兩半 炙剉 犀角屑 一兩 半

右二味剉篩令勻每服二錢匕水一盞煎至五分去滓溫服量兒大小以意加減

升麻散方 治小兒蠱毒血痢身體壯熱煩悶

升麻 白蘘荷根 各一兩 犀角 鎊 芍藥 各三分

敗鼓皮 炙焦一分 乾藍 甘草 炙各半兩

右七味麤擣篩一二歲小兒每用半錢匕水半盞入豉七粒煎至二分去滓分溫二服空心午

後各一更量兒大小加減

犀角地榆湯方 治小兒蠱毒血痢

犀角 鎊 地脈草 各一兩 地榆 剉三分

右三味麤擣篩一二歲兒每半錢匕水一小盞入蜜半匙煎至五分去滓分溫二服更量兒大

小加減

皇朝聖訓

卷二十八

三

燕邊堂



