

急救仙方卷之三

三

急救仙方卷之三

婦女雜病品

四物湯

熟地黄

川芎

芍藥

當歸各等分

右為粗末水煎服

若女蒸勞熱加地骨皮牡丹皮知母柴胡

黃芩

若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉

阿膠黃耆葱服中法血虛多亦以膠

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾

若血崩者加生地黃蒲黃黃芩一加阿大

艾黃芩

若血虛而腹痛微汗而惡風加莪朮官桂

若風虛眩暈加秦艽羌活

例三

若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳

皮

若發熱而煩不得睡卧加黃連施子

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加

乾姜附子

炮

重無久良效驗刊吹白木外

若中濕身沈重無力身涼微汗加白朮茯苓

苓

若筋骨枝節痛及頭痛增寒加羌活防風

藁本細辛

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛加玄胡

索苦練

各炒

若經水過多別無餘證加黃芩白朮

若經水澁少加葵花紅花

若虛勞氣弱咳嗽喘滿加姜製厚朴麩炒

枳實

若經水暴下加黃芩

若血積塊痛加莪朮三稜桂乾漆炒

若赤白帶下加香附子桂炒

若血痢加膠艾黃連

若產後血痢腹痛加槐花黃連御米殼

若血熱相搏舌乾口渴加括蕒麥門冬

若大渴引飲加石膏知母

若藏府祕澀加大黃桃仁

若嘔吐者加白朮人參藿香生姜

若虛寒滑泄者加官桂附子

炮

若虛煩不得睡加竹葉人參酸棗仁

若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍加防風

羌活防已酒浸草龍膽酒浸

芎歸湯

川芎

當歸各等分

右以水煎熟服

若產後眩暈加芍藥甘菊花

若產後腹痛加官桂酒童便合煎

若妊娠子死或不死胎動加紫蘇酒水合

煎死者即下未死者即安

若臨月服之則縮胎易產

若倒橫難生或子死腹中加黑豆一合先炒熟水童便合煎

若腸風藏毒加槐花末半錢三日取下血塊即愈

三

若吐血加生地黃黃芩枳殼

三

若血氣上喘下脹腫加艾煎湯空心調散

服

若產後血悶心迷喘急腹痛加炒黑豆一合入姜汁同煎服

若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩

入甘草一錢湯點服

若白帶加芍藥半兩乾姜二錢半同為末

米飲調下

若赤白帶下加香附子棕櫚燒灰同為末

米飲調下

苦練丸治赤白帶

苦練碎酒炒

茴香炒

當歸各五錢

右為細末酒糊為丸每服五十丸空心温

酒送下

又方雲母爲粉溫水和服三方寸七立見神效

又方夏枯草花開時採搗爲末每服二錢食前溫飲調下能飲者酒服

又方用酸漿草陰乾爲末空心酒下三錢七

治月候湛濁赤白帶下多年不差者

石燕一枚於堅硬甕器內以溫水磨服之

丁香膠艾湯治白帶白崩之物雖多間有如屋漏水下時有鮮血

當歸身

一錢半

熟地黄

白芍藥

川芎 各半 錢

阿膠 六分 炒珠

丁香 四分

生艾葉 一錢

右當歸酒洗剉艾亦剉川芎丁香地黃為

細末都作一服水五盞先煎作一盞半去

滓入阿膠再煎至一盞帶熱空心服之三

惻三

四

兩服愈

補經固真丸治心胞尺脉極微白帶流而不
止

甘草 炙

柴胡 各一錢

黃芩 一錢 令剉

乾姜末 三錢

橘皮 半錢

人參 二錢

白葵花

十六箇
去萼剪

郁李仁
一錢
去皮

尖另研
如泥

右件除苓外以水三盞煎至盞七分再入
黃芩同煎至一盞去滓空心熱服少時以
早膳壓之

萬金散治婦人血崩不止

香附子

四兩
炒

當歸尾

一兩
二錢

五靈脂

一兩
炒

右為細末每服五錢醋調空心服立愈

當歸散治血崩

當歸

一兩

龍骨

一兩

香附子

三錢

棕毛灰 兩半

右為細末空心米飲調下四錢忌油膩等物

蓮殼散治血崩

乾蓮蓬

燒存性

棕皮及毛

燒灰各半兩

香附子

炒三錢

右為細末每服四錢空心米飲調下

小薊湯治崩漏不止

小薊莖葉 研汁一盞

生地黄

汁一盞

白朮

半兩

右三件入水一盞煎至一半去滓溫服

槐花散治血崩

陳槐花 一兩

百草霜 半兩

右為末每服三四錢溫酒調下若昏憤不省人事則燒紅秤錘淬酒下

芎藭酒治崩中晝夜不止

芎藭 一兩

生地黄 汁一盞

右先用酒五盞煮芎藭一盞去滓下地黄汁再煎三二沸分為三服

槐灰散治崩中或下赤白不問年月遠近並

皆治之

槐枝

不以多
少燒灰

右以温酒調下方寸七食前

螺蛸散治漏下臍腹痛久不止者

烏賊魚骨

燒存
生

右研為細末每服二錢煎木賊湯下

紅花散治婦人產後血昏血崩月事不調遠
年乾血氣

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃

炒各
等分

右為細末每服半兩酒煎和滓溫服如胞
衣不下調榆白皮末半兩服之立下

萬病丸治女人月經瘀閉月候不來繞臍痛

乾漆

杵碎炒令一時久大
煙出煙頭青白為度

牛膝

酒浸一宿
焙各一兩

惺三

六

右為末以生地黄汁一升入二味藥末瓦

石器內慢火熬可丸即丸如桐子大每服

二丸空心米飲調下

牛膝散治婦人月水不利臍腹疔痛

牛膝

一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

玄胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香

各七錢

右為細末每服方寸匕温酒調下食前

催經散治婦人經脉不行

凌霄花

不以多少搗羅為末

右每服二錢温酒調下食前服

衛生湯治婦人女子虛弱月事不來

白芍藥

當歸

各二兩

黃耆

三兩

甘草

人參

各一兩

右為粗末每服五錢水煎空心服

二神丸治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調

橘紅二兩

玄胡索

去皮醋煮

當歸

剉酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊丸如桐子大每服一百

丸艾醋湯下

蓮蓬散療經血不止

例三

七

蓮蓬

燒灰存性

右為細末每服二錢熱酒調下

徹清膏治婦人頭痛

川芎

三錢

蔓荊子

細辛

薄荷

藁本 各一錢

生甘草 半錢

甘草 半錢

當歸 一錢半

右為細末食後茶清調下二錢

石膏散治頭痛不可忍

石膏

麻黃 去根節 冬一兩 乾葛 七錢半

何首烏 半兩 忌鐵

右為細末每服三錢生姜三片水煎熱服

川芎散治婦人偏頭疼

川芎

甘菊花

石膏 各三錢

白殭蠶 六錢 生用

右為極細末每服三錢茶清調下

清寧散治婦人偏頭痛連睛痛者

石膏

黍粘子炒

川芎各等分

菊花

細辛半

右為末茶清調下食前

湧泉散治婦人妳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬去心

龍骨

川山甲

炮黃

王不留行

右為細末每服一錢熱酒調下後喫猪蹄

羹少許又用木梳左右乳上梳三二十下

日三服

芫荽散治乳汁少

芫荽根

薄荷幹

等分爲末
酒調服

右先喫羊骨汁一碗次服藥後再喫葱絲
羊羹少時微汗出效

劑三

下乳散

粳米

糯米

各半

生甘草

兩半

藜蘆子

一合並
淘淨

右煎汁一升研藥令極細去滓分作三服

下乳散

乳香散治吹妳

乳香

一錢

括萋根

末一兩

右研勻每服二錢温酒調下

又用天南星末温湯調塗之

橘皮散治乳癰初發神效

橘皮

湯浸去白晒乾麵炒微黃

右為末每服二錢麝香研酒調服

菘萋散治乳癰妳勞屢效

菘萋

一箇去皮焙為末

生甘草

一錢

乳香

一錢

沒藥

二錢末

當歸

酒浸焙

右用無灰酒三升銀石器內慢火熬取一

升清汁分三服

連喬散治妬乳

連喬

升麻

磁硝各一兩

玄參

芍藥

白飲

例三

防已

射干各八錢

大黃二錢

甘草六錢

杏仁四十箇
去皮尖

右以咀水五升煮二升後下大黃數沸却

下硝分三服

陰蝕齋方

當歸

芍藥

甘草

下地榆三兩

芎藭各三兩

右細切以水五升煮取二升去滓熏洗日

三夜一

又方蒲黃升一

水銀一兩二味研均以粉上

又方蝦蟇

兔屎等分為末敷瘡上良

治婦人夢與鬼交妄有所見聞言語錯亂

伏神一兩半

茯苓

人參

石菖蒲各一兩

赤小豆半兩

右吹咀每服四錢水一盞煎食前温服

辟邪丹治婦人與鬼魅交通

鹿頭骨

二兩

朱砂

雄黃

雌黃

鬼臼

皂莢

鬼箭

黎盧

蕪夷仁

各一兩

右件生為末，陳蜜丸，如彈子，火囊盛，或下丸。

男左女右繫臂上，及用一丸當病人戶前。

燒之一切邪鬼不敢近。

菖蒲散治婦人月水澁滯，陰間腫痛。

菖蒲

當歸

各一兩

秦艽

七錢

吳茱萸

半兩

製

右為粗末每服三錢水一盞葱白五寸煎
空心溫服

又方艾葉

五兩

防風

三兩

大戟

二兩

右剉細以水一斗煮取五升熱洗日三切

宜避風冷

治婦人陰腫或瘡爛者

則三

十

麻黃

黃連

蛇床

各二兩

艾葉

一兩半

烏梅

十箇

右剉細以水一斗煮取五升去滓熱洗

大風冷

大黃散治陰痒

大黃微炒

黃芩

黃耆各一兩

赤芍藥

玄參

丹參

山茱萸

蛇床子

各半兩

右為細末食前溫酒調二錢服

又方杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又方蒜煮湯洗之一方用枸杞根煎湯洗之

又方取雞肝乘熱納陰中如有蟲當盡下

治陰痒脫方

礬石為末空心酒服方寸七日三

治陰挺下脫方

當歸炒

黃芩各三兩

牡蠣二兩半

蛻皮炙一兩

赤芍藥一兩半

右為細末每服二錢食前煖酒調下米飲

亦可

治陰中生瘡方

測三

士

杏仁炒存性

雄黃

礬石各半兩

麝香一錢二分

右為末敷陰中

內補丸治婦女五勞七傷子息斷緒服一月

當妊娠百病皆愈

草薢

四兩

牛膝

五加皮

白朮

各二兩

川烏

炮

枳實

炒

丹參

各一兩

右為細末鍊蜜丸如桐子大溫酒下二十

丸空心日午晡後各進一服有娠住服

辨證詩括

紫色紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃色

困脾端

觀兒顏色及男左女右手二指節文如經過三節上者難治自下而上看

全嬰紫圓治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒

温壯后熱不歇腹中有痰癖哺乳不進乳則吐覘食癩先寒後熱此方無所不治雖下不虛人

代赭石

赤石脂

各一兩

大杏仁

五十粒
去皮尖

巴豆

三十粒
去殼用
厚紙追去油

或加青蒙石

二錢重另
為末入和

右石二味為末別研巴杏為膏相和更擣一二千杵當自相得若硬入鍊熟蜜少許同杵收密器中若生纔三十日兒服止如麻子大一粒與少乳汁令下食頃又與坐

乳勿令多至日中當小下則熱除若未全
除明日更與一粒如百日兒圓如小豆一
粒以此準定加減

蓋小兒初生骨骼未成筋骨未就臟腑未
充精神未全氣血虛浮肌膚軟脆資乳以

例三

十二

養積漸增長故有變蒸之候三十二日爲
一變變者變其形容再變爲一蒸蒸者蒸
長肌肉十變而五小蒸又四大蒸積五百
七十六日大小蒸俱畢乃得成人故當變
蒸之時輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇

頭有白泡起如魚目珠子微汗時出其重者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲乳食食輒吐喎目白微赤黑睛微白變蒸畢則目明矣此乃氣血周流肌膚充溢所致謹無他治但少與紫圓微下其熱即退若二

次下後身有熱而耳熱尻熱乃爲他病宜

別治焉

保嬰桃紅散亦可用水煮麵糊爲丸如龍眼大臨用各依湯使磨化服如用吞服則丸如菜豆大每服十五丸

川烏

白附子

各五錢
生用

大南星

陳半夏

各二錢
生用

右剉碎以新汲井花水拌濕瓦器中浸之
春五夏三秋七冬十日晒夜露一日一換
新水日足晒乾為末以好大粒朱砂五錢

重另研為細末和如桃紅色為度

治急驚
風薄苛

燈心金銀環同煎

○慢驚用全蝎鈎藤同煎

湯下重則灸百會

○煎湯下重灸百會

○嘔瀉姜葱煎湯下

○或老腹疼痛淡咳

○未飲加酸醋一呷下

○姜湯下有

桑白皮胎驚夜啼及覺腹中有蟲用

煎湯下○苦練根皮煎湯露一宿下

傷風咳嗽姜○瘡亦姜葱湯下後用

葱煎湯下○姜湯調末子服尤佳

保命丹治小兒急慢驚風痰涎壅盛牙關緊
急角弓反張睡中驚跳哭泣叫喚偏搐斜目
面青臉赤兩眼直視手足搐搦天吊客忤搖
頭上竄一切風痰並皆治之

大箇無油南星 二兩 煨

朋砂 淨六錢

白殭蠶 二兩 姜汁浸炒

茯神 去皮尖 六錢

蟬退 去頭足翅 淨一兩

白礬 火枯 一兩

天龍 即蜈蚣也 四條 酒煮

麝香 一錢

全蝎 去尾毒 淨用二兩 糯米炒黃為度 去米

遠志 去骨用 淨肉一兩 甘草一節同煮過去草

大粒朱砂

五錢另研為衣

猪牙皂角

二兩打碎煎濃汁

右先將南星煨以皂角汁淬十數次餘皂
汁留煮米糊以前藥俱為末丸如龍眼大
以朱砂為衣陰乾每用一丸以薄苛燈草

金銀環子同煎湯浸磨化臨時於火上頓

溫與服

保童丹治小兒急慢驚風痰涎咳喘喘滿不
進乳食蟲疳積熱膨脹等證

陳枳殼

五對大者去根用巴豆七粒去殼入內以線十字縛定好醋反

覆者軟去巴切片
焙乾餘醋留煮糊

三稜

莪朮 煨各五錢

金箔 十箇

朱砂 二錢另研

右為末以前醋煮麵糊為丸菘豆大朱砂
為衣未及周歲一九周歲已上三丸三歲
已下五丸已上七丸用薄苛燈心金銀環
例三
同煎湯下不能吞磨化與服



急救仙方卷之三

