



孫真人備急千金要方卷之三十六  
宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

醫心方卷之三十六  
秘閣校理林億等校正

膽腑方

膽腑脉論第一

論曰膽腑者主肝也肝合氣於膽膽者中清之腑也難經云膽者清淨之

腑甲乙云中號將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短

葉間下貯水精汁二合難經作三合能怒能喜能剛能柔目下果大

其膽乃橫凡膽腦髓骨脉女子胞此六者地氣之所生也皆藏

於陰而象於地故藏而不瀉名曰奇恆之腑若胃大腸小腸三

焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五

臟濁氣名曰傳化之腑此不能久留輸瀉者也所謂五臟者藏

小山山房

卷之三十六

喬氏世定刻行

精氣甲乙作神而不瀉故瀉而不能實六腑者傳化物而不藏故實

而不能滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而

胃虛故曰實而不滿瀉而不實也

左手關上陽絕者無膽脉也若膝疼口中苦眯目善畏如見鬼

多驚少力刺足厥陰治陰在足大趾間或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也若腹中不安身軀習習也刺足少陽

治陽在足上第二趾本節後一寸是也

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介

然數嚙候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱

刺陽陵泉若善嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之

邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三



里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也

膽脹者脇下痛脹口苦太息

肝前受病移於膽肝效不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢鬪甲乙云夢鬪訟自刺

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急

爪爽色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽

結

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏濁其病若實極則傷熱

熱則驚動精神而不守卧起不定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩

不能獨卧發於玄水其根在膽先從頭面起腫至足方見治水篇中

小丘山房

金匱卷三十八

喬氏世定刻行

膽有病則肩為之傾病人肩系傾者七日内必死

足少陽之脉是動則病口苦善太息心脇痛不能及側甚則面

微塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭痛角

領痛目兌背痛缺盆中腫痛腋腫馬刀挾癭汗出振寒瘧胃

中脇助髀膝外至脢絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用

盛者則入迎大一倍於寸口虛者則入迎及小於寸口也其經

筋支別已  
肝臟部十

膽虛實第二 脈方  
灸法

膽實熱

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽

乾頭痛洒洒惡寒脇痛名曰膽實熱也

半夏湯治膽腑實執精神不守瀉熱方

半夏 宿薑各三兩 黃芩一兩 生地黃五兩 遠志

茯苓各二兩 秫米一斗 酸棗仁五合

右八味㕮咀以千里長流水五斗煮秫米令蟹目沸揚一千

餘徧澄清取九升煮藥取三升半分三服集驗方治虛煩悶

志有麥門冬桂心各三兩其草人參各二兩

治胃中膽病方

灸濁浴隨年壯穴在俠膽輸傍行相去五寸

膽虛寒

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖臂不能起僵仆目黃失精眊眊名曰膽虛寒也

小山山房

一合卷三十一

喬氏世定刻行

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此方

半夏 竹茹 枳實各二兩 橘皮三兩 生薑四兩

甘草一兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升分三服

治膽虛方

灸三陰交各二十壯穴在內踝上一夫

千里流水湯治虛煩不得眠方

麥門冬 半夏各三兩 茯苓四兩 酸棗仁二升 甘草

桂心 黃芩 遠志 草解 人參

生薑各二兩 秫米一斗

右十二味㕮咀以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚萬遍

清取一斗煮藥取二升半分三服

酸棗湯治虛勞煩擾奔氣在胃中不得眠方

酸棗仁升五人參

桂心

生薑各二兩

石膏兩四

茯苓

知母各三兩甘草一兩

右八味咬咀以水一斗先煮酸棗仁取七升去滓下藥煮取三升分三服日三

治虛勞煩悶不得眠方

大棗二七枚葱白七莖

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

梔子湯治大下後虛勞不得眠劇者顛倒悞懷欲死方仲景云發汗吐

下後虛煩不得眠若劇者必反覆頭胸心中懊憹梔子湯主之

小丘山房

全方卷三十一

四

喬氏世定刻行

大梔子十四枚豉七合

右二味以水四升先煮梔子取二升半內豉更煮三沸去滓

每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮二兩亦可加生

薑二兩

治煩悶不得眠方

枸犯皮白生地黃五兩麥門冬

前胡各二兩

茯苓

知母各四兩人參二兩粟米

豉各五合

右十味咬咀以水八升煮取三升七合分四服

治虛勞不得眠方

酸棗 榆葉各等分

右二味為末蜜丸如梧子每服十五丸日再為度

又方乾薑四兩為末湯和頓服覆取汗病愈

咽門論第三

論曰夫咽門者應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨胞囊舌者並津液調五味之氣本也不可不研乎咽門者肝膽之使也其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸主通五臟六腑津液神氣應十二時若臟熱則咽門閉而氣塞若腑寒則咽門破而聲嘶毋薑酒主之方見別卷熱則通之寒則補之若寒熱調和病不生矣

髓虛實第四論

論曰髓虛者腦痛不安髓實者身痺凡髓虛實之應主於肝膽若其腑臟有病從髓生熱則應臟寒則應腑

小丘山房

二卷卷三十一

五 喬氏世定刻行

羌活補髓圓治髓虛腦痛不安膽腑中寒方

羌活

芎藭

當歸各三兩

桂心二兩

人參四兩

棗肉

研如脂

羊髓

酥各一升

牛髓

大麻仁各二升

研如脂

右十味先擣五種乾藥為末下棗膏麻人又擣相濡為一家下二髓并酥內銅鉢中重湯煎取好為丸如梧子酒服三十丸日二服稍加至四十九

柴胡發泄湯治髓實勇悍驚熱主熱方

柴胡

升麻

黃芩

細辛

枳實

枳子仁

砒硝三兩

淡竹葉

生地黃一升澤瀉四兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓下消分三服

風虛雜補酒前第五方

巴戟天酒治虛羸陽道不舉五勞七傷百病能食下氣方

巴戟天 牛膝各三斤 枸杞根白皮 麥門冬 地黃

防風各二斤

右六味並生用卒無生者用乾者亦得咬咀以酒一石四斗浸七日去滓溫服常令酒氣相續勿至醉吐慎生冷猪魚油蒜春七日新月二七日夏勿服先患冷者加乾薑桂心各一斤好忘加遠志一斤大虛勞加五味子菴蓉各一斤陰下濕加五加根皮一斤有石斛加一斤佳每加一斤藥則加酒七升此酒每年八九月中旬即合入十月上旬即服設服餘藥以此酒下之大妙滓曝乾搗為末以此酒服方寸七日三益

小山房

李卷二一八

喬氏世定刻行

又方

生常加甘草十兩佳虛勞加黃耆一斤

巴戟天 生牛膝各三斤

右二味咬咀以酒五斗淹浸服如前法

五加酒治虛勞不足方

五加皮 枸杞根白皮各一斗

右二味咬咀以水一石五斗煮取汁七斗分取四斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米多少如常釀法熟壓取服之多少任性禁如藥法倍日將息

天門冬大煎治男子五勞七傷八風十二痺傷中六極一氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛二肺極則寒痺腰痛心下堅有

積聚小便不利手足不仁三脈極則顏色苦青逆意喜恍惚失  
 氣狀似悲泣之後苦舌強咽喉乾寒熱惡風不可動不嗜食苦  
 眩喜怒妄言四筋極則拘攣小腹脹心痛膝寒冷四肢骨節皆  
 痛疼五骨極則肢節厥逆黃疸消渴癱疽妄發重病浮腫如水  
 病狀六肉極則發瘡如得擊不復言甚者至死復生衆醫所不  
 能治此皆六極七傷所致非獨房室之為也憂焦積思喜怒悲  
 懽復隨風濕結氣欬時嘔吐食已變大小便不利時泄利重下  
 溺血上氣吐下乍寒乍熱卧不安席小便赤黃時時惡夢夢與  
 死人共飲食入冢神室魂魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相  
 引難可俯仰氣極則傷肺傷肺則小便有血目不明髓極則陰  
 痿不起住而不交骨極則傷腎傷腎則短氣不可久立陰痿惡  
 寒甚者卵縮陰下生瘡濕痒搔不欲住汁出此皆為腎病甚  
 者多遭風毒四肢頑痺手足浮腫名曰脚弱一名脚氣醫所不  
 治此悉主之方

小丘山房

卷三十八

七

喬氏世定刻行

天門冬

生地黃

各切三斗半  
搗壓盡取汁

白蜜

三升  
鍊

枸杞根

切三斗淨洗以水二石五  
斗煮取一斗三升澄清

麈膏

一具搗碎  
以水一石

煮取五  
斗澄清

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃合煎

取大斗二斗下後件散藥煎取一斗內銅器重釜煎令隱掌

可丸如梧子大平旦空腹酒服二十九日二加至五十九慎

生冷醋滑猪鷄魚蒜油麵等漬擇四時王相日脩合其合和

一如第一卷合和篇說散藥如左



茯苓 桂心 白朮 萎蕤 五加皮

菖蒲 遠志 澤瀉 薯蕷 栝子仁

人參 石斛 牛膝 杜仲 覆盆子

細辛 獨活 枳實 芎藭 大豆黃卷

黃耆 茯苓 續斷 狗脊 胡麻仁

草薺 白芷 橘皮 茯神 巴戟天

石南各二兩 阿膠十兩 甘草六兩 蜀椒 薏苡仁一升

大棗一百枚 鹿角膠五兩 蔓荊子三兩

右三十八味治下節內煎中有牛髓鹿髓各加三升大佳小

便澁去栝子人加秦芫二兩乾地黃六兩陰痿失精去萎蕤

加五味子二兩頭風去栝子人加菊花防風各二兩小便利

小丘山瘠 今卷三一八 喬氏世定刻行

陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾薑

二兩無他疾依方修合凡此煎九月下旬採藥立冬日合服

至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬止若

停留經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥中上

加沙覆之則經夏不損也女人先患熱者得服患冷者勿服

填骨萬金煎治內勞少氣寒心裏急腹中喘逆腰脊痛方

生地黃三十斤 肉苻蓉 甘草 阿膠各一斤

麥門冬 乾地黃二斤 乾薑 茯苓 桑根白皮

桂心各八兩 人參 桔梗 五味子 附子各五兩

石斛一斤 牛髓一斤 白蜜十斤 清酒四斗 麻子仁三升

大棗一百枚 當歸十四兩 乾漆二十兩 蜀椒四兩

右二十三味先以清酒二斗六升內桑根白皮麻子人棗根為刻識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半日許令可丸止大甕盛飲吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱煮煎轉味可以蜜地黃汁和諸藥成末為丸如梧子服十五丸不知稍加至三十九

治男子風虛勞損兼時氣方

甘草一斤

石斛

防風

菴蓉

山茱萸

茯苓

人參

薯蕷各四兩

桂心

牛膝

五味子

菟絲子

巴戟天

芫薺

各三兩並為末

生地骨皮碎切

生地黃汁各一升

丹參二兩

生薑汁

胡麻以水二斗煮取四升去滓各二升

牛髓

小丘山房

金匱卷三十一

九

喬氏世定刻行

白蜜

生麥門冬汁各三升

右二十二味先煮地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓蜜薑門冬各等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調內銅鉢中湯上煎令可丸如梧子大酒服三十九日二加至五十九

鹿骨一具碎

枸杞根切二升

右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃合一器

共煎取五升日二服盡好將慎皆用大斗

地黃小煎治五勞七傷羸瘦乾削方

乾地黄末一斤

胡麻油半蜜二升

猪脂一斤

右四味銅器中煎令可丸如梧子大飲服三九日稍加十九

久久常服大有所益瘦黑者肥充

陸抗膏治虛冷枯瘦身無精光虛損諸不足方

牛髓 羊脂二升 酥 經心錄用猪脂 生薑汁 白蜜 各三升

右五味先煎酥令熟次內薑汁次內蜜次內羊脂牛髓後微火煎三上三下令薑汁水氣盡即膏成攪令凝止溫酒服隨人能否不限多少令人肥健發熱也 經心錄云治百病勞損風濕補益神效男女通

可服之良

枸杞煎補虛羸久服輕身不老神驗方

九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煮五六沸出取熟研瀘取汁令其子極淨曝令乾搗末和前汁微火煎令

可丸酒服二方寸七日二加至三七亦可丸服三十九

小丘山房

金卷三十一

喬氏世定刻行

夏雜杏人煎方

杏人三升內湯中去皮尖兩入熟搗盆中水研取七八升

汁以鐵釜置瘧火上取羊脂四斤就釜內磨消內杏人汁

溫之四五日色如金狀餌如彈子日三服百日肥白容易

人不能識也

又方杏人熬黃去皮尖搗服如梧子日三治枯瘦令人潤澤無所禁欬逆上氣喉中百病心下煩不得咽者得茯苓款冬紫菀併力大良其藥生熟熟冷喉中如有息肉者亦服之桃人煎方

桃仁 為末 蜜 各一斤 酥 半斤 胡麻 一升 牛乳 五升

地黃 十斤

右六味合煎如飴旋服之

治五勞七傷方

白羊頭蹄

一具淨治更以羊火燒令黃赤以淨綿急塞鼻及腦孔

胡椒

葷撥

乾薑

各一兩 葱白一升 豉二升

右七味先以水煮頭及蹄半熟即內藥煮令極爛去藥冷暖任性食之日一具七日凡七具忌生冷酢滑五辛陳臭等物

治虛勞補方

羊肚

一具 白朮一升

右二味以水二斗煮取六升每服二升日三為度

又方

豉

一升蒸三遍 薤白一升

右二味以水七斗煮取三升分三服小取汗

小丘山房

金匱卷三十八

十一

喬氏世定刻行

滑煎治虛羸瘦方

不中水猪肪煎取一升內葱白一握煎令黃出內盆中平旦空腹服訖暖覆卧至晡時食白粥粥不得稀過三日服

補藥方如左

羊肝

一具 羊脊膂肉一條

麩末

半斤 枸杞根十斤

右四味以水三斗煮枸杞取一斗去滓細切肝等內汁中煮著葱豉鹽如羹法合煎看如稠糖即好食之七日禁如藥法

補虛方

猪肚

一具 人參五兩

蜀椒

一兩 乾薑半兩

葱白

七兩

白梁米

半斤 千金翼用粳米

右六味吹咀諸藥令相得和米內肚中縫合勿令泄氣取四

斗半水緩火爛煮空腹食之大佳兼下少飯

吐血第六

論方灸法

論曰稟丘云吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或如豆羹汁或如切蠟血凝停胃中因即痛悶便吐或去數斗至一石若是也得之於勞倦飲食過常所為也肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半升一升是也傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不能消化不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臍因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹絞痛白汗出其脉緊而數者為難治也問曰病胃脇支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先嘔血四肢清目眩時時前後小丘山房

千金卷三十一

二

喬氏世定刻行

血病名為何何以得之對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血若醉入房中氣竭而肝傷故使月事衰少不來也治以鷓鴣骨蘭茹二味并合丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也凡吐血後體中但自掩掩然心中不悶者輒自愈假令煩躁心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃土湯阿膠散益加悶亂卒至不濟如此悶者當急吐之方

瓜蒂

分二

杜蘅

人參

各一分

右三味治下篩服一錢匕或無水漿但得下即可羸人小減之吐去青黃或吐血一二升無苦

黃土湯治吐血方

伏龍肝鷄子大二枚

桂心

乾薑

當歸

芍藥

白芷

甘草

阿膠

芎藭各一兩

生地黃

八兩細辛半兩

吳茱萸二升

右十二味咬咀以酒七升水三升合煮取三升半去滓內膠

煮取三升分三服亦治衄血

又方治卒吐血及衄血方

伏龍肝半斤甘草

乾薑仲景作地黃

白木

阿膠

黃芩各三兩

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓下膠分三服仲景有附子三

兩為七味

生地黃湯治憂恚嘔血煩滿少氣胸中痛方

生地黃

一斤大棗五十枚阿膠

甘草各三兩

小丘山房

一合卷三十八

十三

喬氏世定刻行

右四味咬咀以水一斗煮取四升分四服日三夜一

堅中湯治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方

糖斤三

芍藥

半夏

生薑

桂心

二兩

大棗五十枚

右七味咬咀以水二斗煮取七升分七服日五夜二千金翼無甘草

桂心有生地黃

治噫止唾血方

石膏四兩

厚朴三兩

麻黃

生薑

五味子

半夏

杏仁各二兩

小麥一斤

右八味咬咀以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內藥煮取二

升半分再服

治吐血脅中塞痛方

芍藥 乾薑 茯苓 桂心 當歸

大黃 碎硝各三兩 阿膠 甘草 人參各二兩

麻黃一兩 乾地黃四兩 蟲蟲 水蛭各八枚 大棗二十枚

桃仁一百枚

右十六味吹咀以水一斗七升煮取四升分五服日三夜二

治吐血內崩上氣面色如土方

乾薑 阿膠 栝葉各二把 艾一把

右四味吹咀以水五升煮取一升內馬通汁一升煮取一升

頓服仲景名栝葉湯不用阿膠小品不用栝葉與肘後同

治吐血酒客溫疫中熱毒乾嘔心煩方

小丘山房

金卷三十八

一四

喬氏世定刻行

蒲黃 犀角 枯蕒根 甘草各二兩 葛根

桑寄生各三兩

右六味吹咀以水七升煮取三分三服

澤蘭湯治傷中裏急脅脇痛欲嘔血時寒時熱小便赤黃此皆傷於房勞故也

澤蘭 糖各一斤 桂心 桑根白皮 人參各二兩

遠志二兩 生薑五兩 麻仁一升

右八味吹咀以醇酒一斗五升煮取七升去滓內糖食前服

一升日三夜一勿勞動

治忽吐血一兩口或是心衄或是內崩方

蟬螬五枚 牛膝 牡丹 王不留行

麥門冬二兩 草薢

芍藥

乾地黄四續斷

阿膠各三兩

右十味吹咀以生地黃汁五升赤馬通汁三升煮取三升分

三服不瘥更合數劑取瘥止

又方熟艾三鷄子許水五升煮取二升頓服

又方燒亂髮灰水服方寸七日三服集驗云治舌上忽出血如簪孔者亦治小便出血者

治虛勞吐血方

生地黃肥者五升搗以酒一升煮沸三上三下去滓頓服

又方凡吐血服桂心末方寸七日夜可二十服肘後云亦療下血良

又方生地黃五斤絞取汁微火煎三沸投白蜜一升又煎取三

升每服半升日三主胃痛百病又服佳

小丘山房

二會卷三一八

一五

喬氏世定刻行

又方栝葉一斤以水六升煮取三升分三服

又方

生地黃汁半升

川大黃末一方寸七

石二味先溫地黃汁一沸次內大黃攪和空腹頓服目三瘥

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不汗之內畜血者及鼻

衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面黃消瘀血方

犀角一兩 生地黃八兩 芍藥三兩 牡丹皮二兩

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂者加大

黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱

但依方不須有所增加

治五臟熱結吐血衄血方



伏龍肝雞子一枚

生竹茹升芍藥

當歸

黃芩 芍藥

甘草各二兩 生地黃一斤

右八味咬咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下藥取三升

分三服千金翼有桂心

當歸湯治衄血吐血方

當歸 乾薑

芍藥

阿膠各二兩

黃芩三兩

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死並主之

艾葉

竹茹各一升 阿膠如手掌大 乾薑二兩

右四味咬咀以水三升煮取一升去滓內馬通汁半升煮取

一升頓服

小丘山房

金卷三十八

十六

喬氏世定刻行

又方取新馬屎與少水和絞取汁一方不用竹茹加乾薑作七

兩

治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絕面黑如漆方

黃耆

芍藥

芎藭

甘草各四兩

生薑一斤

右五味咬咀以酒五升浸一宿明旦更以水五升煮取四升

分四服日三夜一下陰中毒如湯沃雪凡夏月不得宿浸藥

酒客勞熱發痔下血其穀道熱者去生薑用生地黃代之凡

進三兩劑

竹茹湯治吐血汗血大小便下血方

竹茹二升

甘草

芎藭

黃芩

當歸各六分

芍藥

白朮

人參

桂心各一斤

右九味吹咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

治九孔出血方

擣荆葉汁酒服二合一本作荆芥

治吐血蟲毒痔血女子腰腹痛大便後出清血者方

取東向蕤荷根擣絞取汁二升頓服立瘥

赤小豆散諸下血先見血後見便此為遠血宜服黃土湯方見前七

味仲景方是先見便後見血此近血宜服赤小豆散方

赤小豆三升煮令折 當歸三兩

右二味治下節每服方寸七日三

乾地黃圓治血虛勞胃腹煩滿痠痛瘀血往來臟虛不受穀氣

逆不得食補中理血方

小丘山房

二卷卷三一八 一七

喬氏世定刻行

乾地黃三兩 當歸兩 乾薑 麥門冬 甘草

黃芩各二兩 厚朴 乾漆 枳實 防風

大黃 細辛 白木各一兩 茯苓五兩 前明六分

人參五分 蟲蟲 麝蟲各五分

右十八味為末蜜丸如梧子大先食服十九日三稍加

麥門冬湯治凡下血虛極方

麥門冬 白木各四兩 甘草一兩 牡礪 芍藥

阿膠各三兩 大棗二十枚

右七味吹咀以水八升煮取二升分再服

胃中瘀血楮滿脇膈痛不能久立膝痿寒三里主之

嘔血肩脇痛口乾心痛與背相引不可效欬引腎痛不容主之

容一作

心膈下嘔血上管主之

唾血振寒盪乾大淵主之

嘔血太濇及却門主之

嘔血上氣神門主之

內傷唾血不足外無膏澤刺地五會

灸法

治虛勞吐血灸胃管三百壯亦主勞嘔逆吐血少食多飽多唾

百病多唾一作多睡

吐血唾血灸胃堂百壯不可針

吐血酸削灸肝輸百壯

吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯

吐血唾血上氣欬逆灸肺輸隨年壯

小丘山房

千金方卷三十一

十八

喬氏世定刻行

吐血嘔逆灸手心主五十壯

千金翼云太陵是

凡口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯入髮際一寸是

大便下血灸第二十椎隨年壯

孫真人備急千金要方卷之三十八

宋朝奉即守太常少卿充秘閣校理林億等校正

膽腑方

萬病丸散第七

方論

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以此方散在群典乃令學者難用討尋遂鳩撮要妙以為斯品庶使造次可得好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備病瘥也

芫花散治一切風冷痰飲癰瘡疔瘻萬醫所不治者皆治之

一名登仙酒

一名三建散

芫花

桔梗

紫苑

大戟

王不留行

小丘山房

千金卷三十九

喬氏世定刻行

烏頭

附子

天雄

白朮

五加皮

芫花

很毒

莽草

藥劑

桔萸根

躑躅

麻黃

白芷

荆芥

茵芋

各十兩

車前子

石斛

人參

石南

石長生

各七分

蛇床子

葶藶

牛膝

狗脊

菟絲子

菴菴

秦艽

各五分

棘蘆

五分

薯蕷

薏苡仁

巴戟天

細辛

當歸

芎藭

乾地黄

食茱萸

杜仲

厚朴

茵香

山茱萸

乾薑

芍藥

桂心

黃芩

吳茱萸

防己

遠志

蜀椒

獨活

五味子

牡丹

橘皮

通草

柴胡

栝子仁

藜本

菖蒲

茯苓

續斷各二

右六十四味

千金翼有麻花半夏赤車使者高良薑紫葳無白朮食茱萸等七味

並不治不擇不炙不熬但振去塵土搗以粗羅下之即與服凡曼猪鷄五辛生冷酢滑任意食之無所忌惟諸豆皆殺藥不得食

藥散

兩

細麴末

二

糯米

三

貞酒

五

先以三大斗水煮米作粥極熟冬月揚去火氣春月稍涼夏月揚絕火氣令極冷秋稍溫次下麴末搗使和柔相得重下藥末搗使突突然好熟乃不真酒重搗使散盛不津氣中以淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知為度微覺發動流入四肢頭面習習然為定勿小丘山房

金卷三九

二

喬氏世定刻行

更加之如法服之常常內消非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無在稍增以知為度服丸者細下篩密丸如梧子每服七丸但此藥或丸或散皆可惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取內消大益勝於五石兼逐諸病功

十二種瘧痺拜風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水鷄聲不得眠卧飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿及連胷背鼓氣堅結流入四肢或復又心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疰蟲寸白諸虫上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無力陰入骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沉重行立不能久婦人因

產冷入于臟腑中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因此斷產拜小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病此藥以三九為一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其用牛黃為主故一名牛黃丸以耆婆良醫故名耆婆丸方

牛黃

麝香

犀角

各一分

桑白皮

茯苓

乾薑

桂心

當歸

芍藥

芍藥

甘遂

黃芩

蜀椒

細辛

桔梗

巴豆

前胡

紫莖

蒲黃

葶藶

防風

各五分

吳蚣

三節

石蛻

人參

朱砂

雄黃

黃連

大戟

禹餘糧

荒花

小丘山房

千金卷三十九

三

喬氏世定刻行

荒青

七枚

右三十一味

崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風為二十七味

並令精細牛黃麝香犀

角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合搗重絹下篩以白蜜

和更搗三千杵密封下破除日平且空腹酒服三九如梧子

大取微下三升惡水為良若卒暴病不拘平且早晚皆可服

但以吐利為度若不吐利更加一丸或至三九五九須吐利

為度不得限以丸數病強藥五服即定一服一盞治一切冷

病積冷萎瘦者四兩和酒一斗強者六兩和酒一斗半痰飲

疝瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗癥瘕腸鳴噫八兩和酒

二斗久症及久勞上同癰痔塊堅冷嗽上氣二十兩和酒五

斗奔豚冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒惡注忤心

腹脹氣急欲死者三服定一服一盞溫吐出鮮血瘴氣上同  
蠱毒五服定一服一盞溫瘡瘡瘡並上同可三服一盞末瘡  
治婦人諸風諸病等並依前件帶下十二兩和酒三斗崩中  
六兩和酒一斗半月閉不通及冷病不產並上同閉結不產  
八兩和酒二斗月水前後不調年多少亦令人絕產四兩  
和酒一斗產後風冷不產六兩和酒二斗若重者八兩和酒  
二斗甚者十六兩和酒三斗大重者子宮下垂十六兩和酒  
四斗

論曰遠覽前古莫親此方有高人李孝隆者自云隋初受之於  
定州山僧惠通道人此後用之大有效驗祕而不傳但得其  
其方不可得而聞始吾得之於靜智道人將三紀於茲矣時俗  
小丘山房

金牙卷三十九

四

喬氏世定刻行

名醫未之許也然比行之極有神驗其用藥殊不倫次將服節  
度大不近人情至於救急其驗特異方知神物效靈不拘常例  
至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其不知所以  
然而然雖聖人莫之辯也故之篇末以貽後嗣好學君子詳之  
非止救物兼深抑亦庶幾於博見矣  
太乙神精丹治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癩狂鬼語蠱毒  
妖魅溫瘧但是一切惡毒無所不治方

丹砂

曾青

雌黃

雄黃

礞石

各四兩

金牙

二兩半

右六味各搗絹下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醃醋浸之會  
青好酒用於銅器中漬紙密封訖日中曝百日經憂急五

亦得無日以火暖之然後各研令如細粉以醃酢拌使乾濕  
得所內土釜中以六一泥固濟勿令泄氣乾後安鐵環施脚  
高一尺五尺置釜上以漸放火無間軟硬炭等皆得切放火取  
熟兩秤炭各長四寸置釜上待三分二分盡即益如此三度盡  
用熟火然後用益生炭其過三上熟火已外皆須加火漸多及  
至一伏時其火已歇近釜即便滿就釜下益炭經兩度即罷火  
盡極冷然後出之其藥精飛化凝著釜上五色者上三色者  
次一色者下雖無五色但色光明皎潔如雪最佳若飛上不  
盡更令與火如前以確鷄翼掃取或多或少不定研和東膏  
丸如黍粒一本云丹砂會青雄黃雌黃各二斤丹砂以大酢  
黃雌黃各油煎九日九夜去油膩訖更搗數千杵皆勿研之  
別以大酢拌令泄泄然內藥土釜中以確黃在下次下雖黃  
小丘山房

次會青次丹砂以茸土泥塗勿令余毫毛許乾以剛炭火燒  
之九日九夜去釜五寸九日九夜至釜志九日九夜侵釜膜  
三寸三九二十七日夜之一日一夜以刀于釜際刮著一  
匝開之取丹砂成訖細研如粉以東膏和一切丹不得用密  
皆用東膏學者宜知此術舊不用磁石金牙今加而用之

治偏風大風惡疾癩癧癰疽鬼  
打等最良服法平旦空腹一九如黍米為度其瘡病積久百  
方不瘥又加心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服一九  
吐即瘥亦有不吐瘥者若不吐復不瘥者更服一九半仍不  
瘥者後日增半丸漸服無有不瘥氣亦定當吐出青黃白物  
其因瘡兩脇下有癍塊者亦當消除若心腹不脹滿者可與  
一九日日加之以知為度不必專須吐亦可一九即瘥勿併  
與服亦可三日一服皆須以意斟酌量得其宜或腹內有水  
便即下者勿恠若患瘡日近精神健亦可斟酌人藥性併與



兩丸作一丸頓服之皆至午後食勿使冷勿使熱或漿粥任  
意食之若病瘡盜汗虛弱者日服一丸至三日吐即止若患  
瘡不汗氣復不流腳冷者服一丸至三日若不汗氣復脚即  
暖有潤汗不至三日吐即止若患瘡無顏色者服藥後三日  
即有顏色亦有須吐差者亦有服少許而差者亦有殺藥強  
人服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同不可一槩與之但  
作黍米大服之為始漸加以知為度藥力驗壯勿併多服特  
慎油麵魚肉蒜當清淨服之若有患久不瘥在牀羸瘦腹  
脹滿及腫或下痢者多死但與藥救之十人中或瘥三四人  
也又一說瘥瘻積聚服一刀圭以飲棗水送下治諸至死中  
惡客忤霍亂腹滿體帶五尸疰惡風疰忤大病相易死亡疰  
小丘山房

金方卷二十九

六

喬氏世定刻行

門狂癲鬼語已死氣絕心上微暖者扶起其頭以物校開口不  
可開琢去兩齒以漿飲送藥藥下即活諸久病者日服一刀圭  
覆令汗汗出即愈不愈者不過再服亦有丕汗而瘥復有不汗  
不愈者服如上法加半刀圭以瘥為度當以絳囊帶丸刀圭散  
男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡時氣射小兒患可若酒和  
之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在上治之亦有已死者冬二  
日夏一日與此藥服得藥下便活若不得入腹不活若加金牙  
磁石者服至五服內必令人吐逆下利過此即自定其藥如小  
豆大為始從此漸小不得更大風惡癩可二十服偏風癩癩  
諸惡風癩癩等亦可二十服自餘諸惡者皆止二服量輕重  
弱強不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服此藥後不應頭

痛身熱二三日來大不能得食味後自漸得氣味五日後更能食若食貪過多者宜節之若服藥下悶亂可煮木防已湯服之即定凡言刀圭者以六粟為一刀圭一說云三小豆為一刀圭

作土釜法

其法取兩箇瓦盆各受二大斗許以甘土塗其內令極乾又

一法作一瓦釜作一熱鐵釜各受九升瓦在上鐵在下其狀

大小隨藥多少不必依此說一本云持好甘土編篩水和作泥硬軟如坭瓦泥一升

內細紙封持可受十斤亦可隨藥多少作之陰乾三十日

置日中曝亦三十日夕翻轉向日乾訖以糠五日內釜

糠中四土攪攤之令糠徧釜周圍上下各厚七寸以大從

下放五日五夜勿令人近之待過一日一夜乃取掃拭冷

淨以黃丹醋和如稀粥掃其中令厚一分乃內藥泥合九

丹八石招魂太清神仙諸大丹若用此釜作之萬成終不

作六一泥法

赤石脂 牡蠣 滑石 礞石 黃礬

鹵土 蚯蚓屎釜三兩

右取酸酢以足為度若無鹵土以鹽代之先作甘土泥以泥各

別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火燒周三日最好

一日亦得出火破團取藥各持碎絹篩然後與蚯蚓屎鹵土等

分以酢和之如稠粥既得好酢可用二分酢一分水和用煎前

瓦盆以此泥塗之曾青如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好葛盆

碌亦得瘥病丹砂亦妙粟砂亦得舊不用礞石金牙今加之湖

小丘山房

全卷三十九

七

喬氏世定刻行

落節其在釜六一泥及鐵釜皆除去之勿更用也此釜一具前後數十回用不動久久轉此法師甚秘之余欲令當來天下學士得解之所以委曲具述之也

萬種惡風神良凡有患連年積歲不可治者宜須合此一  
篇皆王相日天晴明齋戒沐浴如法合之

述曰古之仙者以此救俗特為至秘余以大業年中數以合和而  
若雄黃嘗青難得後於蜀中遇雄大黃賤又於飛鳥玄武大獲曾  
青蜀人不識今須識者隨其大小但作蚯蚓尿者即是如此千金  
可求遂於蜀縣魏家合成一釜以之治病神驗不可論宿癘風氣  
百日服者皆得痊愈故序而述焉

凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可丹不爾有毒慎勿生用丹必  
熱毒不堪服宜慎之

倉公散治卒鬼繫鬼疰鬼刺心腹痛如刺下血便死不知人及卧  
厥鬻齒脚踵不覺者諸惡毒氣病方此是漢文帝時太倉  
令淳于意方故名

特生礬石 皂莢 雄黃 藜蘆各等分

小丘山房

金卷三十九

八

喬氏世定刻行

右四味治下篩取如大豆許內管中吹入病人鼻得嚏則氣  
通便活若未嚏復更吹之以得嚏為度此藥起死回生

小金牙散治南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼疰方

金牙五分 雄黃 萆薢 黃芩 蜀椒  
由跋 桂心 莽草 天雄 朱砂

麝香 烏頭三分 牛黃一分 蜈蚣一板六寸者 細辛

菱藥 犀角 乾薑各三分 黃連四分

右十九味治下篩合牛黃麝香搗三千杵溫酒服錢五七  
日三夜二以知為度絳囊盛帶男左女右一吋七省病問孝

不避夜行塗人中最昏霧露亦塗之

太金牙散治一切蠱毒百症不祥醫所不治方

金牙

觀骨

石膏各八

斑猫七

活草子

胡燕矢

白木

雷允

龍牙各六

銅鏡鼻

梔子仁

乾擦

龜甲

鼈甲

鬼督郵

桃白皮

大黃各四

桂心

芍藥

徐長卿

羚羊角

射干

升麻

蒿尾

馬目毒公

蜂房

細辛

乾薑

碎硝

由跋

犀角

甘草

狼毒

蟻娘

龍膽

狼牙

雄黃

真珠各三

芫花

莽草

射罔

烏梅各一

蛇蛻皮尺

鐵精

赤小豆合一

地膽

樗雞

芫青各七

挑奴

巴豆各二

右五十味

治下篩服一刃圭稍加至二刃圭帶之碎百邪泥十

小丘山房

金卷三十九

九

喬氏世定刻行

九種疰

一本有麝香無白木

孫真人備急千金要方卷之三十九

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

心臟方

心臟脈論第一

論曰心主神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏王七十二日位在南方离宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火也腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出唇口知味榮華於耳外主血內主聲音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名响响主藏神號小山山房

今身卷四十

一 喬氏世定刻行

五神居隨節應會故云心藏脈脈舍神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢丘山煙火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脈洪相於春王於夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名鉤心脈洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄以終汗故名曰長長洪相得即引水漿溉灌經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊巳用牢根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脈浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母

夏脈如鉤夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來

盛去衰故曰鉤反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而虜痛為浸淫不及則令人煩心上見欬唾下為氣泄

心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病心脉來前曲後居如操帶鉤曰心死真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病

心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死于冬

小丘山房

二金方卷四十一

二

喬氏世定刻行

毛少陰氣絕則脉不通少陰者心脉也心者脉之合也脉不通則血不流血不流則髮不澤面黑如漆葉者血先死壬篤癸死水勝火也

心死藏浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心火王其脉浮大而散一作弦曰平反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母為實邪雖病自愈反得沉濡而滑者是腎之乘心水之剋火為賊邪大逆十死不治反得微澀而短者是肺之乘心金之陵火為微邪雖病即瘥腎乘心必瘥

左手關前寸口陰絕者無心脉也若心下熱痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸口陰實者心實也若

心下有水氣憂恚發之刺手心治陰

心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精  
五至死六至命盡手少陰脉也

心脉急甚為痹癢微急為心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩  
為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為喉介微大為心痺引  
背善涎出小甚為善噦微小為消痺甚為善渴微滑為心疝引  
臍小腹心澹甚為瘡微澹為血溢維厥耳鳴癩疾

心脉搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病瘡渴自己  
渴一作環

赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名心痺得之

外疾思慮而心虛故邪從之痛鵠曰心有病則口生瘡腐爛

小丘山房

金匱卷四

三 喬氏世定刻行

心在聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心精氣并於心則喜  
心虛則悲悲則憂實則笑笑則喜

時主夏病者時間時甚知其源取其輪觀其應審其害

病先發於心者心痛一日之肺喘効三日之肝脇痛支滿五日  
之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

病在心日中慧夜半甚平旦靜

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸

日方

凡心病之狀胃內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內  
痛虛則胃腹大脇下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌  
下血者其變病刺郄中血者

心肺沉之小而緊浮之不喘苦心聚氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜大息得之憂思

心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脉實火兩數此為可治宜服者關紐服春當刺中衝夏刺

勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之皆是手經又當灸巨闕伍拾壯背第五椎百壯邪在心則病心痛善悲

時眩仆視有餘不足而調其輸

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒

心中風者翕翕發熱不能起心中飢則飲食食則嘔

心中寒者其人病心如噉蒜齏狀劇者心痛徹背背痛徹心如

蠶注其脉浮者自吐乃愈也

小丘山房

千金卷四十一

四 喬氏世定刻行

心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍跳手其脉弦此為心臟傷所致也

邪哭使魂魄不安者血氣少者屬於心心氣虛者其人即畏合

目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者即為癩陽氣

衰者即為狂五臟者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚

者其五臟空虛也即邪神居之神靈所使鬼而下之脉短而微

其藏不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液即為涕

泣出肺氣衰者即泣出肝氣衰者魂不安肝主善怒其聲呼

心水者其人身體腫一作重而少氣不卧煩而躁其陰默真心痛

手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死

心腹痛懊懷發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱善



涎出者是蛇咬以手聚而堅持之無令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針腸中有蟲蛇咬皆不可取以小針

心脈者煩心短氣卧不安

凡心脈急名曰心疝小腹當有形其以心為莊藏小腸為之使故小腹當有形

診得心積沉而乳時上下無常處病胃滿溇腹中執面赤咽乾心煩掌中熱甚則唾血身癩癢主血厥夏差冬劇色赤也

心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久久不愈病煩心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結為積故知伏梁以秋得之

小山山房

千金卷四

五

喬氏世定刻行

心病煩悶少氣大熱熱上湯心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身體厥冷其脈當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黑者此是水剋火為大逆十死不治

徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣內傷傷則寒寒則虛虛則驚悸心悸定湯主之

方見別卷語聲前寬後急後聲不續前

混後濁口喎冒昧好自笑此為厲風入心荆瀝湯主之

方見別卷

虛風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪蓋附湯主之

方見別卷此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂

此為水剋火陰擊陽陰起而陽伏伏則實實則傷熱熱則狂悶亂冒昧言多謬誤不可採聽此心已傷若其人口唇正赤可療

青黃白黑不可療也

心病為瘡者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱

人本來心性高雅而忽弊急反於常白水酒主之

竟便佳以手剔脚爪此人必死禍雖未及名曰行尸此心病發

之候也虛則補之實則瀉之不可治者明以察之

赤為心心合脉赤如雞冠者吉心主舌舌是心之餘其久火形

相比於上微赤色廣明兌面小頭好有背髀腹小手足行安地

疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮見事明了好顧急心不

壽暴死耐春夏不耐秋冬感而生病主手少陰竅竅然體

骨長短傾正則心應之正赤色小理者則心小小則邪邪能傷

易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易傷

小丘山房

千金卷四

六

喬氏世定刻行

於邪無髑髒者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善

忘難開以言髑髒小短舉者則心下下則藏外易傷於寒易恐

以言髑髒長者則心堅堅則藏安守固髑髒弱以薄者則心脆

脆則善病消痺熱中髑髒直下不舉者則心端正端正則和利

難傷髑髒向一方者則心偏傾偏傾則操持不一無守司也

若髑髒小短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒病憂患內損

心悲痛而好唾清涎口臭齒痛下齒若髑髒高起則心高

高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙癰舌

傷小兒則便秘口重舌捲口聲嘶方見頭面篇中

凡人部分陷起者必有病生小腸太陽為心之部其處陷起即

病生矣藏含內外沉濁屬內浮清居外若外病內入小腹滿起

內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內出外前補陰後

瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休

谷則藏神前變形于外人心前病則口爲之開張若心前死則  
枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之卯死不治看應增損甚  
酌驗從賒則不出四百日內促則不賒旬月之間心病少愈而卒  
死何以知之曰赤黑色黥點顏即若見顏度年上必卒死心絕  
一日死何以知之兩目回回直視有息立死凡面赤目白憂恚思  
慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日死又面黃目赤不  
死亦不死赤如衄血死吉凶之色若在於分部臍臍而見赤黑  
入口此必死不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必  
死矣

夏大心脉色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏者火始治心氣  
始長脉瘦氣弱陽氣留溢熱熏分腠內至於經故取盛經腠絕

小丘山房

千金方卷四十一

七

喬氏世定刻行

膚而病者邪居淺也所謂盛經者陽脉也其脉本在外踝之後  
應在命門之上三寸命門者在心上一寸也脉根在少澤少澤  
在手小指端

其筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結肘內兌骨之後彈  
之應小指之上入結腋下其支者後走腋後廉上繞有甲循頸  
出足太陽之筋前結於耳後完骨其支者入耳中直出上下結  
於頷上屬目外眦

其脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉  
出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞有甲交肩入上缺  
盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰  
至目兌骨脚入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡於

顛合手少陰為表裏少陰本在兌骨之端應在背後同會于手太陰

其手太陽之別名曰支止上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃主心生病病實則小腸熱熱則節弛弛則陽病陽脈反逆於寸口再倍病則噤痛頰腫耳聾目黃卧不能言悶則急坐虛則小腸寒寒則生疝疝則陰病陰脈反小於寸口過於壹倍病則短氣百節痛筋急頸痛不能轉顧

此蓋是手太陽小腸經筋支別為病今取心

主胞絡少陰心經附于後

手心主之別名曰內關去腕五寸甲乙竹出於兩筋間循經以

上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則為煩心取之兩筋間

手心主之脈起於胃中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胃

小山山房

千金方卷四十一

喬氏世定刻行

出膈下腋三寸上抵腋下循膈內行大陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指出其端也動則病手心熱肘臂掣急肢腫甚則胃膈支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎

手少陰之別名曰通理在腕後一寸別而上行循經入咽中系

舌本屬目系其實則大膈虛則不能言取之掌後一寸別走太

陽

手少陰之脈起於心中出屬心系上膈絡小腸其支者從心系

上俠因系目系糸曰系一作循會而出其直者復從心系却上肺出腋下

下循膈內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌

後兗骨之端入掌後內廉循小指之內出其端是動則病噎乾

心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃腸滿痛膈臂

內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補之盛者則

寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎

手少陰之脉獨無輸何也曰少陰者心脉也心者五臟六腑之

大主也為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則傷心

心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡

者心主之脉也故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經

腑病臟不病故獨取其經於掌後兗骨之端也

小山山房

十全方卷四

九 喬氏世定刻行

夏三月主心小腸赤脉攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而

停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則

臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰

脉掉捉所不禁臟實則為陽毒所侵肉熱口開舌破咽塞聲嘶

故曰赤脉攢病方見傷寒卷中

扁鵲云灸腎肝心三輪主治丹一作痺毒病當依源為治表洽陰

陽調和臟腑疾不生矣

心虛實第二脉方灸法

心實熱

左手寸口人迎以前脉陰實者手少陰經也病苦閉大便不

利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也

石膏湯治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛方

石膏斤 淡竹葉 香鼓各一 小麥

地骨皮兩五 茯苓三 梔子仁三

右七味咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次

下諸藥煮取二升去滓分三服外薑名 瀉肺湯

瀉心湯治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安

方

人參 黃苓 甘草各一 乾薑一兩

黃連 半夏 大棗十二

右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服并治霍亂若寒

加附子一枚渴加栝蒌根二兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一

小丘山房 千金卷早 十 喬氏世定刻行

兩客熱以生薑代乾薑

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實也

病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不轉水較實

也名曰心小腸俱實

竹瀝湯治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安方

淡竹瀝 生地黃汁升各一 石膏兩八 芍藥

白朮 人參 梔子仁各三 赤石脂

養菴 知母 茯苓各二

右十一味咬咀以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝

更煎取三升若瀕利入苦消二兩去芍藥分三服

神散治心實熱口乾煩渴眠臥不安方

茯神 麥門冬各三十

通草

升麻各三

紫菀 桂心各十

知母一兩

赤石脂二銖

大棗二十枚 淡竹茹雞子一

石十味治下篩為粗散以帛裹方寸匕井花水二升半煮取

合時動裏子為一眼日再

湯治心氣不定吐血衄血方

大黃二兩 黃連

黃芩各一兩

三味吹咀以水三升煮取一升頓服亦治霍亂

散治心熱滿煩悶驚恐方

白芍藥 遠志

宿薑二兩 茯苓

丘山房 千金方卷四

十一 喬氏世定刻行

赤石脂 麥門冬

知母 紫菀

石膏各四十銖 人參二十銖

桂心 麻黃

黃芩各三十銖 姜蕤三十銖

甘草十二銖

十五味治下篩為粗散先以水五升淡竹葉一升煮取三

升去滓煮散一方寸七分以絹裹煮時動之煎取八合為一

服日再

不能食胃中滿膈上逆氣悶熱方

灸心輸二七壯小兒減

虛寒

于寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也痛苦悸恐不樂心

難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

茯苓補心湯治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出汗一作汗出善忘恐徙不定婦人崩中面色赤方

茯苓兩四

桂心

甘草各二

紫石英

人參各一

大棗二十枚

麥門冬三

赤小豆二十四枚

右八味咬咀以水七升煮取二升分三服

半夏補心湯治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤者方

半夏兩六

宿薑五兩

茯苓

桂心

枳實

橘皮各三兩

白朮四兩

防風

遠志各二兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

小丘山房

千金方卷四

三 喬氏世定刻行

牛髓圓通治百病虛瘠羸之等方

牛髓

羊髓

棗膏

白蜜

酥各一升

麥門冬

芎藭

桂心

當歸

茯苓茯神

甘草

羌活各三兩

乾地黄

乾薑三兩六銖

五味子

人參

防風各一兩

細辛十八銖

白朮四兩二銖

右拾玖味切搗十四味再篩別研棗膏和散次與諸髓蜜和

攪令相得內銅鉢中於釜沸湯中煎之取堪為丸如梧子大

酒服三十九丸稍加至四十九日再服

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手小陰與巨陽經俱也病



苦澗泄若寒少氣四肢厥勝游名曰心小腸俱虛

大補心湯治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢撻變氣力顏色不榮方

黃芩

附子各一兩

甘草

茯苓

麥門冬

乾地黄

桂心

阿膠各三兩

半夏

遠志

石膏各四兩

生薑六兩

粘糖斤

大棗二十枚

右十四味取十三味咀咀以水一斗五升煮取五升湯成下

糖分四服

補心圓治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後餘疾月經不調方

當歸

防風

芎藭

附子

芍藥

小丘山烏

金卷四十

三

喬氏世定刻行

甘草

蜀椒

乾薑

細辛

桂心

半夏

厚朴

大黃

猪苓各一兩

茯苓

一方用茯苓神

遠志各二兩

右十六味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三不知加至十九

冷極加熱藥

心勞第三論

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂閔格病則生矣

大黃洩熱湯治心勞熱口為生瘡大後苦難閉澀不通心滿痛

小腸熱方

大黃

澤瀉

黃芩

砒硝

梔子仁三兩

桂心

通草

石膏一兩

甘草一兩

大棗二十枚

右十味咬咀用水九升先以水一升別漬大黃一宿餘八升水  
煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下砒硝令烺分  
三服

小丘山房

三金卷四十一

十四

喬氏世定刻行

孫真人備急千金要方卷之四十一

