

卷十八至十七



南京中医药大学图书馆版权所有

沈氏尊生書卷十六

雜病源流犀燭 六淫門

濕病源流

沈金鰲撰

經曰諸濕腫滿皆屬脾土。此言土濕過甚。則痞塞腫滿之病生。經故又曰諸症強直。積飲痞膈中。滿吐下霍亂。體重脇腫。肉如泥。按之不起。皆屬於濕也。蓋太陰濕土乃脾胃之氣也。然則濕之爲病。內外因固俱有之。其由內因者。則本脾土所化之濕火盛化爲濕。熱水盛化爲寒濕。其爲症狀。發熱惡寒。身重自汗。筋骨疼小便秘。大便溏。腰疼脇腫。肉如泥。腳如石墜。其爲脉必緩。浮緩濕在表。沉緩濕在裏。弦緩風濕相搏。治法則以燥脾利溲爲主。宜五苓散加蒼朮半夏厚朴。其由外因者。則爲天雨露地泥水人飲食與汗衣濕衫。其爲症狀頭面如果滯重。骨節疼手足痠軟。腿膝脇腫挾風痰。則麻兼死。

血則木動邪火則腫疼或疝氣偏墜目黃其爲脈亦必緩治法則以燥濕祛風爲主宜除濕羌活湯虛

者獨寄生湯

濕病之因

內外不同如此然

不論

內外

其熏襲乎人多有不覺非若風寒暑熱之暴傷人便覺

也至病之爲患于身者其部分尤不可不辨如濕在上宜防風風

能燥濕猶濕衣懸透風處則乾也

濕在中宜蒼朮

猶地上有濕灰

多則滲乾也

濕在下宜利小便

猶欲地乾必開水溝也

濕在週身

宜烏藥羌活等

濕在兩臂宜桑條威靈仙等

濕在兩股宜牛膝防

已草薢等分其部位而治之而一身之患有不盡去者乎且同一

濕也而有中濕寒濕風濕濕痺濕熱溫濕酒濕及濕痰破傷濕之

不齊焉中濕者其脉沉而微緩腹脹脹倦怠且濕喜歸脾流于關

節四肢疼痛而煩或一身重着久則浮腫喘滿昏不知人挾風則

眩暈嘔噦挾寒則攣拳掣痛內經曰面色浮澤是爲中濕此尤顯

南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学 1951

而可驗者也。宜除濕湯加寒濕者雖夏月亦覺清涼多中于血虛
之人發則關節不利牽掣作痛。

宜虎骨官桂當歸若腰下冷重或痛便爲

腎着。宜腎着湯前輩云凡濕以尿赤而渴爲濕熱以尿清不渴爲寒濕

是其驗也。風濕者太陽經感風與濕相搏其骨節痠疼不能轉側

者濕氣也其掣而不能屈伸者風也其汗出身寒脉沉微短氣小

便清而不利者寒閉也其惡風者表虛也其或微腫者陽氣不行

也然雖惡風寒宜微汗之不得用麻黃葛根輩使其大汗若使大

汗則風去濕留反能爲患。

宜除濕湯活湯濕熱者肢節疼肩背重胸滿身

疼流走脛腫作疼。

宜當歸拈痛湯甚加倍服之或有氣如火從脚下起入腹此

亦濕鬱成熱而作。

宜二妙丸加牛膝防已濕痰者痰涎流注肌肉間時作痰

疼。

宜祛濕痰湯濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言必其人嘗傷

于濕因而中暑暑濕相搏則發濕溫其脈陽濡而弱陰小而急治

在太陽不可發汗。汗出必不能言耳。聾不知痛所在。身青。面色變

名曰重暎。如此死者乃醫殺之。

宜蒼术白虎湯酒濕者亦能作痺症口眼

渴斜半身不遂。渾似中風舌強語澁。當瀉濕毒不可作風病治而

汗之。宜蒼木湯破傷濕者因破傷皮肉而入水濕口噤身強直者是也

宜用甘草湯調服煅牡蠣未二錢仍取末敷瘡口濕痺詳在風門此風寒暑等當各因所

兼而治之者也。至其傷濕之故則有緣腎虛者必身重腰冷如坐

水中不渴小便利。宜腎有由體氣虛弱者必身重或便溏

宜清燥湯有

因坐卧濕地當風涼致腰背足膝疼偏枯拘攣者。宜獨活寄生湯有因年

老衰憊及女人腎虛血竭致腰脚疼者。宜獨活寄生湯有由下焦冷濕致

身重腰冷却能飲食者。宜乾姜散有緣風濕相搏夏月身重如山者

宜勝瀉湯所由既異爲治亦殊辨之誠宜切矣若夫濕流關節一症身體

煩疼爲病尤劇其夾風者必加煩熱流走拘急其夾寒者必加攣

煩。爲病尤劇其夾風者必加煩熱流走拘急其夾寒者必加攣

痛浮腫，濕症宜芩苓川芎湯，夾風宜加減五積散。三者合則成癥矣。另詳癥症此皆不可不知者也。總之濕之中人必原于虛，強壯者無慮也。治濕之法惟當滲利小便，別無他法也。古書有加減二陳湯法，以之治濕頗極神效，奉爲蓍蔡可也。

脉法 難經曰：濕溫之脉陽濡而弱，陰小而急。 脉經曰：傷濕之脉細濡濕熱之脉緩大。 脉訣曰：脉浮而緩，濕在表也；脉沉而緩，濕在裏也。 活人書曰：身痛脉沉爲中濕，脉浮爲風濕。 入門曰：寸口陰脈緊者，霧露濁邪中于少陰之分，名曰渾陰；寸口陽脈緊，或帶澁者，霧露清邪中于上焦太陽之分，名曰潔陽。 中霧露之氣也。 陰陽脈俱緊者，上下二焦俱中邪也，必吐利後，脉不緊，手足溫則愈。 若陰陽脈俱緊，口中氣出唇口乾燥，踰卧足冷，涕出舌胎滑，勿妄治也。

暑濕異處。內經曰：地之濕氣感人，害人皮肉筋脈，蓋濕傷形，形傷故痛。仲景曰：濕傷關節，則一身盡痛。活人書曰：風濕相搏，則骨節煩疼；濕則關節不利，故痛。入門曰：暑病多無身痛，蓋傷氣而不傷形故也。

濕病類傷寒。活人書曰：中濕風濕濕溫，皆類傷寒。中濕之由，風雨襲虛，山澤蒸氣，濕流關節，一身盡痛；風濕者，其人先中濕，又傷風也。其人中濕，因又中暑，名曰濕溫，又曰傷寒。有五，其一爲中濕，蓋風濕之氣中人爲病，發熱與溫病相類，故曰濕溫。故難經曰：濕溫之脉，陽濡而弱，陰小而急也。

濕病原由症治。內經曰：因于濕，首如裹，大筋繩短，小筋弛長。註云：受熱則縮而短，得濕則引而長。鈞元曰：濕病本不自生，因火熱怫鬱，水液不能宣通，停滯而生水濕也。仲景曰：太陽

病，關節疼痛而煩，脉沉而細者，此名中濕。亦曰濕痺，又曰病者，一身盡疼，發熱，日晡所劇者，此名風濕。丹溪曰：濕本土氣火，熱能生濕土，故夏熱則萬物潤，秋涼則萬物燥也。夫熱鬱生濕，濕生痰，故用二陳湯加酒芩羌活防風去風行濕，蓋風能勝濕也。又曰：濕者，土濁之氣，頭爲諸陽之會，其位高，其氣清，其體虛，故聰明得以係焉。濕氣熏蒸，清氣不行，沉重而不爽利，似乎有物蒙冐之失而不治，濕鬱爲熱，熱留不去，熱傷血不能養筋，故大筋爲拘攣，濕傷筋不能束骨，故小筋爲痿弱。又曰：濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，平胃散主之。濕在上宜微汗而解，不欲汗多，故不用麻黃乾葛，宜微汗，用防已黃芩湯。濕在中下宜利小便，此滲淡治濕也。五苓散主之。入門曰：霧露濁邪中下焦，名曰渾陰，氣爲慄，令人足脛逆冷，小便妄出或腹痛下利，宜理。

中湯四逆湯，霧露清邪，中于上焦，名曰潔陽，令人發熱頭痛，項強，頸攀，腰痛，脛痠，宜九味羌活湯，藿香正氣散。正傳曰：濕家

治法，大概宜發微汗，利小便，使上下分消，是其治也。醫鑑曰：

太陽發汗太多，因致瘡濕家大發汗，亦作瘡，蓋汗太多，則亡陽不能養筋，故筋脈緊急而成瘡。其症身熱足冷，項頸強急，時頭熱，面赤目赤，獨頭面搖，卒口噤，背反張者，是也。繆仲淳曰：傷

于暑濕而成瘡瘍，四肢不能動，宜用自然銅燒紅酒浸一夜。川

烏頭泡五靈脂，蒼朮酒浸各一兩，當歸二錢，酒浸爲末，酒糊丸

每七丸，酒下，覺四肢麻木即止。只虛人有火，未宜輕用。其有中

濕骨痛者，白朮一兩，酒三盞，煎一盞，頓服。不飲酒以水代之，至

如尋常濕氣作痛，則取白朮熬膏，白湯點服。葉天士曰：時令

濕熱之氣觸自口鼻，由募原以走中道，遂至清肅不行，不饑不

食但濕乃化熱之漸致機竅不爲靈動與形質滯濁有別此清
熱開鬱必佐芳香以逐穢爲法宜用括蔞皮桔梗香豉黑山梔
枳殼薑金降香末又曰本人體壯有濕近長夏陰雨潮濕着於
經絡身痛自利發熱仲景云濕家大忌發散汗之則變症厥脈
來小弱而緩濕邪凝遏陽氣病名濕溫濕中熱氣橫冲心包絡
以致神昏四肢不煖亦手厥陰見症非與傷寒同法也藥用犀
角連翹心元參石菖蒲野赤豆皮金銀花煎送至寶丹又曰仲
景云小便不利者爲無血也小便利者血症諦也此症是暑濕
氣蒸三焦瀰漫以至神昏乃諸竅阻塞之兆至小腹硬滿大便
不下全是濕鬱氣結彼旁醫猶以滋味呆鈍滯藥與氣分結邪
相反極矣當用甘露飲法猪苓浙茯苓寒水石晚蚕沙皂莢子
去皮又曰厥陰爲病必錯雜不一瘧痢之後肝臟必虛發症左

脇有痞。腹中塊。礪外堅。脇下每常汨汨有聲。惡虛就寢。常有寒熱。胃中不知飢。而又嘈雜吞酸。脈長而數。顯然厥陰陽明濕熱下滲。前陰陽縮而爲濕熱症也。須用升發陽明。胃氣滲洩。厥陰濕熱其症自愈。蒼朮半夏。茯苓。橘紅。當歸。通草。茴香。柏子仁。沙蒺藜。川棟子。卽爲丸方。

治濕病方二十三

五苓散 內因 肉桂 白术 藕本 茯苓 猪苓 澤瀉
除濕羨活湯 外因 蒼朮 獨活 桑寄生 熟地 牛膝
獨活寄生丹 因虛 藿朮 白芍 細辛 人參 茯苓 杜
仲 藁朮 白芍 細辛 人參 茯苓 杜
歸 防風 甘草 姜

加味木附湯 中濕 附子二錢 白术 炒甘草 赤芩各
錢半 姜七 薤二 水煎日再服。終見身痺
三服後。當如冒狀。勿怪。蓋木附並行。皮中逐水。
氣故耳。

除濕湯

中濕
藿香各七分半

半夏
當歸
濕熱
當歸

蒼术
羌活
人參

厚朴各錢半
葛根
升麻

陳皮
苦參
防風

澤瀉

當歸拈痛湯

當歸
當歸

蒼术
知母

茵陳草
炙甘草

白术
胆星
半夏
羌活
獨活

葛根
苦參
防風

陳皮
澤瀉

祛濕痰湯

當歸
當歸

黃芩
白术

炮姜
黃芩
白术

膽星
半夏
羌活
獨活

葛根
苦參
防風

陳皮
澤瀉

腎着湯

體虛
便赤

大便洩
柴胡

加蒼术
甘草

陳皮丁香
白术

神曲
黃連
黃芩
白术

五味子
麥冬
陳皮
當歸

清燥湯

子
皮

黃芪
甘草

黃連
白术

陳皮
蒼术

丁香
黃芩
白术

如小
柴胡
人參
澤瀉
當歸

乾姜散

下焦
柏

乾姜
升麻

茯苓
生地

人參
茯苓

白术
白术

甘草
甘草

勝濕湯

風濕
黃柏

羌活
豬苓

澤瀉

防風
桑皮

蒼术
官桂

甘草
川芎

茯苓川芎湯

濕症
赤芍

當歸
茯苓

葛根
桑皮

當歸
官桂

杏仁
甘草

黃芩
川芎

防風湯

寒風
甘草

當歸
防風

杏仁
葛根

黃芩
羌活

赤芩
葛根

桂枝
水

煎大酒少許服

加減五積散	夾寒
陳皮	茯苓
麻黃	甘草
厚朴	乾姜
	桔梗
	赤芍
	蒼朮
	白芷
	半夏
	川芎
	當歸

加味二陳湯 總治木 **陳皮** **半夏** **茯苓** **甘草** **加製**
羌活 **黃芩** **因症加減法** **附後如或**

**濕在上頭重嘔吐倍蒼朮
濕在下足脛膚腫加升麻**

咽喉肿痛

升麻

**濕在內腹脹中痞加猪苓澤瀉
濕在外身重浮腫倍羌活取汗**

中病浮腫

猪苓

**肥人濕沉困怠惰是氣虛加人參白朮
瘦人是濕熱倍黃芩加白朮白芍
瘦白亦是氣虛照肥人治之**

防已黃芪湯 濕在上
甘草錢半 防己 黃芪各三錢 白朮二錢

平胃散 又 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

单苍术膏 又 苍术一味熬膏

二陳湯 热生濕 茯苓 甘草 半夏 陳皮

藿香正氣散

清邪

白朮

陳皮

白芷

茯苓

紫蘇

厚朴

九味羌活湯

又

羌活

白芷

細辛

生地

防風

蒼

四逆湯

又

甘草

川芎

黃芩

附子

乾姜

理中湯

又

人參

白朮

炙草

乾姜



南京中医药大学
南京中医药大学图书馆版权所有

痰飲源流

沈金鰲撰

痰飲濕病也。經曰：太陰在泉，濕淫所勝。民病飲積。又曰：歲土太過時雨流行，甚則飲發。又曰：土鬱之發，太陰之復，皆病飲發。內經論：痰飲皆因濕土，以故人自初生以至臨死，皆有痰，皆生于脾聚于胃。以人身非痰不能滋潤也。而其爲物，則流動不測，故其爲害，上至巔頂，下至湧泉，隨氣升降，週身內外，皆到五臟六腑，俱有試罕譬之。正如雲霧之在天壤，無根底，無歸宿，來去無端，聚散靡定。火動則生氣，滯則盛風，鼓則湧變怪百端，故痰爲諸病之源。怪病皆由痰成也。然天之雲霧，陽光一出，卽消散無踪。人身之痰，若元陽壯旺，亦陰濕不凝，而變滅無迹，其理固相同也。茲卽痰之在一身者言之。在肺曰燥痰，其色白，咯出如米粒，多喘促，寒熱悲愁，脈必濇。宜利金丸在心曰熱痰，其色赤，結如膠，而堅多煩熱，心痛，口乾唇燥。

喜笑脉必洪。宜牛黃丸在脾曰濕痰。其色黃滑而易出。多倦怠軟弱。喜

卧腹脹食滯脉必緩。宜白术丸或挾虛

宜六君子湯

挾食宜保和丸

挾暑宜消暑丸

暑丸

挾

驚。宜妙應丸各宜從脾分治。在肝曰風痰。其色青。吐出如沫。多泡四肢。

悶滿躁怒二便閉脉必弦。宜川芎芍藥丸加半夏南星防風丸

在腎曰寒痰。其色有黑

點。吐出多稀。多小便急痛。足寒逆心恐怖。脉必沉。宜胡椒理中丸

或加星半

此

痰之由于五臟者也。若由于外感而生者。一曰風痰多癲痰奇症。

頭風眩暉。暗風悶亂。或搐搦瞓動。宜白圓子二

曰寒痰卽冷痰也。骨

痺。四肢不舉。氣刺痛無煩熱。凝結清冷。宜溫胃化痰丸

三曰濕痰

身重而軟。倦怠困弱。宜山精丸

三仙丸四曰熱痰卽火痰也。多煩熱燥結。

頭面烘熱。或爲眼爛喉閉。癲狂嘈雜。懊憹怔忡。其色亦黃。宜清氣

清熱導化痰丸

五曰鬱痰卽火痰鬱于心肺間。久則凝滯。胸膈稠粘難咯。

化痰丸

多毛焦咽乾口燥咳嗽喘促。色白如枯骨。宜節齋化痰丸

六曰氣痰七情

痰湯清熱導化痰丸

八曰寒痰。宜牛黃丸

九曰火痰。宜清氣

清熱導化痰丸

十曰濕痰。宜牛黃丸

十一曰熱痰。宜白虎湯

鬱結痰滯咽喉形如敗絮或如梅核咯不出。嚥不下。胸膈痞悶。宜火豁丸。七曰食痰飲食不消。或挾瘀血遂成窠囊。以至痞滿不通。宜瓜萎丸。八曰酒痰。因飲酒不消。或酒後多飲茶水。但得酒次日即吐。飲食不美。嘔吐酸水等症。宜瑞竹堂化痰丸。九曰驚痰。因驚痰結成塊在胸腹。發則跳動痛不可忍。或成癩癧。在婦人多有此症。宜妙應丸以上。如風寒濕火等痰。雖與五臟所發者。或有相似。然內因與外因畢竟有別。此外又有相火咳血痰。宜滋陰清化丸。胃熱鬱結。臭痰加減用。鬱氣凝聚成塊痰。宜清氣化痰丸。脾氣不運柔痰。宜參木健脾丸。骨節空處結核痰。宜滾風氣發湧所生白沫潮痰。宜生鐵落湯。鬱火凝結久成痰毒。宜服舟車神佑丸。勞損所生如鷄蛋白痰。卽俗所謂白血。宜金匱腎氣丸。加消痰藥。心膽被驚神不守舍。或痰迷心竅妄言妄見。宜壽星丸。風痰注痛。或次服導痰湯。在腰脚或在手臂。宜躡躅花丸。上膈風熱痰寢。宜桔梗蘆散。頑痰壅遏胸膈。

久而不化。宜青綠丸。胸胃中有痰。頭痛不欲食。宜碧吐法。痰血凝聚。致成結

胸芝丸。

陰虛火動。生痰不堪。用燥劑。宜五味

頭目不清。宜三仙丸。種種不一。摠由氣血陰陽升降拂逆而成。雖然同

焉是物。稠粘者爲痰。清稀者即爲飲。飲有八。一日留飲。水停心下。

背冷如手掌大。或短氣而渴。四肢厯節痛。腸痛引缺盆。咳嗽轉甚。

脉沉是也。久則骨節蹉跌。恐致癲癇也。宜導痰湯二日。痰飲水走腸中。

轆轤有聲是也。宜芩桂米甘湯三日。癥飲水癖在兩脇下。動搖有聲是也。

宜十束湯三日。四曰溢飲。水流四肢。當汗不汗。身體疼重是也。宜小

湯五曰懸飲。飲後水流脇下。咳唾引痛是也。宜東湯六曰伏飲。膈滿

嘔吐。喘欬寒熱。淚出惡寒。腰背痛。身瞞悶是也。宜倍朮丸七曰支飲。咳

逆。倚息短氣。不得卧形如腫是也。宜五苓散八曰流飲。飲水流行遍體

俱注無定在是也。宜三花神佑丸。此外又有飲食胃寒。或飲茶過多致成

五飲及酒癖。宜姜桂丸。或患支飲時苦冒眩。宜澤瀉湯飲癖嘔酸嘈雜。脇痛食減。宜蒼朮丸。冷飲過度。遂令脾胃氣弱。不能消化。飲食入胃皆變成冷水。反吐不停。宜赤石脂散。種種不一。總由飲食水漿乖時失度而成。雖然曰痰曰飲之外。又有非痰非飲時。吐白沫不甚稠粘者。脾虛不能攝液。故涎沫自出也。宜六君子湯加生姜益智仁或以半夏乾姜等分爲末服之。又有時吐酸水。非關食滯者。必由停飲所致也。宜蒼朮苓陳湯。又有嘔清水者。渴欲飲水。水入卽吐。此名水逆也。宜五苓散。又有痰極腥臭。或帶膿血者。必肺胃癟也。肺宜清金飲。胃宜葵根湯。凡此皆痰飲之屬。也要之治痰治飲。不理脾理氣兩法。蓋脾胃健運。自無痰。故曰治痰先理脾胃。氣道順。津液流通。亦無痰。故曰治痰必理氣。但昔人云。脾喜溫燥。惡寒潤。宜以二术星夏爲要藥矣。肺喜涼潤。惡溫燥。宜以二母二冬。地黃桔梗爲要藥矣。旨哉斯言。其誠有不可混治者乎。然而土能生。

金。金。不。能。助。土。脾。痰。斷。不。可。用。肺。藥。肺。痰。稍。助。脾。以。生。肺。痰。自。益。
消。也。是。在。臨。症。時。消。息。之。可。耳。

脉法 仲景曰。脉雙弦者。寒飲也。偏弦者。飲也。又曰。肺飲不弦。但苦喘短氣。又曰。脉沉而弦者。此懸飲內痛。又曰。脈浮而細滑者。傷飲。提綱曰。痰脉弦滑。三因曰。飲脉皆弦微沉滑。丹溪曰。久得滯脉。必費調理。以痰膠固。脈道阻塞也。醫鑑曰。脉沉弦細。謂大小不勻。俱痰飲爲病也。

痰涎飲不同 直指曰。伏于包絡。隨氣上浮。客肺壅敷而發動者。痰也。聚于脾元。隨氣上溢。口角流出而不禁者。涎也。惟飲生于胃腑。爲嘔爲吐。此則胃家之病。又曰。水與飲同出而異名。人惟脾土有虧。故所飲水漿不能傳化。或停心下。或聚脇間。或注經絡。或溢膀胱。往往因此成疾。又曰。飲者。因飲水不散而成病。

痰者。因火炎熏灼而成疾。故痰稠濁飲清稀。

痰飲藥宜分治。繆仲淳曰。夫痰之生也。其出非一。藥亦不同。

由於陰虛火炎。上迫乎肺。肺氣熱。則煎熬津液。凝結爲痰。是謂陰虛痰火痰。在于肺而本于腎。治宜降氣清熱。益陰滋水。法忌

辛溫燥熱補氣等藥。由于脾胃寒濕生痰。或飲啖過度。好食油

麵。猪脂。以致脾氣不利。壅滯爲痰。甚至流于經絡。皮裡膜外。或

結塊。或不思食。或徹夜不眠。或卒然眩仆。不知人事。或發癲癇。

或昔肥今瘦。或呴呼異常。或身重腹脹。不便行走。或泄瀉不止。

或成癰瘍。種種怪症。皆痰所爲。故昔人云。怪病多屬痰。暴病多

屬火。有以夫。此病在脾胃。無關肺腎。治宜燥脾行氣。散結軟堅。

法忌滯膩苦寒。濕潤等藥。及諸般厚味。由于風寒之邪鬱閉。熱

氣在肺而成痰。嗽齁喘病。亦在肺。治宜豁痰除肺熱藥中。加辛

熱辛溫如麻黃生姜乾姜之屬以散外寒。則藥無格拒之患。法忌溫補酸收等藥。病因不齊。藥亦宜異。利潤利燥及利發散。各有攸當。非可混而施也。夫世每以痰飲混稱。藥亦混投。殊不知痰之與飲其由來正自有別。其狀亦殊。痰質稠粘。飲惟清水。特其色有異。或青或黃或綠或黑。或如酸漿。或伏于腸胃。或上支胸膈。刺痛難忍。或流于經絡四肢。則關節不利。支飲上攻。爲心痛。爲中脘痛。甚則汗出。爲嘔吐酸水。苦水。黃水等。種種各異。或發寒熱。不思飲食。及不得安眠。皆其候也。此症多因酒後過飲茶湯。則水漿與腸胃中飲食濕熱之氣凝而爲飲。或因情抱抑鬱。飲食停滯。不得以時消散。亦能成飲。總之必由脾胃有濕。或脾胃本虛。又感飲食之濕。則停而不消。此飲之大畧也。治宜燥濕利水。行氣健脾爲主。乃爲得也。其藥大都以半夏茯苓白术。

人參爲君。佐以猪苓澤瀉以滲洩之。白豆蔻陳皮以開散之。蘇梗旋覆以通暢之。東垣五飲丸中有人參。其旨概可見矣。

痰病似邪祟。東垣曰。血氣者。人之神也。神氣虛乏。邪因而入。理或有之。若夫血氣兩虛。痰客中焦。妨礙升降。不得運用。致十二官失職。視聽言動。皆有虛妄。以邪治之。必死。先宜多飲姜鹽湯。探吐。或多灌竹瀝香油。次服消痰藥餌。

辨痰色。入門曰。寒痰清潔。痰白。火痰黑。熱痰黃。老痰膠

痰飲原由症治。丹溪曰。凡有痰者。眼皮及眼下必有烟灰黑色。又曰。凡病百藥不效。關脉伏而大者。痰也。控涎丹下之。又曰。脾虛不能剋制腎水。多嘔痰。嘔而不咳者。宜八味丸。又曰。大病後多嘔痰。此胃冷也。又曰。病人多嘔白沫。乃胃口上停寒也。又曰。凡病久淹延。卒不死者。多因食積痰飲所致。所以然者。因胃

氣亦賴痰積所養。飲食雖少。胃氣卒不便虛故也。又曰。痰在膈上。必用吐法。瀉亦不能去。脈浮者宜吐。膠固稠濁者必用吐。又曰。痰在經絡中。非吐不可。此中就有發散之意。不必在出痰也。又曰。凡用吐藥。升提其氣便吐也。又曰。氣寔痰熱結者難治。入門曰。一切痰症。食少。肌色如故。一切水症。脇硬。心下怔忡。又曰。痰新而輕者。味淡。色清白稀薄。久而重者。黃濁稠粘。凝結咯不出。漸成惡味。酸辛腥臊鹹苦。甚至帶血而出。但痰症初起。頭痛發熱。類外感表症。久則潮咳。夜重。類內傷陰火。痰飲流注支節。疼痛。又類風症。但痰症胸滿食減。肌色如故。脉滑不勻。不定爲異耳。又曰。俗云。十病九痰。誠哉斯言。又曰。痰厥者。皆因內虛受寒。痰氣阻塞。手足厥冷。麻痺暈倒。脉沉細也。回春曰。凡臂難。遍身骨節痛。坐卧不寧。痰入骨也。又曰。眼黑而行步吟呻。舉

動難。難入骨。痰也。其症必遍身骨節痛。眼黑。面土色。四肢痠痺。屈伸不便者。風濕痰也。眼黑氣短促者。驚風痰也。眼黑頰赤。或面黃者。熟痰也。咯之不出者。痰結也。脇下痛作寒熱。咳嗽氣結亦痰結。局方曰。胸中有寒。則喜唾痰。資生經曰。痰涎病。不一惟癆。療有痰爲難治。最宜早灸膏肓四花穴。全嬰方曰。肺胃虛。則生粘痰。痰涎凝滯咽喉。如曳鋸聲。時或癇癥。或因吐瀉所致。脾虛肺亦虛。痰涎流溢。變成癩癇。尤爲難治。得效曰。有痰飲流注者。人忽胸背手脚腰膀隱痛。不可忍。速筋骨牽引。釣痛坐卧不甯。時時走易不定。不可便用風藥。及妄施針灸。亦不可疑爲風毒結聚。欲爲瘡。亂用藥貼此。乃痰涎伏在心膈上下。變爲此疾。能令人頭痛難舉。神昏意倦。多睡食少。味痰唾稠粘。夜間喉中如鋸聲。多流涎。手足冷。脾氣脉不通。亦不得誤認。

爲癰瘍。凡有此疾。只服控涎丹。其疾如失。丹溪曰。有痰核塊者。人身上中下。有塊如腫毒。多在皮裡膜外。此因濕痰。散核之劑。核不散。問其平日好食何物。用藥吐下之方。用消痰散核之劑。如二陳湯。加大黃連。喬柴胡。桔梗。姜黃。連白芥子水煎入竹瀝。多服自消。醫鑑曰。痰飲流注于胸背頭項腋膀腰腿手足。聚結腫硬。或痛或不痛。按之無血潮。雖或有微紅。亦淡薄不熱。堅如石。破之無膿。或有薄血。或清水。或如紫汁。又有壞肉如敗絮。或如瘰疬。在皮肉間。如鷄卵可移動。軟活不硬。惟覺咽喉痰結。作寒作熱。回春曰。渾身有腫塊。或骨體串痛。都濕痰流注經絡也。

痰火導引 保生秘要曰。伸足坐定。以雙手掐兒訣。撐起。用力低頭。躬身而下。扳足尖三次。如訣。用力而起。咽津下降。幽關躬絡也。

起二十四回。守運後功。

運動保生秘要曰：取靜于晌，用十六字提咽指腰存想念，在茲次運尾閭八九度，入靜自然痰火自降。

治痰飲方

利金丸

燥痰
甘草

桔梗
姜

貝母
陳皮

枳壳
茯苓

半黃丸

熟痰
餅研丸

南星
姜湯下

牛夏
四十五丸

黃芩
等分

姜汁
浸蒸

白朮丸

濕痰
後姜湯下

南星
半夏

白朮
湯浸蒸

六君子湯

挾虛
陳皮

人參
茯苓

白朮
炙草

半夏
半夏

保和丸

挾食
麥芽

山楂
連翹

神曲
黃連

半夏
萊菔子

橘紅
水泛丸

消暑丸

風挾暑
見生水

茯苓
每五十丸

半夏
姜湯下

甘草
入夏後

姜汁
不可缺也

妙應丸

濕挾驚
大卧時

甘遂
姜湯下

大戟
七丸至十丸

白芥子
氣寢痰

糊丸梧子
糊丸梧子

丸數或加硃砂爲衣

成塊加穿山甲

甲鼈甲蓬术

元胡索
加雄黃

即控

涎丹

防風丸

風痰

防風

川芎

甘草

天麻

蜜丸重

川芎丸

辛又寒痰

蜜丸

每丸重三分

食後卧時茶

清嚼二丸

桔梗

甘草

防風細辛

胡椒理中丸

陳皮

乾姜

白术

款冬花

蜜丸

每服三

十丸至五十丸

青州白圓子

寒痰

川烏

半夏

七兩

南星

三兩

白附子

二兩

研瀘以盡爲度澄清去水晒乾又爲末糯米竹
筒十朝夕換水日數足取絹袋中瀘過其渣再
清和丸菉豆大姜湯下三五十丸

溫中化痰丸

又米飲下

五十丸

青皮

陳皮

良姜

乾姜

等分醋糊

溫胃化痰丸

又姜汁糊丸

蒼朮

半夏

三兩

炮姜

陳皮

白术各二兩

山精丸

濕痰收浸九次

蒼朮

黑桑椹

一斗取汁將蒼朮

杞子

地骨皮末各一斤

蜜丸

溫湯下

百丸

三仙丸

又半夏 南星各一斤爲末姜汁調作餅放篩中將艾葉蓋發黃色造成麴收之此須三四月造每麴四兩入香附末二兩姜汁糊丸姜湯

下五十九丸

清氣化痰丸

熱痰

半夏二兩 陳皮

赤苓各一兩半

黃芩 連翹

山梔 桔梗

甘草各一兩

薄荷

荆芥各五錢 此方乃二陳湯合涼膈散也

瓜蔞仁 黃連

姜汁糊丸

姜湯下五十

清熱導痰湯

又

枳實 陳皮

赤苓

桔梗

白朮

人參各七分

枳實

甘草各五分

姜三

東二

冲竹瀝

節齋化痰丸

欒痰

天冬 芒硝

黃芩 茶樹紅

海粉 炒香附

桔梗 連翹

各五錢

青黛二錢

蜜入姜汁少許

丸茶子

大細嚼

一丸開水下

清火豁痰丸

氣痰

製大黃二兩半

山梔

半夏

白朮 酒黃連

酒黃芩 陳皮

南星各兩

半

貝母一兩二錢

連翹

花粉

茯苓

神曲

白芥子各一兩

元明粉七

錢

青礞石以焰硝一兩同煅如金色

青黛

甘草各五錢

沉香二錢

竹瀝爲丸

茶

清下五十七丸

黃桔萎丸

食痰

桔萎仁

神曲

半夏麵

杏肉

等

瑞竹堂化痰丸

分酒痰

半夏

南星

生姜

白礬

皂角

皂角

備

化

丸

分

瓜萎汁丸

姜湯竹瀝下五十丸

仁各一兩

姜汁糊丸

食後臨卧茶酒任下

香附

杏

茶酒任下

滋陰清化丸

相火痰

天冬

麥冬

生地

熟地

知母

神

茶酒任下

草蜜丸噙化

查肉

萊菔子

五味子

甘

茶酒任下

清胃湯

胃痰

升麻

當歸

黃連

丹皮

生地

清氣化痰丸

鬱氣痰

半夏

南星

白礬

皂角

乾姜

先將白礬等三味

用水五碗煎

三碗入星夏

浸二日再煮

至星夏無白點

晒乾又用

萊菔

子

茶湯

曲子

橘紅

青皮

杏仁

葛根

山楂

神

茶湯

不愈

如脾

胃虛弱

切忌

參术健脾丸

脾不運

人參

白术

茯苓

陳皮

炙甘

草

白芍

當歸

姜

東

滾痰丸

結核 大黃 黃芩 青礞石 沉香
煎水丸空心白湯下三錢 此藥但取痰積
自腸中次第而下並不刮腸大瀉爲痰家聖藥

生鐵落湯

潮痰 生鐵落先煮水入 石膏三兩 龍齒
茯苓 防風各兩半 元參 秦艽各一兩
煎好再加竹瀝半小杯 此方專取生鐵落重墜之性能降痰熱之鬱結
於腸胃經絡者

舟車神佑丸

痰毒 甘遂 芫花 大戟 大黃 青皮
黑牽牛頭末 陳皮 木香 柴榔 輕粉
水丸 椒子 大空心服 五丸日三服 如痞悶者
多服反煩滿宜初服二丸每服加一丸以快利

爲度

導痰湯

又 半夏 南星 赤苓 枳實 橘紅 甘草
食後 姜湯下三四錢 水煎亦可

金匱腎氣丸

白朮 濡瀉 熟地 附子 肉桂 牛膝 車前子
天南星一斤 丹皮 茯苓

壽星丸

被驚 三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星在內盆
砂二兩 琥珀一兩 共爲末姜汁糊丸每三珠
覆定以灰塞之勿令走氣次日取出爲末

十九至五十丸人參菖蒲湯下日三服

躑躅花丸

注痛 踟躅花 南星 並生時搗作餅餽上
蒸四五遍以稀葛囊盛之臨時取焙爲末蒸餅

丸每服三丸溫酒下

腰脚骨痛空心服

手

桔梗蘆散

上膈

桔梗蘆生研末白湯調服一二錢探吐

青綠丸

頑痰 石青一兩

石綠五錢 水飛爲末

大豆研末水下吐去痰一二盞

能不損人

礬吐法

痰澼 白礬一兩

水二升煮一升納蜜半合
頻服須臾大吐不吐飲少熱湯引之

紫芝丸

瘀血 五靈脂飛

半夏湯泡等分姜汁糊
丸每飲下二十丸

五味天冬丸

陰虛 天冬一斤浸洗去心淨肉十二兩

味子水浸去核取肉四兩並晒乾不見火搗丸
每茶下二十丸日三服

桂苓术甘湯

痰飲

桂枝 白朮 茯苓 甘草

杏仁 甘草

大青龍湯

溢飲 姜

東

麻黃 桂枝

白朮 茯苓 甘草

杏仁 甘草 石膏

大青龍湯

姜

十枣湯

懸飲

芫花

甘遂

大戟

水杯半升煎

先煎

大

水

杯半升煎

不除

東十枚取八分入藥末七分平旦溫服病不除
再服五分

五苓散

支飲 茯苓 白术 猪苓 津瀉 肉桂

三花神佑丸

酒飲

蒼半芩陳湯

酸水 蒼术 半夏 茯苓 陳皮

清金散

肺癰 刺蒺藜 茵仁 橘葉 黃芩 花粉
牛蒡子 貝母 桑皮 桔梗

葵根湯

胃癰 葵根一兩 黃芪 白术各三錢
伏飲 米飲下 肉桂 乾姜 白术 蜜丸每三十九

倍术丸

不咳 熟地 山萸 丹皮 茯苓 津瀉
附子 肉桂

八味丸

白术一斤 炮乾姜 肉桂各八兩
附子 五錢

姜桂丸

蜜丸每服二三十丸
支飲 津瀉五兩 白术二兩 水二升煮一升

澤瀉湯

分二服 津瀉飲方

赤石脂散

吐水

赤石脂一斤

搗篩服方寸七酒飲任

下稍加至三七服盡一斤終身不吐痰水又不下病補五臟令人肥健有人痰飲諸藥不效用

此遂愈

蒼朮丸

飲酒

蒼朮一斤去皮切片爲末

大枣五十枚煮去皮核

油麻五錢

水二錢濾研汁

大枣五十枚煮去皮核

油麻五錢

搗

丸每空心湯下五十丸增至一二百丸忌桃李雀肉服三月而疾除若再常服不嘔不痛胸膈寬利初服時必覺微燥以山梔末湯解之久服自不覺燥

諸疽源流 黃肺

沈金鰲撰

諸疽脾濕病也。疽有五曰黃疽。曰穀疽。曰酒疽。曰女勞疽。曰黃汗。其名各別。仲景謂當以十八日爲期。治之十日以上瘥。反劇爲難治。其故何也。蓋疽病既成。則由淺而深。當速治。曰十八日者。五日爲一候。三候爲一氣。若其病延至十五日。又加三日。則一氣有餘。雖未滿四候。而愈則竟愈。故曰爲期。過此則根漸深。而難拔。曰治之十日以上瘥者。言至十日外必宜瘥。倘不瘥。而反劇。必不若初治之可取效。而爲難治矣。此仲景言諸疽之期也。古人謂黃疽之爲病。如罨麴罨醬。濕熱鬱蒸。變色大抵濕勝。則所蒸之色。若熏黃黑晦。熱勝。則所蒸之色。若橘黃鮮亮。最宜分別。而熏黃黑晦一症。若兼一身盡疼。乃是濕病。非疽。當從濕治。宜除濕羌活湯
茯苓滲濕湯疽則身未有疼者。試卽五疽形症治法詳言之。如遍身面目悉黃。寒熱食。

卽饑黃疸也。經言目黃者曰黃疸。以目爲宗脈所聚。諸經之熱上熏于目。故目黃可稔知爲黃疸也。宜茵陳五苓散連服以小便清爲度。若無汗則汗之。宜桂枝腹滿。小便濇出。汗則斟酌下之。宜酌用硝黃湯。腹滿欲吐。但以鷄翎探吐之。嘔則止之。宜小半夏湯。如食已頭眩寒熱。心中怫鬱不安久則身黃。穀疸也。因饑飽所致。亦名胃疸。以胃氣蒸冲得之。經曰已食如饑者。胃疸是也。宜茵陳湯。如身目黃。腹如水狀。心中懊憹不食時。欲吐足脛滿。小便黃赤。面黃而有赤斑。酒疸也。因酒後胃熱醉卧。當風水濕得之。宜梔子大黃湯。若但心滿不食。尿赤。則不用前劑。宜當歸白朮湯。或變成腹脹。漸至面足腫。及身急須培土。宜藿香扶脾飲。如薄暮發熱惡寒。額黑微汗。手足熱。腹脹如水。小腹滿急。大便時溏。女勞疸也。寔非水濕。因房事後醉飽而成。經所云溺黃赤安卧者。黃疸。正理論謂得之女勞者是也。宜君子湯。若兼小便不利解之。宜滑

散兼身目黃赤小便不利。清理之宜腎着湯如不渴汗出同梶子水染

衣黃汗也。因脾熱汗出用。水。濕。浴。水。入。毛。孔。而。成。宜。黃。

以上五痘
長湯

之異所可分按者也。然而五痘之中惟酒痘變症最多。蓋以酒者。

大熱大毒滲入百脉。不止發黃而已。溢于皮膚爲黑爲腫流于清

氣道中則脹或成鼻瘡種種不同也。黑痘詳其餘又有陰黃乃傷

寒兼症四肢重自汗背寒身冷心下痞硬瀉利小便白脉緊細空

虛此由寒涼過度變陽爲陰或太陽太陰司天之歲寒濕太過亦

變此症宜茵陳四逆湯又有虛黃口淡怔忡寒熱溲白耳鳴脚軟怠惰無

力。凡鬱不得志人多生此症。宜人參養榮湯又有風黃身不黃獨目黃其

人肥風不外泄故也。宜青龍散又有瘀血發黃身熱小便自利大便反

黑豚朮而澁當用藥下盡黑物爲度。宜桃仁承氣湯又有天行疫癘以致

發黃者俗謂之瘟黃殺人最急。宜茵陳湯濟生茵陳湯五痘之外又有可

歷舉者如此。大約疽症渴者難治。不渴者易治。治之之法。上半身宜發汗。下半身宜利小便。切不可輕下。惟有食積。當用消導。宜茵陳湯

餘則以利水除濕。清熱養胃爲主。

主治諸疽宜化疽湯。茯苓澤瀉湯。

故丹溪以爲

五疽不必細分。但以濕熱概之也。夫丹溪之言。雖若太簡。其寔五

疽之因。不外飲食勞役。有傷脾土。不能運化脾土。虛甚。濕熱內鬱。久而不泄。流入皮膚。徹于周身。故色若塗金。潤若姜黃。耳則是不

可不辨者。諸疽之症。而治之有要者。丹溪之言。極爲真切也。特治

之之時。旣概以濕熱復能察各症之由。加藥以瘳之。更爲對症無

悞耳。至于治疽之藥。不宜多用寒涼。必君以滲洩佐以甘平。斯濕

可除。熱易解。若太寒涼重傷脾土。恐變爲腹脹。此防于未然者也。

若旣成腹脹者。治法必須疏導濕熱于大小二便之中。總之新起

之症。惟通用化疽滲濕二湯。及久病則宜補益。宜參术健脾湯。色疽久加黃芪扁豆

子若疽病久而口淡咽乾發熱微寒或雜見虛症赤白濁又當參酌治之宜當歸秦艽散久而虛必溫補宜人參養榮湯或四君子湯下金匱腎氣丸若素虛弱

子湯下金匱腎氣丸

若素虛弱

避滲泄而過滋補以至濕熱增甚又不在久病調補之例而亦有

服對症藥不能效耳目皆黃食不消者是胃中有乾糞也宜飲熬

豬油量人氣稟或一杯或半杯日三次以燥糞下爲度卽愈夫諸

黃之爲病其源流症治亦旣詳言之矣若夫黑疽爲症尤重故特

表而出之大約黑疽專由女勞亦兼由于酒惟此二者有以致之

其他疽病雖有變症必不致黑試舉仲景之言以証之金匱曰額

上黑微汗出手足中熱薄暮卽發膀胱急小便自利名曰女勞疽

腹如水狀不治蓋言黃雖必由傷脾而致傷之原有因腎者額爲

心部黑爲水色腎邪重則水勝火而黑見于額也手勞宮屬心足

湧泉屬腎水火不相濟故熱又以暮交于酉酉主腎因原有虛熱

衛氣并之。卽發于手足而熱也。膀胱爲腎腑。臟虛則腑急。然雖急而非熱流膀胱之比。故小便仍利也。迨至腹如水狀。則脾精不守。先後天俱絕矣。其可治乎。此女勞之所以成黑疸也。又曰。黃家自晡所發熱。而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱小腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑時溏。此女勞之病非水也。腹滿者難消。鑿散主之。仲景爲立方。因詳辨女勞疸症。其初亦未遽卽黃。故如日晡發熱反惡寒。少腹滿身盡黃等症。皆與他疽病相類。惟額黑足熱膀胱急小便利爲女勞所獨。以正愈虧而邪愈肆。故曰因作黑疸。蓋至是而腎邪遍于周身。不獨額上見黑而周身漸黑。且腎邪遍于腸胃。不獨周身黑。而大便亦黑。腹脹如水狀者。水肆則土敗。時溏泄者。土敗則不堅。然曰似水則非真水。故曰此女勞之病非水也。至于腹滿。則土之敗已極。腎邪益不能。

制而何可治乎。然則黑痘之爲病固自有由而黑痘之云黑所以專屬女勞之傷腎者言也。宜沈氏

黑痘方

其又曰酒痘下之久久爲黑痘。

目青面黑心中如噉蒜蘿狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之者以酒痘始亦本黃或因悞下則陽明病邪從支別入少陰故積漸而腎傷腎傷故亦從腎色而變爲黑痘也惟其然肝腎同原故肝亦病而目青腎氣上乘而面黑且腎邪乘土故大便俱黑土傷則痺故皮膚不仁腎邪盛而正氣虛故脈浮弱似此種種竟同女勞之痘何以辨其爲酒痘不知腎元雖病而其寔酒熱未除故心中如噉蒜蘿皆酒積之爲味也雖誤下傷腎而黑然寔因酒而脉終浮故黑色中猶帶微黃不如女勞痘之純黑也然則酒痘之黑雖亦由傷腎而要與女勞有別矣宜沈氏

黑痘方余故

于黑危險極矣。雖立治之之法亦未必盡效。毋徒咎醫之不良也。

脈法 脈訣曰。五疸寔熱。脈必洪數。其或微澁。悉屬虛弱。直指曰。疸脈緩大者順。弦急而堅者逆。

諸疸原由症治 仲景曰。寸口脈浮而緩。浮則爲風。緩則爲痺。痺非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。入門曰。經云。濕熱相交。民病痺。痺卽黃。疸陽而無陰也。又曰。諸發黃皆小便不利。惟瘀血發黃。小便自利益。蓋熱結下焦。則熱傷下焦而小便不利。血結下焦。則熱但耗血而不耗津液。故小便自利也。海藏曰。

凡病當汗而不汗。當利小便而不利。皆生黃。蓋脾主肌肉。四肢寒濕與內熱相合故也。正傳曰。五疸同是濕熱。終無寒熱之異。仲景曰。脈沉渴欲飲水。小便不利者必發黃。丹溪曰。凡時行感冒及伏暑未解。宿食未消。皆能發黃。時行疫癘。亦能發

黃殺人最急。又曰黃疸因食積者。下其食積。其餘但利小便爲先。小便利。黃自退。千金方曰。傷寒病遇太陽太陰司天。若下之太過。往往變成陰黃。寒水太過。土氣不及。往往變成此疾。繆仲淳曰。凡黃有數種。傷酒黃。誤食鼠糞亦作黃。因勞發黃。多痰涕。目有赤脉。益憔悴。或面赤惡心者。是也。用秦艽五錢酒半升。浸絞取汁。空腹服。或利便止。就中飲酒。人易治。屢用得效。又法。黃疸穀疸。用龍胆苦參丸。酒疸用茵陳蒿酒。猪項肉丸。甚至心下懊痛。足脛滿。小便黃。飲酒發赤黑黃斑者。由大醉當風入水所致。用黃芪散。女勞疸。因大熱大勞交接後。入水所致。身目俱黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。用二石散。其氣短聲沉者。用月經灰酒。其體重不眠眼赤如硃。心下塊起若瘕者。十死一生之症。宜烙舌下。灸心俞關元二七壯。以婦人內衣燒灰酒服二。

錢時行黃疸用小麥湯走精黃疸多睡舌紫甚面裂若爪甲黑者多死用豉五錢牛脂一兩煎過棉裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之急黃欲死用雄雀糞湯化服之立甦。癟黃如金好眠吐涎用白鮮皮湯婦人黃疸經水不調因房事觸犯所致用蟬礬丸。徐忠可曰仲景言黃疸初時由風兼挾寒濕後則變熱然其立方雖有穀疸茵陳蒿湯主之女勞疸消磐散酒疽主之正黃疸芩散有裡無表大黃消石湯真寒假熱小半夏湯無表裡而虛小建中湯之別未嘗專于治風專于治寒專于治濕惟清熱開鬱而爲肺爲胃爲脾爲腎分因用藥絕不兼補豈非治黃疸法以清熱開鬱爲主雖亦有汗下之說而破氣與溫補大汗及大下皆非所宜乎。

黃胖宿病也與黃疸暴病不同蓋黃疸眼目皆黃無腫狀黃胖多

腫色黃中帶白眼目如故或洋洋少神雖病根都發于脾然黃疸則由脾經濕熱蒸鬱而成黃胖則濕熱未甚多蟲與食積所致必吐黃水毛髮皆直或好食生米茶葉土炭之類宜四寶丹有食積用消食之劑宜神曲紅曲山楂針砂消食平肝其功最速不可缺又須帶健脾去濕熱之品治之無不愈者宜二术茯苓澤瀉力役人勞苦受傷亦成黃胖病俗名脫力黃好食易餓忘情無力宜沈氏鑊砂丸此又在蟲食黃病之外者

黃胖症治 得效曰食勞疳黃一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲景以十八日爲期食勞黃者久病也至有久而終不愈者正傳曰綠礬丸褪金丸二方治黃胖病最捷 繆仲淳曰脾病

黃腫者用青礬四兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫草霜三兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫

水下。一月後黃去立效。又脾勞黃病。針砂四兩。醋淬七次。乾漆燒存性二錢。香附三錢。平胃散五錢爲末。蒸餅丸湯下。又好食茶葉面黃者。每日食榧子七枚。以愈爲度。入門曰。黃病愛吃薄荷七錢。砂糖煮神麴糊丸空心砂糖水吞下五七十丸。又黃病愛吃生米者。用白朮一錢半。蒼朮一錢三分。白芍陳皮神麴麥芽山楂。茯苓石膏各一錢。厚朴七分。藿香五分。甘草三分。砂糖末一匙冲服。

治黃疸病方三十七

- | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------|----|----|----|----|
| 除濕羌活湯 | <small>濕似痘</small> | 蒼朮 | 藁本 | 羌活 | 防風 | 升麻 |
| 茯苓滲濕湯 | <small>諸痘</small> | <small>蒼朮</small> | 茵陳 | 茯苓 | 猪苓 | 澤瀉 |
| | | | | | | |
| | | | | | 黃連 | 白朮 |
| | | | | | 山梔 | 秦艽 |
| | | | | | | 防已 |

茵陳五苓散

黃疸

車前

蒼朮

猪苓

赤苓

澤瀉

官桂

桂枝黃芪湯

又
芪

桂枝
白芍

甘草

生姜

大棗

黃

此治無汗須熟服
汗如無汗再服

硝黃湯

又

大黃

硝石

黃柏

山梔

小半夏湯

又
半夏

生姜

茵陳湯

穀疽

茵陳

山梔

大黃

梔子大黃湯

酒疸

山梔

大黃

枳實

淡豉

葛根

加味柴胡酒

又
淡豉

茵陳草

柴胡

黃芩

半夏

黃連

當歸白术湯

又
半夏

茵陳草

葛根

當歸

白术

黃芩

藿香扶脾飲

又
陳皮

炙甘草

麥芽

厚朴

半夏

藿香

木香

加味四君子湯

又
白芍

人參

黃芪

茯苓

白术

炙草

濕諸疸方

根燈心

滑石散

又 滑石錢半 枯凡三分 爲末大麥湯下

腎着湯

又 升麻 防風 蒼朮 白朮 羌活 獨活
茯苓 猪苓 柴胡 葛根 甘草 濤澤

黃芪湯

活瀉 人參 神曲 黃柏 又方四芩合四物
去川芎 加茵陳 麥冬 滑石
黃汗 黃芪 赤芍 茵陳 石膏 麥冬
淡豉 甘草 生姜 竹葉
茵陳

茵陳四逆湯

陰黃 茵陳 附子 甘草 乾姜

濟生茵陳湯

疫疸 茵陳四錢 大黃二錢 山梔一錢

茵陳瀉黃湯

又 茵陳草 葛根 姜黃連 山梔 白朮
赤苓 白芍 人參 木通 木香 姜東

人參養榮湯

虛黃 肉桂 白朮 當歸 白芍 陳皮 黃芪
炙草 熟地 茯苓 遠志

五味子 姜 杓

青龍散

風黃 防風 荆芥 首烏 生地 威靈仙
每末一錢食後開水下日三次

桃仁承氣湯

血黃 大黃 芒硝 厚朴 枳棗 桃仁
木通 山梔 茯苓

化疸湯

總治 茵陳 蒼朮 木通 山梔 茯苓

停滯加神曲麥芽山楂

酒疸加葛根首蓿

女勞加當歸紅花

瘀血加琥珀丹皮紅花紅曲蒲黃桃仁五靈脂

延胡索

參术健脾丸

久痘

人參

白术

茯苓

當歸

陳皮

秦艽

當歸秦艽散

又

川芎

當歸

白芍

熟地

茯苓

四君子湯

又

白术

陳皮

半夏

炙草

秦艽

金匱腎氣丸

又

熟地八兩

山萸

山藥各四兩

丹皮

附子

肉桂各一兩

茯苓

澤瀉各三兩

牛膝

車前子各兩半

硝礬散

黑疸

硝石

礬石燒

等分爲末

大麥粥汁

服方寸七日

三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是其候也

便正黑是其候也

硝能散虛鬱之熱爲體輕

脫而寒不傷脾礬能却水而所到之處邪不復

侵合而用之散鬱熱解腎毒其于氣血陰陽汗

下補瀉等治法毫不相涉所以爲佳

茵陳蒿四兩搗取汁一合

瓜萎根一斤

沈氏黑疸方

又

搗取汁六合冲

和頓服之必有黃

水自小便中

下如不下再服此金鰲自製方也簡便方單用爪蔓根汁以洩熱毒爲黑疸良方余復加茵陳汁以爲濕邪引導較爲真切故用之輒效也

龍胆苦參丸

穀疸勞疸

龍胆草一兩

苦參三兩

牛胆

茵陳蒿酒

酒疽

茵陳蒿四根

山梔七枚

大田螺一枚

連壳打爛

以百沸白酒一大盞

冲汁飲之

甘遂末一錢

和

豬項肉丸

酒疽

作丸

紙包煨香

食之酒下當利出酒布袋也

甘遂末一錢

和

黃芪散

女勞

滑石

石膏

等分爲末

每方寸七大

二石散

麥汁

服日

三次

小便大利

愈腹滿者不治

月經灰酒

又

女勞

月經和血

衣燒灰酒服

方寸七日二

服三日瘥

時行

小麥七升

竹葉五升切

石膏三兩

小麥湯

水

一斗半煮

取七升細服

盡劑愈

白蟬各五錢

陳皮三錢

化

白鮮皮湯

婦人

癟

黃

白鮮皮

茵陳蒿

等分

水二

鍾煎服

蠟礬丸

日二服

白蟬

黃蠟各五錢

陳皮三錢

化

治黃胖方四

四寶丹

黃胖
兩
使君子內二兩

枳榔

南星製各一斤

如

吃茶葉加細茶一斤
如吃炭加黑炭一斤
蜜丸空心砂糖水送下

五十丸

綠礬丸

又
炒紅
醋淬
綠礬
姜汁
炒白各四兩
神曲
炒黃各八兩
姜汁煮
針砂

枣肉丸溫酒
下六七十丸米飲下亦可終身忌

褪金丸

又
大
術各二兩半
陳皮
神曲
麵糊丸
麥芽各兩半
白术
蒼

厚朴
甘草各一兩
忌魚腥濕麵生冷等物
有塊加醋三稜
醋蓬朮各一兩半

沈氏雙砂丸

脫力黃
針砂四兩炒紅醋淬至白色
砂仁
包煅紅一兩
胡桃肉四兩生研一兩
去皮核爲丸每服一錢半脫力勞傷陳酒下

升
切黃病米飲下每病不過服四兩多至六兩無

此金鱉自製方也用以治脫力黃及一切黃神
不愈效

附載楊氏黃病方二

餘糧丸

總治脫力勞傷黃病及一切黃胖病仙方也
餘糧石醋煅一斤

皂礮浮麥醋炒四兩

海金沙沙醋炒二兩

益母草蜜酒炒二兩

百草霜醋炒二兩

香附便浸鹽酒炒四兩

茵陳酒炒二兩

烏龍尾醋酒炒二兩

廣皮焙二兩

砂仁姜汁炒二兩

白蔻仁烘二兩

松蘿茶焙脆二兩

木香晒二兩

生地酒煮晒二兩

歸身炒二兩

白芷晒二兩

陳香櫟切片晒二兩

川貝母去心晒二兩

川椒晒二兩

延胡索酒炒二兩

漆渣炒烟盡二兩

大棗六斤煮取肉作丸豌豆大朝七暮八開水
送下以病愈爲度

治同上

針砂醋煅一兩

香附童便浸炒一斤

甘草炒一兩

陳皮去白炒三兩

白芍炒五兩

香附丸

製蒼术五兩

茯苓乳蒸晒焙三兩

山楂肉炒黑五兩
青皮炒六兩

苦參炒春夏二兩秋一兩

白术土炒三兩

醋糊丸每一錢米飲下弱者七八分白术湯

忌一切生冷油膩腥發磁硬之物服過七

日手心卽涼內有紅暈起調理半月卽愈矣
虛弱人宜佐以四君子湯



南京中医药大学
南京中医药大学图书馆版权所有

沈氏尊生書卷十七

雜病源流犀燭 六淫門

燥病源流

沈金鳌撰

經曰。諸澁枯涸乾勁皺揭皆屬於燥。夫陽明燥金乃肺與大腸之氣也。故燥之爲病。皆陽寔陰虛。血液衰耗所致。條分之。雖有風燥。熱燥火燥氣虛燥之殊要。皆血少火多之故。是以外則皮膚皺揭。中則煩渴。上則咽鼻乾焦。下則溲赤便難。陽有餘而陰不足。肺失清化之源。腎乏滋生之本。痿消噎攣皆本于此。治法惟以滋金養血爲主。宜滋。所謂熱燥病在裡者也。耗人津液。故便秘消渴生焉。宜大補。地黃丸。所謂風燥病在表者也。肌膚枯毛髮槁。故乾疥爪枯生焉。榮湯。所謂火燥病亦在裡者也。東垣云。饑飽勞役損傷胃氣及食辛辣厚味而助火邪。伏于肺中。耗散真陰。津液虧少。故大便燥結。

燥病源流

卷十七

一

而其燥結又有風燥熱燥陽結陰結之殊治法總惟辛以潤之苦以瀉之。宜大黃黃芩黃連黃柏連喬山梔元參知母石膏
膏童便當歸木通麻仁甘菊柏子仁蘋漿梨汁而此熱燥風燥火燥其原搃不外氣血之虛燥蓋惟氣血之虛先有致燥之由故風熱火相感而成病也然氣虛之燥其症則爲痿痺以肺熱

不能管攝一身也血虛之燥其症則爲噎膈以胃虛

納飲

食也。氣虛燥宜以黃芪爲君黃柏爲臣黃芩爲使

血虛燥宜以歸身爲君白芍爲臣生地爲佐其本病亦有易

見者至于燥病之發不一瘳治之方亦不一試列舉之一切燥熱

可概治也。宜大黃黃芩黃連黃柏連喬山梔元參知母石膏
地黃丸咽乾鼻燥必清上部也宜清涼飲

大腸風秘燥結

宜清涼飲

理中焦也。宜潤湯元戎四物湯皮膚皴裂血出肌肉燥痒是火刑金

必清肺以保金也。宜加減筋燥爪枯必滋養其榮血也。宜養榮湯皮膚

必生血潤

拆手足爪甲枯搔之屑起血出痛楚必養血以澤膚也。宜膚飲瓊脂

膏天門腸胃枯燥大便秘結必清燥以潤腸也。宜當歸承氣湯如是而燥
膏天門
膏膏
膏膏

病有不愈者哉。

脉法。入門曰。傷燥脉澁。正傳曰。脈緊而澁。或浮而弦。或芤而遲。皆燥脉也。

燥病原由症治。類聚曰。燥者肺金之本。燥金受熱化以成燥。澁由風能勝熱。熟能耗液而成燥也。燥于外。則皮膚皺揭而癢。痒。燥于中。則精血枯涸。燥于上。則咽鼻乾焦。燥于下。則便尿閉結。故曰燥爲肺金病也。宜當歸承氣湯。正傳曰。火熱勝則金衰。而風生。緣風能勝濕。熟能耗液而爲燥。陽寔陰虛。則風熱勝于水濕而爲燥也。蓋肝主筋。而風氣自甚。又燥熱加之。則筋太燥也。燥金主于收歛。故其脉緊澁。而爲病勁強緊急而口噤也。夫燥之爲病。血液衰少。不能榮養百骸。故也。入門曰。經云燥者潤也。養血之謂也。積液固能生氣。積氣亦能生液。宜服瓊玉

膏。又曰皮膚皺揭拆裂。血出大瘡。或皮膚瘙痒。爪甲浮起乾枯。皆火爍肺金。燥之甚也。宜以四物湯去川芎。合生脉散加天冬。花粉。知母。黃柏。酒紅花生甘草之類。東垣曰。榮衛枯涸。濕劑。所以潤之。二冬。人參。杞子。五味同爲生脉之劑。葉氏醫案曰。

燥有由心陽過動傷液者。一老人舌腐肉消肌枯。心事繁冗。陽氣過動。致五液皆涸而爲燥。冬月無妨。夏月深處林壑。心境凝然。每早服牛乳一杯。又曰。上燥治氣。下燥治血。此定評也。今陽明胃腑之虛。因久病嘔逆。投以辛耗破氣津液劫傷胃氣。不主下行。致腸中傳送失司。經云。六腑以通爲補。半月小效。全在一通補工夫。豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰。用鮮生地。天冬。人參。甜梨肉。生白蜜。又曰。陽津陰液重傷。餘熱淹留不解。臨晚潮熱。舌色若赭。頻飲救亢陽焚燎。究未能解渴。形脈俱虛。難投白

虎當以仲景復脉一法爲邪少虛多使少陰厥陰二臟之陰少
甦。冀得胃關復振因左關尺空數不藏非久延所宜耳此亦清
熱劫陰液之法也用人生地阿膠麥冬桂枝炙草生姜大枣

華岫雲曰燥爲乾澀不通之候內傷外感宜分外感者由于
天時風熱過勝或因深秋偏亢之邪始必傷人上焦氣分法以
辛涼甘潤肺胃爲先喻氏清燥救肺湯是也內傷者乃人之本
病精血下奪而成或因偏餌燥劑所致病從下焦陰分先起法
以純陰靜藥柔養肝腎爲宜大補地黃丸六味丸是也要知是
症大忌苦澀最喜甘柔若氣分失治則延及于血下病失治則
槁及平上喘咳痿厥三消噎嗝之萌總由此致大凡津液結而
爲患者必佐辛通之氣味精血竭而爲患者必藉血肉之滋填
在表佐風藥而成功在腑以緩通爲要務古之滋燥養榮湯潤

腸丸五仁湯瓊脂膏牛羊乳汁等法各有專司也。

治燥病方十九

滋燥飲

搃治
麥冬

秦艽
花粉

白芍
生地

天冬

人乳牛乳梨汁
蔗汁時

時可服

大補地黃丸

熟燥
白芍

熟地
生地

當歸
元參

杞子
酒知母

山藥
酒黃柏

山萸
肉

蕤容

蜜丸
鹽湯下

養榮湯

風燥
黃芩

當歸
防風

白芍
甘草

熟地
黃芩

生地
薄荷

秦艽
當歸

清涼飲

清上部
白芍

黃連
甘草

便少
黃芩

大黃
便少
大黃

麻仁
少加大黃

鎮風順氣丸

風秘
枳榔

大黃
枳壳

獨活
防風

山萸
車前子

山藥
牛膝

菟絲
菟絲

辛潤湯

又
楨榔

熟地
歸身

生地
桃仁

升麻
當歸

紅花
白芍

炙甘草
生地

元戎四物湯

又
桃仁

川芎
當歸

白芍
白芍

生地
生地

煨大黃
煨大黃

加減四物湯

保肺

當歸

白芍

生地

麥冬

元參

生血潤膚飲

潤膚

天冬一錢半

生地

熟地

麥冬

桃仁泥

瓜蒂

天門冬膏

天門冬去心生搗綃汁濾去渣砂鍋熬成

膏酒服一二匙

當歸

大黃各二錢

芒硝七分

甘

當歸承氣湯

潤腸草五分水煎臨時入芒硝攪和服

當歸

大黃各二錢

芒硝七分

甘

當歸承氣湯

潤腸草五分水煎臨時入芒硝攪和服

當歸

大黃各二錢

芒硝七分

甘

四物湯

燥甚川芎當歸

水煎臨時入芒硝攪和服

當歸

大黃各二錢

芒硝七分

甘

生脉散

又人參麥冬五味子

炙甘草

阿膠

生地

麥冬

人參

炙甘草湯

熱劫麻仁

炙草

阿膠

生地

麥冬

人參

清燥救肺湯

傷氣

桔梗

黃芩

麥冬

花粉

桑皮

六味丸

傷血

生地

山藥

山萸

丹皮

茯苓

滋燥養榮湯

揩治

熟地

生地

黃芩

甘草

白芍

潤腸丸

又歸尾

熟地

秦艽

羌活

桃仁

麻仁

大黃

一

五仁湯

又

桃仁

杏仁

柏子仁

松子仁

郁李

瓊脂膏

又

生地

二十斤打汁去渣

白蜜

二升煎沸

鹿角膠

真酥油各二斤

生姜

二兩

取汁

先以慢火熬

地黃汁數沸

棉濾取淨

汁

又煎二十沸下

膠次下酥蜜全熬

至如飴

磁器

器

收貯

每服一二匙溫酒

下

三消源流

沈金鳌撰

三消燥病也。三消之症分上中下。上消者舌赤裂咽如燒大渴引飲。日夜無度。中消者多食易饑。肌肉燥口乾。飲水大便鞭小便如泔。下消者煩躁引飲耳輪焦便溺不攝或便如膠油。三消之由上消肺也。由肺家寢火或上焦熱或心火煅煉肺金中消脾也。由脾家寢火或伏陽蒸胃下消腎也。由腎陰虛或火伏下焦經曰心移寒于肺爲肺消肺消者飲一溲二死不治。又曰心移熱于肺傳爲鬲消。又曰奇病有消渴皆上消也。多飲而渴不止者也。蓋肺主氣其能通調水道而有制者賴心君火時與以溫氣而爲之主以潤燥金故肺之合皮其主心也。若心火不足不能溫金而反移以寒寒與金化則金冷氣沉而不得升猶下有溝瀆上無雨露是以飲一溲二也是肺氣以下而枯索也故曰肺消死不治此因于寒者

也。肺本燥金。心腹以熱移之爲火燥相卽。因而鬲上焦煩飲水多而善消。此因干熱者也。可見上消之由。有陰有陽。不可不辨。而多飲易消。火氣炎鬱。所以爲奇病也。經又曰。痺成爲消中。又曰。胃中熱則消穀。令人善饑。又曰。二陽結謂之消。皆中消也。此蓋結于本氣。陽明氣盛。熱壯然以血多津守。未嘗有所結。今言其結。則陽邪盛而傷陰。枯其津液。故結在中。焦陽明亢甚。故消穀善饑。又熱亢能消。精液不榮肌肉。故名曰消也。經又曰。溲便頻而膏濁不禁。肝腎主之。此下消也。蓋緣腎水虧損。津液枯竭。水虧火旺。蒸爍肺金。肺被火邪。又不能生腎。故成下消也。趙獻可言三消之症。總由煎熬既久。五臟燥烈。能食者必發胸疽背瘡。不能食者必發中滿鼓脹。治者不必分上中下。概用清肺滋腎之藥。上消小劑。中消中劑。下消大劑。宜概用六味丸。其或命門火衰。火不歸元。遊于肺爲上加麥冬、五味子。

消遊于胃爲中消必用引火歸元之法渴病若失矣。宜八味丸水服之。若過用寒涼恐內熱未除中寒又起。獻可此言誠能于消病中尋源討流但必切脉合症確然審是命門火衰然後可用桂附若由熱結所致下咽立斃矣慎之謹之大約善治三消者必補腎水真陰之虛瀉心火燔灼之勢除腸胃燥熱之邪濟心中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不滯則消症無不愈矣夫三消之成摠皆以水火不交偏勝用事燥熱傷陰之所致而要之五行之氣相成陽勝固能消陰陰勝亦能消陽如經言二陽之病傳爲風消二陽者陽明也陽明既病木邪起而勝之既勝則精血不榮肌肉風消也故由燥陽傷陰而氣不化水固爲消由陰邪偏勝而陽不帥陰其水不化氣亦爲消其消一也。治三消宜人參白朮散桑白皮湯

活血潤燥生津飲又有中消而口甘者由脾熱中消而口苦者由大黃甘草飲子

燥 三消

胆熱此二種內經謂之瘧症與消病一類而却非卽消病蓋口甘者脾痺肥美之所發肥令人內熱甘令人中滿中滿熱鬱其氣上溢久亦轉爲消渴也經則治之以蘭草除陳氣也蘭性味甘寒能利水道其清氣能生津止渴除陳積畜熱也口苦者膽痺肝取決於胆而數謀慮不決膽氣虛其氣上溢而口爲之苦以膽之脉會于咽也治法俱同三消特各加引經藥使歸于肝脾至三消分治之方可詳舉之有煩渴能食者宜人參白虎湯有消渴胸滿心煩無精神者寧神湯有消渴便乾陰頭短舌白燥口唇裂眼濇而昏者消潤燥湯有消渴後身腫者宜紫蘇湯有消渴面目足膝腫小便少者宜瞿麥飲有消渴咽乾面赤煩躁者宜地黃飲有消渴盛于夜者宜加減地黃丸有消渴由心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消者宜降心湯有心火熾熱口乾煩渴小便赤澁者宜清心蓮子湯有消渴小便數舌上赤脉肌體枯瘦

者。宜和血有消渴而上焦煩熱爲膈消者。

宜人參有消渴不能食石膏湯。

益氣湯。

有消渴而上焦煩熱爲膈消者。

宜人參有消渴不能食石膏湯。

津養血湯。宜麥門冬飲子有老人虛人大渴者。

宜人參以上皆上消之屬。通治上

冬飲子。

有老人虛人大渴者。宜人參以上皆上消之屬。通治上

黃芩湯。有消中飲食多不甚渴小便數肌肉瘦者。

宜加減白朮散有消

穀善饑者。宜加減白朮散有能食而瘦口乾自汗便結溺數者。

宜清涼飲有消

中而瘦二便秘者。宜蘭香飲子有消中由胃熱者。

宜藕汁膏有消中而中焦

燥熱。肌肉瘦削大便鞭小便數而黃赤者。

宜生津甘露飲有消中後腿漸

細將成腎消者。宜茯苓丸以上皆中消之屬。

通治消中宜調胃承氣湯

順氣有腎消大渴飲水下部消瘦小便如脂液者。

宜元鬼丹有腎虛水

散潤燥渴者。宜雙補丸有腎消大渴便數腰膝疼者。

宜腎瀝丸有腎消尿濁如

膏者。宜人參茯苓散有腎消口燥煩渴兩脚枯瘦者。

宜加減腎氣丸有腎虛消渴

小便無度者。宜鹿茸丸有腎消莖長而堅精自出者此孤陽無陰卽強

中症也最難治蓋此亦由耽好女色或服丹石以恣慾久則真氣

燥三消

脫而熱氣盛。故飲食如湯沃雪。肌膚削小。便如膏油。陽易興而精

易洩也。

宜六味丸石子薺以上皆下消之屬

通治下消宜補腎地黃元加減八味丸

消症之不同如此。此外又有食佞性。經曰。大腸移熱于胃。善食而

瘦。謂之食佞性。胃移熱於胆。亦名食佞性。註云。佞性者。易也。飲食移易而

過。不生肌肉也。治之與消中同。而又有酒渴症。由平日好酒。熱積

于內。津液枯燥。煩渴引飲。專嗜冷物也。

宜烏梅木瓜湯

而又有蟲渴症。由

蟲在臟腑之間。耗其精液。而成消渴也。

宜苦棟湯

而又有類消症。其人

渴欲求飲。飲一二口。卽厭。不比消渴之無厭。此由中氣虛寒。寒水

泛上。逼出浮游之火。于喉舌間。故上焦欲得水救水。到中焦。以水

遇水故厭也。

宜理中湯送八味丸

又經云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女

予不月。陽明位太陰之表。而居中于腑。則胃當之。非若手陽明大

腸之以經絡爲陽明比也。其病發心脾者。胃與心爲生土之母子。

而脾與胃爲行津之表裡。發者，發足之義。人之情欲，本以傷心勞倦憂思。本以傷脾。臟既傷，則必連及于腑。又必從其能連及者。如母病必及子。故凡內而傷精，外而傷形者，皆能病及胃。此二陽之病，發自心脾也。然陽明爲生化之本，其氣盛，其精血下行，化榮衛而潤宗筋。化源既病，則陽道外衰，故不行隱曲而枯澁。女子則不月。蓋心脾爲真陰之主，胃爲真陽之主。傷真陰，必使真陽無守。二陽既病，倉廩空而餉道絕，爲生死之閼。然必自真陽之傷爲之。故曰發心脾也。治亦同三消。參其症而用方主之可也。至于消渴既久，其傳變之症，在能食者，必發瘡疽，背瘡不能食者，必至中滿鼓脹。何也？津液竭，則火邪勝，故發瘡膿，且痛甚。而或不潰，或流赤水也。又如上中二消制之太急，寒藥多而胃氣傷，故成中滿甚而水氣浸漬溢于皮膚，則爲腫脹。所謂上熱未除，中寒之症復生也。夫

至瘡疽脹滿亦與強中等症皆爲傳變而不易治矣。

脉法 內經曰消渴脉寔大。病久可治。脉懸小堅病久不可治。
仲景曰趺陽脉數。胃中有熱。卽消穀引飲。大便必堅。小便卽
數。 脉經曰消渴脉當得緊寔而數。反得沉澁而微者死。又曰。
心脉滑爲渴。滑者陽氣勝也。心脉微小爲消渴。又曰脉數大者
生。沉小者死。

消渴與脚氣反 本事曰消渴脚氣雖皆爲腎虛所致。其爲病
則相反。脚氣始發于二三月。盛于五六月。衰于七八月。消渴始
發于七八月。盛于十二月。衰于二三月。其故何也。蓋腳氣壅
疾也。消渴宣疾也。春夏陽氣上。故壅疾發。則宣疾愈。秋冬陽氣
下。故宣疾發。則壅疾愈。審此二者。疾可理也。

消渴原由症治 本事曰消渴之症全由坎水衰少。何也。肺爲

五臟華蓋。若下有暖氣蒸。則肺潤。若下冷極。則陽不能升。故肺乾而渴。譬如釜中有水。以火煖之。又以板覆。則暖氣土騰。故板能潤。若無火力。則水氣不能上升。此板終不能潤。火力者。腰腎強盛。常須煖補。腎氣飲食得火力。則潤上而易消。亦免乾渴之患。宜腎氣丸。又曰。消渴者。腎虛所致。每發則小便必甜。以物理推之。淋鶴醋酒作脯法。須臾卽甜。足明人之食後。滋味皆甜。流在膀胱。若脾腎氣盛。則上蒸炎氣。化成精氣。下入骨髓。其次爲脂膏。又其次爲血肉。其餘則爲小便。故小便色黃。血之餘也。五臟之氣鹹潤者。則下味也。若腰腎旣虛冷。則不能蒸化穀氣。盡下爲小便。故味甘不變。其色清冷。則肌膚枯槁也。直指曰。自腎消而析之。又有五石過度之人。真氣旣盡。石勢獨留。陽道興強。不交精液。名曰強中。消渴輕也。消中甚焉。消腎又甚焉。若强

中則斃可立待。

類聚曰：五臟六腑皆有津液，熱氣在內，則津

液竭少，故爲渴。夫渴者，數飲水，其人必頭目眩，背寒而嘔，皆因裡虛故也。入門曰：飲水而安者，寔熱也。飲水少頃卽吐者，火

邪假渴耳。

丹溪曰：三消多屬血虛，不生津液，宜以四物湯爲

主。上消加人參、五味、麥冬、花粉，煎入藕汁、地黃汁、牛乳、酒，客生葛根汁，冲服。中消加知母、石膏、寒水石、滑石。下消加黃柏、知母、熟地、五味子。又曰：養肺降火，生血爲主，分上中下治之。又曰：消

渴症，小便反多，如飲水一斗，小便亦一斗，宜腎氣丸。

徐忠可

曰：仲景云：厥陰之爲病，消渴，氣上衝心，心中疼熱，饑而不欲食，食卽吐。下之不肯止。夫厥陰之爲病，消渴七字，乃消渴之大原。

然或單渴不止，或善食而渴，或渴而小便反多。後人乃有上中

下之分。不知上中下雖似不同，其病原總屬厥陰。厥陰者，風木

之臟也。與風相得，故凡中風必先中肝。然風善行而數變，故在經絡在血脉，在肌肉，各各不同。而又有鬱于本臟者，則肝得邪而寔，因而乘其所勝。陽明受之，乘其所生，少陰受之，于是上中下，或有偏勝。現症稍殊，皆爲消渴。皆由厥陰風鬱，火燔故曰厥陰之爲病，消渴。內經亦有風消二字。消必兼風言之，亦此意也。又曰：內經云，二陽結謂之消。仲景獨言厥陰，似乎互異。不知邪氣浸淫，病深腸胃，氣聚不散，故曰結。其使腸胃之氣不能健運，而成三消，則厥陰寔爲病之本。如果病專腸胃，則下之爲中病，消渴宜無不止矣。然多食而飢不止爲中消。此又云，饑不欲食，則知消渴之病，亦有不欲食者。但能食而渴者，全重二陽論治。飲一溲二，重在腎虛論治。其不能食而氣冲者，重在厥陰論治。此又臨症時，微細之辨乎。

繆仲濬曰：三消渴疾，以鮎魚涎和

黃連末爲丸每五七丸烏梅下日三服取效。又曰用白芍甘草等分爲末每一錢水煎日三服。有人患消渴九年服藥止而復作得是方服之七日頓愈。古人處方殆不可曉不可以平易而忽之。又方用瓜蔞根黃連各三兩爲末蜜丸每三十丸麥冬湯下日二服其飲水無度小便數者用田螺五升水一斗浸一夜渴卽飲之每日一換水及螺或煮食飲汁亦妙其飲水無度小便赤澁者用秋麻子仁一升水三升煮三四沸飲不過五升瘥其腎消飲水小便如膏油者用茴香苦棟子等分炒爲末每食前酒服二錢其消渴飲水骨節煩熱者用芭蕉根搗汁時飲一二合其消渴不止下元虛損者用牛膝末五兩生地汁五升浸之日晒夜浸汁盡爲度蜜丸空心酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑鬚髮津液自生其胃虛消渴者羊肚煮爛空腹服之其

消渴煩亂者。乾冬瓜瓢一兩水煎服。其消渴羸瘦小便不禁者。
兔骨和大麥苗煮汁服極效。其消中易饑者。用蕤容山萸五味
蜜丸每鹽酒下二十丸。其三消骨蒸者。以冬瓜自然汁浸晒黃
連末七次。又以冬瓜汁和丸每三十丸。大麥湯下尋常日渴。
只一服見效。其強中消渴者。用猪腎一具。薺苓石膏各三兩。人
參茯苓磁石知母葛根黃芩花粉甘艸各二兩。黑大豆一升。水
一斗半。先煮猪腎大豆取汁一斗去渣。下藥再煮三升分三服。
名猪腎薺苓湯。後人名爲石子薺苓湯。

消癰。肝心腎三經之陰虛而生內熱病也。卽經所謂熱中與三消
異。靈樞經言。五臟皆柔弱者善病消癰。夫皆柔弱者。天元形體不
充也。其本大氣不足。五臟氣餒。陰虛生內熱。自是內熱不解。而外
消肌肉。故五臟之脉。皆以微小者爲消癰。是五臟之氣不能充滿。

於榮分而內有鬱熱以爍之也。故法以脈寔大者爲順。雖病可治。若脈懸小而堅。則精枯血槁。必不能耐久矣。是知消癰之病本起。于不足。必以滋陰平肝清熱爲主也。宜生地黃飲

子玉泉丸

消癰症治。內經註曰。癰謂消熱病也。多飲數溲。謂之熱中多食數溲。謂之消中。內經曰。凡消癰肥寔人。則膏梁之疾也。此人因數食甘美而多肥。故其氣上溢。轉爲消渴。註曰。食肥則腠理密。而陽氣不得外泄。故肥令人內熱。甘者性氣和緩。而發散逆。故甘令人中滿。然內熱則陽氣炎上。炎上則欲飲而嗌乾。中滿則陽氣有餘。有餘則脾氣上溢。故轉爲消渴。入門曰。消者燒也。如火烹燒物者也。鰲按消爲肌肉爍。癰爲內鬱熱二字。連讀爲一症之名。非如內經言癰成爲消中。消爲三消。癰爲癰病也。卽內經言肥甘之病。亦消渴之類。非消癰姑附于此。

治三消方四十四

六味丸

澤鴻

地黃

山藥

山萸

丹皮

茯苓

八味丸

澤鴻

熟地

山藥

山萸

丹皮

茯苓

人參白朮散

澤鴻

人參

白朮

當歸

白芍

山梔

錢

官桂

木香

藿香

花粉

葛根

寒水石

四錢

石膏

八錢

磁石

芒硝

六錢

共爲末

每取五錢

加蜜少許

服漸加至

桑白皮湯

桑白皮

新生者

二錢

茯苓

人參

麥

冬

葛根

山藥

肉桂

各一錢

甘草

五分

水煎服

大甘草飲子

大黃兩半

甘草大者四兩

黑豆五升

另用井水一桶

同煮豆爛

另煮去苦水

火麻仁

令病人食豆飲汁無時不三劑病去

活血潤燥生津飲

天冬生地仁

麥冬熟地

五味子花粉

瓜蔞仁當歸

火麻仁甘草各一

錢

水煎服

人參寧神湯

上消
知母

人參

生地

甘草

葛根

茯神

人參白虎湯

又

人參

石膏

甘草

知母

止渴潤燥湯

又

升麻

錢半

杏仁

桃仁

麻仁

歸身

荆芥

知母

黃柏

石膏各

一錢

熟地

甘草五分

熟服

紫蘇湯

又

紫蘇

羚羊角

桑皮

赤苓各

一錢

郁李仁

細辛

香獨活

枳壳各

三分半

枳壳各

五分

瞿麥飲

又半

瞿麥

澤瀉

滑石各

一錢

防已

一錢

地黃飲

又杷葉

黃芩

大黃各

五分

桑螵蛸

三個

加減地黃丸

又百藥煎

熟地

生地

天冬

麥冬

人參

枇杷

甘草

降心湯

又

蓮子二錢

赤苓

人參

遠志

當歸

熟地

甘草各一錢

東二枚

清心蓮子飲

又

黃芩

麥冬

車前子

地骨皮

甘草各

一錢

甘草各一錢

七分

人參石膏湯

又人參錢七分
甘草錢三分

石膏四錢

知母二錢三

和血益氣湯

又連各八分
母草

酒黃柏升麻各一錢

酒生地桃仁石膏各六分

酒黃知母

差活防已各五分
炙甘草麻黃根柴胡各三分

歸梢四分生甘

紅花

麥門冬飲子

又麥冬二錢葛根

知母生地甘草各一錢

人參花粉人參五味子

人參麥冬湯

又麥冬葉十片

人參茯苓甘草

杞子五味子

生津養血湯

通泊上消錢川芎

當歸白芍生地

麥冬各一分

母蜜黃柏蓮肉

烏梅肉薄荷甘草

桔梗麥冬當歸

黃芩湯

又地片芩葛根人參

白芍各一錢

當歸生烏

清涼飲

中消
草
柴胡
黃芪
茯苓
生地
酒知母
防風
桃仁
杏仁
當歸
黃柏
石膏

蘭香飲子

又 石膏三錢
各一錢
白豆蔻
蒸餅糊
生津甘露湯
羌活
八分
生地
五個
熟服
又 藕汁
未佐以
湯送下
日三四次

知母錢半
炙甘草
桔梗
升麻各五分
乾爲末
每二錢
淡姜湯
龍胆草
黃柏各一
錢
酒知母
酒黃芩
升麻四分
杏仁六個
桃仁
生甘草各三分
水煎加酒
一匙不拘時
稍

人參
蘭香葉
連翹
半夏二分
乾爲末
每二錢
淡姜湯
龍膽草
黃柏各一
錢
酒知母
酒黃芩
升麻四分
杏仁六個
桃仁
生甘草各三分
水煎加酒
一匙不拘時
稍

人參
蘭香葉
連翹
半夏二分
乾爲末
每二錢
淡姜湯
龍膽草
黃柏各一
錢
酒知母
酒黃芩
升麻四分
杏仁六個
桃仁
生甘草各三分
水煎加酒
一匙不拘時
稍

藕汁膏

又 藕汁
生地汁
牛乳和黃連末
天花粉
未佐以姜汁
白蜜爲膏
挑取留舌上
徐徐以白
湯送下
日三四次

加減白朮散

又 葛根二錢
木香
知母
黃柏
甘草各五分
五味子

茯苓丸

又 茯苓
葛根
人參
元參
石斛
蛇床子
覆盆子
鵝肫

皮 磁石湯下

調胃承氣湯 通治中消

加減三黃丸

大黃

黃芩

黃連

生地

黃連豬肚丸

又 根

雄猪肚全具
知母各四兩

黃連五兩
麥冬

瓜萎

口蒸爛搗入蜜少許丸每百丸米飲下

順氣散

又

大黃 芒硝各二錢

炙甘草一錢

元兎丸

下消
十兩

兎絲子酒浸通軟乘濕研焙乾別取末
五味子酒浸別爲末淨七兩 茢苓

蓮肉各三兩 別研乾山藥末六兩將所浸酒
添酒打糊丸空心食前米飲下

雙補丸

又 蔴容 鹿角膠

人參

茯苓

苡仁

熟地

又 兔絲子 覆盆子各一兩

錢

麝香一錢

人參

黃芪

肉桂

腎瀝丸

又 熟地

遠志

茯苓

歸身

龍骨

澤瀉

桑螵蛸

各一兩 煙草各五錢 川芎各二兩 五味子

元

參

火草各五錢

磁石二兩研淬去赤水

燥

三消方

卷十七

十四

每末五錢用羊腎煮湯代水煎日二服

加減腎氣丸

又子

熟地二兩

丹皮

茯苓

山萸

五味

赤沉

澤鴻

山藥

鹿茸各一兩

肉桂

沉

香各五錢

蜜丸空心下七八十九丸

人參茯苓散

又苓

滑石

寒水石

各錢半

甘草七分

赤連

喬三分

人參

白朮

澤鴻

桔梗

天花

連

葛根

山梔

砂仁各二分

一名人參散

桔梗

天花

連

喬三分

人參

白朮

澤鴻

桔梗

天花

連

喬三分

人參

白朮

連

鹿茸丸

又子

麥冬二兩

鹿茸

熟地

黃芪

五味

赤連

酒牛膝

山萸

各七錢半

地骨皮

五味

赤連

酒浸肉蓯客

地骨皮

五味

赤連

石子薺苓湯

又粉

薺苓

人參各五錢

蜜丸空心米飲下

五味

赤連

酒浸肉蓯客

地骨皮

五味

赤連

蜜丸空心米飲下

五味

赤連

蜜丸空心米飲下

五味

赤連

蜜丸空心米飲下

補腎地黃丸

通治下消

日蒸爛研膏與黃柏拌晒乾

生地半斤酒浸二

天

冬熟地

人參

甘菊各二兩

酒條芩

天

生片芩

當歸

枳壳

麥冬各一兩

水丸

空心鹽酒

下七八十九丸

加減八味元

熟地二兩

山藥

山萸各一兩

酒蒸

兩半

肉桂五錢

蜜丸五更初未言語時鹽湯下五六十丸臨卧再服

此方有五味最爲得力不惟止渴亦先生瘡疽久服永除渴疾氣

血加壯

烏梅木瓜湯

酒湯

烏梅打碎

木瓜各二錢

炒麥芽

苦棟湯

煎空心飲之

金匱腎氣丸

補氣澤瀉

熟地附子

山藥

山萸

丹皮

扶苓

四物湯

補血

川芎附子

肉桂

牛膝

當歸

白芍車前子

治消癬諸藥要品及方二

滋陰清熱平肝

地黃

黃柏

知母

丹皮

沙參

山藥

續斷

青蒿

牛膝

五味

山萸

阿膠

沙蒺藜

柏子仁

地骨皮

杞子

川芎

人參

玉泉丸

消癩

花粉

葛根

各兩半

麥冬

人參

茯苓

烏梅

甘草

各一兩

生黃芪

燥

三消方

卷十七

十五

蜜黃芪各五錢
蜜丸彈子大每一丸溫水嚼

下

生地黃飲子

又人參黃芪生地熟地金石斛
天冬麥冬枳壳枇杷葉澤瀉各一錢

甘草五分

此方乃二黃元合甘露飲也生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳壳疏導二府使心火下行則小便清利肺金潤澤火府流暢宿熱旣消其渴自止造化精深妙無倫比

火病源流

沈金齋撰

火有三。一曰君火。一曰相火。一曰龍雷之火。人之心爲君。以照臨爲德。故居神之物。惟火爲之所謂君火也。君火不以火用。惟建極于廣明。廣明卽膻中。爲神明喜樂之官。廣大清明之地。君主居之。以照臨十二官。爲生之本。榮之居。初非以燔灼爲令也。經故曰。君火以明。以明者。言照臨之不爽也。後人昧乎明字之義。因改曰君火以名。亦可發一笑矣。然君火雖不用。有時無精以養。則神空飛而有自焚之患。則亦有灼熱之時。相火者。心包代君行事。在三焦之中。處兩陽合明之地。所以應天之夏令。而主乎腐熟水穀。故經曰。陽明者午也。經以陽明當相火。夏令不言心包。而心包在其中矣。蓋人之相火。起少陽胆。游行三焦。督署于心包。爲陽明胃腐熟水穀之主。故曰少陽相火。火之能相在少陽耳。丹溪諸公。乃以龍

雷之陰火爲相火。後人多承襲其訛。其不知相火先。不知龍雷之陰火矣。所謂龍雷者何。曇氏曰。性火真空。性空真火遍滿法界。陰符曰。火生于木。禍發必尅。蓋陽隧直形。卽在陰物。莫宅之中。故此火則隱。胎坎水。昧兆風。木寔在乎君相有形之外。是謂龍雷無故。則不現。雖激之亦不起。惟水涸木枯氣逆血沸。則勢將焚巢燎原。而不可止。此火若起。則反君滅相。豈君相治平之火乎。緣此火不起于子半。不循行于少陽胆。猝犯之而猝起。所謂火生于木。禍發必尅者也。何前人竟謂之相火哉。然而相火之爲害亦大矣。甚則爲元氣之賊。又能煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。皆相火之爲也。夫火主動。凡動皆屬火。醉飽胃火動。恚怒肝火動。悲哀肺火動。房勞腎火動。心火能自焚。是五臟又皆有火也。且火動卽身熱。其因于五臟者各不同。如按至肌肉之下。至骨上。乃肝之熱。寅卯時尤

甚其症必兼四肢滿悶。便難轉筋。多怒多驚。筋疲不能起于牀。宜

胡飲

如按至皮膚之下。肌肉之上。輕手乃得。微按至皮毛之下。則

熱少。加力按之。則全不熱。是熱在血脉也。乃心之熱。日中尤甚。具

症必兼煩心。心痛。掌中熱而嘔。赤湯宜導如輕手按不熱。重按至筋骨

亦不熱。在不輕不重間。此熱在肌肉也。乃脾之熱。夜尤重。其症必

兼怠惰嗜卧。四肢不收。無氣以動。宜分虛寢。虛宜補中益氣湯實宜瀉黃散如輕

按不熱。重按至骨。其熱炙手。乃腎之熱。亥子時尤其甚。其症必兼骨

蘇。蘇然如虫蝕。其骨因熱不任。亦不能起于牀。宜滋腎丸如輕手乃得

略按全無此熱在皮毛也。乃肺之熱。日西尤甚。宜分輕重。輕者瀉百散重

者涼。是五臟之熱所宜審也。且火動則熱壅。其見于三焦者。又各

不同。如熱在上焦。因欬而爲肺萎。或口舌生瘡。眼目赤腫。頭項腫

痛。宜涼膈散加減清心湯如熱在中焦。大便堅結。或胸膈煩躁。飲食不美。

痛涼膈散清心湯如熱在中焦。大便堅結。或胸膈煩躁。飲食不美。

宜四順清涼飲。如熱在下焦。尿血淋閉。或小便赤澑。大便秘結。宜

桃仁承氣湯。

當歸飲子。是三焦之熱。所以審也。然而火之虛寔。又宜辨。如遇發

熱。脈沉寔而大者。爲寔。浮而虛數者。爲虛也。火之燥濕。又宜辨。燥

火疼而不腫。濕火腫而不疼。又燥火筋縮而疼。濕火腫脹而疼。又

燥火口渴便閉。濕火口不渴而大便滑也。痰與火又宜辨。如病之

有形者。總是痰紅腫結核。或疼或不疼。是也。病之無形者。總是火

但疼不腫。是也。火變病。又宜辨。如睡覺忽腰背重滯轉側不便。如

隆冬薄衣不冷。非閑壯盛。如平時筋不縮。偶直足一曲。卽縮。如食

時有涕無痰。不食時有痰無涕。如弱症。左側睡心左墜一響。右側

睡心右墜一響。如心中滴滴噏噏若有響聲。如頭眩耳鳴目暈。皆

火之變。可也。治火之藥。又宜辨。如心火。宜黃連生地。小腸火。宜赤

通肝火。宜柴胡。胆火。宜連翹。脾火。宜白芍。胃火。宜石膏葛根。肺火。宜

黃芩。龍胆草。生地。大黃。根大黃。肺火。山

梔黃芩桑

大腸火宜大黃

腎火宜黃芩知母

膀胱火宜黃柏

滑石宜黃柏

三焦火宜黃柏

上皮石膏

山梔中宜連翹

下宜地骨皮

心包絡火宜麥冬

丹皮

燥火宜生地

當歸

濕火宜歸麥冬

通茯苓

芩寃火宜大黃

芒硝如欲下之

寃火熱甚宜黃連

柏黃芩山梔

虛火宜姜皮竹

葉麥冬童

便甘草

如欲下之宜加大黃

生姜

虛火宜補

宜人參黃芪白芍

鬱火宜青

鬱火重按焰手輕按

火青黛

以宣五臟

鬱火山梔以

利小便而解鬱火

血中火宜生地

血虛發熱宜當歸生地熟地

氣如火從足下起入

腹爲虛熱之極

十不救一宜六味加內桂大劑作湯外用

無根之火附子末津調塗湧泉穴或愈

火遊行作熱

宜元參附子末津調塗湧泉穴或愈

臂水受傷爲真陰失守宜六味加元參作湯服

火過食生冷遏抑少陽之火于脾部宜加減

火宜竹茹竹瀝

過食生冷遏抑少陽之火于脾部宜加減

火宜竹茹竹瀝

過食生冷遏抑少陽之火于脾部宜加減

火宜竹茹竹瀝

過食生冷遏抑少陽之火于脾部宜加減

火宜竹茹竹瀝

之爲病所當悉心究之者

火之見症又宜辨

二便忽閉火也以利

小便爲先

宜赤芩猪苓澤瀉通草車前子

氣逆冲上火也以降氣

清熱爲先

宜桔金蘇子

躁擾狂越

言罵驚駭火也以清鎮涼解爲

小便爲先

宜滑石海金沙防已扁蓄瞿麥

火也以降氣

清熱爲先

宜桔金蘇子

躁擾狂越

言罵驚駭火也以清鎮涼解爲

小便爲先

宜麥冬枇杷葉

火也以降氣

清熱爲先

宜桔金蘇子

躁擾狂越

言罵驚駭火也以清鎮涼解爲

先

宜牛黃黃連黃芩山梔滑石知母童便

猝眩仆倒竅流血火也。以降折清涼爲先。然多不治。

以

石膏加大黃不行再加芒硝

益湯藍汁梨汁蘋汁猝心痛火也。以

涼心解毒爲先。

宜生地赤芍黃連大黃元參連

葛根

白芍生甘草目暈赤腫痛甚火也。以涼血

清熱爲先。

宜生地赤芍黃柏荆芥山梔木通

頭面忽然赤腫或痛

火也。以清熱消毒爲先。

宜甘菊牛蒡子連葛根石膏竹葉薄荷蟬退元參知母

甘草大黃口乾舌苦忽大渴思冰水火也。以清潤生津爲先。

宜石膏知母元參麥冬

苦忽大渴思冰水火也。以清潤生津爲先。

宜竹葉花粉五味子梨汁

苦忽大渴思冰水火也。以降氣發音爲先。

宜蘇子貝母桔梗百部竹瀝天

冬麥冬薄荷元參桑皮梨汁桔梗

苦忽大渴思冰水火也。以利水洩熱爲先。

宜茯苓黃連黃芩滑石

禁慄如喪

神守火也。以清熱鎮神爲先。

宜硃砂黃芩山梔知母

膾癰瘍瘡亂火

也。以和肝滌熱爲先。

宜白芍竹葉元參黃連石膏

症狀不同而各

有所以治之如此。總之治火切不可久任寒涼之品重傷脾胃便

不可救故化而裁之因乎變神而明之存乎人。

不可救故化而裁之因乎變神而明之存乎人。

脉法 脉經曰火脈洪數虛則浮 脉訣曰骨痿勞熱脈數而

虛熱而澁小必捐其軀加汗加咳非藥可治 丹溪曰脉寔數

者有寔熱 正傳曰脉浮而洪數虛火沉而寔大寔火洪數見

左寸心火右寸肺火左閑肝火右閑脾火兩尺腎經命門之火

男子兩尺洪大必遺精陰火盛也

火論四條 紹仲淳曰夫火者陽也氣也與水爲對待者也水

爲陰精火爲陽氣二物匹配名曰陰陽和平亦名少火生氣如

是則諸病不作矣倘不善攝養以致陰虧水涸則火偏勝陰不足則陽必湊之是謂陽盛陰虛亦曰旺火食氣是知火卽氣也

氣卽火也東垣亦曰火與元氣不兩立亦指此也譬諸水性本

流過極卽凝爲冰解則復常非二物也蓋平則爲水火旣濟火

卽真陽之氣及其偏則卽陽氣而爲火也始與元氣不兩立矣

故戴人曰。莫治風。莫治燥。治得火時風便了。正指火之變態多
端。爲病不一。了此則皆可辦也。人身之有陰陽水一而已。火
則二焉。是稟受之始。陽常有餘。陰常不足也。故自少至老。所生
疾病。由于真陰不足者恒也。若真陽不足之病。千百中一二矣。
陽者氣也。火也。神也。陰者血也。水也。精也。陰陽和平。是爲常候。
若縱恣房室。或肆情喜怒。或輕犯陰陽。或嗜好辛熱。以致腎水
真陰不足。不能匹配陽火。遂使陽氣有餘。氣有餘。卽是火。故火
愈盛。而水愈涸。于是而吐血。咳嗽。吐痰。內熱。骨蒸。盜汗。種種陰
虛之病。醫者又不明。凡見前症。不分陰陽。概施溫補。參芪二术。
還佐姜桂。倘遇僉劇。輒投附子。死猶不悟。良可憫也。雖然亦病
家不明。有以致之。何則。難成易虧者。陰也。益陰之藥。必無旦夕
之效。助陽之藥。能使胃氣一時暫壯。飲食加增。或陽道興舉。有

似神旺醫者病者利其速效宜乎服藥者多斃勿藥者反得存也。人身以陰陽兩稱爲平偏勝則病此大較也水不足則火有餘陰既虧則陽獨盛蓋陰陽之精互藏其宅是陽中有陰陰中有陽也故心火也而生赤液腎水也而藏白氣赤液爲陰白氣爲陽循環不息此常度也苟不知攝養虧損真陰陽無所附而發越上升此火空則發周身之氣併于陽也併于陽則陽盛故上焦熱而咳嗽生痰迫血上升而爲吐衄爲煩躁爲頭痛爲不得眠爲胸前骨痛爲口乾舌苦此其候也陽愈盛則陰虛陰愈虛則爲五心煩熱爲潮熱骨蒸爲遺精爲骨乏少力爲小水短赤丹田不緩則飲食不化爲瀉泄爲卒僵仆此其候也治之要當亟降氣當急益精氣降則陽交于陰是火下降也精血生則腎陰來復是水上升也此坎離而既濟也至此則陰陽二

氣復得其平矣。經曰：形不足，補之以氣；人參、黃芪、人胞、羊內紅鉛之屬是已。益陽氣也，乃可以却沉寒。經曰：精不足，補之以味。人乳、鼈甲、地黃、黃柏、杞子、牛膝、天冬之屬是已。補陰精也。乃可以除伏熱。

火病原由症治。內經曰：心熱病者，顏先赤。顏卽額也。脾熱病者，鼻先赤。肝熱病者，左頰先赤。肺熱病者，右頰先赤。腎熱病者，頤先赤。綱目曰：心肺居胸背，心熱則胸熱，肺熱則背熱，肝胆居脇，肝膽熱則當脇熱，腎居腰，腎熱則當腰熱，胃居臍上，胃熱，臍以上熱，腸居臍下，腸熱則臍以下熱。以上言臟腑發熱部分 東垣曰：

凡病晝病在氣，夜病在血。晝發少而夜發多者，足太陽膀胱血中浮熱微有氣也。有時發，有時止。知邪氣不在表，不在裡，而在經絡中也。夜發多者，是邪氣下陷之深，當從熱入血室而論之。

宜瀉血湯退熱湯。海藏曰晝熱則行陽二十五度。宜柴胡飲子。夜熱則行陰二十五度。宜四順清涼飲。平旦發熱熱在行陽之分。肺氣主之。故宜白虎湯以瀉氣中之火。日晡潮熱。熱在行陰之分。腎氣主之。故宜地骨皮散以瀉血中之火。入門曰氣分寔熱。白虎湯。血分寔熱。四順清涼飲。氣分虛熱。清心蓮子飲。血分虛熱。滋陰降火湯。以上言晝夜發熱之異丹溪曰火能消物。凡爍金虧土。旺木涸水者皆火也。河間曰火之爲病其害甚大。其變甚速。其勢甚張。其死甚暴。人身有二火。一君火。一相火。在氣交中。多動少靜。凡動皆屬火。化動之極也。病則死矣。又有臟腑陰陽之火。根於五志之內。六慾七情激之。其火隨起。東垣曰相火易起。五性厥陽之火相扇。則妄動矣。火起于妄。變化不測。無時不有。煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。又曰火者元氣。穀氣。

真氣之賊也。以上言火爲元氣賊

丹溪曰。病人自言冷氣從下而上。非

真冷氣也。此上升之氣自肝而出中挾相火。自下而上其熱爲甚。自覺其冷者。火極似水積。熟之甚也。陽亢陰微。故見此症。冷

生氣者。高陽生之謬言也。又曰。氣從左邊起。肝火也。宜回金丸。

氣從臍下起。陰火也。宜黃柏丸。坎離丸。氣從足下起。入腹乃虛之極也。宜滋陰降火湯。外用津調附子末塗湧泉穴。引熱下行。

蓋火起于九泉之下。十不救。以上言上升之氣屬火。東垣曰。能食而

熱。口舌乾燥。大便難者。寔熱也。以辛苦大寒之劑下之。瀉熱補

陰。脈洪盛而有力者是也。不能食而熱。自汗氣短者。虛熱也。以

甘寒之劑瀉熱補氣。脈虛而無力者是也。海藏曰。五臟陰也。

所主皆有形骨血筋血皮毛是也。此五臟皆陰足。陰足而熱反勝之。是爲寔熱。若骨痿肉爛筋緩血枯皮聚毛落者。陰不足陰

不足而有熱乃虛熱也。

丹溪曰：寔火可瀉。黃連解毒湯之類。

虛火可補。四君子湯之類。

以上言火熱有虛寔

內經曰：陰虛則發熱。陽

在外爲陰之衛。陰在內爲陽之守。

精神外馳。嗜慾無節。陰氣耗

散。陽無所附。遂致浮散于肌表之間。而惡熱當作陰虛治之。

又曰：惡寒戰慄皆屬於熱。又曰：病熱而反覺自冷。寔非寒也。古人

遇戰寒之症。有以大承氣湯下燥糞而愈者。明是熱症耳。

丹溪曰：惡熱非熱明是虛症。惡寒非寒明是寔症。

仲景曰：其人

亡血必惡寒。後乃發熱無休止。其陰脈必遲濇或微澁。

以上言惡熱惡寒

陽虛外寒。陽盛外熱者。內經曰：陽受氣于上焦。以溫皮膚

分肉之間。今寒氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留于

外。故寒慄。又曰：上焦不通利。則皮膚密緻。腠理閉寒。元府不通。

衛氣不得洩越。故外熱。陰虛內寔。陰盛外寒者。內經曰：有所勞

倦形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣熏胸中。故內熱。又曰。厥氣上逆。寒氣積于胸中而不瀉。不瀉則溫。氣去寒獨留而血凝澁。澁則脈不通。其脉盛大以澁。故中寒。以上言陰

陽虛盛而致
內外寒熱

方廣曰。陰虛陽虛。丹溪辨之明矣。何則。日夜發

熱。日重夜輕。口中無味。陽虛症也。午後發熱。夜半則止。口中

味陰虛症也。陽虛之症責在胃。陰虛之症責在腎。蓋飢飽傷胃

則陽虛矣。房勞傷腎。則陰虛矣。以藥論之。甘溫則能補陽氣。苦

寒則能補陰血。如四君子補陽氣。四物補陰血是也。若氣血兩

虛。但以甘溫補氣。氣旺則能生血也。若只血虛而氣不虛。亦用

甘溫補氣。氣旺而陰血愈作矣。故陽虛與陰虛。甘藥與苦藥不

可不慎也。入門曰。氣虛熱升。陽以散之。宜補中益氣湯。益胃

升陽湯。血虛熱滋。陰以降之。宜滋陰降火湯。坎離丸。氣血俱虛

熱升陽滋陰兼用之。宜十全大補湯人參養榮湯加知母黃柏。

以上辨陰虛陽虛

丹溪曰飲酒人發熱者難治。不飲酒人因酒發熱者亦難治也。仲景曰飲酒發熱。黃連解毒湯加葛根主之。以上發熱言飲酒

直指曰

其人血滯而發熱者。脈澁必有嗽水之症。必

有嘔惡之症。必有兩足厥冷之症。必有小腹結急之症。或吐血。

或鼻衄。宜用柴芩佐以川芎白芷桃仁五靈脂更加大黃蜂蜜。

使滯血宣通。黑物利去。則熱不復作矣。以上言滯血發熱

入門曰火

不妄動。動由于心。靜之一字。其心中之水平。又曰神靜則心火自降。慾斷則腎水自升。以上言制火有方

丹溪曰退熱之法全在清

心。必用麥冬燈心白朮茯苓益心者。一身之宰心不清。則妄動

而熱不退。熱能傷血。血滯則氣鬱。而熱愈不退。退熱之法。又在

調血。宜用芎歸。若陽浮于外。則當歛以降之。宜參苓白朮散。

直指曰。凡壯熱煩躁。用柴芩大黃解利之。其熱不退。宜用黃芩川芎烏梅作劑。入黃連生地赤芩燈艸煎湯。其效甚速。蓋芩地皆能調血。心血一調。其熱自退。
以上言退
熟有法

駱隆古曰。風火既熾。當滋腎。

水可耳。
以上言退
熟有法

海藏曰。君火者心火也。可以濕伏。可以水滅。

黃連之屬可以制之。相火者龍火也。不可以水滅。惟從其性而伏之。黃柏之屬可以降之。又曰上焦熱。梔子片芩中焦熱。黃連白芍下焦熱。黃柏大黃東垣曰。黃連瀉心火。黃芩瀉肺火。

白芍瀉脾火。柴胡瀉肝火。黃連佐之知母瀉腎火。木通瀉小腸火。條芩瀉大腸火。柴胡瀉胆火。黃連佐之鰲按瀉胆火
龍胆草爲最石膏瀉

胃火。黃柏瀉膀胱火。入門曰。主治各經熱藥。肝之氣柴胡。血黃芩。心之氣麥冬。血黃連。脾之氣白芍。血大黃。肺之氣石膏。血梔子。腎之氣元參。血黃柏。胆之氣連翹。血柴胡。胃之氣葛根。血

大黃。大腸之氣。通喬。血大黃。小腸之氣。赤苓。血木通。膀胱之氣。滑石。血黃柏。心包之氣。麥冬。血丹皮。三焦之氣。通喬。血地骨皮。
以上言臟腑 滉火清熱藥 丹溪曰。除熱瀉火。非甘寒不可。有大熱脉洪大。

服苦寒劑而不退者。加石膏。火妄動。夏月用益元散。鎮墜之。虛熱用荆芥。薄荷。山梔。黃芩。寃熱用大黃。芒硝。寃火可瀉。黃連解毒湯之類。虛火可補。參术。甘草之類。火盛者不可驟用寒涼。必兼溫散。火急甚者必緩之。生甘草。兼瀉。兼緩。參术亦可。火盛發狂人。壯氣寃者可用正治。冰水之類飲之。虛者用生姜湯。若投冰水立死。補陰則火自降。黃柏。生地之類。又曰。芩連白芍。知母。柴胡。皆苦寒能瀉五臟有餘之火。若內傷勞倦爲陽虛之病。以甘溫除之。如參芪。甘草之屬。相火熾盛。日漸煎熬爲血虛之病。以甘寒降之。如歸地之屬。心火亢極爲陽強之病。以鹹冷折之。

如硝黃之屬。腎水受傷。真陰失守。爲陰虛之病。以壯水之主制之。如生地元參之屬。命門火衰。爲陽脫之病。以溫熱濟之。如附桂之屬。胃虛食冷。遏抑陽氣。爲火鬱之病。以升散發之。如升麻葛根之屬。以上言通治火熱之藥

治火病方四十方

六味丸

虛熱
澤瀉

熟地 山萸

山藥 丹皮

茯苓

加減發鬱湯

火退
香附

升麻 葛根

羌活 柴胡

細辛

瀉血湯

夜熱
丹參

酒生地 酒當歸

酒防已

熟地 蒲黃

各七分

桃仁泥二分

退熱湯

又
芩

黃芪 錢三分

柴胡一錢

酒黃連

黃

柴胡飲子

晝熱
大黃

柴胡 黃芩

人參 甘草各一錢

當歸 姜三片

赤芍

七分

歸身

升麻各五分

四順清涼飲

積熱二分

蒸大黃

赤芍

當歸

炙草各一錢

白虎湯

朝熱二分

石膏

知母

甘草

粳米

地骨皮散

骨蒸地各一錢

石膏二錢

柴胡

黃芩

知母

生

地骨皮各五分

姜三片

清心蓮子飲

心火一錢

蓮子二錢

赤芍

人參

黃芪各一

各七分

滋陰降火湯

血熱麥冬一錢

白芍錢三分

當歸錢二分

熟地

酒生地八分

陳皮七

分片

鹽知母

益黃柏

炙草各五分

姜三

黃連解毒湯

寒火半錢

黃連

黃芩

黃柏

山梔各錢二分

四君子湯

虛火半錢

人參

茯苓

白芍

甘草

涼膈散

積熱錢

連翹二錢

大黃

芒硝

甘草各一

蜜少許

煎至半入硝

清心湯

上焦熱
大黃

甘草錢七分
薄荷

連翹二錢
黃連

山梔

酒蒸
黃芩各七分

朴硝五

分

竹葉七片

蜜少許

加減涼膈散

又桔梗

連翹二錢
薄荷各五分

甘草錢半

山梔

黃芩

桃仁承氣湯

中焦熱
桃仁

大黃

芒硝

甘草

桂枝

立效散

丁香
姜

燈心

瞿麥四錢

山梔二錢

甘草一錢

防風當歸飲子

又各一錢

滑石三錢
大黃

柴胡

人參

赤芩

甘草

當歸

赤芍

防風各七分

姜三片

此方乃專治風熱燥熱濕熱補虛之妙劑

五蒸湯

諸蒸

石膏二錢

生地

葛根各錢半

知母

竹葉

黃芩

赤苓各一錢

甘草五分

竹葉

粳米一撮

小麥二撮

荆蓬煎丸

骨蒸

三棱

蓬术

俱酒浸三日夏一日全巴豆二十八粒炒去豆湯浸去白各二兩

木香

全巴豆二十八粒炒去豆湯浸去白各二兩

木香

五蒸丸

各一兩

當歸七錢

胡黃連五錢

醋鼈甲

生地

石膏

石膏

一片

蜜丸

小麥湯下七十丸

清骨散

枳殼
姜湯
下三
五十丸
青皮
茴香
梔榔各一兩
糊丸

芩各五分

風各一錢

柴胡各二錢
熟地
人參
防

柴前梅連散

又
柴胡
前胡
烏梅
黃連各一錢
生地
柴胡各二錢
熟地
人參
防

尿二盞
猪膽一個
猪脊髓一條
韭白五分
煎至一盞服

此切劑也
胃虛人忌用

減小柴胡湯

又
柴胡
前胡
黃芩
人參
甘草
加香
葛根
獨活
人參
白

升陽散火湯

又
升麻
葛根
羌活
獨活
人參
白
柴胡
甘草各七分
防風五分

甘艸三分

火鬚湯

又
柴胡
甘草各一錢半
升麻
葛根
白芍
人參
白
葱白

四七湯

又
骨頭
半夏曲
茯苓
蘇葉
厚朴
姜

補中益氣湯

潮熱
錢半
歸身
陳皮各五分
大枣
黃芪
人參
白术
炙草各一

分

茯苓補心湯

勞心

白芍

二錢

熟地

錢半

當歸

一錢二

分

川芎

茯苓

人參

前胡

半夏各七

加減逍遙散

又草

各五分

當歸

白芍

枳壳

葛根

桔梗

蘇葉

甘

分

川芎

茯苓

人參

前胡

地骨

甘

分

柴胡

茯苓

白朮

甘

四物二連湯

又黃連

川芎

當歸

白芍

薄荷

加胡黃連

麥冬

地骨

甘

分

秦艽

木通

車前子

等分

赤芍

甘

分

荆芥穗

薄荷

七葉

甘

參蘇飲

又梗

人參

蘇葉

葛根

半夏

前胡

桔梗

白芍

熟地

胡黃連

甘

分

陳皮

茯苓

甘草

木香

生

甘

分

大棗

三黃湯

又積熱

積熱

大黃

黃芩

黃連

等分

蜜丸

甘

分

大黃

當歸

荆芥穗

薄荷

七葉

甘

分

黃芩

當歸

赤芍

甘

洗心散

又甘草

各一錢

麻黃

大黃

當歸

荆芥穗

薄荷

七葉

甘

分

白朮

五分

甘

分

黃連

六兩

甘

分

吳萸

一兩

甘

回金丸

又肝火

下三十

金丸

六十

丸

一名左金丸

又名更連丸

甘

分

白朮

三十

克

甘

分

黃柏

一味

炒爲末

水丸

空心

服

黃柏丸

又陰火

三十

克

甘

分

黃柏

一味

炒爲末

水丸

空心

服

南京中医药大学图书馆版权所有

坎離既濟丸

酒牛膝

酒當歸二兩

熟地

酒生地

山萸

五

味子

山藥

天冬

麥冬各四兩

酒白芍

酒當歸二兩

酒白芍

五

益知母

川芎一兩

酒川柏

益川柏各三兩

酒知母

益川柏各三兩

酒知母

五

四物湯

陰虛血

川芎

當歸

白芍

地黃

益胃升陽湯

內傷

白朮一錢半

人參一錢

神曲各七分五

黃芪一錢

歸身一錢

陳皮

炙甘草各五分

黃芪一錢

歸身一錢

陳皮

炙甘草各五

黃芪一錢

甘草

川

升麻一錢

柴胡各三分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

十全大補湯

升陽

白朮一錢半

人參一錢

神曲各七分五

黃芪一錢

歸身一錢

陳皮

炙甘草各五

黃芪一錢

歸身一錢

陳皮

炙甘草各五

黃芪一錢

甘草

川

當歸一錢

白芍一錢

地黃一錢

黃芪一錢

肉桂各一錢

黃芩一錢

肉桂各一

姜三

遠志三分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

東二

防風各七分半

遠志五分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

黃芩二分

橘皮湯

虛損

橘皮三錢

竹茹一錢

甘草各一錢

人

人參各五分

竹葉七片

粳米一撮

人參竹葉湯

草

石膏各五分

麥冬各二錢

半夏一錢

炙甘

人

人參各五分

竹葉七片

姜三片

淡竹茹湯

又
芩
麥冬
小麥各二錢
半夏錢半
白朮

分
姜三
芩
人參各一錢
甘草五分
竹茹一錢

既濟湯

又
人參
麥冬
半夏
甘草
生姜
梗米
附子
此卽竹葉石膏湯去石膏加附子

竹葉石膏湯

又
甘草
竹葉
石膏
人參
麥冬
半夏
生姜
梗米

陰生內熱湯

又
川芎
當歸
蒼朮
陳皮各八分
白芍
沙參各七分
白朮
山楂
花

虛生內熱湯

又
木
粉各六分
元參五分
黃柏三分
甘草二分
姜三片
久服去川芎
冬月加補骨脂

諸血源流

蓄血症脫血症

沈金鰲撰

諸血火病也。血生於脾。統於心。藏于肝。宣布于肺。根于腎。灌激於一身。以入于脉。故曰血者。神氣也。其入于脉。少則濇。充則定。他旺。諸經賴以長養。衰耗竭。百脉由此空虛。蓋血屬陰。難成而易虧。人非節慾以謹養之。必至陽火盛熾。日漸煎熬。真陰內損。而吐衄妄行于上。便溺滲洩于下。精神損而百病生矣。故經曰。心主血。而不能藏。夜則復歸于肝。肝藏血。而不能主。晝則聽令于心。心爲君。肝爲相。君火動。相火從之。相火動。六經之火從之。火動。則血隨以動。迨至六經受傷。血液流迸。聚于兩脇。胸膈之間。從火而升。爲吐爲咯。傷重者。從夾。脊而上。如潮湧生。法當任其出。不得強遏。以所出皆敗血。卽遏之亦不歸經也。必與以消瘀之品。佐以潤下之劑。使敗血下行。乃服止血藥以歸其經。再服補血藥以還其元。此正

治也。試舉諸血症詳言之。

吐血者。吐出全血也。陽症血色鮮紅。陰

症血色如猪肝紫黯。或由七情妄動形體疲勞。陽火相迫錯行。

洪口渴便結者。須用涼藥。

宜二冬二母生地丹皮山梔白芍黃柏犀角

湯加木

陽不相爲守。血亦妄行。必有虛冷之狀。蓋陽虛陰必走也。

宜理中湯加木

香烏血症。久古人多以冒藥。收功如烏藥沉香炮姜大棗。此虛家

神劑也。而其條分縷判。則有傷酒食醉飴。低頭掬損肺臟。吐血汗

血。或口鼻妄行。但聲未失者。

宜槐花散有勞瘵而吐血者。宜神傳膏有勞心

而吐血者。

宜黃明膠散有肺痿而吐血者。宜生地黃

膏。有憂恚吐血。煩滿少氣。胸中疼痛者。

宜柏葉散有氣鬱而吐血者。宜人中黃散有墜

附散。有心熱而吐血者。

宜蒲黃湯有吐痰夾血。心煩骨蒸者。宜人中黃散有忽然吐血一二口。或心

跌瘀血積在胸腹。吐血無數者。

宜乾薑節散有忽然吐血一二口。或心

衄。或內崩者。

宜阿膠湯。茜根煎皆當治。而古人試血之法。又不可不知。如

吐在水盃內浮者。肺血也。沉者。肝血也。半浮半沉者。心血也。各隨所見。以羊肺羊肝羊心者熟。薙白芨末。日日食之。咯血者。痰中略出血。瘡瘍與吐血症相類。輕則身涼脈微。重則身熱脈大。急則治標。宜十灰散。緩則治本。宜四物湯犀角地黃湯。當斟酌行之。而其條分縷判。則有由肺熱者。宜青餅子。有由肺損者。宜薏苡仁散。皆當治。咳血者。火乘金位。肺絡受傷。故血從咳嗽出也。先痰嗽而後見紅者。是積痰生熱。宜急降痰火。宜橘紅蘇子貝母。先見紅而後痰嗽者。是陰虛火動。痰不下降。宜滋陰降火。宜補陰丸加麥冬。而其條分縷判。則有肺家熱鬱而咳血者。宜紫苑丸。有咳血而極甚不止者。宜桑白皮散。有肺破而嗽血不上者。宜海犀膏散。皆當治。而此條又當與咳嗽條互參。衄血者。勞傷元氣。陰虛火動。邪火上冲。氣歸于肺也。宜清肺降火。宜白虎湯加地黃犀角丹皮白芍山梔扁柏。而其條分縷判。則有由肺經寢熱者。宜青黃散。有由小小鼻破

衄血小勞輒出者。宜桑耳有由病後常衄。小勞卽作者。宜石膏有

塞鼻丹

牡蠣壳

衄至五七日不住者。宜人中。有口鼻出血如湧。因酒色大過者。宜

散白散

荆芥

芥有火熱上升而衄極甚。或不止者。宜沈氏牙血者。陽明經熱火上攻所致。或挾風。或挾濕。或係血熱。或係氣寔。宜清胃湯加減。或大寒犯

腦。宜白芷散。

須就脈症辨之。

總治宜用百草霜擦牙立止。

舌上無故出血者。全屬心火舌爲心苦也。

宜槐花末擦之。而其條分縷判。則有舌硬而出血者。宜木

有舌腫出血如泉者。宜塗舌丹。有舌上出血竅如針孔者。宜紫金沙丸。溺血

者。一因膀胱火。卽血淋之屬。溺出必痛。宜小薊飲子或四物湯。加髮灰山梔牛膝一因

下元虛冷。卽尿血。溺出不痛。宜金匱腎氣丸。而其條分縷判。則有由勞傷

者。宜茅根湯。有由陰虛者。宜參芪。有卒然尿血不止者。宜龍胆蘿蔔湯散。有不問

男婦患溺血者。宜龍骨散。鬱金散。二草丹。皆當治。腸風者。腸胃間濕熱鬱積甚

至脹滿而下血也。宜槐花散。或四物湯。而其條分縷判。則有風入

加阿膠山梔地榆

湯

者。宜金匱二草丹。而其條分縷判。則有風入

大腸留滯不散。挾濕而成者。四物湯有陰分虛血。不循經而成者。

宜加減

宜四物湯地。皆當治便血者。內經謂之結陰病。由于陰氣內結。不

得外行。血無所稟。滲入腸間。遂成此症。與腸風不同。內經釋云。其

脉必虛濫者是也。

宜平胃地榆湯結陰丹清臟湯榆砂湯

而其條分縷判。有先便後

血。仲景謂之遠血者。

宜黃土湯

有先血後便。仲景謂之近血者。

散有內傷下血。必有以解脈絡之結者。

宜連壳丸有寃熱積于內而便

血者。宜當歸地榆湯有結陰下血。而腹痛不已者。

宜地榆甘草湯有由脾濕便血

者。宜蒼朮地榆湯有大便瀉血。

三代相傳者。

宜砂仁末米湯熱服一錢以愈爲度

有臟毒下

血者。宜大蒜丸旱蓮草散乾柿散。

有痔漏脫肛瀉血。面色萎黃。積年不瘥者。

宜白朮有五腫腸風痔漏瀉血。糞前有血。名外痔。糞後有血。名內痔。大

腸不收。名脫肛。穀道四面弩肉如奶奶。名舉痔。頭上有孔。名瘻瘡。內

有虫。名虫痔者。

宜槐角丸有瘀血內漏者。宜蒲黃散子有下血虛寒。日久腸

火 諸血

冷者。

宜熟附子丸

有便血及腸風用寒藥熱藥及脾虛藥俱不效者。

宜生散

楂子

有便血止後但覺丹田元氣虛乏腰膝沉重少力者。

宜桑寄散

有卒瀉鮮血噴出如竹筒者。

宜小薊打汁溫服一升

有腸胃積熱及因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者。

宜黃連丸蒸黃連丸

有大腸素虛挾風又飲酒

過度挾熱下痢膿血且痛甚多日不瘥者。

宜烏梅丸搏白皮散

有風邪入臟或食毒積熱大便鮮血疼痛肛出或久患酒病者。

宜木餳頭散

皆當治

痰涎血者脾家畜熱所致。

宜加味逍遙散清肺湯

而痰唾中帶有紅絲紅點

病尤爲甚其條分縷判則有由六經之火者。

宜山梔地黃湯

有由思慮傷

心傷肺者。

宜天門冬湯

有由於陰分虛弱者。

宜清火滋陰湯

嘔血者血從口湧

出多至成盆成碗者始必大怒以至肝氣上逆治以降氣清熱爲

主。

宜蘇子欝金橘皮甘草楂香蒲黃當歸青黛麥冬生地赤芍童便天冬麥冬

而其條分縷判則有飲

酒過多積熱湧盛或至垂死者。

宜葛黃丸

有飲食過度負重弩力傷胃

而大嘔者。宜是齋白朮散。有陽乘于陰血溢妄出者。生丸。有內傷心肺血效者。宜七生湯。有因虛勞。五內崩損。涌出可升斗計者。宜側柏散。有血出如泉。諸藥不能
止。東垣謂爲水穀與血。另作一派。如唧桶涌出也。長夏濕熱。太甚。正當客氣盛而主氣弱。故腸澼之病甚也。總之腸風臟毒。便血。腸澼四者。雖相似而各有辨。腸風由邪氣外入。隨感隨見。所以下清血而色鮮。必在糞前。臟毒由蘊積熱毒。久而始見。所以下濁血而色黯。必在糞後。便血兼由濕熱風虛。所以下血或清或濁。亦不論糞前糞後。腸澼則客氣盛而正氣衰。所以血與水穀齊出。固不可不詳審而治之也。然則腸澼之不得用腸風等藥明矣。宜涼血地黃湯。當歸和血散。升陽除濕。和血湯加味香連丸。而其條分縷判。則有唧出之血。遠散如篩。色紫黑。腰腹沉重。名曰濕毒腸澼者。宜升陽補胃湯。有唧出血色紫黑。

腹痛惡寒。右關脉按之無力。喜熱物熨之。而由于內寒者。宜益智和中湯

宜黃芪建中湯

有因飽食發爲腸澼者。

宜香設丸

有下血作派。唧出有力。而遠射四散。

如篩。腹中大痛者。

宜芍藥黃連湯

皆當治。九竅出血者。因火盛之極。故卒

然大驚。九竅皆溢出血也。

宜側柏散沈氏犀角湯

而其條分縷判。則有九竅

四肢指岐間出血。乃暴怒所爲者。

宜小薊散或以井華水卒有指燒灰傅之卽止

縫搔痒成瘡。有竅出血不止者。

宜多年糞桶籬蔑燒灰傳之卽止

有血自皮膚間

濺出者。

宜以煮酒塗上紙揉碎如楊花攤在出血處按之卽止

有膾中出血不止。乃血虛者。

宜十全大補湯

有遍身不論何處。無故出血者。

宜五花湯

皆當治。血汗者。或有

病。或無病。汗出而色紅染衣。亦謂之紅汗。內經以爲少陰所至。河

間以爲胆受熱而血妄行。本草以爲大喜傷心。喜則氣散。而血隨

氣行。其原雖不同。而治之則一。

宜黃芪建中湯兼服妙香散以金銀器大小麥麥冬煎湯調下或定

命薄厥症者。得于大怒。氣逆。陰陽奔併。不必素有病。而忽吐血以

升斗計。脈弦惡者是也。

宜六火湯。睡血者鮮血隨唾出其原本于腎也。鬱湯。

宜滋陰降火湯而其條分縷判有唾中帶紅絲者乃是肺痿難治宜人參

有由熱鬱所致者宜河間生地黃散有陰虛火動而唾血者宜清有由鬱

心動火者

宜元霜雪梨膏

皆當治

以上諸血症或輕或重或緩或急其原

各有所因其症各有所見如此然而一切去血過多則必致眩暈

悶絕以虛故也

宜大劑芎歸湯煎服救之全生活血湯生地芩連湯亦佳

故凡吐衄太多不止

者當防其血暈急取茅根燒烟將醋酒之令鼻嗅氣以遏其勢或

蓦然以冷水噀其面使驚則止或濃磨京墨汁飲之仍點入鼻中

如此預防庶可免血暈之患至婦人崩漏及產後血症俱詳在婦

科茲不贅。

脉法

靈樞曰衄而不止脉大者逆內經曰脉至而搏血衄

身熱者死又曰腹脹便血脉大時絕者死

難經曰病若吐衄

脉當沉細反浮大而牢者死。仲景曰脫血而脉寔者難治。脈經曰脉得諸濇濡弱爲亡血。脈訣曰諸症失血皆見芤脈。芤貴沉細浮大難治。正傳曰芤爲失血濇爲少血。又曰亡血之脉必大而芤。大爲發熱。芤爲失血。丹溪曰吐衄血脉滑數者難治。又曰吐唾血脉細弱者生寔大者死。又曰諸失血症脉大且數者逆也。

論治血三法藥各不同。繆仲淳曰血虛宜補之。虛則發熱。內熱法宜滋益榮血。用甘寒甘平酸寒酸溫之品。宜熟地白芍牛膝炙草鹿角膠血熱宜清之涼之熱則爲瘡腫瘍癰。爲齒齦爲鼻鼽爲牙斷腫。爲舌上出血。爲舌腫。爲赤淋。爲血崩。爲月事先期。爲熱入血室。爲赤遊丹。爲眼暴赤腫痛。法宜酸寒苦寒。鹹寒辛涼以除寔熱。宜童便生地犀角茜草山梔青黛大薊小薊荆芥丹皮赤芍黃芩地榆黃連大黃天

冬元

血瘀宜通之。瘀必發熱發黃。作痛作腫。及作結塊。癥積法。

宜辛溫辛熱。辛平辛寒。甘溫之劑。以入血通行。佐以鹹寒。乃可。

軟堅。

宜當歸。紅花。桃仁。蘇木。肉桂。五靈脂。蒲黃。姜黃。鬱金。三棱。

參乳。

花蕊石。韭汁。左牡蠣。芒硝。延胡索。麝香。乾漆。童便。沒藥。丹。

香。

益血爲榮。陰也有形可見。有色可察。有症可審者也。病既。

不同。藥亦各異。治之之法。要在合宜而已。謹之。

論治吐血三要。繆仲淳曰。吐血宜降氣。不宜降火。蓋氣有餘。

卽是火氣降。則火降。火降。則氣不上升。血隨氣行。無溢出上竅。

之患矣。降火必用寒涼之藥。反傷胃氣。胃氣傷。則脾不能統血。

血愈不能歸經矣。今之療吐血者。大患有二。一則耑用寒涼之

味。如芩連山梔青黛柿餅灰四物湯。黃柏知母之類。往往傷脾

作泄。以致不救。一則專用人參。肺熱還傷肺。咳逆愈甚。亦有用

參而愈者。此是氣虛喘嗽。氣爲陽。不由陰虛火熾所致。然亦百

不一二也。宜以白芍草制肝。麥冬薄荷橘紅貝母枇杷葉清肺。
苡仁山藥養脾。韭菜桺香蘇子下氣。青蒿鼈甲丹皮地骨皮銀
柴胡補陰清熱。枣仁茯神養心。山萸杞子牛膝補腎。此累試輒
驗之方。然陰無驟補之法。非多服藥不效。病家欲速其功。醫生
張皇失主。百藥雜試。以致殞命而不悟。悲夫。宜行血不宜止血。
血不循經絡者。氣逆上壅也。夫血得熱則行。得寒則凝。故降氣
行血。則血循經絡。不求其止而自止矣。止之則血凝。血凝必發
熱惡食。及胸脇痛。病日沉痼矣。宜補肝不宜伐肝。經曰。五臟者。
藏精氣而不瀉者也。肝爲將軍之官。主藏血。吐血者。肝失其職
也。養肝則肝氣平而血有所歸。伐之則肝不能藏血。血愈不止
矣。

辨驗血色 王海藏曰。初便褐色者重。再便深褐色者愈重。三

便黑色者尤重。色變者以其有火燥也。不可不辨。綱目曰新

血鮮紅。舊血瘀黑。又曰。風症色青。寒症色黯。暑症色紅。濕症如

烟煤屋漏水。

諸血原由症治

內經曰。諸血者。皆屬於心。又曰。大怒則形氣

絕而血越于上。使人薄厥。又曰。怒則氣逆。甚則嘔血。

入門曰

暴喜動心。不能生血。暴怒傷肝。不能藏血。積憂傷肺。過思傷脾。

失志傷腎。皆能動血。正傳曰。暴喜傷心。則氣緩而心不出血。

故肝無所受。暴怒傷肝。則氣逆而肝不納血。故血無所歸。又房

勞過度。以致陰火沸騰。血從火起。故錯經妄行。以上皆七情動

血之病也。直指曰。凡熱皆出于心。熱甚則能傷血。三因曰

凡血得熱則洋溢。故鮮。得寒則凝滯。故瘀。者黑色也。鮮者紅

色也。丹溪曰。諸見血皆熱。症所謂知其要者。一言而終是也。

又曰血見熱則行。見寒則凝。凡口鼻出血。皆係陽盛陰虛。有升無降。血隨氣上。越出諸竅。法當補陰抑陽。氣降則血歸于經也。以上皆言火熱傷血之病也。靈樞曰。卒然多飲食。則脹滿。起居不節。用力過度。則陽絡脈傷。傷則血外溢而衄。陰絡脈傷。則血內溢而後血。內經曰。血由上竅出爲血溢。由大小便出爲血洩。以上皆言內傷失血之病也。丹溪曰。血妄行于上。則吐衄。衰涸于下。則虛勞。忘返于下。則便紅積。熱膀胱則癃閉。尿血。滲漏腸間。則爲腸風濕壅。熱瘀則爲滯下。熱極腐化。則爲膿血。火極似水。則紫黑。熱勝于陰。則發瘡瘍。濕滯于血。則發痛痒癰瘍。上言諸失血病也。入門曰。凡血逆行難治。順行易治。無潮熱者輕。有潮熱者重。潮盛脉大者死。九竅血身熱不得卧者卽死。

東垣曰諸血症身熱脉大難治。身涼脉靜易治。又曰血溢上行。或吐嘔睡逆也。凶也。若變而下行爲惡痢順也。吉也。故仲景云畜血症下血者當自愈。無病人忽然下血利者其病進也。今病血症上行而復下行爲惡痢者其邪欲去是知吉也。仲景曰吐血欬逆上氣脉數有熱不得卧者死。直指曰無故忽然瀉下惡血名曰心絕難治。又曰傷寒太陽症衄血者病欲愈熱結膀胱血自下者亦欲愈。觀此則他病伏熱之人上焦瘀熱而作吐者亦病之欲愈也。雖然血既吐而自止則可矣。以上皆言諸血病之吉凶也。丹溪曰凡藥治血不可單行單止及純用寒涼如用須酒炒酒煮又曰血症久服藥不效以川芎爲君乃效也。入門曰若嘔吐血出未多必有瘀在胸膈當先消瘀而涼之止之。消瘀宜犀角地黃湯。又曰治血防風爲上使連翹黃

連爲中使。地榆爲下使。不可不知。東垣曰。血不足。用甘艸血瘀黑。用熟地血鮮血。用生地。若脈洪寔痛甚。用酒大黃和血止痛。用當歸。以上言治血藥法也。

咳紅導引法。保生秘要曰。坐定兀子上。以雙手搭項。蹲身閉氣三七口。如氣稍急。微微放之。放而又閉。日行五次。兼用運法極妙。

運功。保生秘要曰。艮念數日。繩胸前推開。次運湧泉水洗心。或封固臍凝守。

蓄血瘀血鬱積也。而瘀血之鬱積當有上中下之分。如劙嘔唾吐血。皆屬上部。苟蓄于此。其症必兼善忘。宜犀角地黃湯。血結胸中。則屬中部。苟蓄于此。其症必兼胸滿身黃。漱水不欲嚥。宜桃仁承氣湯。血凝下焦。又屬下部。苟蓄于此。其症必兼發狂糞黑。小腹硬痛。須盡下黑物。

爲效。

宜抵當湯
抵當丸

醫者能分三部治之。蓄血之症無遁情矣。而仲景

云。傷寒、熱病。身黃尿黑。發狂喜忘者。爲蓄血。仲景云。然者乃是傷寒、熱病亦有蓄血之症。非蓄血止屬傷寒、熱病。絕有之也。治之之法。雖大畧相同。而倘由傷寒、熱病者。則必隨本症而調劑治之。與單病蓄血者。應稍殊也。

蓄血原由症治。海藏曰。喜忘發狂。身黃尿黑。疾已甚也。但小腹滿。小便不利者輕也。直指曰。蓄血外症。痰。嘔。燥渴。昏憒。迷忘。常喜湯水沃口。入門曰。凡病日輕夜重。便是瘀血。又曰。通治三焦蓄血。生地黃湯。丹溪曰。生韭菜汁。善治胸膈間瘀血。甚效。綱目曰。瘀血燥結。宜用玉燭散。直指曰。下焦蓄血。宜桃仁五靈脂。生地大黃甘草。利而逐之。本草曰。沒藥蘇木水蛭。䗪虫桃仁五靈脂。留尖皆破瘀血。

蓄血 脫血

脫血衝脈病也。靈樞經曰：衝脈爲血之海。血海不足，則身少血。色面無精光。是名血脫。又曰：血脫者，色白，天然不澤。其脉空虛，然則據經之言。脫血之症，固由衝脈不足。但其所以不足之故，有由先天賦異，本來衰弱。而後天又不能培養，以致尪然如不勝衣者。有先天賦異，本來充盛。而或因思慮過傷，或因房勞過傷，或努力過傷，或因酒食過傷，皆能虧耗真陰。真陰既虧，血自消散而不澤者，且真陰既虧，火熱愈熾，或致齶吐溺便，上下失血，而天然血不華者。凡此皆脫血之所由來也。故附列此條于諸血之後。

宜四物湯
三才丸補

榮湯加味
四物湯

脫血原由症治。內經曰：臂多青脉曰脫血。又曰：安卧脈盛，謂之脫血。東垣曰：六脈弦細而澀，按之空虛，其色必白，而天不澤者，脫血也。鰲按：靈樞謂鼻頭色白者爲亡血。身少血色而

無精光者爲脫血。則知亡血之色之白。僅在鼻頭。而脫血之色之白。且由面而及于一身。此其所以異也。亡血者。卽諸失血也。乃一時暴來之病。非若脫血爲由內而漸致之病也。

治諸血方一百零三

理中湯

氣虛

人參

白朮

炙草

乾姜

槐花散

吐血

槐花二兩

百草霜五錢

每末二錢

神傳膏

又剪草

茅根湯下

膏忌鐵器盛磁瓶內一日一蒸九蒸九晒乃止
病人五更面東坐勿言語挑膏四匙食之良久
以粥湯壓之藥只冷服米湯亦勿太熱或吐或
否總不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽
血妄行每服一匙可也 上部血須用剪草丹
皮天冬麥冬許學士云剪草治勞瘵吐血損肺
及血妄行

米蓮散

又糯米五錢 蓮子心七枚爲末酒服多效

或以墨汁作丸服之

黃明膠散

又黃明膠炙乾 花桑葉陰乾

各二兩研末每三錢生地汁調下

生地黃膏

又 生地一斤打汁入酒少許以熟附兩半去皮膚切片入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏搗丸空心米飲下三十丸

柏葉散

又 柏葉爲末米飲調下二方寸七

香附散

又 香附爲末每服二錢童便調下

蒲黃湯

又 蒲黃末三錢煎湯服 每日溫酒或冷水調服亦可

人中黃散

又 人中黃爲末 每服四錢或三錢用茜根汁姜竹瀝和匀服之

乾藕節散

又 乾藕節爲末酒服方寸七日二次

阿膠湯

又 阿膠二兩 蒲黃六合 生地三升 水五升煮三升分服

茜根煎

又 可水調服 茜根一兩爲末 每末二錢水煎冷服亦

十灰散

咯血 茜根 大薑 小薑 柏葉 荷葉 茅根丹皮 櫻皮 大黃 栀子黃 等分

燒存性研末或藕汁或菉菔汁磨京墨半匙下五錢立止

花蘆散

又 花蘆石煅研極細 童便一杯煎溫調服三錢或五錢男用酒一半女用醋一半與童便

和服亦可總使瘀化黃水再調治

四物湯

又 川芎 當歸 白芍

熟地

各一錢二分

半水煎服

一方春倍川芎夏倍白芍秋倍

地黃冬倍當歸

又方春加防風夏加黃芩秋倍

加天冬冬加桂枝

當歸和血歸經白芍涼血

補腎生地黃生血寧心熟地黃補血滋腎川芎

行血通肝

劉宗厚曰

欲求血藥其四物之謂乎夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行

血滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘

寒能生真陰之虛者也當歸分三治血中主藥

也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也

白芍陰分藥也通脾經性味酸寒能涼血又治

血虛腹痛若求陰藥之屬必于此而取則焉

犀角地黃湯

又 犀角 生地 黃連

黃芩 大黃

青餅子

又 青黛一兩 杏仁以牡蠣粉炒過一兩

研勻黃蠟化

和作三十餅子

每服一餅以乾柿

半个夾定濕帛包煨香嚼食粥飲送下日三

薏苡仁散

又 薏苡仁爲末以熟猪肺切蘸空心食之苡仁補肺引經也

補陰丸

咳血 砂仁 甘草

五味子

杞子 側柏葉

黃柏 知母

杜仲

用猪脊髓

地黃膏爲丸

紫苑丸

又

紫苑

五味子

等分蜜丸芡子大含化

桑白皮散

又倒碎

鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮入糯米四兩焙乾爲末每一錢米飲下

海犀膠散

又末每三錢海犀膠卽水膠一大片炙黃塗酥再炙研

白虎湯

鷀血

石膏

知母

粳米

竹葉

青黃散

又青黛

蒲黃各一錢新汲水服之或青

黛髮灰等分生地汁調下亦可

桑耳塞鼻丹

又桑耳

炒焦搗末每發時以杏仁大塞鼻中數次即可斷

石膏牡蠣丸

又石膏五錢

牡蠣一兩

每末方寸七酒服蜜丸亦可日三次

人中白散

又人中白

新瓦上焙乾入麝少許溫酒調服立效

荆芥散

又荆芥炭

每二錢研陳皮湯下不過二服

沈氏止劔丹

又各五錢

共爲末每服二錢開水下不過一服

卽止重者亦止二三服

此金鱉自製方也用之無不驗

清胃湯

牙血

升麻

當歸

黃連

生地

丹皮

白芷散

火

木賊煎

舌血

木賊草煎水漱之立止

塗舌丹

火

烏賊骨 蒲黃 等分炒爲細末塗舌上

紫金沙丸

四錢

紫金沙 即露蜂房頂上寃處一兩

貝母

蘆薈三錢

蜜丸

芡子大

每丸水一

小杯煎

五分溫服

如吐血

溫酒

調服

小薌飲子

小薌

熟地八兩

山藥

山萸各四兩

當歸一錢

山梔八分

滑石

通草

蒲黃各五分

甘草三分

竹葉七片

金匱腎氣丸

又

熟地八兩

山藥

山萸各四兩

丹皮

茯苓

澤瀉各三兩

附子

肉桂

車前

子

牛膝各一兩

茅根湯

又

茅根

姜炭

等分入蜜

一匙水二杯煎

參芪蘿蔔散

又

人參

鹽黃芪

等分爲末用紅皮大蘿

蔔一枚切四片用蜜

二兩將蘿蔔逐片蘸炙令

火

諸血方

卷十七

三九

乾再炙勿令焦密盡爲度每用一斤蘸藥食之
仍以鹽湯送下以瘥爲度

龍胆草湯

(又) 龍胆草一虎口 水五升煮二升半分五

鬱金散

(又) 鬱金 槐花各一兩 每末二錢淡或湯服

龍骨散

(又) 龍骨煅爲末每服方寸七日三

二草丹

(又) 金陵草卽旱蓮草 車前草各等分搗汁
每至心服三盃愈乃止

槐花散

(陽風歸) 槐花二錢 蒼朮 厚朴 陳皮 當

加減四物湯

(枳壳生地當歸) 烟草各五分 側柏葉各一錢

枚 姜三片

地榆散

(又) 地榆 卷柏各五錢 砂瓶煮十餘沸溫

平胃地榆湯

(便血) 蒼朮 升麻 炮附各一錢 地榆七

分 葛根 厚朴 白朮 陳皮 赤苓各五
乾姜 當歸 神曲 白芍 益智仁

人參 枳壳 煙草各三分 姜三 枣二

皮 首烏 威靈仙 黄芪 陳皮 梓根白
荆芥穗各五錢 米糊丸每五七

結陰丹

十九米湯少入醋下

清臘湯

又 生地一錢 酒洗當歸 地榆各八分
山梔 黃芩 黃柏各七分 白芍 黃連

阿膠

側柏葉各六分

川芎

槐角各五分

榆砂湯

又 地榆四兩 砂仁七枚 生甘草錢半
炙草一錢

黃土湯

又 阿膠 火草各一錢
灶中黃土三錢 熟地 白朮 附子
黃芩

赤小豆

當歸散

又 赤小豆五兩浸令芽出晒乾

當歸二兩

枳壳各二兩剉

以槐花四兩全

連殼丸

又 炒去

黃芩

每末二錢漿水調服二錢日三服

當歸承氣湯

又 芒硝七分

當歸二錢

厚朴

枳殼

大黃各八分

地榆甘草湯

又 地榆四兩

炙甘草三兩

每末五錢水

蒼术地榆湯

又 前溫服

蒼术二兩

地榆一兩 分二帖水煎食

大蒜丸

又 煙大蒜二枚

淡豉十枚 全搗丸梧子

大香菜湯送二十丸日二服安乃止永絕根本

無所忌

此藥甚妙大蒜九蒸更佳仍以冷蘿水送下

旱蓮草散

又 旱蓮草瓦上焙研末每服二錢米湯下

乾柿散

又 乾柿燒存性湯服二錢愈 有人患此半
月自分必死服此方卽愈

白术丸

又 白术一斤土炒研末 生地半斤飯上蒸
熟搗和乾則少入酒丸每十五丸米飲下日三

槐角丸

又 槐角去梗炒一兩 地榆 酒當歸 楚
炒枳壳 防風 黃芩各五錢 酒糊丸米飲

下五十丸

蒲黃散子

又 蒲黃末二兩 每方寸匕水調下服盡止

熟附子丸

又 熟附子去皮 枯礬各一兩 每末三錢
米飲下 又方熟附一枚 生姜三錢半水煎
或加黑豆一百粒

山楂子散

又 山楂淨肉爲末 艾湯調下應手而效

桑寄生散

又 桑寄生爲末每服一錢非時白湯點服

黃連丸

又 黃連四兩 作四分一生研一炒研一炮
研一水浸晒研 茄芩一兩 防風一兩 麵
糊丸每五十丸米泔浸枳壳水送下 冬月加
酒蒸大黃一兩

酒蒸黃連丸

又 黃連四兩酒浸一宿晒乾爲末酒糊丸熟水下三十五丸

烏梅丸

又 烏梅三兩燒存性 每丸米飲下二十丸日三

樗白皮散

又 樗白皮 温酒調服米湯亦可 每末二錢空心人參各一兩 忌油膩濕麵青菜果子

甜物雞猪魚羊蒜薤等

木饅頭散

又 木饅頭燒存性 桉灰 烟灰 烟管 草等分每末二錢水一盞煎服

加味道遙散

又 桃仁 痰涎 丹皮 白术各錢半 槟榔各一錢 山梔 各八分

桔梗七分 青皮五分 甘草三分

清肺湯

又 赤芩 陳皮 當歸 生地 赤芍 天冬 麥冬 山梔 黃芩 紫苑 桑皮 阿膠

膠珠各七分 甘草三分 杏仁二枚 烏梅一

山梔地黃湯

又 山梔錢二分 生地 赤芍 知母 貝母 瓜蔞仁各一錢 花粉 丹皮 麥冬各

五分

天門冬湯

又 天冬 遠志 白芍 蘭節 麥冬 人
芪 阿膠 没藥 當歸 生地各七分 人

諸血方

卷十七

四十一

參 甘草各三分 姜三片

清火滋陰湯

又

天冬

麥冬

生地

丹皮

赤芍

赤山

梔黃連

山藥

山萸

澤瀉

甘草

芩各七分

加童便

葛黃丸

嘔血

黃連四兩

葛花三兩無則葛根代之
用大黃末水熬成膏爲丸溫水下百丸

是齋白朮散

又

白朮二錢

人參

黃芪

茯苓各一錢

甘草五分

前胡

柴胡各二分半

姜三

枣二

四生丸

又

生荷葉

生艾葉

生側柏葉

生地黃

葉如無以鮮生地代等分搗爛丸如雞子大

每取一丸水一盞煎服或鹽湯化服亦可

一方無荷葉有生薄荷葉

側柏散

又

側柏葉蒸乾二兩半

荆芥穗炭

人參

各一兩

每末三錢入白麵二錢新汲水調如

稀糊服

七生湯

又

生地

生荷葉

生藕節

生茅根

生

韭菜各一錢

生薑五錢

右共搗取自然汁

一碗濃磨京墨同服

涼血地黃湯

腸澼
槐花

知母
黃柏各錢半

熟地
當歸

熟地
青皮

荆
當歸

當歸和血散

又
芥

當歸
白朮

熟地各七分
末每二錢空心米飲下

槐花
一名槐花散

青皮
刺猬

益
當歸

升陽和血湯

又

白芍錢半
升麻各七分

黃芪
生地

炙草各一錢
丹皮

陳皮
生甘草各七分

陳皮
肉桂各三

青皮
荆

加味香連丸

又

黃連
白豆蔻一錢半

淡吳萸各一兩
乳香

木香一錢
沒藥各錢二分

煨
水

浸烏梅肉

搗丸每三十丸
甘草湯下

升陽補胃湯

又

白芍一錢半
生地

熟地
炙草各五分

升麻
獨活

黃芪
柴胡

防風
丹

葛根各三分
半夏

升麻
肉桂

炙

益智和中丸

又

白芍一錢半
草各一錢

丹皮

柴胡

葛根

升麻
葛根

葛根各三分
半夏

升麻
肉桂

炙

香穀丸

又

黃連一兩
荆芥穗

枳壳

厚朴各五錢
丹皮

柴胡

葛根

葛根各三分
半夏

升麻
肉桂

炙

分

四錢

荊芥穗

木香

黃柏各三錢

枳壳

厚朴各五錢

柴胡

當歸

火

諸血方

刺猬

卷十七

四十二

皮一个燒灰 麵糊丸溫水下五七十丸日二服 一名加味速壳丸

芍藥黃連湯

又

白芍 黃連

當歸各二錢半

大黃五分

內桂二分半

炙草三

沈氏犀角湯

九般血各一錢

犀角磨汁

龍骨生研八分

黃連

荆芥炭

小薑

人參

五分

水二杯煎一杯入側柏汁五匙服

黃芩錢半

荆芥炭

小薑

人參

小薑散

又小薑錢爲末或掺或擦牙立止

百草霜

香附

蒲黃炒各用五

分

水煎服

槐花

茅花

白鷄冠

五花湯

又水蘆花紅花等分水煎服

槐花

茅花

白鷄冠

黃芪建中湯

血汗

妙香散

又

定命散

又朱砂新水調下

寒水石

麝香

等分每末五分

六鬱湯

薄厥症喬陳皮

香附

蒼朮

神曲

山梔子

連

川芎

赤苓

貝母

枳壳

蘇

滋陰降火湯

嘔血麥冬

白芍錢三分

白朮各一錢

當歸錢二分

酒生地八分

熟地

陳皮七

分 盐知母 咸黃柏各五分 姜三 斧二

人參平肺散

又 草各一錢 人參 知母 地骨皮
皮各五分 天冬 赤苓各八分 陳皮 青

河間生地黃散

又 冬 柏子 柴胡 黃連 地骨皮 天門
地黃 白芍 黃芩 黃芪 生地 熟地

生甘草各七分

清唾湯

又 地元參 知母 貝母 桔梗 黃柏鹽水炒 熟
天冬 遠志 麥冬各一錢 姜

炭五分

元霜紫雪膏

又 用 雪梨六十個去心打取汁二十鍾酸者不
生藕汁十鍾 生地汁十鍾 麥冬煎濃

汁

五鍾

生菜菔汁五鍾

白茅根汁十鍾

右汁合和重濾去渣火上煎煉入煉蜜一斤飴
糖八兩柿霜八兩姜汁半酒杯火上再熬如稀
糊收好每服三五匙日三次不拘時

芎歸湯

眩暈

生地芩連湯

又 梔

生地黃芩

川芎

當歸各錢半

赤芍

山

水煎

火 植 諸血方

卷十七

四十三

徐徐呷下

此方兼治男子失血過多女人崩漏過度因而

潤燥循衣摸床撮空閉目不省揚手擲足錯語失神鼻乾氣粗并及眩暈皆危症也以此救之

全生活血湯

活

柴胡

歸身

葛根

甘草各七分

川

芎

藁本各五分

生地

熟地各四分

蔓

荆子

細辛各三分

紅花二分

此方兼治崩漏太多昏冒不省閉目無所知覺蓋因血暴亡也血去則心神無所養暴損氣血豈能久活當補而升舉之以助其陽則目張神不昏迷矣此方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足

治蓄血方五

犀角地黃湯

上部皮各一錢

一方加當歸黃芩黃連各一錢

赤芍二錢犀角鏹

丹

桃仁承氣湯

中部桃仁

甘草桂枝

大黃芒硝

下部

抵當丸

又

抵當湯

生地黃湯

總治 生地汁一升無則用乾生地二兩
漆五錢 生薑汁半升無則用刺薊汁升半

生藍葉汁半升無則用乾末半升
個炒 水蛭十个炒 大黃一兩 桃仁研五

錢 水一升同熬至二升放冷分二服先服至
半日許血未下再服之 此藥比抵當湯丸甚

輕恐服抵當湯丸下血不止故以此主之
此方耑治蓄血症脉沉細微膚冷臍下滿或狂
或躁大便色黑小便自利老幼氣弱者尤宜

治脫血症方四

四物湯

又 純治 丸 熟地 天冬 人參 蜜丸酒飲任下百

加減四物湯

又 枳壳 側柏葉 生地 當歸 川芎各一錢
荆芥 槐花 炙草各五分 姜三
烏梅一

補榮湯

又 當歸 白芍 生地 熟地 赤苓 山
梔 麥冬 陳皮各一錢 人參 甘草各五
分 茯二枚 烏梅一個



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

嘔氣嘈雜吞酸惡心源流

沈金鰲撰

嘔氣嘈雜吞酸惡心皆火病也。嘔氣者卽內經之噫氣經云五氣所病心爲噫。又云寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故爲噫。竊按嘔氣一症總由胃弱不和三焦失職經云寒氣客胃者必先有火鬱于胃中又爲客寒所遏清無所歸而不得升濁無所納而不得降又或挾痰或挾食或挾氣故隨胸中之氣而上逆也。宜香附散

而致嘔之原更有由脾肺鬱者有由胃陽虛者

脾肺鬱宜杏仁桔梗鬱金厚朴半夏

曲胃陽虛宜生白朮茯苓益智厚朴半夏曲皆當詳察嘈雜者卽心嘈內經云飲入于

胃游溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺又云脾主爲胃行其津液則知胃陽易燥必賴脾陰養之脾陰易濕必賴胃陽運之若

表裏不和則鮮冲和之氣致生嘈雜之病其原有火動其痰者必痰多脉滑而數當先治痰次治火宜二陳湯加黃芩黃連有食鬱作熱者必

脉數寔而大。當先治火。次消導。宜生地黃芩木通有濕痰壅盛者。

神曲山楂麥芽

必脉沉而滑。當去濕消痰。宜二陳湯

木丸

有氣鬱胸膈者。必脉沉而澀。當開

鬱理氣。宜氣鬱湯又有嘈雜。至于醋心吐水者。宜枳榔橘皮湯有嘈雜醋心。上

攻直至咽喉者。宜吳茱萸湯有嘈雜由心陽熱。而心中煩。頭汗洩者。茯

神淮小麥朱砂柏子仁有婦人時患嘈雜。皆血液汗濁變而爲痰。或言是血

嘈多以猪血炒食自愈。蓋以血導血歸原之意也。節或衄血作嘈

雜。血得血腥亦飽伏也。又有肝陰虛。經水十日半月一至夜分多

嘈雜者。宜生地阿膠天冬茯神白芍丹皮皆當詳察。吞酸者。鬱滯日久。伏于脾胃。

間不能自出。又嘸不下。倘肌表復遇風寒。則內熱愈鬱。而酸味刺

心。肌膚得溫緩。則腠理開發。或得香熱湯丸。則津液流通。鬱熱暫

解。宜二陳湯或有食已吞酸。則因于胃氣虛冷。宜吳萸炮姜等分爲末。湯服一錢或

八左金丸。或另有吐酸。吐出酸水如醋。是津液鬱積日久。濕中生痰。故從火。

化。遂。作。酸。味。隨。升。之。氣。而。吐。也。宜平胃散加木香惡心者由痰

砂仁查肉神曲

惡心者由痰

凝。胃。脘。或。濕。熱。壅。遏。膈。中。故。欲。吐。不。吐。欲。嘔。不。嘔。心。中。兀。兀。如。畏。

舟。車。者。然。宜橘紅半夏山梔黃連

此。四。者。皆。胃。家。之。病。

而。治。之。之。法。

固。不。離。

乎。胃。矣。而。亦。有。時。不。耑。主。胃。者。蓋。胃。司。納。食。主。乎。通。降。通。降。則。無。

此。四。者。之。病。其。所。以。不。通。降。而。生。病。之。故。皆。由。肝。氣。冲。逆。阻。胃。之。降。也。古。人。胃。病。治。肝。寔。有。見。于。此。所。以。噯。氣。嘈。雜。吞。酸。惡。心。諸。症。

于。理。胃。藥。中。必。加。平。肝。之。品。也。

噯氣等原由症治 灵樞曰足太陰之脉病是動則病腹脹善

噫。內經曰太陰病所謂上走心爲噫者陰盛而上走乎陽明。

陽明終屬心故上走而噫也。脈經曰寸脈緊寒之寔也寒在

上焦胸中必滿而噫。仲景曰上焦受中焦之氣未和不能消。

故能噫又曰上焦之氣不至其部則物不能傳化故噫而吞酸。

又曰。寸口脉弱而緩。弱者。陽氣不足。緩者。胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣填于膈上。活人書曰。傷寒。噫氣由中氣不交故也。少陰經至胸中。交于厥陰。水火相搏。而有聲。故噫氣。曰。噫氣轉出食氣也。胃中鬱火。膈上稠痰。飲食鬱成。宜香附石膏半夏南星梔子治之。亦治嘈雜。又曰。氣寔噫者。食罷噫轉腐氣。甚則物亦然。濕熱所致也。氣虛噫者。濁氣填胸也。不因飲食常噫者。虛也。蓋胃有濁氣。膈有濕痰。俱能發噫也。宜六君子湯加沉香爲君。厚朴蘇葉爲臣。吳萸爲使。以治之。亦有善飲酒。每朝常噫不吐者。正傳曰。痰在中焦。作噫氣吞酸。胃脘當心痛。或嘔清水。惡心。以茯苓陳皮半夏甘草白朮蒼朮神曲麥芽砂仁川芎草蔻仁枳壳猪苓澤瀉吳萸黃連枳榔木香山梔之類。治之效。又曰。河間原病式言酸者。肝木之味。由火盛冠金。不能

平木。則肝木自甚。故爲酸。是以肝熱。則口酸也。所以中酸不宜食。粘胃油膩者。謂能令氣鬱不通暢也。丹溪曰。俗謂之心嗜似飢不饑。似痛不痛。而有懊惱不自寧之况。其症或兼噯氣。或兼痞滿。漸至胃脘作痛。皆痰火爲患也。治法以半夏橘紅草消其痰。芩連石膏山梔知母輩降其火。二术芍藥輩健脾行濕。壯其本元。則安。又曰。此乃食鬱有熱。黑山梔姜炒黃連必用之藥。又曰。內經言諸嘔吐酸。皆屬於熱。以爲熱言其本也。東垣言作熱攻之。必悞。則又以爲寒。言其末也。

九九。行政後。自效。

吞酸導引法 保生秘要曰。于肝經肺經二穴。掐之九九。擦亦

運功。保生秘要曰。先服氣凝定歸元半晌。次行胃口。洗滌邪穴。至轉大腸散濁。復元。又凝定氣自愈。

治噯氣嘈雜吞酸吐酸惡心方九

香附散

噯氣

香附

山梔

黃連

橘紅

半夏

六君子湯

又夏

人參

茯苓

白术

半夏

陳皮

炙草

陳皮

二陳湯

嘈雜

茯苓

半夏

陳皮

甘草

白术丸

又夏

白术

南星

半夏

氣鬱湯

又母

香附

蒼术

橘紅

半夏

茯苓

貝

枳榔

川芎

山梔

甘草

紫蘇

木香

尖

枳榔橘皮湯

又心生蜜湯下

枳榔四兩

橘皮一兩

每末方寸匕空

吳茱萸湯

又此二十年不發

淡吳萸

水煎頓服

有人心如蟄破服

左金丸

又吞酸

黃連

吳萸

平胃散

吐酸

蒼术

厚朴

陳皮

甘草

呃逆源流

沈金鰲撰

呃逆火病也。經曰：諸逆衝上，皆屬於火是也。呃逆一症，古名噦。後名欬逆。又名吃忒。其故有三。一曰熱逆。胃火干氣上逆。脉洪大而數。必口乾舌燥。面赤便秘。宜平胃散加清火藥。陰火上炎而呃。其氣從脣下逆上。蓋上升之氣至肝而出中。挾相火也。宜山梔黃連清火香胃理氣扶苓半夏理脾胃湯半黃丸。中停痰阻塞。致痰火鬱遏。不得疏洩。亦呃。宜參用二陳湯。溫病發呃。乃伏熱在胃。令人胸滿而氣逆。逆而呃。或大下。胃中虛冷亦致呃。宜茅根湯。一曰氣呃。勞役過度。努傷中焦。丹田之氣逆而上行。故呃。急調氣。宜調氣平胃散人參利膈湯。中氣大虛。不時發呃。急補益。宜補中益氣湯。元氣不足。胃虛而呃。非培元不可。宜人參湯。肺氣鬱痺。面冷頻呃。總在咽喉。不爽。當開上焦之痺。蓋心胸背部須藉在上清陽舒展。乃能曠達也。宜枇杷葉川貝鬱金射干通草淡豉子湯。傷寒。汗吐下後。

或瀉利日久。或大病後氣呃爲中氣極虛。宜十全大補湯兼熱加

竹茹丹皮兼寒。加丁香。

附桂脈沉數大便祕。宜稍加大黃。

男女傷寒。及一切雜病。手足逆冷而嘔且呃。宜橘

湯。呃逆之甚。至于短氣急。疏導之。

宜紫蘇二錢人參一錢煎服。

食傷脾胃復病。

嘔吐發呃下利。兩脉微澁。是陽氣欲盡。濁陰冲逆急候也。

舍理陽驅陰無別法。

宜乾姜吳萸人參茯苓。丁香柿蒂炮熟附子。

病後氣逆不能歸元。致呃呃。

連聲不止。聲聞屋外。

宜刀豆子燒存性白湯調服二錢。卽止。

溫病飲水過多。氣滯呃逆不止。

宜枇杷葉茅根各半斤煎水徐徐服。呃而心下悸。蓋緣水氣停鬱。

宜二陳湯加木香竹

瀝姜。痰氣滯其氣從胸中起。中州元氣鬱也。

宜氣鬱湯。或脉小舌白氣汁逆吃忒畏寒微戰。胃陽虛。肝木上犯。必議鎮肝安胃理陽法。

宜代赭石

人參丁香皮茯苓。淡乾姜半夏。若無別症。忽然發呃。氣從胃中而起。只是氣不順。

宜木香。若痰結碍逆而吃忒。乃爲痰呃。宜先用鹽湯探吐。

陰火從少腹上冲呃逆。夜分轉甚。乃欒血虧傷之故。

宜四物湯加知母黃

調氣散。若欒結碍逆而吃忒。乃爲欒血虧傷之故。

宜柏竹茹陳皮茯苓。

逆吃忒畏寒微戰。胃陽虛。肝木上犯。必議鎮肝安胃理陽法。

宜代赭石

人參丁香皮茯苓。淡乾姜半夏。若無別症。忽然發呃。氣從胃中而起。只是氣不順。

宜木香。若痰結碍逆而吃忒。乃爲痰呃。宜先用鹽湯探吐。

陰火從少腹上冲呃逆。夜分轉甚。乃欒血虧傷之故。

宜柏竹茹陳皮茯苓。

呃而專由于火。則曰火呃。宜乾柿生呃。而音高連聲。尚爲有力。爲

姜煎服

呃而音高連聲。尚爲有力。爲

寃可治。若呃一二聲而音低者。中氣稍絕。而不能接續。則虛之極。

一旦發夕死。病後大發呃。亦由真元之氣絕。不治。二日胃寒。手足冷。

嘔吐。無熱症。脉遲濇。爲胃寒之候。宜丁香

柿蒂湯

胃虛寒。致胸滿而發呃。

宜丁香。胃家寒冷久。呃不能止。宜沉香散

柿蒂湯

腎氣自腹中。趕上築于咽喉。

逆氣連屬而不能出。或至數十聲。上下不得喘息。此由寒傷胃脘。

腎虛氣逆。上乘于胃。與氣相伴。經云。病深者。其聲曠也。宜吳茱萸

黃散

利後胃氣虛寒。手足厥冷。必傷土氣。宜理中湯加丁香白朮枳壳

或脈歇止汗

出呃逆。大便溏。此勞倦積傷。胃中虛冷。陰濁上干。宜人參茯苓淡

乾姜炒川椒代赭石炒烏梅肉

若爲冷物所阻。或誤投寒劑所遏。至陽不得上升而呃陽。

症。傷寒。胸中飲食未消。悞服石膏。人中黃之類。而呃均宜散其寒。

越其熱。不使寒熱抑遏。宜丁香柿蒂散以上三者。皆呃症之由也。故有謂

呃症屬寒多而熱少者。又有謂呃症屬熱多而寒少者。皆一偏之見。蓋呃之爲症。總屬乎火。卽如胃寒諸症。亦必火熱爲寒所遏。而然。若純由乎寒。則必不相激而逆上矣。故人有尋常並無疾病。或一張口而寒氣相襲。立時發呃者。俗名之曰冷呃。其得竟謂之冷病乎。蓋相襲者。寒氣而相襲之時。必陽氣適當上升。故寒氣一襲。陽卽不得越而呃也。若陽當下降而非上升之時。雖寒襲之。亦必不呃也。然此偶然感發。不足爲病。非若前文三因之症。必須調治也。至如活人書所載。呃逆陰症。胃寒脉細虛極。宜丁香柿蒂散。柴胡湯加橘皮竹茹。呃逆陽症。發熱口苦。胸滿脈數。宜竹茹橘皮湯。或小入門所載。痢後呃逆。宜人參白朮煎湯。調元散。頓服自止。痢後胃陽衰。氣弱不相續而呃逆。竹茹生姜附子。飲食填塞胸中。或食物太甚噎而不下。發爲呃逆。宜補中益氣湯。加枳壳砂仁蘇葉。正傳所載。痰閉于上。火動于下。無別症忽

發呃逆從胸中起。宜二陳湯加芩連痰挾氣虛而呃逆。宜六君綱子湯

目所載胃中虛冷。不能食。飲水則呃逆。或飲水太過或水結胸而

呃逆。宜小陷胸湯或但飲水多而呃逆。別無惡候。宜五苓散回春所載過矣。

而呃逆。宜燈草探鼻取嚏皆所當究者也。總之呃逆甚危。不得視爲尋常。

易瘳之症。倘尋常視之。危斃立見。

脈法 醫鑑曰。呃逆之脈宜浮緩。若弦促代急微結。難治。散大者必死。

呃逆症治 入門曰。呃逆當分有餘不足。不足者。因內傷。及大病後。發其症。胃弱面青。肢冷便軟。有餘者。因外感冒燥及大怒。大飽而發。其症面紅體熱。便閉。便軟者。瀉心湯主之。便閉者。大承氣湯主之。綱目曰。靈樞云。嘔以草刺鼻令嚏而已。無息而疾迎引之。立已。大驚之亦已。詳此三法。正是治呃逆之法。今人

用紙燃刺鼻取嚏。嚏則呃逆立止。或閉口鼻氣使之無息亦立已。或作冤盜賊大驚駭之亦立已。此以噦爲呃逆。正得經旨也。謂之噦者。呃聲之重也。謂之呃者。噦聲之輕也。皆因病聲之輕重而名之也。又曰呃聲頻密相連者爲寔。可治。若半時呃一聲者爲虛。難治。多死。死在旦夕。呃至八九聲氣不回者。難治。呃逆小便祕澀或腹滿者。不治。脉見沉微散者。死瀉痢後呃逆及傷寒結胸發黃而呃逆俱難治。

治呃逆方二十七

平胃散

熱呃

蒼朮

厚朴

甘草

陳皮

二陳湯

痰呃

茯苓

陳皮

甘草

半夏

半黃丸

又
後姜湯

半夏

南星

黃芩

姜汁浸蒸餅丸食

茅葛湯

熟呃

茅根

葛根各半斤

水三升煎升半

每溫飲一盞。噦止即停。

調氣平胃散

藿香

木香

檀香

烏藥

蔻仁

砂仁

人參利膈湯

草

木香

蒼术

厚朴

陳皮

甘草

補中益氣湯

虛呢

升麻

柴胡

黃芪

歸身

白术

陳皮

人參理中湯

胃虛

人參

白术

甘草

乾姜

六君子湯

痢後

陳皮

人參

茯苓

白术

甘草

十全大補湯

虛極

川芎

人參

白术

熟地

茯苓

姜橘湯

病後

橘皮

四兩

生姜

一兩

水煎

徐呻乃

木香調氣湯

忽呢

木香

藿香

砂仁

蔻仁

甘草

導痰湯

痰呢

南星

半夏

茯苓

枳實

陳皮

四物湯

血虧

川芎

當歸

地黃

白芍

丁香柿蒂湯

胃寒

橘皮

半夏各五錢

甘草二錢半

生姜七

錢半

共爲粗末每三錢煎服或調蘇合丸服

亦可

一方七味各一

錢甘草五分煎服

沉香散

久呃 沉香 紫蘇
末每佈蒂湯服五七分

白蔻仁各一錢 共爲

理中湯

吐病後 白朮 乾姜 炙草

氣鬱湯

鬱呃 香附 茯神 蕤香 桔梗 木香
枳壳 厚朴 砂仁

丁香柿蒂散

寒呃 片煎湯 調下 本方潔古治虛人呃逆加人參一錢
如治傷寒呃逆每末一錢人參

湯下 三方加貝母甘草等分 衛生方加青皮陳

皮 易簡方加半夏生姜

羌活附子湯

胃寒 羌活 附子 茴香 炮姜 木香
丁香各一錢 入鹽一撮全煎服

橘皮竹茹湯

陽症 橘皮三錢 人參二錢 竹茹四錢
甘草一錢 姜五片 枣二枚 加白朮枳壳

尤妙

小柴胡湯

又 柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

益元散

痢後 滑石 甘草

三香散

食呃 沉香 木香 蔴仁 蘇葉 蕤香

小陷胸湯

水結 黃連 半夏

瓜蒌是

生姜瀉心湯

便軟 甘草

生姜 乾姜

黃連 大枣

黃芩 半夏

人參

大承氣湯

便閉

大黃

芒硝

枳實

厚朴

