

醫方

陽和湯

熟地黄一兩。麻黃五分。鹿角膠三錢。白芥子二錢。炒。
 研肉桂一錢。生甘草一錢。炮薑炭五分。不用引。此方
 主治骨槽風流注陰疽脫骨疽鶴膝風乳品結核石
 疔。貼骨疽及漫腫無頭平翳白陷一切陰凝等證。麻
 黃得熟地不發表。熟地得麻黃不凝滯。神用在此。

陽和丸

肉桂一兩。麻黃五錢。炮薑炭五錢。共研細末。麩水為



醫藥大學圖書館藏

丸

醒消丸

乳香沒藥末各一兩麝香一錢五分雄精五錢共研
 和取黃米飯一兩搗爛入末再搗為丸如蘿蔔子大
 曬乾忌烘每服三錢熱陳酒送服醉蓋取汗酒醒
 消痛息

庫黃丸

醒消丸內除去雄精加西牛黃三分如前法用飯一
 兩為丸凡患乳毒瘰癧痰核橫痃流注肺癰小腸癰



毒每服三錢熱陳酒送下患生上部臨臥服下部
空心服

小金丹

白膠香茸烏五靈脂地龍木鼈各製末一兩五錢
藥歸身乳香各淨末七錢五分麝香三錢墨炭一錢
二分以糯米粉一兩二錢爲厚糊和入諸末擣干捶
爲丸如芡實大此一料約爲二百五十丸曬乾忌烘
固藏臨用取一丸布包放平石上隔布敲細入杯內
取好酒幾匙浸藥用小杯合蓋約浸一二時以銀物



北京中醫藥大學圖書館藏

加研熱陳酒送服。醉蓋取汗如流注初起及一應咬
核癰癧乳蟲橫痃初起服消乃止。幼孩不能服煎劑
及丸子者服之甚妙。如流注等證成功將潰潰久者
當以十丸作五日早晚服服則以杜流走患不增也
但內有五靈脂與人參相反不可與有參之藥同日
而服

子龍丸

甘遂大戟必要按法精細法製為粉。白芥子炒磨為
末各等分煉蜜為丸。日服三次每服淡薑湯送服二

分息與甘草之藥同日而服

觀音救苦丹

硫黃三錢。硃砂二錢。共研入銀器。鎔化。離火入麝香一錢。調和。預以油紙鋪地。以藥燒紙上。取為米粒。小齋取一粒。放患頂。火點即然。立刻燒過。膏掩。次日

愈

洞天救苦丹

取露天有子蜂窠。鼠矢尖者。青皮。棟樹子。立冬後者。佳。瓦上炙存性。為末。等分。配準。研和。每取三錢。陳酒



送服服後要隔兩日再服

大棗丸

用山羊矢曬乾入鍋炒炭存性悶熄磨粉收藏每遇
久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核先搗爛如泥
然後入前粉捶至成丸每服四錢黑棗湯送服

回疔散

土蜂窠有子者一兩蛇蛻一條泥裏火煨存性爲末
研和聽用

拔疔散

硝砂白丁香輕粉乳香蜈蚣各一錢血竭麝香各一錢
錢金頂碗六分均製為末取蟾酥一錢酒化和搗為
丸如芥子大宜帶長以便插入疔孔

奪命湯

銀花○草○河○車○赤○芍○細○辛○蟬○蛻○黃○連○殭○蠶○防○風○澤○蘭○羌
活○獨○活○青○皮○甘○草○等○分

聖靈丹

真珠西牛黃冰片各一錢琥珀四錢硃砂三錢石鍾
乳二錢各製研分入飛麩四兩研和每服取末五分



煎土茯苓湯調合再以湯送服無不愈但石鍾乳
真珠牛黃三物價皆貴重不可輕減分兩

三黃丸

熟大黃三兩乳香沒藥末各一兩雄精五錢麝香一
錢五分西牛黃三分以熟大黃酒浸透入碗隔湯蒸
饑擣爛然後以乳沒雄麝西五末和入再擣干捶爲
丸如梧子大每服五錢此丸專治懸癰紅腫熱毒疼
痛大癰楊梅廣瘡結毒火毒等證連服十次甚險全

愈



五通丸

廣木香五靈脂麻黃沒藥乳香各淨末等分用飯燒爛人末再擣爲丸如梧子大另以芎歸赤芍地龍白草等藥煎湯送丸五錢凡大癰生於要緊穴道將丸發威之際服此甚效如與三黃丸閒服更妙

蟾酥丸

寒水石三錢血竭沒藥膽礬乳香雄精銅青穿山甲殭蠶全蠍酒炒各一錢硃砂枯礬阜角刺冰片輕粉紅礬各三分蜈蚣去足三錢各製爲末用蝸牛二十



一箇蟾酥三錢酒化共搗爲丸如綠豆大金箔爲衣
每用葱白裹一丸敲碎酒服醉蓋取汗小癰初起服
卽全消白疽忌用

梅花點舌丹

沒藥。礪砂。藤黃。熊膽。乳香。血竭。葶藶。大冰片。沈香。各
二錢。蟾酥。麝香。各二錢。破大珠子。三錢。硃砂。牛黃。各
二錢。各製爲末。摘出蟾酥。以人乳化開。入末和搗爲
五百丸。如綠豆大金箔爲衣。凡紅腫癰癩初起。取一
丸入葱白內打碎。酒吞蓋暖取汗。三箇時毒消而愈。



紫金錠

山慈姑去皮淨文蛤去末淨各三兩麝香一兩
手金子去油淨大戟洗淨焙各一兩共為細末研極
細為度以老米糊和勻入口中杵干捶成膏作錠醋
磨塗毒消腫化服通節竅消熱痰

勝金散

人參三七磨粉米醋調塗患消痛息潰者乾敷立愈
刀斧傷

五音錠

六



雄黃熊膽京墨硃砂各一錢麝香五分牛黃一分生
將京墨研粉用酒少許化之再入熊膽研膩後入諸
末共研作錠凡遇紅腫惡毒水磨以新筆蘸藥圍患
中空毒頂乾再圍圈至全消初起者無不神效自頂
息此

一筆消

大黃二兩藤黃一兩明礬蟾酥五錢麝香乳香沒藥
各二錢用蝸牛搗爛作錠小瘡空出瘡頂取錠醋磨
新筆蘸藥圍乾再圍圈至瘡消方上



咬頭膏

銅青。松香。乳香。沒藥。杏仁。生木。鼈粉。蓖麻仁。等分。包豆。不去油。加倍。搗成膏。每兩膏內。加入白礬一分。再搗勻。臨用。取綠豆大一粒。放患頂。用膏掩潰。卽搗下。洗淨。換膏貼胎前產後。忌用。

代刀散

旱角刺。蘇黃芪。各一兩。炒。生甘草。乳香。各末。五錢。每服三錢。酒服。立潰。

紫藥

昆麻仁搗爛如泥鋪絹上絹照患大又取一絹蓋上
然後隔絹紫上能拔其毒能止其痛惟紅痛非常者
不得已用之如胎前產後婦人及患色白者忌用此
即如千捶膏內有蓖麻仁鯽魚膏有巴豆二物提拔
之力甚狠如孕婦紫即墮胎白疸紫則成功惟無孕
婦人及男子可紫痛止即去

山蓮散

大活鯽魚一尾破腹去雜以山羊矢塞實魚腹放瓦
上漫火炙乾存性研末加麝香一錢固貯如爛潰不



堪與內腑止隔一膜者用此撒。上奇功立見。

象皮散

豬身。前蹄。扇骨。燬炭。研粉。十兩。加入。象皮。炙炭。存性。一兩。共為。極細。末。凡。遇。爛。孔。如。掌。之。大。者。以。此。撒。上。至。孔。收。小。後。用。六。和。散。敷。此。藥。能。愈。刀。傷。跌。損。出。血。

六和散

海。螵。蛸。龍。齒。水。飛。象。皮。炙。存。性。研。極。細。血。竭。乳。香。輕。粉。各。等。分。加。研。極。細。或。乾。撒。或。熬。雞。子。油。調。拂。

推車散



推車。蠶即羌蝦。炙研細末。每一錢。人乾薑末五分。研極細。專治多骨。用吹孔內。內有骨。次日不痛。白出。吹過周時。無骨出。則知肉無多骨也。

五寶散

人指甲五錢。用紅棗去核。逐枚包甲。以長髮五錢。細繫棗。同象皮薄片五錢。入瓦上。炭火炙。鎔成團。存性。取出研粉。加麝香一錢。冰片三分。固貯。生肌速效。

拔毒散

邑。五霜一錢。雄黃一錢。冰片五分。麝香一錢。共為細



粉取撒膏上貼則拔盡毒氣使無後患胎前產後之
婦忌用

合掌散

硫黃一兩鐵鏽一錢紅硃六分共研極細如麴取葱
汁調和塗入大椀內勿使厚薄以椀覆於瓦上取艾
置椀下熏藥藥得熏乾敲藥椀聲同空椀無異爲度
取藥再研極細每遇滿身癩疥及腎囊痒用藥一錢
可敷數次全愈臨用以右手中指羅紋黏滿香油再
在包內黏藥塗入左手心合掌數磨止有藥氣不見

藥形將兩掌擦瘡。每日早晚擦二次。三日瘡光再擦三四日不發。

二美散

吳茱萸焙。硫黃等分。各研極細。如麪專治膿疥雜間者。照前法蘸入手心。合掌磨擦。每日二次。愈後再擦三四日。

五美散

皮脂一兩。黃丹一兩。炒透。硫黃。雄精各三錢。輕粉一錢。共為極細末。入洞天嫩膏調敷。膿窠坐板。溼毒。



孫疔。外以繭紙掩綁。不可動揭。五日後揭下。再敷。二次全愈。如溼毒痒極。先以金銀散敷。上次以前膏加敷。

金銀散

硫黃二兩。入銅器鎔化。加銀朱五錢。攪和。離火倒油紙上。冷取。研細。醋調敷。治惡瘡。極痒。如破爛。爛孔。痒極者。白蜜調敷。

神仙棗

紅棗二斤。銀花歸身各二兩。甘草三錢。白殭蠶白芷。



乳香末五楸子黃芪各五錢水六椀煎半渣如前煎
共湯六椀去渣留水煮棗治患瘡日久體虛瘡最重
者外敷內服四五日喫完全愈

紅棗丸

白殭蠶紅棗各四兩先用水煮紅棗一二滾取棗湯
洗殭蠶棗湯以棗去皮核擣爛殭蠶曬乾爲末二兩
同棗擣和爲丸四兩仍用紅棗湯送服專治瘡鼓服
完全愈

金霜散



中醫藥大學圖書館版

杏仁去皮尖三錢。雄黃錢半。輕粉一錢。研末。豬苦膽調敷。不痒惡瘡。

平安餅

烏梅肉一錢。輕粉五分。研和。不見粉亮為度。加硬。用津少許。不可用水。研至成膏。照患口大小。作薄餅。幾箇。以貼毒根。外用膏掩。日易一次。俟毒根不痛。落下。方止。

枯痔藥

用明礬一斤。紅白礬三錢。共入陽乘罐內。外圍炭火。

外科醫方



外科諸論卷之三
燒至礬鎔有煙起煙卽礬毒人立下風忌聞俟煙盡礬枯去炭次日取出研如細粉每取一錢加入飛過硃砂一分研和聽用

退管方

黃荆條所結之子取炙燥爲末每服五錢黑糖拌空心陳酒送服專治痔漏之管服至管自退出方止

消管丸

苦參四兩川連二兩酒炒當歸槐花單澄茄各一兩五楮五錢各爲細末用馬蹏鼈兩箇約重八九兩柿



餅四兩。以水共煮。去鼈骨。搗爛。入前末。搗和。爲丸。空心每服四錢。白湯送下。其管自出。

陽和解凝膏

每香油十斤。取新鮮大力子根葉梗三斤。活白鳳仙

梗四兩。入油煎枯去渣。次日以川附桂枝大黃當歸

方○肉 性○所未○另存○同乳○沒等○未入○膏○奧○和

肉桂官桂草烏川烏地龍殭蠶赤芍白芷白斂白芩

各二兩。川芎四兩。續斷防風荆芥五靈脂木香香圓

陳皮各一兩。再煎藥枯。瀝渣。隔宿油冷。見過斤兩。每

油一斤。加炒透黃丹七兩。攪和。文火漫熬。熬至滴水。



北京中醫藥大學圖書館藏

成珠不黏。搗爲度。卽以溼粗紙。覆火。以油鍋。移放冷
竈上。取乳香。沒藥末。各二兩。蘇合油。四兩。麝香。一兩。
研細入膏攪和。半月後。攤貼。一應爛潰。陰疽。凍瘡。貼
一夜。全消。潰者。三張。全愈。瘡疾。貼背心。

洞天鮮草膏

先用壯年頭髮一斤。菜油三斤。入鍋熬。髮枯淨去渣。
聽用。以活牛蒡。甘菊。蒼耳根。葉。金銀藤。馬鞭草。仙人
對坐草。各鮮草一斤。入菜油十斤。熬下。去渣。漚出。再
以白芷。甘草。五靈油。當歸。歸身。八箇末。葶藶。枯樹。



消俟油冷。將前頭煎過之油。共見過斤兩。每
油一斤。用當日炒透黃丹七兩。入於油內攪勻。再熬
熬至滴水成珠。以兩指取膏為丸。而丸不黏指為度。
離火。俟退火氣。以油紙攤膏。用貼一應熱毒瘡。癩如
做嫩膏者。每斤油內入黃丹四兩。熬黑。收起聽用。

白玉夾紙膏

麻油四兩。熬至滴水成珠。為度。離火。加製松香五錢。
白蠟黃蠟各二錢半。再熬去煙沫。用絹漚清。一加輕
粉一兩二。加冰片三分三。加麝香三分。隨攪隨加。

攪勻極增雞子白一箇再攪勻貯瓷瓶以蠟封口聽
用如貯兩月則藥乾無用專治夾棍杖傷及刀斧槍
棍傷損爲效甚速用油紙校傷處長闊一倍以膏攤
一面餘一面刺眼折來蓋膏以有眼一而向貼患處
用絹布綁縛

化核膏

菜油四斤壁虎十四條蜘蛛二十八箇蝸牛三十六
枚入鍋熬至枯淨油面取出再入各新鮮首烏藤葉
甘菊根薄荷牛蒡蒼耳等草各半斤武火熬至草枯

出渣俟油冷再入連翹。元參。苦參。白斂。白芥子。殭蠶。
水紅子仁。各搗碎。大黃。荆芥。防風。各四兩。浸一宿。熬
至黑枯。以油瀝清。見過斤兩。加製木鼈油半斤。配炒
黃丹。慢入。慢攪。攪勻。文火再熬。熬至滴水成珠。膏不
黏指爲度。再加入丁香油。麝香。各二錢。蘇合油一兩。
攪勻。退火攤貼。凡癰癤。結核。惡核。此膏貼卽暗消。但
毒根不除。必以子龍丸日服三次。外用膏貼。方可除
根。以杜後發。

白花膏

香油一斤。青槐枝百段。陸續入油熬枯。油至滴水不
散。取出枯枝。入黃蠟兩半。鉛粉兩半。離火溫時。再下
製淨乳香。兒茶。沒藥。白花蛇。各三錢。樟腦一兩。麝香
一錢。同油攪勻。成膏。浸水內一宿。專治痒極。見骨者。

紫微膏

香油四兩。燭油兩半。黃蠟兩半。熬至滴水不散。入炒
鉛粉三兩。輕粉。乳香。阿魏。白蠟。沒藥。各五錢。兒茶。六
錢。雄黃。龍骨。真珠。各五錢。攪勻。遠火入麝香五錢。成
膏。聽用。生肌收口。

麝蘇膏

麝香五靈脂沒藥雄黃乳香各一兩蟾酥五錢蘇合香油二兩洞天嫩膏八兩共攪勻入瓷瓶固藏遇大癰空出患頂取此塗圍如乾以雞毛黏酒拂上神效內服醒消丸立愈。

聾耳散

凡耳內有膿作痛取新鮮白鯊魚腦中枕骨入火燒紅取出俟冷每兩加冰片一錢共研用棉花捲置耳內吹藥二三次即愈。



消管方

早角刺尖。柘樹膜。灰。淨末。各五錢。紅腹金錢。糯米。末。三錢。渝麵。真蟾酥。各一錢。和入。加工研細。固。藏。聽。用。每遇漏管。先以豬鬃探通。料其淺深。然後以紙捲藥。爲條塞入。日易日塞。至愈乃止。

癰酒方

用本地白椶皮。南星。檳榔。各一兩。檀腦。生木。鱉。各五錢。斑蝥。三十箇。蟾酥。三錢。共浸滴花燒酒。一斤。內聽。用。遇癰。三日一搨。一拂。至愈乃止。

鮮角膏方

五月初旬取新鮮早角刺數斤。擣爛。水煮濃汁。濾出。易水再煮二、三度出渣。以汁共歸一鍋。漫火煎至成膏。如治橫痃。每日取二錢。同糯米煮粥。日食兩匙。如治頑癬。用皂角刺醋熬成膏。髻髮後塗敷。日髻日較。毒水盡。再敷數次。全愈。

喉證方

蘇子前胡。赤芍。各二錢。甘草。桔梗。各二錢。元參。連翹。浙貝。各一錢半。治風火喉閉鎖喉風。實火用川連。



一錢桔梗。牛蒡。元參。赤芍。荆芥。各一錢半。連翹。黃芩。
花粉。射干。各錢半。防風。一錢。○連翹。黃芩。防風。荆芥。
射干。各一錢。銀花。錢半。薄荷。八分。川連。甘草。各五分。

壁錢散

六七月取有子壁錢十箇。老蟪子兩箇。髮紮好。用明
礬七分。鎔化。以紮好之壁錢入鎔。礬粘足。燈火炙透。
研粉。凡熱痛喉證。用吹最效。

眞珠散

礬砂。雄精。川連。兒茶。人中白。冰片。薄荷。黃蘗。各等分。



大破珠減半。名爲極細末。治牙疳牙根紅腫。口喉
點以散吹。

赤霜散

紅棗一枚。去核。入紅碗。如黃豆一粒。茶好瓦上炭火
至棗炭上起白色煙盡爲度。蓋熄。俟冷。加入冰片一
分。研專治走馬牙疳。延腫穿腮。危險不堪之證。吹之
效速如神。久爛之孔。生肌亦速。

又方

白馬前躑。修下腳皮炭。炙存性爲末。入冰片少許。吹



患處立愈

南星散

南星一枚。空。空。入雄黃一塊。麥麪包裏。火燒候。雄黃
以杯合定。遠火候冷。去麪研末。加麝香。專治牙蝕。因
患骨槽風。以致牙蝕。透骨穿腮。拂之數日。愈。

骨鯁方

縮砂。草果。威靈仙。清水。沙糖。共煎。連服三四碗。骨化

為涎

刻次丸

又名過街笑



蟾酥一錢。陳酒化透。入五靈脂。麝香。各一錢。研和爲丸。二百粒。新零綢包。絲線紮固。藏瓷瓶。每取一丸。咬於痛牙。九化全愈。

固齒散

取老鼠頭骨牙。同鹽煨。存性研細。以擦動牙。牙卽收。上不搖。

取齒丹

活鱒魚一條。每重十兩。以白礬一錢。人腹放無風無。貓犬處七日。魚身發白毛。用雞毛拂下。以少許膏藥。



收之每遇病牙取些些膏藥貼齒片刻牙即落下。

舌上出血或鼻衄方

茅柴根車前子血餘三物為末吹擦即止以煎服治
溺血鼻衄龍骨末吹入立止

小兒口疳方

生香附生半夏等分為末雞子白調作如餅貼男左
女右湧泉穴一周時愈如小兒口内生毒塊不能食
乳俗名螻蛄子用生地酒浸搗爛塗男左女右腳心
自愈



口舌藥方

荆芥。梔子。仁。黃連。黃芩。連翹。大力子。薄荷。通草。各一錢。燈心一撮。甘草四分。蒲黃一錢。爲末。擦上。卽愈。又天門冬。麥門冬。去心。元參。等分。爲丸。彈子大。日取一丸。嚙化。又舌硬。生衣。用犀黃。硃砂。各一分。元精石二兩。研末。刺出舌尖黑紫血。用藥撒。上須與舌軟。

楊梅瘡敷藥

人指甲。頭髮。瓦土。炙存性。研粉。每一兩。加麝香一錢。再研和。日敷。

千金內托散

人參。黃芪。防風。官桂。白芷。厚朴。川芎。桔梗。甘草。不用引。

二陳湯

橘紅五錢。半夏二錢。茯苓一錢。甘草加白芥子二錢。

炒研

四物保元湯

川芎。當歸。白芍。熟地。人參。黃芪。炙草。

又保元湯



肉桂。生黃芪。生甘草。

加味四物湯

川芎。當歸。白芍。熟地。黃生。甘草。炒白芷。茯苓。五。味。子。

人參。肉桂。

十全大補湯

人參。白朮。漂淨土炒。焦茯苓。炙甘草。熟地。白芍。川芎。

當歸。黃芪。肉桂。

六味地黃湯

熟地。山藥。澤瀉。山萸肉。茯苓。丹皮。



北京中醫藥大學圖書館版權所有

龍膽瀉肝湯

龍膽草。當歸尾。各二錢。銀花。花粉。黃芩。連翹。各錢半。
知母。甘草。丹皮。防風。木通。各一錢。

敗毒湯

連翹。赤芍。銀花。歸尾。黃芩。花粉。各二錢。甘草。節。一錢。
煎湯。送醒消丸。唯疔毒忌酒。此外藥內不可缺酒水。
各一椀。煎半服。小孩減半。煎化丸服。



雜證

外科之治法。並藥方。業已和盤托出。尚有雜證。亦藥到病瘳。萬無一失者。盡錄於左。

調經種子方

當歸身。川芎。吳茱萸。各一錢。熟地。香附。各一錢五分。白芍。茯苓。丹皮。各八分。延胡索。廣陳皮。各七分。若經水先期者。必色紫。加條芩八分。過期者。必色淡。加官桂。乾薑。熟艾。各五分。不論先期。落後。每服加生薑三片。水一椀半。煎八分。俟經水至。日空心服。起濟再煎。



臨臥服一日一劑服至經止兩三日交媾卽孕經期
準而不孕者照後方服四劑下期再服而孕續斷
參杜仲當歸益母各二錢州芎一錢砂仁炒研五分
香附二錢楠紅一錢紅花三分凡痛經不受胎者取
丹參曬乾磨粉日以二錢温陳酒送服兩月內卽孕
無有不靈

求嗣得嗣法

昔褚澄言男精洩於先而女精後至則陰衰陽主男
孕如女精洩於先而男精後至則陽衰陰主女孕又

言月信初盡其濁氣未清而交接卽女務待經止兩
足日則女体虚而濁氣盡再男人保養月餘陽勝於
陰定成男孕又論子宮左右如男精洩於婦人之左
生男右則生女此男清女濁男左女右陽壯陰衰之
至論也凡疾風暴雨或醉飽或服春藥而受胎者多
天必俟天氣晴明日暖風和明星朗月而受胎者多
富貴儻時令不正或迷霧氣怒而受胎者多愚蠢貧
賤或雷電之後而受胎者定生怪狀一物凡求嗣者
須知

黎洞丸

牛黃冰片各二錢。阿魏雄黃各一兩。大黃乳香沒藥。
兒茶天竺黃參三七血竭各二兩。山羊血五錢。前藥
各爲末。取山羊血拌曬乾。再磨爲末。加藤黃二兩。隔
湯煮十餘滾。去淨浮膩。入末爲丸。如芡實大。儻藥散
少加熟蜜可也。九宜陰乾。以黃蠟包裹珍藏。臨用破
蠟殼。取丸。陳酒化服。專治腫毒。跌打危重之證。內服
外敷皆效。

祛風逐溼散



番木鱉甲尾各精製淨末二兩川附一兩共爲末專
治手足不仁骨節麻木每服七分用好陳酒五鼓送
下醉蓋取汗服至痛處更痛麻處更麻頭眩背汗昏
沉四五刻卽定定則全愈如服後不覺痛麻必要日
服至知覺方止

化痞膏

凡患痞癖之處肌膚定無毫毛須看準以筆圈記用
香油一斤密陀僧六兩阿魏五錢羌活一兩水紅花
子麝香各三錢熬膏退火攤貼近起一膏可消年久

外科證治全書
三
兩張而愈。內服尅堅酒。用水紅花子研末三錢。浸
酒二斤。時刻呷。至愈乃止。

三日大瘡方

瘡未至之先。用陽和解渴膏。布攤貼背心。用常山雪
苓。官桂。甘草。檳榔。各三錢。小黑豆四十九粒。酒水各
二碗。煎至二碗。當晚先服一碗。蓋暖而睡。留一碗。次
日約瘡至兩箇時。前頓熱服。蓋暖臥待。瘡至亦
輕。亦有當日而愈。愈後忌房事。戒食生冷。勞碌。風霜。
忌食雞羊牛肉。雞子鴨卵。白扁豆。半月。永截不發。



愈瘡棗

紅棗三斤。豬板油一斤。陳酒三斤。共入沙鍋內。煮飯。加水三斤。煮至一半。不時取食。食完瘡愈。如暑天。分作五六次煮食。

黃疸立效方

凡患黃疸者。眼白黃。小便赤。身體軟倦。取黃豆生嚼。不惡心者。是用蒼耳子。薄荷木通。絲苗陳。各三錢。要用無毫水之陳酒一斤。煎一椀。衝炒砂仁末三錢。服。小便赤如血者。加川連一錢。同煎。屢用。愈人有白癰。

廣黃疸皆溼證。應忌酒。殊不知酒本溼也。今做緝溼
捕善識溼穴。領藥戰溼非酒。不可如經滴水不效者。
何也。酒被水解。捕猶賊阻也。

紅白痢及赤息痢方

凡痢不拘紅白。忌服川連。服則倒胃。不生腹痛。而痢
者。後方一服立愈。儻增減定不效。車前草炒研二錢。
檳榔厚朴。山查陳皮。滑石甘草各一錢。紅麴三錢炒。
澤瀉枳實各一錢。燈心一撮。同煎。另以木香六分酒
磨衝藥而服。有等腹不作痛。惟稠膿血兼流黃漿。此



魚平。素愛食冷茶水酒。乃滑腸疝息痢積溼之證。取
活鱖魚。去腸雜切段。放瓦上炙炭研粉。每服三錢。黃
糖拌熱陳酒送下。數服全愈。不拘老幼。滑腸外痢者
神效。忌食水果水酒。生冷海參海蛇等性寒之藥。

癆願證方

凡患癆癩。或羊頭風等證。緣心竅中痰迷所致。取橄
欖十斤。敲損。入沙鍋煮數滾。去核。入石臼搗爛。仍入
原湯煎膩出汁。易水再煎。煎至無味。去渣。以汁共歸
一鍋。煎濃成膏。用白明礬八錢。研粉入膏攪和。每日



早晚各取膏三錢開水送服。或初起輕者取橄欖末入口嚼嚥。橄欖之味更美。至愈乃止。

吐血立愈方

凡吐血多者。覓三四兩重大當歸一隻。全用切細。取好陳酒一斤。漫火煎至一滿碗。頓於鍋中以溫為妙。候將要吐。尚未吐。口中有血。含住。取藥一口。連血嚥下。卽此一劑而愈。後不再發。每有醫家阻云。吐血尙要戒酒。豈可酒者當歸而服。服則血噴不止。如之何。殊不知當歸二字之解。當者當其時。歸者引血歸經。



也全用定血此方乃余家世傳活人多多從無一誤
痰中有血方

活雄鴨一百隻每日清晨空腹時以一隻殺血碗內
卽取呷嚥忌加鹽百日而食白鴨之血不可隔斷食
完全愈

弱血頭痛如裂方

當歸一兩酒一升煎成一碗一服卽愈

徧身疼痛方

當歸肉桂延胡索天麻等分爲末酒送五服愈



手足骨節疼痛方

熟地四兩。擣爛。浸入滴花燒酒二斤。隔湯頓熱。以竹筴攪勻。候冷。隨量日飲。至愈。取所浸熟地。過酒。

箭風痛方

延胡索。桂心。五靈脂。木香。白芷。防風。各一錢。酒煎。遠服。三日。三服。愈。

雷頭風方

諸藥不愈之證。惟用山羊矢。炒炭。研粉。酒送。二錢。立

效。



偏正頭風方

白芷三錢。天麻一錢。磨細防風。荆芥錢半。煎水衝服。

疳膨食積方

雞裏金三十箇。忌經水。瓦上炙無臭氣。成炭存性。磨粉。車前子四兩。炒磨粉。二物和勻。以米餈。鎔化與食。食完全愈。忌食炒豆。熬油結硬等物。遲治傷目。

又方

田雞白水煮熟。薑末少許。淡食至愈乃止。

閃頸促腰方

礪砂研粉以骨簪蘸津黏粉點兩目淚出稍鬆連點
三次立時全愈

赤眼淹纏方

杜仲厚朴桑白皮檳榔各一錢取雄雞肺一箇淨經
水去紅筋入白酒釀六兩隔湯頓熟去渣以湯肺食
下隔兩日再服三次全愈

胃脘痛方

活乳汁草卽蒲公英放瓦上炙枯黑存性研末每取
五分燒酒調丸口含再以燒酒送燕痛息接服五日



全愈戒食生冷

又方

紅坊內好紅花匹分棗頭十枚水二碗煎至棗熟去
花食湯棗連服二十日永遠斷根

夢遺方

六味地黄湯減去澤瀉增龍骨三錢生研水飛蓮鬚

一兩茨實二兩線膠四兩用牡蠣熟粉炒膠成珠去

磨粉同前藥蜜丸每早各取四錢鹿含草煎

湯送服



白濁方

午舌頭草根。卽野甜菜。又名禿菜根。近水地處最多。煎湯當茶飲。或以湯煮粥喫。至愈乃止。

欬嗽神效方

杏仁一兩。泡去皮尖。內有雙仁者棄之。買新乳鉢。新研捶。將杏仁擣爛如泥。分爲三服。每內加冰糖三錢。共入蓋碗。用泉水煎滾。衝入薑片。刻候溫。連杏仁末服下。早晚各一次。三服而愈。如以杏仁同煎無效。

天絲入目方



捉肥蝨二十餘。將蝨用鍼截破。令人仰臥。捏蝨血。飛入眼內。少刻。天絲灰。抱蝨血。而出。

塵屑入目方

吐津於石硯上。以人指甲磨濃汁。用骨簪蘸點眼內。不一刻。一抹而出。

跌打骨斷方

綠礬一斤。煎湯。粗紙浸透。裹傷處。手執燈。恣然火。不住紙上。炙紙溫。即易火。熄換然。再炙。二者相際。效速。斷骨處。用竹片綁紮。七日全愈。



冷哮方

淡豆豉一兩。白礮一錢。皆爲末。用飯三錢研爛入水。爲丸如蘿蔔子大。每取七粒。白湯送下。童子服可除根。有年者經寒卽發。服可托定不哮。

腸紅方

取花椒子炒磨粉。每服三錢。用黃糖拌白湯送下。服

至愈止。

胃寒嘔吐黃水方

生薑一斤。搗取汁。梔許入廣膠。乳香沒藥末各五錢。



同煎膠化。離火取藥攤作三四大膏。令貼胃脘痛處。以絹綁縛三箇時。然後取周歲孩鞋兩隻。鑪上烘極熱。輪熨至膏硬。再易膏貼。再綁三時。熨至愈而止。後服慰胃丸。○厚朴三斤。切片。薑二斤。薑帶原皮。五升水。煮去薑。留朴焙乾。生甘草二兩。乾薑四兩。依前再煮。煮乾。去草。留薑朴炒燥。共為細粉。黑棗薑湯煮。取棗搗為丸。曬乾服。

翻胃初起方

陳皮土炒黃皮起炮為粉。每空心服三錢。



烏痧瘰方

丁香。雄精。蒼木。硃砂。各等分。爲末。取蟾酥亦等分。切片。酒浸。研漿。和。前末。搗爲丸。如芥子。細曬乾。藏。每取七粒。溫茶送。嚥。立甦。

水瀉立愈方

焦白朮。蒼朮。各二錢。山查。厚朴。廣陳皮。土炒黃芩。各一錢。車前。二錢。焙。搗。同煎。

大麻瘋方

用粗如酒杯之蛇一條。竹刀破腹去雜。切寸段。取瓦



放於炭火上。以蛇段豎放瓦上。蛇段跌倒者無毒。其不倒者有毒。用炙存性磨粉。拌入飯內。食通身白毛鴨一隻。與食次日鴨毛盡脫。殺鴨石鍋內者爛勻。作四五日食。凡食鴨第一頭其腫者更腫。第二三頭收小。食完而愈潰爛不堪。及初起未爛者。治法同效。

狗咬方

番木鱉切片。瓦上炙炭存性。研末撒上。二三日可以收功。如爛潰日久者。半月收功。

小兒冷疳方

小兒面黃腹大。名曰冷疳。證多不瀉。食多吐。用丁香
七枚。研末。乳蒸三四次。薑湯頓服。若吐瀉相兼者。楸
紅分等。蜜丸。如黃豆大。米湯下。不瀉。僅吐者。生薑薑
湯浸煮。曬乾。磨粉。對丁香。橘紅末。薑汁。糊丸。薑湯送
下。吐立止。

小兒蟲證方

檳榔六兩。黑牽牛仁二兩。曰牽牛仁。二兩爲末。用烏
海二枚。花椒三十粒。煮湯吞服。二錢。如腸鳴久瀉。用



青皮。棟樹根。肉蒸透。曬乾。再蒸。白饅。拌。每服一錢。

夜啼兒方

因穿蓋過暖。竝父母同牀。熱極所致。諺云。苦夏小兒。安常帶三分飢。與寒取雞矢塗兒臍中。男雌女雄。晨妙。或用真犀黃。飛硃砂。各五釐。研和塗舌上立止。

砂雪丸

急慢驚風。用青蒿。節。閒。蟲。狀如小蠶。七月內有。久亦成蛾。將蟲七箇。搗和硃砂。輕粉。各五分。九粟粒大一歲一丸。乳汁調服。詩云。一半硃砂一半雪。其功全在。



青蒿節任教死去也還魂服時須用親娘血

啞驚丹方

天竺黃二錢麝香犀黃各四分雄黃一錢琥珀六分
僵蠶一錢陳膽星四錢各爲末用甘草釣藤釣煎膏
爲丸硃砂一錢爲衣外加赤金每料勻作四十九丸每
服研一丸用燈心炭四錢薄荷湯送下神效又方用
六蜘蛛一箇炙粉調豬乳灌之立刻音出

小兒目疾方

黃連一錢人乳調塗湧泉穴男左女右紅赤自無



又方

痘後眼內有星翳取杭州臙脂泡水鋪紙水上以新筆在紙上蘸水一日拂三次三日愈遲治帶疾

小便閉方

此證乃氣閉非大小便不分也往往醫家用澤瀉木通車前豬苓等藥全無一效以歸身一兩川芎五錢柴胡升麻各二錢半水二椀煎八分一服即通曾救多人或孕婦及老年之人加人參一錢

老年便燥方



老年人或患癰毒大便燥結取杏二松子仁大麻子
仁柏子仁各三錢搗爛滾水衝蓋片刻當茶卽飲如
熱甚者加甘蔗汁半杯衝服

小兒浮腫方

一童十一歲手足臂腿及指頭面徧身浮腫數日後
日增沈重以致氣喘不能眠一客令覓黃皮柑子一
枚同酒釀二斤煎至將乾去柑内核取柑連酒釀食
食二次全愈

