

肝胆部



杭州圖書館藏

醫學綱目卷之十

肝肺諸風

肝肺諸風

大法

素問

風之傷人也

或為寒熱或為熱中或為氣鬱或

為癘風或為偏枯或為風也其病各異其善治河漢因至

五臟六腑不知其解願聞其由岐伯對曰風氣藏于皮膚

之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則酒

然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故

使人快慄而不能食名曰寒熱風論治見寒熱門○快

風氣與陽明入胃循脉而上至目內皆其人肥則風氣不

得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而

泣出治熱中見黃疸門

風氣與太陽俱入行諸脈俞散于分肉之間與衛氣相干

其道不利故使肌肉憤脹而有湯衝氣有所疑而不行故

其肉有不仁也治見痺門

風寒客于脈而不去名曰癘風或名曰寒熱癘者其榮衛

不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢潰

以春甲乙傷于風者為肝風 以夏丙丁傷于風者為心

風 以季夏戊己傷于邪者為脾風 以秋庚辛中于邪

者為肺風 以冬壬癸中于邪者為腎風 風中五臟六

腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風治見

俞穴風 風氣循風府而上則為腦風治見頭痛 風入係頭則為

目風眼寒治見眼目 飲酒中風則為漏風治見肝門 入房汗出

中風則為內風王註以勞風為內風治見在門 新沐中風則為首風治見

頭痛 久風入中則為腸風飧泄治見下痢 外在腠理則為泄

風故風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方然

致甲乙經有風氣也帝曰五臟風之形狀不同者何願聞

醫學綱目卷之十

一

癘風

燕府風

俞穴風

歲府風

其診及其病能岐伯曰肺風之狀多汗惡風色餅然白時

欬短氣晝日則瘥暮則甚診在肩上其色白餅字音邊切白貌也○仲

景云肺中風者口燥而心風之狀多汗惡風焦絕善怒

嘔身暈而重冒而腫脹

赤色病甚則言不可快診在口其色赤嘖字衍文也仲

翕翕發熱不能起肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼噎

心中飢食則嘔吐

乾善怒時憎女子診在目下其色青仲景云肝中風者頭

人嗜

脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄

微黃不嗜食診在鼻上其色黃仲景云脾中風者翕翕發

而短氣

腎風之狀多汗惡風面疣然浮腫脊痛不能正

立其色皤隱曲不利診在肌上其色黑奇病論云有瘰然

大紫身無痛處形不瘦不能食食少名為何病岐伯對曰

病生在腎名為腎風腎風不能食善痿而心氣痿者死○

張生和治桑惠民病風面黑畏風不敢出爬搔不已乃毛

脫落作痛醫三年不痊求治于戴人曰非癩也乃出

素問風論云腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色始

面疣然浮腫今公之病乃腎風也宜先刺其面大出血其

血當如墨色三刺血變色矣于是下針自額上下排針直

兩傍蓋此少陽經少血多氣隔日又針之血色乃紫二日

外又刺其血色赤初針時裏再刺則額角痛三刺其痛

不可任蓋邪退而然也後二十日餘又輕刺一過方已每

刺必以水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃

紅白但不服除下熱之藥病胃風之狀頸多汗惡風飲

食不下膈塞不通腹善滿失衣則腹脹食寒則泄診形瘦

而腹大 首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚

頭痛不可以出內至其風日則病少愈 漏風之狀或多

汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口

乾善渴不能勞事 泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾

上漬其風不能勞事身體盡痛則寒

俞穴風形

入醫學綱目卷十

二

診

靈黃帝曰人之善病風厥漉汗者何以候之少俞答曰肉

真人皆灸本臟背膈兼用續命湯治之

右五臟風症多汗惡風其治法用仲景桂枝湯之類孫



不堅腠理疎則善病風帝曰何以候肉之不堅也少俞荅曰膈肉不堅而無分理者粗理粗理而皮不緻者腠理疎此言其渾然者論五變

素暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也不從內外中風之病故瘦留者也通評虛實論此條非風病汗出而身熱者風也全文見虛

頰尺膚滑其淖澤者風也尺膚滑而澤脂者風也全文見診法

脈脈浮而大者曰風病風以日多死全文見診法

中風 卒中之初 中分淺深

中淺半身偏痛舌能言 中深半身不收舌難言

產中風 口噤 口眼喎斜 癢

考異

中風世俗之稱也其症卒然仆倒口眼喎斜半身不遂或舌強不言唇吻不收是也然名各有不同其卒然仆倒者

入醫學綱目卷十

三

經即九宮八風篇  
通評虛實論仆擊  
偏枯

經稱為擊仆世又稱為卒中乃初中風時如此也其口眼喎斜半身不遂者經稱為偏枯世又稱為左癱右瘓及腿風乃中倒後之証邪之淺者如此也其舌強不言唇吻不收者經稱為痺病世又稱為風懿風氣亦中倒後之症邪之深者如此也東垣以邪淺為中脈中腑而易治邪深為中臟而難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故內經連名稱為擊仆偏枯也後世迷失經意以偏枯痺病之旨一以中風名之遂指偏枯為枯細之枯而非左癱右瘓之症習俗之弊至于如此也殊不知仲景云骨節傷則瘳名曰枯蓋痿緩不收則筋骨氣肉無氣以生脈道不利手足不稟木穀之氣故曰枯非細之謂也或積日累月漸成細者間有之非可便指枯為細也

內經兼  
內傷外

素凡治消痺仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之



感

疾也通評虛 三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉全

見診病傳變云樞云直氣去邪氣獨留發為偏枯

靈其有三虛而偏中於邪風則為擊仆偏枯矣九宮入風篇

風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則

為偏風全文見諸風

右經四節論偏枯前二節屬內傷後二節屬外感蓋此

症內傷外感相兼而成也至于河間東垣丹溪則專主

內傷仲景陳無擇孫思邈則專主外感今詳偏枯邪淺

者宜瀉外感為主補內傷佐之痲病邪深者宜補內傷

為主瀉外感佐之也

中風為百病之長乃氣血閉而不行此最重疾凡治風

之藥皆辛溫上通天氣以發生為體是元氣始出地之根

蒂也

醫學綱目卷十

河間東垣主內傷

河風病多因熱盛俗云風者言末而忘其本也所以中風

而有癱瘓諸症者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非

外中于風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制

之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不為用而卒

倒無所知也多因喜怒思悲恐之五志有所過極而卒中

者由五志過極皆為熱甚故也所謂肥人多中風者肥則

腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利若陽熱又甚而鬱結

甚故多卒中其瘦者腠理疎通而多汗洩血液衰少而

為燥熱故多有勞嗽之疾也然肥人反勞者由暴然亡液

損血過極故也瘦人反中風者由暴然陽熱太甚而鬱結

不通故也經云人之氣以天地之疾風名之故中風者非

外來風邪乃本氣病也凡人年逾五旬氣衰者多有此疾

壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治

法宜和臟腑通經絡便是治風東垣論中風從內出其治法則如外入之証亦以發

仲景無  
道三法也

而數中風使然無擇諸方論中所謂左癱右瘓者蓋邪氣

以心悶閉不能言俱噫噎作聲蓋肺氣入心則能言邪中

于關節氣不能行故使四肢不遂也舌強不能言者以風

入心脾經心之別脉系于舌本脾之脉使咽連舌本散舌

下今風涎入其經絡故舌不轉而不能言也四肢拘攣者

以中風冷邪氣入肝臟使諸經學急屈而不伸也風柔者

以風熱入于肝臟使諸經張緩而不收也故經曰寒則攣

急熱則弛張風顛者以風入于肝臟經絡上氣不守正位

故使頭招面搖手足顛掉也風瘖者以風冷之氣客于中

滯而不能發故使口噤不能言也與前所謂涎塞心肺同

候此以口噤為差耳脹腿風者半身不遂失音不語歸專

表攻裡行中  
道三法也

初中治

初中倒時隨即醒者宜治若不醒者宜搯人中至醒若痰

涎壅盛者宜吐之口噤者亦宜吐之若口開手撒遺尿者

為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼戴上者宜灸之

本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于

上膈氣閉不通宜救急稀涎散

猪牙皂角四挺肥實不晋攀光明者

右為細末研勻輕者五分重者三字七温水調灌下不

大嘔吐但微微令涎出一二升便得醒醒後緩緩調治

卒中之初

八醫學綱目卷十  
五



不可便大投藥餌恐過傷人

治中風同前症勝金丸

生薄荷兩 二兩 銹碎水一升二味  
一處浸取汁研成膏

苾芾兩 一兩 梨蘆兩 二兩 硃砂兩 半兩

右將硃砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍  
眼大以硃砂為衣溫酒化下一丸甚者二九以吐為度  
得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金  
虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉  
不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不  
當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾予用此三方每每有  
驗羅謙甫方有粉霜益  
粉無梨蘆治法同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子皮膜 一粒去 白禁 如拇拈大  
一塊為末

不醫學編首卷一

六

右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度為末煉蜜  
丸如雞豆大每服一丸用綿裏放患人口中近喉處良  
又吐痰立愈

中倒後口禁牙關緊急治法另見後口噤門 亦用吐法

玄風病口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾者五臟氣絕也蓋  
口開者心絕手撒者脾絕眼合者肝絕遺尿者腎絕聲如  
鼾者肺絕也若見一猶可用工若面赤時黑主陽上散腎  
水反克心火蕪遺尿口開氣喘者斷不救也

五臟氣絕速宜大料參芪煎濃湯灌之及臍下大艾灸之  
亦可轉死廻生也

羅治中風眼上戴不能視者灸第二椎骨第五椎上各七  
壯一齊下火炷如半束核大立愈

中分淺深



表裡

靈虛邪偏客于身半其入深內居榮衛榮衛稍衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯故其邪氣淺者脉偏痛刺節真邪當

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨針

取之益其不足損其有餘乃可復也痺之為病也身無痛者四肢不收志亂不甚其言微知可治甚則不能言不可

治也痺廢也痺即偏枯之邪氣深者痺與偏枯是二疾以其半身無氣榮運故名偏枯以其手足廢而不收或名痺或偏廢或全廢皆曰痺也

巨針取之千金作温臥取汗

右內經論中風之淺深也其偏枯身偏痛而言不變志

不亂者邪在分腠之間即仲景東垣所謂邪中腑是也

痺病無痛手足不收而言瘖志亂者邪入于裡即仲景

東垣所謂邪中臟是也

診

寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相傳邪在皮膚浮者血氣虛絡脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩

入醫學綱目卷

七

正氣即急正氣引邪啗僻不遂邪在于絡肌膚不仁邪在于經即重不勝邪入于腑即不識人邪入于臟舌即難言

口遂吐涎

在臟在腑在經

風者百病之始善行而數變行者動也風本為熱熱勝

之治法

則風動宜以靜勝其躁養血是也治須少汗亦宜少下多

汗則虛其衛多下則損其榮汗下各得其宜然後可治其在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者宜汗之

中臟者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景云汗多則

亡陽下多則亡陰亡陽則損氣亡陰則損形故經言血氣

者人之神不可不謹養也所謂表裏不和須汗下之表裡

已和是宜治之在經也其中腑者面顏顯五色有表証而

脉浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中

身之側皆曰中腑也其病多易治其中臟者唇吻不收舌

身之側皆曰中腑也其病多易治其中臟者唇吻不收舌

不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼翳大小便秘結皆曰中臟也其病多難治若風中腑者先以加減續命湯隨証發其表如兼中臟則大便多秘澁宜以三化湯通其滯表裏証已定別無變端後以大藥和而治之大抵中腑者多著四肢中臟者多滯九竅雖中腑者多兼中臟之証至于舌強失音久服大藥能自愈也

垣中血脈則口眼喎斜中腑則肢節廢中臟則性命危急此三者治各不同如中血脈外有六經之形証則從小續命湯加減及疎風湯治之如中腑內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利之外無六經之形証內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芫湯羌活愈風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脈中腑之病初不宜用龍麝牛黃爲麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入

腎治骨恐引風深入骨髓如油入麪莫之能出又不可一槩用大戟芫花甘遂瀉大便損其陰血則真氣愈虛紫古臟者大小便秘東垣言中腑者有便溺阻隔二說當以東垣爲主蓋大小便秘不中臟者亦有之中臟者亦有大小便不秘結者也有

中淺半身偏痛舌能言

難經所謂偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠是也

解長維方

仲三黃湯治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒終

日不欲飲食附無揮兼半另不遂失音不言

黃芪二錢

獨活四錢

細辛二錢

麻黃五錢

黃芩二錢

右五味以水六升煮取二升分溫作三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二錢腹滿加枳實一枚氣逆加入



參三錢，悸加牡蠣三錢，渴加瓜蒌根三錢，先有寒加附子一枚。

黎踈風湯治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃去節 三兩 益智仁 杏仁去皮尖各 兩炒

甘草炙 升麻各五錢

右咬咀每服一兩水一小碗煎至六分去查熱服脚蹠熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月不可服

海拯濟換骨丹自汗者 不宜服

槐皮 芎朮 芷 仙人防首 蔓 十味各停勻

苦味香減半 龍麝加少許 硃砂作衣纏

麻黃膏煎丸 大小如指彈

右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澁或痛入骨髓或痺在皮膚或中急風涎潮不言精神昏塞行步

八醫學綱目卷十

九

艱難筋脉拘急左癱右瘓一切風疾並皆治之

槐笮子生 人參 桑白皮 蒼朮

川芎 何首烏 蔓荆子 葳靈仙

防風各二兩 五味子 木香 苦參各一兩

香白芷二兩 麝香另研 龍腦二錢 辰砂五錢

右十四味為細末入麝香令勻又用麻黃十斤去根節

用大河水三石三斗熬至六斗去滓再熬至二斗半入

銀石器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩

作十九硃砂為衣每服一九先搗碎酒一盞浸自晨至

晚食後臨卧攪勻服之神清無瞍是藥之驗更隔五日

服之如無汗宜服若體自汗服之是重亡津液也若風

盛人于密室溫臥取汗

羅續命丹治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言語蹇澁牙



閉緊急半身不遂手足搐搦頑痺疼痛涎潮悶亂婦人血  
風喘嗽吐逆坐臥不寧

川芎 羌活 南星 川烏

白蘚皮 海桐皮 肉桂 當歸

防風 熟地 乾葛 地榆

虎骨 硃砂 鈴白霜 烏蛇生

牛黃 雄黃 輕粉

麻黃 去節四兩以好酒三升 煎一升不用麻黃用酒

右為末以麻黃酒汁入蜜半斤熬成膏和藥為丸彈子  
大每服一丸豈淋酒下或葱湯化下不拘時候中書左  
丞張仲謙患半身不遂麻木大醫劉子益與服之汗大  
出一服而愈

行中道  
雜方

不醫學綱目卷十

寒

升一日服盡無時圖經云桑枝温平不涼不熱可以常服  
療體中風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣咳  
嗽消食利小便又服身輕聰明耳目令人光澤蕪療口乾  
仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子政和間何子  
常病兩臂痛服諸藥不效依此作數劑臂痛即愈  
外療偏風半身不遂冷痺症附子一兩生用咬咀納于無  
灰酒中經一七日隔日飲之服一小合瘥

中深半身不收舌難言

經所謂非之為病身無痛四肢不收志亂不甚其言微知  
可治甚則不能言者是也

風症辨  
異

丹今世所謂風病多與痿証滾同論治良由局方多以治  
風之藥通治諸痿也古聖論風痿各有篇目源流不同治  
法亦異不得不辨按風論風者百病之長至其變化乃

它病又曰善行數變曰因丁露風曰先受邪曰在肢理曰  
容曰入曰傷曰中歷陳五臟與胃之傷皆多汗而惡風其  
發明風邪係外感之病有臟腑內外寒熱虛實之不同若  
是之明且盡也別無癱緩痿弱卒中不省僵仆喎邪攣縮  
眩暈語澁不言之文也或曰吾子謂內經風論主于外感  
局方用麻黃桂附葷將以解風寒也用腦麝威靈仙黑牽  
牛葶將以行凝滯也子之言過矣曰風病外感善行數變  
其病多實少虛發表行滯有何不可治風之外何爲又歷  
述神魂恍惚起便須人手足不隨神志昏憒癱緩羸曳手  
足筋攣眩暈倒仆半身不遂膝脚緩弱四肢無力顫掉拘  
攣不語語澁等諸痿症兼治之考諸痿論肺熱葉焦五臟  
因而受之發爲痿躄心氣熱生脈痿故經縱不任地肝氣  
熱生筋痿故宗筋弛縱脾氣熱生肉痿故痺而不仁腎氣

熱生骨痿故足不任身又曰諸痿皆生于上謂之上者指  
病之本在肺也又曰昏惑曰瘈瘲曰瘖喑曰暴病曰鬱冒  
曰矇昧暴瘖曰瘖瘖皆屬于火又曰四肢不舉曰舌木強  
曰足痿不收曰痿涎有聲皆屬于上又禮記註曰魚肉天  
產也以養陽作陽德以爲僊怠悉是濕熱內傷之病當作  
諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居八九不思諸  
痿皆起于肺熱傳入五臟散爲諸症大抵宜補養若以  
外感風寒治之寧免實虛虛之禍乎風病外感之邪有  
寒熱虛實而挾寒者多痿病內熱之傷皆是虛証無寒可  
散無實可瀉局方本爲外感立方而以內傷熱証滾同一  
治其爲害也似非細故

右丹溪諸論蓋因局方治中風孟浪用發表行濕之藥  
戕賊血氣誅伐根本不知補養之法故引痿病以救局



方之失而其言如此然局方所述中風手足不隨起

須入神魂恍惚不語語澁等証即內經熱病相同至于

異處不得不察針經刺節真邪二氣去邪獨留發為

偏枯痿論云陽明虛則宗筋縱帶脉不引而足痿不用

由是知手足不隨者在偏枯手足為邪氣阻塞脉道而

然在痿病則陽明虛宗筋縱帶脉不引而然也非病有

言變志亂之症痿病則無之也痲病又名風痺而內傷

外感兼備痿病獨得于內傷也非病發于擊什之暴痿

病發于怠惰之漸也凡此皆明非與痿明是兩疾也

大率治風主血虛有痰治痰為先或作屬虛挾火與濕半

身不遂者大率多痰在左屬死血在右屬痰 左以四物

湯等加桃仁紅花竹瀝姜汁 右以二陳四君子湯等加

竹瀝姜汁 氣虛有痰者濃煎獨參湯加竹瀝姜汁 聲

如斫者屬氣虛以人參一兩煎湯一盞入竹瀝姜汁 遺

尿者亦屬氣虛以參芪竹瀝姜汁與之少食者亦為氣虛

宜參芪竹瀝 血虛有痰宜四物湯俱用姜汁炒恐泥痰

再加竹瀝入內服 治痰若氣虛少食者用竹瀝氣實能

食者加荆瀝此二味開經絡行氣血入四物湯中必少用

姜汁肥人多濕用附子烏頭行經肥人中風口喎手足麻

木左右俱作痰治用

貝母 瓜菱 南星 半夏 陳皮 黃芩 白朮

黃連 羌活 黃柏 防風 荆芥 歲莖仙 薄荷

桂心 甘草 天花粉 多食溫麪加附子竹瀝姜汁

酒一匙行經

風病治痰為先左右氣血之分

瘦人多火

瘦人脈虛火實四物湯加牛膝竹瀝一匙行經黃芩黃柏有痰加痰藥痰壅盛者口眼喎邪者不能言者皆當用吐



氣虛治  
驗

法輕者用瓜蒂蝦汁皂角急者用藜蘆五分或三分加射  
香灌入鼻內吐痰出如口不噤者灌入口內吐痰出一吐  
不已再吐之亦有虛而不可吐者有痰者先吐後用藥

羅風中腑兼中臟治驗○順德府張安撫耘夫年六十一

歲于己未閏十一月初患風証半身不遂語言蹇澀心神  
昏憤煩躁自汗表虛惡風如洒水雪口不知味鼻不聞香  
臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便秘結燥欲用大黃之類  
下之則平日飲食減少不敢用不然則又滿悶晝夜不得  
瞑目而寐最苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至  
庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利唾  
多中脘氣痞似噎子思內經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣  
氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾風名  
之此風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣又云形

不醫學綱卷十

十一

樂志苦病生于脉神先病也邪風加之邪入于經動無常  
處前証互相出見治病必求其本邪氣乃服論時月則宜  
升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裡養衛氣瀉肝木潤  
燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減冲和湯主之

柴胡

黃芪各五錢

升麻

當歸

甘草各三錢

半夏

黃柏洗

黃芩

陳皮

人參

芍藥各二分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服自汗加黃  
芪五分五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心  
火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以殊  
砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡  
三月有餘今困睡不已莫非它病生否予曰不然衛氣  
者晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度此衛氣交

入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼  
白睛紅隱澁難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連

黃栢各五分

連翹四分

當歸

甘草各三分

右作一服水二盞煎至一盞去查時時熱洗十三日後  
至日晡微有悶亂不安于前冲和湯中又加柴胡三分  
以升少陽之氣飲三服至十五日全得安卧減自汗惡  
寒燥熱胃膈痞元小便多服藥後小便減少大便一二  
日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脉微弦而柔和按  
之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言  
快利午後微澁宜以玄參升麻湯治之

升麻

黃連各五分

黃芩炒四分

連翹

桔梗各三分

鼠粘子

玄參

甘草

入醫學綱目卷十

七

姜蚕

各三分

防風一分

右吹咀總作一服水二盞煎至七分去查稍熱噉漱時  
時咽之前症良愈止有牙齒無力不能嚼物宜以牢牙

散

牢牙散治牙齒無力不能嚼物

羊脛骨灰

升麻錢二分

生地

黃連

石膏

各一分

白茯苓

人參各五分

梧桐淚三分

右爲細末入麝香研勻臨臥擦牙後以溫水漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌

肉瘦不能正臥臥則痛甚經云汗出怛阻使人偏枯余

思針經云虛與實隣決而通之又云留瘦不移節而刺

之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之爲陰氣下

陷入陰中有膊時痛不能運動以火導之火引而上補

之温之已上症皆宜灸刺爲此先刺十二經之井穴于四月十二日右肩臂上肩井穴內先針後灸二七壯及至灸瘡發于枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸左肩井次于尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥五分 人參 升麻 柴胡各四分

天門冬 麥門冬各三分 陳皮二分 甘草生

甘草炙 黃芩 黃柏各二分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去查温服食後汗多加黃芪五分後以潤腸丸

潤腸丸治胃膈痞滿大便澀滯

醫學綱目卷一 圭

麻子仁研 大黃酒煨各一兩半 歸尾 枳實

白芍藥 桃仁泥 升麻兩 人參

甘草生 陳皮各三分 木香 檳榔各二分

右除桃仁麻仁外爲末却入二仁泥蜜和丸如桐子大每服七八十九温水食前服初六日得處暑節暑猶未退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣爲本以益氣調榮湯主之藥中加時藥使邪氣不能傷也

人參三分爲臣 陳皮二分爲佐

熟地調燥瀉陰火 白芍藥微收肝木之邪

白朮三分爲佐養胃 升麻二分爲使使陽明

當歸和血潤燥 黃芪五分爲君實皮毛

半夏強胃進食 甘草二分爲佐調和

柴胡二分爲使引少陽之氣使

出于胃中乃風行于天上



麥門冬三分為佐，猶有暑氣未退，故加之安肺氣，至秋分節不用。

右咬咀，作一服水二盞，煎至一盞，去查，溫服，忌食辛熱之物，反助暑邪，秋氣不能收，正氣得復而安矣。

厥逆者，溫補之。

素太陰所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡。辨此腎虛也，少陰不至者厥也。脾解篇王註云：辨瘡也。腎氣內奪則足廢。

河地黃飲子治舌瘡不能言，足廢不能行，腎虛弱其氣厥不至，舌下。

熟地 巴戟 山茱萸 肉蓯蓉酒浸

石斛 附子炮 五味子 白茯苓

菖蒲 遠志去心 官桂 麥冬去心各等分

右為末，水一盞，半每服三錢，生薑五片，棗一枚，薄荷同煎至八分，不拘時服。

醫學綱目卷一

六

附治中風四肢逆冷，吐清水，婉轉啼呼者，取桂二兩，咬咀，以水三升，煮取二升，去查，適寒溫，盡服。

熱煩者，冷補之。

干地黄煎治熱風心煩悶及脾胃熱不下食，冷補方。

生地汁 枸杞根汁各二升 生薑汁

酥各三升 荆瀝 竹瀝各五升 天門冬

人參各八兩 茯苓六兩 大黃 梔子各四兩

右十一味，擣後五味為細末，先煎地黄等汁，成煎次納藥末，攪勻，每服一七日，再漸加至三七，覺利減之。

荆瀝湯治患風人多熱宜服。

荆瀝 竹瀝 生薑汁各五合

右三味相和，溫煖為一服，每日且服，煮散，午後進此平復乃止。表難方餘

口禁者，不下者。

唐王太后中風不能言，脉沉而口噤，醫人許胤宗曰：既

不能下藥宜湯氣薰之藥入腠理週時可瘥乃煎黃芪防風湯數斛置床下氣如烟霧薰之其夕便得語藥力薰蒸其效如此

丹溪云人之口通平地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形王太后病風不言而脉沉其急非大補不可也若以有形之藥湯緩不及事今以黃芪防風煎湯氣如烟霧滿室則口鼻俱受非智者通神之法不可爲也

雜方

食主風中心氣風熱手足不遂及風痺不任筋脉五緩恍惚煩躁熊肉二斤切如常法調和作醃腊空肚服之

肘中緩風四肢不收者豉三升水九升煮三升分爲三服日二服亦可酒漬飲之治卒中不得語者豆煎汁如

醫學綱目卷十

七

飴舍之亦可濃者飲之佳

聖治卒中風中不語舌根強硬陳醫五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服又當愈

肘治中風卒不得語以苦酒煮白芥子附頸一周以綿裹之一日夕而瘥

凡治中風莫如續命之類然此可扶持初病若要收全功大艾爲良中風皆因脉道不利血氣閉塞也灸則喚醒脉道而血氣得通故收全功

凡中風續命排風風引竹瀝諸湯及精神丹茵芋酒之類更加以灸無不愈者然此疾積聚之灸非一日所能收皆大劑久而取効唐書載王太后風瘡不語醫者煮黃芪防風湯數斛以薰之得瘥蓋此類也今人服三五盞求効



則責醫也亦速矣孟子曰七年之病必求三年之艾久而後知爾

仲夏後  
中寒補

仲續命湯治中風痲身體不能自收口不能言胃昧不知痛處或拘攣不能轉側

麻黃兩六

桂枝兩二

當歸

人參各一兩

石膏兩四

乾姜

甘草

芫蕪各一兩

杏仁枚十

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治肺風但服不得臥咳逆上氣面目浮腫

解表

瀉治中風外有六經之形証先以加減續命湯隨証治之

麻黃節去

人參

黃芩

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁燻炒去皮

防己

醫學綱目卷十

官桂

防風各一兩

附子炮去皮剉半兩

右除附子杏仁外搗為粗末後入二味令勻每服五錢

水二盞半生姜五片煎至一盞去查稍熱服食前

如無汗惡寒者加麻黃防風杏仁右依本方

加一倍宜針太陽經至陰出血如有汗惡風者加

桂枝芍藥杏仁右依本方加一倍宜針風府已

上二証太陽中風也

如身熱無汗不惡寒者加知母石膏甘草如

身熱有汗不惡寒者加葛根桂枝黃芩右依

本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊

也刺厲兌者瀉陽明之實也已上二証陽明中風也

如無汗身涼者加附子乾姜甘草宜針隱白

去太陰之賊也此一証太陰中風也



如有汗無熱加 桂枝 附子 甘草 若依本方加一倍宜針太溪此一証少陰中風也

如無此四証六經混淆繫于少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜羌活連翹續命湯

小續命湯羌活 四兩 連翹 大兩

右古之續命混殺無經今立分經治療又各分經針刺無不愈也治法宜刺厥陰之井大敦以通其經灸少陽

之經絕骨以引其熱是針灸同象治法之大體也

附雲岐子加減法 如精神恍惚加 茯苓 遠志 如

心煩多驚者加 犀角兩 如骨節間煩庸有熱者去附

子倍芍藥 骨間冷痛者倍用桂枝附子 如燥悶小便

澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服 如臟寒下痢者

去防已黃芩倍附子白朮一兩熱痢不可用附子 如脚弱加牛

入醫學綱目卷

九

膝石斛各一兩 如身疼痛加秦芫一兩 如腰痛加桃

仁杜仲各半兩 如失音加杏仁一兩 如或歌笑語無

所不及者用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無附子防

風生姜有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白朮 春加

麻黃一兩 夏加黃芩七錢 秋加當歸四兩 冬加附

子半兩

內有便溺之阻隔復以三化湯導之

厚朴姜製 大黃 枳實 羌活各等分

右剉如麻豈大每服三兩水三升煎至一升半服之以

微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中

道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然

治病之法不可失于通寒或一氣之微汗或一旬之通

利此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

攻裡

羌活愈風湯療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤及治風濕內弱者是風熱體重也或瘦而一枝偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜而多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生靜則萬病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝保命集云內邪已除外邪已盡當服此藥以行中道諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減服之如覺風動服此不致倒仆

羌活

甘草炙

防風去

黃芪去

蔓荊子

川芎

細辛去

枳殼炒去

人參去

地骨皮

麻黃去

知母去

甘菊

薄荷

枸杞

當歸去

獨活

白芷

杜仲炒去

秦朮去

芍藥去

黃芩

白茯苓記上各兩

肉桂兩

石膏兩

生地

蒼朮各四兩

醫學綱目卷十

十

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去查溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨臥再煎查服俱要食遠服空心嚥下二丹丸謂之重劑臨臥嚥下四白丹謂之輕劑是動以安神靜以清肺 假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則住 如一旬之通利用愈風湯三兩大黃一兩亦勻作四服如煎煎臨臥服之得利為妙常服之藥不可失四時之輔如望春大寒後加半夏柴胡人參各二兩木通四兩此迎而奪少陽之氣也 望夏加石膏黃芩知母各二兩此迎而奪陽明之氣也 季夏之月加防己白朮茯苓各二兩此勝脾上之濕也 秋初大暑後加厚朴藿香各二兩桂一兩此迎而奪太陰之氣也 望冬霜降後加附子官桂各一兩

當歸二兩此勝少陰之氣也 如得春減冬所加藥四時類此此藥治七情六慾四氣無使五臟偏勝及不動于榮衛如風秘服之永不燥結如久瀉服之能自調適初覺風氣便服此藥與局方天麻丸一料相為表裡乃治未病之聖藥也不問男子婦人小兒風癘急慢風等病服之神効

四白丹能清肺氣養魄為中風者多昏員氣不清利也

白朮 白茯苓 人參 砂仁

香附 甘草 防風 川芎各半

白芷 白檀 知母 羌活

薄荷 獨活 細辛 麝香

牛黃 龍腦 藿香 甜竹葉

右為細末煉蜜丸如桐子大每兩作十九臨臥嚼一九

醫學綱目卷十

用愈風湯送下能上清肺氣下強骨髓

二丹丸治健忘養神定志和血內以安神外華膝理

熟地 天冬 丹參 茯苓

甘草 菖蒲 遠志 人參

麥冬 硃砂

右為細末煉蜜丸如桐子大空心用愈風湯送下至六

十九

中風外無六經之形証內無便溺之阻格知為血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮也當以秦朮湯主之

秦朮 石膏 甘草 川芎

當歸 羌活 獨活 防風

黃芩 白芍藥 白芷 白朮



生地 熟地

白茯苓一名一細辛附

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓溫服無時如遇天陰加生姜七八片加心下痞每服一兩加枳實一錢同煎

天府九行榮衛壯筋骨

天麻六兩酒浸三日酒乾

玄參六兩

牛膝六兩酒浸三日焙乾

草薢六兩另炒為末

杜仲七兩剉炒法絲

當歸十兩全用

羌活兩

生地六兩

附子一兩炮

獨活五兩無一

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九丸病大至百丸空心食前溫酒或白湯服忌壅塞失于通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸輕踈之使藥可為用也如素有痰又病中風津液湧溢在胸中氣不利者用獨

痰用法

聖散吐之吐後用利氣瀉火之劑

醫學綱目卷十

五

獨聖散治諸風隔痰諸癩痰涎津液湧溢用芫蒂一兩炒黃色為末每服量虛實新或二錢藥末茶一錢酸薑汁一鍾調下若用吐法須天氣晴明陰晦無用如病卒暴者不拘此法吐時宜辰卯二時故內經云平旦至日中天之陽陽中之陽也若論四時之氣仲景大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣辰卯是其候也故宜早不宜夜先令病人隔夜不食如服藥不吐用熱薑水投之如吐風瀉者加全蝎五分微炒如有重者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花五分立吐虫出如濕腫滿者加赤小荳末一錢此藥不可常用大要辨其虛實實則芫蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑

清熱

潔瀉清丸治中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安臥此  
是風熱煩躁方見治虛寒法

鮮麥雜方

瀘一婦人年六十左癱手足不語涎痰

防風

荆芥

羌活

南星

沒藥

乳香

木通

茯苓

厚朴

桔梗

甘草

麻黃

全蝎

紅花

右作末酒湯下不拘時春脉漸伏以淡鹽湯薑汁每早  
一碗吐五日仍以白朮甘草陳皮厚朴菖蒲一日二貼  
後以川芎山梔豆豉瓜蒂藜蘆粉薑湯吐了用蒼木南  
星生姜半膝茯苓酒糊丸服十日後夜間微汗手足動  
而能言

竹瀝湯治風痺四肢不收心神恍惚不知人不能言方

八寶學綱目卷十

五

患熱風者必先用此以制熱毒

竹瀝

生葛汁

生薑汁

右三味相和溫服分三服平旦日晡夜各一服服訖覺  
四肢有力次進後湯方

竹瀝

生葛汁

芎藭

防已

附子

人參

羚羊角

芍藥

黃芩

甘草

桂心

生薑

石膏

杏仁

麻黃

防風

右十六味咬咀以水七升煎減半納瀝再煮取二升五  
合分三服取汗間五日更服一劑頻服三劑漸覺少損

仍進後方

竹瀝

防風

升麻

羚羊角

防已

桂心

芎藭

麻黃

右八味咬咀以水四升合竹瀝煮取二升半分三服兩日服一劑常用加獨活三兩此方神良頗進三劑若手足冷者加生姜五兩白朮二兩若未除更進後服

竹瀝升一 甘草兩二 人參 芎藭

獨活 升麻各二 防風 麻黃

芍藥各一 羚羊角 生姜 石膏

附子各一 防已 桂心 黃芩

白朮各二

右十七味咬咀以水八升煮減半納瀝煮取二升半分三服相去如行人十里又更服若有氣者加陳皮牛膝五加皮各一兩

凡風痹服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

防已 獨活 秦朮

人參 獨活 卷十一

三

黃芩 芍藥 人參

白朮 茯神 羚羊角 遠志

升麻 石斛 牛膝 五加皮

丹參 甘草 厚朴 天門冬

陳皮 地骨皮 黃芩 桂心各一

乾地黄 杜仲 生姜 麻黃

枳榔 藁本 烏犀角各二 薏苡仁升一

石膏兩六

右三十三味搗篩為粗散和攪勻每服以水三升藥三兩煮取一升綿濾去渣頓服之取汗日服若覺心中熱煩以竹瀝代水煮之

世治卒中風不語桂枝薄辣者去皮一兩懷中藏三箇時辰分三服水煎併進神効



右解表諸方治中風全不能語經所謂甚則不能言者是也

羅犀角防風湯治一切諸風口眼喎斜手足躄拽言語蹇澁四肢麻木皆治之

犀角 防風 甘草 天麻

羌活各一兩 滑石三兩 石膏一兩 麻黃七錢半

獨活 山梔各七錢 荆芥 連翹

當歸 黃芩 全蠍 薄荷

大黃各半兩 桔梗 白木 細辛各四錢

右咬咀每服五錢水二盞生姜十片煎至一盞去渣稍熱服未汗再服如病人臟氣虛則全減大黃

輕骨丹治風癱瘓四肢不隨

苦參 桑白皮 白芷 蒼朮

八寶墨綱卷十

甘松各半兩 川芎各半兩 麻黃去節五升河水五升

右爲末入前麻黃膏和丸如彈子太每服一丸溫酒研化服之臥取汗五七日間再服手足當即輕快卒中涎

潮分利後用之一方有浮萍 風藥聖餅子治半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅盛

及一切風他藥不効者小兒驚風大人頭風婦人血風並治之

川烏生 草烏 麻黃去節各二兩 蒼朮

何首烏 白附子 白姜蚕 川芎各五錢

防風 乾姜各二錢半 雄黃四分 藿香

荆芥各二錢半

右爲末醋糊丸如桐子大捏作餅子嚼碎茶湯送下食

後

世沐浮萍草法并方 不在山兮不在岸採我之時七月  
半一任癰風與瘰癧風些少微風都不算豆淋酒內下三錢  
鐵幘頭上也出汗

本治風半身不遂此方甚妙

川山甲

左癱用左脚  
右癱用右脚

川烏頭

紅海蛤各二兩

右為末每用半兩生葱自然汁調成膏作餅子約一寸  
半左患貼左脚右患貼右脚貼在足掌心內用舊絹片  
緊扎定于密房中無風處椅子上坐用湯一盆將有藥  
脚浸于湯中用小心人扶病人恐汗出不能支持候汗  
出急去藥如汗欲出時身必麻木以汗過遍為妙如未  
効半月後再用一次神妙

世治卒中手足不遂用麥麩五升入烏頭尖一升連麴半

入醫堂綱目卷十一

三

升同餽炊令大熱鋪在席下以手足不遂處臥之令熱氣  
薰蒸候出汗為度日用三次元藥再蒸用之候兩日外別  
用新藥如無烏頭尖只用草烏頭半升不去皮火研作粗  
末亦可

子治半身不遂用蚕沙兩石分作三袋每袋可七斗蒸熱  
一袋着患處如冷再換一袋依前法數數換易百不禁瘥  
止須羊肚釀粳米葱白姜椒豉等煮爛熟喫日食一具十  
日止此方千金不傳

右鮮表方治中風語言蹇澁經所謂志亂不其其言微  
知者是也

通雅

羅中臟治驗○真定府臨濟寺趙僧判子至元八月間患  
中風半身不遂精神昏憤面紅頰赤耳聾鼻塞語言不出  
診其兩手六脉弦數常記紫古有云中臟者多滯九竅中



腑者多着四肢今語言不出耳聾鼻塞精神昏憤是中臟也半身不遂是中腑也此臟腑俱受病先以三化湯一兩內踈二三行散其壅滯使清氣上升充實四肢次與至寶丹加龍骨南星安心定志養神使各臟之氣上升通利九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脈証加減用藥不旬日稍能行步先以繩絡其病脚如履闕或高處得人扶之方可踰也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不用繩絡能行幾步百日大勢皆去戒之慎言語及節飲食一年方愈

子和一衲子因陰雨臥濕地一年手足皆不遂若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久服反加大便澀風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足能舉戴人曰受風濕寒三氣合而為痺水濕得寒而浮畜于皮腠之間久而不去內舍六腑宜用去水之藥可也水濕者人身中之寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

世治中風大便秘者用不蛀皂角燒灰為細末每服一錢水飲調下

行中道  
雜方

本稀簽丸稀簽俗呼火杵草莖葉頗類蒼耳春生苗葉秋初開花秋末結實法于五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實或云秋花成實後和枝取用洗淨曝乾入甌中用酒蜜蒸之九遍焙乾搗篩為細末煉蜜丸如桐子大空心用溫酒或米飲下四五十丸張乘望進表云誰知至賤之中乃有殊常之効臣服至百服眼目清明至于服鬚髮變黑筋骨強健又云甚益元氣療諸疾患備合施



人服無不効

羅正舌散治中風舌強語澁

雄黃研

荆芥各等分

右為末每服二錢用豆淋酒調下

茯神散治証同前

茯神心兩

薄芎焙二兩

蝎梢去毒半錢

右為末每服一二錢温酒調下

本治風在肝脾語澁蹇脚弱大便多秘地黄酒

熟地兩

附子

茵芋

羌活

防風

芎藭各一兩

石斛二兩

丹參二兩

牛蒡根二兩

牛膝

杜仲

桂枝各一兩

大麻子升

右剉入絹袋盛寬貯之用無灰酒一斗九升封漬七日

入醫學綱目卷十

天

逐日空心食前後飲一盞常醺勿令吐

治中風內虛脚弱語蹇防風湯

石斛半兩

地黃

杜仲

丹參

防風

川芎

麥門冬

桂心

獨活各一兩

右為粗末每服五錢水一大盞半棗三枚同煎去渣温

服

治中風入肝脾經四肢不遂舌強語蹇竹瀝湯

歲薑仙

附子

桔梗

防風

蔓荊子

枳殼

川芎

當歸各等分

右為粗末每服四錢水一盞竹瀝半盞生姜四片同煎

至八分去渣温服日三四忌口

治久風邪入肝脾二經言語不轉防已湯

漢防已

防風

桂心

附子各半兩

葳蕤仙三錢

麻黃兩半

右為粗末每服四錢水一盞引子半盞煎七分去渣溫服日三四引子用竹瀝荆瀝地黃汁各一盞生姜汁拌勻用之已上四方龐先生傳審而用之良驗

干獨活煮散治風痺

獨活分八

芎藭

芍藥

茯苓

防風

防已

葛根各六兩

羚羊角

當歸

人參

麥門冬

桂心

石膏各四兩

磁石兩

甘草三兩

白朮五兩

右十六味各切剉分為二十四服每服生姜生地切作一升杏仁二十七枚以水二升煮取七合或日晚或夜中或日一服或間日服

不舉晨昏痰多

安神雜方

羅局方至寶丹治風中臍方見弱方

无

聖保命金丹治中風口眼喎斜手足躄拽言語蹇澁四肢不舉晨昏痰多

貫仲兩一

生地七錢

大黃半兩

青黛

板藍根各三錢

硃砂研

蒲黃

薄芎各二錢半

珠子研

龍腦研各一錢半

麝香研一錢

牛黃半錢研

右為末研和藥勻蜜丸如雞豈大每服一九細嚼茶清送下新汲水亦得如病人嚼不得薄芎湯化下無時此藥墜痰涎大有神効用金箔為衣

活命金丹治中風不語半身不遂肢節痺疼痰涎潮上咽隘不利胸膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

板藍根

貫仲

甘草

乾葛各一錢

桂心 芒硝兩一 大黃半兩 珠子粉

生黃研 青黛 生犀屑 薄荷各五錢

辰砂四錢研一錢為衣 麝香研 龍腦二錢

右為末和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作十九就濕用硃砂再用金箔四十片為衣臘月修合磁器收貯多年不壞如瘡風毒茶清化下鮮毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚風熱病用薄荷湯化下

治痰雜方 海解語丸治中風語言不正

白附子 石菖蒲 遠志 全蝎

羌活 天麻 南星 白姜蚕

右為細末蜜丸如棗荳大服之

經治中風及壅滯旋覆花淨洗搗末煉蜜丸如桐子大夜臥茶湯下五九七九至十九 治中風不語喉中如拽鋸

醫學綱目卷十 三

聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一枚去浮皮却于臍上刺一坑子內入藜蘆陳醋和麪包裏四面用火逼令黃色同搗再研極細生麪為丸如小荳大每服三九溫酒下

運氣 運語澁皆屬風經云厥陰司天風淫所勝民病舌本強是風氣勝也又云厥陰司天主勝則舌難以言是風氣虛也

針灸

靈帝曰刺節言解惑夫子乃言盡知調陰陽補瀉有餘不足相傾移也惑何以解之岐伯曰大風在身血脈偏虛偏虛者不足實者有餘輕重不得傾側宛伏不知東西不知南北乍上乍下乍反乍覆顛倒無常甚于迷惑黃帝曰善取之奈何岐伯曰瀉其有餘補其不足陰陽平復用針若此疾于解惑黃帝曰善刺節真邪論○盡知調陰陽補瀉候面部三候足部三候視其所候之症其脈實者瀉之虛者補之如陽經之脈實陰經之脈虛瀉其陽經補其陰經陰經之脈實陽經之脈虛瀉其陰經補其陽經又如左實右虛瀉左補右右實左虛瀉右補左之類是也



羅灸風中脈口眼喎斜

聽會二穴

頰車二穴

地倉二穴

凡喎向右者為左邊脈中風而緩也宜灸左喎陷中二七壯 凡喎向左者為右邊脈中風而緩也宜灸右喎陷中二七壯艾炷如大麥大

灸風中腑手足不遂等疾

百會一穴

肩髃二穴

曲池二穴

足三里二穴

絕骨二穴

風市二穴

凡覺手足痺或麻或痛良久乃已此將中腑之候宜灸此諸穴病在左灸右在右灸左

灸風中臟氣塞涎上不語極危者下火立効

百會二穴

風池二穴

大椎一穴

肩井二穴

曲池二穴

間使二穴

醫學綱目卷十

三十一

足三里二穴

凡覺心中憤亂神氣不怡或手足麻木此中臟之候也不問是風與氣可速灸此七穴五七壯日後再別灸之隨年壯止凡遇春秋二季可時時灸此七穴以泄風氣

凡人風發怕痛不肯灸忽然卒死是謂何病曰風入臟故也病者不可不知予自五月間口眼喎斜灸百會等三穴即正右手足麻木無力灸百會髮際等七穴得愈七月氣塞涎上不能語魂魄飛揚如墮江湖中頃刻欲絕灸百會

風池等左右頰車二穴氣遂通吐涎半碗又下十餘行伏枕半月遂平復自後凡覺神氣少異于常即灸百會風池等穴無不立効

本范子默記崇寧中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地

倉百會骨髑曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依而用之無不効

羅中風鍼法出寶大師氣元歸類

手太陰 列缺偏風半 天府卒中惡鬼症不得安卧

手陽明 肩髃 曲池偏風半

足陽明 大巨偏枯四肢不舉 衝陽偏風口眼喎斜足緩不收

手太陽 腕骨偏枯 輔陽偏痺不仁

足太陽 照海大風偏枯半身不遂善悲不樂

足少陰 陽陵泉半身不遂 環跳風眩偏風半身不遂

甲痺痿臂腕不用唇吻不收合谷主之 偏枯四肢不舉

善驚大巨主之 偏枯不能行大風默默不知所痛視如

見星溺黃小腹熱咽乾照海主之 偏枯臂腕發痛肘屈

不得伸手又風頭痛汗出肩臂頸痛項急煩滿驚五指掣

不得屈伸戰惕腕骨主之

羅天接經從陽引陰治中風偏枯出雲岐子醫李新說

足太陽膀胱之脉出于至陰小指外側去爪甲如韭葉為

井金呬 足少陰腎之脉湧泉起于小指之下斜趨足心

三 手厥陰心包之脉其直者循中指中衝出爪甲如韭

葉陷中為井其支者別掌中小指次指出其端 手少陽

三焦之脉起小指次指之端去爪甲如韭葉為井三

少陽膽之脉起足竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉為

井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中

三 呼十 足厥陰肝之脉起大敦大指入叢毛之際去爪

甲如韭葉及三毛為井六 呼 手太陰肺之脉起大指之

端出于少商大指內側去爪甲如韭葉為井其支者出次



指內廉出其端 手陽明大腸之脉起大指次指之端入次指內側去爪甲如韭葉爲井呼中指內交呼足陽明胃之脉起足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指出其端呼足太陰脾之脉起足大指端循指內側去爪甲角如韭葉爲井隱白是也呼手少陰心之脉起于小指內出其端循指內廉去爪甲角如韭葉爲井手太陽小腸之脉起于小指之端去爪甲下一分陷中爲井

大接經從陰引陽治中風偏枯

手太陰肺之脉起于少商大指內側去爪甲角如韭葉爲井三呼手陽明大腸之脉起于大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指間出其端足陽明胃之脉起于足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其

入醫學淵覽

卷五

支者入大指間出其端足太陰脾之脉起于大指端循指內側去爪甲如韭葉爲井隱白也手少陰心之脉起于小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉爲井手太陽小腸之脉起于小指之端去爪甲下一分陷中爲井足太陽膀胱之脉起于小指外側至陰去爪甲如韭葉爲井金足少陰腎之脉起于小指之下斜趨足心爲井湧泉穴也手厥陰心包之脈其直者循手中指出其端去爪甲如韭葉爲井中衝穴也其支者循掌中循小指次指出其端手少陽三焦之脉起于小指次指之端去爪甲如韭葉爲井足少陽膽之脉起于竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中足厥陰肝之脉起于大指之端入叢毛之際去爪甲如韭葉爲井大敦也呼



大接經皆十二經井穴也此羅謙甫治趙僧判中臟刺十二井穴愈治張安撫中臟灸十二井穴愈內經所謂留瘦不移節而刺之是也

難陰躡為病陽緩而陰急陽躡為病陰緩而陽急

羅云治失音不語出費大師氣元歸類

手陽明

天鼎暴瘡并

合谷瘡不能言

手少陰

陰郄瘡不能言

靈道暴瘡不語

足陽明

頰車

地倉不語飲食不收水漿瀉落病右治左病左治右

手少陽

支溝暴瘡不語

三陽絡能言

手太陽

天窗暴瘡不語

足少陰

通谷暴瘡不語

手厥陰

間使瘡不能語

玉中風不語不省人事

頂門灸七

百會針入豆許先補後瀉瀉多

醫學綱目卷十

舌

少補

又撮要法

中衝一分大敦灸一分

百會瀉

恠穴又法

十指尖出血此更詳之

玉中風失音

瘡門二分留三呼瀉之不可深

人中三分留三吸瀉之天

突湧泉各五分

神門支溝各三分

如舌急不語瘡門

分二如舌緩不語風府分

東陽卒中失音不能言語緩縱不隨天窓刺之一分灸五十壯息火仍移灸百會五十壯畢復灸天窓五十壯始發

若先灸百會則風氣不得洩內攻五臟喜閉伏仍失音所以先灸天窓

以先灸天窓

壬治風痺不語手足不遂方 度病者男左手女右手小

指內岐間至指端為度以置臍上直望心下以朱塗度上

端畢又作兩度續所塗上合其下開其上取其本度橫置

開上令三合其狀如▽形復以朱塗兩端畢三處同時起  
火灸之各一百壯愈

藥品

河凡覺中風必先審六經之候慎勿用太熱藥烏附之類  
故陽劑剛勝積若燎原為消狂瘡腫之屬則天癸絕而榮  
涸矣

羅云中風人初覺不宜服腦麝恐引風入骨髓如油入麪  
不能得出如潮痰盛不省人事煩熱者宜用下痰神効

鑿云中風如小便不利不可以藥利之既已自汗則津液  
外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈盛  
當候熱退汗至小便自行也

丹治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻  
黃令人不得慮虛以風邪不得汗則不能泄也然此治中  
風不汗者為宜若自汗者更用麻黃則津液轉脫反為大

八醫學綱目卷十

三

害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至于不住發搐口眼瞤  
動遍身汗出者豈勝對治此時獨活湯續命散能復榮  
衛却風邪不可缺也獨活續命散方見痰癆條

干治中風無密室者不可療強人居室不密尚中風邪况  
服藥之人乎服汗劑必依此法

再寒則筋急熱則筋緩緩因于弛長縮因于短促若受濕  
則弛弛因于寬而長然寒與濕未嘗不挾熱三者皆因于  
濕然外濕非內濕無以啓之不能成疾致濕之由酒麪為  
多魚與肉繼以成之若甘滑燒炙香辛硬物皆致濕之因  
戒之慎之藥中肯綮矣若將理失宜雖聖醫不治也天  
產作陽氣浮發熱先哲格言但是患痿之人若不能淡薄  
食味吾知其必不能安全也丹溪斷辨病為痿凡人初覺食指  
次指麻木不仁或不用者三年內必中風之候也宜先服



診

愈風湯天麻丸各一兩料此治之先也是以聖人治未病不治已病 中風人能食蓋甲已化土脾盛故能多食此脾愈盛下克腎水腎水虧則病增宜廣服藥不欲多食病能自愈 中風多食風木盛也盛則克脾脾受敵求助于食經曰實則夢與虛則夢取當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其養矣

肺脉微緩為痿痺偏風頭已下汗出不可止 全大見治虛實法

脾脉微緩為風痿四肢不用心慧然若無病 同 經云

蓋風痿即風辨之類

素胃脉沉鼓濇胃外鼓大心脉小堅急皆偏枯男子發

左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖三歲起

年不滿二十者三歲死 大奇論王註云從謂男發左女發右也

玄中風不語者為病在心臟脉反沉者治難見効凡病脉

不應病者危

不應病者危

丹脉訣內言不治証見則不可治筋枯不治動則筋痛者

是謂筋枯以其無血滋潤筋骨也

產後中風

丹產後中風口眼喎斜必用大補氣血然後治痰當以左

右手脉分其氣血多少以治切不可作中風治用小續命

湯及發表治風之藥

雲治產後中風半身手足不遂言語蹇澁恍惚多忘精神

不定

獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

玄參

天麻 各五錢

桂心 三錢

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺効更作一劑又作九每服二十九如有執加葛根五錢有冷加二

虛



木五錢 若有氣症加生姜一兩半若手足不遂加牛膝一錢半草薢三錢黃芪四錢 若腹痛加當歸芍藥七錢半 若不食加人參五錢玄參一兩 若寒中三陰所患必冷小續命湯加姜煎 若暑中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷煎 保血氣湯治產後諸風痿攣無力

秦朮

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

當歸

白朮

茯苓

熟地各等分

右爲末一半蜜丸一半散酒調下五七十九妙

食治產後風虛五緩六急手足頑痺氣血不調大芫二升炒令熟熟投三升酒中密封飲之

小品治產後中風語澁四肢拘急羌活三兩爲末每服五

醫學綱目卷一

七

錢水酒各半盞煎去查溫服

右產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以

四物四君子相與各半停對分兩服之可也

口噤中倒之初有口噤者故附之

實開闕法

丹口噤搐鼻用薺金黎蘆爲末水調搗之 治口噤卒不得語附子杵末內管中吹喉中立安 千金翼云吹喉中恐是吹鼻中

經治急中風目瞋牙噤無門下藥者用此末子以中指蘸

末措大牙左右二三十遍其口自開始得下藥名開關散

天南星搗爲末白龍腦二件各等分研五月五日午時脩

治者只一字至半錢効涎盛者吐之

吐痰法

簡治中風口噤涎潮壅塞吐涎方用皂角一挺去皮塗猪

脂炙黃爲末每服一錢七非時溫酒服如氣實脈盛調二

錢七如牙不開用白梅搯齒口開卽灌藥吐出風涎瘥

本治中風不省人事牙關緊急用藜蘆一兩去蘆濃煎防風湯洗過焙乾切炒微黃褐色搗末每半錢溫水下以吐涎為效如人行三里許未吐再服

羅分涎散治中風涎潮作聲口噤手足搐搦

藿香 全蝎炒 白附子 南星炮各兩

丹砂 膩粉 粉霜各二兩

右為細末每服一錢七至二錢薄苛湯或茶湯調下未

吐利再服

虛

衍黃芪防風湯薰法方見中深半身不遂門

世治中風口噤不知人事產後中風用白朮四兩水三升煎一升頓服

大白木酒治妊娠中風口噤語言不得

白朮 獨活兩 黑荳炒一

醫學綱目卷十

夫

右剉以酒三升煮取一升半去渣溫分四服口噤者幹開灌之得汗即愈

子治中風通身冷口噤不知人事用獨活四兩好酒一升煎半升分溫再服

破傷風口噤見破傷風門

針灸

人中風口噤不開 人中四分 頰車四分得氣即瀉

焦又法 人中 頰車透地倉一分 百會一分 承漿三分

東口噤不開唇吻不收瘡不能言 合谷 人中

甲口噤不能言翳風主之

口眼喎斜

凡半身不遂者必口眼喎斜亦有無半身不遂之症而喎斜者故另立附之

運氣口眼喎斜者多屬胃土風木不及金乘之土寡于畏也經云木不及曰委和委和之紀其動緩戾拘緩又云厥陰所至為縵蓋縵縮短也木不及則金化縮短乘之以勝木之條達也戾者口目喎斜也拘者筋脉拘強也木為金之縮短牽引而喎斜拘強也緩者筋脉縱也木為金乘則土寡于畏故土兼化緩縱于其空隙而拘緩者自緩也故目喎斜者多屬胃土有痰治法宜辛溫瀉金之短縮平土之濕痰也

恒清陽湯治筋脉縮短牽引口目喎斜方見後

孟中賊風口偏不能語者取吳茱萸一升清酒一升和者四五沸合服之半升日三服得少汗瘥  
于治口喎大葶三升炒令焦好酒三升淋取汁頓服一日一服

不醫字綱卷十

羌

治中風面目相引口偏着耳牙車急舌不得轉方

獨活兩

竹瀝

生地汁各一

右三味合煎取二升頓服即愈

治卒中風口喎不正取空青末如葶大一枚含之即愈

口目喎斜之症大率在胃而有筋脉之分 經云足之陽

明手之太陽筋急則口目為僻腎急不能卒視此胃土之筋為喎邪也 經云胃足陽明之脉挾口環唇所生病者

口喎唇邪此胃土之脉為喎邪也

恒清陽湯治口喎斜頰腮急緊胃中火盛汗不止而小便

數

升麻二錢

葛根半錢

當歸身二錢

黃芩二錢

甘草錢一

紅花錢

蘇木五分

桂枝錢

甘草生五分

黃栢酒一錢

胃土



右吹咀作一服酒三盞煎至一盞三分去查稍熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎筋急者是筋脉血絡中大寒此藥少代燔針劫刺破惡血以去凝結內泄衝脉之火熾

羅風中血脈治驗○大尉中武史公年六十八歲于至元十月初侍國師於聖安寺丈室中煤炭火一爐在左邊遂覺面熱左頰微有汗師及左右諸人皆出因左頰踈緩被風寒客之右頰急口喎于右脉得浮緊按之洪緩予舉醫學提舉忽君吉甫專科針灸先以左頰上灸地倉穴一七壯次灸頰車二七壯後于右頰上執手熨之議以升麻湯加防風秦艽白芷桂枝發散風寒數服而愈或曰世醫多以續命等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰足陽明經起于鼻交頰中循鼻外入上齒中手陽明之經

醫學綱目卷一

甲

亦貫于下齒中况兩頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香白芷又行手陽明之經秦艽治口噤防風散風邪桂枝實表而固榮衛使邪不能再傷此其理也夫病有標本經絡之別藥有氣味厚薄之殊察病之源用藥之宜其効如桴鼓之應不明經絡所過不言藥性所主徒執一方不惟無益而又害之者多矣學者宜細思之

秦艽升麻湯治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘急惡風寒

升麻

乾根

甘草炙

芍藥

人參各半

秦艽

白芷

防風

桂枝各三錢

右吹咀每服一兩水二盞連鬚葱根白三莖煎至一盞去查稍熱服食後服藥畢避風寒臥得微汗出則止

丹婁舍人口眼喎斜先自右邊牙疼

防風分五

南星錢一

桂枝分三

半夏分五

蒼朮分五

甘草分二

白朮半錢

茯苓分三

右煎後入姜汁一合服

本治風客陽經邪傷腠理背脊強直口眼喎斜體執惡寒痰厥頭痛肉瞶筋惕辛頰鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭痛眩暈如坐車船常服解風邪傷寒辟霧露瘴氣爽慧神志諸風不生定風餅子

天麻

川烏

南星

半夏

川姜

川芎

白茯苓

甘草生各等分

右為細末姜汁為丸如龍眼大作餅子硃砂為衣每服一餅細嚼熟姜湯下不拘候熙豐間王丞相常服預防風疾神驗

八醫學綱目卷十

聖

枳茹酒主口僻眼急大驗諸藥不瘥方枳實上青括取末欲至心止得茹五升微火炒去濕氣以酒一斗漬微火煖令得藥味隨性飲之

子和東杞一夫患口目喎斜其兩手急數如弦之張有力而實其人壯氣充風火交勝與調胃承氣湯六兩以水四升煎作三升分作四服令稍熱啜之前後約瀉四五次行去一兩次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬而愈脉訣云熱則生風

筋牽牽法

內經治口眼喎斜多屬足陽明筋病蓋足陽明筋結頰上得寒則急得熱則弛左寒右熱則左頰筋急牽引右之弛者而右隨急牽引喎向左也右寒左熱則右頰筋急牽引左之弛者而左隨急牽引喎向右也故其治法以火灸且為之膏油熨其急者以白酒調和桂朮塗其弛者又以桑

為鈞鈞其舌吻之喎僻處使正平而高下相等復以水調生桑灰千鈞柄之坎縫處連頰塗之以收其弛兼飲姜酒散美肉使筋脉氣和以助外之塗熨不飲酒者自強其筋骨以手拊拍其急處使症自去也詳見筋門

子又方

牡礪

附子

礬石

竈下黄土

右四味各等分為末取三年雄鷄冠血和藥傳其上持鏡看候欲復故便急洗去之不速去便過不復還也千金

謂真云偏左塗右偏右塗左

又方酒煮桂取汁一升以故布浸搗病上則正左喎斜搗右右喎斜搗左此秘方不傳余常用大効此方即內經用酒桂塗法也又方大皂莢一兩去皮子搗篩以三年石灰末水和左喎塗右右喎塗左乾又塗之

醫學綱目卷一

里

取硬石灰一合以醋炒和如泥于患偏風牽口喎斜人口唇上不患處一邊塗之立便牽正

孫卒患偏風口喎語澁取衣中白魚糜耳下喎向左摩右

向右摩左即正即鱖魚青

聖治中風口喎用巴莖七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以暖水一盞安向手心頻曳即便正洗去藥并頻抽掣中指

針灸

子和一長吏病口目喎斜予療之目之斜灸以承泣口之喎灸以地倉俱効苟不効者當灸人迎夫氣虛風入而為

偏上不得出下不得泄真氣為氣邪所陷故宜灸所以立

愈按此乃麻熱喎斜故灸之愈若筋急喎斜非灸可愈必用服藥及用蠟針劫刺其急處或用馬膏塗法可愈故

承泣地倉人迎皆足陽明陽明胃脉之所發也

玉口眼喎斜

地倉針入二分沿皮斜向頰車一寸半留十吸瀉之

頰車二分斜向



地倉巴上二穴闊右  
補瀉左闊左補瀉右

甲乙口僻顛窮及斷交下關主之 面目惡風寒頓腫癰  
痛招搖視瞻瘦瘵口僻巨窮主之 口不能水漿啗僻水  
溝主之 厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不能收舌不  
能言不能嚼大迎主之 口僻偏歷主之 口僻刺太淵  
引而下之 口僻繫外關主之 僻不正失欠口不開翳  
風主之

壬又方以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麩塞密  
勿令泄風一頭納大荳一顆并艾燒令然灸七壯即瘥患  
右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

癢

凡中風多有痒甚不收者故縮此附之于後與前中風方  
相兼用之可也

大醫學綱卷十

三

血虛

丹經曰諸痒為虛血不榮肌膚所以癢也當以滋補藥以  
養陰血血和肌潤痒自不作矣 治身上虛癢四物加黃  
芩煎湯調浮萍末服之 治諸痒如虫行此虛也先與大  
料四物湯服之 益一斗水一石煎減半溫浴三次能治  
一切風痒秘要 諸痒凌霄花末酒下一二錢此花補陰血  
甚速本草云凌霄治執風身痒遊  
風風疹痧血蒼耳葉同用也

氣虛

陶安人身體肥壯久患癢痒自投風藥漸成虛症身上麻  
木無力口苦乾小便數

白朮錢二

陳皮

芍藥

黃芩雨一

茯苓錢七

歸身

黃芪

人參

川芎

青皮

蒼朮

木通錢五

黃柏酒炒

五味子

甘草錢二

每服下黃精丸三十九

靈虛邪搏於皮膚之間其氣外發腠理開毫毛搖氣往來行則為痒刺節真邪篇

丹何首烏散治渾身風寒濕痒

何首烏炒鹽

天麻

枸杞

生地

熟地各一兩

防風

川芎

薄荷

訶子

甘草各半兩

右為末每服二三錢溫酒空心服溫茶亦得

集治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷末等分為末酒調

一錢七日三服 又方治風氣客于皮膚瘙痒不已蜂房

炙過蟬蛻等分為末酒調一錢七日二三服

局消風散治皮膚頑麻癢疹瘡痒

茯苓

川芎

羌活

人參

荆芥穗

防風

藿香

蟬蛻

不醫學綱目卷七

器

白姜蚕絲炒去

甘草炒各二兩

厚朴

陳皮各半兩

右為末每服二錢茶酒調下

經治風癢痒不止枳殼三兩麩炒微黃去穢為末每服二

錢非時水一盞煎至六分去查服

聖治婦人癢疹身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅為末

頭淋酒調服一錢七

丹治一切痒食羊蹄根不宜多

河痒得爬而解者爬為火化微則亦能痒甚則痒去者謂

令皮膚辛辣而屬金化辛能散火故金化見則火化解矣

聖治風癢癢疹偏身痒成瘡者用蚕沙一升水二斗煮取

一斗二升去查熱洗宜避風 羅澡洗藥治一切諸風及偏身癢痒光澤皮膚

乾荷葉三十歲蠶仙十五

藁本一斤

零陵香一斤

雜方

熱

茅香兩

甘松

白芷各半

右為粗末每用二兩生絹袋盛水二桶約四斗煎五沸  
放熱於無風處淋瀝洗之避風少時如水少時便添熱  
湯斟酌得所勿添冷水不添藥末浴痒無如鹽濃煎  
湯最妙

診

匣寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛  
緩則為中風邪氣中經則身痒而癢疹心氣不足邪氣入  
中則胸滿而短氣脉緩而大浮為風虛大為氣強風氣  
相搏大成癢疹身為痒痒者名泄風又為痲癩



杭州圖書館