

本草備

卷二

要

藥部

薄荷 輕宣散風熱

辛能散涼能清

本經溫蓋體溫而用涼也

升浮能發汗搜肝氣而抑肺盛

消散風熱清利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口氣語澇

舌胎 含漱

眼耳咽喉口齒諸病

辛香通竅而散風熱

皮膚癩疹癰瘡疥

驚熱

凡小兒治驚藥俱宜薄荷湯調

骨蒸破血止痢

能治血痢血病在凝滯辛能散涼能清 虛

人不宜多服

能發汗疎表夏月多服泄人元氣

蘇產氣芳者良

薄荷猫之酒也犬虎

之酒也蜈蚣雞之酒也桑椹鳩之酒也莽草魚之酒也食之皆醉被猫傷者薄荷汁塗之

雞蘇

一名水蘇一名龍腦薄荷輕宣散熱理血

辛而微溫清肺下氣理血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血

痢吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病

局方有龍腦雞蘇丸

方莖中虛似

蘇葉而微長密齒面皺氣甚辛烈

木賊 輕發汗退目翳

溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形性亦能發汗解肌升散火

鬱風溼入足厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜翳乃肝邪鬱遏

不能上通於目及疝痛脫肛腸風痔瘻赤痢崩中諸血病

浮萍 輕發汗利溼

辛散輕浮入肺經達皮膚能發揚邪汗丹溪曰浮萍發汗甚於麻黃止癢

癢消渴 搗汁服生於水又能下水氣利小便治一切風溼癰瘻

浮萍一味蜜丸酒服治三十六種風濃煮汁浴治惡疾瘡癩徧身 燒烟辟蚊 紫背者良

蒼耳子 一名葇耳 卽詩卷耳輕發汗散風溼

甘苦性温善發汗散風溼上通腦頂下行足膝外達皮膚治

頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣痺痛癩瘡疥采根葉熬名萬應膏徧身瘙

癢作浴湯佳

去刺酒拌蒸忌猪肉聖惠方云葉搗汁治產後痢

天麻宣祛風

辛温入肝經氣分益氣強陰通血脈強筋力疎痰氣治諸風

眩掉頭旋眼黑語言不遂風溼痛音頑痺小兒驚癇諸風眩掉皆屬肝木

肝病不能榮筋故見前證天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸疾自瘳血液衰少及類中風者

忌用風藥能燥血故也昂按風藥中須兼養血藥制其燥也養血藥或兼搜風藥宣其滯也古云治風先治血血行

滅風自根類黃瓜莖名赤箭有風不動無風反搖一名定風

草明亮堅實者佳溼紙包煨熟切片酒浸一宿焙用

本草綱目卷之...

秦艽 宜去寒溼

苦燥溼辛散風去腸胃之熱益肝膽之氣養血榮筋風藥中 潤劑散

藥中 補劑 治風寒溼痺經曰風寒溼三氣雜至合而為痺風勝為

則體重在脈則血滯在筋則行痺寒勝為痛痺溼勝為著痺痺在於骨

拘攣在肉則不仁在皮則寒 通身變急血不榮筋 虛勞骨蒸時珍

足陽明經藥兼入肝膽陽明有溼則手足痠痛寒熱有熱則

日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦艽柴胡各一兩甘草

五錢為末每服三錢治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦 疸黃酒

芫炙甘草各一兩每服一二錢錢乙加薄荷五錢 毒腸風瀉血口噤身痛齒下齟屬手陽明大腸經張潔古溼

勝風淫之證利大小便牛乳點服兼治 黃疸煩渴便赤 形作羅紋相交長

大黃白左紋者良菖蒲為使畏牛乳

豨薟草 宜去風溼

苦辛生寒熟溫治肝腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛腰膝無力
風溼瘡瘍若痺痛由脾腎兩虛陰血不足不由風溼而得者

忌服

風藥能燥血

江東人呼豬為豨其草似豬豨臭故名

唐成訥有

進豨豨表宋張詠進豨豨表云其草金稜銀線素莖紫莖對節而生頗同蒼耳臣喫百服眼目清明即至千服鬚髮烏黑筋力輕健效驗多端以五月五日六月六日七月七日九月九日採者

尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸曬九次蜜丸甚益元氣

豨豨

辛苦氣寒故必蒸曬九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁未盡則不能透骨搜風而卻病也搗汁熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三味收之酒調服尤

妙

威靈仙

宣行氣祛風

辛泄氣鹹泄水本草苦元素甘氣溫屬木其性善走能宣疏五臟通

行十二經絡治中風痛風頭風頑痺溼熱流於肢節之間腫屬溼痛屬熱汗多屬風

麻屬氣虛木屬溼痰死血十指麻木亦是胃中有溼痰死血

脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬寒宜辛溫藥久痛屬

熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順

氣清痰搜風散溼養血去瘀為要威靈仙傳曰一人手足不

遂數十年遇新羅僧曰得一藥可治癥瘕積聚痰水宿膿黃

入山求之乃威靈仙也服之而愈

疽浮腫大小腸秘風溼痰氣一切冷痛性極快利積疴不痊

者服之有捷效然疎泄真氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎治

諸骨哽 根叢鬚數百條長者二尺餘色深黑俗名鐵腳威

靈仙忌茗麪湯

釣藤鉤 宣除風熱定驚

甘微苦寒除心熱平肝風治大人頭旋目眩小兒驚啼瘰癧

音熾縱筋急而縮為瘰筋緩而弛為癱伸縮不已為瘰癧俗謂之搖搦是也

客忤胎風發斑疹主

肝風相火之病風靜火息則諸證自除

相火散行於膽三焦心包

有刺

類釣鉤藤細多鉤者良

純用鉤其功加倍

久煎則無力

茵芋

宜去風溼

辛苦微温有小毒治風溼拘攣痺痛

時珍曰古方治風癩有茵芋丸治風痺有茵芋

酒治產後風有茵芋膏風溼諸證多用之茵芋石南莽草皆

治風妙品近世罕知莽草辛溼有毒治頭風癰腫乳癰疔瘻

蘇頌曰古方風溼諸酒多用之今人取葉煎

湯熱含治身蟲喉痹甚效甄權曰不入湯

莖赤葉如石

榴而短厚莖炙用

當歸

補血潤燥滑腸

甘温和血辛温散內寒苦温助心散寒諸血屬心凡通脈者必先補心當歸苦温

助心入心肝脾心生血肝藏血脾統血為血中之氣藥治虛勞寒熱欬逆

上氣血和則氣降温瘧厥陰肝邪澀痢便血曰澀頭痛腰痛心腹諸痛散寒和氣

風痙無汗痙音擎上聲身強項直角弓反張曰痙無汗為剛痙者以脫血無以養筋也宜十全大補湯痿痺癱瘓筋骨緩縱足不任地曰痿風寒溼客於肌肉血脈曰瘳血

凝氣聚按之堅硬曰癥雖堅硬而聚散無常曰瘕尙未至癥也癰疽瘡瘍衝脈為病氣逆裏

急帶脈為病腹痛腰溶溶如坐水中衝脈起於腎下出於氣街挾臍上行至胸中上

顛顛滲諸陽灌諸經下行入足滲三陰灌諸絡為十二經脈之海主血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈及婦人

諸不足一切血證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚養血

生肌血旺則肉長排膿止痛血和則痛止然滑大腸瀉者忌用當歸為君白芍

君白芍

為臣地黃為佐芎藭為使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃耆血熱佐以條芩梔連血積佐以大黃牽牛昂按血屬陰四物能養陰陰得其養則血自生非四物能生血也若氣虛血弱之人當用人參取陽旺生陰血之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者

使氣血各有所歸故名

血滯能通血虛能補血枯能潤血亂能撫

蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而不流全活血而不走雷斅海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾通治全用一定之理也

川產力剛善攻秦產

力柔善補以秦產頭圓尾多肥潤氣香者良名馬尾當歸尾

粗堅枯者名鑿頭當歸只宜發散用治血酒製有痰薑製昂按

當歸非治痰藥

薑製亦臆說耳

畏薑蒲海藻生薑惡溼麩

芎藭

補血潤燥宣行氣搜風

辛溫升浮為少陽引經膽入手足厥陰氣分心包乃血中氣

藥助清陽而開諸鬱

丹溪曰氣升則鬱自降為通陰陽血氣之使

潤肝燥而補肝

虛

肝以瀉為補所謂辛以散之辛以補之

上行頭目下行血海

衝脈搜風散瘀止

痛調經治風溼在頭血虛頭痛

能引血下行頭痛必用之加各引經藥太陽羌活陽明白

芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛

腹痛脇風氣鬱血鬱

溼瀉血痢寒痺筋攣目淚多涕

肝熱風木為病

諸風眩掉皆屬肝木及癰

疽瘡瘍

癰從六腑生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣為陽血為陰血行脈中氣行脈外相並周流寒溼搏之則

凝滯而行遲為不及火熱搏之則沸騰而行速為太過氣鬱邪入血中為陰滯於陽血鬱邪入氣中為陽滯於陰致生惡

毒然百病皆由此起也芎歸能和血行氣而通陰陽

男婦一切血證然香竄辛散能走

泄真氣單服久服令人暴亡

單服則臟有偏勝久服則過劑生邪故有此失若有配合節制

則不至此矣昂按芍地酸寒為陰芎歸辛溫為陽故四物取其相濟以行血藥之滯耳川芎辛散豈能生血者乎治法云

驗胎法婦人過經三月用川芎末空心熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動者是經閉

蜀產為川芎

秦產為西芎江南為撫芎以川產大塊裏白不油辛甘者勝

白芷為使畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸

白芍 補血瀉肝瀉斂陰

苦酸微寒入肝脾血分為手足太陰行經藥 瀉肝火 酸斂

以斂為瀉 安脾肺固腠理 肺主皮毛脾主肌肉肝木不尅土 以散為補 則脾安土旺能生金則肺安脾和

肺安則腠理固矣 和血脈收陰氣斂逆氣 散惡血利小便 斂陰

小便自利非 緩中止痛 東垣曰經曰損其肝 益氣除煩斂汗 通行之謂也 者緩其中即調血也

安胎補勞退熱治瀉痢後重 能除胃 脾虛腹痛 瀉痢俱太陰 病不可缺此

寒瀉冷痛忌用虞大民曰白芍不惟治血虛大能行氣古方 治腹痛用白芍四錢甘草二錢名芍藥甘草湯蓋腹痛因營

本草精要 白芍 卷一 部

氣不從逆於肉裏白芍能行營氣甘草能斂逆氣又痛為肝

木剋脾土白芍能伐肝故也。天民又曰白芍止治血虛腹

痛餘不治以其酸寒收斂無溫散之功也心痞脇痛

脇者肝膽二經往來之道其收斂無溫散之功也

脇痛白芍能肺脹喘噫同癰腫疝瘕其收降之體又能入血

理中瀉肝衝脈為血海而至厥陰肝治鼻衄音女六切目澀肝血不

海男女皆有之而治鼻衄音女六切目澀肝血不

足退火益陰婦人胎產及一切血病又曰產後忌用丹溪曰

寒伐生發之氣也必不得已酒炒用之可耳時珍曰產後肝

血已虛不可更瀉也寇氏曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥

古人猶諄諄告戒况大苦大寒可肆行而莫之忌耶○同白

朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芍芩瀉肝同甘草止腹

痛同黃連止瀉痢同防風發痘證同薑棗溫經散溼赤芍藥主治略同尤能瀉肝火

散惡血治腹痛堅積血痺疝瘕邪聚外腎為經閉腸風癰腫

疝腹內為瘕

目赤皆散瀉之功白補而收赤散而瀉白益脾能於土中瀉水赤

散惡血治腹痛堅積血痺疝瘕

疝腹內為瘕

目赤皆散瀉之功白補而收赤散而瀉白益脾能於土中瀉水赤

散邪能行血中之滯產後俱忌用 赤白各隨花色單瓣者

入藥酒炒用制其寒 婦人血分醋炒下痢後重不炒惡芒硝石

斛畏鱉甲小薊反藜蘆

生地黃 大瀉火

甘苦大寒入心腎瀉丙火 小腸為丙火心與小腸相表裏導赤散與木通同用 清燥金

胃大消痰通經平諸血逆治吐衄崩中 唾血者血隨唾出咯血者隨痰咯出或帶

血絲出腎經及肺經自兩脇逆上吐出者屬肝經衄血者血溢於腦從鼻而出欬血者欬出痰內有血並屬肺經吐出嘔

出成盆成碗者屬胃經經漏不止曰崩血熱則傷寒陽強痘妄行宜以此涼之虛人忌用用乾地黃可也

證大熱 痘證用之甚多本草未載 多服損胃 生掘鮮者搗汁飲之或用

酒製則不傷胃生則寒乾則涼熟則温 故分為三條以便施用

本草綱要 生地黃 乾地黃

乾地黃 補陰涼血

甘苦而寒沉陰而降入手足少陰心厥陰及手太陽經

小腸滋陰退陽生血涼血治血虛發熱經曰陰虛生內熱勞傷欬嗽

陰虛者地黃丸為要藥亦能除痰丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除痿痺驚

悸有觸而心動曰驚無驚而自動曰悸即怔忡也有因心虛火動者有因肝虛膽怯者有因水停心下者火畏水故悸

也地黃能交心腎而益肝膽亦能行水故治之吐衄尿血痛為血淋不痛為尿血由心腎氣結或憂思房勞所致

致多屬虛寒不可專作熱治血運崩中經曰陰虛陽搏謂之崩足下熱痛折跌絕筋

生地一斤瓜薑糟一斤生薑四兩炒熟罨傷折處冷則易之又生地汁三升酒升半煮服下撲損瘀血填骨髓

長肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹急痛海上方

麩作飢食能利出蟲忌用鹽本草匯曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性凝滯若胃虛氣弱

之人過服歸地等劑反致痞悶飲食減少變證百出至死不
悟豈不惜哉大抵血虛固不可專補其氣而氣虛亦不可徒
補其血也凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛以
四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯
江浙生者南

方陽氣力微北方生者純陰力大以懷慶肥大菊花心者良
酒製則上行外行薑製則不沉膈惡貝母畏蕪荑忌萊菔蔥
蒜銅鐵器得酒門冬丹皮當歸良

熟地黃 平補肝腎養血滋陰

甘而微溫入手足少陰厥陰經滋腎水補真陰填骨髓生精

血聰耳明目 耳為腎竅目為肝竅目得血而能視耳得血而能聰 黑髮烏髭治勞傷風

痹胎產百病為補血之上劑 丹溪曰產前當清熱養血為主產後宜大補氣血為主雖有雜

證從末治之昂按丹溪產後大補氣血一語誠至當不易之
論後人不善用之多有風寒未解瘀血未盡妄施峻補反致

本草黃芩
熟地黃
何首烏
丹溪
本草

大害者不可不察王碩云男子多
陰虛宜熟地女子多血熱宜生地
以好酒拌砂仁末浸蒸

曬九次用地黃性寒得酒與火與日則溫性泥得砂仁則和氣且能引入丹田六味丸用之為君尺脈弱者加

桂附所謂益火之原以消陰翳也尺脈旺者加知藥所謂壯水之主以制陽光也

何首烏 平補肝腎瀦精

苦堅腎溫補肝甘益血瀦收斂精氣添精益髓養血祛風治風

先治血血活則風散強筋骨烏髭髮故名首烏令人有子為滋補良藥氣血

太和則勞瘦風虛崩帶瘡痔瘰癧癰腫諸病自己營血調則癰腫消赤

者外呼止惡瘡益陰補肝瘡疾要藥而本草不言治瘡時珍曰不寒不燥功在地黃天冬諸藥之上

二種夜則籐交一名交籐有陰陽交合之象赤雄

人氣分以大如拳五瓣者良三百年者大如栲

栳服之成地仙凡使赤白各半
泔浸竹刀刮皮切片用黑豆

與首烏拌勻鋪柳甑入砂鍋九
蒸九曬用茯苓為使忌諸血

無鱗魚萊菔蔥蒜鐵器

唐時有何首烏者祖名能嗣父名延秀能嗣五十八尚無妻子服此藥七

日而思人道娶妻連生數子延秀服之壽百六十歲首烏又

服之壽百三十歲髮猶烏黑李翱為立何首烏傳然流傳雖

久服者尚少明嘉靖初方士邵應節進七寶美髯丹世宗服

之連生皇子遂盛行於世方用赤白首烏各一斤黑豆拌九

蒸曬茯苓半斤乳拌當歸枸杞菟絲各半斤俱酒浸牛膝半

斤酒浸同首烏第七次蒸至第九次破故紙四兩黑脂麻炒

蜜丸並忌鐵器昂按地黃何首烏皆君藥也故六味丸以地

黃為君七寶丹以何首烏為君各有配合未可同類而共施

也即有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏

加入地黃丸中合兩方而為一方是一藥二君安所適從乎

失製方之本義也

牡丹皮 瀉伏火而補血

本草綱目卷之九 丹部 牡丹皮 瀉伏火而補血

辛甘微寒入手足少陰腎厥陰肝心包瀉血中伏火色丹故入血分時珍

曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃蘗治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸用之

和血涼血

而生血血熱則枯涼則生破積血積瘀不去則新血不生通經脈為吐衄必用

之藥血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅治中風五勞驚癇瘵筋脈伸縮抽掣為瘵

癱或手足抽掣口眼喎斜卒然眩仆吐涎身軟時發時止為癇皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致除煩熱

療癰瘡涼血下胞胎退無汗之骨蒸張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精

為神故心藏神單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母菴

絲大黃忌蒜胡荽伏磁時珍曰花白者補赤者利人所罕悟宜分別之

續斷補肝腎理筋骨

續斷補肝腎理筋骨

續斷補肝腎理筋骨

苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中補不足

經疏云味甘故然

暖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎漏懷妊瀝血崩帶遺

精腸風血痢

是齋方平胃散一兩川續斷二錢半每服二錢米飲下治時痢亦驗

癰痔腫毒又

主金瘡折跌

以功命名

止痛生肌外科需為上劑川產良

狀如雞腳皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃為

便

骨碎補

補腎治折傷

苦溫補腎故治耳鳴

耳鳴必由腎虛

及腎虛久瀉

研末入豬腎煨熟空心食之腎主二

便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

以功命名粥和樽傷處經曰腎者胃之關也

前陰利水後陰利穀

牙痛

炒黑為末擦牙嚥下亦良

又入厥陰

心包

能破血止血入血

行傷故治折傷
粥和末裏傷處

根似薑而扁長去毛用或蜜拌蒸

益母草

一名茺蔚通行瘀血生新血

辛微苦寒入手足厥陰

肝心包

消水行血去瘀生新調經解毒

瘀血去則經調

治血風血運血痛血淋胎痛產難崩中帶下

帶脈橫於腰間

病生於此故名為帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升降血虛者養血滋陰而兼調氣

為經產良藥

消疔腫乳癰

亦取其散瘀解毒

通大小便然辛散之藥瞳子散大者

忌服

益母子主治略同調經益精明目

血滯病目者則宜之

活血順

氣逐風

氣行則血行血活則風散

行中有補治心煩頭痛

血虛血熱之候

胎產帶

崩令人有子

有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血

分風熱明目調經用子為良蓋根莖花葉專於行子則行中有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖

葉花實爲末蜜丸治胎產百病近效方搗汁熬膏亦良

忌鐵子微炒用

澤蘭

通行血消水

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰脾通九竅利

關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫防已治

產後血瀝腰痛瘀行吐血鼻血目痛頭風癰毒撲損補而不

滯行而不峻爲女科要藥古方澤蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭一

類二種俱生下溼紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但

以莖圓節長葉光有歧者爲蘭草莖微方節短葉有毛者爲

澤蘭嫩時並可按音而佩之楚詞所謂紉秋蘭以爲佩是也

朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥溼不變方可刈刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人呼

本草備要
為香草俗名孩兒菊

夏曰采置髮中則髮不腫浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭

蘭草走氣

分故能利水道除痰癖殺蠱辟惡而為消渴良藥

經曰數食肥甘傳為

消渴治之以蘭除陳氣也

澤蘭走血分故能消水腫塗癰毒破瘀除癥而

為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防已為使

寇宗奭朱丹溪並以蘭草

為山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭葉甘寒清

肺開胃消痰利水解鬱調經閩產者力勝○閩產為勝則是

建蘭矣○李士材云蘭葉稟金水之氣故入肺臟東垣方中

嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時

珍又謂東垣所用乃蘭草也其集諸家之言曰陳遜齋閑覽

云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以

澤蘭為下今之種種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止

齋著盜蘭說以譏之○既名幽蘭正合騷經矣○方虛谷訂

蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂

蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得蘭名楊升菴云

世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣也久矣又吳草廬有蘭說

云蘭為醫經上品有根有莖草之植者也今所謂蘭無枝無

莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草溺於流俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其種盛於閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭為蘭何以惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷紉佩以為證竊謂紉佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈真露可飲而英可餐乎又云製芰荷以為衣集芙蓉以為裳豈真芰荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭無疑也然離騷不嘗曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延竚乎不又曰疏石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列之梅菊之前今反屈於孩兒菊之下以為盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品擯棄不錄何其不幸若斯之甚也本草殺蠱之藥良多皆未必有驗至於行水消痰固山蘭之葉力所優為者也蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂併騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思若以為一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤

本草傳要 卷一
蘭止為中品乎况一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特二類一種且四種一類矣而以為九畹之受誣豈理也哉蓋本經言澤蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生於深山窮谷故也寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以諮多識之士

白微 瀉血熱

苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身熱支滿

忽忽不知人 陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼血厥 汗出過

陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此證宜白微 熱淋温瘡

湯白微當歸各一兩參五錢甘草錢半每服五錢 熱淋温瘡

洗洗寒熱酸痛 寒熱作則營氣不 婦人傷中淋露 血熱千金

胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服丹溪曰此即河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也廷孔

女人溺 產虛煩嘔 仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方

孔也 少而其源起於真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則血自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等

藥 似牛膝而短小柔輒去 鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸

棗

艾葉 宜理氣血燥逐寒溼

苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二經走三

陰 太 理氣血逐寒溼暖子宮止諸血溫中開鬱調經安胎

胎動腰痛下血膠艾湯良 阿膠艾葉煎服亦治虛痢 治吐血崩帶 治帶要藥 腹痛冷痢霍亂

轉筋 皆理氣血逐寒溼之效 殺蛇治癰 醋煎外科有用乾艾作湯投白礬二三錢洗瘡然後傳藥者蓋

人血氣冷必假艾力以佐 以之灸 音九 火能透諸經而治百病

本草摘要 艾葉 延胡索 草一節

血熱為病者禁用

灸火則氣下行入藥則熱上衝不可過劑
○丹田氣弱臍腹冷者以熟艾裝袋兜臍

腹甚妙寒溼腳氣亦宜以此夾入襪內

陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用

入茯苓數片同研則易細

煎服宜鮮者苦

酒醋

香附為使

艾附丸調婦人諸病宋時重湯陰艾自明成化來則以蘄州艾為勝云灸酒壘一灸便透

蒙竝發明並以野艾為真蘄艾雖香實非艾種

延胡索

宜活血利氣

辛苦而溫入手足太陰

肺脾厥陰心包

經能行血中氣滯氣中

血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外諸痛

通則癥瘕不痛

崩淋月候不調

氣血不和因而疑滯不以時至

產後血運暴血上衝折傷積

血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫走而不守

獨用力

補氣 通經墜胎血熱氣虛者禁用 根如半夏肉黃小而堅

者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花 古名紅藍花通行血潤燥

辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血

瘀行則血活有熱結於中暴吐紫黑血者吐出為好

吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行

潤燥消腫止痛

凡血熱血瘀則作腫作痛

治經

閉便難血運口噤胎死腹中

非活血行血不能下

瘡瘡血熱

本草不言治痘 喉

痹不通又能入心經生新血

須兼補益藥為佐使

俗用染紅併作胭

脂

胭脂活血解毒疔挑破以油胭脂傅之良

少用養血多則行血過用能使血

行不止而斃

血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與相類故治血病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花

數十斤煮湯寢婦於上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

茜草 通行血

色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血本經入厥陰血分

心包 能行血止血能行故能止消瘀通消瘀通經酒煎一兩

治風痺黃疸疸有五黃疸穀疸酒疸黃疸汗疸女勞疸此蓋蓄

不可以溼熱例治當用四物知藥壯其崩運撲損痔瘻瘡癩

血少者忌用 根可染絳忌鐵

紫草 瀉血熱滑腸

甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血活血利九竅通二便鹹寒

治心腹邪氣即熱水腫五疸癰癤惡瘡血熱及痘瘡血熱毒

盛二便閉滯者血熱則毒閉得紫草涼之則血行而毒出大

實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽瀉者氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者

忌用 去頭鬚酒洗

凌霄花 一名紫葳瀉血熱

甘酸而寒入厥陰血分心包能去血中伏火破血去瘀主產

乳餘疾崩帶癥瘕腸結不大血閉淋瀝風痒血熱生風之證

女科多用孕婦忌之本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也○肺癰有用之為君藥者凌霄花為

末和蜜陀僧唾調傅酒澀甚驗 篠生花開五瓣黃赤有黠不可近鼻聞傷

腦

大小薊 瀉涼血

甘溫大明曰涼皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女子赤白

沃安胎涼血之功小薊力微能破瘀生新保精養血退熱補虛不

能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦結熱血淋本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汁

服立兩薊相似花如髻大薊莖高而葉皺小薊莖低而葉

不皺皆用根

三七一名山漆瀉散瘀定痛

甘苦微温散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰腫醋磨塗即

散已破者為末摻之為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心杖後傳之去瘀消腫易愈大抵

陽明厥陰血分之藥故治血病此藥近時始出軍中恃之從廣西山洞來

者略似白芨地黃有節味微甘頗似人參以未摻豬血啣血

化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖存恭稜夏秋用黃花處加金絲盤紐可愛而氣不香根

大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七治
金瘡折傷血病甚效與南中來者不同

地榆 瀉止血

苦酸微寒性沉而瀉

本草未嘗言瀉然能收汗止血皆酸斂之功也

入下焦除血熱

治吐衄崩中

血虛禁用

腸風

血鮮者為腸風隨感而見也血瘀者為臟毒積久而發也糞前為近血出

腸胃糞後為遠血出肺肝

血痢

蘇頌曰古方斷下多用之寇宗奭曰虛寒瀉痢及初起者忌用○蘇頌著本草圖經

似柳根外黑裏紅取上截炒黑用梢皮行血得髮良惡麥

冬

蒲黃

生滑行血炒瀉止血

甘平厥陰血分藥

心包肝

生用性滑行血消瘀通經脈利小便

祛心腹膀胱寒熱

同五靈脂治心腹血氣痛名失笑散

療撲打損傷瘡癰諸腫

本草綱目
婦舌脹滿口以蒲黃類摻比曉乃愈宋度宗舌脹滿口御
醫用蒲黃乾薑末等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之涼血
活血可知矣蓋舌為心苗心包相火
乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也
炒黑性瀉止一切血崩

帶泄精 香蒲花中蕊屑湯成入藥

卷栢 生用破血炙用止血

生用辛平破血通經治癥瘕淋結炙用辛溫止血治腸風脫

肛 生石上拳擣如雞足俗呼萬年松凡使鹽水煮半日并

水煮半日焙用

藺茹 瀉破血

辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥蟲除熱痺破癥瘕
內經同烏鰂骨

治婦人 根如菜菔皮黃肉白葉長微闊折之有汁結實如豆

一顆三粒甘草為使

菴藹子

瀉行水散血

苦辛微寒

別錄微溫

入肝經血分行水散血散中有補治陽痿經

澀腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃剝折傷

撲打方多用之

能制蛇

見之則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗苳蕒為使

鬱金

宣行氣解鬱瀉泄血破瘀

辛苦氣寒純陽之品其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經

涼心熱散肝鬱下氣破血

行滯氣亦不損正氣破瘀血亦能生新血

治吐衄尿血

婦人經脈逆行

經不下行上為吐衄諸證用鬱金末加韭汁薑汁童便服其血自清痰中帶血者加竹瀝

血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心

顛多喜笑尚知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫

能制證屬有餘此病多因驚憂瘀血塞於心竅所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸鬱金入心散惡血明礬化頑痰故也痘毒入心鬱金一兩甘草二錢半煮乾焙研末冰片五分每用一錢加豬血五七滴新汲水下治班痘始有白泡忽搖入腹紫黑無膿下蠱毒同升麻服不吐則下出川廣體銳圓如蟬

肚外黃內赤色鮮微香味苦帶甘者真

市人多以薑黃為之

薑黃

瀉破血行氣

苦辛

本草大寒藏器大明曰熱

色黃入脾兼入肝經理血中之氣下氣破

血除風消腫功力烈於鬱金治氣脹血積產後敗血攻心通

月經療撲損片子者能入手臂治風寒溼痺

血虛臂痛者勿用時珍曰人臂

治痛其兼理血

出川廣

陳藏器曰鬱金苦寒色赤薑黃辛溫色黃莖味苦色青三物不同所

中之氣可知

用各別經疏曰薑黃王治介乎三稜鬱金之間時珍曰薑黃

參金或應形大用大各目行且參金入小專台血薑黃人

脾兼治血中之氣莖入肝治氣中之血稍為不同今時以屬
如乾薑者為片子薑黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可染色
莖形雖似鬱金

而色不黃也

莖莖

瀉破血行氣消積

辛苦氣溫入肝經血分破氣中之血

能通肝經聚血

消痰通經開胃

化食解毒止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚炫癖

酒醋磨服

腹積疝癖多見於男子癥瘕多見於婦人莖莖香烈行氣通
竅同三稜用治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起臍上至
心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息賁在右脇脾積曰痞氣
在胃脘右側腎積曰奔豚在小腹上至心下治之不宜專用

下藥恐損真氣宜於破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能
磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也衰其大半

而止過者死東垣五積方用三稜莖莖兼人參贊助成功
按治積諸藥神麴麥芽化穀食萊菔麩麩食礱砂阿魏山查

化肉食紫蘇化魚蟹毒葛花根根消酒積麝香消酒積果積
芫花牽牛大戟行水飲三稜莖莖鱉甲消癥瘕木香檳榔行

氣滯礫石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積大黃芒硝
雖為泄劑亦

攻熱積雄黃膩粉攻涎積虻蟲水蛭攻血積
能益氣王好古曰故治氣短不能接續大小
根如生薑莪

生根下似卵不齊堅硬難搗灰火煨透乘熱搗之入氣或醋

磨酒磨或者煮熟用入血

荆三稜瀉行氣破血消積

苦平色白屬金皮黑肉白入肺金血分破血中之氣亦通肝兼入

脾經散一切血瘀氣結瘡硬食停老塊堅積乃堅者削之從

氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良昔有人患癥瘕死遺言

開腹取之得病塊如石文理五色削成刀柄因砍三稜柄消

成水乃知此藥可療癥瘕消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻虛者慎

用色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麪裏煨

白茅根

瀉火補中止血止嘔

甘寒入手少陰心足太陰陽明

脾胃

補中益氣除伏熱消瘀血

利小便解酒毒治吐衄諸血

心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄血茅根甘和血寒涼

血引火下降故治之撲損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

血閉寒熱

血瘀則閉閉淋則寒熱作矣

瀝崩中

血熱則崩

傷寒嘔逆

即呃逆說文曰嘔氣梧也東垣作乾嘔之甚者未是

肺熱喘急

內熱煩渴黃疸水腫

清火行水時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事苦寒之劑傷沖和之氣烏足

知此哉

茅鉞潰癰瘡

酒煮服一鉞潰一孔二鉞潰二孔

蘆根

瀉熱止嘔

甘益胃寒降火治嘔噦反胃

胃熱火升則嘔逆食不下金匱方蘆根煎服

消渴客

熱傷寒內熱止小便數

肺為水之上源脾氣散精上歸於肺始能通調水道下輸膀胱腎為水臟

本草

白茅根

蘆根

薔薇根

草

部

而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣 能解魚蟹河豚毒 取逆水肥厚者去鬚節用

芋根 瀉熱散瘀

甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾大渴大狂胎動

下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金瘡拆傷 止血雞湯下魚骨魚湯下

魚骨 搗如龍眼雞骨雞汁能化血為水芋皮與產婦作枕

止血運安腹上止產後腹痛 散瘀之功 漚芋汁療消渴

薔薇根 瀉溼熱

苦澆而冷入胃大腸經除風熱溼熱生肌殺蟲治泄痢消渴

牙痛口糜 煎汁 遺尿好眠癰疽瘡癬 花有黃白紅紫數色

以黃心白色粉紅者入藥子名營實酸溫主治略同千金日薔薇根

角蒿口瘡之神藥角蒿所在多有開淡紅紫花角微彎長二寸許辛苦有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡

芭蕉根 瀉熱

味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹並搗汁服塗癰腫結

熱為末油調傅霜後者佳

大黃 大瀉血分溼熱下有形積滯

大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃心包肝血分其性浮

而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分仲景太陽門調

胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣

在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或日赤喉痺頭痛膈上熱疾生也 用以蕩滌腸胃

芭蕉根卷二大黃 草部

下燥結而除痰熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之譫音古

溫熱瘡瘡下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚積久成形謂之

積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣留飲宿食心腹痞滿二便不

通皆土鬱奪之吐血衄血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏

火行水除痰蝕膿消腫能推陳致新然傷元氣而耗陰血下

亡若病在氣分胃虛血弱人禁臞病在氣分而用之是為誅伐無過東垣曰能推陳致

新如定禍亂以致太平所以有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾

胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之輒者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之溼熱非瀉心也病發於陰而反下之

則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生腫脹是已病發於

陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘故大瀉胸

陽氣皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也

在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問
心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足
亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不
足肝肺各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰
之主肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣
寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之李
士材曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深微蓋濁
陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦

紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩爲使

欲取通利

者不得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳
夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調傅止痛無癢

黃芩 瀉火除溼

苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家溼熱治癖痢腹痛

便血

寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰溼之不同寒宜
溫熱宜清虛宜補實宜下食宜消導瘀血宜行散痰溼宜化
痰利溼痛時手不可按者爲寒熱往來
實痛按之痛止者爲虛痛
寒熱往來 邪在少陽
黃疸五淋血閉

本草部

實熱在血分 氣逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰 丹溪以黃芩降痰假其降火也按痰因火

動當先 利水解渴安胎 胎孕宜清熱涼血血不妄行則胎安 養陰退陽補膀胱

水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣 肺主氣熱傷氣瀉熱所以保肺 治上焦之

風熱溼熱 丹溪曰黃芩上中二焦藥 火嗽喉腥 五臭肺為腥 目赤腫痛過服損

胃血虛寒中者禁用 得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得白朮安胎

之聖藥時珍曰仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽證下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒入

心瀉熱除脾家溼熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽證雖在半表半

裏而心膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦

少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱身如火燎煩躁引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉黃

明者良中虛名枯芩卽片芩瀉肺火清肌表之熱內實名條

芩卽子芩瀉大腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝膽火豬膽汁

炒山茱龍骨爲使畏丹皮丹砂

黃連 瀉火燥溼

大苦大寒入心瀉火 王海藏曰瀉心實瀉 鎮肝涼血 凡治血

上部之使黃連爲中部 脾也實則瀉其子 除煩益肝膽 治消渴

厚腸胃消心痰 能去心 止盜汗 涼 治腸澼瀉痢 便血曰澼有

鬱而爲痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同人參煎湯呷 之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內

首用辛涼以解表次用苦寒以攻裏機要云後重宜下腹痛 宜和身重宜除溼脈弦宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜

溫膿血稠黏宜重劑以竭之下痢赤屬血分白屬氣分戴氏 曰俗謂赤熱白寒者非也通作溼熱處治但有新久虛實之

分痞滿燥溼開鬱仲景治九種心腹痛清熱心痛伏梁積目痛

皆傷人乳浸點或合歸芍等分煎湯熱洗散熱活血癰疽瘡疥諸痛癢瘡皆屬心火酒毒胎毒

小兒初生合甘草傳信方羊肝一具黃連一兩搗定驚

為末蜜調令嚙之九凡是目疾皆治名羊肝丸

鎖止汗解毒除疳同猪肚蒸為丸殺虵虵得苦則伏虛寒為病者禁用久服

黃連苦參反熱從火化也昂按炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且苦寒沉陰肅殺伐傷生和之氣也韓愈曰黃連與肉桂同行能交心腎於頃刻時珍曰治痢用香連丸薑連丸用黃連乾薑薑黃散用黃連生薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡

用黃連細辛止下血用黃連大蒜一陰一陽寒因熱用熱因寒用最得製方之妙 出宣州者且肥

出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良去毛治心火生用虛火

醋炒肝膽火豬膽汁炒上焦火酒炒有吞酸嘈雜等證亦有吐酸者名酢心宜黃連

吳茱萸降火中焦火薑汁炒下焦火鹽水或童便炒食積火

黃土炒治溼熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引導蓋辛熱制其寒苦鹹寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨為

使惡菊花元參殭蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌豬肉時珍曰方有藏連丸

黃連豬肚九豈忌肉而殺烏頭巴豆毒黃連瀉心火佐以龍膽瀉肝膽火白芍瀉脾火石膏

瀉胃火知母瀉腎火黃蘗瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉肺火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝膽火黃連佐

之瀉三焦火黃芩佐之鄭奠一曰熱鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分甚效

胡黃連 瀉熱療驚疳

苦寒去心熱益肝膽厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱心窩手

三消渴而多飲為上消肺熱也心移熱於肺傳為膈消是也多食善飢為中消胃熱也癰成為消中是也渴而小便

數有膏為下消腎熱而水虧也五痔此痔牡痔脈痔腸痔血痔溼熱下流傷

本草精要 胡黃連卷二苦參

温瘧瀉痢女人胎蒸消果子積爲小兒驚疳良藥

朱二允曰解吃烟毒

合茶服之甚效

性味功用同黃連故名出波斯國今秦隴南海亦

有之心黑外黃折之塵出如烟者眞畏惡同黃連

苦參

瀉火燥溼補陰

苦燥溼寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝膽安五臟

溼熱去則血氣

和平而五臟自安

利九竅生津止渴明目止淚

淚爲肝熱

治温病血痢

純下

清血者風傷肝也宜散風涼血下如豆汁者溼傷脾也宜清熱滲溼

腸風溺赤黃疸酒毒熱生

風溼生蟲又能祛風逐水殺蟲治大腸疥癩然大苦大寒肝

腎虛而無熱者勿服

張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝爲患經曰五

味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天

之由也玉水註曰氣會不已則藏有扁勞扁勞則藏有扁勞

故令人暴天筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心元參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補藥能醫病不能養人食能養人不能醫病

腥氣蒸用元參為使惡貝母菟絲子漏盧反藜盧苦參一兩或酒煎或

醋煮能吐天行時毒

知母 瀉火補水潤燥滑腸

辛苦寒滑上清肺金而瀉火瀉胃熱膀胱邪下潤腎燥而滋

陰入二經氣分黃蘗入二經血分故消痰定嗽止渴安胎非

清火治傷寒煩熱募勞產骨蒸退有汗燥渴虛煩久瘧下痢

治嗽者清肺火也治渴者清胃熱也退骨蒸者瀉腎火也利二便消浮腫小便利則腫消東垣曰熱在上

焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜
用滲溼之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便閉而
不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃蘗知
母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪
曰小便不通有熱有溼有氣結於下宜清宜燥宜升又有隔
二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺
熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾溼不運而精不上
升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃蘗知
母之類清肺車前茯苓之類燥脾二朮之類
昂按凡病皆有隔二隔三之治不獨便閉也然苦寒傷胃而

滑腸多服令人瀉

李士材曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其滋陰施之虛損之人則如水益深矣

特表出以爲戒

得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

龍膽草

瀉肝膽火下焦溼熱

大苦大寒沉陰下行益肝膽而瀉火

相火寄於肝膽有瀉無補瀉其邪熱即所以補

之兼入膀胱腎經除下焦之溼熱與防已同功酒浸亦能

行上行治骨間寒熱腎主驚癩邪氣肝經時氣溫熱熱痢疽

黃寒溼脚氣足傷溼熱則成脚氣腫而痛者為溼脚氣宜清熱利溼搜風又有攣縮枯細痛而不腫者名乾

脚氣宜養血潤燥咽喉風熱赤睛努肉瀉肝膽火能明目元素曰柴胡為主龍膽為使日疾要藥

昂按若日疾初起宜發散忌用寒涼癰疽瘡疥過服損胃 甘草水浸一宿曝

用小豆貫衆為使忌地黄

青黛瀉肝散鬱火

鹹寒色青瀉肝散五臟鬱火解中下焦蓄蘊風熱衍義曰一婦患臍腹

二陰徧生溼瘡熱癢而痛出黃汁二便澀用鰻鱧松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦發風之物乃用馬

齒莧四兩研爛入青黛一兩和塗熱痛皆去仍服入正散而愈此中下焦蓄蘊風熱毒氣若不出當作腸風內痔婦不能

禁酒物果仍發痔治傷寒發斑吐咯血痢陰虛火炎者忌用合杏仁研置柿餅中煨食名聖餅

本草蒲葇 青黛卷二大青 牽牛 臣 草 部

子治 咯血 小兒驚癇疳熱丹熱傳癰瘡蛇犬毒 卽靛花取嬌碧

者水飛淨用 內多石灰 故須淘淨

大青 瀉心胃熱毒

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱在陽毒發斑 熱甚 傷血

裏實表虛則發斑輕如疹子重如錦紋紫黑者熱極 而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有犀角大青湯 黃疸熱

痢丹毒喉痹 處處有之高二三尺莖圓葉長葉對節生入

月開小紅花成簇實大如椒色赤用莖葉

牽牛 大瀉氣分溼熱

辛熱有毒屬火善走入肺經瀉氣分之溼熱 肺主氣火能 平金而泄肺能

達右腎命門走精隧通下焦鬱遏及大腸風秘氣秘利大小

便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿瘰癧氣塊若溼熱在血

分胃弱氣虛人禁用東垣曰索牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉乃瀉氣之

藥比諸辛藥泄氣尤甚若溼從下受下焦主血血中之溼宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣

血俱損也王好古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥結服硝黃藥

則若罔知如此三十餘年其人體肥膏梁而多鬱日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下潤腸

腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不能入氣故無效用牽牛為末阜角膏丸纔服便通外甥素多酒色病二便不通脹痛

呻吟七晝夜用通利藥不效予言此乃溼熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀

胱也用棟實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破故紙

諸藥深得補瀉兼施之妙有黑白二種黑者力速亦名黑丑取子淘去浮者

春去皮用得木香乾薑良此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

防已 通行水瀉下焦血分溼熱

大苦大寒 本經平別錄温 太陽經藥 膀胱 能行十二經通腠理利九竅

瀉下焦血分溼熱為療風水之要藥治肺氣喘嗽 水溼熱氣諸

癩 降氣下痰 溼瘡脚氣 足傷寒溼為脚氣寒溼鬱而為熱溼則腫熱則痛防已為主藥溼加苡仁蒼朮木瓜

木通熱加荅藁風加羌活葶藶痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛

連臂加桂枝威靈仙痛連脇加膽草又 有足跟痛者屬腎虛不與脚氣同論 水腫風腫癰腫惡瘡

或溼熱流入十二經致二陰不通者非此不可然性險而健

陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用 十劑曰通可去滯通草防已之屬是也通草即木通

是徐之才亦以行水者為通與燥劑無以別矣木通甘淡瀉氣分溼熱防已苦寒瀉血分溼熱 ○本集以行水為通劑改

熱藥為 出莫中根大而虛通心有花紋色黃名漢防已

點黃腥木強者名木防已不佳陳藏器曰治風用木防已治水用漢防已酒洗用

惡細辛畏葶藶

葶藶 大瀉氣秘通行水

辛苦大寒屬火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣贖急者

非此不能除破積聚癥結伏留熱氣消腫除痰止嗽定喘水

泛溢為腫脹為痰嗽為喘滿 通經利便久服令人虛十劑曰洩可去閉葶藶大黃之屬是也大

黃泄陰分血閉葶藶泄陽分氣閉氣味俱厚不減大黃然有甜苦二種甜者性緩苦者性急泄肺而傷胃宜大棗輔之仲

景有葶藶大棗瀉肺湯治肺氣喘急不得臥昂按輔以大棗補土所以制水 子如黍米微長色

黃合糯米微炒去米用得酒良榆皮為使

甘遂 大通瀉經隧水溼

苦寒有毒能瀉腎經及隧道水溼直達水氣所結之處以攻

決為用為下水之聖藥

仲景大陷胸湯用之

主十二種水大腹腫滿

水名

蠱喻嘉言曰腎為水穀之海五臟六腑之源脾不能散胃之
水精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病於上
腎不能司胃之關時其輸泄而病於下以致積水浸淫無所
底止○腎者胃之關也前陰利水後陰利穀○王好古曰水
者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭面中
四肢下腰腳外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之
別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按水腫有痰裹
食積瘀血致清不升濁不降而成者有溼熱相生隧道阻塞
而成者有燥熱沖擊秘結不通而成者證屬有餘有服寒涼
傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小
便不通水液妄行脾莫能制而成者證屬不足宜分別治之
然其源多由中氣不足而起丹溪曰水病當以健脾為主使
脾實而氣運則水自行宜參苓為君視
所挾證加減苟徒用利水藥多致不救
痰迷顛癩虛者忌用
皮赤肉白根作連珠重實者良麴裏

煨熟用或用水如墨以清為度再麩裏煨瓜蒂為使惡遠志反甘

草仲景治心下留飲與甘草同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘遂末傅腫處濃煎甘草湯服之其腫

立消二物相反感應如此

大戟 大瀉通臟腑水溼

苦寒有毒能瀉臟腑水溼行血發汗利大小便治十二水腹

滿急痛積聚癥瘕頸腋癰腫風毒腳腫通經墮胎誤服損真

氣時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到人心則迷成癲癩入肺則塞竅為欬喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入

經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癩癧癰腫

陳無擇並以控涎丹主之殊有奇效此乃治痰之本痰之本

水也溼也得氣與火則結為痰大戟能泄臟腑水溼甘遂能

功也又曰錢仲陽謂腎為真水有補無瀉復云痘證變黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則臟自不實腑者膀

胱也百祥為大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非獨瀉腑
乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青緣肝膽之色
也痘證毒盛火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津液內
竭不能化膿而成黑陷之證瀉其風火之毒所以救腎扶脾
也昂按瀉心乃所以補心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰
復矣機要用大戟一兩棗三枚同煮焙乾去戟用棗丸服名
棗變百祥丸

大棗則不損脾畏菖蒲反甘草

商陸 大通行水

苦寒有毒 諸家 辛酸 時珍 苦寒 沉陰下行與大戟甘遂同功療水腫脹

滿 腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猶行如單脹而不腫者名蠱脹

為木橫剋土難治腫脹朝寬暮急為血虛暮寬朝急為氣
虛朝暮俱急為氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者吉由
四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治 瘦

疝癰腫喉痺不通 薄切醋炒 溼熱之病瀉蠱毒傳惡瘡墮胎

孕令人見鬼神取花白者根赤者傷人只堪貼臍入麝三分搗貼小便利則腫消黑豆

湯浸蒸用得蒜良

芫花 大通行水

苦寒有毒去水飲痰癖療五水在五臟皮膚脹滿喘急痛引

胸脇欬嗽瘡瘡

五水者風水皮水正水石水黃汗也水積胸中堅滿如石名石水汗如藥汁名黃汗久不

愈必致癰膿時珍曰伸景治傷寒太陽證表未解心下有水而欬乾嘔發熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從兩便出內經所謂潔淨府去陳莖法也十棗湯芫花甘草遂大戟等分棗十枚

葉似柳二

月開花紫碧色葉生花落陳久者良醋煮過水浸曝用根療

疥可毒魚反甘草

鬪訟者取葉擦皮膚輒作赤腫假傷以誣人

蕘花 大通行水

辛散結苦洩熱行水捷藥主治略同莞花

澤漆 通行水

辛苦微寒消痰退熱止嗽殺蟲利大小腸治大腹水腫益丈

夫陰氣 生平澤葉圓黃綠頗類貓睛一名貓兒眼睛草莖

中有白汁粘人 時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類耳

常山 宣吐痰截瘧通行水

辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲 痰有六風痰寒痰溼痰熱痰食痰氣

痰也飲有五流于肺為支飲于肝為懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也常山力能吐之下之 專治

諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用 時珍曰常山蜀漆劫痰截瘧

陽分之後用之瘡有經瘡臙瘡風寒暑溼痰食瘴鬼之別須
分陰陽虛實不可槩論常山蜀漆得甘草則吐得大黃則利
得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則
入肺得龍骨附子則入腎得草菓檳榔則入脾蓋無痰不作
瘡一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生
用多用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每
見奇功未見其或吐也世人泥于雷敷老人久病忌服之說
使良藥見疑沉痾難起抑何愚也○常山吐瘡痰瓜蒂吐熱
痰烏附尖吐溼痰萊服
子吐氣痰藜蘆吐風痰

雞骨者良酒浸蒸或炒用栝樓為

使忌蔥茗莖葉名蜀漆功用略同古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結甘

草水拌蒸

藜蘆 宣引吐

辛寒至苦有毒入口即吐善通頂令人噫風癩證多用之張

和日一婦病風癩初一二年一作後漸日作甚至一日數作
求死而已值歲大飢采百草食見野草若蔥采蒸飽食覺不

本草綱目卷之六 藜蘆 木通卷二 草部

本草傳要
安吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常
人以所食蔥訪人乃熬蔥苗即藜蘆是矣李時珍曰和王妃
年七十中風不省牙關緊閉先考太醫吏日月池翁診視藥
不得入不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣遂吐
痰而甦藥不瞑眩
厥疾不瘳誠然
取根去頭用黃連爲使反細辛芍藥諸

參惡大黃畏蔥白

吐者服蔥湯即止

木通 古名通草輕通行水瀉小腸火

甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱

心火降則肺熱清矣

化津液

肺爲水源

肺熱清則津液

下通大小腸膀胱導諸溼熱由小便出

故導赤散用之

凡利小便者多不利大便以小水愈通
大便愈燥也木通能入大腸兼通大便

通利九竅血脈關節

治胸中煩熱偏身拘痛

楊仁齋云偏身隱熱疼痛拘急足冷皆伏熱傷血血屬于心宜木通以通

心竅則經絡流行也

大渴引飲

中焦

淋瀝不通

下焦火心與小腸相表裏心移熱于小腸則淋

秘水腫浮大利小耳聾泄腎火目眩口燥舌乾舌為心苗喉痺咽

痛火炎上焦鼻鼈音壅熱壅清道失音清脾熱好眠脾主四肢倦則好眠心為

脾母心熱清除煩退熱止痛排膿破血催生行經下乳火不亢于

內氣順血行故經汗多者禁用東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受

溼熱癰閉約束則小便不通宜此治之○寒水太陽膀胱也

○朱二允曰火在上則口燥眼赤鼻乾在中則心煩嘔噦浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而下降矣○君火宜

木通相火宜澤瀉利故通水雖同所用各別竅籐有細孔兩頭皆通故通

通草古名通脫木輕通利水退熱

色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行而利小

便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁治五淋水腫目

本草綱目 通草 澤瀉 籐 竅

昏耳聾鼻塞夫音

淡通竅寒降火利肺氣

退熱催生

澤瀉

通利水瀉膀胱火

甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功專利溼行水治

消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞腳氣疝痛淋瀝陰汗

陰間有汗尿

血洩精

既利水而又止洩精何也此乃溼熱為病不為虛滑者言也虛滑則當用補澀之藥

溼熱之病

溼熱既除則清氣上行又能養五臟益氣力起陰氣補虛損

止頭旋有聰耳明目之功

脾胃有溼熱則頭重耳鳴目昏滲去其溼則熱亦隨去土乃得令而

清氣上行故本經列之上品云聰耳明目而六味丸用之今人多以昏目疑之

多服昏目

小便過利而腎水虛

眼中有水屬膀胱過利則水涸而火生仲景八味丸用冠宗奭謂其接引桂附入腎經李時珍曰非接引也乃

膀胱之邪氣也古人用補藥必兼瀉邪邪去則補藥闔一闢此乃玄妙後人不知此理專一手補必致偏

勝之患矣王履曰地黃山茱萸丹皮皆腎經藥桂附右腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎爲真水有補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏雷之邪耳○脾喜燥腎惡燥故兼補爲難○易老云去胷中雷垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼山藥之瀉茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神奇所以爲古今不易之良方也卽有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加入有補無瀉且客倍于主責成不專而六味之功且退處于虛位失製方配合之本旨矣此近世庸師之誤也

鹽水拌或酒

浸用忌鐵

車前子

通行水瀉熱涼血

甘寒涼血去熱止吐衄消癥瘕明目通淋

凡利水之劑多損于目惟此能解肝

與小腸之熱溼熱退而目清矣雷斅曰使葉勿使莖蕊

子甘寒清肺肝風熱滲膀胱

溼熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有子腎

二竅車前子能利水竅而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用之枸杞菟絲各八兩五味覆盆各四兩車前二兩蜜丸慣

遺洩者車前易蓮子時珍曰人服食須佐他藥如六味丸之用澤瀉可也若單用則過瀉治溼痺五淋暑

溼瀉痢歐陽文忠患暴下國醫不能愈夫人云市有藥三文一貼甚效公不肯服夫人雜他藥進之一服而愈問

其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而不動氣水道利則清濁分穀臟自止矣目赤障翳能

肝熱催生下胎 酒蒸搗餅焙研酒蒸搗餅入滋補藥炒研入利水泄瀉藥

燈草輕通利水清熱

甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸心與小腸相表裏心火清則肺熱小腸亦

清而熱從小便出矣通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉痺塗乳止夜嘔

擦癬最良縛成把擦摩極癢時蟲從草出浮水可見十餘次則能斷也

瞿麥 通利水破血

苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥

故入正散用之五淋大抵

皆屬溼熱熱淋宜入正及山梔滑石之類血淋宜小薊牛膝

膏腎虛淋宜補腎不可獨瀉老人氣虛者宜參朮兼木通山

梔亦有痰滯中焦作淋者宜行痰破血利竅決癰消腫明目

兼通利藥最忌發汗汗之必便血

去翳通經墮胎性利善下虛者慎用

寇宗奭曰心經雖有熱而小腸虛者服之則心

熱未清而小腸別作病矣

花大如錢紅白斑爛色甚斌媚俗呼洛陽花

用蕊殼丹皮為使惡螻蛄

產後淋當去血瞿麥蒲黃皆為要藥

扁蓄 一名扁竹通淋

苦平殺蟲疥利小便治黃疸熱淋虻咬腹痛蟲蝕下部 煮服

葉細如竹弱莖蔓引促節有粉三月開紅花

本草綱目 瞿麥卷二 扁蓄 天仙籐 地膚子 草部

天仙籐

通活血消腫

苦温疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫

有天仙籐散專治水腫

葉似

葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋

一云即青木香籐

地膚子

通利水補陰

甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋

時珍曰無陰則

陽無以化亦猶東垣利小便不通用知藥滋腎之意王節齋曰小便不通或頻數古方多以爲寒而用温澀之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數也故老人多頻數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪爲主而佐以收澀之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之澀之治其標也

治癩疔散惡瘡

煎湯洗瘡疥良

葉作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除雀盲澀痛

葉如蒿莖

赤子類蠶砂惡蜈蚣

石韋 通淋補

甘苦微寒清肺金以滋化源

凡行水之藥必皆能先清肺火

通膀胱而利水

道益精氣補五勞

利溼清熱黃帝治勞

之功高陽負對傷用石韋汁

治淋崩發背

末炒

冷調酒服

生石陰柔韌如皮背有黃毛去毛微炙用杏仁滑石

射干為使得菖蒲良生古瓦上者名瓦韋治淋

海金砂 通淋瀉溼熱

甘寒淡滲除小腸膀胱血分溼熱治腫滿五淋莖痛得梔子

牙硝礪砂治傷寒熱狂

大熱利小便此釜底抽薪之義也

莖細如線引竹

木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

茵陳 通利溼熱治諸黃

苦燥溼寒勝熱入足太陰經 膀胱 發汗利水以泄太陰陽之

溼熱 脾胃 為治黃疸之君藥 脾胃有溼熱則發黃黃者脾之色也熱甚者身如橘色汗如漿汁亦

有寒溼發黃身薰黃而色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃梔子陰黃加附子乾薑各隨寒熱治之 又治傷

寒時疾狂熱瘴瘧頭痛頭旋女人瘕疝 皆溼熱為病

香薷 宜通利溼清暑

辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺為清暑

之主藥肺氣清則小便行而熱降 暑必兼溼治暑必兼利溼若無溼但為乾熱非暑也

治嘔逆水腫 熬膏服小 腳氣口氣 煎湯 單服治霍亂轉筋 時珍

日暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中入內遂病顛痛 發熱惡寒頭暈口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和

脾則愈若飲食不節勞役作傷之人傷暑大熱大渴汗出如
雨煩躁喘促或瀉或吐者乃內傷之證宜用清暑益氣湯人
參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷是重虛其表而
濟之熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛
者尤不宜多服今人謂能解暑槩用代茶誤矣李上材曰香
薷爲夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者
誤服之反成大害世所未知按潔古云中暑爲陰證爲不足
中熱爲陽證爲有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得
之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼
○身寒寒字當熱字看傷寒必病熱
陳者勝宜冷飲熱服令人瀉

青蒿

瀉熱補勞

苦寒得春木少陽之令最早

二月生苗

故入少陽厥陰血分

膽肝治

骨蒸勞熱

童便搗葉取汁熬膏

葶勞虛熱

凡苦寒之藥多傷胃氣惟青蒿芬香入脾獨宜于血虛有

熱之人以其不犯胃氣也

風毒熱黃久瘧久痢瘙疥惡瘡鬼氣尸疰

時珍

令通纂言伏內庚日采蒿懸門庭可辟邪冬至元旦
各服一錢亦良則青蒿之治鬼疰蓋亦有所伏也

補中明

目 童便浸葉用熬膏亦良使子勿使葉使根勿使莖

附子 大燥回陽補腎命火逐風寒溼

辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不守通行十

二經無所不至能引補氣藥以復散失之元陽引補血藥以

滋不足之真陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒 同乾薑 桂枝温

經散寒 發汗 引温暖藥達下焦以 在裏之寒溼 能引火下行亦 有津調貼足心

者○入八味丸內 治三陰傷寒 吳綬曰附子陰證要藥凡傷 寒傳變三陰中寒夾陰身雖

亦從地黃等補陰 大熱而脈沉細者或厥陰腹痛甚則唇青囊縮者急須用之

若待陰極陽竭而用之已遲矣 東垣治陰盛格陽傷寒而赤 目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑附 湯加人參投半勛得汗而愈此神聖之妙也 中寒中風 幸

日中漸傷曰傷輕為感冒 氣厥 痰厥 虛寒而厥者宜之如傷 寒陽盛格陰身冷脈伏

重則為傷又重則為中

熱厥似寒者誤投立斃宜承氣白虎等湯欬逆風嘔噦胃膈噎膈噎多由氣血虛

可下而食不可下槁在吸門喉間之厭會也食下胃槁而成飲

與吐出槁在賁門胃之上口也此上焦名噎食下良及吐出

槁在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐槁在闕門大

小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血壅塞胃口

者如寒痰胃冷則宜薑附參朮胃槁者當滋潤宜四物牛脾

羊乳血瘀者加韭汁○當與韭汁牛乳二條參看論治

泄命火冷痢寒瀉霍亂轉筋脾虛寒客中焦為霍亂寒客下

拘攣風痺癥瘕積聚督脈為病脊強而厥小兒慢驚痘瘡灰

白癰疽不斂一切沉寒痼冷之證經曰陰盛生內寒陽虛生外寒助陽退陰

殺邪辟鬼本草通經墮胎凡陰證用薑附藥宜冷服熱因寒

以寒則陰益盛治之以熱則拒格不納用熱藥冷飲下噓之

後冷體既消熱性便發清且不違而致大益此反治之妙也

又有寒藥熱飲治熱證者此寒因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒此正治也或以寒

治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所毒而先其所因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦曰從治王好古曰用附子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈耗精血日枯而氣無所附麗遂成不救者多矣

母為烏頭附生者為附子連生者為側子細長者為天雄

兩岐者為烏喙五物同出異名附子以西川彰明赤水產者

為最皮黑體圓底平八角重一兩以上者良或云二兩者更勝然難得生

用發散熟用峻補趙嗣真曰仲景麻黃附子細辛湯熟附配麻黃發中有補四逆湯生附配乾薑補中

有發其旨微矣丹溪曰烏附行經仲景八味丸用為少陰嚮導後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行地黃之滯耳相習用為風藥及補藥殺人多矣昂按附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四逆真武白通諸湯多用之其有功于生民甚大况古人日用常方用之最多本非禁劑丹溪乃僅以為行經之藥而云用作補藥多致殺人言亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每訾陽藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四君子湯血虛用四物

湯虛甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆平和寬緩之劑須得
附子健悍之性行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當
病則雖暑熱時水浸麩裏煨令發垢乘熱切片炒黃去火毒
月亦可用也

用又法甘草二錢鹽水薑汁童便各半盞煮熟用今時人用黑豆煮亦

佳畏人參黃耆甘草防風犀角綠豆童便反貝母半夏栝樓

白芨白斂中其毒者黃連犀角甘草煎湯解之黃土水亦可

解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻温脾逐寒烏頭性

輕疎温脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭烏附尖吐風痰

治癩癩取其鋒銳直達病所丹溪治許白雲屢用瓜蒂梔子苦參藜蘆等劑吐之不透後用

附子尖和漿水與之始得大吐膠痰數碗天雄補下焦命門陽虛寇宗奭張元素皆云補上

焦丹溪曰可為下部之佐時珍曰其尖皆向下生故下行然
補下乃所以益上也若上焦陽虛則屬心肺之分當用參耆

本草補要 草烏頭卷白附子 益 草 部

不當用
雄附矣
治風寒溼痺為風家主藥發汗又能止陰汗
側子

散側旁生宜于發散四肢充達皮毛治手足風溼諸痺

草烏頭
大燥開頑痰

辛苦大熱搜風勝溼開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝川烏然

至毒無所釀制不可輕投
野生狀類川烏亦名烏喙薑汁

炒或豆腐煮用熬膏名射罔傅箭射獸見血立死

白附子
燥祛風溼治面疾

辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行滲面上百病

陽明之脈縈于面白附能去
頭面游風作面脂消斑疵
補肝虛祛風痰治心痛血痺諸

風冷氣中風失音陰下溼癢
根如草烏之小者長寸許皺

紋有節炮用

附法景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

破故紙

一名補骨脂燥補命火

辛苦大温入心包命門補相火以通君火暖丹田壯元陽縮

小便

亦治遺尿

治五勞七傷

五臟之勞七情之傷

腰膝冷痛腎冷精流腎虛

泄瀉

腎虛則命門火衰不能薰蒸脾胃脾胃虛寒遲於運化致飲食減少腹脹腸鳴嘔涎泄瀉如鼎釜之下無火物

終不熟故補命門相火即所以補脾破故紙四兩五味三兩肉蓯二兩吳茱一兩薑煮棗丸名四神丸治五更腎瀉婦

人血氣

婦人之血脫氣陷亦猶男子之腎冷精流

墮胎

出南番者色赤嶺南者

色綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良惡

甘草

唐鄭相國方破故紙十兩酒浸蒸為末胡桃肉二十兩去皮爛研蜜和每日酒調一匙或水調服白飛霞曰破

故紙屬火堅固元陽胡桃屬水潤燥養血有水火相生之妙忌芸薑羊血加杜仲名青娥丸○芸薑油菜也

本草備要

破故紙卷二肉蓯蓉

瑣陽

卷

草

部

肉蓯蓉 補腎命滑腸

甘酸鹹温入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓强筋治

五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩帶遺精峻補精

血 時珍曰補而不峻故有蓯蓉之號 驟用恐妨心滑大便 長大如臂重至

斤許有松子鱗甲者良酒浸一宿刷去浮甲劈破除內筋膜

酒蒸半日又酥炙用忌鐵 蘇恭曰今日所用多草蓯蓉功力稍劣

瑣陽 補陽滑腸

甘温補陰益精興陽潤燥養筋 强筋故能興陽 治痿弱滑大便 便燥者淡

之可代蓯蓉 煮粥彌佳 鱗甲櫛比狀類男陽酥炙

巴戟天 補腎祛風

甘辛微温入腎經血分強陰益精治五勞七傷辛温散風溼

治風氣脚氣水腫 根如連珠擊破中紫而鮮潔者偽也中

雖紫微有白糝粉色而理小暗者真也蜀產佳 山葍根似巴戟但色白人

或醋煮以亂之 去心酒浸焙用覆盆子為使惡丹參

胡盧巴 燥潤腎命除寒溼

苦温純陽入右腎命門暖丹田壯元陽治腎臟虛冷陽氣不

能歸元 同附子 硫黃 痕疝冷氣 同茴香巴戟川烏川棟吳萸黃 寒溼脚氣 出嶺

南番舶者良云是番萊菔子酒浸暴或蒸或炒

仙茅 燥補腎命

辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺無子心

腹冷氣不能食

胃溫

腰腳冷痺不能行

骨暖筋

相火盛者忌服

葉如茅而略闊根如小指黃白多涎竹刀去皮切糯米泔浸

去赤汁出毒用忌鐵

唐婆羅門始進此方當時盛傳服之多效照前製陰乾蜜丸酒服禁牛乳牛肉

許真君書云甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必效也

淫羊藿

補腎命

辛香甘溫入肝腎補命門

時珍曰手足陽明三焦命門藥

益精氣堅筋骨利

小便治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢不仁

手足麻木

一

名仙靈脾北部有羊一日百合食此藿所致故名去枝羊脂

拌炒山藥為使得酒良

蛇牀子

補腎命去風溼

辛苦而温强陽益陰補腎祛寒祛風燥溼治陰痿囊溼女子

陰痛陰癢

溼生蟲同
礬煎湯洗

子臟虛寒產門不閉

炒熱熨之

腎命之病及

腰酸體痛帶下脫肛喉痹齒痛溼癬惡瘡

殺蟲止癢

風溼諸病煎

湯浴止風癢

時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子而
且有益婦人世人舍此而求補藥於遠域豈非

貴耳賤日乎

似小茴而細微炒殺毒則不辣

以地黃汁拌蒸三徧佳

惡丹

皮貝母巴豆

菟絲子

平補三陰

甘辛和平凝正陽之氣入足三陰

脾肝腎

强陰益精温而不燥

不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

脾虛腎燥而生
內熱菟絲益陰

清祛風明目補衛氣助筋脈益氣力肥健人

補肝腎之效老
學庵筆記子族

弟少服菟絲子凡數年飲食倍常血氣盛忽因浴見背
隨視隨長乃大疽也適值金銀花開飲至數斤腫遂消菟絲
過服尚能作疽以此知金石藥不可不戒
昂按此人或感他毒未可盡歸咎於菟絲也
無根蔓延草

上子黃如黍粒得酒良淘去泥沙酒浸一宿暴乾搗末山藥

為使

覆盆子 平補肝腎

甘酸微溫益腎臟而固精補肝虛而明日起陽痿縮小便寇氏

日服之當覆澤肌膚烏髭髮榨汁塗女子多孕同蜜為膏治

肺氣虛寒李士材曰強腎無燥熱之偏固狀如覆盆故名
精無凝滯之害金玉之品也

去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸 葉絞汁滴目中出目翳蟲除

膚赤收溼止淚

蒺藜子 平補肝腎

苦温補腎辛温瀉肺氣而散肝風益精明目

肝以散為補凡補肝藥皆能明

目治虛勞腰痛遺精帶下欬逆肺痿乳閉癥瘕痔漏陰瘡

腎肝肺三經之病催生墮胎

刺蒺藜主惡血故能破癥下胎

沙苑蒺藜綠色

似腎

故補腎

炒用

亦可代茶

刺蒺藜三角有刺去刺酒拌蒸

風家宜刺蒺藜

補腎則沙苑者為優

餘功略同

瑞竹堂方齒身打動者蒺藜根燒灰傅之

使君子

補脾殺蟲消積

甘温健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳便濁瀉痢瘡癰為小兒

諸病要藥

經疏曰五疳便濁瀉痢腹蟲皆由脾胃虛弱因而乳停食滯溼熱痰塞而成脾胃健則積滯消溼熱

散水道利而前證盡除矣時珍曰凡能殺蟲之藥多是苦辛獨使君子樞子甘而殺蟲每月上旬蟲頭向上中旬頭橫下

旬向下道藏云初一至初五蟲頭面上凡有蟲病者每月
上旬空心食數枚蟲皆死而出也○按地黃胡麻皆殺蟲

出閩蜀五瓣有稜內仁如榧亦可煨食久則油不可用忌飲

熱茶犯之作瀉

益智子 燥脾腎補心腎

辛熱木脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門五焦之不

足心為脾母補火故能生土能牆精固氣本草未載又能開發鬱結使氣宣通

味辛能散温中進食攝涎唾胃冷則涎湧縮小便腎與膀胱相表裏益智辛温固腎鹽水炒

同烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉九治嘔吐泄瀉客寒犯胃冷氣腹痛崩

帶泄精瀉精固氣因熱而崩濁者禁用出嶺南形如棗核用仁

砂仁 即縮砂藜官行氣調中

辛温香竄補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛

痞脹痞滯有傷寒下早裏虛邪入而痞者有食壅痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者須分虛實治之不宜專用利氣

藥恐變為鼓脹鼓脹內脹而外有形噎膈嘔吐上氣欬嗽赤痞脹惟覺痞悶而已皆太陰為病也

白瀉痢溼熱積滯客於大腸霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷砂仁亦入大小腸經

消食醒酒止痛安胎氣行則痛止氣順則胎安散咽喉口齒浮熱化銅鐵

骨哽王好古曰得檀香豆蔻入肺得人參益智入脾得黃蘗茯苓入腎得赤石脂入大小腸醫通曰辛能潤腎燥引

諸藥歸宿丹田地黃用之拌蒸亦取其能達下也經疏曰腎虛氣不歸元用為嚮道始勝桂附熱藥為害

南研用

白豆蔻 宣行氣暖胃

辛熱流行三焦温暖脾胃三焦利脾胃運則諸證自平矣而為肺家本藥肺主

本草備要 砂仁 白豆蔻 肉豆蔻 草部

氣散滯氣消酒積除寒燥溼化食寬膨治脾虛瘧疾感寒腹

痛吐逆反胃

肺胃火盛及氣虛者禁用

白睛翳膜

白睛屬肺能散肺滯

太陽經目眚

紅筋

太陽脈起目眚

番舶者良研細用

肉豆蔻

一名肉果燥脾瀉腸

辛溫氣香理脾暖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒治積冷

心腹脹痛

挾痰挾食者並宜之

中惡吐沫小兒吐逆乳食不下又能瀉

大腸止虛瀉冷痢

初起忌用

出嶺南似草蔻外有皺紋內有斑

紋糯米粉裏煨熟用忌鐵

草豆蔻

一名草果燥溼祛寒除痰截瘧

辛熱香散暖胃健脾破氣開鬱燥溼祛寒除痰化食治瘴癘

寒瘧

佐常山能截瘧或與知母同用取其一陰一陽治寒瘧蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火

寒客胃痛

散滯氣利膈痰因滯因寒者多效

霍亂瀉痢噎膈反胃痞滿吐酸

痰飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒

故食料用之

過劑助脾熱耗氣

損目

閩產名草蔻如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁如

砂仁而辛香氣和滇廣所產名草果如訶子皮黑厚而稜密

子粗而辛臭雖是一物微有不同麪裏煨熟取仁用忌鐵

香附

一名莎草根宜調氣開鬱

性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣藥通行

十二經入脈氣分主一切氣

人身以氣為主氣盛則強虛則衰順則平逆則病絕則死矣經

曰怒則氣上恐則氣下喜則氣緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣耗此七情之氣也以香附為君隨證而加升降

消補之藥○素問中仍有寒則氣收熱則氣泄名九氣 利三焦解六鬱 痰鬱火鬱氣鬱血鬱溼鬱食鬱

止諸痛通則不痛治多怒多憂痰飲痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍

亂吐瀉腎氣腳氣癰疽瘡瘍血凝氣滯所致香附一味末服名獨勝丸治癰疽由鬱怒得者

如瘡初作以此代茶潰後亦宜服之大凡瘡疽喜服香藥行氣通血最忌臭穢不潔觸之○故古人治瘍多用五香連翹

飲○康祖左乳病癰又臆間生核痛楚半載禱張王夢授以方薑汁製香附為末每服二錢米飲下遂愈吐血便

血崩中帶下月候不調氣為血配血因氣行經成塊者氣之凝將行而痛氣之滯行後作痛氣血

俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也錯經者氣之亂肥人痰多而經阻氣不運也香附陰中快氣之藥氣

順則血和暢然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰胎產百病能能引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義

推陳致新故諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不怠所以生生無窮即此理耳時

珍曰凡人病則氣滯而餒香附為氣分君去毛用生則上藥臣以參耆佐以甘草治虛怯甚速也

用麩裏煨用腸用實畏火

霍香 宜去惡氣

辛甘微温入手足太陰脾肺快氣和中開胃止嘔胃弱胃熱而嘔者忌用

去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛有寒上焦壅熱

能理脾肺之氣古方有霍香正氣散正氣通暢則邪逆自除出交廣方莖有節葉微似

茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因葉多偽也

茴香 古作懷香燥補腎命門寒疝

大茴辛熱入腎膀胱暖丹田補命門開胃下食調中止嘔療

小腸冷氣癩疝陰腫疝有七腫氣血寒水筋孤癩也肝經病不屬腎經以厥陰肝脈絡陰器也多因

寒溼所致亦有挾虛者當加參求于温散藥中乾溼脚氣多食損目發瘡小茴辛平

本草 卷之三 山柰 三 草 部

理氣開胃亦治寒疝食料宜之 大如麥粒輕而有細伎者

名大茴出寧夏他處小者名小茴自番舶來實八瓣者名八

角茴香炒黃用得酒良得鹽則入腎發腎邪故治陰疝 受病于肝

見證于腎大小茴各一兩為末豬胞一箇連尿入藥酒煮爛為丸服

甘松香 宣理氣醒脾

甘溫芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疰齒齲脚膝氣浮

煎湯淋洗出涼州及黔蜀葉如茅 根極繁密 用根

山柰 宣溫中辟惡

辛溫暖中辟惡治心腹冷痛寒溼霍亂風蟲牙痛 生廣中

根葉皆如生薑入合諸香用

行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒則入

血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥或蜜水炒青鹽炒則補

腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且斂其散薑汁炒則化

痰飲炒黑又能止血忌鐵時珍曰得參朮則補氣得歸地則補血得木香則散滯和中得檀香

則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱

得梔子黃連則清降火熱得茯神則交濟心腎得茴香破故

紙則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇蔥白則發

汗散邪得三稜莪朮則消積磨塊得艾葉則治血氣暖子宮

乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解

故服之尤效非宜於婦人不宜於男子也李士材曰乃治標

木香 宣行氣

其疾矣世俗泥於女科仙藥之一語惜未有發明及此者

辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝氣和脾

氣怒則肝氣上肺氣調則金能制木而肝平木不尅土而脾和治一切氣痛九種心痛皆屬

胃脘曰寒痛熱痛氣痛血痛溼痛痰痛食痛虻痛悸痛蓋君心不易受邪真心痛者手足冷過腕節朝發夕死嘔逆

反胃霍亂瀉痢後重同檳榔用劉河間曰痢疾行血則膿血自愈調氣則後重自除癰閉痰

壅氣結疔癰癥塊腫毒蠱毒衝脈為病氣逆裏急殺鬼物禦

瘴霧去腋臭實大腸消食安胎氣逆則胎不安過服損真氣丹溪曰味辛氣

升若陰火衝上者反助火邪當用黃蘗知母少以木香佐之

王好古曰本草主氣劣氣不足補也通壅導氣破也安胎健

脾胃補也除痰癰癥塊破也不同如此汪機曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉時珍曰諸氣臍鬱皆屬於肺上焦氣

滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬於脾中焦氣滯用之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癰閉肝

氣鬱則為痛下焦氣滯用之者塞者通之也番船上來形如枯骨味苦黏舌者

良名青木香今所用者皆廣木香土木香磨汁用東垣用黃連製亦有蒸

良薑 宜燥暖胃散寒

辛熱暖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛

凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘

有滯或有蟲及因怒因寒而起以良薑酒洗七次香醋醋洗七次焙研因寒者薑二錢附一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙鹽少許服初梁纒患心脾痛夢神授此方二味等分服後入各炒方屬 痢吐惡噎膈瘴瘧冷癖肺胃熱者忌之 出嶺南高州子名

紅葶藶温肺散寒醒脾燥溼消食解酒

東垣脾胃藥中常用之

葶東壁

土炒用

葶芩

一作撥除胃冷散浮熱

辛熱除胃冷温中下氣消食祛痰治水瀉氣痢

牛乳點膜

虛冷腸

鳴亦入大腸經

冷痰惡心嘔吐酸水疰癖陰疝辛散陽明之浮熱

本草綱目 良薑 葶芩 土炒 金銀花 葶 草

治頭痛 偏頭痛者口含溫水隨左 牙痛 寒痛宜乾薑藜蘆細辛熱痛宜石膏牙硝

風痛宜皂角僵蠶蜂房 鼻淵多服泄真氣動脾肺之火損目

出南番嶺南亦有類樵子而長青色去挺用頭醋浸刮淨

皮粟免傷人肺

烟草 新增宜行氣辟寒

辛溫有毒治風寒溼痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循

常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使醉醉能使醒飢

能使飽飽能使飢人以代酒代茗終身不厭 故一名然火氣

薰灼耗血損年人自不覺耳 閩產者佳 烟筒中水能解蛇毒

金銀花 瀉熱解毒

甘寒入肺散熱解毒清熱即補虛凡物甘者皆補療風養血止渴丹溪

曰癰疽安後發渴黃者六一湯吞忍冬九切當忍冬養血黃者補氣渴何由作治癰疽疥癬楊梅惡

瘡腸澀血痢五種尸疰 經冬不凋一名忍冬又名左纏籐花葉

同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並妙忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起便服奇效

乾者亦可不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二碗煎至一碗再入酒一碗畧煎分三服一日一夜喫盡重者日二劑

服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前分兩酒煮曬乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調

常服能稀痘

蒲公英 一名黃花地丁瀉熱解毒

甘平花黃屬土入太陰陽明脾胃化熱毒解食毒消腫核端治

乳癰乳頭屬厥陰乳房屬陽明同疔毒亦為通淋妙品諸家忍冬煎入少酒服搗敷亦良不言

本草綱目 卷之六 草部 忍冬 忍冬一名黃花地丁 忍冬一名黃花地丁 忍冬一名黃花地丁

治淋試瑞竹堂有還少丹方取其通擦牙烏髭髮腎東垣曰苦寒腎經君藥白汁塗惡

刺凡螳螂諸蟲盛夏孕育游諸物上必遺精汁乾久則有毒人手觸之成疾名狐尿刺慘痛不眠百療難效取汁厚塗

即愈千金方極言其功葉如萵苣花如單瓣菊花四時有花花罷飛

絮斷之莖中有白汁鄭方升曰一莖兩花高尺許者掘下數尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服

治膈噎如神

紫花地下瀉熱解毒

辛苦而寒武出疽發背疔腫癰癤無名腫毒葉如柳而細

夏開紫花結角生平地者起莖生溝壑者起蔓

杜牛膝一名天名精一名地菘瀉熱吐痰破血解毒

甘寒微毒能破血一婦產後口渴氣喘面赤有斑大便泄小便便秘用行血利水藥不效用牛膝濃煎膏

飲下血一桶小便通而愈能止血吐痰除熱解毒殺蟲治乳蛾喉痹砂淋

血淋良方云濃煎加乳麝少許神效小兒牙關緊閉急慢驚風不省人事者絞汁入好酒

灌之即甦以醋拌渣傅項下服汁吐瘡痰驚風服之亦取其吐痰漱汁止牙痛搗之

傅蛇蟲螫毒 根白如短牛膝地黃為使煎湯洗痔渣塞患處良

鶴蝮瀉殺蟲

苦辛有小毒殺五臟蟲治虺蝮腹痛面白唇紅時發時止者為蟲痛肥肉汁調末服

沈存中筆記云是杜牛膝子或曰非也別是一種最粘人衣有狐氣

炒熱則香

山荳根瀉熱解毒

苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則不灼肺而金清肺與大腸

本草綱目卷之四十五 牛膝子 山慈姑 五十五 部

相表裏肺金清
則大腸亦清
消腫止痛治喉癰喉風齙腫齒痛含之喘滿

熱欬腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷療

人馬急黃血熱極所致苗蔓如豆經冬不凋

牛蒡子 一名鼠粘子 一名惡實瀉熱解毒

辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利二便行

十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣性冷而滑利痘證虛寒泄瀉者

忌服 實如蒲萄而褐色酒拌蒸待有霜拭去用根苦寒竹刀

刮淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈搗和豬脂貼瘡腫及反

花瘡肉反出如花狀

山慈菘 瀉熱解毒

甘微辛有小毒功專清熱散結治癰瘡疔腫癩癧結核

醋塗

解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷 根與慈菘小蒜相類去毛殼用

王樞丹中用之廣筆記云出處州遂昌縣洪山無毛少真者有毛誤也

漏盧 瀉熱解毒

鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經

下乳排膿止血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背

古方以漏盧湯為稱

首及預解時行痘疹毒 取其寒勝熱又能入陽明故也

出閩中莖如油麻

枯黑如漆者真甘草拌蒸連翹為使

貫眾 瀉熱解毒

味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治崩中帶下產後血氣脹

痛破癥瘕發斑痘王海藏快化骨哽能輒殺三蟲根似狗

脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞解毒輒堅此以

浸水缸中日飲其水能辟時疾

射干 瀉火解毒散血消痰

苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自解故能消

心脾老血行太陰厥陰之積痰肺脾治喉痹咽痛為要藥搗

醋和噲之引延千金治結核瘕疝便毒瘡母鼈甲煎丸治瘡母用之皆取其

降厥陰相火也通經閉利大腸鎮肝明目扁竹花根也葉橫鋪如烏羽及扇

故一名烏扇烏扇 泔水浸一日篋竹葉煮半日用

續隨子 一名干金子瀉行水破血解毒

辛温有毒行水破血治癥瘕痰飲冷氣脹滿蠱毒鬼疰利大

小腸下惡滯物塗疥癬瘡玉樞丹用之治百病多效去殼

取色白者壓去油用時珍曰續隨子大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相似長于利水用之得法皆

要藥也

馬藷子 一名蠡實瀉溼熱解毒

甘平治寒疝喉痹癰腫瘡癤婦人血氣煩悶血運崩帶利大

小腸久服令人瀉 叢生葉似薤而長厚結角子如麻大赤

色有稜炒用治疔用醋拌根葉同功

蓖麻子 瀉通竅拔毒出有形滯物

辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風不遂喎

斜搗餅左貼右

口噤鼻窒耳聾

搗爛綿裹塞耳塞鼻

喉痹舌脹

油作紙燃烟薰

能利水氣治水癥浮腫

研服當下青黃水壯人只可五粒

能出有形滯物治

針刺入肉

搗傅傷處頻看刺出即去藥恐努出好肉

竹木骨哽

蓖麻子一兩凝水石二兩研勻以一

捻置舌根噙燕自然不見

胞胎不下

蓖麻一粒巴豆一粒麝香一分貼臍中併足心胎下即去之若子腸挺出

者搗膏塗頂心即收

能追膿拔毒傅瘰癧惡瘡外用屢奏奇功

鵝鵝油能引藥

氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多用之

然有毒熱氣味頗近巴豆內服不可

輕率

去皮黃連水浸每晨用浸水吞一粒至三四粒治大風疥癩

形如牛蟬黃褐有斑

鹽水煮去皮研或用油忌鐵

食蓖麻一生不得食炒豆犯之脹死

白頭翁

瀉熱涼血

苦堅腎寒涼血入陽明血分

胃大腸

治熱毒血痢

仲景治熱痢有白頭翁湯

合黃連黃蘗秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之温瘧寒熱齒痛骨

痛腎主齒骨鼻衄禿瘡癩癧疔痕血痔偏墜搗傳患處明目消疔

有風反靜無風則搖近根處有白茸得酒良

王瓜 卽土瓜根瀉熱利水行血

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴搗汁飲便數帶下月閉

瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳藥多用之單服亦可墮胎 根如栝

樓之小者味如山藥根子通用經疏曰主治略似栝樓傷寒發斑用王瓜搗汁和伏龍肝

末服 甚效

王不留行 通行血

甘苦而平其性行而不住能走血分通血脈乃陽明衝任之

藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下乳催生俗云穿山甲王

不留婦人服之乳長流治金瘡止癰瘡血散出竹木刺孕婦忌之花如

鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

冬葵子滑腸利竅

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便消水腫

用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎 秋葵復種經冬至春作子者

名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥 蜀葵花赤者

治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關

格皆取其寒潤滑利之功也

白鮮皮通祛風溼

氣寒善行味苦性燥行水故燥人脾胃除溼熱兼入膀胱小腸行

水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥一味白鮮皮湯治產後風時珍曰世

醫止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中腫痛溼熱乘虛客腎與膀胱所致

根黃白而心實取皮用惡桑螵蛸桔梗茯苓萆薢

萆薢通祛風溼補下焦

甘苦性平入足陽明厥陰胃肝祛風去溼以固下焦陽明王肉屬溼厥陰

主筋屬風補肝虛去風堅筋骨風溼去則益精明目治風寒溼痺腰

痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡

諸病皆陽明溼熱流入下焦萆薢能除濁芥清古方有萆薢分清飲史國信云若欲興陽先滋筋力若欲便清先分肝火

萬金護命方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因大腸秘熱不通水液只就小腸大腸愈加乾竭甚則身熱心

六直... 白嫩皮... 土茯苓... 草部

燥思水即重證也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷膩之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛與淋證瀆而痛不同宜用草薺一兩鹽水炒為末每服二三錢使水道轉入大腸仍以蔥湯頻洗穀道令氣得通則便數及痛自減也○腎有二竅有黃白二種黃長鞭音白淋證出於溺竅濁證出於精竅

虛軟軟者良薏苡為使畏大黃柴胡前胡忌茗醋時珍曰草薺薺上

茯苓形不同而主治不甚相遠豈一類數種乎草薺根細長淺白薺薺根作塊亦黃

土茯苓通祛溼熱補脾胃

甘淡而平陽明主藥胃大腸健脾胃祛風溼脾胃健則營衛從

風溼除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘攣楊梅瘡毒楊梅

瘡古方不載明正德間起於嶺表其證多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄於厥陰肌肉屬於陽明故也醫用蠶絲劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄入經絡筋骨血液枯槁筋失所養變為拘攣癱漏瘻致廢

痼土茯苓能制輕粉之毒去陽明溼熱用一兩為君
銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分阜角子四分氣虛加人
參七分血虛加當歸
七分名搜風解毒湯
瘰癧瘡腫
溼鬱而為熱營衛不和則生
瘡腫經云溼氣害人皮肉筋
脈是也土茯苓淡能滲甘能
補患膿疥者煎湯代茶甚妙
大如鴨子連綴而生俗名冷

飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

白斂 瀉火散結

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌止痛

治癰疽瘡腫面上疱瘡金瘡撲損
箭鏃不出者同丹皮
或半夏為末酒服
斂瘡

方多用之
故名每與
白芨相須
搽凍耳
同黃蘗
末油調
蔓赤枝有五葉根如

卵而長三五枚同窠皮烏肉白一種赤斂功用皆同
鄭奠一
日能治

溫瘡血痢腸風
痔瘻赤白帶下

本草精要 白斂 鴉片子 旱蓮草 劉寄奴 草 部

預知子

補勞瀉熱

苦寒補五勞七傷治疰瘕氣塊天行温疾蛇蟲咬毒殺蟲療

蠱綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而預知之故耳利便健生 籐生子如阜角褐色

光潤出蜀中云亦難得

旱蓮草

一名鯉腸又名金陵草補腎

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭

千金云當及時多收其效甚速經疏云性涼不益脾胃故

千金方金陵煎丸用薑汁和劑

苗如旋覆實似蓮房斷之有汁須臾而黑

熬膏良

劉寄奴草

瀉破血止血

苦温破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利一莖

直上葉尖長糙澀花白蕊黃如小菊花有白絮如苦買絮子

細長亦似苦買子莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時曾射一蛇明日見童子林

中搗藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥傅之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也叱之不見乃收藥回每遇

金瘡傅

之立愈

馬鞭草

瀉破血消脹殺蟲

味苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癥痕癰瘡陰腫

搗塗

墟陌甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫花穗如車前草

類蓬蒿而細根白而小用苗葉

穀精草

輕明目

辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功在菊花

之上亦治喉痺齒痛陽明風熱 收穀後荒田中生葉似嫩

秧花如白星

小兒雀盲者搗羊肝一具不洗竹刀割開入穀精煮熟食之或作丸茶下

青箱子

一名草決明瀉肝明目

味苦微寒入厥陰

肝

祛風熱鎮肝明目消青盲障翳蟲疥惡

瘡腫子散大者忌服

能助陽火

類雞冠而穗尖長

決明子

瀉肝明目

甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決明之名又曰

益腎精

瞳子神光屬腎曰華曰明目甚於黑豆作枕治頭風

狀如馬蹄俗呼馬蹄決

明搗碎煎惡大麻仁

麥實宜溫中

辛温温中明目耐風寒下水氣

時珍曰古人種蓼為蔬收子入藥今惟酒麴用其汁耳以

香蓼青蓼紫蓼為良

有香蓼青蓼紫蓼赤蓼木蓼水蓼馬蓼

馬勃

輕解熱外用傅瘡

辛平輕虛清肺解熱

東垣普濟消毒飲中用之

散血止嗽治喉痺咽痛

吹

中良或加白礬或硝掃喉取吐痰愈

鼻衄失音外用傅諸瘡良

生溼地朽木

上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取粉用

木鱉子

瀉熱外用治瘡

苦温微甘有小毒利大腸

瀉癰疔積瘰癧瘡痔乳癰蚌毒

消腫追毒生肌除黥

音旱黑斑

專入外科

核扁如鱉綠色揀去

油者能毒狗