


圖書集成醫部全錄

弟五十八冊

小兒痘疹三十三至四十二





博物彙編藝術典第五百十二卷目錄  
醫部彙考四百九十二

痘疹門三十四

奪命丹 消毒飲

桂宣枝散大黃十湯全大三

尊命丹	消毒飲	葛根解毒湯
乙承氣湯	黃芪建中湯	化毒湯
補湯	甯神丸	黃芩湯
仙聖散	紫草散	益黃散
毒散	胭脂塗法	加味四聖湯
癰湯	苦参散	減癰湯
脾丸	柴葛桂枝湯	辰桂散
明日散	洗肝明日散	五積散
升陽湯	鼠黏子湯	七物升陽散
湯	解毒湯	萬青快
門冬湯	五皮湯	經驗方
清肺湯	塌氣丸	流氣散
安胎飲	洗心散	麥餽

醫部彙考四百九十二  
痘寒門三十五

方五	追溯解毒湯	保嬰丹	滋陰三寶散	四製白木散	衛元湯	內托至奇湯
伏神湯	野仙獨聖散		加減參苓白术散	固真湯	籠金湯	紫霞黃露飲
十神解毒湯	蟠鷗飲	穀精龍膽散	消導飲	磨積散	牛膏	安裏解毒防風湯
保生散	荆芥散	羌活散	太乙保和湯	益元透肌散	保嬰百補湯	祕傳八味二花散
肌湯	防風蒼朮湯	葛根橘皮湯	羌活散	正氣散	調解散	疏解散
大無比散	玳瑁湯	犀角飲子	四君子湯	和中散	六一散	和解湯
班散	西來甘露飲	渾元汁	托裏快膈湯	牛蒡散	獨膝散	大靈丹
黃甘草湯	田氏調肝散	龐氏地黃膏	清裏退火湯	加減調中湯	小解毒疏痘湯	無比散
紫草廻班散	木通散	人參蟬蛻散	人參竹葉湯	白虎湯	紫草散	四聖散
葡萄	野通散	祕傳大透肌散	透肌湯		麻蘿	安胎散
黃湯	甘桔加梔子湯	化毒湯	透肌散		藍根散	金散
獨參湯	五龍湯	玉泉散	二花散		紫金散	瓜散
祐邪湯	化斑湯	廻陽丹	不二散		天元散	元散
玉樞正氣丹	四仙散		涼血散		接髓丹	
			解毒散		震蟄丹	
			毒湯		神應膏	
			加味		胎元散	
			犀角飲子		散	
			黃連解毒湯			
			加減犀角散			

博物彙編藝術典第五百十四卷目錄  
醫部彙考四百九十四

博物彙編藝術典第五百十五卷目錄  
警部彙考四百九十五

晉書卷之六十一

痘疹門三十七

博物彙編藝術典第五百十六卷目錄  
醫部彙考四百九十六

痘疹門二十八

方八	清肌透毒湯	直達透肌散	寬中透毒飲	疏肝透毒湯	清熱解毒湯
調中湯	涼血攻毒飲	鬆肌通聖散	清涼攻毒飲	清暑透毒湯	疏邪實表湯
湯	既濟湯	清金攻毒飲	京屬攻毒飲	消斑快毒湯	必勝
寶氣飲	瀦榮飲	滌邪救苦湯	萬兩黃金散	養榮透毒湯	養榮附氣
湯				薈針法	散火驅毒飲

平順清解飲 托裏無夏散 賽金化毒散 保元八珠湯 退陽返本湯 實脾固本湯  
瀉黃納穀散 補液湯 清金解渴散 安神散 淸宵忘晝飲 金蓋散 滋肌散 水納穀  
湯散 保元回漿散 活絡透毒飲 忍冬解毒湯 振雲散 消瘡解毒散 加味內托十宣散  
雙仙化毒膏 第一日方 第二日方 第三日方 第四日方 第五日方 第六日方 第七日方  
全湯 痘瘡初起方 痘瘡出齊方 痘瘡將同方 痘瘡神方 同毒卽消丹 壞證方  
水痘方 治回毒歲久不愈方

博物彙編藝術典第五百十七卷目錄

醫部彙考四百九十七

痘疹門三十九

單方

鍼灸

醫案一

博物彙編藝術典第五百十八卷目錄

醫部彙考四百九十八

痘疹門四十

醫案二

博物彙編藝術典第五百十九卷目錄

醫部彙考四百九十九

痘疹門四十一

醫案三

博物彙編藝術典第五百二十卷目錄

醫部彙考五百百

痘疹門四十二

醫案四

痘疹門三十三

方三

加味甘桔湯

幼科書下同全

治痘咽痛

桔梗 甘草 牛蒡炒研 荆芥穗 升麻 射干 右取順水一盞煎熟時常服之

橘皮湯

治痘中傷食

橘皮 青皮 枳殼 木香 白茯 甘草 山楂 右麥芽作引水煎不拘時服

參苓白朮散 治痘中脾胃氣弱不食

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 山楂肉 木香 枳實 陳皮 右水煎搗砂仁一箇作引不拘時服

消毒快斑湯 治痘不及期發熱即出

桔梗 甘草 防風 赤芍 木通 天花粉 元參 大力子 當歸 赤芍 川芎 荆芥 防風 連翹 桔梗 乾葛

右水煎服 準繩重加連翹

增損八物湯 治痘過期發熱不出

人參 黃芪 白朮 甘草 當歸 大力子炒

赤芍 川芎 荆芥 防風 連翹 桔梗 乾葛

右水煎服

加味參蘇飲 治痘應出不出外感風寒

人參 蘇葉 葛根 陳皮 前胡 白芷 桂枝 枳殼 甘草 羌活 防風

右竹葉引水煎服

準繩去桂枝加桔梗

加味調中湯 治痘裏虛不出

人參 黃芪 甘草 白朮 木香 官桂 白茯 半夏 陳皮 右水煎服

右水煎服

原书缺页

原书缺页

歸尾 川芎 赤芍 生地 荆芥 升麻 葛根 牛蒡炒 連翹 紫草 地骨皮 右水煎入燒人糞同服

四君子快斑湯 治痘瘡濕盛而氣不足

黃芪 人參 白朮 白朮 甘草 官桂 白芷 防風 陳皮 白芍 荆芥 右水煎服

大補養命湯 治痘瘡皮嫩易破

黃芪 官桂 川芎 赤芍 白朮 甘草 木香 當歸 大棗 右水煎服

大補快斑湯 治痘瘡浮囊空殼如麸皮中無水色

黃芪 當歸 川芎 赤芍 人參 生地 甘草 牛蒡 防風 荆芥穗 連翹 官桂 右水煎

入燒人糞同服

解標瀉火湯 治痘根窠赤頂紅此火勝也

歸尾 牛蒡 地骨皮 山豆根 酒梔仁 酒芩 酒連 連翹 桔梗 甘草 升麻 葛根 右水煎入燒人糞同服

解毒化斑湯 治痘中枯黑子

黃芪 人參 甘草 歸身 川芎 牛蒡炒 荆芥穗 防風 連翹 右水煎入燒人糞同服 寒

月加官桂

四聖珍珠散 治痘疔

菟豆四十九粒 菟豆四十九粒 油髮一撮 珍珠七粒 右二豆油髮各燒灰存性共珍珠爲細末

用胭脂取汁調勻以針挑破黑陷納藥於中胭脂水塗四圍其瘡必回不回而添黑陷決死無疑

朱杏莊加雄黃八分紫草茸錢半 周順齋用牛黃一錢二分硃砂八分珍珠三分爲末口嚼胭脂汁調

搽

加味四聖快斑湯 治痘瘡毒氣陷伏倒靨

黃芪 人中黃 木通 紫草 酒紅花 連翹 麻黃酒炒黑 牛蒡炒 絲瓜蒂帶燒灰存性

宣風快斑湯 治同前

湯調之

木香快斑散 治痘瘡倒伏倒醫

木香 枳殼 甘草 檳榔 大黃 右水煎用黑牽牛半生半熟研末同服以通爲度瘡回服四君子煎服

十全快斑湯 治痘瘡灰白項平正氣虛弱

人參 黃芪炙 甘草炙 白术 歸身 白芍 川芎 木香 官桂 陳皮 藿香 薏子 右薑引水引水煎服

異功快斑湯 治痘瀉不止

人參 黃芪炙 白术 歸身 木香 桂心 陳皮 藝子 丁香 白茯 薏子 炙甘草 右薑引水煎服

附子理中湯 治同前

人參 白术 甘草炙 乾薑炙 附子煨熱 藝子肉 右水煎服

補元快斑湯 治痘瘡元氣不足

人參 黃芪 白术 當歸 甘草 右水煎溫服

調中快斑湯 治痘瘡誤服涼藥冷水

人參 白术 白茯 甘草 桂心 木皮 陳皮 蒼朮 厚朴 藿香 右薑引水煎服

涼血快斑湯 治痘瘡紅紫焮腫血熱

歸梢 生地 酒紅花 連翹 牛蒡炒 升麻 甘草 右水煎溫服 大便堅者加紫草甚者加大黃 小便少者加木通

助脾快斑湯 治痘瘡初發如錫餅

陳皮 山楂肉 荆穗 牛蒡炒 甘草 木香 青皮 枳殼 木通 右白水煎服

補脾快斑湯 治痘瘡手足發不透

黃芪 人參 甘草 防風 官桂少許 右水煎服

正氣快斑湯 治痘爲寒所鬱不能起發

羌活 蒼朮 防風 甘草 桔梗 當歸 葛根 白芷 川芎 右薑引水煎服 寒月加官桂

平胃快斑湯 治痘遇久雨不能起發

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 羌活 防風 官桂 豬苓 白茯 右水煎服

白虎快斑湯 治痘瘡天時暄熱毒火鬱遏不得發越

人參一錢 軟石膏 甘草 麥門冬 葛根 升麻 右各等分淡竹葉爲引水煎服 昏暈者加辰

砂 小便赤加木通滑石 大便堅者加生石膏

理中快斑湯 治痘起發誤食生冷脾胃虛不能發透

人參 白茯 甘草 乾薑 官桂 木香 右薑引水煎服 嘘者加半夏 泄瀉加訶子肉

寬中快斑湯 治痘內傷飲食腹痛不能發透

陳皮 半夏 白朮 枳實 山楂肉 神龜炒 砂仁 黃連薑汁炒 甘草炙 厚朴 青皮

木香 連翹 右薑引水煎溫服

四苓新加湯 治痘起發小便赤

豬苓 澤瀉 木通 赤茯苓 甘草 滑石 連翹 右淡竹葉燈心引水煎服

胃苓和中湯 治痘起發泄瀉焦黃酸臭內熱

豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 陳皮 甘草炙 木通 黃連酒炒 訶子肉 升麻炒 藥香 右粳

米爲引水煎服

加減六君子湯 治痘泄瀉能食者

引水煎服

消毒化斑湯 治痘起發頭面掀腫

牛蒡

桔梗

連翹

防風

柴胡

升麻

蟬蛻

人中黃

薔蒙花

龍膽草

右水煎服

羌活

桔梗

防風

升麻

荆芥

牛蒡子

連翹

甘草

歸尾

葛根

官桂少許

右淡竹葉

羌活

桔梗

防風

升麻

荆芥

牛蒡子

連翹

人中黃

右淡竹葉

爲引水煎服

救苦散

治大頭瘡

羌活

防風

牛蒡

桔梗

酒芩

荆穗

連翹

人中黃

右淡竹葉

歸尾

白芍酒炒

生地

黃花酒洗

地骨皮

右水煎服

涼血芍藥湯

治痘瘡痛癢

歸尾

白芍酒炒

生地

黃花酒洗

地骨皮

右水煎服

紫草

木通

枳殼

黃芪

桂枝

大黃

右水煎服

又用乾山藥陳白芨二味爲末燃而熏之

四聖解毒湯

治痘瘡痛癢

大便祕結能食

人參 黃芪 甘草 桂枝 蘭子 木香 陳皮 荆芥 防風 羌活 赤芍 右薑引水煎服

導赤解毒湯

治痘瘡熱渴脣焦舌燥小便短少

木通

防風

麥冬

連翹

地骨皮

天花粉

生地

升麻

乾葛

赤芍

右燈心引水煎服

生津地黃湯

治痘瘡大便堅實作渴

生地 麥冬 知母 甘草 天花粉

右淡竹葉爲引水煎服

白朮散

治痘瘡泄瀉作渴

圖書

古今醫案

卷四

金匱要略

經方

古今醫案

卷四

古今醫案

人參

白朮 黃芪

白朮 半夏

甘草

木香

藿香

葛根

右水煎服

人參

白朮 陳皮

半夏

白朮 酒連

竹茹

右薑

引水煎服

二陳理中湯

治痘瘡胃傷生冷寒嘔

陳皮

半夏 白朮

酒連

加味鼠黏湯

治熱嘔

治同前

桔梗

大力子炒 射干 山豆根

甘草 防風 荆芥 連翹

右水煎細細呷之

辰砂

三分 雄黃三分 兒茶五分

黃藥五分

右共爲細末少許吹之

四物化毒湯

治痘瘡血不足

歸身

川芎 白芷 生地

麥冬 木通 牛蒡

甘草

桂少許

白水煎服

保元化毒湯

治氣不足

人參

黃芪 甘草 桂枝

羌活 荆芥 牛蒡

防風

連翹

白水煎服

十全化毒湯

治氣血俱不足

人參

黃芪 甘草 當歸

川芎 牛蒡 桂枝

防風 荆芥 赤芍

右水煎服

承氣化毒湯

治痘瘡六腑祕結狂妄煩躁口乾作渴手足寒熱異常

枳殼

厚朴 大黃酒炒

檳榔 甘草

右水煎服

養衛化毒湯

治痘已成膿咬牙

人參

黃芪 桂枝 甘草

當歸 右水煎服

清神化毒湯

治痘已成膿咬牙並作

升麻

生地 木通

麥冬 防風 甘草

右水煎服

苟藥化毒湯

治寒戰咬牙並作

導赤化毒湯 治痘已成膿瘡癰

右水煎服

木通 麥冬 甘草 梔子仁炒 酸棗仁 辰砂研末調 右燈心爲引各等分煎服

養胃化毒湯 治痘已成膿火冲於胃吐而有物

陳皮 白朮 白茯 砂仁 黃連薑汁少許炒 右水煎服

香連化毒湯 治痘已成膿瀉利色黃而臭

木香 黃連炒 甘草炙 白朮炒 右水煎服

理中化毒湯 治痘已成膿瀉利而清

人參 白朮 白茯 甘草炙 乾薑炙 右水煎服

二錢半

附子化毒湯 治痘已成膿吐利不止手足冷

人參 白朮 乾薑炮 甘草炙 黃芪炙 右水煎服

甘桔化毒湯 治痘食辛熱咽喉失聲

甘草 桔梗 牛蒡 射干炒 連翹 右水煎入竹瀝同服

生地 當歸 麥冬 升麻 人參 右燈心引水煎服

大補化毒湯 治氣血不足痘色灰白

人參 黃芪 歸身 白朮炙 甘草炙 赤芍 官桂少許 右水煎服

固本化毒湯 治痘瘡泄瀉膿色灰白

人參 白朮炒 甘草炙 乾薑炙 官桂 丁香 詞子肉 右水煎服

解肌化毒湯 治痘色灰白氣有腥臭此有濕熱當解其標

升麻 乾葛根 連翹 荆芥穗 天花粉 黃藥酒炒 赤芍 甘草 蒼朮 右水煎服

四聖化毒湯 治痘瘡瘍痒形體壯實

木通

歸尾 赤芍 防風 桂枝少許

荆穗 右水煎服

人參

黃芪 當歸

甯神化毒湯 治成漿時昏昏謾語

歸身

生地 木通 麥冬 山梔炒

石菖蒲 人參 赤茯苓

右水煎服

安神丸

治證同前

當歸

身酒洗一錢半

扶神八分 甘草炙 酸棗仁去殼各五分

遠志去心 石菖蒲 黃連各一

錢

右猪心血和九硃砂爲衣燈心湯送下

大黃化毒湯

治痘出腹痛未經大便

當歸

生地 升麻 麻子仁研

桃仁泡 紅花 大黃酒炒 枳殼炒

右水煎入檳榔末同服

溫中化毒湯

治痘出食冷腹痛

歸尾

人參 木香 白朮 桂心 甘草炙

白芍 枳實 陳皮 乾薑

右水煎服

丁香

助脾化毒湯 治傷食腹脹喘促又加煩躁輕者消導之

陳皮

半夏 厚朴 枳殼

蘇子炒 蘿蔔子 檳榔

右水煎服

不二丸

治證同前而脹甚者以所傷之物送下

蒼术米泔製二兩

甘草炒一兩

羌活一兩半

巴豆去殼製油

杏仁去皮尖炒各四十九粒

右

共爲細末

神麌爲丸黃藥末爲衣每用一丸

補中化毒湯 治同前

陳皮

白朮 砂仁 神麌炒

山楂肉 右水煎熱服

歸尾

元參化毒湯 治痘後丹癰

生地 紅花酒洗 連翹 元參 石膏 赤芍 防風 木通 荆芥穗 地骨皮 右淡竹葉引水煎服

羌活

治濕陽

治痘瘡多飲冷水濕浸肺胃收腫不齊

桂枝解毒湯

治痘瘡冬寒難醫

桂枝

赤芍

防風

蟬退

牛蒡

右水煎服

桂枝

青皮

木香

右水煎服

黃芪

人參

甘草

當歸

牛蒡炒

連翹

薄荷

桂枝

赤茯苓

桂枝

青皮

木香

右水煎服

黃牛糞

右燒過取中心白者研細篩敷之

桂枝解毒湯

治痘瘡冬寒難醫

薄荷

桂枝

赤芍

防風

蟬退

牛蒡

右水煎服

甘露解毒湯

治夏熱難醫

豬苓

澤瀉

地骨皮

麥門冬

木通

黃芩

甘草

連翹

右水煎服

桂枝解毒湯

治元氣素弱難醫

歸身

生地

麻黃

紫草

枳殼

大黃酒炒

連翹

右水煎服

參歸解毒湯

治收醫大熱毒火在內

人參

黃芪

當歸

甘草

牛蒡炒

右水煎服

葛根解毒湯

治收醫大熱毒火在內

葛根

天花粉

木通

地骨皮

歸尾

甘草

連翹

牛蒡

酒芩

柴胡

人參

右淡竹葉爲  
引水煎服

大補湯

治痘瘡破損不能成痂

黃芪

人參

當歸

甘草

牛蒡

連翹

桂枝

右水煎服

升麻解毒湯

治痘瘡盡破膿血浸淫

升麻

白芷

酒芩

連翹

當歸

牛蒡炒

酒木通節

右水煎服

當歸涼血湯

治痘瘡破血出

當歸

紅花

地骨皮

酒芩

生地黃

牛蒡

連翹

黃芩

人參

甘草

右水煎服

托裏回生散 治瘡破血水乾枯陷伏

黃芪 當歸 牛蒡子 連翹 甘草 桂枝 右水煎調燒人屎服

調元固本湯 治瘡表虛癰皮不脫落

人參 黃芪 當歸 甘草 蟬蛻 右水煎溫服

調元清氣湯 治瘡癰皮不落

人參 黃芪 當歸 甘草 麥門冬 酸棗仁 白朮 黃連 陳皮 右用大棗爲引煎服

減癰散

密陀僧 右爲細末以乳汁調敷瘡上其癰自平黑色自退

必勝膏 治痘後癰毒一名拔毒膏

馬齒莧杵汁成膏 赤石脂爲末 右二味併蜜共熬成膏塗上腫處

十六味流氣飲 治同前元氣虛弱者可服

歸尾 川芎 赤芍 防風 人參 木香 黃芪 桂心 桔梗 白芷 檳榔 厚朴 烏藥

紫蘇 甘草節 枳殼各四錢 右水煎服 血氣虛而自利者加熟附子 大便實者加酒大黃

連翹解毒湯 治同前亦係元氣素弱者可服

連翹 白芷 歸梢 川芎 牛蒡 甘草節 木通 穿山甲 芍藥 酒大黃 右水煎服

經加羌活防風 陽明經加升麻乾葛 太陰經加桂枝防風 少陰經加黃連五倍子木通 厥陰

經加柴胡青皮

十全大補湯 治癰毒已潰

歸尾 川芎 赤芍 生地 人參 赤茯苓 白朮 黃芪 桂心 白朮 連翹 甘草節 金銀花

右水煎服依前加引經藥

龍骨五分 貝母去心一錢 赤石脂 白芨 白芷各一錢 共研細末敷貼

生肌散 治同前

痘疹門三十四

方四

防風敗毒散幼科全書下同

治痘後癰瘡

升麻

葛根 赤芍 防風 甘草

右水煎服

苦參丸

治痘風瘡

苦參

山梔仁 防風 枳實 元參 獨活

黃連 黃芩 大黃 甘菊花

右等分煉蜜如豌豆

大每服五十九溫酒送下

花蛇酒

治同前

白花蛇一條 右蒸米一斗缸底先用酒麴次將蛇用絹袋盛之頓於麴上後用糜和勻頓於蛇上用紙

封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨爲末每服酒一盞加蛇末少許全服仍將酒脚并糟同苦參  
末等分糊丸服

大補湯

治痘後疳蝕瘡

人參

黃芪

當歸 川芎 白芍藥 白芷 官桂 連翹 甘草 牛蒡子

右水煎服

薔蒙花散

治斑瘡入眼

蟬殼九十八箇

薔蒙花酒洗 穀精草各五錢

夜明砂一兩 右爲末用獐猪肝一兩批破用本藥

一錢擦在內水煮熟飲汁食肝

涼肝散

治痘後羞明

當歸

川芎 柴胡 龍膽草酒洗

防風 薔蒙花 酒連

右爲細末用獐猪肝煮汁調服

大便閉用瀉青丸 目昏加蟬蛻夜明砂一錢

黃連解毒湯

治痘後下痢膿血

酒連 枳殼 歸尾 酒大黃 甘草 水煎服

和中湯 治下痢腹血已盡

人參 當歸 甘草 枳殼 木通 水煎服

調胃承氣湯 治痘後便下腹血

枳殼 酒大黃 檳榔末 甘草 水煎服

黃芩湯 治同前

酒連 酒條芩 當歸 川芎 甘草 木香 白芍 右水煎服 久不止加升麻 腹痛加酒大黃

四苓湯 治痘後泄瀉

即理中湯加猪苓澤瀉

陳皮竹茹湯 治痘後嘔吐

陳皮 白茯 黃連用吳萸同炒去吳萸不用 竹茹 右水煎服

知母解毒湯 治痘後邪實煩熱

知母 生地 石膏 地骨皮 花粉 升麻 酒芩 牛蒡子 甘草 右用淡竹葉爲引水煎服

黃芪調元湯 治痘後氣虛熱不退

人參 黃芪 甘草 當歸 麥冬 水煎服

桂枝解肌湯 治痘後外感風寒發熱

桂枝 赤芍 黃芩 甘草 萬根 柴胡 人參 右淡竹葉爲引水煎服

補中益氣湯

黃芪 人參 白朮 陳皮 枳實 神曲炒 麥芽 甘草 黃連炒 青皮 木香 右煎服

脾積丸 治痘後傷食腹痛

三棱醉煮 茂木醉煮 枳殼各四錢 良薑 皂角炒 百草霜 丁香各二錢 青皮三錢

雄黃一錢  
鬱金  
巴豆霜各二錢  
水煎服

保和丸 治痘後過食嘔逆反不能食以原物爲引

山楂一兩 神鞠 半夏 白茯 白朮各一兩 陳皮

連翹 蘿蔔子炒各五錢 右爲細末粥和

丸如黍米大米湯送下

集聖丸 治痘後疳勞

蘆薈 五靈脂 夜明砂淘 義术煨 陳皮 廣木香 史君子肉 川黃連炒 川芎翦 乾蟾炙  
焦各三錢 當歸錢半 青皮一錢 右爲末猪膽汁粟米糊共和爲丸

補中益氣湯 治痘後氣虛乍寒乍熱

黃芪 人參 白朮 甘草炙 柴胡炒 陳皮 青皮

調元生脈散 治痘後手足厥冷

人參 黃芪炙 甘草炙 麥冬 當歸 桂枝

右水煎服甚加熟附子

導赤解毒湯 治痘後神昏喜睡口多妄語下方同

木通 生地 麥冬 山梔仁 茯神 甘草節 人參

石菖蒲 右加燈心爲引水煎服

安神丸

當歸 山梔仁焙各一錢半 牛黃 黃連各五分

右共爲細末米湯調蒸餅以猪心和丸粟米大硃砂爲衣燈心湯送下

清神散火湯 治痘後毒發未盡火內攻心發搐

木通 麥冬 元參 黃連 梔子仁 甘草 右燈心引水煎研辰砂調服 大便閉加大黃 自利  
加人參

當歸桂枝湯 治痘後手足拘攣

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 甘草炙 桂枝 黃芪炙 蒼术製 黃藥酒洗 右水煎服 如感

寒骨節痛加羌活防風 如氣虛少加川烏引經再入人參

甯肺湯 治痘後欬嗽喘急

知母 牛蒡子 馬兜鈴 地骨皮 軟石膏 桔梗 甘草 杏仁 右水煎服 欽甚加貝母蜜炒

桑白皮 喘加葶苈子炒

五皮湯 治痘後表虛受濕腫滿

五加皮 蒼朮 桔梗 木通 桑白皮 薑皮 防風 猪苓 澤瀉 右燈心爲引水煎服

厚朴湯 治痘後腹脹如鼓目胞微腫

厚朴 陳皮 蒼朮 大腹皮 茯苓皮 猪苓 木香 右水煎服

葶苈子 傷於食者加神麃山楂三稜莪术枳實 喘加葶苈杏仁

萊菔子丸 治痘後虛腫

萊菔子炒五錢 胡椒用厚朴水煮臘乾一分 白术土炒一兩 右爲末湯浸蒸餅爲丸陳皮湯送下

導赤散 治痘後小便不利

木通 甘草梢 瞿麥 車前子 滑石 赤茯苓 右燈心引水煎服

潤腸湯 治痘後大便難

歸尾 生地 甘草 火麻仁研 桃仁泥 右水煎服 因於熱者加紅花酒大黃名涼血潤

腸湯兼用膾導法

人參生津散 治痘後作渴

人參 麥冬 天花粉 葛根 甘草 右水煎服 有熱加知母軟石膏 自利加白术升麻

黃芪湯 治痘後自汗

人參 黃芪 黃連炒 甘草 桂枝 水煎服

當歸湯 治痘後盜汗

黃芪 當歸 生地 麥冬 白芍炒 甘草炙 右用浮麥爲引用積瘡心以竹刀批開煮湯煎藥服

之

涼血地黃湯 治痘後吐衄

歸尾 生地 黃連 甘草 元參 山梔仁 右藕節柏葉爲引水煎服 鼻血加片芩茅根不止

加蒲黃炒

黃連止衄湯 治痘後吐衄

黃連 黃蘖 烏梅肉 人參 白朮 水煎服

蠶退散 治痘後走馬牙疳一名馬鳴散

尿桶近刮下以火煅令白 五倍子去蟲各二錢 蠶退紙燒存性一錢 枯礬三錢 右共爲細末先

以米泔水洗淨敗血後搽上 又方加銅青五錢杉木灰一錢

黃連除蠶丸 治痘後蟲食肛臟成狐惑證

黃連二錢 史君子肉一錢五分 川棟肉一錢 蘆薈 夜明砂

爲末烏梅肉洗去黑水杵膏和丸米飲送下

陰陽散 治痘後赤口瘡

黃連二錢 乾薑一錢 右共爲末先用地雞搗水洗淨敗血後用此藥搽上

硃礬散

治痘後白口瘡

硃砂二錢 白礬一錢 右二味同研爲末先以白鵝涎洗淨敗血後敷上此藥

洗心散 治痘後赤白口瘡

歸梢 生地 木通 黃連 麻黃 大黃酒洗 薄荷 牛蒡 桔梗 甘草 連翹 右用燈心爲

引水煎服

珍珠散 治同前

珍珠 片腦 元明粉 硼砂 人中白 槐皮 右等分爲細末以荆芥湯洗患處次吹前藥末於口

內

參苓白朮散 治痘後氣虛

山藥 青皮 山楂肉 廣木香 縮砂仁 陳皮各一錢二分 白茯 白朮各一錢 人參

神麴炒各一錢 右共爲細末湯浸蒸餅爲丸米湯下

有熱加訶子肉一錢一分

當歸益榮丸 治痘後血虛

當歸 川芎各二錢 黃連一錢五分 蘆薈 史君子肉各一錢 右共爲細末蒸餅丸米湯下

瀉肝散 治婦人痘疹初熱逢經水適斷神識不清妄視譖語

羌活 防風 當歸 川芎 柴胡 桔子炒 酒芩 木通

龍膽草酒洗 右用竹葉爲引水煎空心服

涼血地黃湯 治婦人發熱經水適來非經正期此毒火內擾血海急宜解之

歸尾 桂枝 生地 白芍藥

條芩酒炒 酒紅花 酒連 升麻

甘草 牛蒡炒 連翹

右水煎服

又 治婦人發熱經水正期而至四五日不止

當歸 川芎 白芍 生地 人參 酒條芩

升麻 甘草 白朮 右水煎服

瀉火越毒湯 治女人一向經閉茲值天行痘疹使毒氣不得拂鬱

川芎 歸尾 赤芍 木香 青皮 連翹 山梔

木通 甘草 枳殼 紅花 右燈心爲引水

煎服

十全大補湯 治女人一向崩漏氣血已虛時當痘疹難任其毒先宜服此

人參 白朮 甘草 當歸 川芎 白芍酒炒 生地 青皮 木香 黃芪 升麻炒 柴胡炒

桂枝 右水煎服

大補湯 治女子痘疹起發泡漿數日忽然經行恐血去裏虛而生陷伏急宜服之

人參 黃芪 甘草 桂心 當歸 川芎 生地 白芍 木香 青皮

右水煎服

當歸養心湯

治證同前兼聲音暴啞

調元內托散 治女子月事大來痘不起灌平塌灰白黑陷

黃芪

人參 當歸 桂枝 木香 青皮 赤芍 牛蒡炒 川芎 右水煎服 虛甚加熟附子

安胎如聖散 治孕婦痘瘡胎熱不安

條芩沉實者 白朮 歸身 砂仁連殼炒研 枳殼 甘草 大腹皮黑豆水洗三五次

桑樹上羊兒藤 右水煎服 初發熱加升麻葛根連翹 瘡出甚加酒連連翹牛蒡山楂 瘡不起發

加防風大力子白芍 渴加麥門冬知母天花粉

大補湯 治婦人痘出逢產

人參 當歸 黃芪 川芎 熟地 桂心 甘草 右水煎服 虛甚加熟附子 腹中不和有癩氣

加青皮木香

黑神散 治證同前兼小腹急痛恐有惡露須微行之

當歸

熟地 乾薑泡

桂心

蒲黃

木香

青皮

白朮 黑豆炒

香附童便炒

右水煎服

大補湯

治產後痘疹

人參

黃芪 白朮

當歸

熟地

白朮

白朮

官桂

甘草

木香

青皮

一方有川芎如

發熱加升麻葛根

出太甚加黃連牛蒡

虛甚加熟附子

自利加訶子

防風解毒湯

治斑疹初發

防風

薄荷 荆芥

石膏

知母

桔梗

甘草

牛蒡

連翹

木通

枳殼

淡竹葉

右水煎

服此溫煖之時以此辛涼之藥發之

黃連毒解湯 治同前

防風

荆芥穗 酒黃芩

知母 石膏

桔梗 酒黃藥

梔子仁

甘草炙

大青

元參

木通 右水煎服

此大熱之時以此辛寒之藥發之

桂枝解毒湯 治同前

桂枝 麻黃 赤芍 防風 荆芥 羌活 甘草 桔梗 人參 川芎 生勞 生薑 赤芍  
右水煎服此大寒之時以此辛溫熱之藥發之

升麻解毒湯 治同前

升麻 乾葛 羌活 人參 柴胡 前胡 生甘草 桔梗 防風 荆芥穗 牛蒡子 連翹  
淡竹葉 右水煎服此時緩時涼以此辛平之藥發之 王肯堂曰右方雖曰因時制宜亦不可拘泥如  
冬月亦有不宜麻桂而宜石膏者正當以脈證爲主耳若株守而不知通變必致有失不如用首二方  
之爲妥當也

麻黃散 治斑疹過期不出

升麻酒洗 麻黃蜜酒同煎 人中黃 牛蒡子 蟬蛻去土足翅 右水煎服

黃連湯 治斑疹毒熱熏蒸發汗遍身不止

黃連 麥門冬 生地黃 黃檗 黃芩 當歸 黃芪 右水煎去查調敗蒲扇灰服之

當歸 芽花 生地黃 山梔子仁 黃芩 右水煎調百草霜服

竹茹石膏湯 治斑疹作吐

陳皮 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 右作一服用水煎飲

猪苓 滷瀉

滑石 赤茯苓 治斑疹自利

猪苓 滷瀉

滑石 赤茯苓 治斑疹滯下

黃芩 黃連 赤芍藥 生地黃 木通 枳殼 甘草 人參 當歸梢 右水煎去渣服之初加酒

大黃與之微利

甘桔牛蒡湯 治斑疹咽喉疼痛

桔梗 甘草

連翹 牛蒡子

升麻

升麻

桔梗

川黃連 黃芩 黃藥各一錢 硼砂三分 乳香一分 兒茶 苦參各五分 右共爲極細末每用

五釐吹之臨時入片腦少許

人參白虎湯 治疹發欬嗽心煩

知母 人參 石膏 天花粉 葛粉 麥門冬 梗米 淡竹葉 右水煎以米熟爲度

化斑湯 治斑疹一齊湧出如朱紅成瘡

人參 知母 石膏 牛蒡子 連翹 升麻 甘草 地骨皮 淡竹葉 糯米 右水煎服以米熟爲度

益榮湯 治同前

人參 當歸酒洗 紅花酒洗 赤芍藥桂水炒 甘草 右水煎服

大青湯 治同前

元參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻 石膏 梔子仁 木通 右水煎調燒人糞服之 便閉者加酒炒大黃

化斑解毒湯 治疹出三四日不收

元參 知母 石膏 人中黃 升麻 大青 牛蒡子 淡竹葉 連翹 右水煎服 閉結加大黃

清熱除疳丸 治疹毒流連不退髮枯膚瘁漸成疳瘵

黃連 當歸各一錢 川芎 乾蟾頭燒各一錢 青皮 陳皮 龍膽草各一錢五分 史君子  
蘆薈各一錢二分 右共爲末神鈞糊丸米湯送下

當歸養血湯 治疹毒流連搗掣煩躁

當歸 川芎 麥門冬去心 木通 甘草 淡竹葉 山梔仁 煙心 準繩加生地黃 便閉少加  
大黃

黃連安神丸 治證同前

黃連 當歸 龍膽草各一錢 全蠍七箇 石菖蒲 茯神各一錢五分 右共爲末湯浸蒸餅吞猪心血爲丸硃砂爲衣燈心湯下

文蛤散 治瘧後走馬牙瘡

五倍子去蟲二錢 蟬退紙一錢燒灰存性 杜薑 雄黃各五分 右共爲細末以米泔水洗淨將藥敷上一日三四次以平爲度

化蠶丸 治瘺後脣瘡聲啞

蘆薈 史君子肉 龍膽草酒炒各一錢二分 黃連二錢 五靈脂 川棟肉各一錢五分 右共爲末浸烏梅汁爲丸滾湯下

雄黃散 治同前

雄黃一錢 黃藥二錢 膜香半分 右共爲細末先以艾湯洗之後敷此藥以平爲度

黃芩湯 治瘺毒流連利下赤白裏急後重晝夜無度

黃芩條實者 黃連 當歸 川芎 人參 木香 枳殼 檳榔 青皮 甘草 右水煎調益元散服

熱甚加酒大黃

門冬清肺湯 治瘺毒流連咳嗽百聲不歇

知母 天冬 麥冬各去心 石膏煅 糯米 桔梗 牛蒡子 貝母 甘草 杏仁 馬兜鈴 右

水煎服

煅麝服法 痘疹心

煅麝服法 下同

麝帶乾落安淨瓦上四圍以炭炙之止令烟盡勿使成灰取起以椀覆地良久出火毒 右研極細每

一分加辰砂半分共研勻再以生地一撮當歸一撮同煎濃汁小半杯調麝砂末敷於乳頭令兒食 乳隨一日內作二三次服盡永不生瘡疹

參蘇飲

人參三分 蘇葉 桔梗 乾葛 前胡各四分 陳皮 茯苓各五分 枳殼三分半 半夏二分

雙解散 卽防風通聖散合益元散

防風 川芎 當歸 白芍 薄荷葉 大黃 連翹 石膏 桔梗 黃芩各八分 白朮 荆芥  
桂枝各二分 滑石一錢四分 甘草一錢 右加生薑三片不拘時用

桂枝葛根湯

葛根 桂枝 升麻 赤芍 防風 甘草各一錢 右加生薑三片淡豆豉一錢不拘時用

連翹升麻湯

連翹 牛蒡子各一錢 升麻 葛根 桔梗 甘草各七分 木通八分 白芍五分 薄荷少許  
右加淡竹葉燈心煎用

三黃湯

黃芩五錢 黃連 大黃各二錢五分 右爲細末雪水爲丸菜豆大硃砂爲衣每服五七丸食前燈

心湯下

備急丸

木香一錢半 大黃 牽牛用頭末各五分 右爲末神麌丸每服五七丸食前山楂湯下

羌活湯

甘草四分 羌活 川芎 防風 龍膽草 山梔 當歸各八分 右加薄荷少許淡竹葉水煎用

勻氣散

木香 青皮各五錢 山楂肉減半 右爲細末每服一錢甘草湯調服

活血散

當歸 川芎各等分 右爲細末每服一錢紅花湯調服

快班散

人參五分 當歸 防風 木通各一錢 木香 紫草 蟬蛻各二分 甘草三分 右剉細水一盞

煎七分去滓溫服不拘時

奪命丹

麻黃 升麻各半兩 大力子 山豆根 紅花子 連翹各二錢半 人中黃三錢 蟬蛻 紫草各一錢半 右研細末酒蜜和丸辰砂爲衣薄荷葉煎湯下

消毒飲

牛蒡子 連翹 甘草 綠升麻 山豆根 紫草各等分 右剉細末一盞煎七分去滓溫服不拘時  
葛根解毒湯

葛根 天花粉 麥冬 生地黃 升麻各等分 甘草減半 右用糯米泔水煎入茅根自然汁一合  
服之

人參麥冬散

麥冬 葛粉各二錢 人參 甘草 升麻 白朮各五分 加粳米一合淡竹葉七片煎米熟用

白虎人參湯

人參二錢 知母三錢 甘草一錢 石膏五錢 粳米一合 訶子肉煨等分 右水煎米熟用 準

繩去訶子

五苓散

澤瀉一錢半 白朮 赤朮 猪朮各一錢 肉桂五分 右加生薑一片棗一枚水煎溫用

桂枝大黃湯

桂枝各二錢半 甘草五分 大黃一錢半 右加生薑一片食前煎用

三乙承氣湯

大黃 芒硝 厚朴 枳實各一錢 甘草五分 右加生薑一片食前煎用

黃芪建中湯

人參 黃芪 桂枝 白芍 甘草等分 右加生薑三片棗二枚水煎

肉桂五分 白芍 甘草各一錢 青皮 木香 枳殼各七分 連翹 山楂肉各五分 不拘時用

丁香脾積丸

三棱煨去皮毛 茴朮去皮炒 神麴炒各七分 青皮 巴豆霜 小茴香 陳皮各五分 丁香  
木香各三分 右酢調神麴糊丸每服五七丸生薑湯下

導赤散

木通 炙甘草 生地黃各等分 右加淡竹葉七片 一方加人參麥門冬

牛黃清心丸

黃連五錢 梔仁 黃芩各三錢 辰砂一錢半 鐘金一錢 牛黃一分半 右臘雪水調糊丸如黍

米大每服七八丸燈心湯下

十宣散 一名十奇散 一名托裏十補散

桂心三分 川芎 防風 甘草 白芷各五分 黃芪 人參 當歸各二錢 厚朴 桔梗各一錢  
每服一錢或二錢木香湯調下

十全大補湯

黃芪 人參 當歸 白芍 茯苓 生地 白朮各一錢 川芎 甘草各五分 官桂三分 右加  
生薑三片棗二枚不拘時用

甯神丸

人參 歸身 生地 麥冬各一錢 梔仁 黃連炒 炙草各五分 菖蒲三分 辰砂末二分 右加  
加燈心五分煎去滓調辰砂末勻食後用

黃芩湯

黃芩一錢半 甘草多一錢 白芍六錢 右加大棗一枚食前服如加半夏二錢生薑一錢卽黃芩加  
半夏湯

益黃散

陳皮一兩 青皮 詞子肉 甘草炙各五分 丁香一錢 右服一錢不拘時用

安神丸

黃連 歸身 麥冬 甘草 茯神各五錢 硃砂一兩 龍腦一分半 右和積猪心血搗勻丸如黍米大每服十九錢心湯下

茱連散

黃連五錢 吳茱萸二錢 右二味同炒研細每服五分生薑湯調下

橘皮湯

陳橘皮半去白半畱白炒一錢 半夏一錢 白茯苓一錢五分 右加生薑五分不拘時用

香連丸

黃連一兩以茱萸五錢同炒去茱萸不用 木香 陳皮各五錢 石蓮肉一錢五分 右加生薑五分不拘時用  
大每服二三十丸陳倉米湯下

瀉白散

一名瀉肺散

桑白皮 地骨皮各一兩 甘草炒半兩 右加粳米百粒每服一二錢食後用

葶藶丸

甘草 蕤黑牽牛炒 杏仁另研 漢防己各一兩 右爲末入杏膏取蒸陳棗和搗丸如麻子大每服  
五七丸淡生薑湯下

仙聖散

紫草 木通 甘草 黃芪 枳殼各等分 右加糯米一百粒水煎米熟溫用

紫草散

紫草 苓藥 當歸 麻黃 甘草等分 右水煎不拘時服

加味四聖湯

柴草

木通  
林晉

黃芪

川芎  
甘草

人參等分

蟬蛻十箇

右加糯米百粒蒸用

黑參

生地  
黑參地黃湯

丹皮

梔子仁各一錢半

甘草升麻五分

白芍一錢

右炒蒲黃五分煎用

麻黃

杏仁

甘草等分

石膏倍用

右加臘茶葉一錢

一方無石膏有桑白皮

當歸

生地黃

熟地黃

黃芪炙各一錢

黃芩

黃連

黃芩各五分

右剉細水一盞煎服

敗蒲散

一名止汗散

故蒲扇燒灰

每服三錢酒調下

荆防敗毒散

柴胡

甘草

人參

桔梗

川芎

茯苓

枳殼

前胡

羌活

獨活

防風

荆芥各等分

右

加薄荷葉五片溫用

胭脂塗法

升麻一味煎濃湯去滓

右用胭脂於湯內採出紅汁就以本綿蘸湯於瘡上拭之

苦參九

苦參一兩

白蒺藜

胡麻

牛蒡子各五錢

甘草二錢半

右酒糊丸竹葉湯下

減癰救苦散

蜜陀僧

滑石各二兩

白芷五錢

右末濕則乾擦乾則好白蜜調敷

茵陳熏法

乾茵陳

右研末搗棗膏丸

雞子大臘乾烈火燒熏

湯風化毒湯

防風

黃芪

白芍

桂枝

荆芥穗

牛蒡子

升麻等分

甘草減半

右加薄荷葉七片溫用

右加薄荷葉七片溫用

右加薄荷葉七片溫用

右加薄荷葉七片溫用

右加薄荷葉七片溫用

羌活救苦湯

羌活 白芷 川芎 防風 蔓荆子 桔梗 黃芩 連翹 升麻 大力子 人中黃各等分

右加薄荷葉七片食後用

消毒化斑湯

升麻 柴胡 桔梗 甘草 龍膽草 連翹 防風 蟬蛻 牛蒡子 密蒙花 右加淡竹葉十片食後用

柴葛桂枝湯

柴胡 葛根 甘草 桂枝 防風 人參 白芍各等分 右加生薑三片不拘時用

五積散

白芷 川芎各三分 桔梗一分半 芍藥 茯苓 甘草炙 當歸 桂枝 半夏各一分 陳皮 枳殼炒 麻黃各五分 蒼朮一錢 厚朴四分 右除桂枝枳殼一味別爲粗咀外十二味剉細慢火炒令轉色候冷同桂殼末加生薑三片水煎不時用

辰砂散

絲瓜近帶三寸連子燒灰存性此物發痘瘡最妙 辰砂一錢 右末蜜水調用紫草甘草湯調尤佳

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃檗 梔子等分 右水煎溫用

桂枝芍藥湯

桂枝 白芍 防風 黃芪 甘草等分 右加棗子二枚溫用

木香大安丸

木香二錢 黃連 陳皮 白术各三錢 枳實 山楂 連翹 神麴炒 萊菔子炒 麥芽炒 砂仁各一錢半 右神麴糊丸陳倉米湯下

蒼木一斤 大黃半斤 右細於放火爐中燒之不可間斷

洗肝明目散

當歸 川芎 防風 桔仁 龍膽草 柴胡 木賊 羌活 蜜蒙花等分 右末每服一錢淡砂糖湯下

蟬蛻散

蟬蛻去土淨 蜜蒙花 黑豆殼 菜豆殼 明月砂各等分 右末每用一錢以猪羊肝一片批開入藥末在內麻煥定米泔煮頻與食肝飲湯

七物升麻丸

川升麻 犀角屑 黃芩 砂硝 桔子仁 大黃各二兩 淡豆豉二升炒 右蜜丸黍米大凡四肢大熱大便難服之微利即止

當歸丸

當歸五錢 黃連一錢半炒 大黃二錢半炒 甘草一錢 先以當歸熬膏後以三味研末以膏和丸 胡椒大三歲以下十九七八歲二十九食前清米飲下漸加以利爲度

九味順氣散

一名勻氣散

白术 白茯苓 青皮 陳皮 白芷 烏藥 人參各五分 炙甘草一分半 木香一分半 右水煎用

馮氏天花散

天花粉 桔梗 白茯苓 詞子肉 甘草 石菖蒲等分 右末用半匙水調臨臥用

蟬蛻膏

當歸 蟬蛻去頭足 防風 甘草 川芎 荆芥穗 升麻 白芍各等分 右蜜丸如芡實大每服

養脾丸

一丸薄荷湯下

人參 白朮 當歸 川芎各一分半 木香 青皮 黃連 陳皮各一錢 砂仁 山楂肉  
神薑炒 麥芽炒各五分 右神薑糊丸麻子大每服三五十九陳米飲下

鼠黏子湯

鼠黏子炒香 歸身 炙甘草各一錢 柴胡 連翹 黃芪 黃芩各一錢五分 地骨皮 右空心  
用畢休與乳食

解毒湯

歸身 川芎 生地 白芍 人參 連翹 黃連 生甘草 陳皮 木通等分 右加淡竹葉十  
片不拘時

瀉青丸

一名瀉肝丸

羌活 大黃煨 川芎 當歸 龍膽草 防風 桔子等分 右蜜丸雞豆子大每服半丸竹葉湯同  
砂糖湯下

粉紅丸

一名溫驚丸

硃砂研飛一錢半 天竺黃五錢 龍腦五分 膽星四兩 脂肪一錢 右牛膽汁丸雞豆子大每用  
一丸小者半丸砂糖溫水下

實表解毒湯

黃芪 人參 歸梢 生地 白芍 甘草 片芩酒炒 柴胡 元參 地骨皮 升麻 加薄荷葉  
少許淡竹葉七片不拘時用 托裏快斑湯

黃芪 當歸 川芎 木香 青皮 紫草 連翹 木通 防風 牛蒡子 桂枝 蟬蛻 加淡竹  
葉十片不拘時用 托裏快斑湯

通關散

此藥通心經利小便

梔子仁 大黃炒各一錢 木通 生甘草

車前子炒

赤苓

瞿麥

人參

骨石各三分

蟬蛻明日散

蟬蛻去足翅 黃連 丹皮 地骨皮 白朮 菊花 蒼朮米泔浸各一兩 甜瓜子半斤  
龍膽草五錢 右服一錢半荆芥湯下臨臥用忌熱麪炒豆醬酢之類

紫草飲子

紫草茸 人參 白芍 蟬蛻去足翅 甘草 穿山甲土拌炒等分 煎五分作三四次溫用  
經驗方

白菊花 菜豆皮 穀精草去根半兩 右爲末抄一大錢用乾柿一箇生粟米泔一盞熬米泔盡將柿  
去核食之一日可食三枚用一月必效  
快班悅脾湯

黃芪炙 白芍 桂枝 防風 甘草 右加生薑一片棗一枚煎

桃仁承氣湯

桃仁二十箇去皮尖研泥勿煎 大黃二錢 官桂 紅花各一錢 甘草五分 右水煎七分去滓入  
桃仁化開食前用

酸棗仁湯

生地 炙甘草 桔子仁 棗仁去殼取仁 麥門冬 人參 歸身各等分 右剉細加燈心水一盞  
煎七分去滓溫服不拘時

排毒散

大黃一兩 香白芷 南木香另剉各半兩 穿山甲七片土炒 右共爲細末看虛實大小加減長流  
水煎沸調服

苡粉方

苡麥一味 磨取細麪痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲之絹袋盛撲此以襯臥尤佳

升陽解毒湯

當歸

升麻

柴胡

桔梗

甘草

蟬蛻

牛蒡子

藜蒙花

連翹

防風

荆芥穗各等分

右

剉細水一盞煎七分去滓食後溫服

四白減瘢散

白芷

白殭蠶

白附子

鷹矢石

蜜陀僧等分

右研末以水調搽面點神效

流氣飲

川芎

歸梢

白芍

防風

人參

蘇葉

木香

黃芪

桂心

甘草節

桔梗

檳榔

白芷

厚朴

烏藥

枳殼各四分

氣血虛而自利者加熟附子

大便實加大黃

小柴胡加生地湯

柴胡

人參

黃芩

生地

半夏各三兩泡

甘草二兩

右加生薑三片棗一枚煎二錢

簞衣湯

炊飯

簞衣

煮水洗隱起疮瘡神效以炊簞煮湯亦好

消風散

人參

羌活

川芎

炙甘草

防風

白茯

蟬蛻

厚朴

殼蠶炒

陳皮去白

藿香

荆芥穗

各五錢

右末每服二錢清茶下

小柴胡加枳桔湯

柴胡一錢

半夏麴

甘草各五分

人參

黃芩各二錢

枳殼

桔梗各一錢

加生薑三片每服

三錢

五皮湯

桑白皮

地骨皮

大腹皮

生薑皮

五加皮

右加燈心長流水煎

塌氣丸

木香五錢

牽牛二兩半生半炒取頭末一兩

檳榔一雙白者

右末神麴丸黍米大薑湯下

洗心散

當歸 生地 木通 黃連 麻黃 大黃酒洗 薄荷葉各等分 加燈心煎

化匱丸

黃連五錢 川椒炒三錢 苦棟根白皮乾二錢 右共研末用烏梅七箇艾湯浸去核搗爛丸艾湯下  
養血化斑湯

歸身

生地 紅花

蟬蛻

人參等分

右加生薑一片水煎

大青湯

大青 元參 生地 石膏

知母 木通

甘草 地骨皮

荆芥穗等分

右加淡竹葉十二片水

煎

柴胡橘皮湯

柴胡 橘皮 黃芩 半夏

人參 白芍等分

右加生薑三片竹茹水煎

柴胡四物湯

柴胡 人參 黃芩 歸身

川芎 生地 白芍

知母 麥冬 地骨皮 淡竹葉

右水煎不拘

時用

門冬清肺湯

天冬去心 麥冬去心 知母 貝母

桔梗 甘草 款冬花

牛蒡子 馬兜鈴

地骨皮 杏仁

右水煎食後用 準繩加桑白皮

安胎飲

條芩子實者酒洗一錢 白芍 歸身 白朮 大腹皮

人參各一錢 川芎 陳皮去白 紫蘇葉

黑豆湯浸酒洗淨臘乾各八分 甘草 砂仁連殼研各五分

右加糯米一撮水煎用

麥餽散外宗正科

治小兒痘風作癰疊成片甚則頑麻不知疼痛

小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內和 硫黃四兩

白砒三兩細末攪勻待冷取起加

烟膠半斤 共

研細末臨用葱湯洗淨用麻油調搽油紙蓋紮三日一換三次愈

此方治一切瘧疾及久瘧不退者取其水煎服之

生甘草一錢半水煎服之

白芷一錢半水煎服之

大頭風一錢半水煎服之

人參一錢半水煎服之

白芍一錢半水煎服之

白芷一錢半水煎服之

白芍一錢半水煎服之

痘疹門三十五

方五

溯源解毒湯

證治準  
繩下同

當歸身 川芎 生地黃 白芍藥 人參 連翹 黃連 生甘草 陳皮 木通各等分 右剉細加淡竹葉十片水一盞煎半盞去滓溫服無時

保嬰丹

紫草酒洗忌鐵 纏豆藤燒灰各四兩二味爲君 升麻取新者鹽水炒引下不使侵肺氣 防風  
荆芥穗去梗 牛蒡子炒研各二兩四味爲臣 天竺黃 蟠酥勿用赤眼者 牛黃各一錢二分  
硃砂麻黃荔枝殼煮過就湯飛研三錢四味爲佐 赤小豆 黑豆 菜豆各四十九粒炒三味爲使  
甘草梢去皮二兩半和 右各取細末和勻另用紫草三兩入水三碗煎去渣熬成膏半碗入生沙糖半  
碗和劑爲丸如芡實大另用飛過硃砂爲衣未出痘之先濃煎甘草湯每服小兒磨一丸大人二丸如  
已發熱之時生薑湯磨服厚蓋取汗多者可少少者可無大有神效

滋陰三寶散

當歸 黃芪 生地 白茯苓 芍藥 川芎 橘紅 甘草 防風 黑參 麥門冬二味加倍 右  
剉細薑棗煎

四製白术散

白术八兩分作四分一分砂仁炒一分糯米炒一分麸皮炒一分壁土炒 掣淨爲末量大小乳酒調服

四珍膏

人參一兩 蜜四兩 乳汁 梨汁同熬 右加製過紫河車酒服兩匙 衛元湯

人參 白朮 全蠍 山楂 半夏 當歸 橘紅 枳殼 烏梅 右薑棗煎加乳服 一方有蒼木  
白茯苓

內托至奇湯

天冬 麥冬 人參 白朮 當歸 茯苓 薏苡仁 川芎 陳皮 甘草 桔梗 銀杏

米煎頻服

茯神湯

生地 當歸各一錢 甘草六分 白芍藥 茯神 遠志 桔梗各八分 右加燈草薑煎服

野仙獨聖散

匾柏炒黑 黑參 地榆 血見愁 芍藥 歸身各一錢 生地黃二錢 木通八分 甘草 乾薑  
各五分

加減參苓白朮散

人參 茯苓 山藥 白扁豆 白朮 陳皮 蓮肉 蕙苡仁 當歸 防風 枳實 右剉爲散隨  
宜加減

固真湯

黃芪二兩蜜炒 酸棗仁四兩 人參 白芍 當歸 生地黃 茯苓 甘草 陳皮 右咬咀生薑  
煎服 一方加粟米一錢

籠金湯

木香 生地黃 白芍 紅花 當歸 甘草 白芷 土木鼈 橘紅 木通 桔梗 白朮 右加  
薑棗煎服

紫霞黃露飲

乾薑 半夏 蕃香 砂仁 枢殼 陳皮 豆蔻 白朮炒 青皮 右咬咀水煎服

龍旋散

艾葉

右煎服

貞元散

甘草

桔梗

人參

白芍藥

黃芪

茯苓

木通

紅花

白术

生地黃

白芷

升麻

陳皮

天花粉

右用燈草煎服

龍蟠飲

人參

當歸

枳殼

白豆蔻

丁香

木香

官桂

青皮

半夏

山楂

三稜

二蠶砂

厚朴

右用生薑酒煎服

穀精龍膽散

生地黃

紅花

荆芥

龍膽草

木通

甘草

赤芍藥

穀精草

白茯苓

鼠黏子

右加乾薑煎服

煎服

消導飲

厚朴

枳實

砂仁

山楂肉

半夏

神曲

檳榔

三稜

蓬术

丁香

右加乾薑煎服

磨積散

乾薑

陳皮

麥芽

二蠶砂

右加生薑煎服

浚牛膏

大田螺

右用葱鹽加少麝搗爛爲膏熱烘細絹攤貼小腹用手摩之

安裏解毒防風湯

防風一兩

地骨皮

黃芪

芍藥

荆芥

枳殼

鼠黏子

各等分

右爲末水煎四五錢服若能食

而大便實當歸丸微利之

參芪飲

卽保元湯專治元氣虛弱精神倦怠肌肉柔慢面青貌白飲食少進睡臥甯靜而不振者不分已出未出皆治

人參一錢 甘草五分初熱生用出定炙用 黃芪二錢 楊仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋爲元氣虛弱者立也後世治痘者多主之不分元氣虛實之異槩用於血熱毒壅之證是爲實證豈不悞哉 右用水一鍾薑一片煎四五分不拘時服 如前虛證辯認不差以此方爲主前後始終皆不可易中間雜證兼見雖或不同要皆氣虛所致則以本方而斟酌加減之毋得過投發散苦寒之劑初熱未出之際只可少濟以開提勻氣之功如桔梗川芎之類漿足之後助以收斂如白朮芍藥茯苓焉爾出不快加川芎官桂禁用蟬退鼠黏子人牙紫草 小便赤加大腹皮茯苓禁用車前滑石瞿麥山梔大便溏加白朮茯苓肉果禁用豬苓河子龍骨枯礬 小便短澀加大腹皮木通禁用滑石瞿麥 大便實祕加酒炒當歸禁用大黃枳殼生地 泄瀉加白朮肉果木香禁用龍骨石脂枯礬 嘴吐加乾薑丁香橘皮禁用半夏 煩渴加麥門冬芍藥五味子禁用天花粉葛根烏梅半夏 減食加白朮人參神鈞禁用山楂砂仁 傷食加神麌麥芽山楂禁用枳實蓬术三稜巴豆大黃 喘急在三四日前者加桔梗蟬蛻杏仁幼幼近編去蟬蛻加紫蘇 風則微散之加紫蘇防風 痰則從痰治加杏仁貝母 有虛證見者決非實喘不過是毒不得外達上乘於肺耳禁用麻黃萊菔子枳殼下氣等藥六七日後或先會泄瀉而後氣喘者虛之極也加人參則喘自止 腹脹加大腹皮厚朴兼發散開提禁用枳殼萊菔子寬中下氣等藥仍視小便祕與傷食否亦有傷於生冷或寒氣鬱遏而然從內傷外感而治 內傷用丁香官桂神麌木香 外感用防風等藥發散治之 當熱不熱四五日間手足厥冷冰硬不起加丁香官桂炙黃芪川芎夏月減丁香 四肢不起加防風減川芎 頭面不起加升麻 漿不足加白朮當歸川芎窮幼幼近編加木香官桂 灌水泡加白朮防風白芷芍藥幼幼近編加茯苓去黃芪 灌清漿加白朮茯苓幼幼近編加官桂 喘嗽加五味子杏仁麥門冬禁用天花粉桑白皮 發癢加川芎窮當歸芍藥白朮茯苓禁用殼蠶蒺藜 瘡甚外用茵陳燒烟熏之禁用沐浴發散之藥恐成氣脫 表虛倍黃芪 內虛倍人參 虛寒及血虛俱加桂 脚闊加芍藥 血滯加陳皮 餘熱不退加金銀花連翹 瀉不止加炒焦紅麌 陳三農曰痘證發熱即用蘇葛湯令其表

人參可用 脣破裂口乾不渴此係血燥肓歸湯加連翹或四物湯加蓮子 大便燥祕只宜養血爲主 痘因表藥太過遂至不發宜理中湯溫補其痘自然出盡 凡痘出不快禁用以毒攻毒之物蓋

毒藥入腹攻臟搗腑一時雖駕毒並氣血衝達肌表痘亦隨而起發少頃則中氣歸復不相接續藥氣少歇則毒反攻於內痘亦隨而內陷矣再將何藥以療之哉若不得已而用毒藥可急用參芪甘草肉桂以內托之慎勿令其既陷而後藥也

### 十神解毒湯

專治身發壯熱腮紅臉赤毛焦色枯已出未出二日已前痘點煩紅燥渴欲飲睡臥

不甯小便赤澑者此熱盛也並皆治之

歸尾 生地 紅花 丹皮 赤芍 桔梗 木通 大棗皮 連翹 川芎 荆芥 此方治血熱痘

疹以涼血行血爲主佐以桔梗川芎有開提發散之功引以腹皮木通有疏利熱毒之效臣以連翹丹皮有解毒之良用此以治血熱痘疹則內外分消熱毒雖盛庶幾解散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐驟用寒涼不惟冰伏熱毒反出不快抑且熱毒爲其所逼則鬱於臟腑或肚腹脹痛內潰而死者有之豈若此方用之爲當若不得已而用黃連芩藥亦須酒炒一以制其寒涼之性二以助其上行之勢借連翹以解毒耳 身熱壯盛加葛根前胡 痒盛綿密加荆芥鼠黏 渴加花粉竹葉滑石

小便赤加山梔 小便尿血加犀角山梔 大便黑加犀角黃連或桃仁 吐血乾嘔加黃連犀角

小便短澀加猪苓澤瀉 小便祕加滑石瞿麥 大便祕加枳殼前胡幼幼近編加蘇梗杏仁去前

胡 發紅斑加犀角黃芩黃蘚山梔元參 煩躁加天花粉麥門冬 大便祕喘加枳殼前胡大黃

煩渴狂亂譁語加知母麥冬石膏 嘔吐加猪苓黃連 咽喉痛加甘草鼠黏元參荆芥射干 泄瀉

加猪苓澤瀉防風 嘔加橘皮 腰痛加羌活獨活 腹脹喘滿目怒面浮毛直枯燥加麻黃 脣裂

舌胎祕結加大黃人屎 出不快加山楂牛蒡蟬蛻 腹脹加山楂史君子厚朴 腹痛因毒氣攻冲

加羌防牛蒡去生地 已上並用燈心十四根水煎服 血熱痘證熱毒蘊盛然毒氣無所分消只宜

重用升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血涼血之劑則痘雖稠密亦能消散自易漿而易化也所謂輕其表而涼其內此方蓋得安表和中解毒三

法盡善誠痘科之神方也丹溪曰熱者清之實者平之其此方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內外彌盛血熱之證悉具辨認不差並只以本方處治之切不得下參芪白朮茯苓補氣之藥於熱證未漿之前如悞而用之是以實攻實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變證百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁桂乾薑木香藿香調子肉果如悞而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥證必至咽疼狂亂失血便祕無所不至矣至於龍骨枯礬濕滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而閉之門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒之及至血疱已成氣血定位頭頂白光勢將行漿又宜易方另行別議

羌活散鬱湯 治實熱壅盛鬱遏不得達表氣粗喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡臥不甯大小便祕毛  
豎面浮眼張若怒並有神效并爲風寒外搏出不快者同治

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮 川芎 連翹 甘草 紫草 大腹皮 鼠黏子 右

爲粗散水一錘燈心十四根煎六分溫服 身初發熱及見點之際毒氣壯盛外爲風寒所抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒壅遏於內爲腹脹爲喘急爲祕結爲狂煩爲驚搐爲失血皮燥毛直面急眼張睡臥不甯驚啼多哭此熱毒壅遏證辨認不差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不壅而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提勾氣之能荆芥連翹鼠粘善解鬱熱地骨皮消壅熱於筋骨之間且能肅清臟腑紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治熱壅之證效大而功用極妙若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱爲寒氣所抑不得伸越逗遛經絡爲疽爲癰者有之冰伏硬閉者有之至於人參黃耆白朮茯苓溫補之劑誤用則共壅盛禍不旋踵他如丁桂木香薑附之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依後法而加減之 初發熱壯盛腮紅面赤毛焦皮燥咳嗽喘急者加升麻 煩渴加天花粉乾葛 腹脹喘急鼻塞面赤若怒毛直及枯加麻黃 便祕加當歸枳殼甚則加大黃 嘔吐加猪苓澤瀉橘皮禁用生薑木香丁香半夏 洞泄加升麻禁用白朮茯苓豆蔻龍骨等劑 嘴渴惡風加桑皮紫蘇 失血加犀角地黃黃連 發斑加黃芩

幼幼近編加鈎藤  
不思飲食加山楂  
不快利加鼠黏子  
山楂蟬退名透肌散  
煩紅赤色加生地黃  
紅花牡丹皮去白芷  
防風皮急肉緊身熱壯甚加葛根前胡  
見點三日之內並依本方加減及三日之後痘疹出齊血泡已成而前證悉平不得復用此方恐發散太過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從血熱痘證法而裁治之故此方不立禁忌辯

太乙保和湯

又名紫草透肌湯專治血熱痘證服十神解毒湯後熱證悉去內外和平惟見點不易長大用此保和元氣活血解毒助痘成漿易癒易落也

桔梗

紫草

川芎

山楂

木通

人參

紅花

生地黃

甘草

糯米五十粒

右用燈心七根

薑一片水一鍾煎六分溫服

便瀉腹脹加大腹皮

繁紅不潤加當歸

蟬退幼幼近編加滑石連翹

出不快加鼠黏子

陷瘍加酒炒黃芪

痛加白芷

不勻加防風

水泡加白朮芍藥

嗽加五味

子麥門冬

渴加麥門冬

痒加白朮芍藥

七八日後漿足

身復壯熱便祕

煩渴腹脹喘急前胡枳

殼湯漿足禁用

此方另立湯飲在後

益元透肌散

專治壅熱痘證服羌活散鬱湯後壅證悉開氣血和平見點三四日後不肥大不成

漿者用之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿而易結膿窠也加減與保和湯同論漿足之後另有保嬰百補湯在後

卽太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠黏子陳皮

右水一鍾加燈心十四根棗一枚煎六分溫服

保嬰百補湯

專治痘瘡八九日漿足之後別無他證並以此方調理氣血資養脾胃不拘實熱二

證皆可服之惟氣虛證八九日後本方加黃芪二錢官桂少許若有別證在審虛實隨證加減而

已

當歸

芍藥

地黃

白朮

人參

茯苓

山藥

甘草

右水一鍾棗一枚煎六分溫服

祕傳八味二花散

桃花蕊 梅花蕊二味不拘多少預取陰乾

紫河車洗去筋焙乾爲末一具

鹿茸去毛酥製

天靈蓋一具以皂角莢煎湯洗淨酥製爲末

人參

穿山甲取四足者酒炒 砧砂水飛過

右各預

取另爲末痘疹未出之先以硃砂一兩爲君梅花一錢桃花三錢共一處和勻每服五分或三分或二

分半用雄鷄與酒二杯灌之與食倒懸刺血入杯中以熱酒調前藥同服

初發不起以梅花一兩爲君加桃花一錢天靈蓋五分

氣血虛不能灌漿以鹿茸一兩爲君加天靈蓋一錢鹿茸一錢五分梅

花一錢桃花一錢或八分 黑陷不起以穿山甲一兩爲君加桃花一錢梅花八分天靈蓋七分麝香五分

人參一錢 氣血虛不能收屬以鹿茸一兩爲君加紫河車一錢桃花一錢梅花八分天靈蓋七分麝香五分

氣血虛不能灌漿以鹿茸一兩爲君加天靈蓋五分桃花七分梅花九分 落屬之後癬

色白氣血虛以人參一兩爲君加紫河車一錢鹿茸一錢梅花一錢五分 以上咸倣首條服法

保生散

紫河車製如前 龜板酥炙 鹿茸酥炙各一兩 右爲末量兒大小用血虛川歸茯苓紫草湯下氣虛

人參黃芪甘草湯下

荆芥散 治癰痘子兼癰癰或癰瘍大便自過

荆芥

右用少許爛研以新井水將布帛濾過入一滴許麻油打勻令飲之便不亂悶癰痘已出用黃蠟

煎青膠水飲卽安

青膠水乃牛皮膠也 荆芥治血風癰子是疹子常言風癰癰瘍則皆出皮膚其毒輕而浮又以

麻油打勻此滑痰之理又以黃蠟煎青膠水服則安此滋血行榮衛榮衛既順癰瘍出矣指迷方荆芥

湯乃消毒飲加薄荷煎服之

羌活散 解熱散毒治風壅欲作瘡痘者

羌活 獨活 川芎 桔梗 蟬退 前胡 柴胡 地骨皮

甘草炙 瓜萎 天麻炙

荆芥

防風各等分 右爲細末每服二錢水三分盞薄荷三葉盞內煎至二分通口服量大小加減藥水此藥

詳其藥味治風治寒治驚下痰涼脾治血熱透肌但實熱發無所不治如稟受怯弱或脾弱或外熱目

白睛青色皆裏無熱不可輕用

薄荷一兩 麻黃去節 甘草各半兩 右爲細末每服二錢水一中盞棗二枚生薑三片同煎至六分去渣放溫日三兩次服此是小兒裏受壅實毒氣甚者宜服之蓋此方云小兒纔覺是疹痘便服之服之而汗出者服調中散服薄荷散若作寒熱脈反遲者進脫齒散以溫之詳其理非下藥之法也實者服之未必安虛者用之必危殆

羌活散 此方初熱暫用兼治驚搐  
羌活一錢二分 獨活 荆芥各八分 前胡 防風各一錢 柴胡 香白芷 蟬退去土 甘草各四分 細辛一分 右加薄荷三葉水一鍾煎五分不拘時服發搐及熱盛不退者暫服煎熟用製砂調下治搐如神

正氣散

甘草炙三分半 陳皮 薤香 白朮各五分 厚朴 半夏俱薑製各一錢半 右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服

調解散

青皮 陳皮 枳殼炒 桔梗去蘆 人參 半夏湯泡七次 川芎 木通 乾葛各四分  
甘草 紫蘇各二分 右俱細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服一方加紫草糯米

疏解散

治痘初壯熱頭疼腰痛腹疼作脹一切熱毒甚者

紫蘇 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬退 紫草 升麻 牛蒡子 木通 甘草各等分 右加燈心葱白各七根水煎熱服

和解湯

解表和中

升麻 乾葛各一錢半 白芍藥一錢 人參 防風各七分 川芎八分 甘草五分 右用薑一片水煎服 以上方乃發表平劑

四物解肌湯

卽陳氏升麻黃芩湯去甘草

芍藥 黃芩 升麻 葛根 每服四錢水一盞煎至七分去滓服或云小兒傷寒疫癘潮熱瘡疹五日已衰疑似不能辯別者並皆辛涼之劑調之卽以四物湯解肌之類 海藏云此論卽有表也若內傷腹中有物未得大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯比錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

防風蒼朮湯

治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出可解表發斑疹

防風

甘草炙各半兩 蒼朮 石膏各一兩 川芎 黃芩各二兩 右爲粗末每服二錢加生薑三

片薄荷七葉水煎日二服

葛根橘皮湯 治冬溫未卽病春被積寒所折不得發至夏熱得其寒解冬溫始發肌肉斑爛癰疹  
如錦紋而欵心悶但嘔吐清汁服此

葛根 橘皮去白 杏仁去皮尖 知母 黃芩 麻黃 甘草炙 右剉散等分每服抄三錢用水一  
盞同煎半盞去滓溫服不拘時候 以上四方辛涼之劑表有實熱者宜之

加味四君子湯

人參 白朮 茯苓 砂仁 橘紅各一錢 甘草五分 水一鍾煎六分食前溫服

和中散

厚朴薑製錢半 人參 白朮 茯苓各一錢 乾薑泡 甘草炙各六分 薑棗煎服

六一散 治諸熱證暫用陳氏云治痘疹初起煩躁作渴等證

桂府滑石水飛過六兩淨 大甘草去皮爲末一兩 右和勻每一錢薄荷湯或冷水調下 內加製辰

砂三錢名辰砂六一散治狂言發搐驚悶用防風荆芥薄荷天麻煎湯候冷調下 更加牛黃三錢纏

豆藤三錢名退火丹治痘初出時大熱不退及標影稠密成片者 用紫草木通蟬退地骨皮紅花牛  
蒡子片黃芩燈草各等分煎湯候冷調下能減標稀痘極良法也本方加鬱金名牛黃六一散治痘後  
瘡癰毒壅及天行瘟疫冷水調下多服大效 全書云痘疹腥臭用蜜水調敷焦痛入胭脂水同敷又

白滑石飛過三兩 雄黃飛過三錢 辰砂研飛二錢半 牛膽黃 水片各一錢 麻香五分 右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷燈草牛蒡子紅花紫草黃連各三錢水二碗煎至半碗細絹

濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和前藥丸如小龍眼大金箔爲衣每用一丸燈心湯下暑月冷水化下

小無比散 治痘壯熱口渴小水澀大便祕口氣熱煩躁不甯或焦紫或紅斑自發熱至起壯時有熱者皆可用痘後餘毒亦可用

桂府滑石飛過六兩 石膏飛過一兩 粉草 寒水石各五錢 鐵金甘草湯養乾爲末七錢 右俱製淨末和勻每五歲者服一錢大人再加 冬月燈心湯下 夏月井水調下 热甚不解者井水磨犀角汁調下 若紅紫頂陷不起加穿山甲末一分麝香半分紫草煎湯加酒一二匙調下卽起

大無比散 治熱毒太甚驚狂譖語引飲痘瘡紅紫黑陷

桂府滑石飛過六兩 粉草一兩 辰砂飛三錢 雄黃飛一錢 右爲末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗毒散調下亦能稀痘 若報痘後用燈心湯下

玳瑁湯 治時行豌豆瘡及赤瘡疹子未發者令內消已發者解利毒氣令不太盛

生玳瑁 生犀各以冷水濃磨汁一合 右同攪令勻每服半合微溫服一日三五服爲佳又治出而未快者宜服之又云毒氣內攻紫黑色出不快用玳瑁水磨濃汁一合入獵猪心血一皂子大以紫草濃煎湯都作一服服之玳瑁犀角其性微寒以治熱毒則知其無失也二藥皆治瘡疫疎瘡解百毒通血脈消癰腫故用之以解蘊毒可多服也又名二寶散治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂語二味磨汁頓服卽愈

犀角飲子 解熱毒去風疹

犀角 甘草炙各半兩 防風二兩 黃芩一兩 右爲粗末每服五錢用水一小盞煎至半盞去渣溫服不拘時候 一方加牛蒡

犀角湯 治小兒痘疹瘡及赤瘍子

犀角屑 大黃炒 桑白皮蜜炙 鈎藤鈎 炙草 麻黃各一兩 龍膽草半兩 石膏 瓜萎

黃芪炙各半兩 右爲粗末每服一錢水一小盞煎至四分去渣溫服量兒大小加減服 瘡子退後濃  
磨犀角水塗之更良錢氏亦附方同以此藥治療瘡疹太盛令不入眼則名調肝散此藥治風盛氣實  
心肝血熱津液內燥大便不通毒氣上盛表熱未散之藥也且大黃瓜萎治內燥鈎藤龍膽治風血熱  
桑白皮石膏治上焦熱麻黃黃芪散肌熱犀角甘草解毒大抵用藥貴於與病相主治則病去而正氣  
自復苟爲不然則反爲大害如犀角湯自非大便數日不通喘急悶亂煩躁譫語者豈可服之恐病藥  
不相主治也

奪命散 治瘡疹已發未發並宜服之

升麻 糯米 紫草 甘草各半兩 木通二錢半 右剉爲散每服一大錢水七分煎四分去渣溫服  
出瘡疹熱毒勢甚者可服解蘊熱利小便瘡痘初發氣盛亦宜服

牛蒡散 凉血解毒

牛蒡子 右用炒爲末水煎一盞服之小兒冬月有非節之煖及春月天氣暄暖或甘肥之過或重衣溫  
厚幃帳周密傷皮膚害血脈瘡發黃是生多疾宜豫常服之也又名鼠黏子湯炒熟爲末同荆芥煎  
服

獨勝散 治小兒發瘡痘早微熱晚大熱目黃脅動身熱手冷發甚如驚者又名牛蒡殼蠶散

牛蒡子半兩 白殼蠶一分 右爲粗末每服一大錢水六分盞紫草二七寸同煎至四分盞連進三服  
其痘便出此藥用牛蒡子出癰透肌白殼蠶治遍身瘡疹疼痛成瘡爲末酒調服之立瘥又以紫草煎  
之令利敷是瘡疹證無虛寒證者服之立出也

解毒疏痘湯 豫服解熱去毒已出解熱毒斑疹又治紅紫口乾壯熱譫語

防風 荆芥 羌活 柴胡 川芎 白芷 當歸 連翹 黃芩 黃連 鼠黏子 紫草 蟬退  
右薑葱水煎服

安斑散

調理清疹

升麻

赤茯苓

羌活

黃芪

人參

桔梗炒

枳殼炒

甘草各等分

右爲細末每服一錢水

七分盡紫草薄荷少許同煎至四分盡去渣放溫服之量兒大小加減此藥爲解毒涼血生肌寬腸導熱利小便快膈之藥也患瘡疹有熱無寒者可服之

西來甘露飲 清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不退痘色紅紫口渴大便結燥服之卽能紅潤亦治疹家煩熱口乾欬嗽疹色枯燥或譖語喘急睡臥不安

絲瓜藤霜降後三日近根二尺剪斷將根頭一節倒插入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵飛入次日以好新鑊一隻將瓶中之汁傾在鑊中仍將藥照前插入阱內三日後汁收盡將鑊封固收藏聽後取用若發熱煩躁口渴未見紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃攪絲瓜藤汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕 若已見標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯衝服便見紅潤 若夾斑者犀角紫草茜根煎湯衝服寒月用酒煎衝服 蓋此汁極能解毒清熱尤治天行時疫每以生薑汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁 專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等證以此汁清而補之其效立見

卽紫河車不拘男女初胎者尤妙入新瓦罐內封因其口上以椀覆埋於土中久則化而爲水是也 氣虛甚者人參紫草煎濃湯衝入服之

托裏快班湯

當歸

黃芪

川芎

木香

青皮

牛蒡子

紫草

連翹

木通

防風

桂枝

蟬退

右剉細

清裏退火湯

治痘帶熱而出名爲火裏苗急用此方退其熱則後無青黑變陷之候

地骨皮

地膚子各一錢

牛蒡子

紫草

乾葛根各八分

連翹六分

川當歸五分

木通三分

蟬退二分

右加薑

一片水煎服

如熱不退再服

一劑或爲末燈心湯服

加減調中湯

人參 白朮 黃芪 甘草炙 木香 桂枝 白茯苓 蔴香 白芍藥酒炒 陳皮 右用生薑爲引煎服

犀角消毒散 治斑疹丹毒發熱痛痒及瘡疹等證

牛蒡 甘草 荆芥 防風各五分 犀角二分 金銀花三分 右水煎熟入犀角領出服

麻黃甘草湯 治表實痘毒焮盛稠密

麻黃 生甘草 右水煎服

田氏調肝散 治瘡疹太盛令瘡不入眼

生犀一錢半 草龍膽 麻黃 鈎藤鈎各一錢 黃芪 桑白皮炒黃 石膏各半兩 大黃  
瓜萎仁去皮 甘草炒各二錢 右爲粗末每服三錢水煎食後溫服微利效

龐氏地黃膏

生地黃四兩 豆豉半升 雄黃一錢 麝香半錢 右以豬膏一觔和勻露一宿煎五六沸令三分去  
一絞去下雄黃麝香攪勻稍稍飲之毒從皮膚中出即愈

透肌湯 治痘不透

紫草 白芍藥 升麻 秋米粉炒各半兩 右三方皆化毒湯加減法也

人參竹葉湯 治夏月吐逆煩躁口渴心悶不甯及疹後餘熱不退小便赤或赤斑者

人參 半夏 麥門冬 當歸 淡竹葉各等分 右剉散每服三錢水一盞生薑一片煎服

白虎湯

石膏四兩 甘草節八錢 知母一兩六錢 右爲粗末每服三錢水一盞粳米二十粒同煎至半盞去

滓溫服不拘時加入人參一兩二錢名人參白虎湯聖惠方加乾葛

紫草散 治發斑疹

鈎藤鈎子 紫草茸各等分 右爲細末每服一字或五分一錢溫酒調下無時

四聖散 治瘡疹出不快及倒臍一方有黃芪

卷之三 痘瘍最要大小分臘銀丹四聖散用木通枳殼極好若大小流利不必苦泥

紫草廻斑散 治小兒痘疹出不快或倒臍毒氣入腹

少許同煎服

紫草木通散 治小兒痘疹

紫草 木通 人參 茯苓 糜米各等分 甘草減半 右爲末每服四錢水煎此小便不利之劑也

人參 蟬蛻散 治小便不利痘瘡不散煩躁多渴憂牙咬齒氣粗喘滿

人參 蟬蛻 白芍藥 木通 赤茯苓 甘草 紫草各等分

右用水煎服

透肌散

紫草 木通 綠升麻 粉甘草各一錢 右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂陷者

紫草一錢 升麻 木香各五分 牛蒡子 防風 荆芥 黃芪各八分 甘草三分 右薑水煎服  
如色紫腹痛加蟬退一錢

烏金膏 治發熱至七日已前或因風寒痘不起發或紅紫或驚搐俱可用

殭蠶酒洗 全蠶去足尾酒洗 甘草 紫草 白附子 麻黃各五錢 穿山甲炒末二錢半 蟬退

去頭足酒洗淨二錢 右爲末將紅花紫草各一兩好酒二鍾熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成珠爲度丸如龍眼核大每服一丸燈心湯化下

紫金散 治痘瘡出不快及倒臍亦治遠年不愈惡瘡

紫草 蛇退炒焦 牛蒡子炒各五錢 右爲細末每服一錢水半鍾煎減半溫服

蘿蔔湯 治痘疹出不快者

開花蘿蔔 右用煎汁時時飲之蓋痘疹氣勻即出快蘿蔔治嗽定喘下氣消脹解毒

野通散 治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞卽獮猴糞火燒存性爲末 黃冰片 黃麝香各等分 右爲細末每服五分看大小用新汲水入蜜調下十歲以上者服一錢 按野人糞治蜘蛛咬瘡此治痘出不快大效若蜘蛛咬瘡久而不愈其絲生皮膚延蔓遍身不愈者加雄黃青黛水調以蜘蛛試之立化爲水屢驗蓋此二味是治瘡疹當用之藥取山中者若人家所養之猴食物味雜卽不效失其真也

祕傳大透肌散

人參 芍藥 川芎 甘草 茯苓 白朮 木通 陳皮 黃芪 糯米 右各等分爲粗散每服四錢水煎服

祕方

兔絲子 右一味酢浸一宿焙乾爲末發熱時每一歲兒服七分量兒大小加減好酒調服甚易發易脹易屬且後無餘證 此方氣血弱者未出之先可用既出之後不可用用則托出太多 此方係胡黃谷祖仰山公宦遊廣東得之用者百發百中但元氣厚者服之不免太密乃大補助火故也或曰痘未出之先既可服此又奚取於保嬰丹乎殊不知保嬰以解毒而便稀之此則氣血弱不能出服此而托之使出也

又

臘月梅花 右將開時採曬乾爲末煉蜜爲丸未出之先量兒大小三四服可令痘稀加硃砂尤妙

二花散 治痘疹已出未出不發不起隱在皮膚之間熱證並治

梅花一兩陰乾 絲瓜陰乾 桃花各五錢陰乾 硫砂二錢水飛過 甘草一錢去皮火煅 右爲細末每服五分半未痘時蜜水調下 服前藥仍不快無諸惡候者可服八味二花散

通天散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參 陳皮 桂枝各八分 川芎 熟地黃 芍藥各一錢 當歸 紫草各一錢半 紅花

廣木香各三分 生甘草六分

知母八分

荔枝殼十箇

右用鷄汁一盞蜜三枚搗糯米一撮煎服初

十補散 滋養氣血調補脾胃能使瘡毒速出有寒證者用之加紫草木香糯米名參芪內托散

黃芪

人參 當歸各一錢

厚朴 桔梗

川芎 防風 白芷

甘草各一錢 桂心三分 每服

四錢水煎服或爲末溫水調下一錢五分

藍根散 治瘡疹出不快及倒壓二聖散救小兒垂死

板藍根一兩 火甘草七錢半 右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後調下無時甚則

三五服立效丹溪云藍能分散敗血

絲瓜散 發瘡疹最妙

絲瓜連皮燒灰存性 右百沸湯調下或以紫草甘草煎湯調服尤佳米湯亦可

甘桔加梔子湯 治痘疹煩不得眠

桔梗 甘草 梔子 右各等分煎服

阮氏萬全散 治痘瘡出不紅潤

防風 人參 蟬蛻各等分 右細切每服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分溫服 热而實者加升麻

化毒湯 治痘已出而熱毒未解宜清熱涼血毒一解不致黑陷血一涼不致紅紫

紫草 升麻 甘草 蟬蛻 地骨皮 木通 黃芩酒炒 右各等分水煎服

解毒散 治痘先發腫者名爲痘母後發者十有九死先發者吉

金銀花五兩 甘草一兩 木通 防風 荆芥 連翹 牛蒡子各三錢 右用酒水各一錘煎服

如瀉加荳子豆蔻 痘紅者加炒黃芩芍藥 瘡痒者加歸身生地或加何首烏尤佳 疼痛者加赤

芍藥

露桃花散 痘形一兩日梟紅罩錦或色焦紫惡渴煩躁睡臥不甯再不宜以藥下之準服露桃花

散自然紅活

露桃花 紫草 紅花 白芍藥加倍 木通 生地黃 茯苓 甘草 橘皮 右用燈草煎服 露桃花

桃花性陰而和陽取時須待將開含笑清晨摘取飯鍋上蒸熟焙乾帶蒂入藥不宜多用多用則恐作  
瀉若不預收多加紫草草芍藥可也

黃連解毒湯 痘出三兩朝身中熱焰焦紫無紅活色梟炎猛烈之甚也或眼紅臉赤或小便澀結

須服黃連解毒湯加減犀角地黃湯可也

黃連 生地黃 芍藥 甘草 水通 車前草 犀角 或去殼蠶翬芥加紫草草燈心 热甚加柴胡地骨皮 飽脹加全瓜蔞枳實山楂 氣弱不用枳楂  
加減犀角地黃湯

犀角 木通 生地黃 芍藥 紅花 紫草 茯苓 車前草鮮者 地骨皮鮮者 甘草 水煎服  
犀角須用井水磨濃俟藥煎如度投下服之不可和內煎也若身熱驚厥加紋銀一塊同煎蓋因肝木  
旺而心火炎上故金以尅之耳

五龍湯 痘一見形就是蚊蚤咬的形者是痘毒緊轉心肝二經而然也極是犯君痘經云臣陵於  
主逆天條有福兒童驚地逃總然和順成功去也在刀山走一遭好把化斑湯浴之內服五龍湯  
黃連 紫草草 芍藥各三錢 生地黃九錢 煎濃水磨犀角汁和服 王氏治此多用大黃湯下之  
徹逐其毒隨用升表之劑固爲美法下後不能提峻速致其死不若五龍之爲妥也

化斑湯

金線薄荷 大水楊柳 荆芥 蒼耳草 四味共煎濃去渣將頭髮涼湯洗去油垢團攏將熱湯徐徐  
浴之必須置之緩處外再服前藥斑去而痘自鼎峻矣

四仙散 痘起遍身俱是黑色論備載在前矣要是元癸奪權爭先如青天晴極而雲霧靜水風動  
而波浪行第一奇痘也只以化斑湯浴之於外而內服四仙散自然色變而爲美矣

甘草紫草與通草三般遇此多是寶黃連翬與石蓮二味合浸共一炒研末惟在空心時砂糖調服最  
時好 此痘得者甚鮮非富貴之至者不能見此若見形而盤縷失天元者不在此例 按此即所謂鴉

庫角一錢 川黃連各一錢爲細末

冰片三分另研

濃煎甘草湯或建糖調服大者五分小

者再減 此方屢治痘焦者恆獲速效但犀角人不諳用法必須粗礪瓦盤井水磨之待澄淨去水刷於綿紙上略有乾燥方和前藥用之若以鐵器剗下細末犀不漬水則不效

涼血解毒湯 痘出熱不退紅不分地或痘苗乾枯黑陷急用此方可起壯灌漿

紫草一錢 生地黃 柴胡各八分 丹皮七分 赤芍藥 蘇木 防風 荆芥穗

川黃連 木通

各三分 牛蒡子四分 天麻 紅花 甘草各二分

右用薑一片燈心二十根糯米百粒水煎服

加味犀角飲 痘已出不勻心煩壯熱口舌生瘡

犀角 牛蒡子 荆芥 甘草 防風 升麻 桔梗

麥門冬 水煎服

神應膏 治痘瘡人眼一名黃藥膏

黃藥一兩 真茱豆粉一兩半 甘草四兩

紅花一兩 右爲細末用胭脂水和蜜水調塗兩眼四畔

之瘡痘上則不入眼 如瘡疹已出右爲細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之日三兩次如早塗瘡自不至面縱有亦少

按全書先將黃藥甘草二味研細末另收用新汲涼水三盞浸茱豆一晝夜去豆不用以浸豆水煮紅花約減至二盞去紅花方入前末慢火熬膏於眼眶上下四旁塗之則瘡不入眼矣 彭氏云痘疹護眼人多用胭脂據尤醫云不如錢氏黃藥膏最好諸家護眼法無出此方也

胎元散 痘不起發不紅活是血氣俱虛

胎元 右焙乾爲末加麝香少許酒調服二五分

獨參湯 治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清不滿或結痂遲緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿水不乾或時作癢或畏風寒

人參 右用好者一兩生薑五片大棗五枚水二鍾煎八分徐徐溫服嬰兒乳母亦服

祛邪湯 痘號天花最忌諸穢臭惡血五六朝間痘本美麗鼎峻而一時失防或觸於腥血感於穢臭倏忽更變外宜祛邪湯浴之而內服玉樞正氣丹可也

鷄毛拔細軟者 升麻 荆芥 木通 紫蘇 荔枝殼 水楊柳 右用水煎濃去渣洗浴

玉樞正氣丹

玉樞正氣神功捷生地紅花並甘桔參芪須倍橘紅扛蟬退防風須愛覓寅谷相朝嫩桃杪五箇和薑甘草列煎濃投酒服須臾不覺痘自還元吉

廻陽丹 治痘瘡不起此方用於四五朝前其效甚速若用於六七日後則噬脣矣

彌月將生胞羊一具 右用酒洗淨隨用黃麻纏攏一團把臘糟裹外置新瓦上四圍炭火炙之俟其外糟焦了如墨樣削去其糟再焙乾另爲末入官桂末丁香末各五錢人參末一兩木香末三錢再研極細升麻煎酒漿調服十歲以上服二錢十歲以下服一錢十五歲以上服三錢年多服多年少服少加減而用無不獲效若加大附子一兩去木香則爲附子廻生丹胞羊須預囑屠肆遇便收製若特殺傷生大不祥

不二散 一名蓮肉散治痘當起脹灌漿時泄瀉不止以此止之只一服愈如服此不已是元氣已脫不可爲

蓮肉炒去心一兩 真鷄片三錢另研 右各取淨末和勻每服三四分米飲調下 此方不但止瀉亦

治煩癢二證夫固大腸之滑脫易知也斂心火之浮游難知也

鷄鳴散 男女發熱二四五日或痘未形或痘形隱隱或纔形於外而不能快利或煩躁譖語或腹疼嘔吐或痰喘惡渴急服此藥則毒自表出矣

炒木 當歸 川芎 甘草 大力子 茯苓 木通 桔梗 蟬蛻 升麻 橘紅 山楂 紅花

燈草生薑煎臨服入雄鷄血并酒妙

震蟄丹 小兒熱三四朝痘或隱隱伏於皮膚或形於頭面一二顆或標於身體四五顆上不宜補下不宜瀉當服震蟄丹

穿山甲四錢酒洗淨和砂仁陳米炒捲去砂仁米 白芍酒漿煮焙四錢 紅麪三錢 蟬酥三錢 右

酒漿服其效尤一

天元接髓丹

男子十七八歲或二三十歲破陽虧元候一時患痘稀少者雖年大無妨倘多密連

布欲其鼎峻充灌勢必難矣急服天元接髓丹

歌曰男兒陽破痘來臨不遇奇方坐視沉天元接髓丹功捷世上醫家盡不明真正酒漿澄十碗一毫酸苦莫相侵人參黃芪各二兩橘蟬歸地半加羸鹿茸乳汁一兩半附桂半兩要調停慢火甕中煨熟後去渣出火莫胡斟每鍾人乳三杯和薄薄生薑一片存再勻一沸仍溫服立見奇功若有神此方屢獲明效但製法要詳明當歸去頭尾懷地揀粗軟人參覓清河黃芪選綿白橘紅連本帶蟬退要身全附子連皮臍官桂削外皮煨時度候只以米熟驗之乳取來就不宜過夜入塵辛酉年杭城邵語溪子年二十六歲平素寡弱患痘痘勢沉匿不起單以此方倍加人參服之後竟保全

上元樂學熒敏仙初校

醫部彙考四百九十四

痘疹門三十六

方六

內托散

證治準繩下同

痘不起發根窠不紅或灰白色咬牙寒戰等證

人參

黃芪

甘草

川芎

當歸

防風

白芷

桔梗

白芍

厚朴

木香

肉桂

右薑一片

棗一枚煎服

色紅紫者去肉桂木香加紫草蟬退漿不滿水酒各半煎服

色淡白者去

防風白

芷加糯米

大便燥加人乳

全蠍散

治孩兒百日裏痘

歌曰全蠍要身全五箇蜜焙乾蟬蛻不可脫完身又完足五箇酒漿洗和炒研細末再加酒芍藥砂糖調來服自然痘森森那怕月不足月裏患痘稀美者多密惡者少變蒸未踰猛浪之劑不宜妄投是方斟酌百投百效

羚羊散 痘出五六朝忽然手脚牽縮一團不知者以爲驚使然耳豈知陽明受暑毒之熬鑠而筋絡不能榮血以滋養故也謂之一把縛須服羚羊散

歌曰白玉羚羊一兩霜木通紫草生地黃芍藥殼全蠍桔橘紅甘草荆芥防按法服來隨妥貼誤看驚治卽多傷此痘多起於四五六朝則爲是若起於兩三朝則爲驚縮若起於八九朝則作寒戰治之可也羚羊角必取其銳尖處用之

六一散

專發痘瘡之膿

黃芪六錢 甘草炙一錢 右㕮咀每服二錢水六分入酒一分同煎至半盞溫服更加橄欖同煎尤好  
加山藥亦得 加人參名保元湯升膿亦妙但參不可輕用恐助癰發熱以致抓破也

助瘡丸

治痘瘡七八日瘡稀不來者急服

黃芪蜜炙三兩 白芍 當歸俱酒炒各兩半 鹿茸鮮潤色如琥珀作鹿角膠香者乳炙之 紫河車

酒洗去筋炙乾 白术煨 人參各一兩 右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每服二丸炒糯米煎湯化下

升天散 即灌膜起頂散治痘灰白或紅紫黑陷乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參六分 黃芪 山楂各八分 白术土炒 當歸酒洗 川芎 橘紅各五分 甘草三分

淫羊藿 穿山甲土炒黃 廣木香各二分 肉桂三釐此引經之藥也多則癢 右薑一片棗一枚水煎服或爲末服亦可 如嘔吐生薑湯下 瀉米飲下 肚痛神麆煎湯下 煩躁麥門冬湯下 渴用麥門冬五味子煎湯下 吐瀉藿香陳皮湯下 痘不成漿多服數帖無妨

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿 穿山甲土炒各三分 人參 當歸 山楂各八分 黃芪一錢半 枸杞子一錢 川芎

甘草 陳皮各五分 廣木香一分 白术土炒六分 官桂三釐 黃豆三十粒 筍尖三箇 右加

薑糯米水煎服 一方有白芷防風

田單火牛湯 痘標六七朝正要翕會膜漿遽乃色白洋洋無紅活鼎峻之美有土鐵塌陷之凶火

熱不退而有寒戰之狀宜服田單火牛湯

蓼子擇細葉者是若川蓼則大葉葉中有青點宜細辨之和穿山甲炒甲氣盡去甲 人參 黃芪

當歸各二錢 附子一錢 甘草五分 桂三分 橘紅八分 右水煎服

澄泉散 治痘中板黃

黃芪上 當歸中 紅花下 右和酒入罐固密煮之另用

蟬蛻 金丸卽雄雞尾後硬石子 二味細研以藥酒調服

轉環丹

雞一隻 右以參芪當歸紅花桂和蜜酒煮熟食之

回漿散 治痘不收漿結痂

何首烏 白芍藥 黃芪 人參 甘草 白术

白芍藥

黃芪

人參

甘草

白术

白茯苓

桔梗

白芍藥

白术

木香

肉桂

甘草

白芷

人參 黃芪 白朮各一錢 甘草炙七分 茯苓一錢半 何首烏一錢 右加糯米二錢棗二枚水  
煎調下象牙末一錢

防風白朮湯 治痘日久不癰

歌曰防風剉五錢炒木與茯苓當歸大腹皮煎服得安甯 昔古杭俞氏專以四製白朮散治痘瘡日久不肯結痂收斂者此方之遺意也但廻延之痘元氣充足者則可若元氣不足而廻速必宜保護不如痘之隨期而廻遲何必勉強用藥以速其收功也

人參固肌湯 治痘表發太過致肌肉不密痘瘡粘肉久不落者

人參 黃芪 甘草 當歸 蟬蛻各等分 糯米一撮 右用水煎服

馬齒莧散 治痘瘡不落成斑痕者

馬齒莧搗汁 猪脂膏 石蜜 右三味共熬成膏塗腫處

退火回生散 治痘血熱枯澀發渴

滑石 辰砂各一錢 冰片三釐 右爲細末冷水調服一分睡片時必轉紅活矣

如聖湯 治痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通 猴梨各等分 右加薑一片葱白二莖水煎熱服 心煩

加麥門冬赤茯苓 煩渴加生脈散 七八九日身如火者加酒炒黃芩地骨皮

連翹散 治一切熱兼治痘疹如神

連翹 防風 桔子 甘草各等分 右爲末水煎服 海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也

梔子金花丸

黃芩 黃連 黃芩 山梔炒各等分 右爲末滴水丸如豆大每服五丸白湯下

利上下氣血藥也

大黃 章牛 木通各等分 右爲細末滴水丸如粟米大每服三五十九量兒大小虛實加減  
通腑丸

竹葉石膏湯 治痘瘡表裏俱虛胷中煩悶小便赤澀多渴成赤斑點者又宜服犀角散

石膏 知母各二兩 麥門冬 甘草各一兩 右剉散每服二錢水一盞淡竹葉一握煎半盞溫服不拘時

麥門冬湯 治斑疹煩渴吐瀉及癰後餘熱

麥門冬 人參 甘菊 赤芍藥 赤茯苓 升麻各一錢 甘草五分 石膏二錢 右用水煎服

生脈散 止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥門冬 右水煎當茶服

神功散

治痘作渴

人參 黃芪 甘草 牛蒡子 紅花 生地黃 前胡 紫草 白芍藥 右水煎服

紅花湯

治同上

紅花或子 右隨意煎湯飲其渴即止縱口中如煙飲之即止加牛蒡子尤妙

酸棗仁湯

治痘疹虛煩驚悸不得眠

酸棗仁炒

甘草炙

知母炒

白茯苓 川芎

麥門冬

乾薑炮各三分

右水煎服兒大倍之

梔子豆豉湯

治同上

山梔四箇

豆豉半兩

右水二盞先煮梔子一盞內豆豉煎至七分去滓溫服得快吐即止

黃連解毒湯

治發斑熱甚心煩不得眠

黃連 黃芩 黃藥

山梔各等分 右每服四錢水二鍾煎五分溫服 若斑毒甚者加青黛一錢調入湯內服之

凡脈弦數內外熱甚譖語者合小柴胡湯主之 若脈洪數內外熱甚舌燥煩渴者合化斑湯主之

牛黃清心丸

生黃連五錢

黃芩

梔仁各二錢

蠻金一錢

辰砂一錢半

牛黃一分半

共研細末臘雪調勑

牛黃清心丸

黃連五錢

黃芩

梔仁各二錢

蠻金一錢

人參

人參蟲蟬蛻白芍藥木通赤茯苓甘草紫草茸右每服三四錢水煎

治小便不利癰瘍不發瘡瘍作湯吹之

人參白芍藥木通赤茯苓甘草紫草茸右每服三四錢水煎

人參

人參竹葉湯治虛煩不得寐或兼自汗

麥門冬各一錢半夏一錢五分炒小麥麥門冬各一錢五分右每服三錢薑一

片粳米一撮水煎服

梔子仁黃芩石膏各一錢大青柴胡豆豉赤芍藥各一錢知母杏仁各一錢半

升麻八分甘草五分右水煎服

紅綿散解表之藥

全蠍五箇麻黃去節殼蟬白芷川芎桔梗

天麻各二錢甘草蘇木各一錢右爲末

每服一錢加紅綿少許水煎有熱加荆芥梢熱服

一方入薄荷葉三片好酒四五點同煎

麻痘風搐方

人參羌活防風殼蟬酢炒南星薑製白附子薑製

甘草炙右等分生薑三片水煎服其

搐立止此解表之劑潔古所謂外感風寒之邪丹溪所謂宜發散藥者是也

解毒丸

寒水石研石膏研各一兩青黛半兩右以二石研細如粉入青黛和勻湯浸蒸餅爲丸

如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼薑水下亦可三歲兒服半丸量歲數加減服之

柴胡一連丸治肝經實火  
柴胡宣黃連右爲末糊丸梧子大每服二三十丸白湯下此解毒涼血瀉肝火之劑有

熱者宜之

瓜萎散治痘熱極生風發搐

瓜萎根一錢白殼蠶一錢

右慢火同炒老黃色爲末每服二三分薄荷湯下

保命丹 治一切驚風發熱

天麻 變金 全蠍去尾 白附子炒

薄荷 瘫蠶薑汁炒 蟬蛻 茯神 桔梗各五錢

防風

生甘草 青黛淘淨各三錢 鈎藤鉤

牛黃各二錢 大半夏炒湯浸曬又薑汁浸曬炒

南星製同

上各一兩 麝香五分 辰砂五錢爲衣 右末煉蜜爲丸芡實大每服一丸燈心湯下

消風散

人參 羌活 川芎 甘草炙 防風 荆芥穗 白茯苓 蟬蛻去毒 厚朴 白殼蠶 陳皮

藿香葉各半兩

右爲末每服二錢清茶調下

車前葉湯

治痘出兩三日溺血

木通 生地黃 黃芪 赤芍藥 牛角 地榆 升麻 紫草

車前葉多用 燈心 右水煎服

痛加甘草梢滑石山梔 余治此痘要在於清心解毒使陰血總歸於榮升麻黃芪貴宜詳察而投不可執方以害人也若便如黑豆汁者毒已衝心而榮元已離十亡八九致有便小澀留結血條如綿線寸長欲尿則號哭痛不可忍者急用炒山梔末青龍鬚草汁調服再以木通湯飲之可也

浮麥散 治胃虛自汗

浮麥 右不拘多少炒香每服三五錢煎服

斬關散

治痘紫發熱鼻紅不止

生地黃 牡丹皮 黃芩各五分

升麻三分 藕節 茅根各一錢 菜豆四十九粒

右水煎服

六神散 治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發虛熱

人參 白朮 茯苓 甘草炙 白扁豆炒

黃芪蜜炙 右等分爲細末每服抄一錢用水半盞生薑

一片棗一枚同煎至三分去滓溫服之不拘時候 身熱甚者加烏梅少許同煎服

七珍散

調胃進食

山藥 人參 茯苓 黃芪

白扁豆各一錢 白朮二錢 甘草七分

右剉爲粗末加粟米一撮薑

白术 陳皮 神薑各一錢五分 人參 茯苓 桃子 黃芩各一錢 甘草八分 右剉散分爲一  
服水煎不拘時服

二和湯 消食扶氣之劑

藿香 香附各等分 右爲極細末滾水放溫調下一三錢

白术苦參湯 治小兒患痘不進乳食

白术 白芍藥 檳榔 詞子 柴胡各一錢 青皮一錢 苦參一錢二分 鼠粘子 厚朴

陳皮 砂仁 烏藥 紫草各一錢 右剉散每服四五錢水煎食遠服

陳皮枳實湯 治患痘宿食不消

陳皮一錢二分 鼠粘子 厚朴各一錢一分 枳實 青皮 烏藥 紫草各一錢

檳榔 草果 桔梗各一錢 升麻八分 右剉散每服四五錢水煎食遠服

白术湯 治欬嗽嘔吐痰涎氣喘通用

白术一錢半 陳皮 白茯苓 五味子 半夏 杏仁各一錢 甘草半錢 右水一盞半生薑三片

煎六分分二服

五味子湯 喘促欬嗽通用

五味子二錢 人參 麥門冬 杏仁各一錢半 陳皮一錢 一方無陳皮加薑棗右剉散水一盞煎

六分空肚溫服兒小者分二服

杏甘湯 治瘡痘煩喘渴躁

麻黃 桑白皮 杏仁 甘草 右等分爲粗末每服三錢水一盞煎食後服

生地黃散 治小兒斑疹身熱口乾欬嗽心煩等證

生地黃半兩 麥門冬去心七錢 款冬花 杏仁 陳皮各三錢 甘草炙二錢半 右每服三五錢水煎徐徐服兒大加之 若痰氣痘熱內作宜桔梗甘草防風湯

若痰上壅者佐以抱龍丸

赤茯苓 甘草 大青 升麻 枳殼麩炒 梔子各一錢 右用水一小盞苦竹葉七片豆豉三十粒  
煎五分分爲三服看兒大小加減

葶藶木香散 治大便自利小便澀滯喘嗽腹脹不能食宜多服爲妙

猪苓 泽瀉 茯苓 白术 官桂 草薢 木通 木香 甘草各錢半 滑石一錢 右剉散水一盞  
煎半盞空心溫服忌油膩分爲二服

葛根黃芩湯 治喘有汗發熱欬嗽

乾葛 黃芩各二錢 五味十一粒 甘草五分 黃連 芍藥 石膏各一錢 右水煎服  
涼血消毒散

犀角如無用升麻 牡丹皮 當歸 生地黃 赤芍藥 生甘草各等分 右每服三五錢水煎  
補肺散

阿膠一錢半炒成珠 杏仁三粒去皮尖雙仁 馬兜鈴半錢 甘草二分半 牛蒡子炒三分  
糯米一錢炒 生黃芪五分 右爲末分二服水一小盞煎六分食後時時與之  
一方有桔梗

八風散 即八風湯

藿香半兩去土 白芷 前胡去蘆各一兩 黃芪 炙草 人參各二兩 羌活 防風各三兩 右  
爲末每服一錢用薄荷少許煎湯調服

清肺散 治患痘瘡乾聲啞

麻黃一錢五分 麥門冬 桔梗各二錢 知母 荆芥 天花粉各一錢 詞子 石菖蒲各八分  
右剉分爲二服八竹瀝薑汁水煎服

梔子菖蒲湯 治小兒痘證因熱毒生風瘡啞不語  
梔子一錢三分 石菖蒲 紫草各一錢一分 山豆根 生犀 黃連各一錢一分 羌活

木通 白僵蠶 杏仁 茉子 風桔子各一錢 升麻 軟兒 藥膏七分 古制收每服五錢水煎

紫河車散 治小兒痘瘡毒氣不解上攻咽喉聲音不出舌頰生瘡過逆煩悶潮熱面赤  
紫河車卽金線重樓 苦根 貴衆各三錢 白芍藥 甘草炙各五錢 右每服三錢生薑一片水煎  
服一方有牛蒡子

噙化丸

薄荷葉二兩 詞子 甘草 疣蠶炒各七錢 桔梗 瓜萎 鼠粘子炒各一兩 風化硝五錢 右  
爲極細末煉蜜丸如芡實大噙化嚥津兒小不能噙則調化頻抹其口中

香蘇飲 治小兒痘疹作瀉

香附子 陳皮 紫蘇 川芎薑 生甘草 白芷各等分 右剉散每服三錢生薑葱白煎或白水煎  
瀉加白朮茯苓 嘔加茯苓白芍藥

紫草木香湯 治痘出不快大便泄利

紫草 木香 茯苓 白朮各等分 甘草減半 一方無甘草 右剉散入糯米百粒水煎服每貼三  
錢紫草能利大便白朮木香佐之 脾氣虛者加人參 陳文中曰加人參治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶  
亂

黃芩半夏湯

黃芩一錢半 炙草八分 白芍酒拌九厘三錢 半夏湯泡七次一錢 生薑一錢 大棗一枚 右  
剉細水一盞煎七分溫服渴去半夏加枇杷葉去毛炙一錢蘆根茅根各三錢

中和湯 治中焦停寒或夾宿食

厚朴一錢 白朮八分 乾薑四分 甘草三分 右剉細作一服加生薑一片水煎稍熱服

竹茹湯

橘紅 半夏 白茯苓 黃連薑炒各一錢 甘草五分 竹茹一團 葛根一錢五分 右水一鍾生  
薑三片煎五分不拘時溫服分三貼

和中湯

治虛吐不止卽鎮胃止吐湯加人參

人參 茯苓 炙甘草各五分

白朮壁土炒

半夏各八分 陳皮 蕁香 砂仁各一錢 右用生

薑水煎服

藿香正氣散

治初熱乾嘔

藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草

茯苓 半夏 厚朴 白芷

右棗薑煎服

橘皮湯

治嘔吐不止飲食不入

陳皮 生薑各一錢

人參五分 右水煎作三四次服

橘皮半夏湯

橘皮 半夏等分

右每服三錢薑棗水煎

丁香煎

治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香不見火 紅豆 甘草 乾薑 青皮 川烏

陳皮 良薑 胡椒 益智各等分

右剉散每服三錢用水一盞生薑三片煎六分加鹽一捏不拘時服

服三錢用水一盞生薑三片煎六分加鹽一捏不拘時服

加味鼠粘子湯

治咽中有瘡作嘔

桔梗 射干 山豆根 防風 乾葛

陳皮 荆芥 連翹

右水煎細細呷之

燈心竹葉湯

治乾嘔

竹葉三十片 燈心三十根

右水煎服

祕方 治嘔吐并吐瀉不止水穀不納者速效

多年竈心赤色土爲細末

右每服二錢米飲調下小兒只一錢

九味理中湯

人參二錢 白朮 乾薑炮 詞子肉

茯苓 木香 蕁香葉 肉豆蔻煨

甘草炙各一錢 右水

煎食前通口服

參木丸

小兒脾胃傷令外熱裏寒不思飲食身常壯熱大便或脣色白或患瘡疹身有大熱因令

內伏不出宜服之其瘡癰白無血色者皆從癰白四圍紅暈再起作膿結痂而愈

人參 白朮 乾薑炮 甘草炙各一分 右爲細末米糕泡糊爲丸如麻子大每服百餘丸溫水吞下或米飲亦得乳食前服前世之書如仲景諸論治傷寒云輕者用理中湯重者用四逆湯此乃胃足陽明經而感寒邪脾胃乃爲中州之府故用理中湯曰辛甘發散爲陽以退寒邪也理中湯煉蜜丸而嚼下曰理中丸蓋添蜜甘以入脾胃嚼而便化於中焦今參朮丸以粳米糕爲丸取其難化服在脾胃滲漸得消化則中焦得緩脾土喜燥其熱自歸此所以能治熱也

加減四君子湯 治瘡疹不渴嘔寒下利

人參 白朮 炙 肉豆蔻 黃芪各半兩 甘草炙二錢 右咬咀每服一錢水半盞薑五片棗一枚煎三分乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗 大便不固痘漸黑陷小兒乳母同服

治中散 治虛寒瀉利不進飲食

黃芪 人參 茯苓 白朮 川芎 當歸 肉桂各五錢 肉豆蔻麪包煨熟取去油淨 丁香一錢半 木香三錢 右爲末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋緩少頃痘變紅活而起

滋腎丸

黃藥炒黑 知母炒黑各二兩 肉桂二錢 右爲末水糊丸

黃芩清肺飲

黃芩炒 山梔炒各等分 右每服二錢水煎

連翹湯

連翹 防風 瞿麥 荆芥穗 木通 車前子 當歸 柴胡 赤芍藥 白滑石 蟬蛻 黃芩  
山梔子 甘草各五分 右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞去滓食前溫服

紫草冬葵湯 治小便不通毒氣閉塞

紫草 茜草 黃芩各一錢二分 秦艽 苦參各一錢一分 冬葵子一錢半 露蜂房

白茯 木通 白芍 淨瀉 車前子各一錢 蟬蛻八分 右剉散每服四五錢水煎食遠溫服

如

急數莖中痛者加甘草梢八分苦棟子一錢 如痛甚欲死者加川牛膝一錢三分 如有赤如血色者加胡黃連一錢三分 如小便血者加當歸川芎龍骨火煅菟絲子各一錢 紅甚者加生地黃

白渴者加史君子一錢三分黃連一錢一分韭子研一錢二分 濁甚者加桑螵蛸一錢

洗心湯 治痘瘡壯熱大小便不利狂言多渴

大黃 甘草 當歸 麻黃去節 白朮 茯苓 荆芥各等分 右咬咀量病輕重多少薑薄荷煎溫

服則平熱服則溏

加味四君子湯

人參 白朮 黃芪 白茯苓

甘草 瓜蔞根

桔梗

右各等分水煎服

海藏以此治瘡疹已出

未出大便祕滯或時發渴蓋有病者或因稟受不足或因吐瀉之後或因汗多或利小便元氣既虛津液乾涸不得潤滑而致大便祕滯者若妄行疏通何異操刀必須此藥治之醫家切宜詳審勿令誤也

紫草麻仁湯 治瘡疹大便不通致毒氣閉塞

山豆根 紫草各一錢一分 生犀 青皮 鼠粘子 露蜂房

桃仁 麻仁 側柏葉

黃芩各一

錢 杏仁一錢二分 右剉散每服四五錢水煎食遠服

祕甚者加烏梅肉七分不已再加冬葵子一錢五分

柴葛桂枝湯

柴胡 乾葛 甘草 桂枝 防風 人參 白芍藥各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

袁氏獨附湯 治寒戰

大附子五錢麵裹煨 右用水一鍾燈草七根煎服

右方加人參二錢肉桂五分黃芪一錢橘紅一錢

甘草五分當歸一錢則爲附子振陰湯治寒戰咬牙捷效方也但紫焦伏黑者不用

無憂散 治臨危痘證寒戰咬牙

右俱研爲末每服三五分多則一錢用荔枝煎湯下 一方有牛黃五分

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍藥 右各等分水煎服

催蟬丹 治痘瘡八九朝膿漿雖不充裕倏然寒戰咬牙以此治之

虎牙 人牙各一枚酥炙 右研細和人參丁香末乳酒和服

滴滴金 治寒戰咬牙

狗頭去肉留髓酥炙脆 右細研爲末濃煎酒下

參附湯 治痘疹陽氣虛寒咬牙寒戰手足並冷或吐瀉不飲食沸湯不知熱人參煎湯入 好真附炮如法一錢 右每劑先加附一錢未應多加之更不應加至四五錢或等分亦

無妨但用之以運其陽氣如已脫者不治

二神散 治傷冷體寒肢冷腹痛口氣冷難發難壯暫用陳三農用治痘灰白不起無漿

丁香九粒 乾薑一錢煨 右爲末每服五分白湯送下蓋被片時令脾胃溫緩陰反陽回則痘變順矣量兒大小輕重用之

蟬蛻散 治斑瘡入眼半年已裏者一月取效

猪羊蹄甲二兩入罐子內鹽泥固封燒存性

蟬蛻去土取末一兩

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字百日外兒一二分三歲三四分漿水或新水調下日三四夜一二食後一年已上者不治

馬屁勃散 治瘡疹入眼

馬屁勃 蛇皮各半兩 皂莢子十四粒 右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細溫酒調下二錢食後

海藏地黃散 治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

熟地黃 當歸各一分 黃連 大黃煨 防風 羌活 生犀末 蟬蛻去土 木賊 穀精草

白蒺藜 沙苑蒺藜各一錢 生地黃 木通 甘草各一錢半 黑參五分 右爲細末每服一字或五分量兒大小加減煎羊肝湯食後調日三夜一忌口將息大人亦治

密蒙花散 治痘入眼瞼膜遮睛

密蒙花 菊花

石決明 白蒺藜 木賊 羌活 右爲末每服二三錢茶清調下

兔糞散 治痘入眼

兔糞炒黃爲末 右用蟬退木通甘草煎湯頓服亦可煉蜜爲丸酒送下三五十九

兔糞丸 治痘入眼或生翳障

兔糞炒四兩

石決明 草決明

木賊去節 白芍藥

防風各一兩

當歸五錢

穀精草一錢

右爲末蜜丸菉豆大每服三五十丸荆芥湯送下

吹耳丹

輕粉 飛丹 右爲細末左眼翳吹右耳右眼翳吹左耳只吹二三次 一方加雄黃麝香少許 外用

石燕子一對檳榔一對二味磨水常服

洗肝散

大黃 梔子 防風 薄荷葉 當歸 川芎 羌活各等分 右剉散每用三錢水一盞煎六分不得

煎熟空肚涼服

防風散 治痘瘍後風熱上攻目赤腫流血及痘風瘡

荆芥穗 當歸 川芎 防風 赤芍藥 防己 梔子

右各等分爲細末每服一錢茶清調下作湯

煎服亦可

加味四物湯 治瘡毒入目血熱不散兩目皆赤兼治瘡癧

川當歸 川芎 白芍藥 防風 生地黃 荆芥各等分

右剉散每服五錢水一盞半煎一盞分作

二三次服

羌活防風散

日三服一切瘡瘍皆可善去

用內薄皮各二錢

右爲極細末茶清調下每服一錢食後服 幼幼近編加白菊蜜蒙花去芎草 陳

三農曰若痘出時眼虛腫流膿赤紫腫膜用葵豆皮殼精草防風三味煎湯時時飲之

秦皮散

治大人小兒風毒赤眼痛痒澀淚昏暗羞明

秦皮 滑石

黃連各等分 右每用半錢湯泡乘熱洗

仙靈脾散

治痘疹入眼

仙靈脾

威靈仙各等分 右爲末每服半錢米飲調食後下

蒺藜散

治痘疹入眼

蒺藜

甘草 羌活 防風各等分 右爲細末每服二錢水調服如撥雲見日之效

菊花散

治瘡疹入眼諸證

白菊花

葵豆皮 密蒙花 旋覆花 穀精草

甘草各一兩 右每貼二錢用柿餅一枚粟米泔一

盞煎水乾爲度取柿餅食之五七日卽效 丹溪曰治痘後目腫穀精草蛇蛻葵豆殼天花粉爲末粟米泔浸養乾爲度食之

浮萍散

治痘疹入眼痛楚不忍

浮萍陰乾爲末

右每服一二錢用羊肝半片入盞內以竹杖刺碎投水半盞絞汁調藥食後服之已傷

者十服九效

羚羊角丸

治小兒腎虛目盲宜補腎明目

羚羊角取末

酸棗仁去皮各半兩 肉桂五分 虎脰骨醉炙五錢 防風 當歸 黃芪各一錢

右爲末煉蜜丸如皂子大每服一丸食前溫水化下日進三服

羚羊角散

治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

羚羊角鏹

羌活去蘆 黑參 車前子 黃芩 山梔仁 瓜萎各五錢 胡連 菊花各三分

細辛一分

右爲細末每服二錢食後竹葉煎湯調服

羚羊角飲子 治黑翳如珠外障

羚羊角 五味子 大黃 知母各一兩 芒硝 防風各二兩 右剉每服五錢水一盞煎五分去滓

食後溫服此方宜斟酌用之不可輕率

撥雲散 治小兒瘡疹後眼中生翳膜

兔糞二斤如蘆花色者佳 蟬蛻 木通各二兩 白蒺藜二兩半 甘草一兩 右同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服八十九食後白湯送下日進三服或煎濃湯服亦可頻頻服之以翳退盡爲度

此方經驗極效

兔糞檳榔方

向東西地方上一去不許回顧尋取兔糞十四粒 檳榔用雄雌同磨

右一味不落地井花水調服甚

甘草桔梗升麻湯 治小兒斑出欲透皮膚身熱咽喉不利

甘草 升麻各半兩 桔梗一兩 右剉細末每服一大錢水煎服

醫部彙考四百九十五

痘疹門三十七

方七

地黃丸畫治準  
繩下同

治小兒痘疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭爛

天門冬 麥門冬 黑參各三兩 生甘草 薄荷各一兩

右爲細末生熟地黃汁和九櫻桃大每服

一丸溫蜜水化服

黑參升麻湯 治痘疹後餘毒咽喉腫痛

升麻

黑參

甘草各半錢 右剉散水一盞煎六分并滓溫服斑疹熱甚涼服

玉鎖匙

點疎骨腫痛或垂下及喉舌強硬等證

硼砂

一錢 破硝五分

殼蠶一條 片腦半分

右爲極細末咽喉腫痛每用少許以竹管吹之

加減射干鼠粘湯

治痘證熱毒上衝咽喉腫痛

射干

山豆根

白殼蠶各一錢一分 鼠粘子

紫草茸

紫菀各一錢二分

桔梗

石膏

訶子

木通各一錢

升麻 蟬蛻各八分 甘草五分

右剉爲粗散每服四五錢水煎食遠服

利咽解毒湯

治痘咽喉痛首尾皆可用

山豆根

麥門冬各一錢

牛蒡子炒 黑參 桔梗各七分

生甘草二分 川防風五分

菉豆四十九粒 右水煎服

三黃熟艾湯

治痘後咽喉腫痛

黃連

黃芩 黃檗

艾葉

右各等分水煎服

加味地黃丸

熟地黃酒浸蒸透曬乾八兩杵膏 山茱萸肉 乾山藥 五味子炒各四兩 淨瀉 白茯苓

肉桂厚者去皮取肉一兩發熱者以此加之引虛火歸腎經而熱自止也 牡丹皮 鹿茸炙各三兩

右各另爲末入地黃和勻量入米糊丸服更佳

羌活當歸湯 治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活 當歸 獨活 防風 川芎各一錢 柴胡一錢五分 桂枝七分 黃藥 桃仁 紅花各八分 右酒水各半煎服 一方治腰痛有蒼朮漢防己

如神湯

治腰痛

當歸 桂皮 元胡索 右各等分爲末酒下一三錢

定痛散 治傷寒壯痛及冷氣痛

神薑 香附各一錢 山楂二錢 良薑 當歸 甘草各五分 右用薑三片棗一枚水煎服 手足逆冷加大附子二分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝 炙甘草各一錢 白芍藥酒炒二錢 右生薑三片棗一枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛或欲吐此藥能升降陰陽

黃連 炙草 乾薑 桂枝各二錢 半夏 人參各八分 右棗一枚水煎服

一味異功散 治小兒諸般鈞證角弓反張脅膈臍凸

透明沒藥 右爲末薑湯調服

蟬蛻一物湯

蟬蛻二十一個洗去泥爲末 右水一盞慢火熬至半盞去滓量兒大小溫服之如覺瘡疹已出便依前

服三五次不是瘡疹亦無害小兒瘡疹欲發出加甘草一錢五分煎一盞旋旋與服累效小兒所伏蘊積熱毒蟬蛻味鹹寒可以制況有暴感風作熱客於表者蟬蛻亦治風毒充於皮膚癰癧不止驚癇夜啼癲疾寒熱驚悸皆宜服之

木通芍藥湯 治痘疹作渴腹脹小便不利

牛黃一分 鐵金一兩 右爲細末每服半錢以潔水半盞煎至三分和滓溫服量兒大小以次增減日

二服

和解湯 三日前後用

升麻 茯苓 葛根 人參 川芎 甘草 防風 羌活各等分

右用水一鍾半生薑三片煎至五

分溫服

紫草承氣湯

厚朴二兩 大黃四兩 枳實 紫草各一兩 右爲粗末每服五錢水半盞煎一三分溫服以利爲度  
如未利加芒硝一字

桔梗枳殼湯

桔梗 枳殼各二兩 甘草五錢 右剉每服三錢薑二片水煎服

二陳加枳殼湯

枳殼 半夏 茯苓 甘草 陳皮各等分 右剉每用三錢薑二片水煎服

加味透肌散

人參 黃耆 白朮 茯苓 川芎 甘草 茯苓 木通 陳皮 糯米 厚朴 大腹皮 右等分

爲粗散薑棗煎服

紫草厚朴湯

治痘瘡煩悶痞滿或堅急或結聚不散

紫草茸一錢二分 枳實 酒黃芩 川黃連 厚朴各一錢一分

露蜂房 白朮 蟬蛻

麥門冬 桃仁 石膏 旋覆花 山豆根 升麻各八分

白朮五分

右剉散每服四五錢水煎食

遠溫服

紫草枳實湯 治痘瘡腹脹或熱毒或因傷冷所致

紫草茸 鼠粘子各一錢二分 白朮八分 厚朴

苦參各一錢一分 白芍藥 貝母 枳實

遠溫服

詞子 肉豆蔻各一錢 蟬蛻 桔梗 升麻七分 甘草六分 右剉散每服四五錢水煎食遠服

五物木香散 治痘出煩痛

青木香二兩 丁香 零陵香 白礬各一兩 麝香一分 右每服四錢水一小盞半煎服之 热甚者加犀角一兩如無犀角以升麻代之輕者一服大效 又方以芒硝和猪膽塗瘡上令動癥落無瘢仍用黃土抹之良此病小便澀有血者中壞瘡背黑膿不出膿者死不療

青黛散 治痘未作膿痛甚心膈煩躁睡臥不安並宜服之

青黛如棗核大 右水調服之卽安

消毒飲

牛蒡子三錢炒 荆芥穗一錢 甘草生用 防風去蘆各半錢 右細切作一服水煎加生犀角尤炒一方有桔梗

勻氣散 卽濟生方八味順氣散加木香也

白术 白茯苓 青皮 白芷 陳皮 烏藥 人參各五錢 甘草炙一分半 木香一分半 右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調亦可

白术湯 治痘瘡痒瘍不掩

白术一錢半 黃耆炙 當歸 陳皮各五分 甘草炙些

蟬花散 治痘疹不拘前後始終遍身作癰抓破皆治之

蟬退去頭足洗去土微炒 地骨皮炒黑色各一兩 右共爲末每服一茶匙酒送下一二服神效

二物湯

蟬蛻淨洗二十一枚 甘草炙一兩 右爲末水煎時時服之

盒脾散 治痘至八九日期倏然身中癩瘡此痘證之最急者以此治之

炒木 苓藥 生地黃 甘草 升麻 荆芥 防風 陳皮 大腹皮 煅蠶 蟬蛻 右水煎服

震澤堂

人參 黃芪 芍藥 生地黃

天元一仙丹

甘草 右水煎服

渾天湯 人參乳浸 黃芪 生附子麪煨各一兩 右四味另研細方和合一處白蜜調勻量兒大小加減十歲已上一錢十五歲已上二錢服後隨以振元湯連進痊遂止矣

七星散

黃芪 芍藥各二錢 人參 桂心各一錢 黑魚一個 右前四味共研爲末置黑魚肚內升麻酒煮熟與痘癰者連藥食之凡上焦癰吃頭中焦癰吃身下焦癰吃尾亦驗方也

浴法

經霜桑葉 蘇梗 升麻 荆芥穗 防風 右水煎十數沸候溫拭體

安常鬱金散 治斑痘始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫煩亂者

鬱金一枚 甘草一分 右水半碗煮乾去甘草切片焙乾爲細末入腦子半錢同研一錢匕用生豬血

五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃差此是九死一生候也

四聖散 治黑陷倒醫不起發不紅活小便不利

紫草 黃芪 甘草 木通 右水煎服 熱甚色紫倍加紫草芩連紅花 大便祕加枳殼 如常加糯米

南金散 治痘已出而復陷其勢甚危諸藥不效者萬無一失

紫背荷葉霜後搭水紫背者 白殭蠶洗去絲炒乾 右爲末等分每服看大小者一錢小者五分研芫荽汁和酒下米飲亦可 治此證多有用龍腦人牙者卒難措辦惟此無毒而效且速但紫背者甚難得可於鹽鋪內尋之

橄欖飲 治倒醫

橄欖 右從中截斷水服少許服之立發  
白花蛇散 治痘疹黑陷倒醫

白花蛇連骨一兩火炙乾勿焦 丁香二十個 右共爲末每服五分或二分熱酒送下如黑陷者移時轉紅甚效

人牙散 治痘瘡方出風寒外襲或變黑或青紫宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出

人齒脫落者不拘多少 右瓦罐固濟煅過出火毒研末出不快而黑陷者獐猪血調下一錢因服涼藥血澀倒陷者入麝香溫酒服之 初虞世曰此名回生散用人牙灰入麝香少許每服半錢黃芪白芍藥煎湯調下 錢氏曰用溫酒調下 雲岐子曰用升麻紫草煎湯調下 海藏曰若平昔油膩腸垢者通膈丸下之朱砂爲衣與宣風散相表裏 一方用雞冠血調成膏好酒半盞人乳半盞入葱白一莖煎湯送下 凡服不可過多每服止三分多則陽氣盡出於表恐痘瘡爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡泄急以四君子加芎歸服之 彭氏曰只用紫草湯自好痘瘡最怕麝香與酒氣觸禁不可用

麻黃湯

麻黃剪去根節五錢 右用蜜一匙同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不用渣病瘡胞倒鑿黑者乘熱盡服之避風俟其瘡復出 一法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服以此藥入表也按世傳此法累用有效 萬全曰凡痘子黑陷古方用穿山甲者取其穿腸透膜而善走也用人牙者取牙齒乃骨之餘腎主骨可以入腎也此二物者但借爲向導引解毒之劑以施治則可若單用之何濟於事哉有用燒人屎者蓋屎大解疫毒痘乃時疫所發故宜用之若加入發表和中解毒湯內尤良右方皆通表發肌之藥首一證感風寒肌竅閉塞血凝不行而黑陷者宜之

斑疹黑陷方

乾臘脂三錢 胡桃一個燒存性 右爲細末煎胡荽酒調下藥一錢立效 右治死血黑陷凡前方用穿山甲及麝香等藥治黑陷皆爲氣滯者設也 右方皆裏藥第二證所謂毒氣太盛內外蒸燉毒復入裏必心煩狂躁氣喘妄言如見鬼神大小便祕渴而腹脹者所宜選而用之者也

奪命五毒丹 治痘黑陷倒鑿乾枯不起神驗

則當調補氣血使中氣實則無內攻之患不然中氣既虛復氣血不外旺藥氣少歇必內攻矣慎之

談笑博金丹 治同上

取用寅亥戌未四時四靈丹 右加麝香下俱用天靈蓋

大造保童丸 治同上兼治痘毒亦妙

一蠻子卽人胎骨炙過 二狼子卽狗胎骨酥炙 三猫子卽貓胎骨炙過 右加麝香下

一字金丹 治同上

紫花地丁 金線重樓 山慈姑

至寶丹 治同上

戌腹糧卽將大米淨室與犬食飽取其糞洗淨炙乾研細每一兩麝香一二分

一粒金丹 治同上虛證雖死者可立活

臘肭臍 冰片 原蠶蛾各二分

鴉片三分 麝香一分 已上六方治危急痘證有起死回生之妙

天眞膏

治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之十全四五

初生小兒解下黑糞用磁罐收貯加水銀二兩麝香一錢黃蠟

封口埋於土中愈久愈妙久則化而爲水

右每遇前證看兒大小熱毒盛者重與一三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之立時紅潤活潑真祕方也勝天靈益枯臭無益之物萬萬矣緣此糞原係母之真血所化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故能解毒 百日內小兒熱而煩躁啼哭不止用少許點入眼角二三次便能神安氣和而睡蓋又能清心熱也

大成散 治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切不起發之證俱可用之

穿山甲酒炒一兩 甘草末二錢 紫草三錢 雄黃 硫砂各一錢半 麝香二分 右每五歲兒用二分 冷證熱酒調下 热證紫草湯下 寒者加入治中散內用 熱證加入小無比散內用

無價散 治黑陷欲死者

用無病小兒糞臘月將傾銀罐二個上下合定鹽泥固濟火燬通紅取出爲末 右蜜水調服一錢 一方加麝香冰片少許

加減大紫草散 治白痘似粉人所不識者

紫草 人參 茯苓 黃芪 白朮 芍藥 川芎 當歸 甘草 糯米 右各等分爲散每服四五錢水煎服 一方有木通無黃芪名紫草快斑散 又一方去甘草加木通防風名參芪四聖散治表裏俱虛

補元湯 治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍藥酒炒 熟地黃各一錢 紫草 紅花各酒洗七分

陳皮 甘草各三分

白术土炒一錢半 右酒水各半盞糯米五十粒棗二枚煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍酒炒 紫草 川芎 紅花各五錢 血竭一錢 木香二錢 右爲末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下 热極血焦不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛灰白色不灌膿回漿者

紫河車一具焙爲末 龜板酥炙五錢 一方有鹿茸五錢 右爲末每服五七分或一錢 氣虛者保元湯下 血虛者芎歸紫草煎湯下

混元散 治同上

紫河車一具分作五七塊 右用白糯米三合水淘淨入無油鐵內同炒以米黃色爲度同爲末每用五七分兒大者一錢極補氣血能助灌漿如神綠糯米性溫得紫河車之氣純化爲河車故其補功最速譬之造酒米從麴化意也

內助丹

黃芪酒炒

人參酒炒

白朮

茯苓

當歸

東皮

半夏

厚朴

肉桂

山蘆

右薑三斤燒

一斤

一斤

一斤

一斤

一斤

門冬 濕加澤瀉 猪苓 不止加調子肉果

助陽丹

甘草三分 紅花五分 陳皮八分 官桂一分 黃芪蜜炙 人參 白芍藥各酒炒 川芎 當歸  
各一錢 右薑棗水煎服

回生起死丹 治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔吐肚痛泄瀉清水手足俱冷  
丁香九枚 乾薑一錢 水煎熱服被蓋片時令脾胃溫緩陰退陽回痘自紅活

人參羌活散 治時氣痘疹兼於發表

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 桔梗 茯苓 枳殼 川芎 天麻 甘草 骨皮各三分 右  
入薄荷五葉薑水煎服表證多者宜之

清和飲

地骨皮鮮者 麥門冬去心各二錢 生地黃 知母 貝母去心 楠紅 赤茯苓 甘草 荆芥穗  
各七分 牛蒡炒研一錢半 桔梗五分 瓜蔞一錢 右裏證多者宜之 虛者加人參黃芪

山梔子湯 治痘瘡及斑毒狀如蚊蚤所齧毒盛黑色者

山梔子仁 白蘚皮 赤芍藥 升麻各一兩 寒水石 甘草各五錢 右爲細末每服一錢水八分  
紫草薄荷各少許同煎至五分去滓放溫服

袁氏方

紫草 紅花 犀角 木通 芍藥 生地黃 茯苓 甘草 蟬蛻 右燈草金銀煎服 外加荆芥  
紫蘇水通荔枝殼鳳凰脫升麻楊枝濃煎湯治之

陽毒升麻湯 治面赤狂言煩躁腰背疼下利脈浮喉痛

升麻五錢 犀角鑄 射干 黃芩 人參 甘草各二錢半 右水煎服

陰毒升麻湯 治陰斑

升麻 當歸 川椒 鱷甲 雄黃 甘草 右木煎服

一聖散 治痘疔挑破以此點之

雄黃一錢 紫草三錢 右研末用油胭脂調

敷方 治癰後痘疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之

赤石脂 脂粉 黃藥 杭粉炒黑 血竭 伏龍肝各一錢 飛丹八分 髮灰五分 乳香 沒藥 各三分 冰片三釐 蜜陀僧飛過二錢 有臭氣加阿魏三四分 右爲細末綿紙篩過敷之用膏藥貼 內服人參敗毒散加穿山甲蟬蛻連翹

拔毒膏 治痘疔

雄黃研 右用胭脂重浸水令濃調雄黃點疔痘上立時紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血也  
飛龍奪命丹 治痘疔痘毒痘癰或麻木嘔吐重者昏憤咬牙  
真蟾酥乾者酒化 輕粉各一錢 枯白礬 銅綠 寒水石 乳香 沒藥 麻香各二錢 朱砂六  
錢 蝎牛四十二個另研如無亦可 右各爲末入蟾酥蝎牛或加酒少許糊丸豆大每服一丸溫酒  
或葱湯送下重者外用隔蒜法灸甚者多灸或著肉灸

苦參丸

苦參一兩 白蒺藜 胡麻 牛蒡子各半兩 甘草二錢半 右共爲末酒調麪爲丸竹葉湯下

牛黃丹 治瘡子出定大便不通瘡中膿水不乾

牛黃 大黃末生用 珍珠末 粉霜各一兩 右研勻煉蜜丸如黍米大每服十粒人參湯下量兒大

小加減

生肌散 治瘡蝕不斂并痘後膿血雜流不收等瘡

地骨皮 黃連 五倍子 甘草 黃藥各等分 右爲細末乾摻瘡上

金華散 治痘後凹瘡凹瘡亦難能收水涼肌解毒

白芷散各等分 川芎

當歸

白螺殼 敗瘡瘻不收

白螺殼不拘多少古牆上取 右去土洗淨火煅紅取出存性爲極細末瘡口濕處乾摻爲妙

乳香韶粉散

卽韶粉散加乳香三錢

又方

荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 敗茅多年者 右三味共爲細末或擦或摻自能收水結痂

又方

黃豆殼 右燒灰爲末摻之 如痘風癬以豆殼煎湯洗

祕傳茶葉方

治痘爛遍身無皮膿水流出粘拈衣被

茶葉

右揀去粗梗入滾水一燶卽撈起再揀去梗濕鋪牀上用草紙隔一層令兒睡上一夜則膿皆乾

蟬花散

治痘爛生蛆蟲及夏月諸蟲咬傷臭惡不可近者服之蟲皆化而爲水蒼蠅亦不敢近

蟬退

去足洗淨焙 青黛澄去灰土各五錢 北細辛二錢半 蛇退一兩燒存性 右爲細末每服三

錢酒調下仍以生寒水石細末摻之

定金湯

綿黃芪 人參 炒术 當歸 白芍藥 生地 白茯苓 甘草 白芷 防風 荆芥 升麻 右

入芫荽一握白銀一塊燈心廿莖同煎服

寒水丹

雞骨灰帶血肉燒過 銀硃各一錢 冰片 赤石脂各五分 棕衣灰一分 右研細末洗淨徐徐摻

之

治痘生蛆方

經霜桑葉

野薄荷

右煎湯洗之其蛆自去或先用艾條熏之後增紫蘇甘草煎湯洗之禁雄黃礬石

等藥

鼠粘子湯 治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣

鼠粘子六錢

甘草五分

犀角 白朮各三錢

荆芥 防風 枳殼各一錢

右水煎服

活血解毒湯 治餘毒

防風 荆芥

生地黃 赤芍藥

牛勞子 當歸

連翹 黃連 紫草 甘草 蒼朮 薄荷

川芎 木通

右各等分水煎服

樟皮散

治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樟皮木

右剉煎溫服此藥味苦平無毒

若治乳癰取樟皮燒存性爲末酒調服之立消

十三味敗毒散

治癰毒

當歸 白芷 穿山甲土炒

金銀花 防風 乳香製 甘草 陳皮 赤芍藥 皂角刺 貝母

沒藥製 天花粉 芎藥

右各等分酒水各半煎服

木香散 治小兒班後生癰如神

地骨皮一兩

木瓜半兩 川山甲炙黃三錢半 腐香一字

右爲末米飲下一錢

東垣聖愈湯

治膿潰心煩無寐體倦少食

熟地黃自製者佳

生地黃各二分 人參 川芎各三分

當歸 黃芪各五分

右水煎服

小柴胡加生地黃湯

柴胡 人參 黃芩各二兩

甘草炙 生地黃 半夏各二兩湯泡七次

右爲粗末每服三錢水一

六味活血散

治癰疽瘡痛初起紅腫不散

當歸 川芎 赤芍藥

生地黃 酒紅花 蘇木各等分

右水煎量服之

仲

替針丸 治痘癰膿已成不潰

腿足加牛膝木瓜

硇砂五錢 雄雀糞四十九粒雄雀糞直者是真 陳壞米一錢 右爲末米粥丸如麥粒大每用一粒粘瘡頭上以膏藥貼之半晌則膿自出若瘡頭透而膿不出或出而愈痛或發熱血氣虛也用托裏散或作嘔吐痰食少體倦脾氣虛也用六君子湯

神效太乙膏 治一切瘡疽潰

黑參 白芷 當歸 肉桂 赤芍藥 大黃 生地黃各一兩 右咬咀用麻油四十兩入銅鍋內熬

至藥焦濾去滓徐入淨黃丹一斤再煎滴水成珠捏軟硬得中即成膏矣

神效當歸膏 治痘毒浸淫或湯火等證及瘡腐不能生肌收斂者

當歸 黃蠟 生地黃各一兩 麻油六兩 右先將當歸地黃入油煎去滓入蠟鎔化候溫攪勻即成膏矣

豆豉餅 治瘡瘍腫痛或硬而不潰及潰而不斂并一切頑瘡毒癧

江西豆豉 右爲末唾津和成餅大如銅錢厚如三四錢置患處以艾鋪餅上灸之未成即消已成者祛逐餘毒間有不效者乃氣血虛敗之證參疔瘡論灸法用之

如聖餅 治一切瘡瘍硬腫不能消散或毒不能解散

乳香 沒藥 木香 血竭 當歸各等分 麝香少許 右各另爲末酒糊和爲餅灸熱頻熨患處惡瘡加蟾酥等分

三豆散 治痘後癰毒初起紅腫

黑豆 赤豆 菜豆 右用醋浸研漿時時以鵝翎刷上隨手可消

鐵箍散 治痘後癰毒

鳳凰退燒灰 右醋調圍四畔留頭出毒氣甚佳

連翹飲 治小兒痘瘡痘疹餘毒作楚或生於頭面耳疼頰赤生瘡

連翹 黃芩

瞿麥 木通

滑石 牛蒡子

柴胡 荆芥

防風 羌活

赤芍 甘草各等分

右每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好

三黃散

治瘡熱生瘡膿水浸淫膿流處便濕爛

松香 五倍子

黃連 黃丹

海螵蛸各一錢 輕粉

雄黃各五分 右爲末用瑩肌散煎洗摻之

乾者香油敷

覬子水

治痘後發癰

覬子不拘多少活者以水養五七日

右取其水洗之

黑參化毒湯

黑參

當歸尾 赤芍藥

石膏 連翹

防風 木通

紅花酒洗

生地黃 荆芥穗

淡竹葉

地骨皮 右水煎服

犀角消毒散

治斑疹丹毒發熱痛癢及瘡疹等證

牛蒡

甘草 荆芥

防風各五分 犀角二分 金銀花三分

右水煎熟入犀角傾出服

加味解毒湯

治斑疹癢痛寒熱甚者煩躁譖語并痘毒發熱咽乾

犀角錫五錢

連翹炒二錢

牛蒡子炒三錢

薄荷一錢

甘草五分 右爲末每服一二錢滾湯調

下

京肝明日散

治痘後羞明

當歸 龍膽草

蕃蒙花 川芎

柴胡 防風

酒連

右各等分雄猪肝煮湯煎服

望月沙散

治痘後暗室中不能開者

穀精草

蕃蒙花酒洗

蟬蛻去翅足各五錢

望月沙二兩

右爲末雄猪肝一兩竹刀批破用藥一錢參入升內水煮熟次十食千枚

黃芪散 治壯熱不退可涼肌膚散熱

黃芪 柴胡 乾葛 甘草炙各等分 右爲末每服一錢薄荷三葉水半盞煎至三分約三呷空心服  
此藥治發熱數日未退者其熱是瘡疹者量其虛實用之也

鈎藤湯 治痘後口噤僵直遠臍腹痛

鈎藤 紅花 木香 川芎 當歸 白芍 甘草 白术 青皮 黃連 官桂 生薑 右各等分  
水煎不拘時服

當歸桂枝湯 治痘後手足不能屈伸

當歸 川芎 黃芪 甘草 薄桂 黃藥 蒼朮炒 右各等分水煎 如氣虛少加川烏以行經加  
人參爲主 如感風寒以致骨節疼痛加羌活防風

燈心湯 治瘡痘出後煩喘小便不利者宜進之

燈心一把 鱗甲醋炙黃二兩 右剉爲散每服一兩用水八合煎取四分服量大小加減

赤茯苓湯 治小兒疹痘瘡出後欬逆脅痛不下食

赤茯 火草 大青 升麻 枳殼炒各半兩 梔子一分 右爲粗末每服一錢水一盞入苦竹葉

七片豆豉三十粒同煎至五分盞去滓分爲三服日三四服看兒大小以意加減本方稱疹痘出後脅  
痛者由病後毒氣混亂阻於升降左右脅爲陰陽之道路氣之所行處今氣滯爲脅痛以枳殼寬腸下  
氣令氣順脅不痛也大青梔子去蘊熱升麻解毒赤茯導心火利小腸無熱以克肺氣而欬逆自平爾

大和散 治瘡痘後寒熱往來嗜臥煩躁亂

生地黃 當歸 地骨皮 人參 甘草炙 白芍各等分 右咬咀每服一錢水半盞煎至三分去滓  
溫服

蓮肉湯

蓮肉去心半斤 猪肉去皮油一斤 右共水煮熟下砂仁伏醬朝夕與啖其胃氣接養蟲自安居不出

矣切不宜投以史君子檳榔之物痘中一投命遂喪矣

黃連陰靈丸 治狐惑瘡

川黃連二錢 蘆薈 乾蟾殼各一錢二分 史君子一錢半 蕪荑一錢五分 川棟子一錢 右爲末烏梅洗淨去核搗膏和丸米飲下

雄黃散

雄黃 枯礬各一錢 麻香一分半 人中白五分

右共爲末吹入鼻中如吹不入用麻油潤使進人中白散

人中白殼一兩 黃蘆炒黑三錢 右爲末搽口內

吹口散 治口疳

黃連 青黛 孩兒茶 冰片 右爲末吹之

赴筵散

薄荷 黃蘆 右等分分爲末入青黛少許搽之

牙疳方 治痘後餘毒攻牙齦疳腐內宜服甘露飲

人中白殼三錢 枯礬 五穀蟲焙乾各一錢 鹽梅七個殼存性 麻香一分 白芨子灰一錢 右

爲細末先將葱茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

麥湯散 治水痘

地骨皮 滑石 甘草各半錢 甜葶苈 麻黃 大黃 知母 羌活 人參各一錢 右剉散水一

盞每服二三錢小麥七粒煎六分不拘時溫服分二貼

麥煎散

治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及癰瘍遍身赤癩往來潮熱時行麻痘疹子餘毒未盡渾身浮腫痰涎欬嗽或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風頭疼並治之

一方去地骨皮滑石加羌活川芎薄荷湯調下

瀉白消毒散

桑白皮 地骨皮採鮮者各三錢 牛蒡子炒研 荆芥穗各一錢半 桔梗 生甘草各一錢 浮萍  
曬乾二錢 右爲粗末每服三五錢水一盞煎六分濾清服

加味金沸草散

旋覆花去梗 麻黃去節水煮曬乾 鼠粘子 浮萍 前胡去蘆各七錢 荆芥穗一兩 火草  
牛夏湯泡七次薑汁拌炒 赤芍藥各五錢 右爲末每服三錢生薑二片薄荷葉三片煎

麻黃湯

麻黃去根節製過 升麻 牛蒡子炒 甘草 蟬殼洗淨去足翅各一錢 右剉細加臘茶葉一錢煎  
七分去滓服 煩渴加石膏末四錢

檸葉散 治沙疹發未出喘嗽煩躁悶亂

櫟亦名西河柳亦名採絲柳青茂時垂葉曬乾爲末 右每服一二錢茅根煎湯調下

茅花湯

茅花 真爵金 生地黃 梔子仁 黃芩 右水煎調百草霜服

加味黃芩湯

黃連 黃芩 各一錢半 白芍藥 滑石各三錢 甘草七分 右水煎服 若滑石不煎調服止於一  
錢 血痢加地榆二錢

十全散

黃連 黃芩 黃檗各一錢 苦參 孩兒茶 雄黃各五分 硼砂 元粉各三分 乳香一分  
片膿少許臨時入 右共爲極細末每用五釐吹之

白虎合解毒湯

石膏研粗末四錢 知母 天花粉 黃芩 黃連 山梔仁各一錢 生地 麥門冬各二錢 右入淡竹葉十片水二鐘煎一鐘更磨入犀角汁索湯水則與之 覺胃熱渴甚宜以此方多與之胃清乃止庶免牙疳之害直至疳成而後清胃涼血解毒往往噬膚無及慈親仁人宜早爲之所母事姑息  
加味地骨皮散 治痘出發熱不退飲食不進  
地骨皮鮮者三錢 桑白皮鮮者 麥冬各二錢 柴胡 赤芍 乾葛各一錢 甘草 犀屑各五分  
右水煎調大小無比散五七分亦治喘急不止

醫部彙考四百九十六 痘疹門三十八

方八

清肌透毒湯

收偏  
言下同

治痘瘡已發未發爲風熱所感腠理阻塞者此湯主之

乾葛

八分

前胡

一錢

桔梗

四分

甘草

二分

山楂

一錢

荆芥穗

一分

蟬蛻

各三分

加薑一片

直達透肌散

治痘將出未出無甚外感亦不至內傷但身熱嘔吐眸子眊焉者此湯主之

蟬蛻

山楂

陳皮

前胡

葛根

加薑一片嫩芋頭一個

溫肌透毒散

治痘已發未發爲寒邪固閉者此湯主之

防風

五分

川芎

八分

蟬蛻去土

桔梗

麻黃

蜜炒

黑色各三分

山楂

一錢

甘草

二分

陳皮六分

加薑五分

寬中透毒飲

治痘已發未發而飲食內傷者此湯主之

山楂

三錢

青皮

六分

葛根

四分

陳皮

五分

前胡

八分

萊菔子

七分

麥芽

一錢

桔梗

蟬蛻各三分

加薑三分

疏肝透毒散

治痘前驚跌而發搐者此湯主之

僵蠶

炒去絲嘴

羌活

各四分

蟬蛻

木通

荆芥

各三分

薄荷

二分

釣藤

前胡

各六分

青皮七分

山楂

二錢

加燈心一分

加薑二分

清熱解毒湯 治痘放點乾紅色滯壯熱煩躁者此湯主之

荆芥穗 紅花 蟬蛻去土 木通各三分 牛蒡一錢 滑石三錢 前胡八分 地丁四分  
牡丹皮 青皮各七分 生地 山楂各二錢 黃連六分

加燈心一分

調中湯

治未痘時先因吐瀉裏虛隨感時行見痘目眶低陷神情困倦者此湯主之

人參五分 陳皮四分 蟬蛻三分 川芎八分 甘草二分 穀芽六分 扁荳 枸杞各一錢

加薑二分大棗一枚此權宜之劑也精神稍醒即當加減

涼血攻毒飲

治痘毒火內伏煩渴躁亂身體反涼痘色紫滯攀紅徹夜無眠者此湯主之

生大黃二錢 荆芥穗五分 木通 蟬蛻 紅花各四分 牛蒡 丹皮 紫草各一錢

赤芍八分 葛根 青皮各七分 生地四錢

加燈心一分

鬆肌通聖散

治痘腠理阻塞血凝氣滯窠粒隱隱於肌肉之間痘色乾紅晦滯神情悶悶者此湯主之

主之

羌活 荆芥 紫草 紅花 木通 赤芍 地丁 青皮 牛蒡 山楂 蜂房 當歸 防風

加蘆筍胡荽

清涼攻毒飲

治痘瘡大熱如火紫艷深紅煩渴頭狂者此湯主之

石膏研三錢至一兩 川黃連一錢至三錢 大黃三錢至六錢 木通

牛蒡一錢五分 星角磨汁三分 青皮七分 丹皮 地丁各一錢 生地五錢至一兩

加燈草一分

清暑透毒湯

治痘值酷暑神情煩悶不時哈舌大渴思冷濺然汗出或身涼如暈痘瘡淹滯此因

暑氣閉塞故也此湯主之

陳皮去白

厚朴

甘草各四分 茄蓄根 通草各三分

桂枝

黑豆各二錢 山楂一錢 甘草二錢

桂枝

桂枝

加燈心一分

疏邪實表湯

治痘屬氣虛皮薄色淡身涼體靜兼有表邪外束者不拘漿前漿後此湯主之

黃芪

防風

荆芥

甘草

川芎

白芷

桔梗

加薑一片胡荽一錢

必勝湯

治痘血瘀氣滯窠粒實而不鬆痘色滯而不活或乾紅或紫黯或斑點諸般痛楚或貫珠

或攢簇毒火兩伏此湯主之

大黃小劑七分至三錢大劑三錢至一兩勢急者以一半同煎一半臨起投下 青皮五分至錢半  
桃仁去皮尖一錢至四錢 紅花五分至錢半 赤芍藥一錢半至三錢 木通三分至八分 荆芥  
葛根俱三分至錢半 生地一錢至兩半 牛蒡七分至一錢 白項地龍三條至念一條 紫花地丁  
小劑三錢中劑七錢大劑一兩五錢 蟬蛻二分至六分 山楂大劑一兩五錢中劑一兩小劑五錢  
蘆根三兩煎湯代水煎

既濟湯 治痘火毒太盛時值隆冬閉塞此湯主之

荆芥穗 乾葛根 石膏 川黃連 大黃 麻黃去根蜜炒將黑地上出火氣 蟬蛻 牛蒡  
加薑二片胡荽一錢陰陽水煎

清金攻毒飲 治痘毒壅於肺聲音不清喉間痛楚煩渴壯熱痘不起者此湯主之

桔梗 甘草 牛蒡 大黃 元參 前胡 山楂 山豆根 枳殼 荆芥穗 蟬蛻 疣蠶  
加燈草一分

涼膈攻毒飲 治痘熱毒壅於上焦胃膈煩悶壯熱發渴揭衣棄被痘色紫黯深紅者此湯主之  
大黃 黃連 石膏 荆芥 地丁 元參 黑梔 赤芍 生地 桔梗 木通 牛蒡子 甘草  
薄荷 枳殼 加燈草一分竹葉三十片

加燈草一分竹葉三十片

消斑快毒湯 治痘有夾疹夾斑膚紅如醉者此湯主之

連翹

元參

生地

牛蒡

木通

蟬蛻

赤芍

牡丹皮

黃連

甘草

地丁

荆芥穗

加燈心二十莖

極熱者加大黃

窮源透毒飲

治痘瘡毒火深潛累日不起色有乾紅有紫滯或煩躁或昏沉身體不熱者此湯主之

大黃

青皮

穿山甲

紫草

歸尾

地丁

川牛膝

羌活

荆芥

紅花

木通

加蘆筍十株

散結湯

治痘血滯氣滯色乾紅而囊不鬆者

青皮

羌活

赤芍

紫草

地丁

山楂

荆芥

綠升麻

川芎

木通

牛蒡

丹皮

加蘆筍十株

鮮芋頭三個

養榮附氣湯

治痘瘡囊蒼老歸附不厚而淡白者

當歸

熟地

川芎

紅花

生地

甘草

加薑一片

寶氣飲

治痘血至而氣不至歸附則厚郛殼不長或平或陷而不充肥者

丹皮

荆芥

青皮

山楂

穿山甲

牛蒡

赤芍

殭蠶

蟬蛻

木通

加蘆筍十株臨服和大桑蟲

清榮飲

治痘氣至而血不至郛郭飽滿而根窠晦者

紅花

歸尾

紫草

丹皮

地丁

牛蒡

荆芥

木通

赤芍

加地龍三條臨服和猪尾膏半盞

滌邪救苦湯

治痘毒火下注大腸邪毒逼迫欲解不解毒垢穢臭無倫者

黃連

大黃

牛蒡

紅花

滑石

木通

蟬蛻

荆芥

澤瀉

青皮

赤芍

山楂

人  
糞 猫糞 猪糞

犬糞

臘月辰日收取四糞乾結者用礪糠火煅黑存性爲末各等分研細以蜜水調服三分至七分準繩每服三錢

養榮透毒湯 治痘瘡血虛淡白并囊窠不起者

桔梗 甘草 當歸 川芎 熟地 紫草 山楂 蟬蛻 木通 穿山甲  
加蘆筍十株

碁針法 治報痘有紫硬有黑陷有歪斜并諸痘內色紫黑根腫硬獨大於衆痘者用之  
取水碁大者放於患處將蛤殼合於碁上用軟絹束之吹出毒血次以藥胭脂膏封貼如無此物以銀針挑破令奶母含金銀花汁以吮之

散火鬆毒飲 治毒爲火鬱不能透發色紫滯而囊不鬆者

丹皮 木通 連翹 防風 赤芍藥 紫草 山楂 露蜂房蜜炙 荆芥穗 青皮 牛蒡  
加燈心半分

平順清解飲 痘至起齊不犯氣虛無長血熱稍用清解者以此湯主之

桔梗 甘草 山楂 疣蠶 木通 連翹 紅花 牛蒡 白芷 生地  
加炒占米百數粒

托裏無憂散 痘至六七日身不熱痘不燥亦不甚紅囊不充肥者以此湯主之

黃芪 人參 甘草 疣蠶 白芷 桔梗 當歸 川芎  
加炒占米大棗

賽金化毒散 治痘內有伏毒啼號不已經日不起并發癰發疔者以此散用蜜湯調服痘若搔傷

或攢簇堆聚或報點梟惡乾焦紫黑板硬等象悉以此散調入油胭脂內用綿紙做如膏藥樣以  
貼之

乳香 没藥各一錢研細配衆藥 貝母去心炒

大黃半炒半曬各二錢 甘草七分 牛黃二分 水片一分半 珠子四分研極細以無聲爲度

保元八珍湯 治痘一切氣血兩虛囊薄色淡身涼體靜項平湏陷漿清皺軟者此湯主之

人參 黃芪 甘草 當歸 川芎 山楂 熟地 柏杞子

外加薑二片炒糯米百數粒

廻陽返本湯 治痘氣血虛劇皮薄漿清錫皮灰白虛惕寒戰者此湯主之

人參 黃芪 當歸 川芎 肉桂 甘草 鹿茸酒炙剉片用酒煎膏配藥 山楂 熟附

外加大棗一枚

實脾固本湯 治痘脾虛滑瀉此湯主之

人參 白朮 茯苓 木香 廣皮 詞子 炙甘草 肉果完穀不化者加麪裹煨用

外加薑棗

納穀散 治痘神不煩熱不熾痘不燥而飲食不思者此湯主之

人參 白朮 茯苓 廣皮 山藥 炙甘草

外加陳倉米大棗煨薑

瀉黃納穀散 治痘邪熱犯胃脣口燥烈口中膩渴甚至舌起芒刺嘴黑如煤漿後身猶壯熱種種

燥熱而不思食者此方主之

石膏 黃連 生地 丹皮 木通 牛蒡 甘草炙用 生甘草 山楂 荆芥穗

重者加大黃外加燈心

補液湯 治痘津液不舉而發渴者以此湯主之

人參 麥冬 五味 詞子 桔梗 甘草

清金解渴湯 治痘金被火燭而咽乾口渴者以此湯主之

安神散

治痘後邪毒淨盡心虛不寐者

人參

棗仁

茯神

甘草

當歸

麥冬

柏仁

白芍

加燈心蓮肉

清宵忘晝飲 治痘邪熱擾亂心神不甯夜不成寐不拘首尾以此湯主之

黃連

丹皮

生地

木通

甘草

荆芥穗

黑梔

加燈心竹葉

金蓋散

治痘腐爛不收和皮脫去以此散撒在褥席上令兒眠上若以絹袋盛之通身撲之亦可

取黃牛糞尖曬燥薯糠火煅黑存性

研細末用

滑肌散

治痘漿足半醫紅暈未收壯熱未和以此散包於絹內撲之

滑石六兩

甘草二兩

菜豆粉三兩

研細末用

水楊湯

治痘板實不鬆或攀紅或紫黯八九日不行漿甚至有作痒者以此湯浴之

取水楊柳連枝帶葉判斷四兩長流水十數杓煎十數滾去渣將三分之一傾於脚桶內以手探之不可

太熱亦不令太溫先以應服之藥服之而後浴其湯漸漸添下浴後以紗絹收乾適時以燈照之隱隱鬆浮漿腳動矣冬月宜於帷帳中更備脚爐旺火於兩旁不使寒侵爲妙 此柳生於水灘四月間纔有其柳不生旁枝長者三尺許粗者如細條其葉較垂楊葉更厚帶有白意至五月葉下開細細紫花者是此名水楊柳非忍冬藤亦非等閒柳樹也須預備風乾得用其性最能活血脉利筋骨大人有患拘攣手不能握手不能步者用酒煎服不能酒者水煎其效有靈氣按萬氏心法水楊柳五六月春多用枝葉治痘不起發不光壯浴洗不拘次數

保元回漿散

痘有身涼體靜漿不滿足膿囊漸闊至收醫自是不齊此湯主之

人參

當歸

甘草

黃芪

白芍

米仁

茯苓

加薑棗

活絡透毒飲 治痘收曆時熱毒畱連愁容可掬將來餘毒在所不免却不易來者以此湯預活之

羌活 紅花 荆芥

牛蒡 木通 當歸

牛膝 蟬蛻 青皮

連翹

外加地龍

大黃 木通 連翹 地丁

忍冬解毒湯 治痘癤初褪大局無虞疤少榮潤熱久清和防餘毒竊發者此湯主之

甘菊 牛蒡 紅花 甘草 金銀花 土貝母 荆芥穗 穀精草

赤芍 木賊 甘菊 羌活 羚羊角 金銀花

撥雲散

治痘後熱毒在肝兩目通紅甚至起障生翳者以此湯

生地 黃連 木通 甘草

荆芥穗 穀精草 赤芍 木賊

甘菊

羌活 羚羊角 金銀花

大黃一分至三分 望月沙

加燈心白芙蓉葉

消疳解毒散 治痘後牙疳

兒茶 天花粉 青黛水澄

硼砂各一錢

薄荷五分

冰片

牛黃各一分 人中白三錢

甘草 雨前茶 黃連各五分

珠子二分

研極細以無聲爲度先以濃茶拭淨方吹

加味內托十宣散

治痘後餘毒白而不紅平而不起按之不熱愁容可掬此本氣血兩虛漿不滿足而致乎毒也以此湯主之

人參 黃芪 當歸 牛膝 金銀花 木通節 甘草 白芷 羌活 紅花 川芎 皂角刺

加胡桃二枚 回漿合宜散

痘瘡血收漿足別無燥熱之證以此湯敷之

白芍 防風 米仁 甘草 茯苓 山楂 扁豆

蜂蜜不拘多寡大約四兩配大黃細末一兩和滾湯攪勻以粥糊拭之癥亦易落

快肌膏 治痘值炎天曬漿燥實偏體如霞煩熱如火身無安放者

生大黃驪乾爲末一兩敗草散五錢

調入猪膽汁宜薄不宜厚以鵝翎輕輕間拭之不可通身塗滿

牛黃八寶丹 不拘已痘未痘嬰兒諸般惡瘡惡毒此丹有靈氣

牛黃 冰片各二分 珍珠四分 破砂水飛 雄黃透明者 元參瓦上焙或驪燥各五錢  
川連土炒 犀角 羚羊角 青黛水澄 乳香 没藥共出汗盡 川貝母炒淨 羌活炒各三錢  
琥珀二錢

右十五味如法製爲細末聽用將揀淨金銀花二兩甘菊一兩甘草五錢胡桃肉二兩擊碎紫花地丁  
連根帶葉理淨勿雜青苔剝斷二兩長流水五碗砂鍋內慢火煎至及半取汁將渣絞乾以綢濾清桑  
柴火熬膏入煉熟老蜜盡許再熬至粘筋將前末和丸每丸三分一歲左右者日服一丸三歲左右者  
日服二丸蜜水調服

奏凱和解飲 痘瘡收痂厚而滋潤寢食俱安可以弗藥而調理和解者以此湯

金銀花 土貝母 牛蒡 山藥 扁豆 山楂 荆芥 當歸 人參 甘草

加核桃肉蓮肉

參歸化毒湯 治痘餘毒留連氣血虛弱何以取驗淡白不振身涼愁困者是也

人參 當歸 黃芪 甘草 金銀花 皂角刺 牛膝 紅花 貝母 山楂 白芷

加胡桃肉

和脾宣化飲 治痘後飲食過傷氣壅飽悶叫喊不已者

廣皮 萊菔子半生半炒 前胡 卷舒 麥芽 大腹皮去黑翳黑豆湯泡洗

右用山楂一兩至二兩煎湯代水煎

雙仙化毒膏

錦紋大黃一兩剉片 麻黃去根五錢剉斷 麻油二兩

將一味入於油內煎至如煤之黑取油去渣於水盆內頓出火氣再將煮熟雞蛋十箇去白取黃於小銅杓內細細刲碎熬至黃沫泛溢繼而焦黃至極焦黑青烟將起油將來矣漸有漸逼以盡爲度亦於水盆內出火氣與麻油合併濾清聽用復用大黃一兩一半曬燥一半與風化石灰同炒炒至石灰如桃花色去灰取黃地上出火氣研爲細末又松香五錢爲末入於葱管內用苧絲紮葱口於銅杓內煮葱黃熟去葱取松香爲末又川黃蘖去粗皮淨五錢一半曬燥一半將猪膽汁炙透爲末又青黛水飛五錢合前藥總調於藥油內其搽法如搽合掌丸以漸而施

第一日方

石室祕錄

見小兒身熱眼如醉眼者此出痘兆也若不是醉眼則非出痘不可用此

方用治外感方治之若見醉眼急投此方則痘點即見必不待三日而自出也

黃芪 茯苓 元參各三錢 白朮 甘草 柴胡 荆芥各一錢 升麻 陳皮各五分 當歸  
川芎 麥冬各二錢

先用金銀花五分水三碗煎湯二碗再煎藥至五分與小兒飲之此方五歲以上俱照此分兩五歲以下減半週歲內者又遞減之服此藥後自然神思清爽病家不肯服藥勸其速服包其速愈不妨身任之服後見點再用第二日方

第二日方

白朮 桔梗 白朮子 茯苓各二錢 麥冬 黑參 白朮 金銀花各二錢 甘草 柴胡

荊芥各一錢 當歸 生地各五錢 升麻三分

水煎服服此藥後一身盡見點矣其色必紅而無色白色黑之虞矣

第三日方

人參五分 白朮 茯苓各三錢 神龜三分 白朮 黑參各二錢 丹皮一錢

人參 甘草各一錢 當歸 白芍各二錢 熟地黃自製五錢 白茯苓 金銀花 黑參 白朮各三錢 陳皮 神翹各五分

服此方後小兒必然口健要喫食不已不妨少少頻與亦不可多食也第五方可不必用矣然更傳之者恐小兒多食別生他病故又傳此方

第五日方

人參 甘草各一錢 茯苓三錢 白朮二錢

有食加麥芽五分山楂五粒若不傷食不必加止加金銀花三錢能服此五方期七日前而回春也以上小兒年歲小者俱照第一方減之如小兒已身熱三日則用第三方四日則用第四方如壞證另用壞證方

疹方

黑參 金銀花 生地各三錢 蘇葉 天花粉 甘草各一錢 麥冬 桂枝各二錢

接桂枝二錢  
宜酌用之

升麻五分 陳皮三分 黃芩八分

水鍾半煎五分熱服小兒初生數月減半一週俱照此分兩

夏月加青蒿三錢

壞證方

人傳

治療瘡壞證已黑者人將乘之下疾即活

人參三錢 陳皮 荆芥穗各一錢 蟬蛻五分

元參 當歸各二錢

水二鍾煎八分灌下卽活大約壞證皆元氣虛而火不能發也今用參以助元氣用元參以去浮游之火用陳皮去痰開胃則參無所礙而相得益彰荆芥以發之又能引火歸經當歸以生新去舊消滯氣蟬蛻亦解毒去斑世人如何知此妙法初起不可服必壞證乃可一劑卽回春不必再劑也

必全湯

雷君傳

痘瘡壞證最爲可憐身如黑團之氣口不能言食不能下世人到此盡乘之溝中醫者到此亦置而不顧誰知盡人皆可生之乎

人參三錢 黑參 金銀花各一兩 荆芥一錢 陳皮三分

水煎五分灌之下喉而眼開少頃而身動久之而神氣回口能言食能下矣不必再服他藥痘瘡自面而生全至奇至神之方也蓋痘瘡壞證皆氣虛而火不能發也火毒留於中而不得洩故形如死狀其實臟腑未壞故用參以固元氣用元參以去火用金銀花以消毒用陳皮以化痰用荆芥以引經而發出於外內中原有生機所以一劑回春也

痘瘡初起方

張真人傳下同

白芍 生地各二錢 當歸 柴胡 甘草 桔梗 麥冬 乾葛各一錢 廣陳皮五分

荆芥八分 防風三分

水煎服痘瘡惡者可變爲良

痘瘡出齊方

人參 黃芪 甘草各一錢 白芍 生地 麥冬各二錢 柴胡八分 紅花五分

水煎服

有熱加黃連五分或黃芩梔子各一錢亦可 有驚加蟬蛻去翅足三分 色黑者加肉桂五分 大便閉結不通加大黃三分 腹痛加芍藥甘草各一錢 泄瀉加茯苓一錢 有汗倍加黃芪 有痰加白芥子一錢 痒加荆芥子六分 身痛加廣木香三分 色白者寒也加肉桂一錢人參黃芪俱多加 痘瘡頭不突者氣虛也倍黃芪 腰不滿者血虛也加當歸一錢熟地一錢

痘瘡將回方

人參 白术 白茯苓各一錢 甘草五分 桔梗三分

水煎服升提其氣而又益肺金使皮毛得諸補藥之益也

有紅紫乾燥黑陷者熱未退也加黃芩一錢 如痘色白黑灰黑色而陷寒虛也加肉桂三分人參一錢 灌膿者倍加人參再加黃芪當歸各二錢 泄瀉加乾薑五分茯苓一錢 心慌悶亂者多

加人參 暑伏者加人參乾薑 身寒者加桂枝大茴一千絲 鐵鑄子當作  
木香一錢 分口溫者熱也 加熟冬二錢黑豆一千錢 失音者加石膏滿三  
分桔梗一錢 痘瘡中防其生痘者初起  
方中卽用桔梗一錢 卽無此證 小兒痘證有此三方再無死法神而通之可稱神醫矣壞證亦以  
此方治之無不生者總之小兒宜補不宜散一言盡之矣

此方治之無不生者總之小兒宜補不宜散一言盡之矣  
疹方 痒乃熱也不可用人參白朮當用補血而不可散血

當歸一錢 黑參三錢 升麻 甘草各三分 乾葛一錢

水煎服此治疹奇方也有此奇方爲骨又出入加減可也

心火熱極加黃連三分 肝火加梔子六分 肺火加黃芩麥冬各一錢 辨各經病亦看小兒山根之色然看之時須用洗去面上塵土細看之痘疹全書統諸證以立言而余總祕要以傳方有此四方爲骨參之彼書出入加減神奇之極矣

痘瘡神方人傳  
錢真不論起初灌漿收醫俱用之神妙無比

人參 白芍各一兩 白术 黑參各八錢 茯苓五錢 陳皮 甘草 神龜 蟬蛻三錢 柴胡

山楂各一錢 黃連五分

各爲細末水打成丸如菜豆大遇前證與一錢未起者卽起已起者卽灌漿不收醫者收醫神奇之極母視爲尋常也願將此方廣傳人世

回毒卽消丹岐天師傳下同 治回毒

浮金銀花五錢  
生甘草一錢 人參一錢 黑參三錢

水二碗煎三分與小兒服之一劑即消大半二劑全愈不須三劑也付符一道焚在藥中煎汁神效凡服藥不效焚符於藥中煎藥與小兒飲之十人十生

呪曰小兒有病魔作祟吾今施符治無不愈吾奉天師岐真君律令敕書符前後念一遍焚於藥內又念一遍此祕訣也

疹方 治夏日發疹者神效

紫蘇葉 桔梗 甘草各一錢 升麻五分 元參 青蒿各三錢 麥冬 生地各二錢  
水煎服

岐真人曰張真人治四時之疹余方治夏時熱疹也切記此一方何患疹病之難治哉

水痘方 亦治熱證而有水氣也

柴胡 桔梗各一錢 茯苓二錢 生甘草 黃芩各五分

竹葉十片燈草一團水煎服  
有痰者加天花粉三分 有食加山楂三粒麥芽三分 有火加黃連一分餘可不必有此一方水痘無難治矣

治回毒歲久不愈方

金銀花 當歸 人參 白朮土炒各一兩 黃芪二兩 薏苡仁炒三兩 生甘草二錢 白芥子三錢 柴胡 肉桂各五分

先將薏仁用水四碗煎湯二碗再煎前藥半碗餳服一劑再用

金銀花 黃芪 薏苡仁各一兩 白朮土炒 當歸各五錢 甘草 白芥子各二錢 陳皮五分  
水三碗煎半碗四服全愈其服藥之時更須用藥洗之  
金銀花一兩 生甘草二錢

生葱三條煎二碗

痘疹門三十九

單方

預解痘毒七八月間或三伏日或中秋日剪壺盧髮如環子脚者陰乾於除夜煎湯浴小兒則可免出痘

唐瑤經驗  
方下同

消解痘毒紫草一錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服

預解痘毒五六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯父母只令一人知溫浴小兒身面上下以去胎毒未不出痘縱出亦少也

體仁彙編

小兒將痘發熱失表忽作腹痛及膨脹弩氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱

白搗敷臍上班止痘出方免無虞

摘元

嬰童痘疹三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩剉以百沸湯一盞泡封勿泄氣待溫時服半合則瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可

後方

預解痘毒用白水牛糞一枚和米粉作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患

譯野翁方

又用白牛糞四十九枚焙菜豆四十粒硃砂四分九釐研末煉蜜丸小豆大以菜豆湯下

本草綱目下同

又每至除夜以白鵝煮炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘希少

浴兒免痘除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌腥以清水洗去也

若不信但留一手一足不洗遇出痘時則未洗處偏多也此乃異人所傳不可輕易

楊洪醫方摘要

身上有熱疑似痘癩用防風蘇葉陳皮赤茯苓各三分蟬蛻三隻羌活二分車前子四分甘草薑各一片

煎服熱退身涼即止如前大熱有欬呵欠眼淚噴嚏者是癩若無欬有驚悸者是痘貧者止用生薑一錢

陳皮八分煎湯服之富者請醫調理

窮經便

稀痘用上好真正麻油浸頭髮擦兒背及腰肋等處便出皆黑其痘自稀若痘瘡血熱毒甚者宜用紫草

草

預解痘毒十二月取兔頭前湯浴小兒涼熱去毒令出痘稀

飲善正要

痘疹煩熱用人中白或老糞缸白垢洗淨研末每白湯或酒服二錢

痘疹便覽方

預解痘毒初發時或未出時以硃砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也

丹溪草谷子方

也保和

痘毒用雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與兒食每成立春日食一枚終身不出痘

也方

又用雞卵一枚童便浸七日煮食之永不出痘

李氏方

又用頭生雞子三五枚浸廁坑內五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐都司得於浙人之

方

預解痘毒用白鵝卵一對入竹筒封置廁中半月取出以卵白和辰砂三錢丸菉豆大每服三十九二豆

飲下

毒從大小便出也小兒食之永不出痘或出亦稀

漏江方

要解風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞汁以熱手摩塗日再上之

圓經

痘疹不出用蘿蔔子生研末米飲服一二錢

良衛生易

斑痘不出端午日用硃砂半兩乳香一兩爲末猪心血圓梧子大乳香湯下一粒

中藏經

小兒痘疹不發韭根煎湯服之

海上

痘瘡不發荔枝肉浸酒飲之并食荔肉忌生冷

聞人規痘疹論

痘不發櫻桃核二三十箇打碎薑一片葱頭一箇煎服出汗即起發暑天不蓋被

易經通考

又用菊花根取汁少加水入穀糠淋下服之即起

痘瘡出時不快壯熱狂躁咽膈壅塞大便閉澀咽腫不利若大便利者勿服牛蒡子炒一錢二分荆芥穗二分甘草節四分水一盞同煎至七分溫服已出亦可服

和濟局方

痘瘡出不快乾山楂爲末湯點服之立出紅活

危氏得效

斑痘不快乳香研細猪心血和丸芡子大每溫水化服一丸

人規

痘瘡倒陷胡桃肉一枚燒存性乾胭脂半錢研勻胡荽煎酒調服

全効

痘瘡門

痘瘡乾黑危困者用棠樾子爲末紫草煎酒調服一錢

心鏡

痘瘡門

痘瘡倒陷鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎數沸去沫再煎去三分之一去滓乘熱

服之避風其瘡復出也一法用無灰酒煎其效更速

急方

痘瘡門

痘瘡變黑歸腎用竹園荽草煎酒噴噀遍身其痘即起

方指

痘瘡黑陷牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸胭脂取汁調搽一日一上

王氏痘

痘瘡黑陷沉香檀香乳香等分蒸於盆內抱兒於上熏之即起

鮮于

痘瘡門

痘瘡惡證如斑痘倒陷毒氣壅遏於裏則爲便血昏睡不醒其證甚惡用抱出雞子殼去膜新瓦焙研每

服半錢熱湯調下嬰兒以酒調抹脣舌上并塗風池督背神效

本草

痘瘡門

痘瘡倒陷月收人中白火煅爲末溫水服三錢陷者自出

儒門

痘瘡門

痘瘡倒陷用白狗一隻或黑狗餌以生粟米候下屎淘取未化米爲末入麝香少許新汲水調服一錢

總

痘瘡門

痘瘡白丁香末入麝香少許米飲服一錢

痘瘡發搐黑陷者用桃膠煎湯飲之或水熬成膏酒化服之大效

痘瘡在躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透者用獵猪第二番血清半杯酒半杯和勻入龍腦一分

溫服良久利下瘀血一二行瘡卽紅活此治痘瘡黑屬惡候醫所不治者百發百中

痘瘡黑陷臘月收獵猪心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服須臾紅活神效無乾血用生血

沈

痘瘡門

痘瘡變黑穿山甲蛤粉炒爲末每服五分入麝香少許溫酒服卽發紅色如神

直指

痘瘡門

痘瘡而作泄甚者用雲南啞芙蓉末五釐兒小者用三釐蓮肉末四分以老米湯調吞立效此藥凡痘瘡

痘瘡門

痘瘡服之皆有奇效

窮鄉便方

痘色灰白頂陷倒壓起死回生紅花子草麻仁麝香各三釐共搗如泥真香油生蜂蜜調成膏如錢大貼

百會穴輕者三四寸重者五六寸立起如珍珠

身經通考方

痘瘡雄黃一錢紫草二錢爲末胭脂汁調先以銀簪挑破搽之極妙

痘瘡證治

痘瘡濕爛黑豆大研末傅之

本草綱目

痘瘡生蛆用嫩柳葉鋪席上臥之其蛆盡出而愈

李樓奇方

痘瘡猪肉煮汁洗之

譚氏方

痘瘡潰爛枇杷葉煎湯洗之

摘元方

痘瘡痒悞搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂自落亦無紫黑瘢痕神妙

方陳氏

痘瘡作痒房中宜燒茶烟恆熏之

本草綱目

痘瘡痛痒用乾山藥白芨爲末燃而熏之

幼科全書下同

又用升麻蒼朮麻黃槐枝桑枝煎水乘熱拭之

全功心鑑錢氏方

痘瘡作癢用蟬蛻三七枚炙甘草各一錢水煎服之

全功心鑑錢氏方

痘瘡稠密用生犀於瀝器中新汲水磨濃汁冷飲

本草綱目

痘瘡便祕四五日用肥豬膽一塊水煮熟切如豆大與食自然臟腑滋潤瘀血易落無損於兒

陳文中方

斑痘始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者此毒入心鬱金一枚甘草二錢半水半盃煮乾

去甘草切片焙研爲末入真腦子半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃瘥此乃五死一生之候也

本草綱目下同

痘瘡不收用象牙屑銅銚炒黃紅色爲末每服七八分或一錢白水下

王氏參方痘

痘不落瘀砂糖調新汲水一杯服之白湯調亦可日二服

劉提點方

痘後離毒赤小豆末雞子白調全傅之

本草綱目

痘瘡入眼用茶豆七粒令兒自投井中頻視七遍乃還

本草綱目下同

防痘入眼用茶豆七粒令兒自投井中頻視七遍乃還

本草綱目下同

痘瘡入目猪蹄爪甲燒灰浸湯瀝淨洗之甚妙

普濟方

斑疹入目紫貝一箇卽研螺也生研細末用羊肝切片摻上紮定米泔煮熟瓶盛露一夜空心嚼食之

童叟

防痘入目胭脂嚼汁點之

集簡

防痘入目白芥子末水調塗足心引毒歸下令瘡痘不入目

痘疹要訣

痘瘡入目羞明生腎華澄茄末吹少許入鼻中三五次效

鴻飛集下同

痘瘡入目雞子殼燒研入片腦少許點之

痘瘡入目石決明火煅研穀精草各等分共爲細末以猪肝蘸食

痘瘡入目生腎華用兔屎日乾爲末每服一錢茶下卽安

普濟方

斑痘入目生腎障用白菊花穀精草茶豆皮等分爲末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食柿日食三枚淺者五六日遠者半月見效

直指方

痘瘡入目腎水煮螺蛳常食佳

濟急仙方

痘後生腎水銀一錢號丹五錢研作六丸坩鍋糊定火煅一日取出薄綿裹之左腎塞右耳右腎塞左耳

自然墜下

危氏方

痘後障腎用蛇蛻一條洗焙天花粉五分爲末以羊肝破開夾藥縛定米泔水煮食子女及甥皆用此得效真奇方也

齊東野語

痘風赤眼初生小兒臍帶血乘熱點之妙

海上

錢氏方

痘瘡黃明膠炒研末溫酒調服一錢七痘已出者服之無癰未出者服之瀉下

本草綱目

痘瘡赤癥用雞子一箇酒醋浸七日白殼蠶二七枚和勻揩赤塗之甚效

聖惠方

痘瘡瘢痕羊脰二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之

明日以猪蹄湯洗去

千金方

鍼灸

陳氏痘疹方曰治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發已起發者不能貫膿已貫膿者不能收斂或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散京師常見治此者卽以銀針挑破出毒血諸痘隨時貫膿若挑破不痛不出血者難治若用此法灸之卽知痛更用針挑破紫血隨出諸痘隨貫亦有生者其法用大蒜頭切三分厚安痘疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤宜當灸治者審之

醫案一

錢氏小兒直訣曰睦親一大王病瘡疹先用抱龍丸解之彼另用藥下之其疹稠密余曰瘡疹始出未有他證但用平和之藥解之如三日不出或出不快宜微發之更不出當再發之出而不多脈平和無他證者瘡本稀少不可更發若瘡起發能食者大黃丸下一二行若初起就用下劑則裏虛瘡不能盡出而稠密難治至三日其瘡黑陷喜不寒戰遂用百祥丸牛李膏各一服瘡復紅活而愈蓋黑者歸腎也腎旺勝脾故脾虛寒戰則難治所用百祥丸瀉膀胱之邪自不盛也

五大尉因墜鞚驟患急驚發搐或用表散之藥不愈此急驚當先退其熱以大黃丸玉露散惺惺丸加牛黃龍麝解之至三日肌膚尚熱余曰再二日不愈必發斑瘡已而果然服必勝散七日而愈此乃初因誤散其表內熱不止而斑自生也

十太尉瘡疹未出呵欠煩悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮赤欬嗽時嚏此五臟證具也以其別無他候故未發出若已出則歸一臟也用抱龍丸數服瘡疹出而諸證愈

張子和儒門事親曰河間劉光濟之子病疮後嘔吐發昏用丁香荳蔻之類不效適麻先生寄其家乃謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰利可開苦

至食時下黃涎一合日午間之兒已索遊於街矣

萬氏家傳痘疹心法曰邑人黃鳳山一子五歲請預解痘毒法予曰令嗣氣色明潤胎稟壯實痘出必疎更服藥則益疎矣乃與代天宣化丸服之後痘甚疎不藥而起

邑令朱雲閣義男一子甫周歲以示予予曰笑無情恐出痘耳訣云喜引才方笑此子不待喜引自笑謂之無情笑者心之聲火象也經曰諸痛癢瘡皆屬心火故恐出痘也朱公忽焉未幾果痘頭面腫瘡死友人胡三溪中年得子項小聲小予告之曰項者頭之莖名曰天柱項不任元天柱頽矣聲者氣之發聲微不揚元氣弱矣誠恐出痘不能勝毒果九歲出痘乍見乍隱鼻滴血死

邑人李新芳子四歲得驚風予醫之愈乃曰以吾兒託公予曰令嗣胎稟怯弱精神短少若調理數年胃氣充實出痘無妨但恐痘太急耳次年果痘密甚不成膿死

邑人周柳溪止一子五歲未出痘癸丑正月念三日發熱請予視之見面多青黑色目無神元氣怯弱予曰當亟治周不喜予言予曰邪氣有餘元氣不足若不亟治後發血泡不可爲也彼更請醫作外感治且汗且下至念八日果發血泡卒

斬水周惠長男婦魯氏新寡二男二女皆未痘請予視之予見二男長女面色嬌赤神光太露額有青紋惟小女形質氣充面色明瑩乃告之曰若出痘惟小女吉也魯以言太直不聽半月後長女二男相繼以痘殞小女存

斬水徐長溪三子癸丑春出痘季子先病痘卒次子又卒惟長子存亟延予治之時未發熱予觀長溪色憂情苦預告之曰令嗣當出痘時精神爽健氣色光晶年壽明潤印堂黃光此壽相又順候其痘必疎不須醫治無疑慮也頃之果出痘甚疎不藥而愈

邑訓導馬公順蜀人也一孫五歲出痘至八九日膿成將燭忽腹痛煩哭大便祕馬駭甚予曰此結糞也當急下之馬公曰痘瘡首尾不可下今當收腫中氣要實敢下耶予思不急下加腹脹氣喘且不救乃作桂枝湯暗入酒蒸大黃煎服下燥糞腹痛即止痘瘡而安馬公知之謝曰非子通變幾誤此孫

邑人汪我溪次女丁卯冬出痘延長男邦忠視之起發貫膿時昏睡不思食予謂忠曰此心血不足邪火內熏神昏證也命以龍腦安神丸與服有頃甦痘亦平

程希文次子辛未春出痘發熱現形時煩躁譫語來告予以病證予授一方用木通山梔仁麥門冬牛蒡子連翹甘草燈心作引水煎調辰砂末連服三劑病退痘出如期愈

鄆陽撫院孫一女七歲己巳四月七日發熱全在幕下見其面赤腮爛知是痘證次日口角傍便見紅點如蚊迹狀不成顆粒一逆也腰痛腹痛二逆也昏睡譫語三逆也乾嘔四逆也初九日入見其狀撫膺大慟全以色脈無恙再三慰之不信但垂淚曰爾痘疹書明言不治何又相誑也全告白此病在經絡猶可治也但因中氣久虛不能驅毒外出耳孫乃命進藥予用保元湯以補中氣加羌活防風荆芥柴胡發散表邪木香山楂驅逐裏邪調辰砂末以解毒初九初十十一日連進三劑十三日午時忽昏暈目閉口噤神色俱變孫與夫人皆哭全急告曰此有冒汗來也汗出痘亦隨出謂之冒痘須臾視之果得大汗而痘盡出矣復用錢氏異功散加黃芪白朮調理而愈孫拱謝曰不負吾爲爾梓痘疹書也

壬申春郡人王蒸湘子出痘請予往治痘已盡出問其詳時有董齋在答曰正月廿七日發熱廿八日現形自額上起今三日矣予思額上初出者重三五成叢者重五心俱有者重鎖項者重乃逆證也及審其證腹脹大而緊腸中汨汨有聲大便如黃金色乃脾敗逆證也因其一子託治甚切設法調治腹脹不減腸鳴如故起發之初心窩中有一痘戴漿者隨卽破滅背瘡盡成水泡目中泊出兩拳緊握手甚恐此脾土敗肝木勝之候也蓋肝爲水泡其爲變也握不泣而淚出肝絕也未五日而脣瘡乾黑背瘡盡破診其脈濡弱沉細其脈又逆六日而瘡作搖頭扭項逆語也且求粥食且急病名除中又逆證也予急進保元湯合桂枝湯調獨聖散服之復見紅點蒸湘喜曰此有生意矣予曰若漸出一層小痘則吉只恐膏之將減也必大明而後滅果紅點復隱加喘而絕

邑令朱一子九歲庚申三月發熱嘔吐召全視之全曰痘也公曰不然昔在蜀已出過痘跡固在全曰此水痘癥非正痘癥也朱又堅執爲傷食全辨之曰痘疹發熱與傷寒傷食相似傷寒發熱則面紅手足微

脾也耳涼散涼足涼腎也以此論之乃痘疹非傷食也朱曰未見五臟諸證只嘔吐足涼恐非痘也全曰此子脾胃素弱痘毒乘虛故發在脾但見嘔吐一證熱纔三日姑待明日再議次日以燈視之皮下隱隱紅點而脣邊已報痘矣朱惟一子心甚憂懼全告曰顆粒分明部位正當此順痘也朱問宜服何藥全曰痘無病不宜服藥但適其寒溫調其飲食期十三日安後果然

黃岡索希文爲羅田吏一子十三歲發熱腹痛煩渴萬世喬先作傷食治熱不除腹痛甚亟復延予予曰此痘也腹痛者毒氣內攻也煩渴者神不得安津液乾也法當解毒托裏不可緩也世喬堅執爲傷食證五日後其痘一齊湧出未及起發乾枯內陷而卒其母泣曰悔不用萬君之言

英山一富家子年十六患痘發熱腰痛來請予治問曾婚否曰未也連進人參敗毒散二服痛止痘出而安若會有房室者不可治也

邑人胡元溪一子甚珍愛未痘延予視之予曰令嗣五嶽端立三關明潤骨堅肉實神俊氣清出痘必疎壬寅五月末旬發熱作搐元溪夫婦憂惶無措予曰此佳兆也以辰砂散投之搐止痘出予又曰凡痘起脹未有頭面不腫者此痘顆粒緊小必不大腫面貌如常期十二日安果然

予次男邦孝辛卯春方四歲發熱卒驚而絕其母大哭予曰此痘疹也乃掐合谷得甦與導赤散瀉青丸一服而搐止痘出甚密幸無他病十三日而醫予時制滿起復追崔宗師至棗陽往返半月抵家又出疹愈

邑人胡玉峯第三子方二歲染痘自利三日不止請予治之彼欲進理中湯加荊子肉荳蔻予曰不可此協熱利也宜用黃芩芍藥湯但觀其形色利當自止不必服藥次日痘出利果止

一小兒發熱之時自利大孔如竹筒狀清水流出逆證也予思乃火盛於內肺金不行收令也以黃芩芍藥湯加烏梅一服而利止

邑人胡三溪子己酉冬痘時常以手自掩面身下縮頻呼曰我怕若有所見者請予視之予曰逆證也經曰腎敗者失志目中見鬼死不治錢氏云腎則病下竄此痘發於腎不可爲也果然

一婦人年二十餘發熱五日痘不出常起摸牀壁昏不知人口喃喃不休請予視之曰死證果然本邑周璜子年十三染痘發熱五日痘不出發狂譖語請予治之予往見其族兄周尚貴在亦明醫也乃問曾服藥否曰連進保元湯二劑矣予曰誤矣犯實實之戒也凡治痘者發熱之初驚者平之渴者潤之吐利者和之便祕者利之熱甚者解之如無他證不須服藥今觀此子元氣素厚飲食夙強乃以保元湯助火爲邪毒氣鬱遏至於狂妄熱已劇矣宜急下之與三黃湯得利狂止痘出至十七日癒

蘄水汪沙溪家癸丑年出痘請晉家湖黑神托巫語云爾家十八人六人不可救也初出痘一婢死急請予往又一婢發熱顛狂予見之曰熱劇矣當速解之沙溪曰專爲吾孫請公非爲此婢也且神言不吉者六人奈何予曰人有貴賤醫無分別僕到當悉活之神言不足信也乃作三黃湯大劑與之得利熱減神清痘出而安餘十七人悉活之

里中林霄年二十餘染痘初發熱小便血予聞之嘆曰不可爲矣或問故予曰乙未春蘄水桃樹坳徐氏出痘死者十八人皆小便血也霄越三日殞

余長孫祖善邦孝長子二歲時染痘發熱三日內忽寒戰似瘧孝泣曰死矣予笑曰爾爲醫救病如篙工然忽遇風浪手足自亂何以渡人此兒元氣充盛毒氣微少邪不勝正故作寒戰而退試觀其痘必少也果止五七粒七日愈

胡三溪子己酉冬出痘初發熱便咬牙戛戛有聲精神昏憤予見之嘆曰逆證也乃腎虛證蓋腎主骨齒者骨之餘腎水不足則毒火無制火氣扇動故上下相戛而有聲陳氏所謂齒槁者是也果卒

黃岡程旋溪子未一歲時值家中出痘請予視之予見此兒多笑知其心火有餘乃令蔡朝辰黃連一用錢山梔仁七分辰砂五分水爲丸服之三日後笑漸少時辛未三月十九日也廿一日發熱忽作喘喉中涎響汩汩有聲旋溪驚予曰肺熱證幸不肩息足冷乃作清金散火湯一劑而減半再劑而喘定麻城周愚齋長媳寡惟一女出痘使使延予予問狀曰發熱五日餘未見痘出但背上發一腫毒予曰不可治也非癰乃痘母也二日後果有凶問

痘出雖有輕重未有不成膿結痂者先者試痘其證爲逆身無熱伏在內也時一日者言次君有大災如予言衆哂之數日次子作大熱痘齊湧出身無空膚予用參芪歸芍甘草節以養氣血荆防木通青皮牛蒡子連翹金銀花酒炒芩梔桔梗以解毒作大劑一日一服調理至十二日後遍身潰不卽收疎予改爛

用十全大補湯去桂加白芷防風外用敗草散貼襯前後三十餘日而安日者亦抵掌曰予言如何

邑人王云野子二歲發熱出紅點一二粒請予視之見額紋青氣年上赤光乃告之曰此險痘也先出者名試痘中氣不足毒氣隱伏故出不快也以調元湯加防風木香服後有痘旋出喜無他證十三日安

邑人余光庭庠生也年十九染痘發熱五日不出請予及韓兩峯治之兩峯佳醫與予素善予問其證未解已三日診其脈細而數雖有下證元氣怯弱不可下也乃謂兩峯使作膽導法不得通病者煩躁家人惶惶予思發熱日久毒流其中燥糞閉塞肛腸乾枯氣不得行血不得潤膽導力小不能通也自立一法取猪屎胞一枚以猪膽汁半杯清油半杯蜜半杯三物攪勻入胞中如作膽導法取下燥屎二十餘枚氣通熱解神清痘出予笑曰此法外意也

胡三溪初生二子丁酉年入監乃以長子托予次子托萬紹戊戌春長子先出痘予守治十一日安隨次子出痘予間其乍熱乍退兩足冷數日不大便痘先出者猶是紅點亦不起發念三溪之常好往視之驚曰此逆痘也紹曰熱微毒亦微熱甚毒亦甚今熱不甚順痘也予曰不然痘本火毒待熱而發如發熱而不煩不渴大小便如常精神清爽者此熱在表其裏無邪毒火發越而痘易出易癰也若煩躁不安大小便艱昏昏喜睡此毒火內蘊不得發越表熱雖微內熱則甚何謂熱微毒亦微也此子乍熱乍退者毒火往來也大便不通者毒火鬱遏也痘見紅點而不起發者毒火之陷伏也足冷者火之極而兼水化謂之厥逆也紹不以爲然至次日紅點俱沒煩躁轉甚紹曰此內收也予嘿不應因嘆曰醫貴同心執已見以誤人命耶此何爲者翌日死

麻城鄒清溪一子五歲出痘先請傅醫治之服保元湯熱益甚又請李醫到曰險痘也清溪不安延予視之曰此順痘也期十八日安不須服藥衆曰今自發熱日計已六日矣何以須十八日况痘不服藥何以

得痘今進保元湯三劑尚有一劑未服予曰痘不可以日期算出已盡發已透膿已滿而後收醫可期也今痘出而熱轉甚者出未盡也由服保元湯犯實實之戒故令出遲醫亦遲也吾聞善攻不如善守本無他病何以藥爲吾爲爾保全是子無憂也後果然

邑人胡近城次子庚午冬未痘先兩頰赤燥請予八子邦靖視之予謂靖曰傷寒論云面色緣緣赤者陽明熱也若不預解至出痘時此處必甚稠密而赤貫串難醫教以升麻葛根湯加防風牛蒡子連翹二服而紅色盡去痘出亦疎

汪懷江次子五歲出痘甚密且紅艷懷江恐其不吉請予四子邦治醫予謂治曰險痘也氣實血熱可治也教用當歸梢赤芍藥生地黃防風荆芥穗牛蒡子連翹桔梗甘草以解其毒連進三劑紅色盡退猶未發透再教用黃芪防風甘草赤芍藥牛蒡子桔梗青皮山楂肉連翹調理十五日而癰

英山馬四衢一子五歲出痘痘不起發延予視之予曰此順痘也馬氏兄弟曰不起發何如曰毒甚者則頭面腫毒微者則頭面不腫非不起發也又呼咽痛四衢憂之予曰此乃痘家常病可喜者喉舌無瘡頸項間痘稀不足怪也乃以甘桔湯加牛蒡子水煎細細嚥之咽痛即止飲食無阻十三日安四衢曰向吾小兒咽痛服藥輒效何神也予曰痘疹者火毒也火氣上熏咽喉豈不作痛故用桔梗之苦以開其結甘草之甘以瀉其火牛蒡子之辛以解其毒是以效也若喉舌有瘡則壅塞潰爛頸項多痘則封鎖熏炙必爲喰水失聲之證令嗣無之故曰不足怪也馬氏稱善

折水羅良制妻魯氏年二十七歲出痘遍身紅點大小相雜無有空處白石曰此女難治予曰此斑疹夾痘證也語言清亮診其六脈調勻問其飲食如常大小便調不煩不渴但遍身紅斑稠密無縫色且艷予曰此夾斑痘證也魯畏死乞救甚哀予曰此病非吾不能治斑痘相雜故難識耳解去其斑則痘自見汝切勿憂亟作荆防敗毒散加元參升麻作大劑一服次早視之則斑迹不見痘粒可摸矣再進一服其痘起發調理半月而安

折水汪白石婢方二歲出痘遍身紅點大小相雜無有空處白石曰此女難治予曰此斑疹夾痘證也乃

本邑各衛出痘先一衛一子一女出長子後發熱見紅斑予疑是夾斑證三四日後其斑盡收熱退身涼痘不出四衛小男女正出痘一子發熱亦出紅斑亦亡恙乃信人有不出痘者或發斑或發疹或發水痘皆可折過也必在正出痘時方論

英山鄭斗門一子出痘將見形作癰不能禁亟請予治迎謂曰吾只此子今痘作癰奈何予曰起發時作癰者逆也貫膿時作癰者逆也將膿時作癰者險也險者可治逆者不可治出見便癰經傳中原無是證待吾思之頃之予謂之曰吾思仲景傷寒正理論云太陽經病身癰者此邪在表欲出不得出也桂枝麻黃各半湯陽明經病皮中如蟲行者此肌肉虛也建中湯令嗣身癰正是痘欲出不得出與太陽證同非陽明肌肉虛證也乃以各半湯方內去桂杏加升麻葛根牛蒡子一服而痒止痘出甚密留予守治半月而安斗門謝曰非公達仲景之妙安能有此子也

吾第七子婦徐患痘大熱大渴眼紅脣裂自利清水妄見妄語循衣摸牀遍身紅斑俱如蚊跡皆逆證也人皆危之予議曰此毒在三焦表裏俱熱非大發大下之劑不可救也乃以通聖散全料大劑與之才一劑而前證悉去痘即出現甚密復用十全大補湯去桂加防風金銀花連翹桔梗調理愈其痘自下收起亦奇事也

折水羅野松年十六出痘其父月湖延予視之予往先有張醫在張之言曰凡出痘者春夏爲順秋冬爲逆今冬出痘時逆也痘起發頭面要腫今被寒氣鬱遏毒不得出故頭面不腫證逆也奈何予曰不然春夏爲順秋冬爲逆非以時言以痘疹言也蓋春夏者發生長養之令也秋冬者收斂閉藏之令也痘本陽毒自出現而起發自起發而成膿如苗而秀秀而實故曰春夏爲順如應出不出應發不發謂之陷伏故曰秋冬爲逆頭面不腫者順痘也頭面浮腫者險痘也頭面預腫者逆痘也今痘本磊落尖圓堅實其毒輕微故起發而頭面不腫若項平根闊肌肉鮮紅此爲毒甚不待起發而頭面先腫矣張曰起發大遲由虛寒始宜服溫補予曰痘無病不須服藥吾觀此痘紅潤鮮明表氣實大小便調裏氣實也無熱無渴無他病也於此補之謂之實實公且止吾計十數日必收膿矣果未嘗進一刀圭藥也

微人吳印墩子出痘胡三溪邀予同往視之磊落紅活順痘也其兒脾胃素弱起發略遲復請醫萬世喬見不起發謂其氣虛妄投陳氏木香散一劑痘轉平不起又投陳氏異功散一劑其家驚懼再請予同三溪視之曰噫死矣

折水一屠家子出痘正貫膿時請一巫者誦呪噀水解厭後忽加瘡癰痘形平塌其色青白而氣腥臭予往視之曰此犯房室穢氣也急令買膠棗一觔燒烟熏之瘡轉紅活而癰亦止問其故老巫他往而子代之有房事

邑人胡半峯子五歲出痘起發時項平而陷請予視之予曰順痘也凡出痘者以氣和平爲主尖圓堅實者氣也紅活明潤者血也紅活平陷者血至而氣不足也圓實而色白者氣至而血不足也平塌灰白者氣血俱不足也焮腫紅綻氣血俱有熱也令嗣痘出卽密時日未到氣血未周以漸起發得其常也故曰順痘不須服藥已果然

折水汪沙溪子痘出膿成時頭面腹背皆飽滿惟手足自肘膝至掌指猶未起發予驚曰脾主四肢此子脾胃何甚弱也祖母葉氏曰吾孫生三日母卽死是吾嚼粥飯養大也予用健中湯加黃芪防風只一服而疹盡起腫作膿矣時沙溪夫婦信奉魯湖黑神於家此子寄名於神未出痘先神降童云壇保吾老黑承管只要痘出得少至是痘甚密予等朝夕笑玩以計逐之使去

折水李望松在監時其子一歲在家中出痘請吾往視之起發時都是水痘予曰痘乃胎痘五臟各具一證肝爲水疱肺爲膿疱心爲斑脾爲疹腎爲黑陷此乃肝臟之證喜皮厚肉堅而色蒼臘若皮薄色嬌不可治也乃以四君子湯加黃芪防風牛蒡子母子同服十三日安

邑令梁厚村子出痘起發時多成膿疮請予治之予告之曰此險痘也治晚矣公曰但盡爾術越一日癰癢作而死

英山鄭兩川子九歲出痘起發時額上兩頰皆成水疱吾曰逆痘不可治也痘證自有次序初出一點血化爲水水化爲膿膿成而毒解矣如苗而秀秀而實今方苗而秀吾恐早發還先萎也七日後更論未及

讀安靜而聊一醫欲投木香散予曰此兒無吐瀉裏虛之證不可用也乃以保元湯加當歸赤芍藥防風桔梗牛蒡子調理而安

一婦人二十四五出痘甚密面腫甚身無完膚七八日後眉心脣上有成血漿者或謂正當作膿之時予曰未也面瘡帶赤猶是血也未曾化水遲爾成膿此惡候也後必潰爛死果然

一小兒起發作癢予曰諸癢爲虛此非虛也乃火邪也人以湯沃之火炙而癢可以例推乃用升麻葛根湯加防風荆芥紫背浮萍只一服而癢止

一小兒痘起發時痘瘡作痛而呻吟予曰痘脹作痛者佳膿成痛自止矣今痛太甚者血熱也升麻葛根加紅花連翹牛蒡子忍冬花服之即止

邑令朱雲閣子出痘至起發時項後手背有二痘變黑者摸之則痛此痘疔也急取胭脂數帖水浸取汁塗之盡汁而止次日視之已紅瑩起發矣

邑人汪我溪子出痘起發時有變黑者予以雲閣子之事語之教取胭脂汁塗之其內周氏不聽予謂我溪曰不用吾言蔓延不可爲也後果一身盡成黑痘而塌復出一層又塌如此者三而卒

王思泉子出痘起發時漸變黑急請予治已蔓延一身矣其兄少峰議曰吾聞痘瘡變黑歸腎者不治公謂何如予曰黑痘有一證一則乾枯變黑者此名倒陷乃邪火太熾真水已涸故曰歸腎不治一則痘色變黑未至乾塌此疫毒之氣所謂火發而熏昧者也令姪之痘正是此類吾能治之乃用當歸梢生地黃赤芍藥酒紅花以涼血黃芪人參主甘草以瀉火補元氣酒炒芩連牛蒡子連翹升麻以解毒防風荆芥以疏表每劑入燒人屎一錢連進十三劑痘色轉紅膿成而收癰矣少峰曰吾未見能治黑痘者人奪天巧信哉

李良臣子出痘至起發時變黑而乾急延予治乃問其大小便何如乳母答曰自初發熱到今未大便曰

此熱盛於內宜急解之因制一方用麻黃酒蜜拌炒焦黑紅花子紫草人中黃連翹酒蒸大黃燒火屎水煎服外用膽導法取下燥屎痘轉紅活後以四物湯去川芎加紫草木通枳殼生甘草調理收癧而安  
坼水汪白石子出痘方八歲請予治起發時有黑枯者予曰此痘疔也用四聖散胭脂汁調銀簪撥開痘頭塗之卽轉紅活亦不延蔓數日後應收不收問之不解已七日矣知其腸內燥結其家信佛事禁殺予強取猪肉爛煮和汁與食果腸潤便通痘旋收癧

英山鄭鄧子出痘請予往治起發時肩膊腰臂間有數箇乾黑者急以胭脂塗調四聖散銀簪撥開痘頂入藥於中須臾起發紅活亦不延蔓時鄧叔鄭斗門善醫同在調理因問予曰痘瘡變黑有可治有不可治者何也予曰痘瘡變黑其證爲逆治之貴早不可緩也緩則延蔓傳變倏出倏沒迤邐而死矣治此痘者亦有數法如四圍有水中心黑陷者只用胭脂塗法須頻頻作之直待轉紅起疖而止如痘子乾黑根腳堅硬者可用四聖散卽今之治法也若皮肉不活根脚不腫者決死勿治若起發有水頂平而黑者互內服涼血解毒藥加燒人屎外用胭脂塗法若大便不通者此裏熱熏蒸得之宜內服四物三黃湯外用膽導法得利後而變紅活也若泄瀉者此虛寒也宜用保元湯加木香桂如盡乾黑煩躁悶亂者決死不可治斗門稱善

李廷讓子四歲出痘十日後予視之見其痘頂平陷根窠紅紫昏睡不食予曰不可救也次日死

張月山妹出痘起發止空殼延予視之予曰此氣有餘而血不足也責在肝經用四物湯小柴胡湯服之雖作膿亦未飽滿而收予曰凡痘瘡不成膿或膿少者皆發癰毒此足厥陰肝病必發項疽已果然

予長子邦忠三歲出痘先君年八十始得一孫與先母珍愛甚篤至膿成將癰時忽作泄瀉瘡變灰白先君曰此虛寒證命作木香散服之未盡其劑泄止瘡復紅活時鄰居民曾顯榮長子出痘密甚將癰亦作泄瀉痘變灰白又作癰亟來請藥先君卽以前未盡劑姑與服之泄亦止而瘡轉紅活不癰矣  
郡別駕王峰蕭公女七歲出痘請杜近林治之連服保元湯公因瘡密憂甚延予視之予曰表裏俱實雖密順痘也不必服藥公江西永豐人彼處出痘者專食雞予以裏實告雞不可食公不聽日取大雞爛竟

予止之至第三日大泄水一行予告公曰泄止矣公問未服藥何以止予曰此坐飲雞汁太多水畱腸胃之中今泄者名蓄水泄也水盡泄自止與四君子湯加陳皮調理而安公甚稱服

一小兒痘本輕疎因傷食腹痛而嘔用平胃散加砂仁藿香葉煨生薑而嘔止

一小兒痘密甚喉舌都是將醫時嗰水嘔食雜膿血痂皮痰涎而出用甘桔湯加牛蒡子頻呷之調理而安

一小兒膿成將醫忽作乾嘔雖不飲食當時自嘔喚予視其痘不作膿不滿頂曰此逆痘也乃誦冰凍葉落絃絕聲嘶之言以告之後失聲悶亂而死

胡三溪女七歲出痘初發熱兩手如撲物狀時喻正甫亦在予曰此肝病也經云其爲病也握宣平其肝以瀉青丸方去大黃加甘草柴胡青皮一服而握手止予欲再進一劑其母匡氏不喜喻順其情呼曰好痘勿藥予曰噫凡肝病者多水泡而作痒吾欲止之未發之前既不聽七日後再議予但言用心守護果至第六日夜面瘡盡抓破矣匡乃大哭請予治之喻亦嘆曰何變之速耶予曰向欲預防此變爾等不信今何嘆惜哉請勿憂予能治之乃用保元湯加防風白芷一服癢止再服著痂而瘡亦平

吳近濱二女出痘請予調治長女順吉次女將養膿面上有乾醫者犯倒陷逆證原無治法乃主一方用黃芪人參甘草節當歸赤芍藥生地黃金銀花牛蒡子連翹麻黃蜜酒拌炒黑紅花子水煎調穿山甲末且告之曰此藥服後若瘡先乾者復起作膿未乾者脾壯飽滿痘空地上再出小痘上也痘不作膿不補空或發癰毒次也否則無可爲計矣連進三服已乾者不腫未乾者飽膿空中補痘不多手足發癰後以十全大補湯加金銀花連翹調理而安

坼水丘蓮塘季子出痘正作膿瘡癢哭亟請予往見其面痘磊落紅綻膿漿未熟兩頰先乾皮肉木硬因其珍愛難以凶告但曰左頰屬木肝也肝主血藏魄右頰屬金肺也肺主氣藏魄兩頰木硬氣血不榮魂魄不靖所以煩哭也蓮塘固請用藥金辭不能治欲解其毒則中氣反傷欲補其中則邪火正盛因告

退是夕加煩而死

折水徐桂山子文禎年十七出痘請予調治至膿成將膿時忽發狂妄語起舞或毆人罵人皆平日讐恨者一身瘡盡逆破父母恐有魘呪亟延田巫禳之田盡其術病者不少甯乃問予予曰信巫不信醫待巫無驗吾方治之田亦自知非魘乃告予曰請用藥勿相徇也吾用安神丸百粒作二次服良久始省問其所爲夢也

麻城鄒瀆溪子出痘至養膿時大渴不止予議用人參麥門冬散傳醫卽依本方修合予謂曰此乃瘡出太甚津液不足之證白朮燥津液茯苓滲津液皆所禁也吾借古方而行己意敎以本方去白朮升麻加生地黃天花粉知母淡竹葉一服渴

邑孝廉萬賓蘭子出痘至養膿時大渴不止予用人參麥門冬散去白朮升麻加生地黃天花粉作大劑代湯飲之一服渴

坼水李宅一女出痘至膿成將膿時發腹脹且痛氣喘呻吟請予治之予視其瘡既肿壯膿又飽滿診其脈弦滑予曰此非痘毒乃傷食也因問曾食雞肉糯米飯予曰急下之女之祖知醫乃曰痘瘡首尾不可下恐虛其裏不膿也予曰病不執方藥貴對證有是病則投是藥下之無妨遂以原物作湯吞丁香脾積丸得利而安

英山金宅一子出痘成膿時忽腹脹作痛氣喘煩悶延予視之其痘光壯飽滿非毒也必曾傷食問之果因麪食過飽乃用原物湯送下丁香脾積丸得利病稍定再用錢氏異功散加青皮山楂一服愈

邑丞雷省齋次孫五歲出痘延予四子邦治視之此孫嘗拜醫萬世喬爲恩父世喬恃熟專恣無忌邦治用藥必力阻之衣之以厚綿圍之以厚被日夜向火任其飲酒未七日而膿予聞日期未足其收太急親往視之見其自面至腰潰爛平塌無作痂者乃告曰此非正收是倒膿也亟用托裏解毒之藥減去衣被再勿近火飲酒可保無事因立一方以黃芪白芷排膿托裏防風蟬蛻以疏表青皮桔梗以疏裏牛蒡子甘草以解毒只一服而潰瘍復張大便膿涎此毒氣中外無留矣予辭歸又告曰勿再服藥恐生他病也

問之但搖頭垂淚自知必死家人懼甚予思痘瘡變黑歸腎宜有猝失聲之證今痘已成膿飽滿紅潤何以有是逆證也沉吟良久亟呼邦忠曰勿亂吾得之矣內經云婦人重身九月而啞者少陰之脈不榮於舌也夫少陰者心也心生血諸瘡皆屬於心瘡毒之火內起於心迫血下行故經血來也舌者心之苗血去則心血虛不能上榮於舌故舌萎縮而猝失聲不能言也乃以生血散去五味子加當歸身生地黃服之良頃之愈後以十全大補湯加麥冬調理而起

坼水蕭家一子三歲出痘請吾長子邦忠治將醫時忽失聲邦忠以問予予乃示以四證忠曰啼哭有聲但言語重濁不清響也予曰此肺熱也教以甘桔清金散服之而安

邑人胡玉峰子出痘甚密請予調治予曰此兒脾胃素弱當用補胃之劑使血氣旺而痘易成就也玉峰不聽至成膿後過期不癰遍身潰爛寒戰咬牙失聲悉具玉峰恐不祥先倩匠合木而吾至逐之玉峰問故予曰戰者遍身潰瘍坐臥艱難不能自任非鼓領寒戰也咬牙者齦瘡相聚相戛而鳴非神昏齦齒也失聲者欲得肉食子不與日夜啼哭思之非咽爛嗆水也予不用吾言以至此極若肯進補脾之藥則卽醫矣乃從吾言予用調元湯加防風白芷暗入熟附一片連進三劑而安

邑庠生余光庭十九歲出痘延予與韓鳳岐治之十日後膿成漿屬忽作厥逆診其脈促而代予謂韓曰厥逆者惡證也促代者怪脈也痘瘡順正飽壯明潤何以得此脈證也韓亦憂疑予思厥逆三證一曰胃寒二曰水逆三曰胃敗皆不相干經曰諸氣逆衝上皆屬於火此火氣炎上之象乃問其大便何如曰自出痘到今七日未更衣予曰燥屎壅塞下竅不通毒火炎上出於上竅故厥逆也促代之脉得之厥逆氣逆脈亦逆也又取猪胞導之取下燥屎厥逆即止而脈亦調匀隨起

坼水徐淑道十三歲出痘請先君菊軒醫治一日歸家而嘆全問何事先君曰坼水徐生出痘父喪母寡今不可治矣全問其證先君曰痘已成膿只待收瞤今變黑歸腎故不可治全曰全能治之乃往視之見其痘磊落膿漿飽滿神識清爽語言清亮自告予曰先生救我問其大便五日未通全告先君曰此痘正宜收瞤裏實熱蒸故潰爛也其色蒼黑亦正色也但解其裏卽瞤矣先君問以何方全曰四順清涼飲與

圖書集成醫部全錄卷四十一

十一

之一服下燥屎二十餘枚痘隨收靡而安先君問全曰汝未習醫何以知其變色爲正色非歸腎也全曰此在邵子皇極經世中乃誦其東赤南白西黃北黑之言而詳解之先君曰爾以儒爲醫矣

卷四十一

## 痘疹門四十

## 醫案二

萬氏家傳痘疹心法曰邑人汪大賓有三子長子次子皆死於痘少子汝愚痘將膿灰白潰爛神昏不醒大賓之兄大川亟請予往謂此姪之病與前相似幸而得生吾弟有後但恐不可治也予視之曰無傷不必服藥但與公同守三日收醫也大川問不服藥何以能痊予曰瘡白者乃熱太過而白如果熟潰爛之狀非虛也神昏者乃邪盡正廻否極泰來之兆非昏瞀也再待三日正氣復而病痊矣果然

英山沈瀚女年十九出痘其壻請予視之起發未透膿漿未成收醫太急非正醫也適占得渙之巽予曰病既逆卦象又凶不可爲矣果死一子十歲出痘將醫亦與其婦證同及十亦得渙之巽人皆懼予曰勿憂此可治也其壻曰同一病同一卦象有可治有不可治何也予曰以病言之令正收醫太急而無完瘡故曰不治令身面瘡半屬膿腫尚存故曰可治以卦言之先以夫占妻用財爲主卦中無財兄弟發動又尅妻財所以凶也後以父占子用子爲主子孫旺相兄弟發動能生其子所以吉也已而果然瀚曰公何但神醫亦神卜也

邑文學胡小山長女未嫁出痘甚密膿成過期不膿請予調治此女平日脾虛食少性不肯服涼劑予乃以錢氏異功散加木香青皮煉蜜作丸米飲送服調理而愈

小山子胡仁山幼時出痘甚密膿成不膿漸至潰爛請予調治予問自起發以來未得大便裏實熱蒸故不成癥議欲下之小山曰此子素弱恐不可下時有一術士王克廉符水甚驗乃書一符焚而服之少頃腹中鳴而利下清水衆皆稱謝予亦喜之但思久未更衣豈無燥糞至次日痘益潰爛予作膽導法取下燥糞三十餘枚如彈子大衆又笑曰此法更妙痘即收醫至腰又不收大便自燥糞下一次又未行也予曰作符乎作膽導乎王亦曰不如膽導王亦曰不如膽導再取下燥糞十四枚後皆溏糞痘亦收盡而安一小兒因渴飲水過多濕傷脾胃不能收醫以四君子湯以人參補中白朮燥濕茯苓滲水甘草解毒加

防風以勝皮毛之濕白芷以逐肌肉之水肉桂以利關節而去寒水之邪砂仁以溫胃止渴調理而安一小兒大便不通熱蒸於內而生其濕以致浸淫不能成痂用當歸梢生地黃以涼血麻子仁以潤燥酒大黃以瀉熱開結生甘草以和中得利而安

一小兒泄瀉不止食少此裏虛不能收腫用陳氏木香散合肉豆蔻丸服之愈

邑人蔡承盛子出痘甚密先延甘醫視後膿成後過期不腫面瘡潰腫起止呻吟嗆水吐食語音不清甘謂不治而去復請予予視其病面瘡腫起正在貫膿遍身皆然非倒臍也嗆水嘔食者口唇腫硬吞嚥不便非咽喉潰爛也語音不清者鼻中壅塞氣不得通非失音也瘡毒盡出表病裏和可治也乃製一方用苦參酒浸牛蒡子白蒺藜何首烏荆芥穗各等分爲細末酒糊爲丸淡竹葉煎湯下調理一月起時鄰居一小兒病證相同亦請予視予曰不可治也或問故予曰證不同也彼痘過期痘熱且癰此痘猶生未得成膿不宜壓者一也彼痘腫脹猶貫膿血此則面平目閉皮脫肉乾一也彼咽喉舌無瘡此則咽喉潰爛嗆水失聲三也彼家私與蔡氏求藥服之無效死

胡三溪長女十二歲出痘其密延喻南麓視之以參芪大補之劑服之二十日後過期不癰予往視見其瘡已潰爛幸非倒臍乃犯溫補藥多裏邪盡出表毒不解急宜解表勿使皮肉腐爛喻猶強執爲是又過五日不收復請吾長子邦忠予敎用防風荆芥升麻以解表勝濕白芷以蝕膿逐水連翹牛蒡子甘草以解其鬱蒸之毒肺主皮毛因參芪之補肺熱且甚時值夏火正旺用黃芩酒炒以瀉肺中之火解時令之熱調理一月而安

斲水董希周女十九歲辛丑十二月中旬出痘請江萬吉治延至歲終不得收壓精神已昏飲食俱廢江不能治而去予往視之僵臥如死人任其開衾詳看無所知識及診其脈洪實調勻其祖父廷憲在素知醫者予告曰此痘倒臍逆證也不可治惟脈洪實調勻不疾不徐三今棄證從脈治之若得壞瘡復起新痘復出人事清爽飲食如常則無事矣乃用升陽散火湯加黃芪當歸木香青皮連進三劑初三日復出一層新痘舊者盡乾初五日出盡周匝一身病者亦漸甦醒能言語求飲食依期起發養膿至十三日瘡

右目痛不能開果喪明

破皮腫脹聚氣多腥臭過期不癰飲食漸少鎖喉噙水請予視之曰形證俱惡恐不能痊延二旬餘殞一小兒痘癰後復出一層小痘其家驚憂請予視之曰佳兆也痘科云輕者作三四次出大小不一等重者一齊湧出此痘最輕且無餘毒發已盡矣其人大悅

邑人吳若泉子三歲出痘請予長男邦忠視之予偕往予曰毒氣有餘穀氣不足此兒食少故不癰也問服何藥予謂邦忠曰無藥可解能食則生不能食則死次日思食所食且多予聞嘆曰死急矣邦忠亦疑曰能食而曰死急何也予曰謂之能食者久不食而今思食自少加多胃氣復也今忽多食乃胃敗火盛邪火殺穀名曰除中冗膏之將滅必大明而後滅死在旦夕矣次日果死

一痘將癰忽作泄瀉口渴飲水小便短少其痘肿壯紅潤此內熱也用五苓散加黃芩芍藥煎調益元散服之愈

一痘起脹成能食一向溏泄未止用錢氏異功散加木香訶子肉服之愈

一痘成膿面部將癰因渴引飲過多以致自利用白朮散服之渴瀉俱止愈

一痘成膿少食忽作瀉泄不止痘變灰白用木香散荳蔻丸服之愈

一滑瀉不止食少腹脹不止足冷痘灰白色脉細無力此犯五虛不治而死

蕲水柴大愚妻周氏二十七歲出痘甚密膿成時請予治予見鼻準先乾曰此凶證也不可治或問此證將收而不治公誤耶予曰起發未透膿漿未熟不當癰也况痘瘡收癰自有次第形色亦殊先自口脣兩旁收起滿漿堆膿面瘡皆然自項而下則成疣殼今痘未熟而癰乃倒陷也自鼻先收失其序也不滿漿者乾枯也予不能治辭去後三日死

一小兒醫後痂皮不脫問予予曰此肺脾二證不足也蓋肺主皮毛脾主肌肉其氣不足故痂難脫乃用錢氏異功散加黃芪桂服之愈

一小兒痘後一身盡癰痂皮盡脫惟頭與足不癰其家甚憂延予治予曰此常候也何勞治蓋天地間物

以陽濟陰以陰濟陽陰陽相濟而成造化人之一身諸陽皆聚於頭乃陽中之陽謂之孤陽諸陰皆會於足乃陰中之陰謂之寡陰孤陽不生寡陰不育所以頭瘡不收者孤陽無陰也足瘡不收者寡陰無陽也久當自痊但遲遲耳不須服藥亦無妨也請者喜而退

一小兒癰落後其瘢白色或問予予曰此氣虛也肺爲氣之主其色白當用參芪大補之劑否則有變其人曰痘已收完何變之有一月後大喘而死

邑丞雷省齋次孫出痘落瘡月餘面瘢凸腫今始發泄也凡毒自內而外者吉用當歸梢赤芍藥防風荆芥連翹牛蒡子黑參蟬蛻升麻作散淡竹葉煎湯調服安

一小兒癰落後瘍內凸起且作癢請予予曰此風熱也用人參敗毒散加防風荆芥一服安後有患此者用荆芥敗毒散加人參服之外浴木楊湯皆效

一小兒落瘡後癰毒不平人問予予曰痘家戒食薑恐虧不齊瘢不平也問之果然

一小兒落瘡後癰腫復成瘡久不愈請予治予曰此痘毒瘡也由犯手擣不得自脫故皮肉受傷而復作瘡以苦參丸與服愈

郡別駕蕭玉峯一女乙丑冬出痘請全調治緣嬌惜太過非雞與煎熬厚味不食而彼處風俗有病必食雄雞全請戒之不聽全告曰不肯慎口他日蓄毒作病必費調理公不肯信自丙寅年後兩目出淚眼絃亦爛全曰此毒發於肝肝火旺也公曰目上下臉屬脾脾有熱乎全曰此因淚出不止浸淫爛潰也乃用瀉青丸去大黃加柴胡黃芩蜜蒙花煉蜜爲丸服半年後而目不出淚眼絃平復丁卯夏又小便如龍青點滴著肉處皆爛成瘡泡全曰此亦肝火也公曰膀胱之熱全曰肝色青乃肝移熱於膀胱也又用瀉青丸方去大黃加柴胡木通車前子煉蜜爲丸服之安公曰悔不早聽佳論耳

邑文學胡近濱長女出痘不甚密亦不十分光壯飽滿與藥點滴不入口蓋平生不肯服藥也收齷時一片薄殼逆痘也足膝發癰毒與藥一飲而盡近濱夫婦喜余曰勿喜病不可爲也近濱問故予曰脾主味

壯收屬太急今發癰毒乃倒陷歸腎證也必不能成膿而死果然

一小兒痘後發癰急請予治予用十全大補湯加連翹金銀花治之愈蓋其癰已潰故用是方凡潰癰者以是治之未有不愈者

一小兒痘後發癰即請予治予用解毒內托散調理愈

黃岡蔡丹泉子痘後卵腫吾子邦正視之作厥陰肝經病是也丹泉不自安使人問予予曰非癰乃厥陰肝病因寄一方用小柴胡湯加青皮木通山楂肉調理愈

邑丞雷省齋一孫出痘七日倒陷予往視發出雷問曰再服何藥予曰痘既發出毒猶太甚欲解其毒中氣素虛恐傷中氣又致倒陷欲補其中恐助毒火又傷其目不如節飲食適寒溫以待自安時萬世喬欲進補中藥聞予言止偶因傷食發熱予不在世喬言於衆曰昔欲用藥密齋力阻今亟矣奈何雷怒乃作參芪溫補劑服之韓鳳岐與吾子邦治不敢止予聞之往問曰勸勿服藥恐其傷目何求效速耶雷曰但得生雖帶疾何妨蓋謂必不得生也予又告曰令孫必無事他日損目須記吾言今果兩目俱盲雷始悔不用予言遂疎世喬

邑司訓王月山子痘後兩目畏明予曰肝火太旺宜服瀉肝散加柴胡蟬蛻黃芩初一劑用酒製大黃其子畏藥苦不服果成內障目盲邑人徐少柳子痘後兩目不開吾兒邦治醫不效乃請予視之予曰兩泡高腫而不流淚決非痘遺乃脾經濕熱也遂製一方用蒼朮童便浸黃連酒炒防風升麻生甘草爲末蜜水調服愈

邑人蕭天秩子痘後目有白翳延予視之曰此痘瘢也治之無功果盲  
目矣果損一目

蘄水周望峯女出痘後目閉不開予曰令愛痘順無餘毒必羞明證也乃試之向暗則開目不赤向明則閉又不流淚此肝經火邪未除耳乃用羌活防風當歸梢川芎柴胡蔓荆子葛蒙花生甘草淡竹葉一服

而目開遍身痘癩腫凸而起再用四物湯加防風荆芥人參連翹生甘草服之愈

吾邑多雲山周宅一小兒九歲痘後出外忽頭廻兩目不開請甘大文視之大文問予予曰此非毒痘乃風熱也因口授一方用羌活防風升麻柴胡當歸川芎藁本蔓荊子細辛甘菊花黃芩酒炒大文依予往治之愈

邑人張國重子痘屬時面瘡潰腫膿水浸淫泄下膿血後重不食先請聞延南作噤口痢治不效請予治之予察其證乃是倒屬非痢也在痘科中利下膿血痂皮者生水穀不化者死在傷寒厥陰經病論則曰熱畜於裏當便膿血勿治利盡膿血自愈予思此疾不死不可亟治乃買藥製藥故延緩以待之數日後度其膿血將盡乃用四君子湯加白芍藥枳殼黃連木香一服後重除利稍止再服而能食三服而痘屬告痊

一小兒痘後發熱大小便難瘡癩帶赤他醫言虛欲用保元湯予曰不可此實熱也因食辛熱之物得之果食雞而得以連翹飲服之愈

一小兒痘後發熱不止食少喜睡延予視之瘡癩黑黯乃知痘毒有陷也予問此兒痘瘡膿水必清痂皮必薄否其家答曰果然不成膿不結疣但水出皮脫而乾也予告之曰凡痘出初壯熱昏睡常候也痘既收後則邪氣已盡正氣當復熱漸退食漸加精神漸爽亦常候也今皆不然吾恐術無用矣遂辭歸半月後忽昏冒死

邑染匠徐姓者一子痘後發熱諸醫或用小柴胡湯或用竹葉湯或用黃連解毒湯皆不效熱益甚請予治之予用保元湯加當歸炒黑乾薑一服熱去

邑令唐肖峯子十二歲戊辰正月出痘時唐要吾偕入京乃延予四子邦治八子邦靖同韓鳳岐醫治痘屬後右肩發一紅腫非癰也韓以鍼刺之其手不能舉三月末肖峯北歸至上蔡聞之甚憂予慰之曰勿憂及至察之其手不痛但軟弱無力不能自舉必用左手持之乃能舉唐問故予曰此肝熱氣虛也蓋肝

次子邦孝作調元湯加麥門冬濃煎升軒開口少與服之又令煮粥湯相間進之須臾平復如故元士曰神哉術也敢問何以預知有此予曰正氣虛弱邪氣方盛壯火食氣氣益弱矣今邪氣既退正氣將生乃否極泰來之兆所以戒勿擾亂待其自蘇人不知此意卒見悶絕便將抱動呼喚號哭神氣一散其不救者多矣時有一醫在側周醫云向者起病日犯太乙天符尚恐有變予曰運氣之論岐黃之祕旨專論其年非謂起病日也况主客之氣勝復之變一歲之中難以預料豈可以是料病吉凶也信如爾言太乙天符日起病者必然則太乙天符年有病者皆不可治也向醫曰尚有餘毒予笑曰取錢氏小兒書來痘後餘毒有三一者疥二者癰三者目赤未言有昏瞀也蓋痘瘡或出不盡發不透膿不齊或空殼無水或清水非膿此則有餘毒也今此痘起發肺壯膿水飽滿有何餘毒哉

黃岡陶前墩子出痘將疕時咳嗽喘急吾子邦正醫之用甘桔湯加牛蒡子麥門冬服之未效請予視之予謂正曰汝用方是此證肺有火邪火鬱宜發之即如前方去麥門冬加紫蘇地骨皮一服即效

一小兒痘後洗浴面目一身盡腫請予治予曰此水氣也用四君子湯以補脾去濕加黃芪以實表防風以勝肌表之濕麻黃以逐皮間之水一服而腫減後以錢氏異功散加猪苓澤瀉調理而愈  
胡松山子出痘在母黃氏懷半夜後此兒却在地下蕭楚梧子出痘日中時忽聞蒜氣過胡三溪子出痘有鴉日日叫噪胡淑卿子出痘近夜時樓上忽聞卓倒聲視之無他王來樓子出痘有蝙蝠飛入室後皆凶

邑人胡道松四歲病疹先請甘大文視之三日疹不出煩躁甚乃請予文又作荆防敗毒散予止之曰此皆發熱之藥無解毒之用况天大熱又無時令之藥一二味在內則陽愈勝陰愈虧陰陽不和此疹所以不出也吾作東垣涼膈散加元參升麻一服疹出三日起

甘大文從吾學醫長男發熱予見之曰疹也三日不出身涼神倦坐臥不甯予謂大文曰汝子疹毒不出外涼內熱毒火內伏故煩而坐臥不安也不急治且危文泣求醫予乃用葛根湯加麻黃石膏以發之一服疹盡出色白不紅予曰此血虛也用四物湯加防風一服色變紅隨愈

鄖陽楊舉人子疹後利下鮮血予授一方用當歸梢生地黃白芍藥炒條芩炒黃連人參生甘草枳殼烏梅肉調理愈時郡中出疹但病利血者楊氏授此方皆效

郡人周小川族人一小女疹後欬嗽失聲予授一方以甘桔湯加炒牛蒡子炒枯芩天花粉作散薄荷葉湯調再煎一沸服之愈

邑文學程文達一女年二十出痘且有娠五月矣請予治之診其脈男胎也惟以清熱解毒和中安胎爲主乃用黃芩白朮爲君人參生甘草當歸身生地黃白芍藥紫蘇葉佐之自初出至成漿無他苦予聞家中被盜竊歸適斬水郭醫至進藥一服胎墮果男胎也亟請予至痘變灰白平塌成倒陷裏虛故耳詢所用方乃獨聖散予曰噫穿山甲麝香皆墮胎藥治去氣血益虛瘡毒內陷不可救也遂辭歸三日卒

萬氏育嬰家祕曰痘瘡有收後落膿肉色不紅遍身肉色盡白者時羅田西門王紫玉所生一女名折哥有此證日夜無時啼哭遍身潮熱不思乳食予曰此證若不急治或一月二月或四十日或二三年潮熱不退者縱有靈丹亦不可治必致成疳而死紫玉不信吾言其女果死矣後紫玉之長子名逢老哥出痘亦有此證渠問予曰小兒此證當服何藥吾答曰要先服十全大補湯數劑後服三合湯治之其熱即退其哭即止俟遍身頭面手足痘疤肉色盡紅方可止藥後服加減八寶湯得保全安二合湯卽四君子四物湯加半夏陳皮蓮肉十五粒膠棗兩箇糯米四十九粒煨薑三片爲引此證若未出痘之先生瘡日久氣血俱虛而有痰滯氣不得行氣不行則血不行而成大疾病矣

薛氏醫案曰一小兒出痘不起發紅活腹脹瀉渴皆以爲不治施院使謂表裏虛寒用十二味異功散一劑卽起發紅活諸證頓退又用參芪肉托散貫膿而膿

儒者薛戒甫子五歲出痘三四日下紫血日數滴至八日不止而瘡不起御醫錢春林謂脾氣虛寒用木香散一劑用丁香十一粒人參五錢一日服之次日痘皆起而有膿由是血漸止二十餘日而愈  
一小兒起發紅活但不時作痒口渴作乾便血面赤發熱先君謂腸胃有熱先用濟生犀角地黃湯加柴胡一劑諸證漸退形體倦怠此邪氣去而形氣虛弱耳用四君子湯加當歸黃芪紅花二劑而愈

而愈後瘡癰凸起如錐或瘡出血余謂肝火熾盛用小柴胡湯加生地一劑隨用濟生犀角地黃湯一劑頓愈又用芹菜汁而痊

一小兒痘瘡下血而不起發先君謂氣血不足用紫草快班湯加參芪歸朮治之血止瘡起但貫膿遲緩用八珍湯倍加參芪數劑瘡醫而根白痒此氣血虛而熱也用八珍湯二十餘劑而愈

一小兒痘疹大便下血小便甚赤瘡顆色赤發熱飲冷先君謂熱毒鬱滯先用八正散一劑後用解毒防風湯一劑頓愈又飲芹菜汁而全痊

一小兒痘正發而便血倦怠少食作渴飲湯余謂倦怠便血此脾虛而不能攝血也少食作渴此脾虛而津液短少也用五味異功散加升麻紫草治之愈

一小兒便血腹脹困倦發熱口乾飲湯四肢逆冷先君以爲脾氣虛寒不能攝血用五味異功散加丁香十粒炮薑五分二劑血止痘貫而醫

一小兒七歲患痘瘡腹脹八九日矣先君云當急補脾土不信乃服消毒之藥大便下血甚多而歿

一小兒作渴泄瀉發熱飲冷唇舌皺裂瀉糞穢臭先君以爲內熱所作用前胡枳殼散一劑稍愈又用清涼飲加漏蘆乳母服之兒頓安

一婦人患時疫將愈更出痘瘡大起發體倦痛甚則昏憤煩渴飲湯不思食用十全大補湯及砂砂末其痛頓止食進體健仍用前湯倍加參芪十餘劑而貫膿又數劑而愈

一婦人發熱作渴遍身骨節作痛用仙方活命飲二劑諸證稍愈至十一日出痘百餘顆形氣甚倦用紫草木香散又出少許但口乾作渴用人參白朮散而渴止用八珍湯加柴胡丹皮而貫膿後去丹皮柴胡倍加參芪數劑而痘醫

一男子年將三十出痘根窠赤痛發熱作渴服紫草飲之類前證益甚痘裂出血余用小柴胡加生地犀角二劑諸證頓減又用聖濟犀角地黃湯而貫膿再用八珍湯而結痂

一小兒煩躁飲冷不止先君用濟生犀角地黃湯頓愈後渴而喜熱又用當歸補血湯而痊惟倦怠少食

用七味白朮散而痊

一小兒患此飲冷不止或痘脹痛先君用濟生犀角地黃湯并芹菜汁而頓愈

一小兒九歲出痘六日痒塌寒戰院使錢密菴用十一味木香散二劑貫膿用參芪托裏散而醫後痕白作痒用十全大補湯而愈

一小兒痘瘡膿未滿面赤作痒余謂氣血虛而有熱欲用溫補之劑不信乃服清熱之藥至十二日瘡痕色赤虛煩作渴腹痛不食手足逆冷而歟愈又用加味逍遙散而痊

一小兒未週歲痘瘡焮痛出血哭不能已診其母有肝火先用小柴胡加山梔生地與母服子飲數滴頓一劑這疔解而諸痘亦愈

一小兒痘疔患在脣間色黑大痛挑出黑血仍復堅痛皆以爲不治先君用隔蒜灸數壯痛止色淡而軟挑出黑血甚多灌以活命飲患處及諸痘貫膿而愈一儒者年三十餘因勞役倦怠發熱服補中益氣湯數劑發赤點以爲斑另服升麻葛根湯一劑更加惡寒仍服益氣湯四劑至九日出痘甚多余用八珍湯加黃芪白朮紫草四劑至二十日膿始貫用十全大補湯月餘而癈一小兒第五日不紅活至九日貫膿不滿余謂氣血虛弱用十全大補湯治之庶無後患不信至脫痂痕作痒色白至十四日而歟

一小兒第七日膿清不滿形氣倦怠飲食少思大便不實用托裏散二劑手足指冷咬牙作渴用木香散倍用參芪一劑諸證頓退又用參芪四聖散四劑而愈

一小兒腹脹渴瀉氣促體倦先君以爲表裏俱虛用六君子湯加歸芪送四神丸一服諸證頓退瘡勢頓正但膿遲而渴仍用前湯加歸芪二劑瘡色紅活形體頗安任其貫膿而痊

余思大熱而不熱者是無火也急用入參理中湯煎服一盃肢體頓溫更用人參白朮散調理而痊瘡膿

一男子年將三十出痘色紫作渴飲水腰痛足熱耳聾余謂腎虛之證用加減八味丸料煎與恣飲熱渴頓止佐以補中益氣湯加五味麥門冬而愈

一小兒十二歲出痘色黯兩足及腰熱痛便祕咽舌料作大劑煎與恣飲至一斤諸證悉退又佐以補中乾渴引飲不絕衆謂腎虛不治先君用加減八味丸益氣湯及八珍湯各十餘劑而痊

一小兒痘疹甚密至九日貫膿不滿不紅活或云當歿於十二日余以爲血氣虛弱用八珍湯內加糯米百粒數劑至十五日膿完色正結痂而愈

一小兒五歲出痘密而色白屬虛弱也始末悉用補托之藥而安旬餘飲食過多忽作嘔吐面白兼青目脣牽動先君以爲慢脾風證用五味異功散加升麻柴胡不信翊日手足時搐服前藥而不應急加木香乾薑二劑而愈

一小兒第五日矣稠密色黑煩躁喜冷先君以爲火極似水令恣飲冷芹汁煩熱頓止乃以地黃丸料服之至二十餘日而愈

一小兒九歲出痘第七日發熱煩躁不貫膿色灰白寒戰咬牙瀉渴腹脹手足冷時仲夏飲沸湯而不熱腹中陰冷先用木香散二劑益甚用異功散一劑頓安又用六君子加附子三分二劑後用調補之劑至十四日而愈

一小兒頭生一癧出膿將愈忽癧間腫脹發痘二十餘顆遍身赤點用快班湯而漸出用紫草散倍加參芪而出完用托裏消毒散而膿貫用托裏散而瘡膿一小兒痘已暯其痕色赤而錯縱日食粥七八碗作渴面赤先用白朮散二劑渴減五六粥減大半又用四君加蕪荑黃連二劑痕平色退乃用八珍湯加蕪荑山梔而痊

一小兒痘瘡愈後泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用六君子加補骨脂肉豆蔻治之而愈

一小兒痘瘡將愈患泄瀉侵晨甚飲食不化屬脾腎虛也朝用補中益氣湯夕用二神丸而愈

一男子患痘瘡作痛發熱不止其勢可畏皆以爲不起施銀臺用消毒救苦湯治之諸證頓退余先用仙

方活命飲痛全止又用八珍湯加紫草三錢四劑貫膿而膿

一小兒患痘瘡密大痛發熱勢甚危急先君用消毒救苦湯一劑安臥良久遍身出小痘頓消再劑俱貫

膿而膿

一小兒六歲患痘第七日根顆赤痛大便祕結小便赤澀煩躁飲冷或用清涼解毒之劑未應錢密菴以爲熱毒內蘊用四順清涼飲一劑并猪膽汁導下結糞而安又用犀角地黃湯其痘自膿

一小兒痘瘡發熱作渴煥赤脹痛大便祕結先用四順清涼散一劑諸證頓退又用四味鼠黏子湯一劑

諸證全退再用紫草湯而貫膿用消毒飲而痘膿

一小兒痘愈而聲瘡面赤足心發熱小便赤少先君以爲腎經虛熱用六味地黃丸補中益氣湯而愈其時患是證用清熱解毒者俱不起

一小兒十一歲患痘第四日根盤紅活起發因痛甚不止至七日形氣甚倦痘色淡而欲陷此因痛盛而傷元氣也先用仙方活命飲一劑而痛止再用八珍湯而貫膿

一小兒痘瘡十二日患欬嗽十餘日不愈所服皆發表化痰余曰此肺脾氣虛復傷真氣而變肺癰也不

信仍服前藥果吐膿血用桔梗湯而愈  
一小兒痘將愈欬嗽面色黃白嗽甚則亦用五味異功散調補而愈

一小兒痘赤壯熱咳嗽痰甚煩熱作渴用人參清漏散一劑諸證頓退日用芹菜汁旬餘而膿

一小兒痘瘡狂喘燥熱作渴飲冷痰涎不利先君用十六味清膈散犀角地黃湯各一劑頓愈又用當歸補血湯而愈

劑月餘而愈

一小兒第八日根顆赤腫脹痛作渴大便下黑血煩渴痰喘飲冷呻吟求治施銀臺以爲血熱毒蓄於內用聖濟犀角地黃湯一劑諸證悉退又用消毒丸及化斑湯而愈

一小兒痘根色赤作痛發熱口渴喜冷大便堅實用清涼飲一劑痛熱少減再劑便利渴止却用聖濟犀角地黃湯而安用芹菜汁而癈

一小兒痘根色赤作渴熱痛喜飲冷水大便不利先用五味煎胡枳殼散大便利而熱渴減又用聖濟犀角地黃湯而安用芹菜汁而癈

一小兒大便不利小便赤澀作渴飲冷先君用涼膈散一劑漸愈又用濟生犀角地黃湯及芹菜汁而痊若乳母有肝火兒患此證必用加味道遙散加黃芩犀角兼治其母

一小兒痘已愈而痕赤作痛內熱作渴二便不利先君用濟生犀角地黃湯及芹菜汁而痊後用四物黃芪而安

一小兒痘痕白或時痒作渴飲湯大便稀溏先君用五味異功散加當歸黃芪而痊

一小兒痘痕白時或痒先君以爲氣血俱虛用八珍湯補之不信自用解毒之劑後卒變慢脾風而歿惜哉

一小兒痘毒蝕陷敷以雄黃散及服加味解毒散而愈

一小兒痘毒遍身腐潰膿水淋漓以經霜茅草研末鋪於寢席更服九味解毒散頓愈用神效當歸膏之而痊

一小兒痘毒後腿膝腫痛此脾胃虛而毒流注先用活命飲四劑腫痛頓減再用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

一小兒痘毒後腿膝腫潰而膿水不止內熱晡熱體倦肌瘦先君以爲復傷宜補陰用八珍湯六味丸三月餘而愈

一小兒痘已愈兩日昏閉先用鼠黏子湯加山梔龍膽草犀角目開而有赤白腎佐以蛇蛻散外用二粉散尋愈

一女子痘癩將脫因其穢氣以湯浴已而身熱如炙四肢強直如發痘然此腠理開泄熱毒乘虛而入用十全大補湯一劑頓安

一小兒痘出甚密先四肢患毒膿潰而愈後口患疳延蝕牙齦先用大蕪荑湯活命飲各一劑又用清胃散加犀角及蟾蜍丸而愈後發熱作渴口中作痛服蟾蜍丸搽人中黃而安

一小兒痘瘡日生昏腎或作或徹服退腎之藥不愈診之脈弦細而數此皆肝腎有疳證余用九味蘆薈丸及六味地黃丸又與輕粉黃丹散尋愈

一小兒患兩目赤腫痛不可當此肝火爲患用四物合小柴胡加山梔牛蒡子生甘草倍用穀精草數劑而愈

一小兒痘愈後眼痛不開用犀角地黃湯加柴胡湯一劑而開又生赤腎迷滿仍用前藥加穀精草治之而愈

薛氏外科心法曰一小兒痘瘡已愈腿上數枚變疳蝕陷用雄黃銅綠等分爲末傅搽兼金銀花散數服而愈若患遍身用出蛾綿繭將白礬爲末填繭內燒礬候汁乾取出爲末放地上以椀蓋良久出火毒傳之效

一小兒痘後瘡痍搔破成瘡膿水淋漓予用經霜陳茅草爲末傅搽及鋪席上兼飲金銀花散而愈若用菜豆滑石末傅之亦可但不及茅草之功爲速耳

聶久吾痘疹論案曰予第四兒生四十日卽出痘其初頭上併身上不過三四點兒身不甚熱飲乳如常看者皆謂此兒痘極少當不滿百粒予以爲未必然卽令禁風調理再越二日而遍身出痘甚多頭上脣腹腰背手足俱稠密之甚至於頸上面及陰囊等處俱一片純紅不分顆粒膿內痘甚多臍因腫大突

膿泡僅小半耳予以爲兒小而血氣有限其理宜然不足憂也獨憂其頰上面上一片純紅者無一點膿漿以爲必得皮下有膿而後毒氣可散仍時以參芪甘草汁與之以助其灌膿至於第七日一更時分頰上純紅者忽有一二處轉黑色予見之而大驚先大人亦見之而大驚以爲此毒盛而將變逆證也然察兒精神與飲乳則又未見困憊是夜三更時見其陰囊亦轉黑結痂予因悟而喜曰此非惡候乃痘欲收而結痂也緣兒小而血氣易於周渙是以七日後卽收腫不可拘以九日常期也果而第八日寅卯時分自上至下遍身俱結痂至晚而結完第九日自上至下遍身俱落痂至晚而落完痂落完後遍身復發大熱予曰此痘毒未得盡發是以速收速落而復發熱如此蓋餘毒盛而欲發癰也急宜解毒因以大連翹飲濃煎汁每用半酒盃以茶匙緩緩挑服之凡一日一夜服至三酒盃而熱退身涼可無癰患矣其鼻上痂落一層又結一層封閉鼻氣不得出因以蜜潤其痂用銀耳空挑開鼻孔以出其氣其一片純紅處痂雖落而膿水未乾以黃藥黃連甘草地骨皮五倍子爲細末繆之而愈其陰囊流清水數日不愈諸藥不效用綿繭散繆之而愈夫以此極小之兒極多之痘極危之證而隨證用藥其見如神立起廻生其效甚大已試之明驗章章可覩矣而古人之著書與世人之治痘一遇兒小痘多與夫穿臍純紅水泡等證卽棄而不治不亦大誤矣乎生靈天死何可勝計也雖往者不可如何而來者猶及救也有司命之責懷慈幼之仁者急宜知之

予次女六歲出痘發熱甚緩至二日而面與手微有痘影數點熱至第四日而痘影仍是數點且帶白色但困倦嗜臥不思飲食時醫視之謂其痘瘡輕少不滿百粒予心疑之以爲若痘不滿百其兒當精神清爽飲食如常今困倦嗜臥不思飲食而痘影淡白此其痘不少因血氣虛弱送毒氣不出故也因以溫中益氣湯托之服一劑而皮下紅點隱隱欲出者甚多服二劑而痘始出大半一日一夜連服四劑而遍身出齊稠密之甚緣此女未出痘數日前會患發熱嘔吐稍傷胃氣是以血氣弱而送痘不出必待溫中托裏而後痘出也其時有一婢與之同日發熱其困倦嗜臥不思飲食痘影淡白等證一一與之相類但此婢數月前曾經出赤痘遍體稠密其父母誤認以爲已經出痘遂謂前證不是痘瘡勿令服藥但時以萬

菜湯及粥食與之而已至於第六日忽然變證痰湧直視須臾死矣此痘不得出而內攻之禍也籍令予女不於第四日用藥托出痘毒而延至第六日不與此婢同斃乎以此知治痘於當出不出之時若不能察其虛實而逐之出外其不測之變甚可畏也

予妹年二十三歲有娠三四月夜間偶爲盜賊所驚因歸甯到家不數日而半產又不數日而發熱一日而痘出頗多至四五日而痘出齊稠密可憂又兼嘔吐痘色淡白諸醫見其裏氣怯弱半產虧損痘出又多皆不敢施治予曰豈有坐視而待斃者乎因以參术陳皮等安和胃氣止其嘔吐而痘色亦略轉紅活予喜曰此可溫補而調治也因以參芪歸芍炙草官桂丁香木香等大補劑屢投之每服補劑後其痘色輒轉紅活若半日不服藥則又轉而淡白予因一日一夜必投以兩大劑至於痘正灌膿時聞其血路尚未淨予曰此注漏卮也急於前補劑中去官桂木香加炒黑乾薑蜜炒升麻柴胡各一錢一分阿膠艾葉各八分服二劑而血路立止乃除此五味依前補劑頻頻投之其膿漿漸漸充滿至二十餘日而後收膿獲安後又患眼腫腎頗甚服清毒撥腫湯數十劑而愈當其服大補劑時每劑用參芪各三錢丁桂各一錢他藥多寡稱是前後二十日服過四十餘劑過此極虛之證若不用此峻補之藥其能拯危爲安乎區區常格又何足拘

一表弟年十五出痘遍身稠密至八九日當灌膿時其痘粒粒陷入成窩諸醫用木香異功等藥治之其陷伏愈甚惟有待斃而已予往視之見其痘色紅紫而體氣頗旺予曰此非虛弱乃毒氣壅蔽血氣是以陷伏不行漿也因以清毒活血湯與之辰時投一劑至午時而陷伏立起再投一劑而膿漿充滿不必服藥矣及至將醫時又發熱蒸蒸不醫投以回天甘露飲而收醫獲安

一表弟年四歲出痘至八九日當灌膿時尚無一點膿漿然其痘色紅紫予知其毒盛血熱是以漿滯不行亦以清毒活血湯與之服完一劑而膿漿即日充滿竟獲全安

予妻弟年十八出痘痘甚稠密既已收結而煩悶不食口鼻時微有血危困之甚予妻兄治之以爲證不

數日妻弟痘瘡尚未落淨而眼忽赤腫妻兄果謂其熱毒盛而可用清涼也遽投以生三黃生梔子生石膏等大寒之劑午前纔投一劑午後忽然變證須臾死矣切慮其將執方以悞他人不虞其卽以殺其弟也嗟乎同一清涼之藥同用之一人之身用得其宜則可以生之用失其宜則因以殺之用藥者可以弗一表姪孫年十歲出痘痘極稠密而頸項甚多俗謂慎乎哉

之鎖頸痘又有暴服痘數粒在各處謂之賊痘又其痘初出帶紫黑色諸醫技窮束手以爲斷不可治之證也其家星夜請予視之予至時其痘已出六日有餘正當灌膿之時而尚無些少膿漿醫者因其兒體氣素強又有賊痘等疑尚以解毒藥與之予曰此但得灌膿充滿則可生何必拘拘以鎖頸與賊痘爲疑也且到此灌膿時又何可解毒也其兒素驕不肯服藥而喜飲酒予曰此時正宜於飲酒可因之以爲用遂製參歸鹿茸湯一大劑令其濃煎汁而以好酒相半和勻與兒頻頻飲之自先日申時分起至次日辰時分服完一劑視其頭面各處痘瘡已灌膿漿大半矣是日午刻忽然溏泄二次知其內虛而脾弱也因製參木散投稀粥內服二三錢而泄立止後再服參歸鹿茸湯一劑而膿漿充滿矣收醫後餘毒頗盛大便祕澀用大連翹飲加酒炒大黃一錢二分服數劑而安

一族姪年四歲出痘正起服時泄瀉大作醫投以參木訶蔻之類竟不能止勢甚危急予以參木散投之服數次約有五六錢許而泄立止因以獲安

一幼兒年三歲出痘將曆時泄不止諸藥不效予以七味豆蔻丸數十粒與之亦不能止其丸從大便中泄出予知其虛滑甚也仍以豆蔻丸數十粒教令以米飲浸軟研爛如泥和粥少許食之其泄立止痘曆而安予用此二方以止痘中虛寒泄瀉起危救困不可勝計姑舉一二以槩其餘

一幼女年六歲出痘其痘虛弱先服補藥已多至於痘已結痂而忽然泄不止投以異功散加訶蔻亦不止醫將以七味豆蔻丸與之予因思此女一向服補藥何以一旦虛滑若是因審其大便時多努力且所泄糞又少而色黃此必毒氣流注而泄也因以加味四苓散與之一服而泄止後因其大便滯滯復加入檳榔青皮炒枳殼等藥數劑而安予用加味四苓散治痘中熱毒泄瀉取效甚多姑舉一以槩其餘



## 痘疹門四十一

## 醫案三

喻昌寓意草曰葉茂卿乃郎出痘未大成漿其殼甚薄兩月後尚有著肉不脫者一夕腹痛大叫而絕余取梨汁入溫湯灌之少甦頃復痛絕灌之又甦遂以黃芩二兩煎湯和梨汁與服痛止令製膏子藥頻服不聽其後忽壯大無倫一夕痛叫小腸突出臍外五寸交紐各二寸半如竹節壺頂狀莖物絞摺長八九寸明亮如燈籠外證從來不經聞見余以知之素審仍爲治之以黃芩阿膠二味日進十餘劑三日後始得小水五日後水道清利臍收腫縮而愈門人駭而問曰此等治法頑鈍一毫莫解乞明示用藥大意答曰夫人一身之氣全關於肺肺清則氣行肺濁則氣壅肺主皮毛痘不成漿肺熱而津不行也殼著於肉名曰甲錯甲錯者多生肺癰癰者壅也豈非肺氣壅而然與腹痛叫絕者壅之甚也壅甚則井水道亦閉是以其氣橫行於臍中而小腸且爲夾出至於外腎弛長尤其刺事矣吾用黃芩阿膠清肺之熱潤肺之躁治其源也氣行而壅自通源清斯流清矣緣病已至極急惟單味多用可以下行取效故立方甚平而奏功甚捷耳試以格物之學爲子廣之凡禽畜之類有肺者有尿無肺者無尿故水道不利而成腫滿以清肺爲急此義前人闡發不到後之以五苓五皮八正等方治水者總之未晤此旨至於車水放塘種種劫奪膀胱之劑則殺人之事矣可不辨之早歟

顧諤明乃郎種痘卽請往看其痘苗淡紅磊落中含水色明潤可愛且顆粒稀疎如晨星之麗天門下醫者先誇爲狀元痘冒未知也躊躇良久明告曰此痘熱尙未退頭重頸軟神躁心煩便泄清白全是一團時氣外感兼帶內虛若用痘門通套藥必危之道也諤明毫不動念余造其契戚言之此痘必得一二劑藥先退其外感則痘不治自痊若遲二三日緩無及矣其戚聞言卽往余亦回寓修書投之其辭激切不避嫌疑傍晚一僕攜回書至擲於几上忿忿而去余以爲諤明之見責也拆視則云必欲得方始肯服藥余卽定一方供詳論方中大意令僮輩賣送僮輩竊謂余之不智也一日三四奔走大人之門是自忘其

恥辱矣吁嗟余豈不自愛但當羣小蒙蔽時倘得一撥立轉所全頗鉅於是親送其方至門則內戶已扃閭人收之次早送進余暗地獨行往返六里以圖心安次日再託其戚促之進藥則云既是狀元痘何必服藥耶此後卽欲一造其庭未繇矣吁嗟使余得與其側此兒卽不服藥亦必無死法蓋感證在身而以鯰魚雞筍發痘之物雜投誤上加誤適所以促其亡耳纔至六日而壞正應感證壞期若痘出既美卽有意外變證亦在半月一月矣越二日三公郎卽發熱佈痘仍夾時氣外感仍用前醫復六日而壞旬日間兩兒爲一醫所殺提明引爲己辜設局施藥於城隍廟余偶見之釐然曰盛德之人恐懼修省皇天明神豈無嘿庇然賞善自應罰惡而殺兒之醫甯無速奪其算耶一夕此醫暴亡余深爲悚惕然尚有未暢者左右之宵人未蒙顯誅也

救偏瑣言曰孫貞老遺一子四歲庚寅暮春出痘甚勻朗稀疎而綻突其熱宜和其神宜爽而躁亂如失水之魚乾熱如紅爐之炙頭汗卒如雨下蓋痘梟毒內擾則躁亂烈火燔極則燥炙痘瘡最惡者也况頭汗如淋頭爲諸陽之首輕清最上之地邪毒不易犯者而犯之以下可知所以先賢謂毒參陽位者死證屬不治所幸惟初見勢雖騰湧而毒尚未有定位用大黃一錢石膏生地各三錢黃連六分佐以地丁青皮荊芥蟬蛻木通山楂連投二劑而頭汗卽收熱勢頓減因減石膏黃連加丹皮滑石牛蒡服過四劑痘五朝仍壯熱而紅暈如硃以痘起齊而毒火盡發於外也躁亂如前而更渴大便日三四次照前方復用黃連石膏倍加生地至九朝漿甚老而少滋潤紅暈未淡胃氣不開熱亦未減寢亦未安以一方至十二朝諸邪悉退寢食俱復以金銀花貝母甘草山楂牛蒡荊芥木通門冬扁豆收痂落膚而愈

驥村嚴五侯之子甫及週歲出痘稀朗可以數紀且紅潤可觀及其身熱如炮愁楚不堪兼窠粒不鬆此內有伏毒也若以稀疎紅潤而概目之則誤矣余卽以大黃六分石膏生地各錢半佐以荊芥丹皮山楂蟬蛻葛根青皮連投二劑大便去三四次熱與愁楚稍緩又投二劑熱和神定窠囊亦鬆宛然順痘矣然此癉色乃藥力強制而來非天然之本質也藥一不繼毒勢必復然矣有一不韻同道而讚曰此痘本順爲其所服每用此劑公然文吳不即重創妄投之可也又得表裏而中和也

日以一劑速以化毒丹調入油胭脂內將綿紙做如膏藥以貼破傷之處次日痒即止色轉紅活叫哭頓愈又二劑漿足飽滿頭面復貫連紙鬆擡膿漿四溢壯熱亦和十二朝用金銀花地丁生地牛蒡荆芥木通甘草連翹山楂調治收功痘後乳食倍進大便較痘前反實神色甚旺夫以一歲芽兒痘且似順一有伏毒必得如此而後愈餘可知矣

先君有一孫友己酉歲其長子忽一日因內傷而吐次日見痘甚密自朝至暮絕無起勢先君投鬆肌透表二劑猶之弗藥次日便以保元湯參芪各一錢加菖歸蟬蛻外加薑桂少許以投之使日進二服景況依然三朝以參芪各三錢餘亦類加至四五朝略起終項陷囊薄七朝以參芪五錢配嫩鹿茸膏半盞餘佐如前仍無沛然之勢一友從旁論曰抑邪得補而愈盛耶先君曰果爾則煩熱躁渴痘色蒼老攀紅今皮薄色白頭溫足冷求一熱而不得是不可以得其故乎乃以參芪各一兩鹿茸膏大半盞一劑而痘即峻發綻突如珠根紅頂白不一日而漿即肥濃其後收痂落膿不假餘力是以補爲瀉之一驗也今無是證矣

雉城臧侄葵之子年已八歲羸瘦如疳證丁矣僅存皮骨庚寅仲春見痘若以理論脾主肌肉瘦削如此脾憲當何如耶况痘賴氣血終始其功而氣血之源根於脾胃是痘之當以保脾爲先可無再計而孰知身熱如炮目紅如火燥渴不已濁血如膏痘色則椒紅黯滯此裏毒與烈火發即內攻若不通變七日期當內潰矣余以大黃四錢石膏七錢生地兩許佐以桃仁赤芍荆芥地丁牛蒡木通臨服和猪尾膏一盞日服二劑或三劑六朝加黃連自放點以至成痂以一方而終始其局約用大黃斤餘生地石膏二十餘兩猪尾血十餘碗而始收功若此者以毒火雄烈首尾如一日也苟不滌除淨盡不免功虧一簣矣痘後精神煥發飲食大進而肌肉生長是以瀉爲補之一驗也

朱吉人小郎甫及百日外忽一夜身熱如焚躁亂不甯次早舌即有胎乾燥如炙口內如爐頻頻乾嘔筋抽脈惕腹硬如石而有痘象余固知其惡痘將萌烈毒沸湧故發始便猖獗也勢雖危篤幸痘尚未見挽回惟冀此耳卽以黃連三分石膏七分大黃三分佐以荆芥葛根地丁赤芍木通丹皮蟬蛻青皮乘毒無

定位時連投二劑勢不稍緩照前方加生地錢許又二劑而痘見矣其細密如針砂色甚乾紅絕無生理仍以前方用大黃七分桑蟲一枚又二劑解毒垢甚多三朝如針砂者悉行退去稍成顆粒者色轉紅活筋脈尚惕熱猶火熾徹夜啼號其餘減半以一方貫至九朝根紅頂白肥潤可觀十朝成漿頓足神亦稍安熱亦減半照前方減大黃石膏十分之四十一朝熱勢復然啼號如故膿漿迅速乾焦紅暈尚是焮赤前方倍加生地大黃石膏外和猪尾膏并大桑蟲以鬆透其餘十一朝發斑如霞晚即安睡焦痂鬆擡色亦滋潤至十四朝如前惡證般般復作牙齦臃腫有細細二牙爲毒擁出點乳不能進是時予在潯中次兒將鍼挑去照前方調牛黃珠末分許方得吮乳諸證稍愈十六朝予歸往視腦後與環跳起一大癰前方加貝母羌活減生地石膏乾葛服至二十朝出膿收功

張仲文二郎癸未仲冬忽身熱如火神卽昏憤舌刺如煤脣口焦黑身上如針刺血斑不紀其數溺血紅鮮肉瞞筋惕有若驚悸固知其痘趨百竅而然第此惡象宛然一悶痘景色斷非輕劑可挽卽用石膏一兩大黃五錢黃連三錢生地一兩佐以青皮荆芥地丁丹皮天寒稍配蜜炒麻黃三分薑一片以行之大劑灌下卽嘔仲文曰奈何余曰毒火上衝水火搏激兩不相下故爾任其嘔逆彼上而我下之藥一進步當必受納矣二劑便覺稍差漸而得進直至第八劑方全受納如此大劑服過十餘劑方始見痘及其見痘可以數紀脣舌猶然煤黑溺血復然至九朝後焦脣始退舌亦有津年已八歲問之方答神覺蘇醒至十二朝後尿血得淡胃氣日開十六朝而全愈服過大黃十餘兩石膏生地約有二斤得以成功是早圖之一驗也

竹溪沈公挹小愛年及週歲一日身熱如焚汗出如雨兩目傍徨如畏刀鋸卽用大黃四分黃連三分石膏一錢餘佐以丹皮木通山楂青皮蟬蛻連進二服次日神色定放標數點磊落分明熱勢復然又二劑熱和神爽痘甚稀疎色亦頗潤遂減苦寒蕩滌以中和之劑至八朝漿足回好

先君治一痘兩朝稠密無縫皮薄色淡身涼體靜睡不合眼神情困倦面顏恍白吐蛔數條而俱死此虛

瘡乾燥防其餘毒以參歸化毒湯重以忍冬膏調理而安

孝廉嚴蔚翁子六歲丙戌仲夏見痘乾紅色滯頂陷不鬆身熱如烙煩躁不甯按其胷膈愁痛口有噦腐氣累日不起此毒火伏於內而中宮有停滯也以大黃二錢青皮錢許兼之蟬蛻荆芥赤芍紅花地丁外用山楂一兩煎汁碗半以代水連投二劑解宿糞甚多痘卽頓起痘色焮赤仍用前方加黃連生地漸漸放白成漿第壯熱未和虐欲尚在前方貫至十二朝而始收回脫醫得以成功

孺山鍾晉叔有一小愛痘值炎天受暑煩擾非常壯熱如焚痘色乾紅累日不起渴思井水不敢多與僅一碗許便覺爽朗求之不止不覺飲及一斗通身微汗而神情始快痘卽隨起色亦紅活終以清火解毒收功

韓子蘧子甫及週歲忽一日身熱如烙昏迷不醒似驚非驚而有痘象余固知其必痘却屬火裏苗之證非輕緩之劑所能取勝者乃以大黃錢許加石膏黃連佐以清透達表之味連投二服而痘遂見勢亦減半至三朝痘頗稀朗自起發以至結痂無甚風波而愈向非早爲之計而釀成之其禍殆有不可知之局矣

一故友朱漢卿小郎痘稠密乾紅一友以痘色乾滯便以清火而兼升發累日不起予見鼻流清涕體涼而且靜時在春初寒風凜凜此熱毒輕而感寒重毒火爲外邪所閉也以溫肌透毒散陳皮換荆芥連投二劑身體卽緩痘卽頓起次日鼻塞眼封而痘發煌身漸熱痘日肥清解治毒調理收功

韓聖翁第五子痘歲在己丑稠密不鬆眉愁腹痛終夜煩躁不寐其毒盛可知又蒼白乾滯涕唾稠粘頭溫足冷其毒爲風邪阻塞可知因急爲疏風以開其牖佐之攻毒以達其滯至四朝體漸熱痘漸起色漸紅活但眉宇不開筋脈時惕以活血驅毒貫漿結痂而回

一兒痘在三朝目紅鼻塞時或噴涕而涕甚濃氣粗壯熱痘甚稀却色滯乾紅無甚內證呆呆不起以大劑荆芥穗葛根前胡佐以黃芩牛蒡木通丹皮蟬蛻青皮赤芍三劑後而起勢沛然六朝肥紅綻突不假餘力而順叙收回

予三兒辛酉生兩歲出痘時在孟夏壯熱昏迷痘色乾紅顆粒稠密然得分珠亦不脚塌自放點以至三朝絕無起勢惟氣粗煩悶轉矢氣極臭細審未痘前曾食何物却食一芋頭圓子重以枳實山楂桔梗前胡廣皮麥芽佐以赤芍蟬蛻牛蒡解結糞甚多而痘即立起且色亦紅潤嗣後以痘甚密功力雖難而破竹之勢殆由此也

孝廉施禹翁季弟幼時出痘道中始事之友極其升發四朝毫無起勢狂煩叫喊至於咽啞目時上竄始事者告辭去矣予至舉家號泣以爲必無生理禹翁昆弟篤於孝友懇予甚切予視痘雖不起而根窠尚在第稠密暮紅頂陷乾滯身體反反涼予按其胷脣手足皆起診其右手寸關洪滑而實予知其內傷太重而致痘閉塞也遂以枳實五錢青皮前胡各三錢桔梗五分佐以荆芥蟬蛻用山楂二兩煎湯代水是夜連進兩頭汁次日午後又進一劑下午一解宿垢極多痘前縱食雞肉完而未變將晚又解一次仍前極多痘即頓然起發神即安靜身體大熱但痘色依然未轉前因中宮停滯故毒火內伏而不熱今得通達則火毒發見於外矣神故得以安靜嗣後以至結痂終以涼血清解痘漸紅活漿漸肥濃痂亦不薄收功而愈聊舉一二以驗內傷阻痘者

清溪章繼美幾三旬矣戊寅季冬在外家王復之處忽然腰痛如杖昏憒如迷烈熱如炙叩之不答身體振振內瞶筋惕痘之象也但腰如被杖其痘必逆猶幸其岳復老信余甚專余得卽用大黃山楂各六錢青皮羌活桃仁各二錢佐以荆芥乾葛元參乘痘未見萌芽甫動而預爲之地庶望轉機於萬一令一見痘腫已受攻無及矣自申至卯連服二頭汁次早發出如芥如沙色更焦紫自頭至足并無容針之地形色並逆神情又惡希冀何在予辭弗藥主人哀懇甚切情不容卻遂用大黃八錢石膏一兩黃連二錢生地兩半佐以荆芥羌活葛根牛蒡紅花桃仁蟬蛻等劑加白頸地龍每劑十條又以猪尾膏半盞和於藥內連服二劑大日其如芥如沙并焦紫色卽退顆粒分明紅活可觀竟若改換但無空隙之地神情猶然昏憒身體仍灸如炮生機却在手矣翁婿原是甥舅尊與堂與其兄公瑾皆至且驚且駭且信且疑復老力主其事云卽是乙亥年仲夏去萬其生理余下

傷氣血乏本氣血果虛漿從何自此痘本逆所賴治於未發臟腑不至潰敗氣血得以融通故得成漿如此然藥力僅可以搜刮隱伏之毒未能驅除燄炙之火上焦清氣何能便徹只恐梟惡之毒終非藥力能淨爲畏耳次日十朝正面有回意絕不思食日期漸迫用大黃石膏各一兩生地兩牛黃連山楂四錢佐以荆芥牛蒡甘草十二朝胃氣忽開神情纔爽熱勢亦和回結頗佳時值獻節渴想年糕因而無物不思次日便飯便食肉十五朝回到諸證悉愈痴落如松皮後又滿口生疳齒牙幾落又服牛黃珠末并黃連解毒湯十餘劑而漸愈月外復發一身血癥瘡身無餘膚將百日始得霍然是痘疏表達裏驅毒導瘀涼血清火自巔至末不撤一劑而得收功當危疑時議論紛紛有云平昔斲喪腎虛而故腰痛者有云裏氣素薄而故神情昏倦者有云從來肥甘不能入口而胃弱者有云如此稠密氣血有限何能當此蕩滌者有云痘瘡何曾有此治法深以爲怪誕者非復翁明時局專信任亦何能奏功

銓部錢孺翁一愛平時內熱瘦骨如柴乙未仲夏出痘熱如炮熾腹痛異常身體不能轉側口穢噴人紫滯稠密但不細碎惟辛初朝毒火雖惡尚未有定位以大黃四錢石膏七錢生地六錢黃連一錢佐以青皮山楂荆芥葛根赤芍桃仁地丁紅花地龍臨服和猪尾膏蓋許以一方服及六朝色漸肥紅放白腹痛稍緩餘俱未減仍用前方至九朝漿甚充足腹痛與熾熱較前尤甚眼雖封而眼角流血譖語不寐飲食不思前方增犀角倍加大黃生地石膏減猪尾血臨服以化毒丹調入牛黃一分珠末二分至十二朝頭面發臭方能進粥碗許一日三次腹痛與熾熱依然至十八朝而始跳脫疏表達裏涼血導瘀清火驅毒自始以至終一方成之是首尾疏達又一驗也如此治驗難以數紀聊附一二以證其大略耳姚無奇幼時於壬戌之秋忽一夜吐瀉三十餘次口不能合兩目失神絕不身熱痘出赫然若不知何自然而致痘甚細密而且一齊湧出僅得分珠却無空隙之地顆粒固滿却似水珠有頂無盤乃劇虛劇寒之證與逆相去幾希矣證象固危所希冀者氣血尚未離散及早圖之或可挽回疏表達裏之劑一不相及初朝即用保元湯加白术木香當歸熟地訶子如是之劑服至六朝僅得中守而已倍加參芪外用鹿茸肉桂至八九朝身得溫緩窠囊覺厚漿水及半但不蒼老前方減鹿茸肉桂訶子加白芍茯苓金銀花神

目開爽乳食大進而回癥終軟薄可見虛劇之證首尾溫補尚不滿其分量其可循規則而疏達也乎第今無是證矣

逢仲老公郎痘止八十三顆始事者以痘甚稀僅以輕緩之劑按日期規則以治之十六朝咸以爲功成矣延至念六朝逢老意中未能釋然予適雉城歸邀予往視但見兩目傍徨如臨白刃乾嘔不止愁楚非常陰囊兩傍俱有一小毒如桃核大隱於肌肉之下色且黑黯此餘毒悶焉者也予辭弗藥是晚即斃一徐友一愛未及半週而痘甚稀頗紅活宛然一順證惟身熱如火至漿後躁亂不甯霎時收斂而紅暉焮赤痴甚焦燥腰間與環跳處發出兩癰如掌大板硬如石焮腫如拳其餘小疔不計其數痛楚甚慘以必勝湯日服二劑外以臙脂調入化毒丹貼之十朝至十六朝以一方治之疔漸起漸退二癰潰而成膿後以忍冬解毒湯加地丁當歸調治收功

一范氏女三歲痘可以數紀而且綻突如珠紅潤可觀據痘似可弗藥究其烈熱如炮晝夜叫喊不已左目焮腫如桃以大黃生地荆芥甘菊赤芍黃連木通地丁青皮自三朝服及十四朝始得身涼體靜回好目亦無恙如是之痘不能枚舉聊紀一二以驗大略云耳

雉城臧明遠子幼時出痘於壬戌甚密而得充肥臧以稠密憂虞余曰痘雖密顆粒綻突色不乾滯慮不在此所可虞者近於紫靚身體太熱耳以清熱解毒湯日進二劑五朝大解一次餘無別證未思飲食次日而漿即老紅暉焮赤大便又三日不解恐其成火褐證謂王翁曰急宜潤其大便使毒以利鬆爲妙成一火褐餘毒太重矣前方重以生地滑石兩許更加黃芩桑葉未及熟而燥痒卽發舉家傍徨急服之更除解黑瘡極臭極硬卽快快熟睡紅盤漸淡漸收飲食大進以忍冬解毒湯調治而愈

竹溪沈氏子二歲時痘熱不二日放標於足胫正邪闊大如螺鈕緊貼皮肉週身細密無空隙次日瓢沙疊錢間於通身惡形不計其數且痘色與肉色一般肌膚板實無粒不陷叫哭不已脈惕筋抽是毒滯血鬱之痘也與逆之相去間不一寸矣以必勝湯減桃仁生地加當歸日進二劑不見起發乳不及半大便

驥村錢東白幼子痘及七朝行漿期矣通身項陷紫滯其環跳處堆聚如燕窩俱板實不鬆眼與鼻若未痘者然并其頭面俱板實晝夜躁亂殆無甯刻時常乾嘔筋脈抽惕此毒伏於內氣壅血滯故耳始其事者謝絕去矣余以大黃四錢紅花生地蟬蛻牛蒡地丁荆芥元參青皮黃連外加白項地龍五條服過三劑大便日去三四次痘稍有起勢服及十劑大便方去十五六次所解皆是黑垢如膠漆臭惡無倫通身頭面頓爾起脹卽時眼封鼻塞而漿沛然矣其環跳堆聚者尚未鬆泛仍以此方服至次日十二朝大解約去二十餘次僅似清水一老嫗驚惶而問曰如此頻解可無害乎予答曰痘今成膿前躁亂今安靜皆便中來也可許收功乎予曰必得環跳穴處成漿結痂飲食能進便許無恙矣至十四朝腫上漿行且飽滿胃氣頓開大便卽止不假一分滋補不假一分止塞飲食日增方以和解餘毒之劑而收功

雉城臧君陶幼時出痘於庚申甚稠密甫及三朝卽起綻如珠囊窠瓢薄歸附不厚不甚安靜身體微熱四朝卽用保元湯加芎歸熟地六朝漸漸肥紅八朝囊漸蒼老漿未及半大便不實而漿停重劑參芪加川芎鹿茸膏木香白芷漿得充足後調理收功

後林潘中山幼時痘證囊似天泡之薄紅暈焮紫如霞徹夜無眠身熱如火渠尊公宗老在江右任所內與乳母深以皮薄爲不足徬徨無主予力辨其故而始信卽用黃連犀角大劑生地佐以荆芥丹皮蟬蛻牛蒡臨服調牛黃一分自第二朝服至六朝漸漸蒼老散漫遊紅亦漸歸附根盤圓淨頂白根紅仍以前方服至九朝膿漿滿足前方加金銀花元參始終以涼血清火解毒收功而愈脫痂之後尚多餘火一路清解霍然

予一鄉親年十七勇力過人忽一日身熱昏迷週時卽痘一齊湧出稠密無空地形與色宛如水珠但根窠結卓呼吸之氣甚雄薄之非因虛也明矣平昔勇力無論矣其所以然者氣與血均爲毒閉兩不至之故也以荆芥葛根赤芍紅花木通地丁紫草重以青皮外以山楂二兩煎湯代水日服三劑次日頓然蒼老第四日卽頂白根紅復用前方七朝漿足飽滿其體原厚緣爲毒遏種種故爾一開其牖正氣勃然莫禦矣兩痘浮衣則同一爲火炮氣蝕故壯熱遊紅一爲毒湧血鬱故昏迷色白一涼血清火一鬆毒活血

各究其致遊紅者斂色白者紅囊窠俱厚矣

烏程陳大尹乙巳歲一孫痘稠密乾紅始任事者有三人焉先以升發後以涼解五朝頂平囊扁七朝眼有開意鼻將有息三人辭陳某而去延先君以決生死先君驗其頭溫足冷非熱毒可知而且身安體靜毒已盡行於肌表又可知曰此氣血虛餒非毒滯不鬆之謂也陳某意中以爲必斃問先君曰此證可挽回萬一乎先君答曰痘瘡放點以至落痂一以氣血終始其功氣血充達則得以領毒而起脹氣血鼓盪則得以化毒而成漿氣血還源則得以解毒而落膿今痘不起脹猶之更籌一般籌得依刻而起非籌自起也必需漏水下壺更籌得起論及於此陳某大悅先君以參五錢芪八錢鹿茸膏半盞佐以芍歸淮熟地少加肉桂連投二劑而痘即起脹如珠再二劑而漿即充滿後以參歸化毒湯收功而愈是證不斃見矣

孝廉王遇老一小兒甫三歲痘在五朝通身稠密全不起脹人不狂躁熱亦不甚有似餒而不充余按其皮肉則板探其口內如脂而多乾嘔則知其毒壅於內外故不能起非氣虛不振之論也以大黃爲君佐以疏表活血之劑至臨服時復持疑而問曰毒滯攻之固其宜矣萬一精神亦從而蕩焉奈何余曰妄投則然對證不惟不損正以護精神之地也二劑服後便有起勢乾嘔減半而身反熱矣是毒透達之象也前方加黃連生地服至十二朝後以忍冬解毒湯而愈

馮春元一小愛三歲痘甚密八朝絕不起脹項陷色滯筋抽脹惕日夜不甯頻頻乾嘔大便日去二三次宛似一內虛平扁之證始事者謝絕去矣舉家哀號待斃余視之項雖陷而板實色雖不榮而紫黯未有內虛而形板實者也而况紫黯其色乎至於種種見證皆毒火發洩無門之象余以大黃青皮山楂達其裏荆芥牛蒡桑蠶疏其表紅花桃仁赤芍猪尾膏以導其瘀黃連石膏生地以清火涼血二劑稍有轉機又二劑更用化毒丹調入牛黃珠末以化毒清火大便日去十餘次多而且暢穢垢般般頂即起盤即潤漿亦迅速餘證未能跳脫首尾一方至二十朝而始霍然收功

戊午一沈氏子痘密而紅色嫩而薄身不甚熱察其神情內證絕無隱伏深藏之毒先以疏透四朝而囊

纂悉起即以參花烹肺淮熟地甘草山楂日進一劑七朝新薑軟田發行一月未見其效不毛之見效不

王含叔一愛三歲痘方見點即使咬牙周身痘色俱白宛如氣虛探其口膩如脂背上三四點紫黯紅者微露其端則知其鬪牙者肝腎之毒火也色白者血爲毒鬱而然也以活血散火疏肌透發之劑痘色漸紅但紅而不潤顆粒不鬆頻頻乾嘔夜不成寐三朝用黃連生地丹皮牛蒡荆芥木通紅花青皮蟬蛻山楂臨服和猪尾膏半盞日進二服色頓攀紅而未活唇口漸黑如煤前方倍用黃連生地加滑石地丁外以牛黃七釐并猪尾膏服至七朝色方紅潤頭面放白乾嘔減半大便日去四五次十朝漿亦堪回唇殼已脫照前方至十二朝唇復焦黑痴老而燥仍復咬牙大便日解十餘次絕不思食前方大劑生地加石膏日進二服牛黃每服一分珠末二分猪尾膏亦如前至十五朝鐵嘴復退終不思食大便約去三十餘度痴落八九四肢強直仰臥如尸十六朝唇口又黑咬牙比前更甚大便無度俱如膠漆或如藥汁點乳不進以蓮肉紅棗扁豆煮濃汁灌入其口嚥下而此汁卽出如漏乳母以寒藥太過脾氣損傷如此皆有怨言主人明理謂此藥不投何能起發以至落痴第痴已落何復如此叩予之故予曰痘貴乎終以餘毒脫卸之難也若餘毒內攻事已去矣餘毒得透可無虞矣其餘毒必結於大腸而故暴利如傾又結於肝而故咬牙不已不則何以唇口猶如乾漆三退而三結也必得內毒成熟有膿血便出方可保全然得精神有三四日可支內毒一二日可熟便妙是日十八朝矣以牛黃七分珠末一錢四分爲兩服蜜汁調下傍晚解紫血甚多逾時夾膿夾血倍於初次卽睡去至夜便尋乳食咬牙頓止唇口鬆退神即蘇爽至天明解一硬黑糞如石大便五日不解乳食大進收功而愈

余一孫女四歲戊子暮春一晚大熱如炮躁亂不甯不逾時而衄如注血紫成條有意亂心慌之象是夜卽以涼血攻毒飲減紅花紫草加石膏元參地丁連投三劑次日午刻見痘不紅不紫如晦色板皮窠囊不起第二朝衄止熱亦減半叫喊不已躁亂如初暫減石膏用大桑蛀同猪尾膏盡許和於藥內日服二大劑服及七朝漸起漸紅大便日去七八次九朝漿行漸入佳境藥餌遂懈十朝晚身復大熱叫喊仍不絕口滿面搔破瘡幸鮮血淋漓急用臙脂調入化毒丹貼之前方重以大黃五錢生地石膏俱兩餘三劑後十三朝始定收結而瘡尚燥寢食僅得其半以忍冬解毒湯減紅花加大黃生地十六朝收功

徽州程氏一子三歲丙戌殘冬一日大熱煩渴口熱如爐舌胎即芒刺而黑則其咽乾可知見點於肌肉之間隱隱若麻乾紅晦滯彷彿乎逆幸在初朝以清涼攻毒飲加蜜矣麻黃二分以隆冬也減犀角二劑細碎者悉退顆粒分明又二劑色亦稍轉四朝淚流如膽汁脣漸堆結如煤謂之鐵嘴大便晝夜約去十餘次一方服至六朝起脹八朝行漿胃氣未開神情未快十二朝鐵嘴鬆褪寢食漸安首尾一方收結成瘑以忍冬解毒湯至十六朝收功

七里溫廣心大郎八歲出痘於乙酉仲冬值久瘡後精神疲敝飲食不思痘毒漏血如膏胷膈閉悶脣黑如煤舌胎如刺兩頰不分界地天庭明朗身上稠密乾紅腹更有紫背浮萍斑點如是毒火身反不熱內鬱故也以涼血攻毒飲大黃爲君加桃仁每劑和大桑蟲日服二大劑五朝未見轉機前方倍大黃五錢生地兩許七朝兩頰鬆透紅活成顆身體大熱餘痘亦俱紅潤腹班漸淡前方減葛根蟬蛻紫草紅花桑蛀加黃連石膏每服調牛黃化毒丹一錢日進二服十朝漿足腹班悉退胃氣頓開十二朝脣殼褪脫舌竟紅活頭面堆砂收結身上氣足血收寤寐俱安前方減大黃黃連石膏桃仁加金銀花貝母攻伐之劑止一劑不及便不思食神情仍復不快痘即停止予駭其故豈攻之太過而真元不繼耶抑攻力未足而毒火竊發也猛省其故失檢其漏取視猶然使內邪淨盡小腸何猶乃爾也悉如前法連進二劑諸象速轉捷於影響服及十八朝而漏始淡黃其色以忍冬解毒湯始得收功

孺山鍾晉叔一郎七歲甲戌出痘未見點時腰腹倏爾疼痛至欲解更甚及解逼迫異常急不能待而卒不能解因艱塞而努力因努力而愈艱塞不惟不得解努力之極氣反上湧而面顏俱變俄頃而惡象復然此毒深藏於脾胃也以必勝湯去生地連投二劑身體壯熱見點稠密不鬆乾紅色滯痘與皮肉接之俱板氣壅煩悶身無安放前方服及四朝大便見毒垢如漆如膠紫黯其色前方加黃連石膏生地服及七朝頭面蠍腫如鵝周身四體脹滿如吹有如氣鼓日之可駭所幸痘亦得脹十二朝漿行十四朝漿斂悉以一方主之大黃用及斤餘大便日止一次口內成瘡目睛起障身熱未和以撥雲散合忍冬解毒湯調牛黃珍珠服至十七朝所進僅止稀糊所存惟有皮骨與參湯數匙口卽乾膩嗣後弗藥惟以牛黃味

黃復初八郎癸酉孟春一日身體燥熱肉瞶筋惕兩目昏沉痘之象也愁容萬狀稍動其衣被痛楚等於剝膚是穎毒鬱於皮膚也卽用必勝湯減桃仁加桔梗用大黃四錢連進二劑痛不稍減照前方大黃六錢又二劑透出一身紫滯乾紅綿密無縫痛始減半大熱如火前方加黃連石膏減葛根服二劑顆粒分明六朝充肥九朝漿勢沛然因痘象可觀藥卽懈弛次日燥痒難禁頭面搔破血流滿面急以藥膳脂貼之悉如前方外以牛黃二分珠末四分勻分三服調於藥內日進三頭汁次日復灌十二朝堆沙漸收腐爛作臭胃氣日開神情日爽十六朝收功用大黃斤餘牛黃二錢

余戊子一孫壬辰初夏一晚大熱如烙叫喊不已如蠍在灰次早大小便去血解後稍緩俄頃復然急以必勝湯加石膏連投二劑日晡卽見痘窠粒不鬆痘色紫黯大解皆紫黑成片成條散者成流叫喊愈甚照前方重以大黃生地石膏晝夜三大劑每劑和猪尾膏一大盞并大桑蟲服及七朝色漸紅活囊漸鬆透終是叫喊不已前方減葛根蟬蛻九朝放白十一朝行漿諸證減半大便日去七八次藥餌稍緩仍復猖獗更加燥痒痘頂穿破若圈喊不絕口悉如前日進三大劑十四朝得有霽色十六朝叫喊復作愁楚萬狀便出紫黑血片如蟄皮散瘀血有一糞杓卽安睡醒餘便思食身熱始和大便頓愈溺猶血水念六朝夜半驟然躁亂舌起一疔以牛黃分半珠末三分蜜湯調服以忍冬解毒湯加大黃錢許用地丁煎湯服及念八朝舌疔卽褪月餘始得安痊約用大黃三十兩石膏生地俱二斤半

一凌姓之兒僅週歲身體壯熱躁亂不甯如蠍在灰痘未見而兩目昏眊是痘象知其毒壅上焦之故也卽以涼血攻毒飲去生地紅花加山楂地丁一劑而神卽安日晡見痘如麻再二劑而細碎者漸消明朗分珠其祖父稱謝不已照方用生地紅花并大桑蟲日進二服以一方服至十二朝順敘收功此僅躁亂一項更得治於未痘故潮頭無甚風波

孺山鍾去疑年及二旬餘一日府試歸見痘昏沉不語有疑其爲虛者有云其爲勞者五日矣窠粒不鬆盤暈焮赤兩頰通紅不分界地且氣粗壯熱之極此熱毒上湧清氣阻塞心竅爲痰所迷虛勞何與焉以涼血攻毒飲減紅花蟬蛻加貝母地丁日投二劑七朝界地漸分痘漸鬆泛神情猶然昏憤前方減葛根

加石膏黃連八朝始省人事方知已之出痘九朝而漿沛然十二朝收結遂弗藥而愈俱以一方終始其功

一賀氏子四歲出痘於仲春滿目愁容天柱不舉神情躁而若倦身不甚熱痘點隱躍於皮膚按之板實板則非不振矣且多遊蠶不拘其數其色乾滯而多白黯黯則非真白矣且有板色間乎其中溺血如膏口穢若腐則此天柱不舉愁容厭倦全是毒火內擾以故情緒難支用必勝湯減桃仁紅花稍加蜜炙麻黃一二分和桑蟲一大枚日投二劑服及四朝身漸熱色漸紅顆粒亦漸起時常乾嘔哈舌前方加黃連四劑毒火湧發驟熱如焚盤若塗硃天柱頓起外加石膏減乾葛麻黃自七朝以至十朝放白成漿大便日去五六次皆毒垢愁容不轉壯熱未和飲食不進十四朝堆結發臭飲食得進諸證平康惟溺血未止十八朝仍復壯熱泛疤口內成疳一方貫至念朝外始得全愈

李姓一幼弟卒然腰痛以及兩脅兩肩骨節皆疼愁楚不堪次日卽報點於左腰如豆大而色黯滯又有數點似痘非痘隱躍於皮膚而多晦色按之板實以必勝湯四劑後顆粒稍起而終不鬆晦色稍退而未紅潤續出者可以數紀只是痛楚呻吟晝夜不息寢食俱廢以一方服及八朝略鬆泛而得半漿服過十二朝痛楚方息稍能寢食將就收結而愈是證幸痘稀疎故得成功而且易若一稠密便如章繼美之歷盡艱難險阻矣腎證之可畏也如是夫

嚴璞菴一孫歲未滿週一日壯熱昏沉筋脈抽惕以清肌透毒湯加木通青皮一劑次日卽見痘頭額如麻身上隱躍以必勝湯減桃仁赤芍生地加當歸三劑後細碎者漸退隱躍者漸透雖見顆粒却密而不鬆滯而不紅胷背多遊蠶珠殼抽惕如故減葛根加丹皮每劑和大桑蟲一枚日服三劑至七日項白根紅惟遊蠶珠殼未鬆服及十朝通身脹滿漿勢沛然獨抽惕未已壯熱未和而多愁楚大便自見點晝夜十餘次皆毒垢幸乳食如常一方貫至十六朝諸證平康戲之方笑以忍冬解毒湯念朝外發出紅斑如霞調理收功

臧比玉大郎四歲一日偏體燔灼面頰通紅氣壅昏憒以必勝湯減桃仁紅花加石膏三劑後見痘如麻

然焮赤十四朝仍復泛疮轉側愁楚口內生瘡一方服至十八朝諸證霍然方以忍冬解毒湯收功

驥村嚴青宇七歲一愛壯熱如火四肢冰冷下部直過環跳躁亂如失水之魚無瞬息甯靜兩頰一片通紅不見點粒胷背乾紅晦滯皮壅肉板主人以爲必斃置之若棄矣然痘在初見毒無定位以必勝湯大黃五錢連投二劑四肢稍溫卽加黃連石膏每劑和大桑蟲一枚又四劑伏火通透兩頰紅中泛點四體頓熱一方貫至九朝偏體充肥粲然可觀主人喟然嘆曰前者兒女輩毙於痘者十數人凶象皆未及此是痘得痊往者不堪回想矣必竟首尾一以攻毒涼血鬆肌十二朝漿黃如蠟漸收漸結十八朝諸證霍然癰落收功嗣後口復生瘡兩日腫赤多淚以撥雲散去木賊加牛蒡元參花粉全愈約用大黃二十餘兩石膏生地各二斤大桑蟲四十餘枚

乙未郡尊一子歲未滿週一日身熱如火汗如雨下左眉稜焮腫如桃愁楚不甯而有痘象乘痘未見毒無定位時卽以必勝湯減桃仁紅花葛根地龍加石膏丹皮羌活連投兩小劑外以牛黃半分珠末一分調入化毒丹三匙蜜湯調送分爲兩服次日見痘頭額細碎如針頭悉如前服又次日細碎者俱退去矣而汗亦收顆粒分明第膚赤如霞熱仍火熾愁楚復然惟喜乳食能進一方服及六朝頂白根紅減蟬蛻八朝漿足飽滿熱勢不減眉宇未開九朝迅速收瘡耳聾便起一毒如雞卵照原方用桃仁紅花十二朝出膚背上腰膀隨起四毒通如前劑并化毒丹至十六朝亦俱成膿平復相繼又起人大小小十數餘癰更多惡色青紫如傷目之可畏以金銀花赤芍地丁貝母羌活牛蒡當歸元參甘菊甘草仍合化毒丹服至念四朝而始收功是痘熱法名爲火裏苗毒先於痘名疙瘩塊令不早圖痘其焦紫內潰矣陳白菴一愛三歲一日驟熱如爐燥炙如烟惟額汗如雨下至晚卽見點於太陽兩頰如榴皮紅而黯滯連成一片不見點粒通身稠密乾紅口渴煩躁徹夜無眠第幸在初朝毒火雖熾尚可撲滅以大黃生地黃連紫草地丁佐以木通荆芥丹皮牛蒡山楂青皮赤芍日服三頭汁次日汗收而熱減半前方減黃連加蟬蛻大桑蟲服及四朝兩頰紅中泛痘色漸光澤神情未舒胃氣閉塞前方每劑調牛黃半分日投二劑七朝頂白根紅神情半爽身復壯熱仍用黃連減蟬蛻桑蟲守此一方成漿結膿至十六朝邪毒退聽

正氣康復癥痕尚燥幾及一月復發血瘋瘡以忍冬解毒湯加生地黃連赤芍減紅花又一月而全愈  
慎復菴長子其章九歲時痘烈熱如焚紫滯乾紅窠囊平板無一隙地通身焮腫如吹四體強直如鐵仰  
臥而不能轉側猶如捆綁痛楚非常叫喊不已此氣毒烈火表裏俱在以大黃八錢石膏兩錢生地兩半  
黃連三錢佐以清喉鬆肌透表活血更以猪尾膏調入盞餘日投二劑六朝勢不稍緩時值炎天畏熱如  
爐乃以藤席鋪地以安之猶云背下如火外取三七草搗自然汁用鵝翎以拭之仍以前方服過八朝景  
色如故計無所施將塘雞矢醬色而有尖頭者和六一散爲細丸又用六一散和冰片二釐研勻爲衣燈  
心湯送服逾時身振體戰臭汗如漿霎時湧出大黑螺疔於肩背四肢十五六處烈熱頓和痘卽肥紅光  
澤方得屈伸轉側終是愁楚未開水米不沾尚屬可畏其疔卽以銀針挑破用胭脂膏貼之仍以原方首  
尾一轍而成漿收結痂落收功二十朝外口復生疳尻骨又生癰毒一僧治之而愈

朱嘉直子一日熾熱煩躁愁容萬狀腦後先起兩毒如桃不知其爲痘之疮瘡塊也嗣卽見痘稠密乾紅  
僅不細碎然顆粒不鬆以必勝湯加元參自二朝服至七朝大便日去四五次色漸肥紅窠漸鬆泛神情  
頗安大有行藥之勢第壯熱未和一老嫗諳曰痘子惟恐脾胃不實反用大黃宣他今痘根俱泄出矣相  
公當自有主意果惑於其言遂中止兩日漿亦中止神情復躁熾熱更甚頻頻乾嘔頭面破傷幾半口穢  
若腐脣口焦裂傍徨之極復邀余視余諭之曰中氣果洩無論別證有不頭溫足冷者乎何以其熱更熾  
耶急以前方加黃連減蟬蛻其破傷處以藥胭脂貼之至十一朝破傷復灌通身漿亦復行兩疮瘡併成  
一大疔黑硬成坑亦以胭脂膏貼之越三日其疔腐爛膿漿旁溢軟絹拭乾重貼十六朝漸爾收結胃氣  
漸開諸證漸得平復其疔至念朝外收疮首尾以一方成之口內生疳終以清熱解毒收功

一許友幼時見痘細如針砂頭面焮腫未及兩朝而眼卽矇閉熱如炮熾愁楚之聲不絕以必勝湯加黃  
連石膏連投三劑卽大解七八次而細碎者悉行退去兩目仍開熱亦減半痘雖成顆尚頂陷不鬆乾紅  
未潤前方減黃連石膏服及七朝囊鬆色潤眼封鼻塞八朝有放白行漿之勢未得沛然大便約去二十

箬溪高氏子痘頗勻朗明潤粗壯道中一友目之爲順投以平和升發之劑主人以夜不成寐身體壯熱爲慮不知更有血絲遠於目泡之下拳毛倒豎如鎗可慮更甚若壯熱不寐又其次矣喜僅在三朝之內猶可攻逐用大黃三錢佐以赤芍紅花地龍大桑蛀餘不過懸肌透發之類服至五朝血絲漸淡而眼合壯熱稍和十朝漿足肥濃攻發似乎可已第兩太陽未脹毒根猶未盡徹神情未爽恐虧一簣大黃與桑蛀服過十三朝方得如意而回

一宋姓者三歲一子痘頗磊落綻突而根無盤暈其色則晦滯灰黯宛若爲塵垢所蒙體不甚熱口中穢氣滿幄躁亂不甯此係熱毒遏鬱於內故見證乃爾身體則不熱也是病在血而不在氣以大黃紅花紫草赤芍丹皮地丁荆芥山楂牛蒡自三朝服至六朝色漸紅活亦漸安八朝頓熱如火穢氣減半項白根紅減紫草紅花赤芍加生地黃連九朝漿成迅速寢食漸復以忍冬解毒湯調治收功一張氏之室年十九歲忽然壯熱如烙喉間刺痛不能嚥津咬牙不已神情躁亂次日即見痘如鍼砂色似胭脂道中一望而去者不一矣其證雖惡以其尚在初朝毒無定位以大黃石膏各五錢生地七錢餘佐以荆芥地丁丹皮赤芍乾葛元參牛蒡木通甘桔用蘆筍兩許煎湯代水日投三劑次日三朝頭面即顆粒分明前方更用桑蟲一枚五朝色轉肥紅七朝放白九朝漿勢沛然咬牙方止熱猶火熾僅咽稀粥槐許猶苦難吞十朝頭面堆結愁楚未舒十二朝血收氣足回膿結膿發臭難近飲食大進諸證悉愈首尾以一方成之

張金友子二週癸巳季冬忽一晚身熱躁亂咬牙弄舌痘象迭呈以清肌透毒湯加大黃牛蒡青皮時值初寒佐以炒黑麻黃羌活二劑後毒騰湧躁亂更甚兩日彷徨啼號乾嘔筋抽脈惕大便傾瀉如注此熱毒內亂下注大腸不容傳送而故湧泄也乘痘未見勢雖猖獗毒未內攻因勢而利導之是擣萬象於兩儀關竅在此前方減羌活麻黃加丹皮地丁木通三劑後瀉即止諸證未降以衝突之勢稍緩不至奔騰下注耳所謂大黃能止瀉信不誣也見標數點於左額細如針頭當喉十餘點犯蚊跡咽關照前方倍加大黃暨元參每劑和猪尾膏蓋許大桑蟲一枚日服二劑次日三朝天庭清楚但是不鬆地角細密即

以胭脂膏貼之右額不成點身幸分珠其間遊蠶珠殼者不計其數悉如前方至五朝弄舌止右額方見點口內脫皮乳不能吮食之竟熟紅棗不變而出大便復去五六次以全體惡毒湧發火性奔騰不暇分消而故直出是謂邪熱不殺穀前方減葛根加白芷七朝痘漸肥紅八朝右額及遊蠶珠殼俱起脹大便去黑垢甚多如膠如漆日進米糊二三碗兩太陽未能起脹以毒根未盡透也日服大桑蟲四枚猪尾膏盡許前方減蟬蛻加山甲生地十朝通身漿足次日漸漸收結大便復止寢食俱安聲音不亮間或咬牙前方減山甲大黃及半加金銀花甘菊外以牛黃半分日服兩次十四朝諸邪退聽調理收功是證始終以攻毒疏透爲主補拓收斂毫不典焉卽寒涼之味亦不相及以熱毒深藏隱伏也痘本凶暴無倫朝頭無甚風波末路得無餘證皆得早圖之力也歟

蔡文清一愛五歲忽一晚躁亂如涸轍之魚未幾卽昏憊面如土色兩目失神若立刻可斃者以大黃羌活青皮紅花蟬蛻蠶炒黑麻黃荆芥穗木通山楂連投二劑次日神情稍醒兩頰通紅身上見痘數點照前方減麻黃殼蠶加丹皮地丁赤芍和猪尾膏半盡三朝身體壯熱人卽醒豁兩額隱隱見點如針砂領下稠密近於托腮卽用胭脂膏封之身間珠殼甚多喜磊落成顆但嫌乾紅少潤前方去羌活加黃連生地每劑和入一大桑蟲四朝額卽清楚五朝色轉紅活鼻塞眼封七朝珠殼起頂食薄粥一茶甌大便日去三四次九朝頭面堆結身上漿滿壯熱未和腹痛異常愁楚不能轉側倍以大黃歸服調入化毒丹二三匙十二朝痛漸緩漸得轉側飲食大進以忍冬解毒湯調治同好

錢氏子忽身熱如烙次日痘卽一齊湧出細若鍼頭自頭至足渾無隙地色滯乾紅時時乾嘔徹夜無眠以大黃爲君佐以青皮山楂荆芥地丁蟬蛻赤芍紅花紫草黃連木通臨服和猪尾膏一盡連投三劑第二日兩頰卽成顆粒但界地未分至三朝通身亦分珠磊落第壯熱未和乾嘔稍稀前方加生地五朝肥紅光澤熱勢減半前方去蟬蛻黃連加甘草八朝放白成漿稍思飲食去紅花紫草猪尾膏加連翹九朝復壯熱大渴時或咬牙仍加黃連重以生地石膏十二朝諸證漸退寢食漸安方以忍冬解毒湯調治收功約用猪尾血三椀餘

發成顆未能光壯照方用生地減桃仁乾葛加殼蠶每劑和大桑蟲一枚五六朝起綻如珠主痘成漿如爛頭癤神情未快飲食未進九朝漿足飽滿寢食得半十二朝收結霍然方用解毒養榮調理收功閔明生一愛四歲痘頗稀疎顆粒細結俗呼爲石痘者是也兩頰界地不清周身乾紅晦滯至脅腹間徧滿此斑眉愁腹痛寢食不安身不甚熱以必勝湯撤生地加紫草每劑和猪尾膏半盞日服二劑至五朝斑色漸淡兩頰漸清前方減葛根蟬蛻用生地當歸九朝其班悉退漿甚充滿腹痛頓止照方減桃仁紅花井猪尾膏次日收結甚速身體反熱十一朝根盤復泛兩額疮內暴癰重出二痘但神情爽朗不爲欝杌仍用大黃蟬蛻赤芍金銀花荆芥當歸牛蒡地丁山楂服至十五朝半漿半膿模糊收結嗣以忍冬解毒湯全愈

庚辰臧比玉子三歲一晚徹夜躁亂兩眼矇眊次日發出一身蚤斑按其體膚頭溫足冷神情昏憒是毒伏藏於內血受其殃凝結成瘡外呈此象幸在發始庶可破滌此瘡一活不惟毒透井火亦鬆以必勝湯生地換歸尾用大黃五錢桃仁三錢服過六劑斑不見退痘不見起更佐猪尾膏盡許并大桑蟲和入劑內以助之服過十二劑斑漸淡漸退而痘方見點三朝即齊痘可數紀蚤斑悉退無餘神情終不開爽乳食點滴不進前方減葛根蟬蛻服至八朝痘將收結景況依然大便日去十數次如藥水終是藥力未充守前方服及十二朝痘瘡悉褪胃口只是不開若謂胃氣受傷何以痘能透發以至落痂若謂痂落無恙豈有絕穀得生者乎熟思其故是證本惡餘邪自未能淨力主前方直至十六朝胃氣頓開神情始快大便即止以三歲小孩大黃約用斤許而得收功以見有病病受如此

吾宗漣漪一愛四歲身熱如火神情昏憒兩頰通紅鼻衄成流身上隱隱數點色滯乾紅以必勝湯減紅花地龍加元參二劑後紅中泛點細碎如麻周身稠密如鋪而多遊蠶珠殼亦間乎其間前方服至三朝兩頰界地未清却成顆粒滯色略轉每劑和大桑蟲一枚六朝滯變爲紅色猶如絳脣口腫裂前方減葛根加黃連石膏七朝放白珠殼泛頂九朝遊蠶繞脹成條時或咬牙腹痛熱猶火熾十二朝頭收斂而痧燥身漿滿而盤量猶赤神情尚困而未舒以一方貫及十六朝發臭異常二十朝諸證頓愈寢食

得安而收全功後左眼亦痛多淚以撥雲散治之得痊

張又阜小郎方一歲一日壯熱如烙徧體如霞痘不甚密色滯而平有蠅窩見於手背神情愁楚不時叫哭是腹痛使然以消斑快毒湯加大黃臨服和桑蟲一枚日服二劑手背以胭脂封貼六朝霞色清愁眉散手背鬆浮泛白七朝氣尊血附俱放白成漿熱勢減半去大黃蟬蛻黃連加連翹元參日服一劑十二朝回好

一錢氏子四歲痘在五朝脣裂焮腫體熱如火頭面稠無隙地身上疎朗板實碧紅四肢冒脣疊錢者不一而足躁亂不甯以涼血攻毒飲加山楂地丁減犀角和大桑蟲一枚日服二天劑更以金汁日服盡餘外用胭脂膏封貼至八朝鬆泛如蒸餅十朝通身漿足十二朝發臭收結十四朝身熱始和寢食俱安方易忍冬解毒湯收功

韓尺龍子六歲乙未仲夏忽一日身熱如爐頭面通紅神情昏憤見痘稠無餘地僅不細碎盤若塗硃內有珠殼幾半以涼血攻毒飲倍生地大黃去紅花紫草加元參地丁四朝加黃連每劑和大桑蟲一枚五朝神情清爽七朝珠殼皆透減蟬蛻葛根桑蟲九朝漿足十朝紅暈漸淡飲食漸進頭面收結十二朝壯熱方和遂去大黃減生地及半十六朝回足如此血熱不致帶火成癰爬肌抓肉大黃生地荆芥之力不淺也後以忍冬解毒湯調治落痂未久腠理未固餘毒亦未能盡淨見風太早忽爾昏暈急以疏風消毒飲而愈

吾宗個如一子一日身熱如火汗出如油神情困苦難支似痘非痘數點隱隱於頭面色滯乾紅痘本是而若非且熱如火汗如油非惡痘不爾以清熱透肌湯未用生地加大黃一劑後次日頭面細碎如麻身上見點處若集隱伏處若無此氣爲毒滯而通塞不均也又二劑頭面顆粒分明色亦覺潤汗即順收徧局者乎前劑每服和大桑蟲一枚五朝窠脚漸鬆囊頂未起色轉深紅神情得定熱不稍減前方重以生地加黃連石膏至九朝頂綻食稀粥梳許十一朝鼠跡與瓢沙俱得統脹如泡而漿俱濃十四朝盛量始

## 痘疹門四十二

## 醫案四

救偏瑣言曰一段氏子三歲見痘三朝兩頰細如蠶種背多雁行更有瓢沙間乎其間椒紅色叫喊不已熾熱如焚以清涼攻毒飲和桑蟲一枚日服二劑四朝頰即成顆六朝色即紅活八朝怪象俱統脹放白十朝漿足猶愁楚不能進食一方服及十四朝眉宇方舒得進飲食身體溫和收曆落痂而愈一女年及十四歲倏爾身熱如火神卽昏憤兩眼如畏刀鋸偏體如霞痘未及見死期若將至矣卽以大黃石膏一兩生地七錢佐以荆芥赤芍青皮葛根木通牛蒡日投三頭汁次日午後見痘細似泥沙色似礬珠通身無一隙地前方又服四劑卽成點粒却稠密如鋪方叫腹痛略知人事大渴不已揭衣棄被前方加黃連犀角生地兩半升大桑蟲服至九朝始得紅潤周身起脹十一朝貫漿連成一片如松皮不能轉側大便日去四五次水米不沾十四朝發臭滿室頭將收結脣黑如煤身若寒戰熱仍如火一方貫至十六朝頓思飲食夜臥得半熱渴稍減二十朝外癩成一片如脫一殼得脫此難方易忍冬解毒湯月餘全愈約用大黃斤半生地石膏一斤餘是痘得治於未見之前更得首尾一轍庶得挽回若令見點其勢便成半不可破矣

閔中介三公郎方半週痘出稠密如鋪色滯乾紅顆粒平板內多蟹爪身體壯熱脈惕筋抽時在二朝以鬆肌透毒散加大黃七分和入桑蟲錢許一枚日服二頭汁次日粒數卽磊落四朝紅潤八朝鬆泛九朝行漿遂減大黃十朝安睡乳食如故大便如常收回而愈

徐明涵一孫身熱如火燥炙如烟兩頰通紅頭面脣腹肩背四體痘密無容針之地頂陷囊實乾紅紫滯叢簇象燕窩者在於大股大便日去三四次始事者以斷無生理而勇退矣余取其囊厚色老雖密成顆可冀者此耳以大劑必勝湯用大黃五錢生地兩許加石膏兩半每服和一大桑蟲日進二劑服及六朝頭面起脹眼封鼻塞八朝晝背鬆透色轉紅活頭面成漿十朝燕窩統脹如蒸餅身漿亦足第熱猶火熾

愁楚未舒自膝至脛猶紫滯不鬆至十四朝腐爛作臭漿及足脛邪毒盡發於外寢食頓復方易忍冬解毒湯成痂落膿至十八朝收功弗藥用大黃一斤生地石膏二十餘兩痘後大便但嫌燥結

吳大雍兄二公郎八歲患痘顆粒頗朗有鳥跡其形於肩背兼多珠殼囊窠通身平實乾紅色滯烈熱如炮愁容可掬云胷膈煩悶難堪以涼血攻毒飲重以大黃加石膏地丁山楂四劑後胷膈漸寬滯色漸活第紅艷若絳前方加黃連并大桑蟲每服和入一枚又六劑頭面通身起脹鼻塞眼封惟鳥跡與珠殼未鬆毒根猶未透也更倍以大黃地丁加山甲至八朝珠殼者圓綻如珠鳥跡者統脹成條九日膿漿充滿飲食大進大便不過三四次終是燔熱不減紅暈厥赤前方減山甲蟬蛻紅花倍以石膏生地服及十朝熱漸減赤暈漸淡頭漿斂而身漿徧減石膏大黃十二朝收痂過半險變順矣是晚徹夜不寐氣粗煩悶腹脹如鼓變出意外若以爲伏毒未盡而囊無不綻漿無不滿若以爲餘毒歸內而血收已盡痂厚而肥決之於脈氣口洪滑有力知其飲食停滯究之果然以寬中透毒湯減陳皮加萊菔子大腹皮外用山楂二兩麥芽一兩煎湯代水服二頭汁腹即轉動隨解而寬嗣以忍冬解毒湯調治收功

同袍鍾微老九歲一公郎見痘一朝體不甚熱囊窠不鬆不實痘色不潤不乾痘頗疎朗似乎險中之順及神情則愁楚異常云胷膈鬱悶目睛昏定身無安放此伏火伏毒之凶象也以必勝湯去桃仁生地連投二劑次日顴上發起寸許血絲兩條一橫一直如反手丁字此非尋常血絲路也貫珠而未能透耳更以猪尾膏每服和入盡許又二劑至晚漸粗如線繼而更粗如芥仍以前方和大桑蟲每服一個五朝方透點於血條密排二十餘顆遊竄最惡者也身體大熱紅暈如硃胷膈稍舒原用生地減紅花葛根蟬蛻加黃連石膏黃連加金銀花貝母次日忽然昏暈神色俱變按脉無影變出意外然以如是收局自非隱毒攻心尤非真元虛脫須知遊竄既見於頭面而第見血絲越三日而後見點此毒伏而又深故前局乃爾結局亦自宜有此變餘毒驟湧一時難以發洩是冒悶之使然猶傷寒冒汗之象也仍以發始前方連

書主人明理始不偏私不貳亦必不到處一覽也

有馮其姓者江右一遊客也年踰不惑一日壯熱煩渴目紅腹痛冲冲欲嘔疑以感寒烹茱萸湯一碗下咽俄頃煩渴倍甚吐出血水碗許內有血絲邀予診視其太陽有二三點是痘顆粒不鬆乾紅色滯余曰兄痘矣此翁愕然曰痘果未曾今在客館奈何余以無恙慰之連投消斑化毒湯用大黃三錢二劑後沸膏半茶甌日投二劑次日三朝痘即疎朗細碎者不知從何去矣色亦可觀煩渴減半而熱仍熾有履底者三寸長寸餘闊見於兩小股按之板實而痛以胭脂封貼前方配大桑蟲每一服一枚六朝眼封鼻塞八朝行漿履底鬆擡前方減蟬蛻桑蟲加牛膝十二朝忽思粉食以糯米水圓食之甘神情爽朗自上而下次第收結履底成膿減大黃石膏加金銀花貝母十四朝兩小股腐爛作臭愈餘朝全愈

一兒三歲忽身熱如炮膚紅若錦煩躁啼號次日痘即湧出稠無隙地兩頰如泥沙乾紅滯色背上鐫痕痘如蠟珠纏子密密環繞又有錢許大者一在於肩一在於脰顆粒板實界地連環紫滯以必勝湯減蟬蛻地龍加黃連止服二劑次日頭面周身即疎朗成顆色俱明潤痘若改換惟四處環珠形色如故證亦未減以一方服及十二朝痘得次第應手證亦逐日平復以忍冬解毒湯調治收功

歐餘方三歲一子痘頗疎朗却色滯乾紅有平有陷顆粒不鬆至顴頂盤集覆金其形是毒參陽位之一證也以鬆肌透毒散和大桑蟲雖見起發不能光壯早欲用猪尾膏化毒丹鬆之因與一不韻者同事阻及七日期滯而更燥陷而漸板愁容可掬不容復緩前方減羌防加荆芥當歸臨服和猪尾膏并化毒丹連投二服外用胭脂膏搽貼身卽壯熱頭面焮腫通身光壯却徹夜無眠以毒火潛伏日久藥與塵戰以故不甯藥得其勝氣血暢達故得煥發不韻者不諳是理第見擾亂歸咎於生豬血而致變料不能起勇退而去舉家悲號孰知猪尾膏最能透伏毒之深藏毒血內瘀非此不活更有化毒丹潛消默奪而共濟之毒根自不容藏次日卽安睡九朝漿行壯熱如燔前方減白芷蟬蛻蜂房加黃連生地十二二朝漸漸收瘡猪尾膏遂撤顴項燥痒之極仍不能寐以荆芥穗金銀花苗陳大黃地丁甘草煎湯止浴其項拭乾復以胭脂膏貼而痒卽止仍復貫漿堆結甚厚餘熱未和痘痂亦燥前方倍加生地臨服調牛黃半分殊

未一分日進二服至十五朝日漸回和口內生瘡以忍冬解毒湯外用消瘡散又數日全愈

孝廉王乃老一公郎未及三歲體弱而兼病後及見痘蒙頭鎖項攢腫背兩頰細碎滿腹斑點皆紫背浮萍痘色晦滯宛似蒙垢痘犯不治不一而足所希冀萬一者惟在初見毒未有定位耳以必勝湯臨服和猪尾膏盞許外復以牛黃半分珠末一分總勻在內日服二劑次日色卽有紅意兩頰便成顆粒四朝曾背覺磊落鬆綻惟頭與項布而不清却亦鬆泛腹班漸淡漸退六朝浮萍悉退前方減葛根桃仁八朝漸漸放白但寢食俱艱眉宇愁蹙九朝漿行未能充溢時或乾嘔身熱驟熾聲音半啞以毒火湧洩也以涼膈攻毒飲十朝頭面夾紙鬆擡有膿漿滲漏身漿幾足十二朝收瘡少潤寢食僅半眉宇未舒十六朝燥癆復泛口內生瘡以消瘡解毒散日吹三四次二十朝外方得全愈是痘始以必勝繼以涼膈佐以猪尾膏化毒丹總以攻毒導瘡而保元拓裏腐談從不講及痘得保全而卒無虧本體見有病病受如此予一孫歲未滿週仲冬一日忽然發搐口眼歪斜周身肉瞤筋惕兩眼傍徨以清肝透毒散加羌活臨服調入牛黃丸七分灌下逾時神醒身卽壯熱次日便見痘頭面細密如麻上自肩至乳下自臍至足瞤無隙地但得成顆中段絕無一點此兩截痘也日夜叫喊不已急以必勝湯減桃仁加當歸佐以猪尾膏日進二頭服四劑後大便去毒垢甚多頭面便成顆粒身上漸得粗壯大便日頻晝夜約去三十餘次繼之清水若溺夜卽安睡遂減大黃至晚仍復叫喊痘卽奄駐不得已而復用晚又安睡次日漿勢沛然乳食大進食之以糯米細圓甚喜十朝頭面堆結甚厚但欠肥潤神情大快第身熱未和不免以大熱一退虛寒繼至爲虞大黃不敢復用停及一日燥痒難禁滿面搔破熱血成流又喊不絕口與食則拒要其所以然者以痘犯兩截壅塞固閉之毒餘氣未殄害仍竊發不得以輕鬆者概論也力主前方第減葛根紅花蟬蛻加石膏元參黃連是方服過十六朝始得全愈胃口甚強痘後精神煩旺

雉城城以用顧渚之孫也幼時出痘犯攢背頭面稠密如鋪肩背以上紅深如絳以下紫若胭脂身體燔熱神情昏憒以必勝湯用生地兩許減紅花加石膏黃連自三朝服及七朝大便日去四五次通身色轉紅潤背得鬆浮減葛根至十朝頭面漿足背得腐爛作臭餘亦成漿脣黑如煤熱猶火熾一方服至十四

一形始者六歲一兒痘及五朝全不起發日夜躁亂如癱在灰堆家涕泣以爲必斃痘頭疎朗按之不紫根窠紫滯頂陷而黑至環跳處攢聚如掌犯鱗坐形伏毒深藏抗拒諸痘始事者但知疏肌透發而不諳其故母惑乎暢達無由日淹滯而至猖獗也急以窮源透毒散和猪尾膏連投二劑更以大桑蟲酒漿調服二枚外以胭脂膏貼次日便覺鬆泛又二劑七朝痘即峻頂成漿神即安爽但環跳處鬆而未腫服及十朝漿湧連紙鬆擡如蒸餅嗣以忍冬解毒湯十二朝收結成功

一徐氏女四歲痘期兩日甚勻朝稀疎却陷而不鬆紫而乾滯身熱如烙兩腰貫珠環遷而犯此證是毒伏於腎貫珠之最惡者也日期尚淺餘痘尚疎猶可挽回恐此翁不明是理解之弗任不期此翁止此一女豫爲痘計屬意已專以予弗任大慟哀懇情甚悲切以必勝湯加牛膝黃連石膏稍用炒黑麻黃以行之并和猪尾膏連服二頭汁腰痛難忍繼之於汗而欲解解後而痛即止便云爽快次日三朝凡服藥後景況亦復如此至八朝而痛不作矣然其所以然者伏毒之證犯幾朝敗者日期未至毒雖暴烈猶未作難以其尚伏也故爾得安時師不諳而多忽殆至發難時毒已潰而無及矣見於機先者攻之而不容其伏毒又盛而未肯遽降藥毒塵戰自不能甯至於藥力戰勝而貼然矣何痛之有嗣後放白成漿腰間纏毒統脹如連殼豇豆漿亦滿圍但熾熱未和飲食未半前方減蟬蛻桃仁葛根紅花麻黃服及十二朝日漸回和收結全愈

吾宗叔澹五歲一憂烈熱如爐不及一日而痘即見於地角領下細如針頭而色近白托腮之象未成托腮之穎已露正面周身所見俱不成粒色多攀紅徹夜躁亂將來攢簇惡象皆所有者痘鄰於逆所冀者惟在初見以必勝湯減桃仁加石膏元參日服三大劑頭汁即用胭脂膏封貼次日正面與身即成顆粒却無隙地是方和大桑蟲每服一箇五朝神情得安七朝圓綻肥紅地角領下隔紙鬆綻亦得繢繡前方減蟬蛻乾葛十朝漿甚充滿惟壯熱未和盤暈焮紅飲食不進大便日解五六次皆毒垢十一朝正面堆沙漸次收結以及周身十三朝胃氣頓開痘痂尚燥紅暈未得全收服至十六朝諸象回春始終以一方成之纔以忍冬解毒湯加生地二十朝全愈弗藥約用大黃二十餘兩石膏二斤

一李氏子二歲見痘兩朝色似胭脂頂陷不鬆火熱如烙煩渴不已至陽越攢簇宛若荔殼瑕內求瑜惟

磊落耳以消斑快毒湯加大黃石膏桃仁地丁山楂服及五朝得鬆六朝紅活猶然絳色前方減桃仁蟬蛻九朝漿足紅暈未淡熾熱復然時生地已幾十餘兩黃連三兩餘矣至十二朝熱得稍緩紅暈略淡寢食亦以之而稍安前方減石膏十四朝先收者疮赤而多浮皮後結者焦痂而紅暈猶附體膚燥熱如初夫固餘毒之先機也不越二日神節昏迷從頭至足於空地及疮內重出一身似痘非痘不成顆粒脚地模糊色如塵垢無一隙地上則抱鼻而更層疊以及人中下復囊瘻以及小便紫腫痛楚非常仍不能寐稀粥與之則嘸不與則不思而痘復始矣較前局更惡此名謂櫓机痘櫓机乃惡獸其性反覆痘與相類故以是名此痘古來有之第罕見耳以窮源透毒散減山甲歸尾加桔梗牛蒡生地黃連金銀花青橘葉臨服調牛黃化毒丹錢許四劑後色漸紅而猶滯癰漸壯而猶平服及五朝仍眼封鼻塞七日行漿通身漸漸堆沙收結痂成一片十餘日而褪及過半頭面黑硬堅牢反不能落其鼻聳抱如螺拂及則痛人中亦燥裂逆血其小便龜頭於中投腫處頂出陽毛老唇抓肉爬肌眉宇不舒餘熱不解前方重加生地兩餘黃連二錢以金銀花湯煎藥服及月餘而熱始和痂始鬆以熟豬油調入官粉沃其頭面而得褪改形換相非初褪時面目矣嗣後寢食俱安調理收功人中與陽毛俱陰陽交會之地惡毒上下關鎖痘故如此若不開闢於前亦烏覩其後局若此也

嚴君弢一小歲未滿週而痘鄰於逆先見於兩鬢攢簇如麻繼而頭面通身徧及無餘色近於白而窠粒卒不鬆體不甚熱而神情卒躁亂似虛似實之間然虛者僞而實者真也兼於脈惕筋抽不時乾嘔兩目預腫而預合種種皆伏毒之象而况抱鬢其形伏毒已先昭於前乎一不謂者認爲氣虛痘反有隱意勢甚猖獗急以涼血攻毒飲以當歸易生地減赤芍加山楂地丁甘桔和桑蟲一枚日服二劑四朝頭面有鬆意根窠稍有紅暈眼腫減半閉而復開生機在此七朝身體壯熱頭面起脹頂白根紅眼封鼻塞有行漿之勢大便日去六七次身尚復然餘證未減前方減蟬蛻葛根原用生地加黃連服至十二朝身得鬆透寢食得半下部痘瘡板實皮肉擁腫如火前藥加牛膝羌活更以牛黃化毒丹日以五分佐之并大桑蟲至十八朝身漿始沛并及足經二十餘朝上褪下結前證日愈惟眉宇未舒眼開有障口內生疳頭

張武老一繼愛三歲一日熱如炮熾次早卽見痘一齊湧出稠無隙地通身紫滯神情躁亂大渴不止凡毒火燔灼於放標時者是痘爲火裏苗若不清其源而但以疏肌透表爲發勢必至焦黑而內潰矣急以消斑快毒湯加大黃石膏桃仁服及六朝色轉紅活顆粒亦鬆熾熱未減至八朝辰刻放白午刻而藥即肥濃以見血熱之痘患火不清一清而轉移之象勃然矣寢食猶未能復外以牛黃一分珠末二分以佐前方至十二朝發臭熾熱頓和寢食俱安漸收漸結痂似松皮嗣後又發血瘋瘡終不外涼血解毒之劑調治而愈

顧元仲六歲時出痘頗勻朗粗綻却紅艷如絳燥炙如火腹內時痛神情煩躁徹夜不寐此火炮於外而內又毒伏也以清涼攻毒飲減紅花加赤芍藥服至五朝痛止肌潤得睡仍用前方加甘草至七朝絳色漸淡項白而肥八朝漿卽肥濃大便日解五六次熱亦減半飲食漸想前方去大黃石膏犀角加連翹元參十朝頭面先收痂燥而白其根底猶附線紅至晚身復壯熱睡不甚安是後來餘毒之漸也復用石膏倍加生地外以牛黃一分珠末倍之和於劑內日進二服至十六朝俱得平復後用忍冬解毒湯調治收功

雉城臧氏八歲一孫身熱如炙口渴煩躁痘甚稠密而色攀紅三日期矣始事者第以升發爲透乾而幾黯躁亂愈甚身無安放以必勝湯用大黃三錢加石膏黃連日服一大劑五朝頭面紅潤身尚未轉七朝面部放白行漿通身乾而得潤神情半爽八朝成漿而迅速黃熟矣漿近板黃凡血熱之痘烈火一透漿無漸次惟嫌太驟漿無不滿惟慮板黃板黃者火褐倒醫之象也倍大黃五錢石膏生地兩錢三劑後漿色潤澤大便日去五六次飲食稍思熾熱未減其外祖王氏至見此藥劑大以爲怪停及一日是晚躁亂如初次日炮熱更熾身戰如寒漿殆變而躁實矣悉如前方連投二劑振戰卽定再劑而漿色復潤紅暈亦漸收漸淡服及十四朝虛欲將熄寢食漸安遂弗藥聽其自回厥後通身泛疤環跳處起兩癰如拳痛楚非常以忍冬解毒湯加羌活赤芍服及十餘劑而愈

小莆黃元澄一郎稟賦甚薄時方二歲出痘於癸酉春體不見熱徹夜擾亂叫不絕聲口膩如脂痘無容

針之地晦色者如蒙垢乾紅者似椒皮顆粒不鬆此毒伏於內體故不熱叫喊擾亂以氣血受錮神故不著晦色椒紅表裏雙關痘鄰於逆者也法當攻其伏不使毒橫於內制其毒使氣血發煌於外庶得挽回於萬一若以稟薄爲慮縱毒肆虐是不知務者矣以鬆肌通聖散加大黃減羌活白芷以其燥也臨服和猪尾膏半盞服及三朝如水澆石大便日去六七次眼卽瞞閉脣口腫硬亦毒參陽位之一證也前方佐以大桑蟲每劑一枚服及六朝身體頓熱脣黑如煤痘色變紅而却燥仍以前方加生地黃連減蜂房赤芍至八朝滯色悉退放白而不能肥煩叫依然面腫若有退意是伏毒未能淨盡而氣血一時不能充達故也權宜之際減大黃青皮用參七分芪一錢而暫充之和入大桑蟲一枚二劑後痘卽肥泛面卽光榮眼縫推脂熱却如火凡熱毒之證乍虛乍乏與虛寒之證不同一喚卽醒醒當卽止今熱如火雄烈仍在以消斑化毒湯減蜂房赤芍日投二劑外以牛黃一分珠末二分以佐之服及十朝漿滿十二朝黑嘴鬆褪神情始安乳食大進痘癰終燥身熱未和服及十六朝發真臂與膝生兩毒減生地加當歸金銀花貝母念朝外俱得平復收功

有一朱姓之子三歲痘在五朝熱如火熨痘色紫艷若花內雞冠脣裂迸血亦紫躁亂如蚓在灰厥父母涕泣以爲必無幸矣然猶可冀者面目焮腫雖紫能肥速以必勝湯重以大黃五錢生地兩許加石膏亦如其數減紅花蟬蛻服及七朝紫變爲紅繼卽放白成漿次日便老更喜烈熱漸解前方去葛根桃仁紅花加元參重劑減半又四劑可好

陳止宜長子出痘於幼時顆粒亦朗其頂平平若爲火熨者然其色白如宿腐盤量焮赤心煩壯熱因以滌邪救苦湯去澤瀉加紫花地丁生地黃丹皮白服一劑大便日解二三次次日三朝佐以大桑蟲每日二枚前方服及六朝項漸起而根脚漸活陳之岳翁舉其族中一同道至以頂平而白認爲氣虛拘古法而傍日期直用保元湯幸止宜明理信任弗貳前方服及十朝減滑石紅花桑蟲服至十二朝亦得次第奏效十四朝收瘡燥硬身熱未和根底尚附線紅此熱毒未盡將來餘毒之象也倍用生地黃兩餘外加石膏亦如其數并金銀花元參貝母至十六朝餘毒聚於頸項腫痛非常強直不能俛仰周身泛瘡寢食

王紹賓之孫偉之一子二歲痘密如鋪郭殼攀紅其頂黑如煤礦若火焯者大都居半身無安放然體不甚熱此乃毒伏於內也余以必勝湯每服和猪尾膏半盞服及三朝更和大桑蟲以佐之七朝頂與郭殼俱轉紅活減桃仁乾葛蟬蛻加當歸八朝身體壯熱有放白成漿之勢飲食大進神情開爽見景象進長恃爲無恐而藥卽懈弛次日仍復躁亂燥痒難禁兩頰搔破痘色變而紫滯悔之無及速以胭脂膏貼其破傷之處前方加黃連重以大桑蟲一枚和於劑內連投二服諸證減半兩頰膿水滲溢痘色復轉繼而成漿結痂神情養食俱安以一方貫之十六朝而得收功

有一陳氏子五歲見痘於隆冬頂陷且深時雖嚴寒却煩渴躁脣裂迸血頂雖深陷囊實根腫而色乾赤此氣血爲熱毒壅遏不得申其領載之權以故陷而不起非寒凝不透尤非氣虛不峻也一始事者不諳其理徒以升發爲事累日不起至六朝驟然作痒手舞足蹈竭定痒之法而莫禁痘色更晦頻頻乾嘔此翁計無所施謝絕去矣據膿未成而痒沸證固危篤猶幸兩頰擦而未破更憐其未得對病之劑而竟棄之覺爲不忍先以胭脂膏貼其兩頰以必勝湯減桃仁地龍加黃連錢許蜜炒麻黃一分臨服和大桑蟲二枚日服三頭汁大便去三四次俱如膠漆伏毒一鬆頭面卽脹而痒遂定上身亦起又二劑色轉紅活而渴愈甚體熱更熾是毒火發見之象也下身猶然板滯減麻黃加石膏酷好橘非此不藥每服必五六紀至十朝頭面漿足下部亦鬆減葛根十二朝頭漿斂而身漿偏飲食得進神情未開前方減蟬蛻桑蟲十六朝諸證脫然痂落過半始易忍冬解毒湯調治未及兩日身復炮熱眉宇復愁肩發一毒周身泛疤復加黃連赤芍外又以牛黃化毒丹日服錢許至念四朝全愈

朱石公五歲一孫痘初見點火熱如爐悶亂喘急昏暈如迷遺尿目閉正面一片攀紅隱隱細如針刺者目之有點按之無粒身上數點而色焦紫勢甚危篤所冀惟在初見以清涼攻毒飲重以大黃減犀角加地丁桃仁蟬蛻二劑後顧卽透發成粒通身俱透點成顆而且圓綻惟色紫滯神情半閉又二劑顧卽光澤身猶未轉外佐以大桑蟲四朝紫漸變紅而未潤服及七朝頭面成漿周身放白胃氣未開前方減蟬蛻桑仁紅花蟬蛻九朝思食而壯熱未減盤量歛紅重以生地兩許防其成火褐也服及十二朝諸證貼然漸收漸褪後易忍冬解毒湯而愈

陳錫甫七歲一郎痘見三朝勻朗粗綻色甚肥紅而少淡痘象頗佳身却熾熱愁容可掬徹夜不寐云曾膈悶而不快假令傷食而然痘其不能煥發矣今紅而且深緣毒火湧盛氣血領載然有及與不及所不及者毒在於內而故有此證以滌邪救苦湯減紅花澤瀉加地丁四劑後大便去三四次曾隔便爽睡臥亦安熱亦減半因痘可觀攻不敢過前方減大黃三劑至七朝前態復然痘覺停滯求其故而未得忽喉間冲冲欲吐俄頃咯出濃痰於乃奪之手痕熱如沸以見攻之未可已也前方倍以大黃二劑通身放白成漿諸邪復退惟熱未和一方服及十二朝全愈是痘因形色而忽其證至變紫變黑而斃者不可勝紀矣

凌長康一孫二歲身不見熱驀然左額一報痘脚地扁闊色赤而乾中心黑陷按之板實身有三四點似痘非痘俱淡白色已三日矣寢食如常神情如故所以然者以痘之所中有淺深淺者其毒鬆其出易形圓而色潤深則反是矣機雖萌動全體尚伏於包孕之地而未發故若未痘者然及所報之點却如此形色若不杜患於將來在其自至有越六七日或八九日有十數日外湧出如麻非紫黯即椒紅而不可救藥矣有所謂等伴痘者卽此是也令將銀針挑破胭脂膏貼之以必勝湯減桃仁生地服及五劑日以大桑蟲一枚而身始熱大便連去三次通身透發痘得疎朗奪其勢於未成也瘡囊尚不鬆泛又四劑圓綻光澤標痘根擡頂腐神情愁楚以全軀毒湧未得成熟也前方減葛根蟬蛻服及十二朝收功

王洪崖一孫三歲痘紅如絳熱熾如火徹夜不寐急以涼膈攻毒飲用生地黃三錢大黃錢許日投二劑三朝大解僅二次劑輕不能駕馭頭面起二點飛漿老黃如蠟紅艷漸滯前方用大黃三錢生地七錢石膏兩許連投二劑挑破飛漿點以胭脂膏是晚得臥熱亦稍和重劑減十分之三五朝又起飛漿十數點景色復然仍以重劑服至七朝放白八朝成漿寢食俱安惟熱未減十朝漿老頭面有斂意紅暈未淡十二朝足小股起一癰如桃夜復不寐以胭脂膏敷其四圍剥出其頂一方至十六朝出濃諸證平復口生痘瘡佐以消疳解毒散吹之方易忍冬解毒湯調治全愈

一施氏女十三歲痘患血熱氣滯瘡粒不鬆紅盤肆溢徧體如霞以貧窘不事醫藥八朝湧泡幾三分之餘俱平板九朝泡俱破傷其浮皮有如參設破傷之色乾赤有如膚剝火熱如炮痛楚非常衣衾難動

證在垂露廁父母哀號悲切余憐其坐視以貧而就死地未免希援於室外以庄地兩牛石膏一兩大黃三錢與衆藥同煎二錢臨起投下餘佐以荆芥穗地丁赤芍山楂青皮木通投下二劑連解六七次破傷處俱有濃水濕潤平板者略覺鬆浮又二劑通身毒化成漿頓思飲食再劑而熱減半漸漸收結發癰發斑以忍冬解毒湯全愈

雉城周彝仲一子五歲出痘於初夏大熱如火煩渴不止兩頰通紅隱隱如針砂身上稠密如鋪乾紅滯色二三同道以危疑而推委彝仲憂慮而致廢寢食余慰之曰毒火誠烈可畏幸得發揚治之得宜當無患者主翁稱謝不已以涼血攻毒飲加黃連三錢生地六錢連投三頭汁次日顧上繚繚成珠第燔熱更熾前方加石膏七錢黃連四錢每服和大桑蟲一枚時有徐培者至與余甚合是方服及八朝色得紅潤前方減乾葛蟬蛻紅花九朝放白成漿十朝正面便有斂意及盤量未淡熾熱未和恐防火褐重以生地石膏各兩牛黃連五錢以制陽光不令驟斂毒復歸於內耳血熱之證不慮難收惟慮熱毒未清乾收爲患不得以九回十褐同論也服及十三朝面癰已老身屬將半胃氣漸開熱亦稍和有一友用白芍錢許助其收斂是晚煩擾不寐未必因此作祟見血熱之不可爲收斂計也次日頭面赤腫身熱復熾煩擾如初是餘毒湧發之象悉如前方加蟬蛻日服三頭汁次日十五朝發出血疹紅斑自頭至足無不徧及夜即安睡神復開爽而熱未和是方服至十七朝方得霍然以忍冬解毒湯加羚羊穀精草以目白紅也念朝外全愈

丁巳先君治一痘十二歲皮薄色淡頂平脚塌始以透發繼而大劑保元湯加芍歸淮地膏得以成漿至十朝不思飲食主翁疑以過補先君曰果爾漿必蒼老癰必燥硬體或煩熱種種反是焉得云過以納穀散重以參木各五錢胷膈豁然胃氣大開無物不想收痂落膿而愈

戊午錢氏一女年十五適值經後痘出甚密鬆而囊薄紅淡而乾身體溫和人若失志睡中時獨語二三句氣血兩虛心神不足之證始以養榮透毒湯四劑後痘雖起發形與色俱不振四朝即以保元拓裏人參每劑二錢至六錢黃芪四錢至一兩芍歸熟地亦俱重劑服及十朝漿僅七分十二朝寢食得半痂不甚厚疮久光澤十四晚徹夜不寐語言不清而無頭緒父母疑以過補使然果爾身必熾熱氣必雄猛痂

必燥硬渴而思冷脈按洪數有力如是不寐方是火毒內擾種種反是緣以痘本不足而又值經後明屬心舍空虛以甯神解毒湯加柏子仁用參四錢一劑即愈

庚申一兒四歲痘在八朝漿色淡薄而滯根盤紅淡而乾神倦而不容安似躁而不能逞身涼指冷咬牙不已兼有戰意斃可立待厥父母呼天號地始事者曾以保元輕而無效余用參三錢芪四錢嫩鹿茸膏淮熟地膏各半盞熟附五分佐以芍歸外山楂三錢以行其滯連進二頭汁更以大桑蟲一枚服後若時雨之化薄者厚淡者濃滯者潤冷者溫咬牙頓止神情遂開嗣後去草附前劑分量減半十二朝左臂發一癰以忍冬解毒湯調治收功甲子以來是證不概見矣

余荆己酉仲秋忽壯熱如火次日卽見痘細如芥子色似胭脂余是時未諳此道先君以升麻葛根湯加蟬蛻山楂牛蒡而升發之二劑後狂煩譖語先君以犀角地黃湯加荆芥木通蟬蛻以大桑蟲一枚三劑後熱卽和神卽靜周身起脹而頂卽白以見曩時毒火之易退聽如此時懷娠七月惟恐裏虛卽以保元湯加芍歸淮熟地白芷殼蠶日投二劑每劑用參一錢其如痘密無縫氣血不繼至八朝頭面灰白如錫皮通身渾如嫩腐皮無二搖頭鼓領寒戰非常危在瞬息先君以參芪各一兩芍歸各五錢熟附一錢肉桂一錢熟地膏二盞傍晚投下戰卽稍定沉沉睡去至夜半大有轉機醒來思食與粥兩碗不饜所欲次早又一劑午後通身漿足身體和緩不復戰矣前方去桂附參芪減半十朝腐爛作臭膿水淋漓以敗草散收之約用一斗飲食大進神氣日爽以參歸化毒湯全愈論胎前熱劑在所大忌况桂附而重用乎然痘犯大虛大寒而不權其當務之急勢必不起可有身外之胎乎母安則子安理蓋如此又當究其所以宜爾者以其灰也白也濕也皺也身涼而神蕭索也若是亢極作戰而混治焉其害可勝道哉

嚴貞生一子三歲出痘於壬戌八朝清漿未半而癰沸禁止不定面幾破碎眼將露縫大便艱塞糞少垢多日去三四次囊窠嫩薄體不燥熱紅暈則肆溢如霞身無安放所謂氣虛血旺者非乎至頻解多垢總氣虛不能化毒毒不成膿而故垢從便出也急以胭脂膏貼其兩頰用淮生地五錢安置其血人參三錢黃芪四錢振作其氣殼蠶白芷大桑蟲爲催漿托頂之佐白芍五分末其遊行山楂四錢木香三分以行其滯傍晚投服卽睡著夜半又一劑次早盤卽歸附漿卽肥濃眼縫推脂正面堆沙便亦減半嗣後收痂

落屬不脫保九清解易若破竹收功

馮素若一子三歲其時丁巳痘出甚密人靜身溫囊殼不老項白而不肥盤紅而乾淡六朝眼合不緊鼻塞而鬆起而少脹夫固已見氣血兩虛矣七朝滑瀉日去三四次淡黃其色口渴不已停飲於中宮水聲漉漉又見土虛不能制水矣始事者因燥渴乾紅且囊殼無漿不敢實脾恐益其燥不知燥而實者火燦金也宜制陽光而金自平燥而虛者土不生金也宜固中央而燥自解况痘賴氣煦血化而成漿氣血之源在於脾胃今瀉而身溫渴而停飲紅而乾淡囊薄而靜種種不足見乎其間烏可齊其末而不揣其本也以實脾固本湯用參一錢加黃芪三錢暨薑棗連投二劑轉機及半又二劑十轉其七漿不甚濃却亦堪回嗣以五味異功散加防風白芍收結而愈是證今不概見矣

一兒三歲痘在八朝膿漿滿足盤量焮赤忽生振戰衽席皆動按其身熱如炮此亢陽作戰也以清涼攻毒飲用石膏五錢生地八錢黃連一錢大黃五分減紅花地龍犀角加薑一小片以行重寒之劑連投二頭汁其戰即止又二劑紅暈漸淡至十二朝熱得和平收功弗藥

朱元卿之長子幼時痘犯血熱之證自放點以至成膿極其涼血解毒清火漿甚濃厚至收醫時大便忽頻日去二十餘度至次日難以數紀乳母與婢輩苦以穢惡不堪嫌以寒涼太過而然烏知熱毒下利之理果因寒涼身體不宜熾熱脣口不宜焦裂神情不宜煩躁痂皮不宜燥硬今種種其然脾豈虛寒者乎以瀉黃納穀散加地丁金銀花貝母服至十四朝左顧頓起一大癰如桃大便即止諸證減半更以牛黃一分珠末二分調入化毒丹內用貝母湯送服十六朝膿自口出前方減生地加連翹甘草十八朝全愈是證難以筆記聊附其一以證其概耳

吾郡吳二公祖有孫四歲痘稠密而氣血兩虛五朝以保元湯加芎歸淮地而得成漿終不肥濃八朝發渴頻頻思飲與之盡許卽拒俄頃又乾身熱不壯神情懶倦便亦不實以補液湯加芪术薑棗服及十朝渴得漸解脾氣亦實減訶子黃芪加茯苓白芍十四朝眼白起紅障多淚以奏凱和解飲減當歸牛蒡加甘菊穀精草調治收功

沈同袍治一痘證放點以至起脹乾紅晦滯平者半陷者半身涼而神却躁頻頻腹痛欲解不解此毒火

渴慾使然以鬆肌活血攻毒服及五朝大便連去四五次火毒一鬆身卽壯熱而神靜色轉深紅發渴不已重以攻毒清火八朝放白成漿險變爲順與一不韻者同事惟恐虛寒繼至減大黃石膏二劑前證復然更多不寐而渴更甚仍如前方十四朝漸安渴解十六朝調理收功

顧韞翁一子四歲出痘屬血熱毒盛放點色似胭脂漿老盤猶焮赤結痂燥硬乾焦始終壯熱煩渴初朝卽以涼血清火攻毒進藥甚艱服不及半致熱毒難清喜得進牛黃化毒散不拒日服餓許自七朝服至十六朝熱毒漸減幾一月始得全愈熱渴難解如此若魏氏論渴云火非虛不發一以保元湯加麥門五味欲壯水之源以制陽光理固有之其可以概施也耶

一女七歲痘未見點壯熱如焚靜則燥炙如烟一轉側而汗卽沾衣俄頃卽燥動卽復然次日見痘細密如麻紫艷與攀紅各半煩渴躁亂以涼血攻毒飲減山豆根加紫草服及四劑顆粒分明而汗卽止五朝胃頭面肥潤七朝通身放白行漿自上而下景象頗佳但烈熱如故絕不思食神情尚楚前方服至十朝胃氣略開夜臥將半頭面收結痂色乾燥身上將膿而紅暈未收熱終未減前方減紫草服及十二朝通身復汗如蒸透時而燥熱等證與大寢食神情蒙蔽之象頓開矣方易前方以忍冬解毒湯調治收功然變幻之證難以悉載能以數項推類以盡其餘庶不爲似是者誤矣

韓人穀一子三歲出痘十二朝絕不思食筋抽脈惕徹夜不寐始事者以胃弱心虛以宿夜曾受驚恐藥以安神開胃而愈甚邀余往視這甚磊落第熱尚如烙盤量焮赤膿囊大半爲烈火燔灼而焦宛若螺醫神情散亂而毒已歸於內矣其未變者猶然圓綻肥黃余曰是痘熱毒未清未宜收斂以故痂如螺盤黑而又薄是倒膿而非正收也奈何此友毅然曰君不見其膿之滿足耳膿老自是當回愜然信爲無恙余遂別是夜卽勉

潘氏五歲一愛痘犯血熱十朝壯熱未和膿成未熟紅暈未淡而卽乾收宛如火淬其兩頤平斂痂燥而薄面猶赤腫始事者亦知其爲熱毒已清解於前矣第清而未暢次日又便利作痒似乎補瀉難施謝事去矣勢在累卵但血熱尚熾證必因之自無兩局以滌除救苦湯減大黃紅花加地丁生地外以牛黃一

青皮加金銀花至十四朝熱和神爽大便順止寢食俱安遂以忍冬解毒湯調治收功

己未有一陳氏子四歲痘甚稠密而且一齊湧出但得分珠頂平脚塌囊薄色淡人靜身涼種種犯氣血兩虛之證四朝乘氣血尚未離散即以保元湯人參一錢黃芪錢半加芍歸淮熟地山楂六朝頂起而囊不蒼盤紅而色終淡眼欲合而未緊鼻將塞而猶通進不勇者防退速前方倍以參芪加河車鹿茸二膠方得行漿終不能肥九朝寒戰漿色腐白前方重以參四錢芪六錢更以熟附六分肉桂四分漿轉肥濃十朝漸收漸結寢食漸安見景象得轉以艱於進藥姑恤停止十二朝忽眉宇不開是晚臥不能安次日曲池二穴俱發一癰其色淡白按之不熱拂之痛甚以加味內托十宣散四劑後方紅活三日後不潰亦不退以參芪僅錢許故淹滯如前重以三錢一劑卽潰左肩與右肋又起一毒紅腫且熱以毒未盡故復發此得氣血振作故熱而紅腫是已十八日矣前方減參芪俱半以胭脂膏塗貼畱出其項漸消平復聊記其一以見大意血熱之餘已散見於前不贅

有一許氏之室懷娠四月身忽大熱如火不一日而見痘稠無隙地細碎如麻躁亂不甯脅迷悶痘鄰於逆所可取者色得肥紅耳猶在初見余欲攻毒導瘀兼清肌疏透庶幾內毒一鬆得分顆粒未必非挽回之一機也厥夫惑於不韻者之言執意不欲予辭弗藥九朝而斃而胎卒墮其所以墮者豈脾虛血弱之故烈毒內攻熱血煎熬臟腑且潰而胎有不墮乎況小產者亦多矣何嘗墮而必斃則知其墮也以毒而斃亦以毒也歟

一友朱貞老其間懷娠六月出疹於隆冬躁亂不甯燔熱如火道中一友以寬氣養血安胎爲主佐以甘桔牛蒡蟬蛻荆芥疏肌透發三朝疹非不透熱終如火煩渴不已歟而增喘徹夜無眠至五日不惟不寐并不能就枕不惟喘急并不能出聲面如土色目睛直視手指厥冷渴想西瓜六脉絕無影響其娠追下小腹痛楚難禁身無安放立刻可斃舉家但願得母無恙足矣余殆弗藥惜其未得一對病之劑覺有不忍爲熱腸所迫以大黃五錢石膏一兩滑石生地各七錢炒黑麻黃三分佐以赤芍丹皮牛蒡荆芥地丁木通甘桔以蘆筍煎湯代水二劑後諸證稍緩徧覓一大西瓜陸續以濟其渴又二劑其疹又透諸證減半而娠不追下矣前方減麻黃仍以二劑面顏頓轉喘定而得伏枕熱渴亦發大半娠卽安然但欬嗽不

止前方去大黃赤芍丹皮減石膏滑石及半加元參花粉黃芩金銀花二劑熱渴俱平胃氣大開據垂斃重證幸而復生尚須調理見安和而遂弗藥越數日後娠復不安但不追下飲食減半復有餘熱口內生瘡以消斑快毒湯減蟬蛻丹皮赤芍加金銀花花粉佐以消瘡散吹之全愈是證所用湯劑據常格胎前所大忌者而得既保其母并安其娠見有病病受不第無損於胎正見所以安之之妙疹與痘雖異其所異者惟氣虛痘耳若烈毒之證原同一軌令是證但畱其母猶畏大黃等味利害並存尚費躊躇竟爾予母俱全凡志醫者可不深思而潛玩也耶有懷娠而宜峻補回陽者若余荆之證可徵矣不贅治驗

余甲寅生一兒百日內生肥疥瘡疊時亦惑於人言而不敢治漸漸通身布滿無容針隙地日夜啼號乳食減半余思痘固當慮尚在日後而况未確瘡毒如此猖獗危在旦夕孰緩孰急當務自在選合掌丸如前法治之內以忍冬解毒湯減紅花加黃藥生地元參治及半月而愈後來出痘頗密而透發甚易人言不足憑如此

嚴琢菴吾宗間如茅奕啓諸人之子俱百日內生胎毒瘡其瘡成暈成圈中低陷而圈浮突宛如梅毒目之可畏有遠臍者有在耳畔者有遠肛門者餘處難以數紀俱以牛黃八寶丹五分一丸日進二服外以化毒丹調入胭脂內一一貼之週時一換更佐以忍冬解毒湯加羌活元參黃藥桃仁赤芍減紅花與丸間服乳母忌魚腥麵食薑椒奕啓子幾百日而愈倘如子愈而復發幾及兩載而痊惟嚴琢菴所藏牛黃金光寶色川中亦不偶者內服與外治兩倍於二子不及兩月全愈嗣復出痘皆收功無恙

臧顧堵一孫生雙胎先下地者三朝便生毒瘡細似針沙赤如紅霞三日後連成一片一擦而膚剝去偏體如焚以痘前瘡當任其生不事醫藥十數朝卽癒其次焉者於十朝後亦發此瘡與前無異余曰是瘡於母腹中受積熱積毒而發名爲血霞瘡治之不早有性命之憂不但不利於痘也余言及此追悔無已云初生者昨已癒於瘡矣今治之可無恙乎余授雙仙化毒丹并牛黃八寶丹二方一治其內一治其外而愈厥後出痘何嘗受治瘡之累如此治驗難以筆記聊存一二以證焉耳

吾郡中有爵尊望重年逾五旬者一鄉紳止有一子兩月內生胎毒瘡與前三證宛肖竟憑老嫗婢尼之言以痘前瘡宜發不宜醫反令乳母食魚鮮鷄筭以發之其瘡日盛延一不韻者以是瘡似梅毒與大人

梅瘡同治用川椒一兩全蠍五錢與乳母假道於乳亦妄冀震拔其毒服及過午其瘡愈大腫愈突陷愈深隙地復增血點細瘡無不徧滿熾熱如火膚亦如霞目紅口燥徹夜煩擾邀余往視勢猖獗矣以兩月芽兒如是之毒如是治法不覺爲之愴然予大戒其乳母忌口急錄牛黃八寶丹方令速脩合將如治三家之法治之容或可挽先以消斑化毒湯減蟬蛻二劑後猖獗之勢亦得稍緩嗣復聽卜云爻象無咎但別有天醫以余方爲廢紙老嫗輩仍復主張將所餘震發之劑罄盡當忌之物大啖遂至不救惜哉姚世所三歲一愛瘡將愈矣惟兩小股至足尚未結膿而痘繼之九朝漿及下部痘與瘡統成一片浮浮痒沸十朝愈甚兩股交擦和皮剝去痛狀可慘惜頭面及身成痂過半因兩足作楚連垂成者亦歸於敗十一朝而斃瘡之惡也如是夫

上元許達璋耀南初校  
陽湖陳以眞璞卿覆校