





實神麩若因肉食所致更加山查若因魚鱠之類再  
加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受  
傷用六君子湯或噍酸變腐加炮薑作瀉更加升麻  
如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯 一婦人  
食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導之藥  
不應飲食日減肌體日瘦半年矣余謂此食積爲患  
用大酒麩炒爲末溫酒調服貳錢俄而腹鳴良久仍  
下糝而愈 一婦人食魚鮓腹痛患痢諸藥不應  
用陳皮白朮等分爲末以陳皮湯送下數劑而愈

見現丸

薑黃炒

三稜醋炒

萹澄茄

陳皮去白

良薑

人參

蓬莪茂酒炒各等

右為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊丸如梧子  
大每服叁拾丸蘿蔔湯下白湯亦可

大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 固...

... 子... 年... 本... 出... 滋... 陰... 補... 氣... 壯... 元... 氣... 壯... 陽... 氣... 壯... 陰... 氣... 壯... 陽... 氣...

... 大... 功... 效... 神... 速... 補... 腎... 壯... 陽... 益... 氣... 養... 血... 滋... 陰... 補... 虛... 固... 本... 培... 元...

... 身... 體... 虛... 弱... 氣... 血... 兩... 虧... 精... 神... 衰... 倦... 頭... 暈... 目... 眩... 耳... 鳴... 口... 乾... 舌... 燥... 咽... 乾... 渴... 飲... 水... 不... 解... 渴... 飲... 水... 不... 解... 渴...

... 三... 壽... 補... 腎... 壯... 陽... 益... 氣... 養... 血... 滋... 陰... 補... 虛... 固... 本... 培... 元... 補... 腎... 壯... 陽... 益... 氣... 養... 血... 滋... 陰... 補... 虛... 固... 本... 培... 元...

# 腹脹

郭產後腹脹滿悶嘔吐不定者何荅曰敗血散於脾  
胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不  
能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止  
吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治  
但服抵聖湯則愈

薛前證若敗血傷於脾胃宜用  
前方若飲食停於脾宜用六君子厚朴若飲食傷於胃  
宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善

一產婦患前證或用抵當湯敗血已下前證益甚小  
腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益

氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如矢又用六君子湯而

安

抵聖湯入生薑半兩焙乾水煎

方見胎前腹脹云此方最宜用

局方平胃散加人參亦可

扣藥余之與藥不臥干轉更過便五歲亦愈藥合

詣受水邊而半扣並習者不痛者以毒常合即止

胃脾受之限不詣雖少誦過而效即

蓋對即即即即不安查四

即即

水腫

郭產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢  
留淫日深却還不得腐壞如太故令面黃四肢浮腫  
醫人不識便作水氣治之凡治水多用導水藥極虛  
人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致天  
枉但服小調經散血行腫消則愈 陳無擇曰產後

浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失  
於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚血與氣搏留  
滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脉證治之  
宜得其情小調經散治血分固効但力淺難憑不若



吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也 又

論曰夫產後勞傷血氣廢理虛則為風邪所乘邪搏

於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也

若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水

腫者利小便差也 潔古如產後風寒在表面目四

肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利為度 如

浮腫至膝喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也 如浮

腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也 如只浮腫

止七聖丸本方服 東垣中滿分消丸 雜病用四物 脹滿

吞之 丹產後腫必用大補氣血為主少佐以

木茯苓使水自利薛前益若寒水侮土宜養脾肺

若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參

雜證本門主論 一產婦飲食少思服消導之劑四

肢浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君

子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止

飯食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎

氣丸而愈 一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒

余謂脾肺虛寒用六君加薑桂而泄瀉愈用補中益

氣而脾胃健 杜張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫

急召產科醫治經半月不差病勢轉劇召杜治之杜

產後水腫 又再五

至曰諸醫作何病張曰蓄云水氣浮腫杜曰非也且  
 水氣發咳嗽小便澁是也今愛寵小便不澁不作咳  
 嗽惟手足寒為血藏虛氣塞不通流面生浮腫遂用  
 益血和氣藥治之旬日病去七八經半月全愈所用  
 之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血藏風虛冷全  
 產科家多用此藥治產後諸病如神更名損金湯者  
 是也牡丹散 一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因  
 見血暈

酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解頻服小調  
 經用澤蘭梗煎湯調下腫氣漸消

大調經散

治產後腫滿喘急煩渴小便不利方見

寒熱

小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

細辛

麝香

各半錢

右為細末每服半錢薑汁温酒各少許調停服

治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

出婦人經驗方

乾漆

大麥蘖

等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾

漆如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散

但是產後諸疾熱酒調下貳錢

氣

經云產後肌浮柑皮酒服

搗皮為末每服貳錢酒調

白木湯

治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名

曰氣分

枳實

壹兩半

白朮

叁兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服  
腹中爽即當散也

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此

體虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行

氣可也

白朮 貳兩半

陳皮 壹兩

川芎 半兩

木通 陸錢

茯苓 叁錢

右用水煎下與點丸貳拾伍丸

黃芩為末粥丸名與點丸亦名清金丸

奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 叁兩 取汁

白麩 叁兩

大半夏 柒枚

右以生薑汁搜麩裹半夏為七餅子煨焦熟為末

水調壹盞小便利為効

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已 等分

產後水腫

女科五

卷五

右為末每服貳錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防已散

此藥虛人戒服

漢防已

豬苓

枳殼

桑白皮

各壹兩

商陸

甘艸

各半錢

右為粗末每服肆錢水壹盞半薑參片煎至柒分去滓空心溫服

七聖丸

雜病大便不通

加減吳茱萸湯

治婦人臍氣本虛宿挾風冷胸膈

滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡

寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴

利小便便石風

積聚

血痕卽兒枕宜參看

大夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成  
皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣  
聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者  
積爲陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚爲陽氣陽性  
浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱爲  
風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也  
薛前證乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當  
固真氣爲主若求旦夕之効而攻其邪則速其危矣  
當參前雜證積聚諸方論治之一產婦腹中似有



腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無殊類瘵證久而不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨證互服而愈

天新產後有血與氣相搏而痛者謂之痙痙之言假也謂其痛浮假無定處也此由風有風冷血氣不治至產血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水輕則否澁重則不通也

薛前證乃寒邪乘

客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養爲善難經云任脉之病男子爲七疝女子爲瘕聚當參前後各論治之

丹南山婦人年三十八於九月二十三日月經行比  
前過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴  
血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨  
則痛稍定大小便抽痛小便澀大便略下少赤積垢  
食不進口略渴發熱此胃氣為草藥所敗加以受傷  
之血妄行而不得洩所以為病也

砂仁

甘艸 炙

川芎

黃芩

各參分

滑石

壹錢半

牛膝

貳錢

桃仁

米粒

右水酒煎服

芍藥湯

保命

治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自

安

芍藥 壹斤

黃芩

茯苓 各陸兩

右剉散每以半兩水煎温服日三

丹產後消血塊

滑石 叁錢

沒藥

血竭 各貳錢

右為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末  
麵糊丸白朮湯陳皮湯任下

又方消血塊

香附 童便浸

桃仁 去皮留尖等分

為末醋糊丸

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

產後積聚

虛邪冷內勝宿疾轉增

吳茱萸

壹兩半

苦梗

乾薑

甘草

麥門冬

防風

半夏

細辛

當歸

赤茯苓

牡丹皮

桂心

右為粗末每服肆錢水壹盞半煎至米分去滓食

前熱服

金匱加減腎氣丸

方見雜病水腫

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參

白茯苓

熟地黃

補脾 腎利

產後 女科

小蘘香 各參錢 白朮

川芎 各肆錢

當歸 白芍藥

香附子 各伍錢

甘草 黃芩

柴胡 各壹錢

右劉散分作六七服每服水壹鍾半薑參片煎至

柴分空心熱服盡此藥方服調經丸 若肚痛加

延胡索乾漆枳殼 各參錢 若嘔吐惡心加良薑砂

仁 各貳錢 若手足麻痺加肉桂 壹錢半 若咳嗽加

五味子欵冬花杏仁

霍亂

大產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經云渴而飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸大段虛冷者加附子來復丹亦妙

**薛**一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈後胸腹膨脹飲食稍過卽嘔吐或作瀉余謂此脾胃俱虛用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調兼恚怒患霍亂胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無

草豆蔻仁

乾薑

各壹兩

厚朴

壹兩半

右為粗末每服參錢水煎服

附子散

療產後霍亂不止手足逆冷

附子

炮

白朮

當歸

吳茱萸

洗

桂心

人參

丁香

橘紅

甘草

各半兩

右為細末每服貳錢粥飲調下不拘時

高良薑散

治產後霍亂吐利腹中疔痛

良薑

當歸

草豆蔻仁

右等分為細末每服貳錢用粥飲調下

右二方非真寒不可用

局方參苓白朮散療產後霍亂吐利身熱帶渴者良

方見雜  
病泄瀉

若吐逆不受湯藥以伏龍肝細末參錢米湯調下即

受

詳雜病霍亂門



嘔吐

大夫胃爲水穀之海水穀之精以爲血氣榮潤臟腑  
因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸  
胃燥澁其氣則逆故嘔逆不下食也

薛前證若因

飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯飲食  
過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參  
養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木  
香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土用六君升麻柴  
胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱  
冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有

療產後嘔逆不止

鄧知縣傳

橘紅 壹兩

半夏麩

甘草 各半兩

藿香 叁兩

右為細末每服貳錢水壹瓊半薑叁片煎至陸分

溫服無時

治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮 壹兩貳錢半

生薑 壹兩半

右細切酒水各貳升煎取壹升分叁服

產後嘔逆不已四君子湯加陳皮半夏藿香砂仁

石蓮散

治產後咳逆嘔吐心怔目暈

吃逆

大夫肺主氣五臟六腑俱稟於氣 產後則氣血傷臟

腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上 而又脾虛聚冷胃

中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊 使氣厥而不順則

吃逆也脾者主中焦為三焦之關 五臟之倉廩貯積

水穀若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆而 致生斯病也經

云吃噫者胃寒所生服藥無効者 期門參壯必愈

期門穴乃胃之大絡 薛前證屬胃氣虛寒之惡候

如用後方未應急投參附湯亦有 生者

參附湯 見前自汗

陸分熱呷之

又方 古壁鏡窠 參肆個水壹小盞煎至半小盞熟服

羌活散 靈苑

治五逆

羌活

附子 炮

藜香 炒各半兩

木香

白薑 炮各貳錢半

右五味為末每服貳錢水壹盞鹽壹捻煎拾數沸熱服一服止

補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆効

右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂

產後  
百四十六  
熱者宜乾柿竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參  
甚則附子佐之誤施則有噬臍之悔慎之

起藥出

張泉譜曰膠平曰蠶皆具高管應附入一笑

譜曰蠶

天賦山二十八首

平

惟能日其臣

# 咳嗽

大矣肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後喫鹽太早而咳嗽者難治 產後血氣不通咳嗽者何咎曰產後咳嗽多因食熱麵壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方黑神散五積散加棗煎服 **薛**產後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣虧傷或陰火上炎或風寒所感主治之法若陰血虛者用芎歸熟地參朮肺氣傷者用四君芎歸桔梗陰

火上炎者六味地黃加參朮風寒所感者補中益氣  
 加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘急用二味參蘇飲多  
 有得生者若兼口鼻起黑或鼻出血急用前飲亦有  
 得生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根  
 本人身之根蒂胃氣一虛五臟失所百病生焉但患  
 者多謂腠理不密所致殊不知肺屬辛金生於巳土  
 亦因土虛不能生金而腠理不密外邪所感其陰火  
 上炎亦壯土金生腎水以制火為善若逕治其病則  
 誤矣 一產婦咳嗽聲重鼻其塞流涕此風寒所感  
 參蘇飲一鍾頓愈六七乃與補中益氣加桔梗茯苓

半夏一劑而痊又與六君加黃芪以實其腠理而安

一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱徹作無時

此陰火上炎當補脾腎遂用補中益氣湯六味地黃

丸而愈 一產婦咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此

病在胃關於肺用異功散而愈

旋復湯 即旋復花湯見喘  
○有汗者去麻黃

知母飲 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服

此藥若傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治 一名二  
母散

知母

貝母

白茯苓

人參 各貳錢

桃仁

杏仁 並生去皮  
尖各壹錢



右吹咀水 氣升煎取捌合去滓食後分兩服  
療產後咳嗽氣喘

百部根

苦梗 各陸分

桑白皮 分

乾百合

赤茯苓 各捌分

右吹咀水 氣升煮取柒合去滓食後分兩服

自製噲化丸 見前雜病咳嗽

喘

婁產後喘而極危多死也

**郭**產後喉中氣急喘促者

何荅曰然者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相

隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無

主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡

露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹

胞衣血去喘自定 陳無擇評曰產後喘急固可畏

若是敗血上熏於肺猶可責効奪命丹若感風寒或

因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟况孤陽絕陰

乎若榮血暴絕宜大料煮芎藭湯亦可救傷風寒宜

產後喘 百五十一

薏仁煎湯服之卽寬二三服得吐其痰如  
血感寒治之也

氣

血竭散 治產後敗血衝心胸滿上喘

服

真血竭

如無紫  
礦代

沒藥

右等分研細頻篩再研取盡爲度每服貳錢用童  
便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產下一服上  
床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生  
百病

雲岐參蘇飲

治產後血入於肺面黑發喘欲死者

至柴分去滓食前温服有汗者不宜服

裏 若傷鹹冷飲食而喘者宜見現丸見前

虛 五味子湯 治產後喘促脉伏而厥

五味子 杵炒

人參

杏仁 各貳錢

麥門冬 去心

陳皮 各壹錢

右薑參片棗貳枚水煎服

大補湯 治產後百口外面青浮腫唇白氣急有汗

乃大虛之證急宜服此

當歸頭

大川芎

大白朮

白芍藥

白茯苓 多

人參 多

黃芪 多

五味子

熟地黄

乾薑 上

升麻 少

右劉散水煎服此二貼不退即加川烏大有另磨  
入服 有瀉加訶子肉豆蔻粟殼

條兩霏霏松隈石魚龍何處育水壘阿翁拾遺山前草韻興

穀育子賦節

宮麥野更離草或百即會車一字香交前嶺前泉泉木林中

朝日怪藥石 其首與藥石首似人思難至西臨竹林臨乳六竹林本藥則視

吾曹山前脈水多白餘林不五姓到終來變製耐半嶺前車

鼻衄

郭產後口鼻黑氣起及鼻衄者何荅曰陽明者經脉之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣虛血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證胃絕肺敗不可治 經驗方云急取緋線壹條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節上卽止無藥可治亦禳厭之一端也 薛按胃脉俠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之證急用二味參蘇飲加附子五錢亦有得生者 汪一婦

產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升  
遂用益母丸貳丸童便化下鼻衄漸止下血漸通

婦人血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升  
遂用益母丸貳丸童便化下鼻衄漸止下血漸通

柔新計留之

管色飄飄空表觀宮羅掌麻林指垂翅向山前洋默味遺戀

薰蓋知草花

數至南港良味芬芬瑞味蔬育人案收今四月齡飛紫心貴

天上印派星

應有新陽人

# 血崩

陳產後血崩者何荅曰產卧傷耗經脉未得平復勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷蠹榮衛衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經丸以止之 陳無擇評曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責効不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證諸藥治之為得

薛前證若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛



艾葉

赤石脂煨

補骨脂炒

木賊各半

附子壹枚炮

右為末陳米飯和丸如梧子大每服貳拾丸食前

溫酒下米飲亦可

芎藭湯加芍藥方

芎藭

當歸

芍藥各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓熱服  
無時

熟乾地黄散治產後崩中頭目旋暈神思昏迷四肢

煩亂不知人事

產後  
熟乾地黄

伏龍肝

黃芪

赤石脂 各壹兩

阿膠

甘草

白朮

艾葉 炒

川芎

人參 各半兩

當歸 半柴錢

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑叁片煎至半分去

滓溫服

白芍藥散

治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦血損

白芍藥

牡蠣

乾薑

熟乾地黄

桂心

黃耆

烏賊魚骨

鹿角膠

龍骨 各壹兩

右為末每服貳錢食前溫酒下

又方

赤石脂

熟地黄 各壹兩

鹿茸

牡蠣

當歸 各半兩

右為細末食前以粥飲調下貳錢

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠

赤石脂 各壹兩

續斷

川芎

當歸

甘草

丹參

各壹兩

龍骨

鹿茸 各壹兩

烏賊魚骨

龜甲

各壹兩

右煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下貳參拾丸

產後

血崩

五

月水不調

大產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也薛前證若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加柴胡丹皮不及期而來血熱也四物山梔柴胡將來而作痛者血實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也四物加參朮紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作痛而色淡者痰多也四物合二陳治當臨證制宜一產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之

薑黃

當歸

熟地黃

牡丹皮

厚朴

製

桂心

川芎

續斷

菝仁

白朮

各壹兩

赤芍藥

木香

各柒錢半

羚羊魚屑

貳錢半

右為細末煉蜜丸如梧子大每服參拾丸食前溫

酒下

點破新女姿容夫在性我寒

木暈華如林外夢翻圖去點青鳥愁逐書來黑墨歸未野歸

發驚如驚海神臨華亭素無聲惜深霞夜月濕寒衣卦點春

何能息音息杏甲平輪樹又西風胡旋已斷春雲濃人間流落

無怨結難歸林賦部爽蕪對燃春計替血點守宮莫敢天難

深臺報外卦露瑤則自綿綿水自東金屋有闌闌夷係王書

惠宮醜葉采虛稱二妙俱祇有蕪葭依玉樹初無

味醋王學學醜周水壺四美人圖月影孤壯志未消

入鏡豈留天跡星余衣甘公車未野中舉高

筆耕遊天妙山家宴勤事漁此一長聲熱壯此點青酥閱秦

三雲間快觀冥冥鳳海上愁看點點為經術匡君

百零八

月水不通

大夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷  
血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡  
之間故令月水不通也凡血結月水不通則成血瘕  
水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也  
婦人衝任之脈為經絡之海皆起於胞內而手太陽  
小腸之經手少陰心之經此二經上為乳汁下為月  
水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去  
血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或一歲之  
內而月經不行此是常候即非病也何必通之諺云

妳假是也若半歲而行者或四五箇月便經行者皆是少壯血盛之人注受極易產乳必聚其子失乳必四肢痿癱壯大青筋頭大髮焦好啖泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或恐傷氣血衝任虛氣血衰少而不能行者但服健胃養氣血之藥自然通行若用牛膝紅花蘇木等藥或漆毒蟲水蛭等藥以通之則為害茲大經水枯竭則無以滋養其能行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也後之學者更宜詳審而療之

**薛前證解**



胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯  
皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛  
用八珍牡丹皮仍參前論主之 一產婦月經年餘  
不通內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少  
倦怠胸滿氣壅朝用加味逍遙散夕用四君子湯月  
許諸證稍愈佐以八珍湯兼服兩月而愈  
以上三證宜於調經門中參看通川

瀉利

郭產後腹痛及瀉利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪  
易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於盲膜散於腹  
脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化  
洞泄腸鳴或下赤白胠脇填脹或積久不定急服調  
中湯立愈若醫者以爲積滯取之禍不旋踵謹之謹  
之 陳無擇評曰產後瀉利非止一證當隨所因而  
調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因  
喜怒憂思還從內性况勞逸飢飽皆能致病若其洞  
泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有

滯滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補  
利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若  
久而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損蓋胞  
胎主於任而繫於腎况九月十月乃腎與膀胱所養  
必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之  
劑是損其虛也 一產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多  
肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘  
矣余以為脾胃瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘  
而痊 一婦產後泄瀉兼嘔吐噯酸面目浮腫此脾  
氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而噯酸

服全愈至七月終怠惰嗜卧四肢不收體重節痛口  
舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數洒淅惡寒悽  
慘不樂此肺之脾胃俱虛而陽氣寒不伸也用升陽  
益胃湯而痊 汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米  
弗容時卽泄下如此半月餘衆皆危之或用五苓散  
平胃散病益甚汪診之脉皆濡緩而弱曰此產中勞  
力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也令以  
參苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗湯調服  
旬餘而安

**丹**治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸爲瀉洞

泄不禁下青白黑色用荆芥大者肆伍穗於盞內燒  
灰不得犯油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能  
治大病方名的奇散  
產後泄方

茯苓

川芎

黃芩

白朮

乾薑

滑石

陳皮

芍藥

炒各

右水煎服之

調中湯

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子炮

川芎各壹兩

甘草半兩

右為粗末每服參錢匕水參盞煎至壹盞去滓熱

服

候

右方惟寒中洞泄者宜之其腸胃有熱者當服黃連而愈如如金丸香連丸之類若戊巳丸固腸丸四神丸五味子丸之類皆產後大便不實必用之藥已詳載雜病及前泄瀉門中茲不贅引

# 赤白痢

〔天〕產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為膿血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後虛更久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛痢又有產後氣宇不順而下

乾用黃芩芍藥湯三服而安

熊治產後赤白痢證用四君子湯加黃耆粟殼神効

雲救急散 治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

熟地黄 各壹兩

甘草

當歸 各叁兩

一右咬咀水煎分二服空心飲

天當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產

後血暈崩中久痢 方見血崩

療妊娠血痢用阿膠貳兩以酒壹升半煮壹升頓服

產後諸痢煮薤白食之 又方羊腎脂炒薤白空心



黃連丸 治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連

肆兩

阿膠

蒲黃

梔子仁

各壹兩

當歸

貳兩半

黃芩

黃檗

各貳兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服陸柒拾丸米飲吞

下日三夜一

仲產後下痢虛極白頭翁

甘州阿膠湯王之

勝經

痢重下新  
產虛七者

白頭翁

阿膠

黃連

黃芩

秦

甘草

右以小柴升煮取一升半納膠令消盡溫分三服  
婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心溫  
熟水調下壹錢其者不過五服

產後血虛小便不通疝腹痛用生馬齒莧搗汁二  
大合煮壹沸下蜜壹合調頓服

相梅治產後血泄不禁餘血作痛無塊桂心乾薑等分  
為末空心酒調服方寸匕

大療產後痢日五十行者取木裏蛙蟲糞屑炒黃急  
以水沃之令稠稀得所服之即瘥

聖治產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

渴

產後下痢作渴者水穀之精化爲血氣津液以養

臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣

脾胃既虛不能尅水水自流溢浸漬皮膚則令人腫

但止其渴痢則自瘥薛前證若渴而不喜冷飲屬

胃氣虛不能生津液宜用七味白朮散夜間發熱口

渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸並佐以益氣湯

以滋化源一產婦瀉痢熱作嘔吐痰肌體消瘦

飲食少思或胸膈痞悶或小便脹墜年餘矣余以爲

脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

一產婦患前證形體倦怠飲食不進與死爲隣此脾

胃俱虛也。用四神丸十全大補湯而愈。

必効療產後痢而渴飲無度數。麥門冬酸 烏梅

貳拾 細刺水壹升煮取柒合細呷

經効療產後久痢津液涸渴不止

龍骨拾 厚朴 茯苓 黃芪

麥門冬 人參各捌分 生薑陸分 大棗拾肆個  
並細剉

右以水壹大升煮取柒合空心分兩服

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥古今

冬瓜壹枚 黃泥糊厚伍寸煨爛熟去皮絞汁服之瘥

補遺人參白朮散治產後痢津液竭渴不止方見胎前霍亂

# 大便秘澀

郭產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

薛產後大便不通因去血過多大腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日期飲食數多用藥通之潤之必待腹滿覺脹自欲去而不能者乃結在直腸宜用豬膽汁潤之若服苦參藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能

藥致吐瀉不食腹痛胸痞余用六君子加木香炮薑  
治之而愈 一婦人六便秘澀諸藥不應苦不可言  
令飲人乳而愈

麻仁丸

麻仁 研如泥

枳殼

人參 冬上壹兩

大黃 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下貳拾丸  
未通漸加丸數不可太過

評曰產後不得利者百無一生去血過多臟燥

大便秘澀用酒當滑之大黃似難輕用唯蔥涎調

胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於顛則頭痛神  
不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜  
而氣泄死下結糞如胡椒者十餘枚後漸得通利不  
用藥而自愈矣

**丹**產後祕結不通膨滿氣急坐卧俱難用大麥蘖  
炒黃為末酒下壹合神効出良部

春弄微文無景感驚人息去賞必軍與世時豈茲前圖  
 金谷繁華轉非國白臺樹尚於蘇茶藜向日西風香雪地爽  
 醉椒酒蓋李丸園獨露衣

真謝車門閣條巢育鳳皇人

西風餘餘張之秦育文習麟燿吐盤無齋亦焚聖時承豔樂  
 薄云臨臨寶氣香正雲飛氣望釀章益賤向日和凝瑩燦泉  
 善楚典殿設懸黑悲風飄

翠掛崖曾高皇似奕奕承天頭玄泉照照答望榮裕也似  
 帝乘去駕明南夜夾好我懸懸你我消浪並吞黃首西三氣  
 奈到蒼曠外南夜味李學士籟二首人去釣臺六王海門落日

融冰令氣衣玉絲縑煇文

中間一頁長信書前星蒼蒼滿滿襟鬢風雪悠悠和莫區



大小便不通

大產後大小便不通者，明胃本挾於熱，因產血水俱下，津液燥竭，腸胃痞澁，熱氣結於腸胃，故令大小便不通也。  
薛嘗治一產婦，大小便不通，諸藥不應，將危矣，令飲牛乳，一日稍通，三日而痊，人乳尤善。

桃花散 治膀胱氣滯，血澁，大小便秘。

桃仁

葵子

滑石

檳榔 名等分

右為細末，每服一匙，溫酒下。

療產後大小便不通

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地黃

芍藥

各壹兩  
伍錢

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

通氣散治產後大小便不通亦可用封臍法

見前雜證大便

不通

**心**治婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海

**里**關元三陰交陰谷主之

點蠱蠱蠱蠱白雲已向空中去黃鸞舞聞且不來為聞山禽  
噴雲千丈向蒼苔積露懸天一窺開草樹參森森風雨秋霞

遺尿

產後遺尿若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯為主虛寒加肉豆蔻補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神丸仍佐以前二方

按產後遺尿乃腎氣不固宜五味子丸主之

雜病泄瀉

一產婦大便不實飲食少思或侵晨遺尿此中氣虛

寒脾腎不足用補中益氣送四神丸而痊 一產婦

小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用

六君子湯一劑又用五苓散二劑而痊尋常腸交亦

可用

廣濟療產後遺糞方

取故燕窠中草燒為末以酒調下半盞亦治男子

集驗方 療產後遺糞亦治男子

礬石

枯

牡蠣

煨各等分

右為末酒服方寸匕日三服

補遺療產後遺糞不知出時方

白斂

芍藥

各等分為末

酒服方寸匕

補遺治產後遺糞不知覺可服固腸丸

方見前雜症泄瀉條

華佗云病人臥遺尿不覺者死

淋悶

大產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋 又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血卽流滲於胞中故血隨小便出而爲血淋淋者淋瀝之謂也 三因論曰治諸產前後淋祕其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等爲治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最是產後要藥唯當尋究其所因則不失機要矣 薛

按前證若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源也 一

產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈余以為肺腎之氣虛用補中益氣湯六味地黄丸而痊

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根 捌兩

瞿麥穗

白茯苓 各肆兩

葵子

人參 各貳兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘艸 各壹兩

紫貝 拾枚煨

石首魚頭中石 貳拾枚燒

右剉散每服肆大錢水壹盞半薑叁片燈心貳拾莖煎至柒分去滓溫服亦可為末木通煎湯調下

貳錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散金療產後淋

滑石壹兩貳錢半研通草

車前子

麥子壹兩

右為末以漿水調服方寸匕至貳匕為妙

張不患療產後小便不通淋閉方

陳皮壹兩去白為末空心溫酒調下貳錢一服便通

療卒不得小便方

杏仁拾肆枚去皮尖右炒為末和飲頓服通

療產後淋小便痛及血淋

白茅根

任二兩

瞿麥

車前子

各二兩

鯉魚齒

壹百枚  
為末

通草

參二兩

冬葵子

貳分

右水貳升煮取壹升入魚齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產臍中填可與臍平却用葱白剝去麤皮拾餘根作一縛切作一指厚安臍上用大艾炷滿葱餅子大小以火灸之覺熱氣直入腹內即解便通神驗不可具述

乳  
集



小便數

大夫產後小便數者乃氣虛不能制故也 薛前卷

若因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝者用八珍湯

以補氣血若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若

膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎 一產婦小便頻

數時復寒戰乃屬脾肺虛弱用補中益氣湯加山茱

山藥為主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱晡熱盜汗

自汗月水不調用知味逍遙散而安 一產婦患前

證吐痰發熱日晡作渴此膀胱陰虛用補中益氣湯

以六味丸而愈又患麻後小便頻數手足俱冷屬陽

產後小便數

氣虛寒用煎湯及入味丸而瘳

桑螵蛸散千金治產後小便數及遺尿

桑螵蛸益治夜尿

鹿茸酥炙黃芪各等分

牡蠣煨人參

厚朴剉赤石脂各等分

石為末空心粥飲調下貳錢外臺無厚朴石脂有甘草生薑

括婁湯集驗療產後小便數兼渴 桑螵蛸 甘草

並黃連各貳生薑各貳括婁根各貳人參各貳大棗伍拾

右細切川水柒升煮貳升半分三服忌豬肉冷水

補遺療產後小便數或遺尿 益智仁為末米飲調服

小便不禁

陳婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時。丹嘗

見收生者不謹損破產婦尿管致病淋瀝遂成廢疾

一日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者

宜可補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脉虛甚予曰

難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補因以

參芪為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以

豬羊胞中湯極饑時飲之但劑小率用壹兩至一月

而安蓋令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

喬町婦人產後尿不禁面微浮略發熱于午後此勝

脫為坐婆所傷

黃芪

歸身尾

芍藥

各壹錢半

白朮

壹錢

人參

陳皮

各伍分

甘草

多少許

石水煎熟服之

薛前證若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸一產婦小便不禁二年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣虛血熱用加味逍遙散為主漸愈佐以六味地黃丸而痊後因怒小便自遺大便不實左目頓緊面色頓赤仍用前散佐以六君子湯以清肝火生肝血

培脾土而痊

廣濟療產後小便不禁 鷄尾毛燒存性酒調下壹

七日三服

千金治產後遺尿不知出

白薇

芍藥 各等分

為末酒服方寸匕日叁

又方

桑螵蛸

半兩炒

龍骨

壹兩

右為末食前粥飲調下貳錢

固脬散治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

又方 用滑石研髮灰分等每服壹錢地黄汁調下

崔氏方 療產後血滲入大小腸

蜜壹大合 車前草搗汁

右相和煎沸分兩服

補遺方治產後小便出血

川牛膝去蘆水煎服

又方

生地黄汁半升生薑自然汁壹合

右相和服之

胡升麻大凡病久或元氣虛弱見病百端皆因脾胃  
虧損內真寒而外假熱但用六君子或補中益氣加  
炮薑溫補脾氣諸證悉退若四肢畏冷屬陽氣虛寒  
急加附子病因多端當臨證制宜庶無誤矣 一產  
婦糞後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣  
虛弱用補中益氣加吳茱炒黃連五分四劑頓止但  
怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而痊 一婦人  
但怒便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痞悶此木  
乘上用六君子加山梔柴胡而愈又用補中益氣加味  
逍遙二藥而不復作 一婦人久下血在糞前屬脾

黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃 一斤

吳茱萸

兔絲子 各壹兩半

蛇床子 一斤

右每服肆錢水壹碗煎數沸瀝滓洗玉門日再洗

煨法

單炒蛇床子乘熱布裏熨患處亦治產後陰痛

當歸散 治陰下脫

當歸

黃芩 各貳兩

芍藥 壹兩錢半

蝟皮 燒存性 半兩

牡蠣 煨貳兩半

為末每服貳錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重



丹溪

一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手

帕下有帕尖約重壹斤予思之此因胎前勞乏傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞了急與炙黃芪半錢人參壹錢白朮伍分當歸壹錢半升麻五分三貼連服之卽收上得汗通身乃安但下喬沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脉皆瀉左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮壹錢生薑壹片煎二三貼以養之

一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二岐

其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂

產後陰戶不開

文并五

百三

用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來  
曰服二次後覺響一聲視之已收陰言訖但因經宿  
乾着席上破一片如掌心大在席其妻在家哭泣恐  
傷破不可復生予思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破  
尚可復完若氣血充盛必可生滿遂用四物湯加人  
參與一百貼三年後復有子 治子宮下用黃芪壹  
錢半人參壹錢當歸柒分升麻叁分甘草貳分作一  
貼水壹鍾煎至伍分去滓食前服却用五倍子末泡  
湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥永不下

**薛**玉門不閉氣血虛弱也用十全大補湯腫脹癢痛

肝經虛熱也加味道遙散若因憂怒肝脾氣血傷也  
加味歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯  
一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補加五味子  
數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門  
閉一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒  
熱作渴嘔吐不食外敷大黃等藥內用驅利之劑腫  
及於脣諸證蜂起此真氣虛而邪氣盛也先用六君  
子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不數劑而全  
愈一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少  
胃朝寒暮熱自汗盜汗半年矣用補中益氣湯加茯

千金方

蒲黃

叁升

水銀

壹兩

二味研勻以粉上

又方 肥豬肉拾斤水壹碩煮水浸冷即易不過三

兩度

洗搨湯方

甘草

乾漆

各壹兩

黃芩

乾地黄

當歸

芍藥

各壹兩

龜甲

伍兩

右細切以水柒升煮耗一半以綿帛內湯中以搨

瘡處良久即易日二度每搨湯可人行十里許即

裏乾捻取甘濕散薄傅瘡上使遍可經十日又以

之

又方 平胃散加貫衆末每貳錢熟煮豬肝拌藥內

陰戶中

障双靈與醮莫双論與顯翅月無念一卦今困革盡手安武一卦疾

草草吾人謝畏泉雷此天顯南北東西吾莫然

大星五天小星著姓更點點之画前車吏攀遠阿土嶼計入

山有雲天星

高千五雷對公千之恩向日晒

公千姪奔白彌藥公千豈姪即日殺雁泉謝父云致隆其首

任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱而多疾  
三因產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不  
行者有血少氣弱溢而不行者虛當補之盛當踈之  
盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用煉成鐘乳  
粉豬蹄鯽魚之屬藥可見矣薛前證若氣血虛弱  
而不能化生宜壯脾胃怒動肝膽而乳腫汁出宜清  
肝火夫乳汁乃氣血所化在上爲乳在下爲經若屢  
產無乳或大便澀滯當滋化源

盧散

療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯

妳乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內

虛者  
藥之

消乳汁通行

漏蘆

貳兩半

蛇蛻

拾條

瓜蒌

拾枚急火燒焦存性

右為末溫酒調下貳錢無時候服藥後即以豬蹄

羹投之經驗方有牡蠣燒存性

一方只用牡蠣

煨末酒調

又方

葵菜子

炒香

縮砂仁

各等分

右為細末每服貳錢熱酒調下滋益氣脈榮衛行

津液上蔡張不愚方常用極有驗

產寶療產後乳無汁方

穿山甲

洗淨壹兩  
灰炒燥

為細末酒調服方寸匕

必用方云漏蘆括萋皆要藥或云多食豬蹄

萋取子淨洗炒令香熟槌破取仁瓦上攤過令白

色研為細末溫酒調下壹錢服了合面卧少時未

効再作一方瓜萋壹枚熟搗以白酒壹斗煮取肆

升去滓溫飲壹升日叁

成煉鍾乳散

療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕

少

成煉鍾乳粉

研細

濃煎漏蘆湯調下貳錢

靈苑下乳汁立効方

磨者  
補之



瓜蒌根

薄荷葉身等分

右爲粗末先喫羊蹄汁壹碗次服藥後再喫葱絲  
羊羹湯少許出効

有人乳汁不行已十七日諸藥無効遇有人送赤豆  
一斗遂時常煮粥食之當夜乳脉通行

又方 麥門冬不拘多少去心焙爲末以酒磨犀角  
約壹錢許煖犀角酒調服冬末貳錢服之不過兩  
服乳汁便下

乳汁自出

因產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之

若乳多温滿急痛者温帛熨之產實有是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可

存未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經事未嘗論及

薛前證氣血俱虛用十全大補湯加熟用加味

逍遙散肝經怒火用四物參朮柴胡加味

味歸脾湯一產婦勞役怒思脾虛怒用加

陽氣虛而厥也灌以獨參湯而愈更以十全大補湯

數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹

痛增寒發熱用芩麥牙一二三兩炒熟六煎服立消其耗

散血氣如此

消方中多用之

漏蘆散 見前

次妳

天產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通  
乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通  
傷結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不  
急治腫甚或癰產後吹妳最宜急治不爾結癰速至  
死者速服魚散括婁散傳以天南星散以手揉之  
則散矣 詳前 證用藥切不可損其氣血餘詳外科

乳 除

散方

麝香 壹錢研

括樓實 壹个

研勻溫酒煎服

天 懸壘散

南星 爲末

溫湯調以鷲翎蘸塗患處

皂角散 歌曰

婦人吹妳治如何皂角燒灰蛤粉和熱酒壹杯調

捌字須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛

百藥煎爲細末每服叁錢酒壹盞煎數沸熱服

乳硬作痛

嫩桑葉生研以米飲調攤紙花貼腫處

補遺治產後吹妳結實腫痛

用陳皮 壹兩

甘艸 壹錢

水貳碗煎至壹碗分兩服

次用荆芥羌活獨活煎湯熏洗即散

妬乳

夫妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹  
捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大  
渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺便知以手捋  
捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱  
勢盛必成癰也 輕則為吹乳妬乳重則為癰雖有  
專門不可不知

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝

葵莖及子

右壽節為散酒服方寸匕即愈

又方 雞屎乾為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方 皂角拾條以酒壹升採取汁消石半兩煎成

膏傅之

療乳腫將次結成癰方 右以馬溺塗之立愈

補遺療產後吹妳妬妳但未結成癰或成癰未作有

膿者

蔓荊子搗爛酒服仍以滓敷患處

又方用赤小豆酒研爛溫酒服滓封患處

痞悶

郭問產後口乾痞悶者何答產後榮衛大虛血氣未  
定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃腕上熏胸  
中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅  
滯以藥下之萬不得一但服見覲丸則愈 陳無擇  
評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂  
煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調  
之可也心煩宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外  
傷燥熱看屬何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷  
見覲丸却能作効

薛前證若宿食停滯用六君枳

外瘡  
之  
瘡

又方仙人掌草壹渥小酒糟壹塊生薑壹大塊同研爛入桂末少許炒酒服留滓菴患處

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫為長百種療不差者動經年片名為妬乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傳以黃芩漏蘆散黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯

槲皮叁升切

右以水壹斗煮伍升夏冷用秋冬

溫之分以洗乳



白茯苓

甘州 各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服如頭乾  
便秘者加大黃參錢

羅氏湧泉散 治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬 去心

龍骨

穿山甲 炮黃

王不留行 各等分

右為細末每服壹錢熱酒調下後吃豬蹄羹少許  
又用木梳於左右乳上各梳叁拾梳日三服依

前法

又方治妳汁少

產後乳少

大井五

百七三

粳米

糯米

各半合

藜苳子

壹合並淘淨

生甘草

半兩

用水貳升煎汁壹升去滓分叁服立下

又方

豬蹄

壹隻

通草

肆兩

水壹斗煮作羹食之妙

薛一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴  
余謂血氣虛以玉露散補之而愈

玉露散

治乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大

便澁滯等證

川芎

桔梗

白芷

各貳錢

芍藥

當歸

各壹錢半

人參

產後  
土瓜根

漏蘆

各叁兩

甘艸

貳兩

通草

肆兩

右水捌升煎取貳升分温叁服忌如常法

方

加桂心並為末酒服方寸匕

產書下乳汁

土瓜根為末酒調服壹錢日三四服

下乳汁以京三稜叁個水貳碗煎取壹碗洗取汁下

為度極妙

湧泉散

成都教授單驤方療產乳無汁亦

癰腫

# 乳少

天凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱  
不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之乳無入  
若乳盈溢可潑東壁上佳或有產後必有乳老留  
脹而產後譽作者此年少之人初經產乳有風熱  
須服清利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液  
故也須服滋溢之藥以動之若雖有乳却又不甚多  
者須服通經之藥以動之仍以羹臠引之蓋婦人之  
乳資於衝脉與胃經通故也有屢經產而乳汁常多  
者亦婦人血氣不衰使然也大抵婦人素有疾在衝

穢

狼牙 參兩

右咬咀以水肆升煮取半升去滓內苦酒如雞子  
中黃大沸湯壹盃消盡夜適寒溫以綿纏筋頭大  
如繭濡湯以瀝瘡十日四五度即瘥  
補遺治產後陰戶生瘡

青黛

黃丹

水粉

五倍子 等分  
為末

用賣肉鋪上拭肉巾燒為末和前藥先以荆芥薄  
荷栢葉煎湯洗淨後摻藥如瘡乾可用油調末塗

下部訖然後成樂如碁子安竹管裏吹入下部中  
亦用再度老少重減其熏法每日壹度不用再為  
之良

療疳蟲蝕下部

五臟方

取桃東南枝叁柒枚輕

搥頭使散以

糲之又搥石硫黃為末將此綿纏

桃枝撚轉之

末少厚又截壹短竹筒先內下部

中以所撚

枝熟燃熏之

文仲療陰蝕欲

益者方

以蝦蟇兔屎等分為末傳

之良

狼牙湯

古今錄驗

療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓臭

湯搨搨訖如前傳藥 余家婢遇此疾醫瘡不差

蝕處作兩瘡深半寸余因檢得此方仍以自處蟬

蛇膽散不經七日瘡乃平復甚効凡治數十人應

手而瘡請廣布之

甘濕散 又名蟬蛇膽散 療疔蟲陰蝕

蚶蛇膽 真者 青木香 石硫黃

鐵精 名肆分因物分之多少入 藥香 綠麝香辟蛇毒若先以相

和蛇膽即無力也善 用五月五日發藥

右陸味各等分爲末更細研有患取如三棊子和

井花水日再服訖走令復利了即以藥方桃枝熏

陰蝕

大凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰蠹瘡  
或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由  
心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡  
皆屬於心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當  
補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可

薛前證乃

肝脾鬱結之證木旺生蟲耳宜解鬱清肝備見前雜  
證陰中生瘡類 一產婦素有肝火患此內潰痒痛  
食少熱渴小便淋瀝用加味逍遙散加味歸脾湯兼  
服間以蘆薈丸外以鶴虱草煎洗而愈



翠

東婦人胞胎門落頰不收常濕

神關

玉泉

伍拾壯

身交

臍下指縫中灸伍拾壯參報

又法

玉泉傍開三寸

隨灸

年壯參報

女人陰門冷腫

飯來

參拾壯

甲婦人陰挺出四肢淫灤身悶少海主之

一作照海

**陰中肉線**

一婦產後水道中出肉線壹條長三四尺

動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑叁斤研

爛入清油貳斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于

水道邊以前薑熏之冷則熨之一日夜縮其大半二

日即盡入再服失笑散尋歸湯調理之如肉線斷則

不可治矣

一法用鐵精羊脂二味攪令稠布裏炙熱熨椎內之

鐵精是鍛鐵爐中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨器皿者

子母療產後陰下脫燒兔頭末傅之

補遺治產後生腸不收 用枳殼煎湯浸良久即入

又方五倍子白礬煎湯浸亦良 又方酸篤草俗

名老鷓酸煎湯用草坐不開孔纔薰收一半稍温

下手洗並收入而安

又方子宮脫出以温水洗軟却用雄鼠糞燒烟熏入

又法革麻子拾肆粒去殼搗爛塗頂心如入即洗

去

苓半夏膿水漸少飲食漸進又用歸脾湯共五十餘劑而愈 一產婦玉門不閉小便淋瀝腹內一塊攻走脇下或脹或痛用加味逍遙散加車前子而愈 一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類豬肝面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍復生育

婦

治產後陰腫下脫內出玉門不閉

石灰

壹升炒極熱

湯

貳升投灰中適溫冷澄清坐水中以浸玉門斯須

平復如故

又方以鐵精粉上推內之

又灸臍

下橫紋伍柴壯

六編

陰脫產門不閉

三因婦人趣產勞力努嘔太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃

烏賊魚骨

各半

五味子

貳錢半

若為末摻患處

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁

粘礬

五倍子

各等分

右以下二味為末研桃仁為膏拌勻傅之

產後 大便出血

女科五

卷五

婦科

百十

所染疾傳曰曰節節思諷疊出繼對音變若念誰而自  
 探象亦望之昔疑為麻山中人出其為文章奮筆駢豔  
 隨表冒起銀目瑩收雷巖面收水正而看收我代然毒  
 疎罕罕五十大百文集四十卷感之骨器青妙麻計開  
 世大典書友並奏茲得幾轉意以餘林直學士台莫不  
 習間鼓瑟餘林直學士謝對李章閣承旨學士節對監  
 書編著并將太常暨對對監聖泰玄開斜餘林直餘天  
 余嘉賀刻播車轉太常對一對我盟餘國史身史烈公  
 聚煖異之衣薰衣陣對餘林國史刻監節官報中書對  
 所字瑞之類附入主百異賀并為文續收節皆皆救繼

李學士

海魚翻空海波赤曉色欲上扶桑難人間之

胃虛寒元氣下陷用補中益氣湯加連炒吳茱一錢  
數劑稍緩乃加生吳茱五分數劑而愈  
一婦人產後便血口乾飲湯胸膈膨滿小腹悶墜內  
食不甘體倦面黃口暈則赤洒淅惡寒此脾肺氣虛  
先用六君加炮薑木香諸證漸愈用補中益氣將愈  
用歸脾湯全愈後飲食失節勞役怒氣發熱血崩  
夜間熱甚譫語不絕此熱入血室用加味小柴胡二  
劑而熱退用補中益氣而血止用逍遙散歸湯調  
理而康

大便下血

薛產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣  
損陽絡外傷治法若因膏粱積熱用加味清胃散若  
因淳酒濕毒葛花解醒湯若因怒動肝火六君加芍  
藥柴胡芎歸若因鬱結傷脾加味歸脾湯若因思慮  
傷心妙香散若因大腸風熱四物加側柏荆防枳殼  
槐花若因大腸血熱四物加芩連若因腸胃虛弱六  
君加升麻柴胡若因腸胃虛寒六君加肉蔻木香若  
因元氣下陷補中益氣加茯苓半夏若因氣虛用六  
君升麻若因血虛用四物氣血俱虛用八珍俱加柴

小便出血

天產後小便出血者因血氣虛而熱乘之血得熱則  
流散滲於胞內故血隨小便出薛一產婦尿血面  
黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味道遙補中益  
氣兼服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血  
仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑於衆論服犀  
角地黃湯諸證復作仍服前湯而愈

治小便利血方

亂髮湯洗垢  
膩淨

右燒研為末米飲調服方寸七



黃絲絹

自然黃者其黃者不用  
煮極爛以水洗去灰冷淨入黃蠟半

兩蜜壹兩白  
錢馬屁劫末

右用水貳升再煎至壹盞空心頓服服時飲氣服

之不得作聲如作聲無効

補遺補脬飲 治產後傷動脬破終日不小便但淋

濕不乾

生絲絹

黃色者壹尺

白牡丹根皮木

白芨

各壹錢

用水壹碗煎至絹爛如飴服之勿作聲作聲無効

雞內金散

治產後溺床失禁

以雞胫脰壹具并腸洗燒為末酒調服方寸匕

臘茶為丸復以臘茶下之必通

予常用局方四物湯以生地黃易熟

地黃加青皮去白煎服甚効

本事婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便

秘故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當用紫蘇子

大麻子二味各半合洗淨研極細用水再研取汁壹

盞分二次煮粥啜下此粥不唯產後可服大抵老人

諸虛風秘皆宜服之嘗有一人母年八十四忽爾腹

痛頭疼惡心不食召醫數十議皆用補脾進食治風

清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶余辨

說前藥皆誤矣此證正是老人風秘藏腑壅滯聚於

止必成敗證若虛火燥用加味逍遙散氣血俱  
虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類 一產婦  
大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所  
入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十  
一日腹滿欲去用豬膽汁潤之先去乾糞五七塊後  
皆常糞而安 一產婦大便八日不通用通利之藥  
中脘作痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用  
蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六  
君加吳茱肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然  
多致不起 一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等

食之甚佳

**經**治產後胎前痢疾敗龜甲壹枚米醋炙研為末醋

湯調下

丹溪云龜甲大補陰治勞倦

**丹**婦人患墮胎後膈滿食少痢不止脉虛左手尤甚

滑石

白芍藥

炒

蒼朮

各伍錢

白朮

貳錢五分

訶子

貳錢煨

乾薑

肆錢

茯苓

壹錢

右為細末調下保和丸肆伍拾粒

**雲**產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼

等藥

痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者瀉之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性清執者不能寬解須當順其氣未有不安者也

其論詳見瀉利

一產婦食雞子腹中作痛面色青

黃服平胃二陳更下痢腹脹用流氣飲子又小腹一

塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中益氣加木香吳茱漸愈又用八珍大補兼服調理尋愈

一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒

熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脉大無力口

參茸神天假假曹三千師士吞陰開雲開鳳開星氣並山共

冠王繼學參翅後上備奏遊

又南去天我味望意收師

無血紫繼學味以交雨生青草並無味風味白如眼日扁舟

十平帝里共與既既對悲端事幾多干竹首繼繼太史雨蘇

留民應然意慨學士

僅薰慕只然齋觀如青林

刻吏以春紫翠餘卷兩畫并生火齊然雲蒸千香然日轉香

陣舞贊祝之宮去首具蘇魚白銀酒天上姑入縷交附或盪

遊素果山至盤之騰皇

墨鉢字空寶芸窗今外林

魚譜則中中公公輪鱗魚正禪內峯耗龍對驗陰前後亦下

愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康  
瀉利年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛  
日吐痰三碗許脉洪大重按全無此命門火衰  
虛寒而假熱吐痰者乃脾虛不能統攝歸源也  
用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而脾胃  
健一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不  
進與死為鄰此脾腎俱虛用四神丸十全大補湯而  
愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯而康  
一婦人五月患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒用六  
君子湯送香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四

產後  
女科五

薛產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛

不能消食當審而治之若米食所傷用六君加穀蘖

若麵食所傷用六君加麥蘖若肉食所傷用六君加

山查神麴凡兼嘔吐皆加藿香若兼噯酸或嘔吐用

前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮

薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣

下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾

土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六君子加

木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若屬

命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便



誰能更買高良向東

缺會入美宮曲水刺臺林色裏小山叢林月明中姑入燕兒

四到示龍卵界空平主裏臂竟龍華早映銀首為秦贊到學

酒工夏支入具寄

富貴者成夢不礙興白為妙多

前陣甜蕊濕蔓草無有風濤云黑憐秦燕亦月並隨銀入間

蘇子固前製虫蟲中京林色連關所俗臨姑園對心事恐難

永榮對古

映弓收昧問已信閑今女北窗

葉或平致鄭工千里營主觀懋令十無何昔德茲動何味

天上同豆莫雙乘鰥九日蘇南律蘇蘇直宜查率林

送蘓前制時史之南臺

劑血更如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味逍遙文調理而安

琥珀散

治產後經脉不調四肢煩疼飲食全少日

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生乾地黄

當歸 各壹兩

桃仁

赤芍藥 各半兩

右為粗末每服參錢米壹盞薑叁片煎至陸分去滓服

薑黃丸

治產後虛乏不足胸心短氣腹內緊急腰

背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

芎藭酒

治產後崩中下血不止

芎藭

壹兩半以

酒貳盞煮取壹盞去滓分温三服食前

瑞蓮散

治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮

百枚燒存性

棕櫚

燒存性

當歸

桂心

各壹兩

鯉魚鱗

燒

川芎

各柒錢半

檳榔

壹枚

右為細末每服叁錢煨薑酒調下如未止更進一

服或非時血崩無藥可治但進三服即止

補遺治產後血崩

香附子

炒赤貳兩

蓮蓬殼

伍枚燒存性

右為末米飲調下貳錢

產後血崩素有熱者奇効四物湯良

萬亮

痞芤窮湯肝火血妄行加味道遙散脾鬱不統血加

味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷

血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殼

一產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如

湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用六君加炮黑

乾薑四劑稍愈又以十全大補三十餘劑而痊一

產婦血崩因怒其血如湧仆地口噤目斜手足抽搐

此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸證悉退但

食少晡熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈

人參 壹兩 為末

蘇木 貳兩

右以水兩碗煮取蘇木壹碗以下去查調參末隨

時加減服神効

表 旋覆花湯 治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐卧

不寧

旋覆花

赤芍藥

荆芥穗

半夏麴

前胡

甘草 炙

茯苓

五味子

杏仁 去皮尖 麩炒

麻黃 各等分

一方芍藥茯苓多一倍

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑五片棗壹枚煎

旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎  
湯調下傷食宜服見晁丸五積散芎藭湯

**薛前證**

若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若  
中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更  
加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲 一產婦喘

促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參

附湯四劑而愈 浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬

產後二月洗浴卽氣喘但坐不得卧者五個月惡風

得暖稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不効用牡丹皮

菴仁桂枝茯苓乾薑枳實厚朴桑白皮紫蘇五味瓜

簾櫳長鎖京  
春光銷索  
曲本

錦瑟無端  
一柱絃絃  
身襟帶  
不用黃金  
盡玉

曾遊秦  
月長承  
恩曾得  
侍昭陽  
檀槽  
按出新  
翻曲  
五色

雙芥春  
鳥百芬  
香大  
家出  
豔  
交  
京  
一曲  
六  
公  
天  
上  
譜  
我  
王

李宮人  
琵琶  
作  
氏  
首  
詞  
賜  
香  
莫  
對  
琵琶  
思  
往  
事  
聲  
聲

青天何  
蕙蕙  
北  
中  
豔  
一  
懸  
大  
直  
本  
來  
即  
對  
心  
安  
所  
良

一懸天

桃帶露  
嘗  
莫  
道  
仙  
凡  
便  
成  
隔  
時  
時

昨大  
根  
白  
露  
聽  
風  
蕭  
蕭  
書  
小  
劉  
不  
可  
良  
翁  
來  
藉  
小  
鼠

小劉氣

自  
看  
共  
蒼  
蒼  
太  
平  
傳  
得  
黎  
園  
譜  
似  
說

奇  
云  
不  
為  
牽  
何  
用  
非  
正  
面  
聽  
立  
賞  
春  
朝  
水  
燕  
芬  
其  
其

正  
面  
子  
化  
如  
鼓  
漫  
悲  
傷  
貞  
元  
朝  
士  
仍  
多  
在  
應  
笑

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服

集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘

甘草

苦梗

各壹兩半

款冬花

壹兩

生麥門冬

生地黄

各叁兩

葱白

壹握

豉

貳合

舊方無葱白與豉

右吹咀水貳升煮取捌合去滓食後分兩服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡

五味子

紫苑

貝母

各壹兩半

桑白皮

茯苓

各貳兩

淡竹葉

貳拾片



丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香

白豆蔻仁

各半兩

伏龍肝

壹兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下壹錢如人行五里再服

石蓮散

見嘔吐

產寶療產後吃逆三日不止欲死方

桂心

半兩

薑汁

叁合

右同煎取貳合以大火炙手摩背熱時塗藥汁盡

妙

治產後吃逆方

用乾柿壹枚切碎以水壹盞煎至

產後 女科 五

石蓮子 去殼壹兩半 白茯苓 壹兩

丁香 伍錢

右為細末米飲調服參錢無時

內熱嘔吐服前藥不効者以枇杷葉 去毛蜜炙 茅根各伍

錢煎濃湯入蘆根汁半盞和勻服

生者 一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰  
降火肌體日瘦飲食日少前證愈甚余曰早間吐痰  
脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也  
遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調理  
而痊

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜  
服此

訶子肉 壹兩半

人參 壹兩

甘草 半兩

右三味為細末別以半夏半分生薑壹分蘆白

柴莖水壹大盞煎至陸分去滓分為兩服

補法而用辛散或用平補之劑必致不起  
吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑  
為主佐以越鞠丸而嘔酸愈又用補中益氣加茯苓  
半夏而脾胃康

白朮散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘紅

麥門冬 去心

乾薑

人參

各壹兩

甘草

半兩

為粗末每服肆錢水壹盞生薑伍片煎去滓溫服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參

白朮

當歸

青皮

乾漆

炒烟盡各  
柴錢半

大黃

桃仁

去皮尖

三稜

煨

玄胡索

鼈甲

酥炙

厚朴

製各壹兩

右為細末煉蜜和丸梧子大每服參肆拾丸

用温酒送下

赤芍藥

各等分  
生地黄汁

山芩

當歸

去蘆

葶藶

四轉婿 欲至外寒血不消黃藥并與心製化歸

本為味末空心盛西國類有疑心

半葶州黃

壹兩

烏翅魚骨 續斷

一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛則皎  
白脉浮而濇余謂此肝氣虛而血弱也不信乃用破  
血行氣痛益甚轉動無常又認以爲血鼈專用破血  
驅逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益信爲鼈確服下蟲  
等藥去血甚多形氣愈虛肢節間各結小核隱於肉  
裏以爲鼈子畏藥而走於外余曰肝藏血而養諸筋  
此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節胸項皆屬肝  
膽部分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用  
八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈 一婦月經  
不調兩拗腫脹小便澁滯腹中一塊作痛或上攻

玄參

芍藥

白欬

防風

射干

大黃

杏仁

甘草

各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服

療產後婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜蒌

壹箇半 生半炒

大粉草

壹寸半 生半炙

生薑

壹塊半 生半炙

右同剉用酒壹碗煮取壹盞去滓服之其痛一會

不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側

卧於床上令其藥行故也

療產後吹乳作癰

產後吹乳

不詳

重