

醫  
西  
林  
一  
致

醫林一致

暨陽駱登高萊飲甫一字恒園輯著

門人

丁有

曾象辛光孔章

甫編定

胡世

安文思昌予延

甫叅閱

男 駱以文來菴甫校訂

腫脹

脹之爲患也。有水與氣。食與鼓。蟲與血之分焉。水脹者。少火衰微。不能溫養脾土。脾土虛寒。水停腸胃。不由中道。漸滲膈外。布散四肢。此水脹之所由成也。其現證也。目窠目下上微腫。如新臥起之狀。皮薄色澤。其頸脉動時欬。陰股間寒。腫則自下而上。或

腫有分界。按之隨手而起。氣脹者。天氣六淫。人身五賊。襲於胃中。胃既受傷。氣不運行。散漫腸胃。併及肌膚。此氣脹之所由成也。其現證也。皮厚色蒼。或一身盡腫。或自上而下。按之窅而不起。小便不利。食脹者。飲食過度。以致傷脾。脾傷則不能運化。積其穀氣。散而爲腫。此食脹之所由成也。其現證也。不欲食。通腹

皆實。鼓脹者。胃氣過盛。

氣脹者多由于氣虛。鼓脹者多由于氣實。

或因怒鬱。或因痰

滯。氣道壅塞。橫行百骸。此鼓脹之所由成也。其現證也。腹皮細急。彈之有聲。旦食而暮不能食。小便亦不利。手足倦怠。蟲脹者。嗜酒耽辛。肥甘炮炙。濕熱之氣薰蒸腸胃。化而爲蟲。久則毒氣散漫。此蟲脹之所由成也。其現證也。思食異味。饑則煩而飽則

否。血脹者。怒氣盛。則血菀於營。有所思則敗精留血。滯於少腹。或菀或滯。皆能壅塞血道。血道既壅。則肌膚之血不能流行。此血脹之所由成也。其現證也。少腹實。大便難。小便自利。血脹之證。婦人更多。在女科有氣分與血分之殊。氣分者。心胸堅大而病發於上。先病腫脹而後經斷。血分者。血結胞門而病發於下。先因經斷而後腫脹。若夫女人腹脹。內生瘕肉。初如卵大。漸長如子胎狀。按之則堅。推之則移。月事以時下者。名曰腸覃。此非血病。皆由汁沫所聚而生也。若推之不移。月事不以時下者。名曰石瘕。此留血也。是皆可下之證。至於腹滿而痛。有形有塊。按之而痛移者。氣與火也。痛不移者。食與血也。不移而惡食者。食

也。不惡食者血也。此段兼男女而言。凡諸證候。陰陽虛實。不可不辨。大

抵陽證必熱。熱者多實。陰證必寒。寒者多虛。急速驟至。成於數

日之間者屬實。日積月累。成於經月之後者屬虛。先脹於內而

後腫於外者為實。先腫於外而後脹於內者為虛。小便黃赤。大

便秘結為實。小便清白。大便溏泄為虛。滑數有力為實。弦浮微

細為虛。色紅氣粗為實。色粹氣短為虛。察其實者。直清陽明。反

掌收功。苟涉虛者。溫補脾腎。漸次康復。所謂塞因塞用也。初服則劇。久服則通。其

有不大實。亦不大虛者。先以清利見功。繼以補中調攝。如大便

不通而精力未衰者宜下。膈間痰壅而脈猶有力者宜吐。暑月

無汗而肌膚色澤者宜汗。小便短赤而便時溫熱者宜利。先喘

而後脹者治在肺。先脹而後喘者治在脾。要而言之。諸經皆有  
腫脹。而其要綱。則皆脾肺腎三經。蓋脾土主運行。肺金主氣化。  
腎水主五液。凡五藏所化之液。悉屬於腎。五液所行之氣。悉屬  
於肺。轉輸二藏以制水生金者。悉屬於脾。故腫脹不外此三經  
也。若分而言之。上焦脹者屬氣。治又宜在肺。中焦脹者屬物。治  
又宜在脾。下焦脹者屬水。治又宜在腎也。

### 膚腫

吳鶴臯曰。凡腫不拘何所。痛者爲實邪。不痛者爲虛邪。腫而赤  
者爲結熱。不赤者爲留氣。

### 死候

凡腫脹四肢不腫。但腹脹者名曰單腹脹。難愈。水腫先起于

腹。後散於四肢者可治。先起於四肢。後歸於腹者死。身熱

者死。寒熱如瘧者死。便血者死。大便泄而腫不消者死。

陰囊及莖腫腐者死。

五傷者死。

唇黑或腫肝傷。缺盆平心傷。臍突脾傷。足心平腎傷。

背平

肺傷

腫脹門方

大安丸

治飲食傷脾  
致成脹者

山查肉

二兩  
炒

白朮

神麴

炒

半夏

製

茯苓

各一兩

陳皮

去白

連翹

蘿蔔子

生用各  
五錢

雞矢醴散

治血  
蟲

大黃

酒潤

桃仁

雞屎

白者酒炒  
各等分

為末每服三錢薑

湯下

導水茯苓湯

治遍身腫喘滿小便秘澀  
諸藥不效者用此即愈

赤茯苓

麥門冬

澤瀉

白朮

各三兩

紫蘇

桑白皮

檳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁



木香 各七錢五分

俱為粗末每服五錢

燈草二十五根水二鍾煎八分連進三服小水漸利

敷藥 治腹滿如石或陰囊腫大先令病人嚼甘草數錢後用敷藥

大戟 芫花 甘遂 海藻 各等分

俱為細末用醎醋調

麵和藥攤於棉紙上覆貼腫處仍以軟綿裹住

舟車神祐丸 去一切水濕痰飲如神

甘遂 芫花 大戟 俱醋炒各一兩 大黃 二兩

黑牽牛 頭末四兩

青皮 陳皮 木香 檳榔 各五錢 輕粉 一錢

俱為細末水丸如椒目大空心服五丸日三服 痞悶者

多服反煩滿宜初服二丸每服加二丸快利為度 戴人

每令病者先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當下種病出輕者一二度重者五六度方愈藥雖峻急爲效甚速弱者當依河間漸次而進實者以戴人治之

### 大聖濬川散

大黃

煨

牽牛

取頭尾

郁李仁

各一兩

木香

芒硝

各三錢

甘遂

五分

俱爲末薑汁調服戴人每言舟車丸必以濬

川散繼之

### 雞矢醴法

羯雞尿

白者八合

炒微焦無灰好酒

二碗

煎至碗半瀝取汁

五更熱服則腹鳴辰巳時行三二次黑水次日足有縐紋

又飲漸縴至膝上而愈

禹餘糧丸

治水脹之聖藥

蛇含石

大者三兩鐵銚盛燒通紅傾入醋中候冷取出研極細

禹餘糧石

二兩

真針砂

五兩淘淨炒乾用醋二鍾同餘糧銚內煮乾更用銚并藥燒紅傾淨磚地上候冷研極細

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝

酒洗

白荳蔻

桂心

大茴香

炒

蓬朮

炮

附子

炮

乾薑

炮

青皮

京三稜

炮

白蒺藜

當歸

酒洗各五錢

爲末入前三味拌

勻蒸餅丸如梧桐子大食前白湯下三十九至五十九虛

老俱可服最忌食鹽一毫入口發疾愈甚服藥後卽於小

便內旋去不動藏府每日三服更以溫補之藥助之真神

方也

椒仁丸

治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化為水

椒仁

甘遂

續隨子

去皮研

附子

炮

郁李仁

當歸

黑牽牛

炒

五靈脂

研

吳茱萸

玄胡索

各五錢

芫花

醋浸一錢

石膏

二錢

膽礬

信砒

各一錢

蛭青

十枚去頭翅足米炒

蟹螯

十枚製同蛭青

俱為末糊丸如雞豆大每服一丸橘皮湯送下藥雖峻利

所用不多畏而不服有養病害身之患

五皮飲

治脾肺不能行運氣滿皮膚水停不利

大腹皮

洗淨

赤茯苓皮

生薑皮

桑白皮

炒

陳皮

各一錢五分

日進三服

土狗一名蟒蛄焙乾爲末用上半節卽消上身之水下半節卽消下半身之水左可消左右可消右方士以此爲神奇

積聚

後世俗名痞

難經曰積者五藏所生其始發有常處其痛不離其部上下有

所終始左右有所窮處聚者六府所成其始發無根本上下有

所留止其痛無常處

按積聚在人身軀殼之內腸胃之外依附于腸胃迴薄曲折處以爲棲止之窠白鶴

臯曰血之所積名曰積氣之所聚名曰

肝之積名曰肥氣在左

聚積者五藏之邪聚者六府之病也

脇下如覆杯令人嘔逆或兩脇痛引小腹足寒轉筋肺之積名

曰息賁在右脇下如覆杯氣逆背痛久則喘咳心之積名曰伏

梁起臍上大如臂上至心下久則令人煩心脾之積名曰痞氣

在胃脘大如覆杯痞塞吐瀉久則飲食不爲肌膚腎之積名曰

賁豚發於少腹上至心若豚狀上下無時久則喘逆骨痠少氣

癥者。按之應手。亦如五積之不移。

癥者熱火薰蒸。汁沫凝於腸胃之外而成。今之所謂瘰肉。

是也。瘕者。假物成形。如血驚石瘕之類。

瘕者或因誤吞毛髮而粘滯不出。或因誤食忌物而

藏氣乖違。久則無情。而化有情。于是爲蛇爲蠶。假物而成形也。

瘕。皮厚也。在肌肉之間而可見。

者也。

瘕者痰流皮膜。依筋而居。初爲痰核。久則成瘕。

瘕者。僻也。內結於隱僻。外不可見。

也。瘕者在少男思想無窮。所求不得。使精欲出而不得出。在室女天癸將至。或傷冷物。或着氣惱。令血欲行而不得行。多成

于少腹之旁。故不可見。

按經之所論。但分五積。而不及六聚者。何也。蓋積

之與聚。動靜雖殊。而藏府之部位則同。故言積而聚在其中。非

五積之外。別有所爲六聚也。後人鑿空附會。因積有五藏之分。

遂以爲聚有六府之別。而七瘕八瘕之說。亦由之而起。焉知將

來不以爲瘕。有九瘕。有十乎。頭緒多端。使人眩目紛心。非所以

示後學者也。昔東垣所立治積之方。只因五藏之積而立名。曰肥氣丸。息賁丸。伏梁丸。痞氣丸。奔豚丸。是得治積之要領。可爲後世之法守。蓋積聚不過一凝結之邪也。非攻不可。治法自是相同。其中或有應分各藏之治。或有應用化痰消食行氣導血之品者。亦惟隨藏所主。隨證加減。以爲引經可耳。蓋人之一身。全賴氣血以養。一有邪干。則氣血不養其身。而反養其邪。是以補其氣血。則邪愈固。攻其邪。則氣血愈衰。治斯證者。亦憂憂乎難矣。故李士材曰。積之始成也。正氣不足。而後邪氣踞之。若不攻去之。邪氣日盛。正氣日衰。喪亡將及矣。然攻之太急。正氣轉傷。初中末之三法。不可不講也。初者病邪初起。正氣尚強。邪氣



尚淺則任受攻。中者受病漸久。邪氣較深。正氣較弱。任受且攻。且補。末者病魔經久。邪氣侵凌。正氣消殘。則任受補。是法雖善。尚未盡美。蓋斯證也。但當以人之壯衰。施攻補。不可以邪之新久定強弱也。若氣壯而邪淺者。專攻不必。偏補不可。法當攻補兼行。若氣壯而邪熾者。無俟於補。有待於攻。法當先攻而後補。若氣衰而邪淺者。標可緩圖。本當急固。法當先補而後攻。若氣衰而邪熾者。一加攻伐。速之殞滅。法惟有補而無攻。書曰。治積治聚。一消一補。故士材李氏又嘗製陰陽二積之劑。曰。藥品稍峻。用之有度。補中數日。然後攻伐。不問其積去多少。又與補中待其神壯。則復攻之。屢攻屢補。以愈半爲期。俟其積去過半。純

與甘溫調養。此真妙法。第不可泥於補中耳。必須審其血虛者。益肝而養營。氣虛者調胃而補中。陰虛者壯水之主。陽虛者益火之原。經曰。大積大聚。其可犯也。衰其半而已。此之謂也。

附痞

痞者。升降不通之名。虛中之實也。經曰。邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病則實。故治痞者。一消一補。

一經之旨，在於治病。治病之要，在於辨證。辨證之法，在於察色、聞聲、問脈、切按。此四者，乃醫者之基本功也。然辨證之時，不可不察其因。因者，病之始也。或因風寒而起，或因飲食不節而生，或因勞傷過度而發。凡此皆病之由也。醫者當先求其因，然後治之。此所謂治病必先求本也。

其次，在於辨別病之輕重。病有輕重，治法亦隨之而異。輕者宜用輕劑，重者宜用重劑。不可輕者用重劑，重者用輕劑。此所謂量腹節哺也。

再者，在於辨別病之虛實。病有虛實，治法亦隨之而異。虛者宜用補劑，實者宜用瀉劑。不可虛者用瀉劑，實者用補劑。此所謂虛者補之，實者瀉之也。

最後，在於辨別病之寒熱。病有寒熱，治法亦隨之而異。寒者宜用熱劑，熱者宜用寒劑。不可寒者用寒劑，熱者用熱劑。此所謂寒者熱之，熱者寒之也。

凡此四者，乃醫者之要務也。醫者當以此四者為法，則治病無不效矣。

積聚門方

陰陽攻積丸

治五積六聚七癥八瘕痞癖  
蠱血痰食不問陰陽皆效

吳茱萸 泡

乾薑 炒

官桂 去皮

川烏頭 炮各一兩

黃連 炒

半夏 洗

橘紅 茯苓

厚朴 炒

檳榔

枳實 炒

菖蒲 忌鐵

玄胡索 炒

人參 沉香

琥珀 另研

桔梗 各八錢

巴豆霜 另研五錢

俱為末皂角 六兩

煎汁泛為丸如棗豆大每服八分漸加

至一錢五分生薑湯送下

肥氣丸 治肝之積  
在左脇下

柴胡 二兩

黃連 七錢

厚朴 五錢

炙甘草 三錢

川椒

四錢去閉口者炒

皂角

去皮弦子煨

茯苓

各一錢五分

廣茂

炮

昆布

人參各二錢五分

川烏頭

炮一錢二分

乾薑

巴荳霜

各五分

除茯苓皂角巴荳為細末另研茯苓皂角

為末和勻方入巴荳霜蜜丸如梧桐子大初服二丸一日

加一丸二日加三丸漸加至大便微澹再從兩丸加服積

去大半勿服

息賁丸

治肺之積在右脇下

黃連

炒一兩三錢

人參

二錢

厚朴

薑炒八錢

茯苓

另研

乾薑

炮

川椒

炒去干

紫菀

去苗各一錢五分

桂枝

桔梗

京三稜

炮

天門冬

川烏頭

炮

陳皮

白荳蔻

各錢

青皮 五分

巴苳霜 四分

丸法服法俱全肥氣丸

伏梁丸

治心之積  
起臍上

黃連

一兩  
五錢

人參

厚朴

薑製各  
五錢

黃芩

三錢

肉桂

茯苓

丹參

炒各  
一錢

川烏頭

炮

紅苳

乾薑

炮

菖蒲

巴苳霜

各五  
分

丸法服法俱全肥氣丸

痞氣丸

治脾之積  
在胃脘

厚朴

薑炒  
五錢

黃連

八錢

吳茱萸

三錢  
炮

黃芩

白朮

各二  
錢

茵陳

酒炒

砂仁

乾薑

各一錢  
五分

人參

茯苓

另研

澤瀉

各一  
錢

川烏頭

炮

川椒

各五  
分

巴苳霜

另研

肉桂

各四  
分

丸法服法同肥氣丸

黃豚丸 治腎之積發于小腹上至心下

厚朴 薑製 七錢 黃連 炒 五錢

苦煉子 酒煮 三錢 茯苓 另研

澤瀉 菖蒲 各一錢 玄胡索 一錢五分 附子 炮 全蝎

獨活 各一錢 川烏頭 炮 丁香 各五分 巴豆霜 四分

肉桂 二分 丸法服法同肥氣丸

三聖膏

石灰 十兩 篩過研極細末炒紅用好醋熬成膏入大黃末

一兩 官桂末 五錢 攪勻瓦器封貯紙攤烘暖貼患處

倒倉法

以肥嫩黃牯牛肉三十斤切成小片去筋膜取長流水煮

糜爛以布濾去渣滓取淨汁再入鍋內漫火熬至琥珀色  
則成劑矣令病者預先斷肉食淡前一日不食晚飯設密  
室一間明亮不通風處行之置穢桶瓦盆貯吐下之物一  
磁瓶盛所出之溺令病者入室以汁飲一杯少時又飲一  
杯積數十杯寒月則重湯盪之而飲任其吐利病在上者  
欲其吐多病在下者欲其下多病在中及在上復在下者  
欲其吐利俱多全在活法而爲之緩急多寡也視所出之  
物必盡病根乃止吐利後必渴甚不得與湯以所出之溺  
飲之非惟可以止渴抑且可以蕩滌餘垢行行倦怠覺饑  
先與稠米飲次與稀粥三日後方可與菜羹調養半月或



一月自覺精神渙發形體輕健沉疴悉能去矣自後須忌  
牛肉終身 丹溪云受自西方之至人凡人于中年後行  
一二次亦却疾養壽之一助也

伏翼屎

即天鼠糞又  
名夜明砂

用水洗淨研細末治積極良

芫花

治蟻瘕爲病腹大上膚黃粗循之戚戚然

蒜

治雞蛋積每服一升三四服卽愈

香油

治蛇瘕爲病腰痛牽心發則氣絕又有食蛇肉致成瘕

者揣其心腹上有蛇形者便是以芒硝雄黃治之

白馬溺

治驚瘕爲病腹內有圓塊忽上忽下忽有忽無每作

時腹痛幾不知人者便是 桑木灰亦良

酒積 輕者葛根神麩黃連白苳蔻甚者甘遂牽牛

氣積 輕者木香枳殼厚朴橘紅甚者枳實牽牛

血積 輕者乾漆桃仁丹皮歸尾赤芍藥紅花甚者大黃蟲

水蛭川山甲花蕊石

痰積 輕者半夏瓜萋甚者滾痰丸老痰海石瓦楞子痰在皮

裡膜外白芥子

水積 輕者五苓散甚者商陸甘遂芫花

茶積 輕者薑黃芝蔴甚者吳茱萸椒薑

癖積 輕者三稜蓬朮甚者巴苳霜大黃

穀積 輕者麥芽穀芽神麩砂仁甚者雞內金

即雞肫內皮

肉積 輕者山查阿魏甚者礪砂硝石

蛋積 白荳蔻橘紅荳豉薑蒜汁

菜積 丁香肉桂麝香 麴積 蘿蔔子薑酒煎

魚鱉積 紫蘇陳皮木香薑汁

狗肉積 杏仁山查虎肚虎骨

蟲積 雄黃錫灰檳榔雷丸蕪荑樞子使君子

瘡積 鱉甲草菓

喉閉

蓋喉閉之證無不由於風火相搏鬱而成熱令氣塞而不通痰上而不下也。喉者氣之關隘。軀命之所關也。通則利。塞則害。急治則生。緩治則死。無問標本。當散其風火。破其結氣。下其稠涎而已。更有結而成蛾者。恐非藥石之可攻。以針刺之法行之可也。

... 氣血虧損... 精神不振... 宜服此藥... 功效顯著... 凡患此症者... 宜早服之... 庶幾無虞... 誠為補劑中之... 聖藥也... 每服一錢... 開水送下... 忌食辛辣... 及油膩之物... 庶幾藥力... 發揮... 誠為... 濟世之良藥也...

齊問

喉閉門方 治纏喉閉急丹

雄黃解毒丸

治纏喉閉急丹 溪之妙方也

雄黃 一兩

鬱金 一錢

巴荳

十四粒 去皮油

共為丸每服五

分津液下

是方也雄黃能被結氣巴荳霜能下稠涎鬱金能散惡血能此三者閉其通矣

稀涎散

治雙蛾單蛾 一切喉閉

猪牙皂角

三錢去黑皮切

白礬

一兩

江子仁

六粒每粒分作兩瓣

將白礬入鍋內用炭火化開入皂角江子礬枯取起放紙上伏地氣少時研極細末每用三分甚者五分水送下探

吐

甘桔防風湯

治咽痛

甘草

五錢

桔梗

防風

各三錢

三升

水

煎

取

三升

火刺纏喉風法

用巴豆油塗紙上撚成條子以火點着纔烟起卽吹滅之

令患人張口帶火刺于喉間俄頃吐出紫血半合卽時氣

寬能言及啖粥飲矣

此三書用其法

鍼急喉閉方

於患人手大指外邊指甲後一韭葉許鍼之出血男左

女右危急者兩手俱鍼之血出卽效蓋喉者肺之系所鍼

之處名少商穴爲肺之井穴故出血而愈

喉中用鍼出血法

凡患人喉中紅赤宜用鍼從旁鍼之出血卽愈所以必欲旁鍼者避夫瘰門穴犯之令人失音故耳

筆鍼法

藏鍼刀於筆頭內入喉中輕輕劃破潰出或血或膿卽愈

又方

鯖魚膽汁滴入喉中不論雙蛾單蛾立愈



此症起於心火上升血脈凝滯

天衣心火上升血脈凝滯

此症起於心火上升血脈凝滯

此症起於心火上升血脈凝滯

此症起於心火上升血脈凝滯

此症起於心火上升血脈凝滯

此症起於心火上升血脈凝滯

消渴

經曰。熱中消中富貴人。蓋以消渴之病。責之肥甘炮炙嗜酒耽辛之所致也。非富貴人何以得之。消渴者無水之證也。然證有三焦之判。病有虛實之分。常變不同。治療亦異。古稱三消曰上消中消下消也。上消者病在上焦。氣厥論曰。心移熱于肺。傳爲

膈消。

夫心火也。肺金也。金得火而燥。故令膈消。

燥者潤之可也。宜丹溪消渴方。若飲

一溲二者死不治。中消者病在中焦。善食而溲者熱也。經曰。痺

成爲消中。

痺者熱也。消中者善食而溲也。

宜調胃承氣湯。若老年及虛弱之人

則用文蛤散。不善食而溲者寒也。宜八味地黃湯。下消者病在下焦。先有消渴善飲而後小便如膏者。蓋腎爲胃關。關門不閉。

則水無底止。燥熱漸深。水日竭矣。用六味湯主之。至若消渴咽乾。面赤煩燥者。精血竭也。生地飲主之。消渴而飲冷水過多。以致心痛者。少火必衰。化水丹主之。消渴而口舌乾。小便數。舌上紋赤者。津液竭也。黃連膏或生地膏主之。消渴而日夜尿八九升者。下焦熱也。猪腎薺苳湯主之。消渴而小便數。腰疼痛。腎虛也。腎瀝散主之。消中之後。兩腿漸細。腰脚無力者。胃熱入腎。消鑠真陰也。白茯苓丸主之。消渴愈後。餘熱未靖。宜預防癰疽。忍冬丸主之。消渴而口乾煩熱。背生癰疽者。藍葉散主之。消渴後。遍身浮腫。心膈不利者。紫蘇湯主之。飲酒過多。肌削嗜冷者。此熱積于內。而津液耗也。烏梅木瓜湯主之。消渴而有蟲者。濕熱

致也。殺蟲之品。隨證用之。又有渴而未消者。其人多渴喜飲。不若消渴之求飲無厭。此爲心腎不交。水不足以濟火。故令亡液。口乾。蓋陰無陽而不升。陽無陰而不降。水下火上。不相既濟耳。用八味湯主之。陽可降而陰自升。明者自知之也。

...

...

消渴門方

丹溪消渴方

治上消

黃連

末

栝蔞根

末

人乳

藕汁

生地汁

和之每服五錢

金匱文蛤散

治渴欲飲水不止者

文蛤

五兩

杵為散以沸湯五合和服方寸匙

調胃承氣湯

治中消善食而溲

大黃

四錢

芒硝

五錢

甘草

二錢

生地黃飲子

治消渴咽乾面赤煩躁

人參

生地黃

熟地黃

黃芪

蜜炙

天門冬

澤瀉

麥門冬

枳殼

麩炒

石斛

枇杷葉

甘草

炙各等分

剉散每服三錢水一盞煎六分去滓食遠臨臥頓服

梨古化水丹

治手足少陰渴飲水不止或心痛者。本事方治飲冷水多

川烏

臍大者四枚泡去皮

甘草

炙一兩

牡蠣

生三兩

蛤粉

用厚者炮四兩

為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新汲水下 心痛者

醋湯下立愈飲水一石者一服愈

黃連膏

治口舌乾小便數舌上赤脉生津液除乾燥長肌肉

黃連

一斤研為末

牛乳汁

白蓮藕汁

生地黄汁

各一斤

將汁熬膏拌黃連末為丸如小荳大每服二十九少呷湯

下日進十服

生地黄膏

治同前

生地黄

四兩

冬蜜

一兩

人參

五錢

白茯苓

八錢

先將地黄洗搗爛以新汲水調開同蜜煎至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服

猪腎薺萇湯

治消中日夜尿八九升者

猪腎 二具

大豆 一升

薺萇

石膏

各三兩

人參

茯苓

一作茯神

知母

葛根

磁石

縣裏

黃芩

瓜萇根

甘草

各二兩

咬咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗

去滓下藥煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒

服一劑渴止勿服



腎瀝散

治消腎腎氣虛損發渴小便數腰疼痛

雞臙脰

微炙

遠志

去心

人參

桑螵蛸

微炒

黃芪

澤瀉

桂心

熟地黃

白茯苓

龍骨

當歸

各一兩

麥門冬

去心

川芎

各二兩

五味子

炙甘草

玄參

各五錢

磁石

五錢研碎淘去赤汁

剉碎每服用羊腎一對切

去脂膜先以水一盞半煮腎至一盞去水上浮脂及腎次

入藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心服晚食前再服

白茯苓丸

治腎消因消中之後胃熱入腎消燥腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚無力

白茯苓

覆盆子

黃連

瓜蒌根

熟地黃

草薺

人參

玄參

各一兩

石斛

蛇床子

各七錢半

雞臙脰

三十具微炒

爲細末煉蜜和搗三五百杵如梧桐子大每服三十九食

前煎磁石湯送下

忍冬丸

治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草

根莖花葉皆可用之

用米麴酒於瓶內浸糠火煨一宿取出

晒乾入甘草少許爲末卽以所浸酒煮糊爲丸如桐子大

每服五十九至百丸酒飲任下

或于四月間採鮮花十數斤揉取其汁煎成膏子酒

湯任用

熱服

藍葉散

治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛

藍葉 升麻 玄參 麥門冬 黃芪 赤芍藥 葛根

沉香 犀角屑 甘草

生用各一兩

大黃

二兩微炒

每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

紫蘇湯

治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉

桑白皮

赤茯苓

各一兩

羚羊角

鎊

檳榔

各七錢五分

郁李仁

去皮炒二兩

桂心

枳殼

麩炒

獨活

木香

各五錢

每服四錢水一盞半生薑半分煎八分溫服

烏梅木瓜湯

治飲食多發積為酷熱裏蒸五藏津液枯燥血泣小便併多肌削嗜冷物寒漿

木瓜乾

烏梅

搥碎不去仁

麥孽

炒

甘草

草果

去皮各五錢

每服四錢水一盞半薑

五片

煎七分不拘時服

殺蟲方

治消渴有蟲

苦楝根取新白皮

一握切焙

入麝香

少許

水二碗煎一碗空心

飲之雖困頓不妨自後下蟲三四條類虻蟲而色紅其湯  
頓止乃知消渴一證有蟲耗其精液

朽木湯

治消渴

取朽木方寸者三十枚

煎湯飲之得水土中者良

朽木年深而質

腐腐者水之氣腐足以勝焦水足以制火

葛花葛根

飲酒消渴宜主葛花葛根以其善解酒毒故耳

淡荳豉

喜食肥甘焦炙令人消渴者此物宜用蓋以荳豉由于益  
造味苦而氣腐苦能勝熱腐能勝焦故耳

烏梅

前有梅林聞者生液故胃乾暴渴者宜用之所謂酸能致液也

香薷

夏月消渴者多是暑邪入于心包絡宜以香薷君之

北梨甘蔗

富貴之人飲酒必多置酢醬海味酒能灼人真陰鹹能喪人真液每每病致消渴然酒以釀而濃以水而淡鹹以燥而堅以濕而化故食北梨甘蔗可以解酒亦可以解鹹冬月宜煮而啖之

人參

凡汗吐下後渴者皆胃液不足宜以人參補之蓋氣能蒸  
溽故耳



痲瘰

痲瘰者老瘰也

內經論瘰最詳。而治瘰無方。惟以刺之一法。傳示後人。是見治瘰之難也。倉公云。非神仙不可以論瘰。卽神仙不能以愈瘰。自仲景張氏出。始獨責之少陽一經。以小柴胡湯。與青皮飲。主治可謂深得內經之旨矣。夫瘰之始生。皆在夏月。傷於風寒暑濕四氣而得之也。

風與暑陽邪也。寒與濕陰邪也。風者陽中之涼氣也。暑者熱中之寒邪也。由是四者皆屬於寒。

蓋當盛夏之際。汗出淋漓。腠理俱開。或因貪涼而邪入。或因浴後而水停。四氣居于皮膚之內。腸胃之外。使營衛不交。陰陽間隔。

皮膚之內。腸胃之外。乃營氣衛氣之所舍也。故四氣居之。則營衛不交。而陰陽間隔也。

陽欲外出而陰

拒之。陰欲內入而陽拒之。所以寒熱往來也。先傷于寒。而後傷



於風則先寒而後熱。先傷于風而後傷于寒。則先熱而後寒。陰氣絕而陽氣獨發。則有熱而無寒。陽氣絕而陰氣獨發。則有寒而無熱。又有寒熱交集者。乃陰陽相簿。邪正分爭。并於表。則陽實而陰虛。陰虛生內熱。陽實生外熱。中外皆熱。故必煩渴而身熱。惡熱莫任也。并於裏。則陰實而陽虛。陽虛生外寒。陰實生內寒。中外皆寒。故必鼓頤而戰慄。惡寒莫任也。邪正分爭。并之未盡。則寒熱交集。鼓頤戰慄。煩渴身熱。並至矣。若夫淺者病在三陽。邪氣隨衛氣以爲出入。而一日一作。深者病在三陰。邪氣不與衛氣並出。而間日一作。至于甚者。病合三陰。三陽邪氣客於風府。循脊項骨而下。至于骶骨。循環于缺盆。在咽邪氣與衛氣

三節

喉下

有時相失而不相得。乃三四日而一作。其一日一作者爲陽。間日或間二日一作者爲陰。晝發者爲陽。夜發者爲陰。一日一作者其邪輕。間一二日一作者其邪重。發愈早者其病易愈。發愈晏者其疾難瘥也。析言其證。先寒後熱者名曰寒瘧。用小柴胡湯加青皮。先熱後寒者名曰溫瘧。用小柴胡湯加肉桂。有熱無

寒者名曰瘧瘧。

暑也。

非清暑之劑不能解其熱。但寒無熱者名曰

牝瘧。非純陽之劑不能散其寒。惡寒自汗。煩燥。頭痛者。名曰風

瘧。細辛白芷須加。饑而不食。食則脹滿者。

嘔吐腹滿。

名曰食瘧。神麴

砂仁必用。發時迷悶甚則狂妄。或不能言者。名曰瘧瘧。用小柴

胡湯加大黃木香。身重嘔脹者。名曰濕瘧。用胃苓湯加羌活蘇

葉經年不瘥前後復發者名曰勞瘧。用小柴胡湯去半夏加瓜  
蒞根。目痛鼻乾渴而喜冷。自汗不眠者。名曰熱瘧。用白芷知母  
石膏之屬。邪伏厥陰。脇下有塊。發時有寒無熱。則爲瘧母。用六  
君子湯加肉桂木香。如瘧愈而瘧母不除。及至老年。必然復發。  
用蜀漆散。牝瘧瘧母俱係有寒無熱。但無塊者爲牝瘧。有塊者  
爲瘧母。蓋瘧母乃久瘧而成者也。仲景曰。頑痰乃至  
陰所化。癥瘕爲凝結之陰。故  
息瘧母者有寒而無熱也。世俗又有鬼瘧之名。此爲特行疫

氣。老幼相同。投以平胃散。無有不截者。今新定治瘧一方。名曰  
錦屏合參湯。取陰陽和合之義也。除痺瘧牝瘧勞瘧瘧母之外。  
服之俱可應手取效。要而言之。治瘧之道。須察其邪之淺深。證  
之陰陽。令其自藏而府散而越之。邪去則安。古法有汗欲其無

汗。養正爲先。無汗欲其有汗。散邪爲急。多熱者涼藥爲君。多寒

者溫藥爲主。逾月不解者營衛兩傷也。宜補。一日二作者邪併

于虛也。宜補。膈間痰壅邪在上焦也。宜吐。鶴臯曰無痰不作瘧。腹中鞭實

邪入陽明也。宜下。夜靜晝作者邪在陽也。在陽則衛必弱。宜益

氣而截。晝靜夜作者邪在陰也。在陰則營必虛。宜養血而提。仲景

曰瘧發於夜者入陰分血分也。宜四物湯加知母紅花升麻柴胡。提出陽分方可截之。然此又爲初發于晝而漸入于夜者言

之。若初發卽在于夜者則不必提。只以常瘧治之可也。久瘧不愈其氣必虛。法宜補中益

氣。久瘧連熱腎水將竭。理當益水滋陰。總之脉實證實者攻邪

以治標。脉虛證虛者補正以治本。此不特治瘧之要訣。實司命

之總綱也。

卷之三

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

痰癰門方

香薷湯

治癰瘡

香薷 二兩

白扁豆

厚朴

製

茯神

各一兩

甘草

炙五錢

蜀漆散

此仲景治牝瘧之方也病原頑痰癥瘕者吳鶴臯曰牝陰也無陽之名頑痰乃至陰所化癥瘕乃凝結之陰故

令人有寒無熱

蜀漆

燒去腥

雲母

燒二日夜

龍骨

煨各等分

為末於未發之先漿水服下五分

七棗湯

治有寒無熱太僕王冰曰益火之源以消陰翳故用此方以治牝瘧

附子

一枚鹽水煮去皮臍

大棗

七枚

為丸每服三錢甚者五錢

三解湯

治時行之瘧長幼相似者神良

痰癰門方

救真堂

麻黃 去節根

柴胡 去蘆

澤瀉 各三錢

清脾飲

治脈來弦數或但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮 炒

厚朴 白朮 炒黃

黃芩

草菓 各八分

柴胡 茯苓

半夏 各一錢五分

甘草 五分

生薑 五片

二水湯 諸瘧必用

白朮 炒焦

蒼朮 炒

柴胡

陳皮 各七分

甘草 五分

乾葛 六分

生薑 五片

一日一作及午前發邪在陽分加

桔苓

茯苓

半夏

熱甚口渴加

石膏

知母

麥冬

間日或三四日發或午後發及夜發者邪在陰分

加四

物湯 酒炒黃耆 紅花 提起陽分方可截之

脉虛神倦加 人參 黃芪

傷食者加 神麩 麥冬 山查 黃連

痰多加 生薑 半夏

要截加 檳榔 常山 烏梅

常山飲

治瘧痰在胃用此吐之 忌雞肉一百二十日

常山 一兩 酒炒

水二鍾煎一鍾空心服

若酒浸一宿炒透熟即不吐

露薑飲

治痰寒瘧

生薑 四兩

連皮搗汁一碗露一宿空心服

交加雙解飲子

治瘴瘧神效



肉荳蔻 二大枚  
草荳蔻 二枚  
厚朴 五錢  
甘草 四錢

生薑 五錢  
水煎空心服 五藥俱一半 生一半熟

祛癰飲 三發後可用因其衰而減之立效

知母 去毛酒炒五錢  
貝母 去心九分  
陳皮 去白  
山查肉

枳實 各一錢五分  
柴胡 七分去蘆  
檳榔 八分  
紫蘇 一錢

甘草 去皮炙三分  
水二鍾煎一鍾渣用水二鍾煎八分俱露

一宿臨發日五更服頭煎未發前一時服二煎

獨蒜 十二枚煨熟  
桃仁 一百粒炒  
搗爛入黃丹丸如棗荳大每服九

丸臨發日五更面東酒送

桃仁 一味  
研爛不犯水加黃丹為丸五月五日合

常山 二錢酒浸一宿炒透熟

烏梅肉 四枚

研爛為丸此截瘧必效之

方世俗畏常山發吐不知其有神功但炒透即不吐矣

生鱉甲

要不見湯煮者

醋炙黃為末烏梅肉為丸每服三錢

瘧母

治之失宜營衛虧損邪伏肝經脇下有塊此症當以補虛為主每見急于攻塊者多致不救

六君子湯加

木香

肉桂

蓬朮

鱉甲

炙

新定錦屏合香湯

柴胡 二錢

防風 八分

半夏 二錢

甘草

生用五分

青皮 一錢

白芥子 三錢

蒼朮

一錢米泔製

神麴

三錢炒

白荳蔻

七粒去殼研

檳榔

八分

黃芩

一錢二分

生薑

二片



木香 肉桂 蘇木 蘇甲

蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲

蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲

蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲

蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲 蘇木 蘇甲

痢疾

經名腸僻  
古稱滯下

痢乃熱淫所致。腸胃氣血之病也。昔多昧此。竟有以赤爲熱。白爲寒者。投治雜亂。寃沉幽冥者多矣。及守真劉氏出。始定爲熱傷于氣。則成白。熱傷于血。則成赤。熱傷大腸。則大腸燥結而裏急後重。以啓後學之愚蒙。丹溪云。凡痢有熱而無寒。服寒涼則百無一死。服溫熱則百無一生。此知要之言。不可易者。其有便白得熱藥而愈者。此非痢疾也。乃寒積耳。必發于隆冬之日。與春初之際。服薑茶飲。生薑三錢  
茶葉三錢未有不愈者。若夫痢則有熱而無寒者也。但當以氣血分赤白。不得以赤白定寒熱也。河間云。行血則便膿自愈。行氣則後重自除。東垣云。初痢宜下。久痢宜

塞。此皆常法。故因於氣者行其氣。因於血者和其血。初痢而實者必有熱。可以通因通用。久痢而虛者熱化爲寒。可以塞因塞用。初痢而身熱無汗者。病合太陽也。先汗而後下。初痢而寒熱往來者。病合少陽也。先和解而後下。卽如久痢亦必審其虛實。察其寒熱。然後可以塞因塞用。如醫者不察。槩以久痢宜塞之法。施于餘熱未淨之人。必休息不止。或變生他證。伊誰之咎乎。凡病痢脹滿。惡食。急痛。懼按者實也。喜按者虛也。煩渴引飲。喜冷畏熱者熱也。喜熱畏寒者寒也。小便短少黃赤而熱者。熱及膀胱也。不熱者。液以陰亡也。虛坐肛燥而不得大便者。血虛也。四物湯。虛坐脫肛或失氣而不得大便者。氣虛也。補中益氣湯。裏

急而不得大便者熱也。重則承氣湯。輕則芍藥湯。裏急而頻見  
汚衣者虛也。補中益氣湯去當歸加肉果。後重而至圉稍減。未  
幾復甚者實也。芍藥湯。後重而圉後不減者虛也。補中益氣湯  
後重而圉後更劇者虛甚也。真人養藏湯。下痢黑色有二種。焦  
黑者爲熱極。反兼勝已之化也。芍藥湯。黑如漆之光者瘀血也。  
桃仁承氣湯。由是觀之。初痢固無補法。卽久痢亦當審其虛實。  
察其寒熱。若虛寒者固可塞而補。實熱者豈可塞而補乎。今新  
定濟坤湯。乃治痢之要方也。凡痢疾初起。可以通因通用者固  
不待言。卽久痢有熱未可塞而補者。俱宜服此。效如影響。若以  
宜補之證言之。脈來微弱者可補。形色虛薄者可補。病後而痢

者可補。因攻而劇者可補。其又有至要者在脾腎兩藏。如先瀉而後痢者。脾傳腎爲賊邪。難療。先痢而後瀉者。腎傳脾爲微邪。

易醫。

尅我者爲賊邪。我尅者爲微邪。

是知在脾者病淺。在腎者病深也。蓋腎爲

胃關。開竅于二陰。未有久痢而腎不損者。故治痢不知補腎非其治也。推而言之。胃爲中州。氣之要道。未有久痢而氣不殘者。故治痢不知補氣非其治也。熱邪久踞。營必受傷。未有久痢而血不枯者。故治痢不知補血非其治也。涼藥過投。元陽必耗。未有久痢而火不衰者。故治痢不知溫補命門非其治也。補雖四法。然其中或宜專主。或宜兼行。須當隨證而施治。慎毋膠柱而鼓瑟也。

噤口痢

丹溪云噤口痢須用人參黃連濃煎加薑汁細細呷之。如吐再呷。但得一呷下咽便開。

休息痢

屢止屢發久不愈者名曰休息痢。多因兜澁太早。積熱未清。以香連丸加參苓枳朮以清之。虛滑甚者以椿皮人參各一兩煨木香二錢粳米三錢煎湯飲之。

蟯蟲痢

蟯蟲之形極細。九蟲之一也。胃弱腸虛則蟯蟲乘之。或癢或從穀道中溢出。內服桃仁紅花槐子蕪荑百部等藥。外用雄黃銳



散。

死候

下純血者死。如屋漏水者死。大孔如竹筒者死。唇若塗

硃者死。發熱不休者死。色如魚腦或如猪肝色者難治。

脈細皮寒。氣少。泄利前後。飲食不入。是謂五虛。死不治。惟急用

大劑參附。百可救一。脈洪大滑促者不治。

仲景云。脈沉弦者重。脈大者爲未止。微弱者爲欲自止。雖發熱

不死。

痢疾門方

大黃湯

治膿血稠黏  
裏急後重

錦紋大黃 一兩

好酒 二鍾

浸半日煎至半鍾去渣分

二次服

芍藥湯

經曰澁而便膿血知氣行而血止也河間  
云行血則便膿自愈調氣則後重自除

芍藥

一錢五分

當歸

黃連

黃芩

各八分

大黃

一錢

肉桂

五分

甘草

炙

檳榔

各四分

木香

五分

水煎服痢不減漸加大黃

蒼朮地榆湯

治脾經受  
濕下血痢

蒼朮

六錢

地榆

二錢

水煎服

鬱金散

治熱毒痢  
下血不止

真鬱金

槐花

炒各  
五錢

甘草

炙二錢  
五分

俱為細末每服二錢食前豈豉湯下

香連丸

治赤白相雜  
裏急後重

黃連

二十兩用吳茱萸十兩水  
拌同炒令赤色去茱萸

木香

四兩八  
錢八分

俱為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三錢空心米湯送

下 噤口痢加石連肉

八兩木蓮  
肉不可用

生生湯

丹溪以之  
治噤口痢

人參

黃連

等分

濃煎加薑汁少許細細呷之如吐再

呷但得一呷下咽便開

倉廩湯 治噤口痢乃熱毒冲心

人參 茯苓 甘草 炙 前胡 川芎 羌活 獨活

桔梗 柴胡 枳殼 陳倉米 各八分 生薑 三片

訶梨勒丸 治休息痢

檮白皮 二兩 訶子 去核五錢 母丁香 三十粒 爲末糊丸如

梧桐子大每服三錢陳米湯下入醋少許日三服

瓜萁散 治五色痢久不愈

瓜萁 一個黃色者炭火煨存性蓋地上一宿 研末作一服溫酒調下

真人養藏湯 治虛寒痢久而不愈

人參 白朮 炒 當歸 各六分 甘草 炙 肉桂 各八分

醫水一收 痢疾門方 後真堂

白芍藥

木香

各一錢  
六分

肉果

五分  
麩裹煨

粟殼

蜜炙三  
錢六分

訶子肉

一兩  
二錢

水煎食前服

清六丸

治血痢。能  
和六府之血

滑石

六兩

甘草

一兩

紅麩

五錢

溫六丸

治白  
痢

滑石

六兩

甘草

一兩

乾薑

五錢

佐以所利薑汁爲丸

新定濟坤湯

黃連

一錢

大黃

生用  
二錢

神麩

二錢

金銀花

五錢

檳榔

八分

木香

六分

當歸

八錢

枳實

八分

橘紅

五分

生甘草

五分

麻仁

二錢

薑皮

二片

泄瀉

泄瀉者風寒濕熱四氣之所致。而所重則在於濕。蓋四氣賊脾。

令脾土虛而不能四布津液。水穀常留于胃而濕生。經曰濕成

則濡瀉也。

風入于肝。肝木受傷。則傳于所勝。寒入于腎。腎水受

傷。則水上泛而凌心。火不能生土。熱入于心。心火

受傷。則母虛而子虛。濕則脾藏自

濕而瀉者。腹不痛。痛者非由

受其傷。故四氣皆足以賊脾也。

于食積。即由于中氣虛而内生寒。瀉而痛。減者為食積。瀉而痛

不減者為虛寒也。

瀉責之脾虛。土不足以防水。痛責之肝實。土敗而木賊之也。

瀉而水穀變

色者為熱。水穀不變色而澄徹清冷。或大便色白者為寒。若肛

門燥澁。小便黃赤而水穀不變色者。又為熱。此由于火性急速。

食下即出。不及變化。仲景所謂邪熱不殺穀是也。瀉而頭痛者。

蓋因陽陷于下而成飧泄。濕犯于上而令頭痛也。濕既除而頭痛自愈矣。瀉而痞悶者。中氣不足不能升降清濁故也。中氣足而痞悶自解矣。洞泄而水液去多甚而轉筋者。傷血也。宜升陽除濕湯。食方入口而卽下。名曰直腸泄。極爲難治。宜大斷下丸。腹痛瀉水。腸鳴痛一瀉一者。謂之協熱自利。火也。黃芩芍藥湯主之。腎主二便。開竅于二陰。受時于子亥。腎藏虛寒。則不能禁固。二便于亥時瀉。名曰腎泄。凡腎泄受溫補者可治。宜五味子散。溲而便膿血。小腹痛。名曰小腸泄。宜用承氣湯。裏急後重。數至圞而不能便。莖中痛。名曰大瘕泄。亦用承氣湯。總之泄瀉多端。而治法不外乎十。一曰淡滲。使濕從小便而去。經曰治濕不

利小便非其治也。又曰在下者引而竭之是也。宜四苓散。一曰升提胃氣下陷而泄瀉鼓舞胃氣上騰則注下自止所謂下者舉之是也。宜補中益氣湯及羌葛之屬。一曰清涼暴注下迫皆屬于熱苦寒諸劑用滌燔蒸所謂熱者清之是也。宜用苓連之屬。一曰疏利痰凝氣滯食積水停皆令人瀉隨證祛逐勿使稽留。經云實者瀉之。又曰通因通用是也。宜小承氣湯。一曰甘緩瀉利不已急而下趨甘爲土味善禁急速所謂急者緩之是也。宜甘桔湯。一曰酸收瀉久則氣散無能統攝瀉何由止酸之一味能助收肅之權。經曰散者收之是也。宜芍藥五味子之屬。一曰燥脾瀉成于土濕濕本于脾虛仲景曰土生則泄瀉自止。經



曰虛者補之是也。宜四君子湯。一曰平肝。痛瀉不瘥。土敗木賊。仇木不損。卑土難安。所謂土欲實木當平之是也。宜劉草窓痛瀉方。一曰溫補命門。腎雖屬水。真陽寓焉。主司二便。封藏之本。少火一衰。何以運行三焦。熟腐五穀乎。故積虛者必挾寒。脾虛者必補母。經曰寒者溫之是也。理中湯。或附子理中湯。一曰固澁。瀉久腸滑。溫補無益。須用澁劑。所謂滑者澁之是也。宜地榆龍骨赤石脂之屬。此外又有交腸證。

交腸者。大小二便。易位而出。若交易然。蓋由幽門濕而清濁不分之所致也。古人用五苓散治之。專爲通前陰而設。蓋前陰通則後陰不治而自愈矣。若二便俱從前陰而出。時時泣下者。其藏燥

者多。則非交腸。蓋因憂思結而傷脾。脾統血者也。脾傷則不能  
統攝。久則血枯于內。血盡則氣亂。氣亂則水穀舍故趨新。舍寬  
趨隘。後陰閉而錯出下行。是當用歸脾湯以大補氣血可耳。  
脫肛者。久瀉則傷氣。下多則亡陰。能令人脫肛。然又有寒熱之  
分焉。熱脫則努力而肛門澁。寒脫則洞泄而肛門不澁也。

死候

泄瀉脉洪大者逆。下利十數行。脉反實者死。腹鳴而滿。四  
肢青。十五日死。腹大脹。四末青。形脫泄甚。不及一時死。下  
則泄瀉。上則吐痰。皆不已。為上下俱脫死。



泄瀉門方

胃苓湯

治暑濕停飲泄瀉小便不利

蒼朮

製一錢五分

厚朴

陳皮

各一錢

甘草

五分

白朮

八分

茯苓

一錢二分

澤瀉

一錢

肉桂

三分

豬苓

一錢

生薑

三片

大棗

二枚

六一散

加紅麴名青六九加薑末名溫六九

滑石

水飛六兩

甘草末

一兩

新汲水調服

戊己丸

治熱瀉糞色黃褐肛門斂澁

黃連

酒炒四兩

白芍藥

三兩

吳茱萸

泡炒二兩

為末神麴和

丸如梧桐子大每服二錢米飲下

升陽除濕湯

治受風發泄及虛弱不思食  
小便黃赤四肢困倦頭痛

蒼朮

一錢

柴胡

羌活

防風

神麴

澤瀉

豬苓

各六分

陳皮

麥芽

炙甘草

各三分

升麻

五分

生薑

三片

漿水散

治暴瀉如水一身盡冷汗出脈弱澄澈  
清冷氣少不能言甚者嘔吐此為急病

半夏

薑製  
二兩

良薑

二錢  
五分

乾薑

炮

肉桂

炙甘草

附子

各五錢

俱為細末每服四錢水二鍾煎一鍾服

連理湯

即理中湯加  
黃連茯苓

人參

白朮

各一錢  
五分

乾薑

炒二錢

甘草

炙五分

茯苓

一錢  
五分

黃連

炒一錢

水煎食遠服

茱萸斷下丸 治藏府虛寒腹內痛瀉大效

吳茱萸 炒二兩 赤石脂 煨 乾薑 各一兩 川附子 製

艾葉 炒 砂仁 肉苳蔻 各一兩 為末麵糊為丸每服三

錢米飲下

固腸丸 此丸性燥滯氣未盡者勿服

檇皮 四兩 滑石 二兩 為末粥丸 醋炙 水飛

四神丸 治脾腎虛寒大便不實飲食不思

肉果 二兩 補骨脂 四兩 五味子 二兩 裹煨 麵

吳茱萸 一兩 俱為末 生薑 八兩 紅棗 一百枚 浸炒 酒 煮熟 去皮取棗肉

和丸如梧桐子大每服四錢空心米飲下

枳木丸

消食  
止瀉

枳實

去釀麩  
炒一兩

白朮

二兩

爲末荷葉裹燒飯爲丸如梧

桐子大每服三錢白湯下

加水香

一兩

砂仁

一兩

名香砂枳木丸

保母散

治久瀉不  
止神效

松花

要陳  
者炒

乾荷葉

焙各  
四兩

粟殼

二兩  
炒

每服四錢糯米飲下

虛者加參末  
二兩

白朮茯苓湯

治脾胃  
虛弱

白朮

白茯苓

各七錢  
五分

訶梨勒散

治胃腸虛寒  
滑瀉腹痛

訶子仁 肉苳蔻 麵煨

青皮 炒各四兩

附子 一兩

肉桂 五錢

為末每服四錢米飲下

劉草窓痛瀉要方 治痛瀉不止

白朮 三兩

芍藥 二兩

防風 一兩炒

陳皮 一兩五錢

五味子散 治腎虛子後泄瀉

五味子 二兩炒香

吳茱萸 五錢酒浸炒

為末每服二錢米飲下

椒附丸 治腎虛滑瀉

椒紅 炒

桑螵蛸 炙

龍骨 火煨存性

山茱萸 炒

附子 炮

鹿茸 酒蒸焙各等分

為末粥為丸每服四錢

二神丸 治脾腎泄瀉

泄瀉門方

三 效真堂



破故子

炒四兩

肉苳蔻

麵煨二兩

棗肉煑熟去皮為丸

青州白丸子

治痰積滑泄不止

半夏

七兩

天南星

製

白附子

各三兩

川烏頭

去皮臍五錢

俱為末水中浸數日為丸每服三錢

不香苳蔻丸

治肝強脾弱泄瀉

青木香

農

肉苳蔻

各等分

棗肉為丸如桐子大每下二

十丸

黃牛肉

治脾虛百藥不效者

用好黃牛肉如茴香花椒煑爛熟日食一二斤病愈終身

不可食牛肉

大便秘結

附脾約

大便秘結專責之於少陰腎證狀雖殊總之津液枯乾一言以蔽之也。分而言之則有胃實胃虛熱秘冷秘氣秘風秘水竭血枯之殊。胃實而秘者善飲食小便赤麻仁丸胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯熱秘者面赤身熱六脉數實腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡潤腸丸承氣湯冷秘者面白或黑六脉沉遲小便清白喜熱惡冷藿香正氣散加官桂枳殼吞半硫丸不效佐以木香檳榔丸氣秘者氣不升降穀氣不行其人多噫蘇子降氣湯加枳殼吞養正丸風秘者風搏肺藏傳於大腸或諸節痛疼或四肢不仁小續命湯去附子倍芍藥加竹瀝吞潤

腸丸或吞活血潤腸丸。更有老年津液枯乾。婦人產後亡血。及發汗利小便病後氣血未復。皆能秘結。此水竭血枯之秘也。法當補養氣血。使津液生。則自通。宜八珍湯加蘇子。橘紅。杏仁。肉蓯蓉。倍用當歸。誤用硝黃利藥者。多致不救。而巴莖。牽牛爲害更速。若病證雖屬陰寒。而脉實微躁。宜溫煖藥中畧加苦寒。以去熱躁。躁止勿加。如陰躁欲坐井中。兩尺按之必虛。或沉細而遲。口渴不欲飲冷。指甲青紫。但煎理中湯極冷方服。或服藥不應。不敢用峻猛之藥者。宜蜜煎導之。用鹽五分。皂角末五分。入蜜煎中。其功更捷。蓋大腸得血則潤。亡血則燥。燥則秘矣。初秘動血。久秘血瘀。瘀則升降不通。凡治之者。從容養血清燥爲上。

手。急遽攻下通腸爲下手。審其燥者濡之。逸者行之。留者攻之。抑者散之。着者滑之。寒者溫之。熱者清之。虛者補之。秘結之治盡於此矣。

脾約

仲景曰。趺陽脉浮而澀。浮則胃氣強。澀則小便數。浮澀相搏。大便爲難。其脾爲約。喻嘉言曰。約者省約也。脾氣過強。將三五日。胃中所受之穀。省約爲一二彈丸而出。全是脾土過燥。致令腸胃中之津液。日漸枯槁。所以大便爲難也。宜用麻仁丸潤之。



大便秘結門方

麻仁丸

厚朴

去皮薑汁浸炒

白芍藥

枳實 各八兩

大黃

一斤蒸焙

麻仁

五兩另研

杏仁

炒五兩五錢

為末煉蜜和丸如梧桐子大

每服二十九臨臥服溫水下

厚朴湯

治胃虛秘結

厚朴 陳皮

甘草

各三兩

白朮

五兩

半夏麴

枳實

炒各二兩

俱為麤末每服五錢薑

三片

棗二枚

食前大溫服

四順清涼飲

治血燥內熱秘結

大黃

蒸

甘草

炙

當歸

白芍藥

各錢

薄荷葉

十片

潤腸丸

治風結血秘  
胃中伏火

羌活

當歸尾

大黃

煨各  
五錢

麻仁

桃仁

各一  
兩

爲末除麻仁桃仁另研如泥外爲細末煉蜜爲丸如梧桐

子大每服五十九空心白湯下

木香檳榔丸

疎導三焦消氣  
化痰消食寬中

木香

檳榔

枳殼

杏仁

炒

青皮

去瓢各  
一兩

半夏麴

皂角

酥炙

郁李仁

各三  
錢

爲末別以皂角

四兩

用漿水

一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許和丸如梧子大每服五十

丸食後薑湯下

蘇子降氣湯

治氣滯妨悶  
痰盛氣秘

蘇子炒

半夏製各一錢

前胡

甘草炙

厚朴製

陳皮

各一錢

當歸

一錢五分

沉香

七分

生薑

三片

虛人加

肉桂

五分

黃芪

一錢

半硫丸

治老人虛人冷閉

熟半夏

硫黃

俱研極細末

用柳木槌子搗過以生薑自然

汁同熬入乾蒸餅末攪勻入杓內杵數百下丸如梧桐子  
大每服十五丸至二十九丸溫酒或薑湯下婦人醋湯下俱

空心服

橘杏湯

治脈浮氣閉

杏仁

炒黃五錢若脈沉為血閉以桃仁代杏仁

橘紅

二錢五分

薑

三片



小續命湯

去附子倍芍藥加竹瀝吞潤腸丸

麻黃

去節

白芍藥

炒倍用

甘草

炙

杏仁

炒

川芎

防已

桂枝

虛人用官桂

人參

黃芩

各一兩

防風

一兩五錢

竹瀝

一兩

每服五錢加生薑

三片

大補丸

治大便秘結睡中口渴

黃柏

炒褐色

為末作丸每服二錢

玄明粉散

治血熱便秘

玄明粉

三錢

當歸尾

五錢

煎服

此攻下之劑宜量虛實而用之

通幽湯

結燥腹痛

生地黃

三錢

熟地黃

四錢

大黃

製一錢加至三錢

當歸尾 五錢

菴仁 十粒炒  
研如泥

紅花 五分

升麻 三分



小便閉癥

李士材曰。閉與癥。二證也。新病爲溺閉。蓋滴點難通也。久病爲溺癥。屢出短少也。夫膀胱爲州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。氣化之道。在於升其陽而降其陰。宜用倒換散。主氣化者太陰肺經也。如喉痛而欬。是肺燥而氣化不及州都也。宜清金潤肺。用車前紫苑麥冬茯苓桑皮之類。大便溏泄。或泄利。是水液只滲大腸。小腑因而燥竭也。宜燥脾健胃。用蒼朮白朮赤茯苓半夏之類。如骨蒸夜熱盜汗腰膝疼。是腎水燥熱。熬煎膀胱也。東垣所謂腎水竭。則火獨治。能鬪而不能開。法宜滋腎滌熱。用六味湯加黃栢知母通草之類。如氣喘而逆者。順氣爲急。用枳

穀木通橘紅之類。面赤。口乾。舌瘡。尿結者。實熱也。仲景曰。邪氣熱之則便澀。邪氣實之則不出。非與以純陰之劑。則陽無以生。用滋腎丸。上焦熱者加梔子黃芩。中焦熱者加黃連芍藥。下焦熱者加黃蘗知母之類。足寒手冷。陽痿精寒。虛寒也。非予以溫補之劑。則水不能行。用金匱腎氣丸。及補中益氣湯。凡少腹急小便有可行之勢而卒不通者。熱秘之也。北利湯其要藥也。王隱君曰。通可以去滯。泄可以去秘。滑可以去着。用八正散。更神效焉。夫升陽降陰。滋腎瀉膀胱。去滯秘與著。名爲正治。清金潤肺。名爲隔二治。健胃燥脾。名爲隔三治。丹溪曰。吾以吐法通其小便。譬如滴水之器。上竅閉。則下竅無以自通。必上竅開而下

竅之水出焉。氣虛者。補中益氣湯先服後吐。血虛者。芎歸湯先服後吐。痰多者。二陳湯先服後吐。氣閉者。香附木通先服後吐。更有瘀血而小便閉者。牛膝桃仁在所必用。別錄云。小便不利。審是氣虛。獨參湯如神。又有孕婦胎滿壓胞。多致小便閉塞。宜用補中益氣湯。升舉其氣。仲景用八味丸酒服。或令穩婆。手入產戶。托起其胎。必溺出如注。或令孕婦眠於床上。將榻倒豎起。胎卽不壓而溺出。勝於手托多矣。或各有所因者。並依證施治。可也。

吳鶴臯曰。小便不通。一見嘔證。便不可治。



小便閉癃門方

倒換散

大黃 一兩

荊芥 二兩

研末每服二錢

八正散加木香

車前子 蘧麥 扁蓄 滑石 山梔子 炒 甘草梢 炙

木通 大黃 麩裹煨 木香 各等分 為末每服二錢燈心湯

送下

木通湯 治小便不通小腹痛甚

木通 滑石 各五錢 牽牛 取頭末二錢五分 燈心 十莖

葱白 一莖 食前服



通心飲

治心經有熱唇黑面赤小便不通

木通

連翹

去心各二錢

燈心

十莖

煎服

牛膝湯

治血結小便閉莖中痛

牛膝

五錢

當歸

三錢

黃芩

二錢

鐵服丸

治少腹急小便不通氣不化

大皂角

炒黑

爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七丸白湯

送下

熨臍法

用燒鹽分作二包熱熨臍腹冷復易之

探吐法

燒鹽三錢溫水二碗服之探吐

大螺着腹法

大螺一枚和鹽半匙連殼生搗如泥置臍下一

寸三分用寬帛緊繫之小便立通

琥珀散

治老人虛人心氣閉塞小便不通

琥珀爲末每服一錢人參湯下立效

滋腎丸

治陰虛小便閉

黃蘗

酒洗焙

知母

酒炒各二兩

肉桂

二錢

爲末熟水爲丸

如芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心下

北利湯

黃蘗

二錢

木通

一錢

車前子

三錢

肉桂

三分

滋陰化氣湯

治因服熱藥小便不利臍下痛

黃連

炒

黃蘗

炒

甘草

知母

炒各一錢五分

滑石散

治男婦轉胞小腹  
急痛不得小便

寒水石 二兩

冬葵子 一合

滑石

亂髮灰 存性

車前子 水通

去皮節 各一兩

水十碗煎至五碗每服一碗

日服盡卽利

葱熨法

治小便閉小腹  
脹不急治殺人

用葱白 三斤

切細炒熟絹包分兩袋更替熨臍下卽通

又法 以自瓜甲燒灰水服

塗臍方

治小便  
不通

大蒜

十枚要  
獨顆者

梔子

七枚

鹽

少許

搗爛攤綿紙上貼

臍良久卽通未通塗陰囊上立通

又方

治小便閉垂死者神效

桃枝

柳枝

木通

川椒

白礬

枯各一兩

葱

七根

燈心

一握

水三十碗煎至二十五碗用磁瓶二箇各盛

熱藥汁一半薰外腎周圍以被圍繞不令外風稍入良久便通如赤荳汁若冷卽易其效大奇

射鼠破赤荳竹苦令唱息其效大奇

蕪藥竹一半蕪衣習風圍以好圍懸不令伏風懸入身入

蠶心 水三十錢煎至二十正罇用蠶懸一箇各蠶

射鼠 射鼠 木鼠 川射 白藤 一兩 藤 十兩

天古 振青轉交 箭木射開通

小便不禁

內經論肝督脉三焦膀胱之病。不指爲何邪所干。則知七情六氣皆能爲病也。又言手太陰虛者爲子母相關之病。則知所生所勝所不勝之五邪皆以爲病也。東垣曰。腎火熄。則水獨治。能開而不能闔。令小便不禁。則知命門火衰。亦能爲病也。總其大要而言。肺者主氣以下降。生水以下輸。膀胱者津液藏焉。氣化則能出。水泉不止者。膀胱不藏也。腎者具水火。主二便。司開闔者也。水火不濟。則小便不禁矣。此三經者。實爲總司。肺虛者爲上虛。當補氣。肺熱者爲上熱。當清金。膀胱虛者爲下虛。當澀脫。挾熱者爲下熱。宜滌胞。若夫腎病以致小便不禁者。則有虛而

無熱者也。此正氣寒之則遺尿。正氣虛之則不禁耳。是以睡則遺尿。皆責之虛。所以嬰兒脬氣未固。老人元氣不足。多有此證。在嬰兒挾熱者十居八九。在老人挾寒者十居七八。此又不可不知也。如妊娠尿出不知。薛立齋云。此證若脬中有熱。加味逍遙散。若脾肺氣虛。補中益氣湯加益智。若肝腎陰虛。六味丸。產後小便不禁。此氣虛不能下制故也。立齋云。若因穩婆損胞者。八珍湯兼進補脬飲。若膀胱氣虛而小便頻數。當補脾而補肺。若膀胱陰虛者。須補肺而益腎。總之不拘老年少壯以及產婦。小便黃赤而熱者爲實熱。清白不熱者爲虛寒也。

小便不禁門方

家菲子丸

治遺溺夢遺白濁

家菲子

炒六兩

鹿茸

酥炙四兩

肉苁蓉

酒浸去甲

牛膝

酒浸

熟地黃

當歸 各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

各一兩五錢

杜仲

炒

石薺

桂心

乾薑

各一兩

爲末酒糊爲丸如

梧桐子大每服五十丸加至百丸空心鹽湯溫酒下

固脬丸

治睇脫虛

兔絲子

二兩

茴香

一兩

附子

泡

桑螵蛸

炙各五錢

戎鹽

二錢五分

酒糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心米

飲下



牡蠣丸

治小便滑脫遺精神效

牡蠣

三兩白者入磁餅內用鹽泥封固炭五斤煨半日取出研極細末

赤石脂

三兩搗碎醋拌勻濕于生鐵銚內慢火炒令乾研如粉

酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯下

白薇散

治膀胱虛熱小便不禁

白薇

白斂

白芍藥

各等分

每服二錢粥飲下

大兔絲子丸

治腎虛小便不禁

兔絲子

洗淨酒浸

澤瀉

鹿茸

去毛酥炙

石龍芮

去土

肉桂

附子

去皮炮各一兩

石薺

去根

牛膝

酒浸一宿焙乾

熟地黃

白茯苓

續斷

山萸肉

去粗皮炒

杜仲

酒洗焙乾

肉蓯蓉

酒洗焙乾

防風 去蘆

補骨脂 去衣 酒炒

沉香 華澄茄

巴戟 去心

茴香 炒各 三兩

桑螵蛸 酒浸 炒

五味子 覆盆子 去枝 華萼

芎藭 各五 錢

為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五

十九空心溫酒或鹽湯下

補脬飲 治產時傷脬 小便漏出

生黃絲絹 一尺 剪碎

白牡丹 根皮用 千葉者

白芨 各三 錢

為末水一碗煮至絹爛如楊空心頓服服時不得作聲作

聲即不效

黃雄雞腸數十條洗淨炙黃研末每服二錢神效