


婦人大全良方



貳五

共八

新編婦人大全良方卷之二

衆疾門

經脈不調衆疾生焉故以次之

極一方總論第一

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象效法之有類原茲婦人之病與男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治不亦言之深乎但三十六病產蓐一門男子無之其如外傷風暑寒濕內積喜怒思飲食良房勞虛實寒熱悉與大夫一同也依源治療可得而知之

產寶方論第二

古者治婦人別著方論者以其胎妊生產明傷之

新編婦人大全良方卷之二

異况婦人之病比之男子十倍難療蓋女子嗜慾多於大夫感病倍於男子加之慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深治之難差况懷胎妊娠而挾病也不特避其毒藥仍須審其虛實冷熱而調治之無使妄投湯劑以致夭枉

博濟方論第三

夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣則風冷乘虛而干之或作之於經絡或循入於腹中內受風邪脾胃虛弱故不能消於飲食也食既不充榮衛凝澁肌膚黃燥面不光澤若大腸氣虛則變為下利若流入關元致絕子嗣隨其所傷而變成疾醫經曰凡婦人三十六種病

皆由子臟冷熱勞損而挾帶下起於胞內也是故衝任之脉為十二經之會海婦人之病皆見手少陰太陽之經而候之

冠宗奭論第四

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪隗之家居奧室之中處惟慢之內復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤已浮謂之易已形氣相失謂之難治色大不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫者人止據脉供藥其可

得乎如此言之於能盡其術也此醫家之通患世
不能草醫者不免盡理質問病家見所問繁速為
醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲是齊
侯之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難
也已
通用方序論第五
夫通用方者蓋產前產後皆可用也或一方而治
數十證不可入於專門皆是各賢所處世之常用
有效之方雖曰通用亦不可刻舟求劍按圖索驥
而膠柱者也

加減四物湯治婦人經病或先或後或多或少疼
痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露多

或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後塊不散
或亡血過多或惡露下服之如神○張聲道云此
方治婦人百疾只是四物湯加茱萸煎服若陽臟
少使茱萸若陰臟多使茱萸吳興周端仁郎中頃
赴省試照曠一鄰案出場云某本醫家凡婦人百
病只是四物湯加茱萸無不效者謹以此為報

仲方加
香附子

當歸

白芍藥

川芎

陸氏云川

生乾地黄

洗焙

養生

必用方

熟者

和劑

亦然

者

合用生

者為是

宜熟者

女子

宜生者

者

者

者

右等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分
去滓取六分清者帶熱服食前服若平常血氣

不調及常服只用於方月三日服治經血凝
滯腹內血氣作疼加莪荑官桂等分用之王頌云
不熟地黃滯血安能止痛如因產後欲推陳致新
補血海治諸疾加生姜煎若胎動不安下血
也每服加艾葉五七片更加葱白阿膠未減四味
之半當歸用小半如疾勢甚者以四味各半兩
細剉以水四盞熟艾一塊如鷄子大阿膠五七
片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡有粉
草乾姜日二三服至二膈為一七日以前產後
黃耆每日可一二服如氣虛弱血海不調服一月
不妨如產後被驚氣滯種種積滯敗血一月
內惡物微少敗血作病或脹或疼曾膈脹悶或

寒熱四肢疼痛加延胡索沒藥香白芷與四
物等分為細末淡醋湯或童子小便酒調下
如血風於產後乘虛發作或產後傷風頭痛發
熱百骨節痛加荆芥穗天麻香附子石膏藿香
各一分四物料共一兩中加之每服三錢水一
盞煎七分服如虛熱心煩與血相搏口舌乾
渴欲飲水者加桔樓根一兩麥門冬去心三分
如腹刺痛惡物不下加當歸芍藥一分計如血
崩不止加熟地黃蒲黃各一兩嘔逆加白朮人
參各半兩如寒熱往來加炮子乾姜牡丹皮
各一分因熱生風加川芎一分柴胡半兩
腹脹加厚朴枳實各一分身熱脈數頭昏項

強加柴胡黃芩各半兩 如臍腑滑泄加桂心

附子炮熟各一分 若虛煩不睡加竹葉人參各

一分 煩躁引飲頭痛大渴加知母石膏各半

兩若水停心下微吐逆加木猪苓防己各三分

同煎 若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不調

只用生姜薄荷如常煎服 此是婦人常服之藥 蓋味寡而性緩效遲

深而効一方治婦人血虛心腹疼痛不可忍者去

地黃加乾姜名四神湯 治老人風秘加青皮

等分煎服 一方治小便秘澹大便秘加大黃桃

仁去皮尖炒黃減半煎 一方治血痢不止加

阿膠艾葉煎 陳氏方治痢疾腹痛 一方治婦

人腹痛作聲經脉不快加熟地黃一倍添桂心

半倍煎治瘡疾加荆芥酒煎常服 一方添柴

胡名五神湯柴胡大能補虛退虛熱 一方以

四物湯共四兩為細末煉蜜為圓如梧桐子大

空心米飲下三四十圓以療年高婦人白帶又

良驗也請詳用之 一方四物湯共四兩加其

草半兩細末煉蜜為圓每兩作八圓酒醋共半

盞溫湯同化調停下名當歸煎去敗血生好血

如人行五里再進一圓無時候 用生地 黃為正 此藥不

知起於何代或云始自魏華他按巢氏云他之

術精微方類羣省傳稱他術鍼灸不過數處千

金方云自三代以來醫方藥論未有如此詳備

者其間有漢晉名公諸方今產寶方乃未梁時

節度巡官外詹所撰其中有四物散因朝太平
興國中修入聖惠方者數方自後醫者易散為
湯雖無傑特之功但善用者若馭良馬以意驅
策之則隨意無所不至自可珍也自皇朝以
來名醫於此四物中增損品味隨意虛實寒燥
無不得其效者然亦非止婦人之疾可用而已
懷娠產前後加減良方

川芎洗

當歸

桂心不見火

白芍藥洗

右四味各為細末取淨一兩各隨病證加減用
產前初覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下
產腹痛甚川芎芍藥當歸各半錢桂末一錢温

酒下扶產婦運行 產後惡露未快川芎當歸
各半錢童子小便調下仍時時打醋炭令香不
絕則血脉自收安樂無病切不可妄投藥恐遂
血過多則心虛氣劣三日內只服當歸川芎末
各一錢童子便調下日三服三日後只服四順理
中圓空心童子小便吞下 七日內補虛當歸
川芎末各一錢童子小便或米飲調下 七日
外方可服補藥補得太早則留住惡血 總平
善四味各半錢童子便調下 產後頭昏目暈川
芎芍藥當歸末各半錢童子小便調下未滿月
已滿月四味各半錢水一盞煎至八分温服
腹痛當歸末一錢桂心末半錢童子小便調下

心胸煩悶當歸芍藥各一錢童子小便調下
惡露過多桂心芍藥當歸各一錢童子小便調
下大便冷用理中圓水一盞煎八分溫服
佛手散治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾總產
了未進別物即先服此藥能除諸疾遂敗血生新
血

川芎二兩 川當歸三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫
服一方為粗末每服四錢水七分酒三分同
煎至七分熱服將產前先安排此藥將兩服藥
未煎之產了速進之三日內日二服三日外日
一服一方名芎歸湯只是此二味等分哎但

水煎專治失血傷胎去血產後去血崩中去血
金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心
煩眩暈胸絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉
能治之若產後眩暈宜加芍藥服之一名桂
香散治產後腹痛不可忍者加桂心等分酒與
童子小便合煎服之立效一名當歸湯治妊
娠子死或未死胎動不安每服用酒水合煎連
進數服胎若已死服之便下若未死其胎即安
此經累效萬不失一一名琥珀散臨月服之
則縮胎易產兼治產後諸疾一名羊肉湯治
虛損羸乏腹中疔痛往來寒熱吸吸少氣不能
支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉一兩

薑十片水二盞煎至六分溫服
治婦人室女心腹疼痛經脈不調用水煎服若
惟婦胎氣不安產後諸疾加酒煎服
當散治婦人血氣上喘下腫二味等分為細末
每服二錢空心煎艾湯調下
又治產後損身
血衝心及腹脹氣絕者神驗
難生倒橫子死
腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童子小
便一盞藥末四錢煎至一盞以上分為二服未
效再作
產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前
用黑豆加生姜自然汁半合煎服
又此藥兼
治臟毒每服一錢半入炒槐花末半錢水一盞
煎至六分無時候服三日取下血塊即愈
如

產後頭痛加荆芥煎
如吐血亦宜服

論丹參散主治
方出明理

四物湯婦人多用者以其不問產前產後經水多
少皆可通用惟丹參散一味其主治頗相類何者
以其能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶
下調經脈大類當歸地黃芍藥以芎也
丹參散治婦人經脈不調或前或後或多或少產
前胎不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞暖
脊痛骨節煩疼

丹參不以多炒
去土切

右為細末每服二錢溫酒調下經脈不調食前
服冷熱勞無時候服

勝金圓

一方名不換金圓治婦人諸虛不
治婦人
足心腹痛一各勝金丹有沉香

久虛無子產前產後一切病患兼療男子下虛無力此藥能安胎催生妊娠臨月服五七圓產時減痛婦人無子是子宮冷如服二十圓男女自至又治積年血風脚午麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死腹中透臍痛氣滿煩悶失蓋汁不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口禁產後痢疾消渴眼前見鬼迷運敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無疫血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞心產後血癖產後羸瘦凡婦人眾疾不論年月日深並皆治之

白芍藥

藁本

石脂

皆可

川芎

不見

牡丹皮

當歸

白茯苓

人參

白薇

白芷

桂心

延胡索

白木

沒藥

甘州

可沒

藥其草

咸羊

下

下

下

下

因右十五味等分為細末煉蜜為圓如彈子大每

五服一圓溫酒化下初產子並用熱醋湯下空心

食前服此方係王承宣皇祖傳渠家凡婦人懷

胎身便服此藥甚神妙常服尤好係在京師於能

下家傳到治婦人諸疾產前產後風虛痲冷赤足

金鈕專治婦人諸疾產前產後風虛痲冷赤足

癰痺豆淋酒化下血風頭痛產後中風荊芥酒化
 下產前產後痰涎咳嗽桑白皮湯下經脈不調或
 前或後或多或少血氣攻刺腰膝重痛溫酒化下
 經脈不通產後血喘蘇木人參煎湯化下血崩不
 止赤白帶下側柏燒灰調酒下妊娠將理失宜或
 因驚動痛極妨胎漏胎下血膠艾煎湯化下臨產
 艱難乳香研酒化下子死腹中胎衣不下用朴消
 三錢重研細童便和酒化下產後勞倦傷敗血氣
 如癰寒熱遍身疼痛喘嗽盜汗地黃烏梅煎湯化
 下產後敗血浮腫姜汁少許和酒半盞化下產前
 服之則安胎臨產亦易產產後則逐去惡血不生
 諸疾用童便和酒化下常服活血駐顏大暖血海

升降陰陽滋養榮衛或子宮久冷多病少子能久
 服之見效立致忌生冷油膩魚腥猪母白猪一切
 毒物

如當歸 白芍藥 川芎

石斛酒炒 香附子炒 糯米 各二兩 炒

降真香細剉 熟地黃 各四兩 秦艽 各二兩 炒

貝母去心 羌活 桂心 各二兩 炒

乾姜炮 地細辛 各二兩 炒

牡丹皮 大豆卷炒 茴香炒 各二兩 炒

枳殼 延胡索 白芷 各一兩 炒

人參 木香 石膏煨 各一兩 炒

沉香 黃芩 各半兩 川椒 三分

瘰癧交加修製下血黃空補後淋酒化

下右為細末煉蜜為圓每兩作七圓依前服餌常

前服温酒化下檀峯曉方腰白化下

交加散治產前後百病治婦人榮衛不通經脉不

調腹中撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風尤妙

生地黄一斤研取生薑十二兩研

右將地黄汁自然汗炒生薑自然汁炒地黄自然汁各稍乾

焙為細末每服三錢温酒調下尋常腹痛亦宜

服產後尤不可缺

交加散治榮衛不和月經湛濁大能滋養血絡逐

散惡血脐腹撮痛腰腿重墜血經諸疾並皆治之

生薑十二兩生地黄一斤如前注

白芍醋延胡索紙裏煨令熟

當歸布標桂心去皮紅花炒無惡

沒藥半兩蒲黃一兩右為細末每服一錢温酒調下如月經不依常

蘇木煎酒調下若腰疼用糖子煎酒調下無

時候未乾發圓每斤重斤重斤重

玉露通真圓治婦人諸疾出經驗婦人方

半夏製人參各食茱萸醋炒

製厚朴各澤蘭葉二甘草醋炒

蟬蛻炒白芍藥石膏

蠶蛻炒白木熟地黃洗焙

當歸故紙三張代替蟻活熟地黃洗焙

白茯苓 各二

防風

乾姜

右栝子仁

蒼朮

白薇

服米香

黃耆

川牛膝

交加附子

白蕪荑

與蟬蛻同炒然此方無蟬蛻想馬鳴蛻是

調服也

川芎

藁本

王不留行

苦梗 各三

白芷 半一西

右為細末煉蜜為圓每九錢重分作十圓切記

煉蜜無令太過及生男子婦人諸虛不足狀

如勞疾黃耆煎酒下血氣痛燒秤鎚淬酒下

產前安胎用醋湯下產後諸疾用酒或鹽湯

下產前產後瀉用米飲送下男子婦人牙

疼用半圓指疼處良久鹽湯燕下產前產後

血暈用童子小便送下經脈不調用紅花煎

酒送下產後風毒生瘡疥荊芥茶下冷痰

翻胃醋心乾噤下婦人子宮冷崩漏赤白

帶下用童子小便米醋好酒一處煖熱下

補中圓常服

川芎

白芍藥

黃耆

當歸

人參

陳皮

白朮

地黃

右為末煉蜜圓如梧子大每服五七十圓溫水

下

二聖散 產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不

下方

下石川芎

羌活二味

二君為細末每服二大錢水七分盞酒少許煎七沸溫服

二聖大寶琥珀散

生地黄 一升

生薑 如前交二味修製

當歸

川芎

牡丹皮

芍藥

莪茂

蒲黃

蘇香白芷

羌活各八味

桂心不見

熟地黄炒

右十味各一兩同煎二味為細末於釐合內收之湯使于後婦人冷氣痛并血海不調膈氣炒姜酒下二錢 產後胞衣不下暖酒調下二

錢 產婦臨月日進三服則滑胎易產溫酒調

二錢 產後血犯心眼见鬼神用童便半觔酒

半盞同煎調二錢 婦人久服則顏色紅白無

血來相攻一生無子者久服則有孕 此藥治

療婦人百病空心日午食前日二服產後百病

並暖酒調下

朱翰林白木煎治婦人胎前產後血氣諸疾出方

木香半升 三稜身 莪茂

白朮炮 枳殼去穢 白茯苓

當歸 延胡索 人參

熟地黄 牡丹皮 粉草

右為未米糊圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓常服温酒吞下湯使于后胎前渾身并脚午痛炒姜酒下胎前腹内疼并安胎紫草煎酒下胎前嘔逆吐食糯米飲下胎前飲食不得渾身倦怠夏淋酒下胎前渾身發熱并草湯下胎前咳嗽煨姜鹽湯下胎前頭痛煨葱茶下胎前產後浮紫蘇姜酒下催生胎衣不下嚼葱白三寸煨酒下產後赤白痢乾姜甘草湯下產後下血不止燒紗帽灰一錢調酒下無燒漆亦可產後渾身虛腫陳皮去白焙乾浸酒下頭疼薄荷茶下常服飯飲下赤白帶下燒棕桐灰三錢調酒下久年血氣

成塊築心痛温酒下炒姜酒下及良薑浸酒下皆可婦人室女經脉不通煎紅花蘇木酒下經脉不調或前或後或多或少煎當歸酒下大小便秘結燈心煎湯下乳汁不行若壅煮猪蹄羹下產後腰疼煎芍藥酒下沉香琥珀煎益榮衛滋氣血經脉不調心忪倦之腰膝疼痛赤白帶下五心煩熱面無顏色血海久冷胎孕不固增寒壯熱婦人諸疾並能治之

沉香 再煎
石斛 去根切
沒藥 研
續斷 十四
肉桂 大者煎
五昧子
附子 炮
阿膠 各半
茯苓 酒洗

右人參
木香
右為末蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心酒吞下日午再服

滋血湯滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷二方

當歸
川芎
芍藥
牡丹皮

人參
麥門冬
酸枣仁炒

阿膠各二兩
琥珀三別研
酸枣仁炒

粉草
桂心各一兩
半夏曲一兩

右為粗末每服三大錢水一盞薑三片煎七分去滓溫服一日三服

烏鷄煎圓治婦人石病出三因方

吳茱萸
良薑
白薑

當歸
芍藥
延胡索

椒炒
陳皮
青皮

劉寄奴
生地黃
莪茂

川芎各一兩
荷葉灰四兩
乾艾二兩

破故紙一兩

右為細末醋煮麪糊圓如梧子大每服四五十

圓月水不通紅花蘇木酒下白帶牡蠣粉

酒下子宮久冷白茯苓煎湯下赤帶建茶

清下血崩豆淋酒調懸灰下胎不安蜜

和酒下腸風陳米飲調百草霜下心疼葛

積散如中痰則有參蘇飲如中寒則有理中湯如
中喝則有白虎湯如的然見得是中風如三生飲
木香煑散排風續命風引大小竹瀝大八風湯至
寶丹牛黃清心圓辨其冷熱虛實而投之未有不
安者也然此疾積襲之久非一日所能致今人服
藥三五服便責無效其責醫者亦速矣正宜大劑
久服方有其效孟子曰七年之病求三年之艾也
婦人中風方論第一
夫中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常
以冬至之日自坎而起候其八方之風從其卿來
者主長養萬物若不從其卿來者名為虛風賊害
萬物人體虛者則中之當時雖不即斃停在肌膚

後或重傷於風前後重沓因體虛則斃入臟腑俞
俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞而乃斃病
婦人血氣虛損故今中風也當察口眼閉闔以別
重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開
涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者
死

至寶丹蘇合香圓五積散
見和方大八風湯方具論
排風傷治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏狂言妄
語精神錯亂及風入五藏等證詳見和劑方

桂心 白鮮皮 白木 川芎 白芍藥 當歸

喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六
脈沉伏或指下浮盛並恒服之兼治痰厥飲厥及
氣虛眩暈悉有神效

生南星 一分
生烏頭 去皮生附子 各半兩

右咬咀每服半兩水一大瓊生薑十片煎至六
分去滓溫服或口噤不省人事者用此細辛皂
角各少許為細末或只用半夏為細末用少許
以蘆管吹入鼻中俟噴嚏其人少甦然後進藥
如氣盛人只用南星五錢重木香一錢加生薑
十四片煎作兩服飲之名星香飲
參蘘飲 治痰飲停積胸中中皖閉塞嘔吐痰涎眩

暈嘈煩忪悸噦逆及痰氣中人停留關節手足羸
曳口眼喎斜半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如
傷寒

人參 紫蘇葉 半夏
茯苓 乾葛 前胡 各三分
甘草 木香 陳皮
枳殼 製 苦梗 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎
七分去滓空心溫服腹痛加芍藥

木香煮散 治左癱右瘓并索有風溫諸藥不效常
服調氣進食寬中

蘇沈良方
麻黃 去節 各防風 三分

白木

南木香

大川烏炮

人參

當歸

陳皮

檳榔

草豆蔻

白茯苓

甘草

黑附子炮

牛膝

杏仁

川芎

桂心

附子理中湯

治五臟中寒

口禁四服強直失音不

麻天門冬知母... 衆醫以此為不可治也... 溢瀉以此真凡脈也... 愈次以木香煮散而先投參藜飲六服先寬氣下

語昔有武士守邊大雪出帳外觀膽忽然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥而劑遂醒

大附子炮 人參 甘草 白木 等分 乾姜炮

右細剉每服四錢重水一錢半煎七分去滓不

以時候服口噤乾開灌之

氏病氣弱倦怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食

熱藥無效石僕診之六脈強而兩關差甚

非特獨甚此何中證也僕嘗曰脈似觀之六部既寒

加減小續命湯 治卒暴中風不省人事漸覺半身

不遂口眼喎斜手足戰掉言語蹇澁肢體麻痺神
情昏亂頭目眩重疼涎併多筋脉拘攣不能屈伸
骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚
氣緩弱久服得差久病風人每遇天色陰晦節候
變更宜預服之以防瘧症

麻黃去根 防己 人參去芦
黃芩 桂心 甘草
白芍藥 川芎 杏仁各一兩

附子炮半 右咬咀每服五錢水一瓊半薑七片棗兩箇煎
至七分去滓不以時候服取汗隨人虛實與所
中經重有人脚弱服此六七劑得差 精神恍

惚加茯神遠志 骨節煩痛有熱者去附子倍

芍藥心煩多驚者加犀角半兩骨間冷痛者倍

用桂附 嘔逆腹脹者倍人參加半夏一兩

躁悶大便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎

服 臟寒下利者去防己黃芩倍附子一兩加

白朮一兩古今錄驗有 救急無芎藭杏仁止

十味 延年無防風違失 便利產後失血并

老人小兒用麻黃桂心甘草各一兩 一法治

或歌哭或笑語無所不及用麻黃三兩人參桂

枝白朮各二兩無附子防風生姜有當歸一兩

自汗者去麻黃杏仁加白朮 脚弱加牛膝石

斛各一兩 身疼痛加秦苳一兩 腰疼加桃

仁杜仲各半兩
加黃芩三分
冬加附子秋加當歸
失音加杏仁一兩
春加麻黃

小風引湯

防風

川芎

人參

甘草

獨活

北五味子

白芍藥

細辛

肉苁蓉

白朮

右吹咀每服三錢水一盞姜三片杏仁五箇去皮尖槌碎同煎至七分去滓溫服
如加麻黃
從蓉附子當歸各半兩
即大風引湯

千金竹瀝湯大治熱即生風

竹瀝二升

生薑汁一升

生薑汁三合

右三味相和溫暖分三服朝晡夜各一服

必效竹瀝湯治中風涎潮譫語昏寒四肢緩縱

秦芫

附子各一分

防風

獨活

右吹咀以水四瓊煎至二盞入生地黄汁淡竹瀝各半盞再煎四五沸去滓分作四服無時熱服病勢去以他藥扶持未愈再作近世貢人用之多有神效

燒竹瀝法

新竹截尺許長去節作兩邊用兩磚對立相去八寸置竹仰在磚上急著焰火燒之磚外兩頭以梳盛瀝瀝盡以緇澄清夏秋須沉冷水中以

防瀝酸凡大熱有風久亦可單服冷暖隨人勿
過度荆瀝亦然

婦人中風角弓反張口噤方論第二

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經
也人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之
經則腰背反折舉急如角弓之狀宜用小續命湯
前見
活人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體
強直口噤皆反張作瘳治之屬大陽經先因傷風
又感寒濕而致然也古人謂之瘳病外證發熱惡
寒與傷寒相似但其脈沉遲弦細而項背反張強
硬如瘳痲之狀比為異耳
新產血虛多汗出當察
喜中風亦有此證

有汗無汗以分剛柔二瘳無汗惡寒名剛瘳有汗惡寒名柔瘳

瘳屬剛瘳陰瘳屬柔瘳無汗葛根湯主之有汗

桂枝加葛根湯主之凡剛柔二瘳小續命湯並可

與之有汗者去麻黃加葛根苦杏仁知剛瘳者胸滿

口噤其人卧不著席脚牽急咬齒當行大承氣湯

注云外臺云熱而瘳者死也附木湯桂枝散

木散附子防風湯物白木湯桂枝散

可選而用之解感論云合面而卧為瘳瘳仰目者

也瘳

葛根湯

治剛瘳無汗惡風

產後有疾凡用

葛根

麻黃

薑錢

桂枝

粉草

芍藥

防風大棗 三介 右 汗為度 每服三錢水一錢煎七分去滓溫服取

桂枝加葛根湯 治柔痙有汗不惡寒

桂枝 芍藥 甘草 各六錢

乾葛 三兩 生薑 一兩 棗 四枚

右 咬咀 每服三錢水一錢煎七分去滓溫服取

汗為度

大棗氣湯 用此藥故不錄

附木散 治傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止項

強直搖頭口噤

附子 白木 各一兩 川芎 三錢

肉桂 二兩 獨活 半兩

右為細末每服三錢水一盞煎至一

半溫服

桂心白木湯 治傷寒陰痙手足厥冷筋脉拘急汗

出不止

白木 桂心 附子 炮

防風 川芎 甘草 各半兩

右 咬咀 每服五錢水二盞薑四片棗三枚煎八

分去滓溫服

附子防風散 治傷寒陰痙閉目合面手足厥逆筋

脉拘急汗出不止

紫胡 半兩 五味子 白木 各一兩

茯苓

甘草

乾薑

附子炮

防風各三

桂心半兩

右為粗末每服三錢薑四片水一盞煎七分去滓溫服

八物白木散治傷寒陰瘕三日不差手足厥冷筋

脉拘急無汗恐陰氣內傷

白木

麻黃去根

茯苓

五味子

羌活各半

附子炮

桂心各三

良薑一分

右為粗末每服四錢水一盞薑四片煎七分去

滓溫服用凡用麻黃宜斟酌

白僵蠶散治婦人中風角弓反張口噤不能言皮

層頑痺筋脉抽掣

僵蠶

烏蛇肉炙

天麻

獨活

南星炮

川烏炮去

天南星防風

蟬蛻洗

白附子炮

急而犀角層

朱砂研

桑螵蛸各半

交加麝香

右為細末每服一錢溫酒調下無時候

烏蛇圓治婦人中風牙關緊急手足頑麻心鼻痰

涎壅滯

杏烏蛇肉炙

白附子炮

南星炮

獨活

烏犀層

僵蠶炒

全蝎炒

半夏麩

麻黃去根

當歸

晚蠶沙各半

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓温酒吞下亦治角弓反張

婦人中風口噤方論第三

夫婦人中風口噤者是體虛受風風入額頰夾口之筋也手三陽之筋結入於額頰足陽明之筋上夾於口而風挾今柔虛入其筋則筋牽故引牙關急而口噤也

天南星散治婦人中風口噤四肢拘急

天南星姜汁炒黃 白附子炮 黑附子炮

烏蛇肉酒炙 全蝎等分

右為細末每服半錢以生薑汁温酒調下無時

柳開口灌

走馬散治婦人中風口噤四肢強直

黑附子炮 天麻各半 桂心

石膏 麻黃去根 蝎稍炒

右為細末入研藥令停每服一字無時豆淋酒

音調灌 烏蛇散治婦人中風口噤

烏蛇肉炙 全蝎炒 天麻

右為細末入臍粉令停每服一字以生薑酒調

灌下

竹

廿六

婦人中風不語方論第四
巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌下心之別脉
係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉
嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶古者聲
之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無
音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語經云醉
卧當風使人癡瘖
神仙解語丹治心脾經受風言語蹇澁舌強不轉
涎唾溢盛及療淫邪搏陰神內爵塞心脉閉滯暴
不能言

白附子炮

石菖蒲去毛

遠志去心并草
水煎十沸

白僵蠶炒

南星半膽釀各如

右為細末煮麪糊為圓如梧桐子大量入辰砂
為衣每服二十圓至三十圓生薄荷湯吞下無

防風湯

治中風內虛脚弱語蹇

石斛酒炒
丹參各一兩
麥門冬各一兩

乾地黄
防風
杜仲去皮切
川芎
桂心
獨活

右吹咀每服五錢水盪半棗二枚煎至八分去
滓溫服

竹瀝湯

治中風入肝脾經年四肢不遂舌強語蹇

竹葉 歲靈仙 附子 炮 苦梗 去 糖 煎

蔓荆子 防風 枳殼 去 糖 煎

右吹咀 每服四錢 水一盞 竹瀝半盞 姜三片 煎

至八分 温服 日四服 忌茶

婦人風痺 手足不隨 方論第五

夫婦人風痺者 由風寒濕三氣合而為痺 風多者

為風痺 其狀肌層盡痛 諸陽之經皆起於手足而

循行於身體 風寒之氣容於肌層 始為痺 復傷陽

經隨其虛處而停滯 與血氣相搏 血氣行則遲緩

使機關弛縱 故風痺而復手足不隨也

療

川續斷

桂心

白茯苓

甘草

川芎

牛膝

右吹咀

為末

每服五錢

水一盞

姜三片

煎

杜仲 去皮切 防風

華陰細辛

當歸

秦艽

獨活

黃耆

生地黄

白芍藥

人參

煎

藥

不

三五七散 亦妙 不復贅錄

尋者治中風方續命排風越婢等悉能除去而于
金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則
不能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者
更用麻黃則津液轉使脫泄反為大害中風自汗
仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼眈動遍
身汗出者豈勝對治當此之時獨沽湯續命煮散
復榮衛却風邪不可闕也

獨沽湯治風虛昏憤不自覺知手足棄縱坐卧不
能或發寒熱血虛不能眠發汗藥及中風自汗先
宜服之

川獨沽

羌沽

人參

防風
茯神
去木

當歸

北細辛

白薇
川芎
各半

半夏

遠志
去心

菖蒲
去毛

右吹咀每服五錢水盞半薑五片煎七分去滓
無時溫服

續命煮散治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼
眈動或時搐搦亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛
去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風

獨沽

當歸

人參
芍藥

細辛
川芎

葛根
甘草

熟地黄

羊夏

遠志

去心

荆芥穗

桂心

半七錢

右吹咀每服五錢水一盞生薑三大片煎至七

分去滓溫服不拘時汗多不止者加牡蠣粉一

分半

婦人臂痛方論第七

論曰夫婦人臂痛筋脉牽急不得屈伸遇寒則劇

由肝虛為風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋

節不榮則乾急而痛其脉緊細宜服栝子仁圓舒

經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由

中腕伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬

於脾胃氣滯而氣不下上攻於臂故痛其其脉沉細

栝子仁圓

控涎丹

栝子仁圓

王氏指迷方

栝子仁

乾地黄

茯苓

枳實

覆盆子

北五味

附子

石斛

鹿茸

酸枣仁

桂心

沉香

黃耆

石斛

鹿茸

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三

十圓

舒經湯

治臂痛又各五痺湯亦治腰下疾

栝子仁

甘草

羌活

白朮

海桐皮

當歸

赤芍藥各二

右為粗末每服三錢水一盞羊煎至七分去滓
溫服如腰以下疾空心服腰以上疾食後服

茯苓圓

茯苓一兩 半夏二兩 枳殼見羊製

風化朴消一分

右四味為末姜汁煮糊為圓如梧桐子大生姜
湯下二十圓食後服

控涎丹

凡人忽患曾背手足頸項腰膝隱痛不可
忍連筋骨盍隱釣痛坐卧不寧時時走易不定俗
醫不曉謂之走疰便用風藥及針灸皆無益又疑
是風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰

涎伏在心膈上下妄為此疾或令人頭痛不可舉
或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉
中如鉅聲多流睡涎于脚重睫冷痺氣脉不通誤
認為癰瘕亦非也凡有此疾但以此藥不過數服
其疾如失

甘遂去心

大戟去皮

真白芥子各等

右為細末糊圓如梧桐子大臨卧淡薑湯吞下
五七圓如痰猛加至十圓

白芥子散

治臂痛外連肌肉牽引背脚時發時止
此由榮衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏
其痛發則有似癰瘕

真白芥子

木鼈子各二兩

沒藥 別研

桂心

木香

各半

右為細末

入研藥

令停每服

一錢

溫酒調下

下

流氣飲子

紫蘘葉

青皮

苦梗

大黃煨

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃耆

枳殼

防風

甘草

橘皮

木香

皮連大腹

二兩

姜汁

炒

右吹咀每服五錢

水二盞

姜三片

棗一枚

煎一

盞去滓服

婦人賊風偏枯方論第八

論曰賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也

人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體

名為偏風也其風邪入深真氣去邪氣留為偏

枯此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於

肌故令偏枯也

論曰夫偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨痛疼

痛神智如常名曰偏枯僕原疾之由皆由陰陽偏

虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風衝坐風邪

乘虛而入疾從斯作內經云汗出偏沮使人偏枯

詳其義理如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯

槁然後被風所害人之身體或有一邊血氣不能

榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然王子亭

有云舟行於水人處於風水能浸舟而亦能覆舟
風能養體而亦能害體蓋謂船漏水入體漏風傷
古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先
宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損
茵芋酒續斷湯

大八風湯

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

當歸

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

杏仁

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

甘草

桂心

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

乾姜

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

五味子

升麻

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

川烏

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

黃芩

芍藥

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

獨活

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

防風

川芎

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

麻黃

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

秦艽

石斛

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

人參

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

茯神

石膏

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

黃耆

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

紫苑

大豆

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

右為粗末每服五錢水二盞酒一合煎至一盞

去滓溫服恍惚者不用酒煎

增損茵芋酒

治半身不遂肌肉乾燥漸漸細瘦或

時瘖痛病名偏枯

茵芋葉

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

川烏

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

石楠葉

防風

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

椒

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

女萎

附子炮

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

北細辛

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

獨活

卷栢

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

肉桂

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

天雄

秦艽

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

防已

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

躑躅花

當歸

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

生乾地黃

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

芍藥

右咳吐酒二斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初服一合漸增之以知為度令酒氣相續指出

續斷湯治偏枯少血

當歸 三兩

陳皮

芍藥

北細辛 各一兩

生乾地黄 二兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服臟寒多利者入熟附子一兩和前藥

偏風口喎方論第九凡五方

論曰偏風口喎者是體虛受風風入於夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛風因虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也

防風湯

治卒然口喎

斜言語卒急四肢如故別無

所苦

防風 一兩

羌活 半兩

甘草 一分

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入麝香研一字溫服

治口眼喎斜

用草麻子七粒去皮殼細研作餅安在掌心右

安左手左却用銅盃乘湯坐於藥上纔正即洗去

去用一方用已豆不

廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方

生地黄汁一升竹瀝一升獨活三

右相和煎取一升頓服未正更進一劑吐四

深師續命湯療中風口僻喑諸疾卒死不知人補

虛起死神方

蘇人參 杏仁 面品 防已 黃芩 芍藥 甘草

黃芩 芍藥 甘草 防已 黃芩 芍藥 甘草

附子 炮 防風 生薑 桂心 五兩

右切以水一斛二升煮取三升分為三服不差

復作忌海藻松菜桃李生菜葱雀肉猪肉

又千金方

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服又

方用大皂莢五兩去皮子為末以三年大醋調

如左唱塗右右唱塗左 乾更塗

婦人血風心 神驚悸論第十

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為

諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心

神虛弱致風邪乘虛于之故驚而悸動不定也其

驚悸不止則憂恍惚而憂懼也亦可用

伏神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

伏神 去木 人參 龍齒 別研

獨活 酸棗仁 各一兩 防風

遠志 去心 桂心 細辛

白朮 各三兩 甘草 乾薑 各半

右為粗末每服四錢水盞半煎至八分去滓溫

服

此方

此方

龍齒圓治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不安

龍齒別研

茯神各一

朱砂研

人參

當歸

天麻各三

犀角屑

檳榔

防風

生乾地黄各半

遠志去心

赤箭各一

麝香一錢

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓薄

苛湯酒下

朱寶琥珀散治婦人血風

琥珀研

沒藥研

木香

當歸

芍藥

白芷

羌活

乾地黄

延胡索

小芎各半

土瓜根

牡丹皮去心

白木

桂心各一

右為末每服一錢水一盞煎至七分益酒三分

再煎少時煎服重者數服効

失血過多心神不安方第十一

忘乎志膏治婦人因失血過多心神不安言語失

常不得睡

酸棗仁炒

辰砂研

琥珀各一

人參

白茯苓

琥珀各一

滴乳一錢

右為末和停每服

一錢濃煎

心寒湯空心調

下彈子大薄苛湯化下

一圓糖

龍

婦人風邪顛狂方論第十二

夫婦人顛狂病者猶血氣虛受風邪所為也人稟

陰陽之氣而生而風邪久并於陰則為顛入并於

陽則為狂陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所

并則癡也顛者卒癡意不樂直視仆地吐涎沫口

喎目急牛足撩戾無所覺知良久乃甦狂者少卧

不飢自高賢也自辨智也自貴侶也妄笑好歌樂

妄行不休故曰顛狂也

防風散治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無

度或心神恐懼或言語失常

防風
人參

茯神
遠志

獨活
龍齒

菖蒲
去毛

石膏

牡蠣
各一兩

秦艽

禹餘糧

桂心
各兩

甘草
三分

蛇蛻
炙一尺

右為粗末每服三錢水饑半煎七分去滓温服

又一方

羚羊角屑
獨活
遠志
去心

菖蒲
去毛
防風
各兩

石膏
麥門冬
去心
龍齒
剉研

白鮮皮
各一兩
人參
生乾地黄
各三分

右為粗末每服三錢水盞半煎七分温服無時

素問云陽厥狂怒飲以鐵落

木之
意
鐵落
出於肝以金制

山梔子
 枳殼去穢
 蜈蚣二條炙
 陳皮
 黃芩各一
 檳榔二箇
 麻黃根去
 芥草
 金蠟切

右為細末每服二錢溫酒調下
 人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人
 目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但
 她眩暈移時方寤此由汗過多血少氣併於血陽
 獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還
 陰陽復通故移時方寤名曰昏冒亦名血厥婦人
 多有之宜服白薇湯倉公散

白薇湯方

白薇
 當歸各一
 人參各一

新編

甘草一分
 右吹咀每服五錢水二觔煎至一觔溫服

倉公散

治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便死
 不知人及卧覺噉脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末九蒼
 雄黃研
 礬石煨研
 黎蘆末

右為末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活
 未嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂莢
 者為正

白木散

治中風身體麻痺不仁
 白木炒
 芍藥
 當歸酒洗焙
 虎骨酥炙

烏蛇肉各半

右為細末每服五錢七温酒調下藏寒多利者

加附子半兩骨中煩熱者加生地黄一兩

新編婦人大全良方卷之三

新編婦人大全良方卷之四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也
芎藭散治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎一兩

酸棗仁炒

木香用酒

赤茯苓

桂心

川牛膝各

赤芍藥

當歸

羌活各

錢羊枳殼去根

右為麤末每服三錢水一大盞姜三片煎至七

分去滓批服無時候

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸枣仁炒 生乾地黄

檳榔各一兩 五加皮 防風

赤芍藥 當歸 骨碎補炒去

海桐皮 川芎各三 甘草半兩

右為末每服二錢温酒調下

通靈圓 治男子婦人手足痛風不可忍者

白附子 僵蠶各一兩 全蝎半兩

麝香一字 右為末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓温酒下

一日三服

當歸沒藥圓 療婦人血風血氣腹脹刺痛筋牽骨

痺手足麻木皮膚瘙痒

當歸 五靈脂各一兩 沒藥半兩

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十圓生姜

湯空心下

大效虎骨散 治血風去症疼痛丈夫筋骨疼及打

撲傷損疼痛甚者

虎骨酥炙 當歸

桂心去土 牛膝

漏蘆去土 藏靈仙去土 玄胡索

夫執自然銅製原形 右各等分為末每服二錢热酒調下每日一服

婦人血風白虎歷節走疰方論第二凡七
夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚
卒然掣痛遊走無有常處故名為走疰也加减小
續命湯主之

漏蘆散治婦人血風走疰疼痛無有常處

蘆蘆 當歸 牛膝 各三

桂心 地龍 去土 防風 各三

羌活 白芷 沒藥 研 各三

甜瓜子 各半 虎脛骨 酥炙 敗龜 各一兩

右為細末每服二錢熱酒調下無時候

四生圓治血風骨節疼痛擡舉臂不起行履不得

白殭蚕 炒去絲 地龍 去土 白附子 生

五靈脂 草烏 各去皮尖

右為末以米糊圓如梧桐子大每服二十圓茶酒任下或作末酒調半錢亦可

鹿射香圓治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲

噬盡靜夜劇及一切手足不測疼痛

大八角 川烏 頭三箇去生全蝎 二分

生黑豆 二十粒 生地龍 羊土淨

右為細末入麝香一字同研停糯米糊為圓如

菜豆大每服七圓甚者十圓夜卧令鼻空溫酒

吞下微出冷汗一身便效許學子云予得此方

痛一服立效在歙州日有一是歷節及不側此方
走疰疼痛至夜則發如虫噬其肌多作鬼邪治

病也 三服 正歷第

為藥知母湯

治諸肢節疼痛身體魁瘰脚腫如脫

頭眩失氣温温欲吐

桂心 知母 同 防風

芍藥 甘草 麻黃 去根節各

附子 炮三兩

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分

去滓空心服一法有白木川芎杏仁半夏

附子八物湯

治風歷節四肢疼痛如錐鍛不可忍

附子 乾薑 芍藥

茯苓 人參 甘草

桂心 各三兩 白木 四兩

右吹咀每服四大錢水二盞煎七分去滓食前

服一方去桂用乾地黄二兩

獨活寄生湯

最治歷節風近人用之其效見本卷

小續命湯

大治白虎歷節痛不可忍

婦人先自兩足踝骨甚痛不可忍... 於後諸藥無效... 劑而證也... 諸藥不效... 而得藥一貼... 自後與人良驗

局方治婦人血風癩瘡痒方論第三凡八方

熱血風攻疰與人參荆芥散消風散四物湯加荆

熱血風攻疰與人參荆芥散消風散四物湯加荆

芥煎或人參當歸散或逍遙散無服導赤圓如不通者食後服皂角圓氣虛老人不可久服如服皂角圓不退者此凝滯熱甚者宜先服青木香圓三兩服以開氣道却以前藥立效

夫婦人體虛為風邪氣客於皮膚復逢風寒相折別起風瘙癢疹若赤癩者由涼濕折於肌肌中之極熱結成赤癩也得天熱則劇取冷則差白癩者由風氣折於肌中肌中熱熱與風相搏所以為白癩也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得暗暖則減著衣暖亦差也脉當浮而洪浮即為風洪即為氣風氣相搏則為癩癩身體為痒凡人汗出不可露卧及浴素向云汗出見使人身振寒熱生風癩也

雷公炮炙序云遍體癩風酒調生側

何首烏散治婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血風遊走不定並宜服之

何首烏

防風

白蒺藜

枳殼

天麻

僵蠶

胡麻

羌蔚子

蔓荊子

右為細末每服二錢煎茵陳湯調下無時候

附子酒治痛風婦人血風身上瘙痒出張氏方

生附子不去皮重 皂角刺二十箇

黑豆一合

右三味細剉分為二處用好酒二瓶入上件藥

慢火煇候乾至半瓶却合作一處蜜縛泥頭經

芥子宿每服一錢溫服無時候未効又服

治女人風痺癩瘡不止聖惠方

者此蒼耳花葉子各等

治皮膚有風熱遍身生癩瘡方初虞世

又治風氣客於皮膚搔之不已方

右等分為細末無時溫酒調下方寸匕此一方出本草

又方

露蜂房洗過蜜 蛇蛻洗炙令 右為細末溫酒調下一錢日二三服

婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四凡

夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臟腑之

精皆上注於目其血氣與脈并上屬於腦也循脈

引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者

養正丹治虛風頭旋吐涎不已蓋此藥升降陰陽

黑鈆西 水銀 硫黃研

朱砂各一研

右用建瓟一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳

杖子打停取下歇少時入二味打停候冷取下

研為粉以糯米軟飯圓如菜豆大每服三十圓

麥湯吞下空心食前日二服

釣藤散治肝厥頭暈清頭目出本方

釣藤 陳皮 半夏

麥門冬去心 茯苓

人參去芦 甘菊花 防風各半

甘草一分 石膏一兩

右吹咀每服四錢水一瓊半生姜七片煎至八

分去滓熱服素問云頭痛癩疾下虛上實過在

目眩耳聾下實上虛過在足小陽厥陰甚則在
肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛
也故目眩耳聾皆暈之狀故肝軟頭暈腎厥頭

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不

知人事者

喝起草人取其嫩心不以多少陰乾為末以

常酒服一大錢七無時候其功大効服之多

連腦蓋善通項門

蔓荊子散治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇澁

痰逆不下飲食

蔓荊子 防風 羌活

羚羊角屑 枳殼

前胡

麻黃去根

甘菊花

旋復花

右為粗末

每服四錢

姜三片

水一盞

煎七分

去滓

溫服

無時候

四神散

治婦人

血風眩暈

頭痛

兒驚

衛生方

當歸

旋復花

菊花

荆芥穗

各等

石膏

荆芥穗

白芷

甘草

右為粗末

每服四錢

姜三片

水一盞

煎七分

去滓

溫服

無時候

四神散

治婦人

血風眩暈

頭痛

兒驚

衛生方

當歸

旋復花

菊花

荆芥穗

各等

赤茯苓

北細辛

葉本

味

藥

本

候

冷

取

下

藥

散

下

藥

散

下

藥

散

下

藥

散

下

藥

石菖蒲

白芷

甘草

右為粗末

每服四錢

姜三片

水一盞

煎七分

去滓

溫服

無時候

四神散

治婦人

血風眩暈

頭痛

兒驚

衛生方

當歸

旋復花

菊花

荆芥穗

各等

藥

赤茯苓

北細辛

葉本

味

藥

本

候

冷

取

下

藥

散

下

藥

散

下

藥

散

下

藥

散

下

藥

川芎散

治風眩頭暈

龐安常方

右為細末每服一錢水一錢葱白三寸茶末一錢煎至七分通口服良久去枕仰卧少時

小川芎

甘菊花野菊不用

右為細末無時候酒調二錢日三服

治女人頭旋即天動地轉名曰心眩非血風也普見

方濟

膽子礬二兩細研用胡餅削子一箇拌停放版

子上按平一指厚以蓖子勒成如散子大塊不

須界斷於瓦上焙乾每服散子大為末煎燈

心竹茹湯調下

婦人血風頭痛方論第五

許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩

如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾子嘗處
此方以授人比他藥效而捷

川芎一兩

當歸三錢

羌活

旋復花

萊陰細辛

蔓荊子

防風

石膏

藜蘆

荆芥穗

半夏麴

乾地黄

甘草

石菖蒲

朱砂

右吹咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分去

滓温服

七星圓

治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥

腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治療
生仲方先

川烏

草烏

南星

三味並不去皮

薑半夏 冷水洗

川芎

石膏

白芷 並生用

右為細末研韭菜自然汁圓如梧子大每服七

圓加至十圓嚼生葱茶送下 僕常療鄧安人頭

烏辛湯

治狀如前但發熱者不可服

生附子 去皮 烏頭 去皮 南星 各一

乾薑 炮 細辛 各一

甘草 兩半 煎至七分 去滓 温服

右吹咀每服四錢水一盞薑七片煎至七分

至六分去滓食前温服中脘素有寒者不用茶

如身... 局方如聖... 效甚速... 嗜卧... 不足而內著其氣逆而... 真圓與硫黃圓... 玉真圓方... 石膏... 硝石... 右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生薑湯下二十圓... 硫黃圓治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不

真圓與硫黃圓

玉真圓方

石膏

硝石

右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生

薑湯下二十圓

硫黃圓

治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不

治服之除根

硝石

硫黃

右研令極細滴水圓如梧桐子大空心蠟茶清吞

下而一方云中暑者以冰水服之下咽即洒然

治傷冷以文湯下

若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於

骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥

逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳

掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右

白附子散方

麻黃

白附子

烏頭

全蝎

南星

辰砂

麝香

錢研

白薑

炮

右為細末酒調一字服訖去枕卧少時

裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中祕方用生蘆

箴汁羅會一蜆殼仰卧注鼻中在痛注左右痛注

右或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈東坡

云荆公與僕言已愈數人此方自後晁將仕甫

云是有効

治頭風痛不可忍者

硝石

人中白

腦子等分

右研令極細用一字搐入鼻中

項筋強痛方論第六凡五方

此一卷論項筋拘牽強痛每得斯疾療之似易而

實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦略以

僕考之然既有斯疾必有是方何古人言此疾證

尚且略又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所

以絕無專門予因暇日樵古名方以備檢閱然自

明學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺儻能

補而完之不亦宜乎咸淳元年上元日藥隱老人

書于存心堂

夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許太學云

是足少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏故也以感

外邪論之則有太陽經先因感風又感寒濕致令

外證發熱惡寒與傷寒相似頸項強急腰身反張

如中風狀瘈瘲口噤其身體凡凡古人以強直為

瘥其脉沉遲弦細新產血虛多汗出喜中風亦有
 此證已上並載第三卷第二論中言之甚詳不復
 贅錄又有挫枕轉項不得者與三五七散和方見
 追風散仍與急風散搽項上若因被風吹頭目
 昏眩太陽并腦俱痛項背筋脉拘急可與蝎附散
 都梁圓心許大孚治項筋強痛不可轉側者以木
 瓜煎之

追風散治年深日近偏正頭疼又治肝藏久虛血
 氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱
 百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙
 痒面上遊風狀若喪行及一切頭風兼療婦人血
 風攻症頭目昏痛皆治之

川烏炮去皮 防風去芦 石膏煨
 川芎炒去絲 甘草炙 荆芥穗
 白僵蟻各一兩 天南星炮 羌活
 天麻 地龍 白附子炮
 全蝎去尾 白芷各半 草烏炮去皮
 沒藥研 乳香研 雄黃研各分

大右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及
 白臨卧服常服清頭目利咽高消風化痰

急風散方

草烏頭三兩 內蘇令冷 燒存性於酥
 生黑豆一分 處為末
 麝香一分 研
 丹砂一分 研

五十一

右為細末研令停酒調塗痛處
蝎附散治一切風邪頭痛夾腦風氣疼涎壅盛嘔
逆惡心口吐清水暗風旋暈眼是黑花牙關緊急
口眼喎邪面目眈動頭項拘急肩背引疼耳疼目
昏四肢麻木及沐頭浴出暴感風邪頭目昏痛兩
大陽穴疼遠年頭風經隔歲月乍差乍發服藥無
効者並皆治之

附子炮去 川烏炮去 麻黃去節
僵蠶炒 南星 防風各三錢
雄黃 朱砂 全蝎各錢半
白芷 藁本各半兩
右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不

可服 京城之鑿用此藥兼嚼如聖餅子治眼生眵
眵眵不明差明多淚見物不明有效

都梁圓方

香白芷擇大塊白色新潔者先以涼刷去煉
蜜圓如彈子大每服一圓多用荊芥點葛茶
細嚼下食後常服只乾嚼下亦可都無所忌
此藥大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風
邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡
浴沐後服一二粒尤佳暴寒乍暖神思不清
傷寒頭目昏暈並宜服之

木瓜煎方

木公

宣木瓜 二箇取 沒藥 二兩 乳香 一分

右二味內木瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上

蒸三四次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半

盞無灰上醞二盞和之用八分盞熱暖化膏子

服必有先從足起病自午後二經絡各有時定予曰此患

少陰之節自足起病自午後二經絡各有時定予曰此患

也自黃昏至天節之陰陽中節又曰陽中合也陰肺中

至是時予旋氣絕而陰旺陽弱之時故靈寶昇法云高

方是三服而愈此而肝氣弱肝腎二藏陰氣傷敗於

婦人腰痛方論第七 凡二方

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛弱外

感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說

如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣

蔽及寒濕腰痛宜五積散加桃仁如虛損及五種

腰痛者香蛾圓神應圓見諸方並皆可用也如氣滯

腰痛如神保圓黑牽牛茴香橘核必有切也

如神湯治男子婦人腰痛 陳總領方

延胡索 當歸 桂心 等分 一方 杜仲 無

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服 珂潭人勝此

醫方得之於神歟故以名之 老

獨沽寄生湯夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷湿地

當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩

弱疼重或腰痛拘牽脚重痺宜急服之

獨沽 桑寄生 續斷 川牛膝

杜仲 北細辛

秦艽 茯苓 白芍藥

桂心 川芎 防風

人參 熟地黄 當歸

右改咀每服三錢水一錢煎至七分去滓温服

空心氣虛下利除地黄并治新產腹痛不得轉

動及腰脚痠痛痺弱不得屈伸此藥最能除風

消血肘後有附子一枚無寄生人參當歸粉草

近人將治歷節風脚氣流注亦効

婦人腰脚疼痛方論第八凡三方

夫腎主於腰脚女人腎藏繫於胞絡若勞傷腎氣

虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰

脚疼痛也

酸枣仁散 治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏心

食少無力

酸枣仁 炒 川牛膝 當歸 各三

羌活 川芎 桂心

防風 木香 海桐皮

杜仲 附子 炮 草解

續斷 粉草 右各半

右改咀每服四錢水一盞半姜三片煎七分去

滓温服

骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脹拘急

股節不持 骨碎補 炒 草解 川牛膝

桃仁杏仁

海桐皮

當歸

附子

檳榔

赤芍藥

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎至七分去滓食前熱服

婦人脚氣方論第九凡十一方

凡頭痛身熱肢節痛大便祕或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑不知或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胃滿氣急或遍體酸痛

皆脚氣候有或之一字黃帝所謂緩風濕痺是也頑

弱名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續

命湯主之煎成入生薑暑中三陰所患必熱小續

余陽去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良

若無紫雪以自合薄苛煎冷水調服極妙大便祕

者脾約圓麻仁圓三和散主之方並和劑仍針

灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也

聖惠方婦人脚氣論聖惠方

夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風

濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡

屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於十足指若臟腑虛損則風邪先客於脚從下而上

動於氣故名脚氣也此皆由體虛或當風取冷或
 久坐早濕或產後勞損或急怒傷肝心氣滯致令
 月候不通因其虛傷風毒搏於肌骨則令皮膚不
 仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘牽或即冷疼或即
 腫滿或西脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食即
 嘔精神昏憤肢節煩疼小便赤黃大便秘澀並皆
 其證也其婦人脚氣治之與丈夫不同者以其氣
 血不調懷胎難產崩傷之異是以褚澄療寬婦師
 尼與妻妾殊別即其義也凡婦人有脚氣疾者必無生育
牛膝散 治脚氣浮腫心神煩悶月候不通
 川牛膝 羚羊角 芒硝 防己
 大黃

桂心 牡丹皮 赤芍藥
 甘草 桃仁 荊芥
各三 各五 粒製

右為粗末每服三大錢水一錢煎至七分去滓
 溫服利下惡物為度亦要相其強弱用之

大腹皮散 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹皮 桑白皮 薤白 荊芥
 赤芍藥 青皮 枳殼 木通
各一 各二 各二 各二

右咬咀每服四錢水一錢薑五片葱白七寸煎
 至七分去滓空心溫服

半夏散 治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔

逆不止
治婦人脚氣卒然衝心悶亂

半夏
陳皮
人參

大腹皮
桂心
檳榔

赤茯苓
蘇
蘇

右吹咀每服四錢水一錢半薑三片煎七分去

滓温服

犀角散
治婦人脚氣忽發衝心悶亂四肢煩疼有

熱者

犀角屑
木香
紫蘓

赤茯苓
檳榔
赤芍藥

紅花
紅雪

右吹咀每服四錢水一錢煎至七分去滓温服

木香散
治婦人脚氣卒然衝心悶亂

木香
郁李仁
赤芍藥

大腹皮
紫雪
桑白皮

桂心
檳榔
茯苓

右吹咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去

滓温服

治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此藥

紫蘇
松節
吳茱萸

檳榔
乾木皮
陳皮

右吹咀每服四錢水一錢煎至一半入童子小

便二合再煎三沸温服

紫蘓散
治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲

食脚重虚腫

紫蘇莖葉

茴香根各一兩

獨活

青皮

右吹咀每服三錢水一盞薑三片葱白一莖煎

至七分去滓温服

木通

枳殼二兩

荆艾穗

甘草各半兩

桑白皮

羌活

木瓜

大腹子十箇

桑白皮散

治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澁腹脹滿氣急坐卧不得

桑白皮

木香

紫蘇子

郁李仁各一兩

防已

木通

赤茯苓

大腹皮各半兩

檳榔

青皮

各三分

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去

滓温服

薏苡仁散

治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急

大便澁

薏苡仁

川芎

郁李仁

枳實三分

防風

防已

大麻仁各一兩

甘草半兩

猪苓

檳榔

桑白皮二兩

羚羊角屑一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓放温服

白散

治男子婦人血虛發熱夜多次血汗不進飲

食四肢羸瘦骨立拘攣脚痛不能行

黃耆

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮

半夏

白茯苓

人參

白豆蔻仁

天台烏藥

甘草

京南芍藥

檀香

沉香

右為細末每服三錢水一盞薑三片枣子一箇

煎至七分温服

自後諸證退只有脚牽痛不能行以蒼朮圓治之
效此藥大治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履
兼補下部

蒼朮圓方

乳耒日

沒藥 各二錢

川牛膝

青鹽 各半

熟艾 四錢

川烏 三錢

全蝎 炒一錢

右除研藥為細末入研藥令停以木瓜一箇大

者切一頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將

蓋蓋定安木瓜於黑豆中煮令極爛取出去皮

連藥研成膏却入生蒼朮末拌令得所圓如梧

桐子大每服五十圓空心用木瓜湯下或温鹽

酒亦得一日三服忌血與蒜乙巳年羅安人病

體不能立足痛拘攣不能屈伸飲食不進心煩身

其熱必退然後及足則可望安遍尋諸方皆無

惡乃挾諸鬼邪而害人以三因致之內非七情所
忤外非四氣所襲雖若麗乎不內外因奈其證多
端博變遷移難以推測故自古及今愈此病者十
不得一所謂狸骨懶肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說
未嘗見效唯膏肓俞崔氏穴名四花若嵐早灸之
可否幾半晚亦不濟也病者增寒發熱自汗面
白目乾口苦精神不守恐畏不能獨卧其傳在肝
病者增寒發熱面黑鼻燥忽忽喜忘大便苦難或
復泄瀉口瘡其傳在心病者增寒發熱面青唇黃
古本強不能嚙飲食無味四肢羸瘦吐涎沫其傳
在脾病者增寒發熱面赤鼻白乾燥毛折咯嗽
喘急時吐白涎或有血線其傳在肺病者增寒

發熱面黃耳輪焦枯脘骨痠痛小便白濁遺瀝胞
痛其傳在腎

二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋毛折髮焦
肌膚甲錯其蒸在皮外人覺熱自反惡寒身振
暈劇其蒸在內髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血
身熱煩躁痛如針刺其蒸在脈瓜甲焦枯眼昏
西服急痛其蒸在筋放齒黑燥大杼酸疼其蒸
在骨背脊疼痛脘骨酸癢其蒸在髓頭眩熱悶口
吐渴涎眼多眵淚其蒸在腦男子失精女子白
淫其蒸在玉房乍寒乍熱中皖與臆中煩悶其
蒸在三焦小便赤黃凝濁如膏其蒸在膀胱

傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在小腸大
腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸口鼻乾燥腹張
睡卧不安自汗出其蒸在胃口苦耳聾眩下痛其
蒸在膽裏急後重肛門澀秘其蒸在回腸小
腹疔痛筋脉縱緩陰器自強其蒸在宗筋眼昏
淚下時復眩暈躁怒不常其蒸在肝古焦黑氣
短煩悶洒洒淅淅其蒸在心唇乾口瘡胞腹脹
悶畏寒不食其蒸在脾咳嗽喘滿咯痰吐血聲
嘶音遠其蒸在肺耳輪焦枯脚氣酸疼起居不得
其蒸在腎情想不寧無故泄精白物絲絲而下
其蒸在右腎心主胞絡心膈噎塞攻繫疼痛俛
仰煩寬其蒸在葛諸證雖曰不同其根多有虫啣

其心肺治之不可不絕其根也

神仙秘法 取傳屍旁虫服此藥須先擇良日焚香
禱祝令病人設榻面向福德方服即有神效不可
使病人知其藥味及子細

青桑皮 楊柳枝 梅枝

桃枝 已上要取東 葱白 七莖

青蒿 引者各七莖 真安息香 去石研

阿魏 一分

右八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥

耗及一半去滓將藥汁化阿魏再煮十數沸去

滓候温作二次調下作藥末

朱砂 半兩 小檳榔 半兩 麝香 半分

右三味研令極細分為二服用前湯使調下五
更初一服三點再一服辰時取下虫遂絕根
本若見虫色白者此病必差若黑色則已傳入
腎經不可救也服藥後只以淡粥補之並不動
元氣效驗無比切須秘之世傳勞虫有靈輕易
傳之則傷醫者此說殆醫者秘惜其方不可以
授人耳要須密重之則無洩慢天機乃起死還
生切同造化鬼神護助自有靈效大凡傳屍勞
者必須先服此一藥後十五方隨證治不可以
繁用藥調治三五箇月再服此取虫藥則永除
根本如取下虫色已黑縱服後藥亦無補也然
則能使不傳它人

治心胸積氣作胸痺引兩脇痛昏悶不收音聲耳不
清虛熱上壅作鼻衄方

桑白皮 三分

枳殼

木通

子芩

生乾地黄

白芍藥

甘草 各半

右為粗末每服三大重水盞半煎至七分去滓

溫服食後

治伏瘀血在心肺時作衄心胸微背痛方

白芍藥

牡丹皮

各一兩

生犀屑

半兩

生地黄

搗三兩碎入

右吹咀每服

羊兩水一

大棗四煎至七分去滓溫

服

調榮衛消瘀血 出聲音治疼嗽消瘀血方

川當歸 牡丹皮 白芍藥

子芩 木通 麥門冬

甘草 華陰細辛 生乾地黄 一兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去

滓溫服

鷄蘇圓 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

鷄蘇葉 羊斤 黃耆 半兩 甘草

川芎 各一兩 防風 一兩 苦梗 半兩

荆芥穗 一兩 甘菊花 一分 真腦子 半兩

生乾地黄 半兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓用麥門

冬去心煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦

弱行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小

便赤澁加車前子一分每服一圓煎桑枝湯嚼

下日可六七服桑枝剉炒香每用水三盞煎至

一盞去滓下藥

防風湯 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失

血榮衛損也

黃耆 一兩 白芍藥 防風 各三

甘草 半兩 當歸 生乾地黄 各三

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至

七分去滓溫服食前服

溫金散 治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮

防風 杏仁 各一兩 製二十七人參 去芦

茯神 麥門冬 各半 一分

以前五味用米泔浸一宿曬乾次八人參 茯神

麥門冬 三味同為細末每服二錢水一匙四蠟一

豆大煎至八分食後溫服

治勞嗽有**四滿圓**極妙方見勞嗽門

桔梗飲子 治心氣不足解勞倦益血

苦梗 甘草 黃老日 青皮 半兩

人參 去芦 麥門冬 各一兩 一匙四煎至七分溫服

右為末每服二錢水一匙四煎至七分溫服

瓜樓湯 治白瘰

枳殼 四箇 厚朴 薤白 各一兩

瓜樓 一箇 桂枝 一兩 有熱 除此一兩

右吹咀水七升煎取四升去滓溫服

子芩散 涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕

黃耆 一兩 白芍藥 子芩 麥門冬

人參 白茯苓 生乾地黃 各半

苦梗 右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三匙

薑三片煎至水一盞半入藥末三錢重煎至七

分去滓溫服

治積氣堅硬作氣噎胸臑引背痛方

白芍藥一斤 鱉甲酥炙 枳殼去穢炒

北柴胡各一 甘草 赤茯苓各半

右吹咀每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎

至七分去滓溫服

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心胸作痺痛引

腹背痛脘膈滿悶方

鬼臼一分 天門冬三分 巴豆一分

莽草 不蛭皂角羊酥炙各 皮一分

葉子雄黃一分 右為細末煉蜜為圓如小豆大每服一圓漸加

至三二圓空心湯水吞下臨卧一服常宜斟酌

勿令泄瀉忌鯉魚山猪蘆筍

出聲音方

訶子炮去核 木通各一分 甘草半兩

右吹咀用水三升煎至升半入生地黄汁一合

再煎數沸放溫分六服食後日作半料

治咽喉痛方

百藥煎皮去蒸 鵬砂 甘草

生白礬等分

右四味為細末每服一錢食後米飲調細細呷

嚙

治肺間邪氣留中積血作痛失音含化圓方

蛤蚧雙去足 訶子去核 阿膠粉炒

麥門冬去心 北細辛 甘草

生乾地黄各半

右為細末煉蜜為圓如雞頭子大令後言化一

圓已上諸方辰州李倅景適錄示云傳之於

五年大帥方侍郎下上德務

治瘵疾得效方河車圓治勞嗽一切勞瘵虛損骨

蒸等疾

河車一枚初生男子者尤良指長流水中湯

不乾礮成須在日內便碾成熟以手

衣煎生者尤佳矣按本草云碾成人肉治總經宿病即

立效胞衣與明疾勿漸瘦者知亦以人勞損而點

水盛埋之三人以中七八年麻和成水渣清如真

雪白茯苓之羊兩棟矣一兩乾山藥二兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大以少麝香末

為衣每服三五十圓米飲溫酒鹽湯送下空心

服嗽甚者五味子湯下

又方治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧一雙全者酒知母

貝母去心人參去芦甘草

杏仁去皮尖枇杷葉去毛鹿角膠粉炒

右各一兩依方事治淨杵為末每服三錢水一

瓊入桑白皮煎至八分溫服日三夜二

補肺湯治勞嗽

桑白皮熟地黄西谷二人參去芦

紫苑黃耆川五味子各一

右為細末每服二錢水一盞煎至七分入蜜少許食後溫服

又四君子湯加秦艽黃蠟煎服尤妙

辰陽李濟公已上藥方乃趙世則傲之次子公與並服此乃安傳之仲弟屢救人甚驗服藥以可食淡煮者指蹄肉仍須先煮熟去腥去鹹毒醃藏等物無不煮仍忌房勞一切煎藥時忌主藥味大有婦人雞犬猫畜見仍勿令病人知用藥味大有效切

養正膏 治傳尸出行取虫辟邪

鼈甲酥炙 青蒿一握 淡豉三粒

葱白兩莖 安息香研 桃柳葉枝各七

桃仁四十九箇 天靈蓋一片 酥炙

右十味隔夜以水一升浸至五更煎至半升再

以童便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末

麋射杏一錢匕將所煎藥去滓調下至日高二丈

時放溫頓服以衣覆出汗審看十指汗出如藕

絲五色臭穢汗出後仍瀉下出狀惡物盡甚者

旬日再服永効

猪肚圓 治骨蒸勞瘵頰赤氣粗口乾遍身壯熱或

多虛汗大腸澀秘小便赤黃飲食全少出博濟方

青蒿以酒洗 鼈甲醋炙 北柴胡

木香以酒洗 生乾地黄各

青皮詳兩 宣黃連七兩

右為末以猪肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟研如泥為圓如菜豆大湯下十五圓空心

三服忌濕麪毒物

婦人

骨蒸勞方論第二凡十五方

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰
傳尸亦謂殮殍亦稱復連亦名無辜丈夫以疰癘
為根女人以血氣為本無問少長多深此病內既
傷於臟腑外則損於肌膚日久不痊遂致羸瘦因
服冷藥過度則傷於脾胃脾氣既衰而傳五臟脾初
受病或脹或妨遂加洩痢肌肉瘦瘠轉增痿黃四
肢無力飲食少味脾既受已次傳於腎腎既受病
時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交浸小便赤黃腎既受
已次傳於心心既受病往往恚悻或喜或嗔兩頰
常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受已次

傳於肺肺既受病胸滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯
狀如鱗片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏
暗眩下妨痛不欲見人常懷急怒五臟既病漸漸
羸瘦即難療也

天靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即
熱面頰紅色食飲不下心神煩躁

天靈蓋 酥炙

安息香

地骨皮

當歸

山梔子仁

人參 去芦

具母 去心

黃連

桃仁 去皮尖雙

檳榔 各一

鼈甲 酥炙

北柴胡

生乾地黃 五十

赤茯苓

麥門冬 各一

阿魏

兩半

案外甚廣濟
獼肝丸合二方
加薑甲柴胡
梔子地骨皮
知母黃芩
耳草去枳實
松脂方

右為粗末以童子小便一大盞桃柳枝各七寸
薑五片葱白五寸葉四錢煎至七分去滓溫服

獼肝圓 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食

獼肝一具 薑甲醋炙 北柴胡各兩

為根生朱砂以血氣為丸 桃仁去皮炙雙 犀角屑

傷於川升麻 天靈蓋酥炙 犀角屑

地骨皮 知母各一

黃耆三分 甘草半兩 麝香研

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫水下三十圓

無時候 黃耆圓 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心

躁不得眠卧

黃耆

麥門冬 去心

茯神

北柴胡

甘草

生乾地黄 各一

酸棗仁 炒

郁李仁

杏仁 去皮炙雙

枸杞子

人參 去芦

黃芩 各三分

百合

枳殼 去穢 炒

赤芍藥

知母 各半兩

薑甲 製

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大清粥吞下三

十圓無時候

煞鬼圓 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連 已上出 聖惠方

麝香 白三

犀角屑

木香

白朮 各一

鬼箭羽

虎頭骨 酥炙

天靈蓋 酥炙

辰砂

桃仁 去皮炙雙

雄黃粉兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大溫水下二十圓此藥亦辟瘟疫亦可帶之

鼈甲煎

治勞婦見專治

雄鼈一個

杏仁雙皮尖

北柴胡

知母各四

甘草兩

具母去心

右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活

鼈在中以藥和停圍定上用板子石壓定令鼈

在藥內喫酒藥候來日却以慢火煮候酒盡為

度却取鼈令患人喫盡次將鼈甲用酥炙黃入

在前項諸藥內焙乾為細末用酒煮麪糊圓如

梧桐子大用米飲吞下三十圓無時候日五服

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢治

麥煎散

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢治

白日煩癰

赤茯苓

當歸

乾漆生

鼈甲醋炙

常山

大黃煨

北柴胡

白朮

生乾地黄

石膏各一兩

甘草兩

右為細末每服二錢水一錢小麥五十粒煎至

六分食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩

蘇東坡云此黃州吳判官方療骨蒸黃瘦口臭

肌熱盜汗極效麥煎散甚多此方吳君寶之如

希世之珍其效可知

筒骨煎

治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘

嗽喘膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胸滿氣保夜多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等候並皆療治許元林

地骨皮

粉草

北紫胡

前胡

烏藥

麻黃節不去

乾葛

青蒿

苦梗

知母

天仙藤

北黃芩各一兩

人參

生乾地黄

秦艽

鼈甲

黃耆各半兩

右咬咀每服三錢水一瓊酒一瓊猪筒骨一莖

炙焦分為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖槌碎煎至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙

一方加當歸白芍藥

萃佗方大靈治傳尸明月丹方

雄黃

木香各半兩

天靈蓋一兩

輕粉一分

鱉甲一兩

兔屎二兩

右為末用法酒一大斗大黃半兩為末熬膏入

前藥為圓如彈子大朱砂為衣傳尸勞肌瘦面

黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香令烟出吸之不

嗽非傳尸也不可用此藥若烟入口咳不能禁

止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿令人知以

童便共酒一盞化一圓服如人行十里久必吐

出虫狀如燈心細長及寸或如爛瓜李子又如蝦

蟄狀各不同未効次日再服以應為度

明月丹

蘇沈良方治諸勞

鬼糞

九枚

碓

砂

如鬼屎

大枚

右細研生蜜圓如梧桐子大以甘草半兩碎之

水浸一宿取汁五更初下七圓勿令病人知勞

藥下後頻看若有虫急打殺以桑火油煎使焦

棄急水中三日不下更服須在月望前日服忌

見喪服色衣婦人猫犬之類後服治勞神氣藥

取差沉月陰萬融病勞四孫元規藏此方數能活人

腹壅一月如大融明爛乃威正規遍人一夜夢皆

寒已而悸如大融明爛乃威正規遍人一夜夢皆

之遠差向其名則明日傷寒煩燥骨熱皆能治

鮮勞生肌進食治血養心地黃煎圓甚效 萃佗

方

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁

薄荷汁

鵝梨汁

法酒

沙蜜

右慢火熬成膏入後藥

北柴胡

木香

人參

茯苓

山藥

栢子仁

遠志

枳實

白朮

秦艽

苦梗

鹿射香

熟地黃

洗焙酒

研

右為末以前膏子和圓如梧桐子大食後甘草

湯下

治骨蒸寒熱各醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪
功女有骨蒸肉熱之病時發外寒寒過內熱附骨
蒸成之時四肢微瘦足跌腫者其病在五臟六腑
之中衆醫不瘥因遇慶州吳醫者曰請為治之只
單用石膏取服之體微涼如故

石膏散

方見靈苑方

真石膏

不以多細研令極細

右新汲水相服方寸匕取身無熱為度外臺秘要本草

青蒿散

治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱靈死

青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日曬乾為末每服二錢烏梅一

箇煎至七分溫服

青蒿鱉甲煎圓

治骨蒸勞退熱解肌進食出博濟方

九 equal 鱉甲 一人 柴胡 二兩 甘草

杏仁 桔梗 當歸

人參 地骨皮 赤芍藥 各二兩

胡黃連 宣連 各一兩 官桂

木香 麝香 一字 酥蜜 各三兩

右十四味同為細末用青蒿一斤童子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升已來攪去青蒿

不用入酥蜜再熬成膏冷後入藥末搜和為圓

如梧桐子大每服十五圓溫酒下米飲亦得日進三服如秋後合時更入桃柳枝七莖此藥甚

治... 五心煩熱附... 治... 五心煩熱附... 治... 五心煩熱附...

五心煩熱頰赤亘局方**逍遙散**秦芫散方第六卷

逍遙散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏

重心松頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血

熱相搏月水不調脘腹脹滿寒熱如瘧又療室女

血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨

蒸右白茯苓去白朮去當歸去白芍藥去北柴胡去甘草去

白芍藥去北柴胡去甘草去當歸去白朮去

白芍藥去北柴胡去甘草去當歸去白朮去

右**逍遙散**每服三錢水一盞煨生姜一塊切片薄

苛三葉同煎至七分去滓熱服無時候

枳殼散治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經

候不調四肢煩倦心胃滿悶狀如勞氣

枳殼去半夏去赤芍藥去

枳殼去半夏去赤芍藥去

右為細末每服二錢水一盞生薑一塊擘破束之

二枚煎至八分去滓溫服候五心煩熱及身體

壯熱潮熱退方續服

婦人血風勞氣方論第三凡十四方

夫婦人血風勞者由氣血虛損經候不調或外傷

風邪或內挾宿冷致使陰陽不和經絡否澁腹中

堅痛四肢酸疼月水或斷或來面色萎黃羸瘦又

有因產後未滿百日不謹將護臟腑虛損百脉和

竭遂致勞損之疾也。不...

人參荆芥散治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目

澁心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神

不爽或月水不調脘腹疼痛痞塊硬疼痛癸歇

或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘵乍

起乍卧甚則著床

荆芥穗

生乾地黄

酸枣仁炒

白朮各七

防風

甘草各半

川芎

積殼制

羚羊角屑引為末

當歸

桂心

鱉甲醋炙

羌活

熟乾地黄

白朮

鹿茸白

赤芍藥

鬼箭羽

熟乾地黄

右為細末煉蜜圓如梧桐子大食前溫酒吞下

八分去滓熱服無時候日二服常服除一切風
虛勞冷宿疾孕婦休服
鼈甲圓治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經脈不
利飲食無味漸加虛困

鱉甲

川芎

當歸

桃仁

黃耆

水蛭

羌活

紫苑

防風

秦艽

琥珀

赤芍藥

鬼箭羽

熟乾地黄

桂心

川牛膝

人參

鹿茸

白朮

赤芍藥

熟乾地黄

三十圓

琥珀圓 治血風虛勞上熱下冷或發動即心中煩
燥困之無力不羨飲食醋心口瘡月水不調肌肉
黃瘁腹痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱頭旋
痰逆手足麻痺大宜常服 出博濟方

- 琥珀
- 川芎
- 三棱炮
- 吳白木洗
- 青皮
- 附子炮
- 栢葉
- 當歸
- 防風
- 乾薑炮
- 柴胡
- 吳茱萸洗炮
- 草豆蔻
- 白芷各三
- 木香
- 檳榔各四
- 桂心各五
- 人參各二
- 全蝎炒
- 赤芍藥
- 桃仁去皮炒

敗龜

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每日空心酒下
二十圓子前近晚更進一服如覺暖近晚不酒
服如腹內塊積攻築於鼈甲桃仁檳榔三棱各
加一倍為妙忌生冷葱蒜菜毒魚等物

香甲散

治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃瘁多
困減食遍身痠疼真邪相繫心腹撮疼

香木香

西牡丹皮末 赤芍藥 橘紅

煎桂心末 蘇大參 茯苓 人參 蘇一

益熟地黃 蘇二 秦花 蘇一 蘇一

白朮炒 當歸炒 附子各炮去一兩

甘草 半兩

右為粗末每服二錢水一錢生姜三片棗二枚

煎至七分去滓稍熱服如煩渴心躁入烏梅一

兩同杵為末

地黃煎 治婦人血風勞心松榮熱茶退出經驗方

生乾地黃或直熟乾地黃熟乾地黃熟地黃

右二味等分為細末用生薑自然汁合水相和

打糊為圓如梧桐子大每服三十圓用地黃湯

下或只茶酒醋湯下亦可食後日三服覺臍臍

虛冷早間先服八味圓一服不可謂地黃性冷

虛則能補陰精血也

荆芥散 治血風諸般病產後並宜服食久服諸疾

除去

荆芥

人參 各半兩

羌活

大腹子

白茯苓

半夏

附子炮

白芍藥

乾姜

雀腦芎

桂心

防風

甘草

枳殼

杏仁

乾地黃

地柴胡

木香

當歸

牡丹皮

苦梗

蒲黃

厚朴

款冬花 各三分

鼈甲

黃耆 各一兩

沉香 各一兩

至七錢溫服

荆芥煮散

治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤口乾
背甲勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不
調多驚盜汗胸膈不快但是風勞氣冷並皆治之

荆芥穗

白芷

義茂

白茯苓

熟地黃

木香

白豆蔻

右為細末

每服二錢姜錢三片烏梅一箇煎至

北柴胡

黃耆

川芎

人參

海桐皮

甘草

檳榔

桂心

秦艽

當歸

麥門冬

白芍藥

枳殼

酸棗仁

鼈甲製

苦梗

七分無時溫服如極虛去檳榔每日兩服臨卧
服尤佳忌生冷動風甜物腹有顆塊服之便消

如聖散

治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾
傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨
少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間
作頭昏飲食無味胃膈不利或產前產後受病並
可服之

北柴胡

熟地黃

白茯苓

人參

甘草

當歸

不踏鼈甲

知母

右為細末

胡黃連

桑寄生

二錢水

沉香

乾葛

一錢烏梅

各半

各半

二枚

麥門冬數粒煎至八分無時候
氣力加散治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱高肌瘦不能飲食

白木 白茯苓 白芍藥 各一
甘草 半兩

右為細末薑枣煎二錢服

油煎散治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦痺不進飲食日三服

川烏 海桐皮 地骨皮 牡丹皮

五加皮 陳橘皮 烏藥 白芷

當歸 白芍藥 白芷

莪茂 等分

右為末每服二錢水二盞入生麻油三四點煎至七分溫服無時候

大效油煎散治血風勞氣攻症四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷敗服此神效

五加皮 川烏 芍藥
海桐皮 牡丹皮 各一 桂心
乾姜 川芎 各半

右為細末每服二錢水一盞油浸錢一大同煎至六分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪喫藥時不可吹局方亦有油煎散方見和劑

四白散子亦少見四卷

治血風勞方

牡丹皮 地骨皮 防風

甘草 黑豆 荆芥穗 白芷

白芍藥 荆芥穗 白芷

右為細末每服二錢水一盞姜五片棗一箇葱

白一寸煎至八分温服無時候

香甲散治熱病後虛勞或四肢倦怠脚午疼痛飲

食無味肌膚黃瘦或熱瘡盜汗頭暈虛煩此藥久

服駐顏其妙不可具述

醋甲 醋浸 當歸 羌活

木香 人參

川芎 沉香 肉豆蔻

酸枣仁 附子 檳榔

大腹子 北柴胡 厚朴

川牛膝 白茯苓 秦艽

桂心 羊兩

右吹咀每服五錢水一盞生姜三片烏梅一箇

煎至八分去滓温服日三服空心忌生冷麪食

雞肉鮓醬之類

馬鞭草散治血風攻透肢體疼痛或覺癢痒或覺

痺麻作寒作熱飲食減味並皆治之

馬鞭草 荆芥穗 北柴胡

烏梅肉 枳殼 白木

羌活

白芍藥

秦艽

天台烏藥

麻黃

木香

當歸

川烏炮

甘草

右為細末每服二錢水一盞生姜二片枣一枚

葱白二寸煎至七分日午臨卧温服常服無忌

有孕莫服

婦人風虛勞冷方論第四 凡二方

夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫
人將攝煩理則血氣調和風寒暑濕不能為害若
勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而干之或客於
經絡或入於腹內其經絡得於冷則氣血凝滯不
能自温於肌膚也腹內得於風冷則脾胃氣弱不

能消於飲食也隨其所傷變成疾病若大腸虛者
則寢下利若風冷入於子臟則令臟冷致令無子
若搏於血則澹壅亦令經水不利斷絕不通也

澤蘭散 治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘

急體瘦無力經候不調飲食減少

牡丹皮

赤芍藥

栝子仁

續斷 各半

麝香 一分

澤蘭葉 二兩

當歸

延胡索

桂心

附子炮

川牛膝

川芎

桃仁

乾漆炒

琥珀

沒藥

木香 各三

右十七味為細末每服二錢温酒調下

紫石英圓 治婦人風虛勞冷經候不調四肢羸弱不能飲食

紫石英

熟乾地黄

白石英

各二兩

續斷

白芍藥

桂心

木香

當歸

白朮

乾薑

白薇 各半兩

川牛膝

川芎

北五味子

人參 各三分

椒紅炒

附子炮

黃耆 各一兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓温酒吞下空心服

婦人冷勞方論第五 凡七方

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾

宿冷致令飲食不消腹內積聚臍下冷痛月候不調骨節疼痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰

冷勞也

桃仁散

治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食

木香

呵子

白薑

桃仁

人參 各半兩

陳皮

琥珀

桂心 各一兩

赤芍藥

延胡索

赤茯苓

川牛膝

當歸

白朮 各三分

右以咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去

滓空心温服

木香圓 治婦人冷勞經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦

木香

琥珀

吳茱萸炮

當歸

牡丹皮

赤芍藥

三稜

附子炮

延胡索

川芎 各三分

乾薑

人參

桂心 各二分

北柴胡

白朮

鼈甲 酥炙去

厚朴

熟地黄

陳橘皮 各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心

溫酒下

熟乾地黄圓治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色痿

黃四肢無力月候不調少思飲食

乾熟地黄

鼈甲

陳皮 各一兩

北五味子

當歸

川芎

桂心 各半兩

川牛膝

人參

白芍藥

白朮

附子

白茯苓

黃耆 各三分

甘草 一分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓

礞砂煎圓 治婦人冷勞心腹積聚腹脹疼痛四肢

羸瘦不食

礞甲 酥炙

桃仁 去皮尖 麩炒

木香

五靈脂 石炒

礞砂 二兩 酥炙 成膏

右為細末用礪砂膏為圓如梧桐子大空心濕酒下二十圓

煮肝散 治婦人冷勞脾胃虛之大腸轉洩水穀不化四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥

北柴胡

草撥各三

胡椒

山茵陳

木香

北細辛

右為細末以攢猪肝一具去脂膜切如柳葉片

縮砂仁

白朮

白薑

人參

紫苑

桂心各半兩

蒔蘿

白芷

陳皮

薑黃仁

白芍藥

以新汲水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩於銚內以新水二大盞入鹽醋少許以瓷椀合煮令水盡空心以意食之喫粥飲下食後食久飲授酒一盞為妙晚食前再服亦佳

煮肝散 治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛四肢少力積漸羸瘦

白芍藥

厚朴

白薑

蒔蘿

川芎

桂心各三

當歸

胡椒

桔梗

陳皮半兩

荊芥穗

薑黃仁

紫苑

紫苑

紫苑各半兩

右為細末每服半兩以攢猪肝一具用鹽醋葱

白各少許相和如尋常煮熟空心任意食之然

大香甲元散

治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲

食進退經候不調心腹多脹漸寢如勞補血海調

氣

鼈甲醋炙

沉香

柴胡

蘇四入參

川芎

羌活

當歸

附子炮去

木香

安息香

桔梗

茯苓

藿香葉

陳橘皮

牡丹皮

三稜

厚朴姜汁

桂心

桃仁尖去皮炒

牛膝去苗各

檳榔

和皮大腹子

各一

右為細末每服二錢

水一錢

生薑烏梅各少許

煎至八分溫服餘

一半更加乾漆

阿魏炒

赤芍藥分同為末煉蜜圓如梧桐子大空心煎

烏梅地黃湯下二三十圓與散子相間服方博濟

新編婦人大全良方卷之五

白芍少許相和如尋常煎服宜心任意食
後更溫酒二錢尤佳

條融融元氣益陽在醫家之理應冷氣現則黃瘦

會進更經候不調心腹之脹漸重如勞補血海

氣

龍甲 醋炙

磁石

朱砂

前...

...

...

烏梅煨黃芩十二錢并曬煎醋子餅固頭

赤芍藥身同煎未數種團以餅餅子大至心煎

煎藥小藥忌服...

古醫...

桂枝...

...

...



