

醫方類聚卷之一百二十五

消渴門二

聖惠方二

治消渴口舌乾燥諸方

夫消渴之病常飲水而小便少也若因虛而

生熱者則津液少故渴也是以心氣通於舌

脾氣通於口熱氣在內乘於心脾津液枯竭

故令口舌乾燥也

治消渴口舌乾燥心神煩熱門冬散方



麥門冬一分地骨皮三分菰蘆根三分人參兩

去蘆根壹兩黃耆三分甘草半兩黃兩

芩兩茅根兩石膏兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分竹茹半分小麥半合煎至五

分去滓不計時候溫服

治瘡渴口舌乾燥煩熱人參散方

人參三分去蘆頭地骨皮兩赤茯苓三分麥門冬

二兩甘草三分去蘆根兩葛根三分黃

去心兩微赤兩

者三分川升麻二兩黃芩兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分淡竹葉二十片煎至六分去

滓不計時候溫服

治瘡渴口舌焦乾精神恍惚煩躁不安地骨

皮散方

地骨皮壹兩茯神三分菰蘆根一分黃連壹兩石

膏兩甘草半兩麥門冬壹兩黃芩兩遠

志二分去心兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓每於食前溫服

治瘡渴止虛煩除口舌乾燥宜服此方

麥門冬壹兩去心人參半兩去蘆頭黃耆三分赤茯苓三分

苓三分甘草半兩炙葛根半兩枇杷葉三分

毛炙微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去

滓不計時候溫服

治消渴口舌乾燥煩熱不能飲食宜服黃連

散方

黃連二兩去須葛根二兩麥門冬一兩去心枇杷葉

二兩拭去毛炙微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去

滓不計時候溫服

治瘡渴口舌乾燥煩熱狂亂麥門冬丸方

麥門冬三兩去心黃芩三分知母二分黃芩三分

甘草

半兩炙

黃連

壹兩去鬚

鐵粉

壹兩半細研

右件藥搗羅為末入鐵粉研令勻鍊蜜和
搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後以
清粥飲下二十九

治瘡渴口舌乾燥煩熱心神如狂犀角丸方

犀角屑

三分

鈎霜

半兩細研

麥門冬

二兩去心焙

鐵粉

一兩甘草

半兩炙

鬱金

半兩

地骨皮

半兩

根

三分

子芩

半兩

茯神

半兩

玄參

半兩

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三五百杵丸如梧桐子大每於食後煎

竹葉湯下二十九

治瘡渴口舌乾燥骨節煩熱方

地骨皮

壹兩

小麥

半兩

生麥門冬

壹兩去心

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞
煎至五分去滓每於食後溫服

治瘡渴心神煩躁口乾舌澁天竹黃散方

天竹黃

壹兩

黃連

半兩

梔子

半兩

川大黃

半兩剉

馬牙消

半兩

甘草

一分

炙

微炒

右件藥搗細羅細散入研了藥令勻每於食後煎竹葉水調下二錢

治瘡渴口舌乾燥煩熱宜服此方

羊髓

二兩炙甘草微赤剉

白蜜

二合

右件藥先以水一大盞煮甘草至六分去滓後下髓蜜更煎五七沸每於食後溫服

壹合

治瘡渴口舌乾燥骨節煩熱方生芭蕉根搗

絞取汁時飲一二合

神巧萬全方同

治瘡渴飲水過度諸方

夫瘡渴飲水過度者由腎虛心熱三焦不和

上熱下冷故也凡人好食熱酒炙肉或服乳

石壅滯之藥熱毒在內不得宜通關腠閉塞

血脈不行熱氣蒸於藏腑津液枯竭則令心

肺煩熱咽喉乾燥故令渴不止而飲水過度

也

治瘡渴飲水過多不止心神恍惚卧不安穩

羚羊角散方

羚羊角屑三分 知母三分 黃耆二分 菰蘆根三分

麥門冬三分 茯神三分 地骨皮二分 人參二分

頭防風三分 甘草半兩 石膏一兩 酸棗人三分 黃芩半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分淡竹葉二七片小麥半合煎

至五分去滓每於食後溫服

治瘡渴飲水過多煩熱不解黃丹散方

黃丹兩 胡粉兩 枯蘆根壹兩 甘草半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以清

粥飲調下一錢

治瘡渴飲水過多煩渴不止黃耆散方

黃耆壹兩 菰蘆根兩 麥門冬二兩 赤茯

苓半兩 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗細羅為散每於食後煎竹葉水

調下二錢

治瘡渴飲水過多煩渴不止黃耆散方

黃耆壹兩 菰蘆根兩 麥門冬二兩 赤茯

苓半兩 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗細羅為散每於食後煎竹葉水

調下二錢

治瘡渴飲水過多煩渴不止黃耆散方

治瘡渴飲水過多不知足限菰蘆根丸方

栝蘆根分二兩黃丹半兩葛根半兩黃連壹兩

右件藥搗羅為末入黃丹研令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每服以溫水下十丸遇渴

喫水即便服之

又方黃丹壹分栝樓粉半兩檳榔壹分菜豆粉壹兩

右件藥都研令勻用白麵三兩相和作餅

飪用生薑葱薤白豉汁煮熟和汁溫食之

又方密陀僧半兩蠟兩面茶兩黃連半兩滑石兩

半栝樓根兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以清

粥飲調下一錢

又方聖濟總錄錄錄鉛壹斤水銀二兩先銻銻旋投

有花暈上便以鐵匙匙俾俾炭炭言言挺挺不不蛀蛀者者塗

掠取於乳鉢內研之之酥酥炙炙令令黃黃去去皮

子入麝香一錢同碾為末末藥藥水水區區下下一一錢

右件藥每服抄皂莢散總錄作作末末一錢以水一

中盞煎至六分去滓令溫放溫每於食後

調下鉛黃散半錢

又方黃連

半兩去鬚

菰蘆根

半兩

蜜陀僧

半兩

人參

半兩去鬚

右件藥搗細羅為散入蜜陀僧研令勻每

於食後以溫漿水調下一錢

又方菰蘆

一兩

黃連

二兩去鬚

甘草

一兩炙

微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓每於食後溫服

又方地骨皮

壹兩

甘草

三分炙

桑根白皮

三兩

剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服

又方栝蘆根

半兩

漢防已

半兩

黃連

半兩

黃丹

半兩

右件藥搗細羅為散入黃丹研令勻每於

食後以溫水調下壹錢

治瘡渴日夜飲水過多不足口乾燥小便數

麥門冬散方

麥門冬

壹兩

菰蘆根

壹兩

知母

壹兩

黃耆

壹兩

甘草

半兩

牡蠣

壹兩

燒為粉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治瘡渴飲水過度煩熱不解心神恍惚眠卧
不安土瓜根丸方

土瓜根三分 菰蘘根兩 麥門冬壹兩 知母三分
苦參壹兩 石膏壹兩 雞臍脰七枚 子芩三分
鐵粉壹兩 川大黃一兩 龍齒三分 大麻人
壹兩研 金薄五十片 銀薄五十片 澤瀉三分
如膏研

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
搗三五百杵丸如梧桐子大每於食後煎
竹葉小麥湯下三十九

治消渴飲水過度渴尚不止口舌乾燥心神
煩亂坐臥不安鎮心止渴鐵粉丸方

鐵粉壹兩 黃連二兩 苦參壹兩 麥門冬二兩
去心 土瓜根壹兩 牡蠣粉壹兩 金薄五十片 銀
薄五十片 菰蘘根二兩
右件藥搗羅為末入研了藥都研令勻鍊

蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時
候以清粥飲下三十丸

治痢渴飲水過多小便不利方

葵根莖葉

五兩切

右件藥以水三大盞入生薑豈分豉豈合
煮取二盞去滓食後分溫三服

治痢渴飲水過多不差方凌霄花豈兩搗碎

以水豈大盞半煎至豈盞去滓分溫三服

又方人參

豈兩去蘆頭搗細羅爲散

右用雞子清調下壹錢日四五服

治痢渴飲水過甚并小兒渴疾方

黃狗膽

壹枚獾豬膽壹枚

右件狗膽併人猪膽內陰乾候堪丸卽丸

如梧桐子大每服以麝香湯下二丸小兒

疳半丸

治痢渴飲水腹脹諸方

夫痢渴飲水腹脹者由水氣流行在於脾胃
脾得濕氣不能消穀復過經絡否澁氣血行

則水不得宣通停聚流溢於膀胱之間故令
 脹滿也
 治瘖渴飲水過多心腹脹滿不能下食人參
 散方

人參一兩去蘆頭 桑根白皮半兩 陳橘皮湯浸
 去白半兩 半夏半兩湯洗黃者 木香半兩 赤
 芍藥兩 草薢半兩 桂心半兩 總錄去麤皮 檳榔半兩
 總錄州 枇杷葉半兩拭去毛炙微黃
 右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治瘖渴飲水過多心腹脹滿或脇肋間痛腰

腿沉重陳橘皮散方

陳橘皮壹兩湯浸 訶梨勒皮半兩 赤茯苓半兩
 桂心半兩 大腹皮半兩 芫薺半兩 枳殼半兩
 去赤芍藥半兩 甘草一分炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
 入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫

服

治瘠渴飲水傷冷太過致脾氣虛腹脇脹滿
不思飲食桂心散方

桂心半兩 人參半兩 蘆頭半兩 去白茯苓 半兩 訶梨勒皮

兩大腹皮半兩 甘草半兩 赤半兩 枳殼半兩 妙半兩

去厚朴壹兩 去壹兩 蘆皮壹兩 塗生白朮 半兩 前胡兩

去蘆頭壹兩 薑汁壹兩 炙壹兩 香熟白朮 兩 前胡兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分陳三枚煎至六分去滓每於

食前溫服

治瘠渴飲水太過胃氣不和腹脹不思飲食

宜服此方

赤茯苓半兩 人參半兩 蘆頭半兩 赤芍藥半兩 白朮半兩

前胡三分 蘆頭一分 枳殼半兩 微半兩 麩半兩 檳榔三分 厚朴

三分去蘆皮塗生 桂心三分 甘草半兩 微赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於

食前溫服

治瘡渴飲水腹脹煩熱嘔吐不思食半夏散

方

半夏半兩湯洗赤茯苓壹兩人參兩白

木香兩甘草半兩炙陳橘皮一兩湯

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分竹茹壹分棗二枚煎至六

分去滓不計時候溫服

治瘡渴飲水不止小便復澀心腹連膀胱脹

悶胃膈煩熱檳榔散方

檳榔壹兩聖桑根白皮壹兩赤茯苓兩

紫蘇莖葉兩木通壹兩麥門冬兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蓋

入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓不

計時候溫服

治瘡渴腹脹利大小腸大黃丸方

川大黃三兩栝樓根兩芎藭三分枳殼兩

治瘡渴腹脹利大小腸大黃丸方

治瘡渴腹脹利大小腸大黃丸方

治瘡渴腹脹利大小腸大黃丸方

治瘡渴腹脹利大小腸大黃丸方

麩炒微 檳榔 一桂心三

右件藥搗羅末為鍊蜜和丸如梧桐子大
不計時候以溫水下三十丸

治熱渴諸方

夫五藏六腑皆有津液也若五藏因虛而生
熱者熱氣在內則津液竭少故為渴也夫渴
者數飲水其人必頭目眩背寒而嘔皆因利
虛故也診其心脉滑甚者為喜渴也 巢氏病源診其
脉心脉滑甚為善渴其久病變成發癰疽或成水疾

治脾胃中熱引飲水漿渴即不止赤茯苓散
方

赤茯苓

壹兩

黃蘗根

壹兩

黃芩

壹兩

麥門冬

壹兩

去心

生乾地黄

壹兩

知母

壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盃
入生薑半分小麥半合淡竹葉二七片煎
至五分去滓不計時候溫服

治熱渴天竹黃散方

天竹黃

壹兩

黃連

壹兩

伏神

壹兩

甘草

壹兩

炙微

蘇川芒消壹兩犀角屑兩壹菰蘆根兩壹川升麻

兩壹

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每於

食後煎淡竹葉湯調下一錢藥二十分煎

治脾胃中熱煩渴不止黃耆散方木壹大

黃耆壹兩茯苓兩壹地骨皮兩壹菰蘆根兩壹麥

門冬壹兩生乾地黃兩壹甘草兩壹炙兩

赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蓋

入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去

滓不計時候溫服

治心脾熱渴不止小便難宜服此方

赤茯苓兩壹蘆根兩壹黃芩兩壹知母兩壹菰蘆

根兩壹遠麥穗兩壹麥門冬兩壹甘草兩壹炙兩

木通兩壹

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中蓋

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治心脾實熱煩渴不止知母散方

知母壹兩 蘆根壹兩 菰蘆根壹兩 麥門冬壹兩

黃芩三兩 川大黃壹兩 碎散 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治脾胃中熱煩渴身漸消瘦宜服此方

黃連壹兩 升麻壹兩 麥門冬壹兩 黃芩壹兩

菰蘆根壹兩 知母壹兩 茯神壹兩 梔子壹兩 甘草壹兩

微赤剉 石膏壹兩 煎至六分去滓不計時候溫服

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治脾胃熱渴不止羸瘦困乏猪肚黃連丸

猪肚壹枚 黃連二兩 菰蘆根壹兩 白

梁米壹合 柴胡壹兩 茯神壹兩 麥門

冬二兩 心焙 右件藥搗羅為末先將黃連末及米入肚

內縫合蒸合爛熟砂盆內研如膏入藥末

內縫合蒸合爛熟砂盆內研如膏入藥末

內縫合蒸合爛熟砂盆內研如膏入藥末

和令熟凡如梧桐子大不計時候以清粥飲下三十丸

治心脾壅熱煩渴口乾宜服此方

知母一兩 菰蘆根壹兩 麥門冬二兩 黃連一兩

去髮神兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和膏三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下三十丸

又方鼓一兩 黃連一兩

去髮

右件藥搗篩為散每服半兩以水壹大盞煎至五分去滓每於食後溫服

又方黃連半兩 麥門冬一兩

去髮心

右件藥搗篩為散每服半兩以水壹大盞煎至五分去滓每於食後溫服

治心肺熱渴面赤口乾宜服此方

馬牙消半斤 川芎消四兩 寒水石四兩 石膏三兩

右件藥以水五升浸三日用銀器中煎至水盡後去寒水石及石膏候凝硬陰乾別

入竜腦半兩朱砂壹兩同研爲末不計時
候以蜜水調下壹錢兼治喉痺腫痛甚妙
治熱極渴不止方

麥門冬一兩石膏二兩蘆根壹兩

右件藥搗篩爲散每服半兩以水壹大盞
煎至五分去滓不計時候溫服

治熱渴不止心神煩躁宜服此方

黃連五兩去鬚地黃汁二升

右件藥於銀器中以慢火煎成膏收於堯

器中每於食後煎竹葉麥門冬湯調彈子
大服之

又方黃連去鬚馱蘆根各等分

右件藥搗羅爲末以麥門冬去心煮熟爛

之研和凡如梧桐子大每於食後煎小麥湯

下三十九

又方右取水中萍洗曝乾爲末以牛乳汁和

丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下

三十九

治暴渴諸方

夫喜渴者由心熱也心主於便汗便汗出多則腎中虛燥故令渴也凡夏月渴而汗出冬則小便少冬月不汗故小便多此皆是平人之候名曰暴渴也

治暴渴煩熱不退少得睡卧麥門冬散方

麥門冬壹兩去心白茅根二兩 菰蘆根壹兩 黃芩三分 地骨皮兩 石膏兩 甘草半兩炙 蘆根半兩 人參三分 骨皮兩 石膏兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分小麥半合淡竹葉二七片煎

至五分去滓每於食後溫服

治暴渴飲水多或乾嘔蘆根散方

蘆根壹兩 人參半兩 去蘆頭 百合二分 麥門冬壹兩 去心桑根白皮三分 黃耆三分 赤茯苓三分 黃芩三分 葛根三分 甘草三分 微赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去

淳不計時候溫服

治暴渴心神煩悶體熱食少

菰蘆根壹兩 蘆根壹兩 麥門冬壹兩 知母壹兩

人參壹兩 地骨皮壹兩 黃芩壹兩 甘草壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分小麥半合竹葉二七片煎至

五分去滓不計時候溫服

治暴渴心神煩悶口舌乾焦柴胡散方

柴胡二兩 烏梅肉二兩 甘草壹兩 麥門冬壹兩

冬壹兩 去心壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至七分去滓不計時候溫服

又方烏梅肉七枚 生薑一分 白沙糖三分

右件藥以水二大盞煎至壹盞二分去滓

分溫三服食後服之

又方枇杷葉壹兩 蘆根三兩 甘草三分

赤黃連壹兩 去鬚壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壺中蒸煎至六分去滓每於食後溫服
治暴渴除煩熱酥蜜煎方

酥五白蜜五川芒消二

右件藥於銀鍋中以慢火熬成膏收斂器中不計時候服半匙嚥津

治胃膈氣壅滯暴渴不止赤茯苓散方

赤茯苓壹兩訶梨勒皮三分竜腦壹錢人參三分

去蘆頭

右件藥搗細羅為散入竜腦研令勻不計時候以粥飲調下膏錢

又方右取蘿蔔二枚大者搗爛取汁入蜜二合生薑半兩取汁酥壹兩調令勻渴即旋少飲之

治渴利成癰疽諸方

夫渴利者為隨飲即小便也由少時服乳石乳石熱盛房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥則渴也今腎氣已虛又不得制

於水液故隨飲卽小便也以其病變但發癰疽以其內熱故小便利少便利則津液竭津液竭則經絡澁經絡澁則榮衛不行榮衛不行則熱氣留滯故成癰疽也

治渴利煩熱發癰疽發背炊腫疼痛玄參散

方

玄參壹兩犀角壹兩川芒消壹兩川大黃二兩

微炒者黃壹兩沉香壹兩木香壹兩羚羊角壹兩

甘草三分生剉

右件藥擣細羅爲散每服不計時候以溫

水調下二錢

治渴利口乾煩熱背生癰疽赤炊疼痛藍葉

散方

藍葉一兩一川升麻一兩麥門冬一兩赤芍藥一兩

玄參一兩黃耆一兩甘草一兩川大黃二兩

微炒犀角一兩沉香壹兩葛根壹兩

右件藥擣篩爲散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治渴利熱盛背生癰疽煩熱肢節疼痛射干散方

射干壹兩川升麻兩壹犀角屑兩壹藍葉兩壹黃芩

兩壹菰蘆根兩二沉香兩壹地榆兩壹川大黃兩二

兩二微炒川朴消兩二

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水壹大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治因服硫黃及諸丹石熱發關節毒氣不得

宣通心肺躁熱渴利不止及發癰疽發背白

茅根飲子方

白茅根壹握桑根白皮二兩麥門冬壹兩

赤茯苓兩三露蜂房壹兩紅雪兩二

右件藥細剉每服半兩以水壹大盞入淡

竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫

服

治渴利煩熱背生癰疽赤炊疼痛心煩不得

眠附宜服此方

水銀壹兩入黃丹點菰蘆根壹兩苦參壹兩

類聚

三

知母壹兩 蜜陀僧壹兩 牡蠣壹兩 黃丹壹兩

半壹兩 黃連壹兩

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

溫水調下壹錢

又方 鈔霜壹分 膩粉壹分 柳絮壹分 川朴消壹分

右件藥細研為散每服以冷水調下半錢

日夜可四五服

自治渴利後發瘡諸方

夫渴利之病隨飲即小便也此謂服石藥之

人房室過度腎氣虛耗故也下焦既虛虛則

生熱熱則腎燥腎燥則渴渴則飲水腎氣既

虛又不能制水故小便利也其渴利雖差熱

猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏

所以生瘡也

治渴利後皮膚生瘡肢節疼痛升麻散方

升麻壹兩 玄參壹兩 知母壹兩 赤茯苓壹兩 赤芍

藥三 漏蘆壹兩 枳殼壹兩 蘇炒壹兩 拔薤壹兩 黃連

甘草壹兩 微赤壹兩 微赤壹兩

右件藥搗細羅爲散不計時候以溫漿水調下二錢以差爲度

治渴利後心煩體熱皮膚生瘡瘙痒菹蕪根散方

菹蕪根二兩赤茯苓二兩玄參壹兩枳殼壹兩

苦參三分甘草三分微赤剉

右件藥搗細羅爲散不計時候以溫漿水調下一錢

治渴利後頭面身上徧生熱毒瘡玄參散方

玄參壹兩梔子一分黃芩兩白欬兩川升麻兩

連翹兩犀角屑兩蕤蕤兩木香兩

右件藥搗細羅爲散每服四錢以水壹中

蒸煎至六分去滓溫服日三四服

治渴利後皮膚生熱毒瘡疼痛寒熱口乾心

煩黃者散方

黃耆壹兩甘草壹兩川升麻兩黃芩兩

前胡兩菹蕪根兩知母兩麥門冬兩

赤芍藥兩生乾地黄兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞入竹葉二七片小麥一百粒煎至六分去滓溫服日三四服

治渴利後肺藏風毒外攻皮膚生瘡瘙痒心

煩秦芫丸方

秦芫壹兩烏蛇三兩酒浸去骨兩微炒壹兩牛蒡子三分微炒

防風半兩去盧頭枳殼壹兩微炒壹兩梔子三分犀

角屑二分赤茯苓兩苦參壹兩右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食後煎竹葉湯下三十

凡 治渴利後熱毒未解心神煩熱皮膚瘙痒成

瘡皂莢煎丸方

夫皂莢十挺不艸者搥碎用水二升浸壹天

門冬壹兩半壹兩枳殼壹兩微炒壹兩烏蛇三兩酒

骨炙令白蒺藜壹兩微炒壹兩防風壹兩去盧頭杏人

微黃壹兩湯浸去皮尖川大黃壹兩碎微炒苦參壹兩

雙壹兩湯浸去皮尖川大黃壹兩碎微炒苦參壹兩

川升麻壹兩雙壹兩湯浸去皮尖川大黃壹兩碎微炒苦參壹兩

右件藥搗羅爲末入皂莢膏和擣三二百杵丸如梧桐子大每於食後以溫漿水下三十丸

治瘡渴後成水病諸方

夫五藏六腑皆有津液若腑臟因虛而生熱氣則津液竭故渴也夫渴數飲水其人必眩背寒而嘔者因利虛故也診其脉滑甚爲喜渴其病變成癰疽或爲水病也

治瘡渴後徧身浮腫心膈不利紫蘇散方

紫蘇莖葉

壹斤

桑根白皮

壹斤

赤茯苓

壹斤

羚羊

壹斤

兩

羊角屑

三分

檳榔

二分

木香

半兩

桂心

半兩

獨活

半兩

兩

枳殼

半兩

兩

兩

兩

郁李仁

二兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

右件藥擣羅羅爲散每服四錢以水壹斗

蒸入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治消渴後頭面脚膝浮腫胃虛不能下食心胃不利或時吐逆赤茯苓散方

赤茯苓

壹斤

紫蘇干

壹斤

白朮

壹斤

前胡

壹斤

盧頭

壹斤

壹斤

壹斤

人參壹兩去蘆頭 陳橘皮三分湯浸去白 蘇合焙 桂心三分 木

香三分 檳榔三分 甘草半兩炙 微赤對

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治瘡渴後成水病面目身體浮腫升麻散方

川升麻壹兩 蘇合半兩 赤茯苓兩 麥門冬壹兩

二兩去心焙 桑根白皮二兩 青橘皮三分湯浸去白 蘇合焙

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下壹

錢日三四服

治瘡渴後四肢虛腫小便不利人參散方

人參三分去蘆頭 猪苓三分去黑皮 木通壹兩 黃連壹兩

壹兩去鬚 麥門冬二兩去心焙 蘇合根 二兩

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下壹

錢日三四服

治瘡渴已覺津液耗竭身體浮氣如水病者

漢防已丸方

漢防已三分 猪苓三分去黑皮 蘇合根 壹兩 赤茯苓兩

壹兩桑根白皮一到半白朮半兩杏仁一兩湯浸
人麩炒去皮郁李人一兩半湯浸甜葶藶壹兩
微黃炒紫色炒令

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫水下三十丸

治消渴後成水病浮腫方

甜葶藶壹兩隔紙杏仁壹兩湯浸去皮尖

馱藪子壹兩漢防已兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗壹二百杵丸

如梧桐子大每服煎赤茯苓湯下三十九

日三四服神巧萬全方同

治消渴後變成水氣令作小便出方

蘿蔔子三兩炒紫蘇子二兩炒

右件藥搗細羅為散每服煎桑根白皮湯

調下二錢日三四服

治大渴後虛乏諸方

夫渴病者皆由腑藏不和經絡虛竭所為故
也病雖新差血氣未復仍虛乏也

治大渴後下元虛乏日漸羸瘦四肢無力不思飲食肉菘蓉散方

肉菘蓉 壹兩酒浸一宿刮熟乾地黄 壹兩

巧萬全 去皺皮炙令乾 白茯苓 三分 白芍藥 半兩 桂心 半兩 牛膝

三分 麥門冬 壹兩 白石英 壹兩 附子 三分

去皮臍 萬黃耆 壹兩 牡蠣 壹兩 燒磁石

全方壹兩 二兩擣碎木淘去赤汁 萬全 五味子 三分

方一兩火煨醋淬淘去赤汁 萬全 地骨皮 兩

人參 三分 去續斷 三分 草薺 兩 續斷 兩

○萬全方無桂心有柴胡三分

右件藥擣麤羅為散每服用獾猪腎一對

切去脂膜先以水壹大盞半煎至一盞去

滓入藥五錢生薑一分薤白三莖煎至五

分去滓每於食前溫服

治大渴後虛乏脚弱小便數石斛散方

石斛 壹兩 肉菘蓉 壹兩 酒浸一宿麥門

冬心 兩 去白蒺藜 半兩 微甘草 半兩 炙乾

薑 三分 炮桂心 兩 熟乾地黄 兩 續斷 兩 黃

耆 三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓每於食前溫服

治大渴後上焦煩熱不退下元虛乏羸瘦無力小便白濁飲食漸少黃耆丸方

黃耆一兩肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮鹿茸

一兩毛塗熟乾地黄二兩人參三分去

酥炙微黃兩杞子三分白茯苓三分甘草半兩炙地骨皮半

澤瀉三分附子三分炮裂巴戟三分禹餘糧三分

燒赤細研桂心三分牡丹三分五味子三分龍骨

三分礞石一兩半燒赤醋淬赤石脂三分麥門

冬心一兩去牡蠣三分燒為粉

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗五七百杵丸如梧桐子大每於食前以

清粥飲下三十九

治大渴後虛乏羸瘦小便白濁口舌乾燥不

思飲食礞石散方

礞石二兩半搗碎熟乾地黄二兩麥門冬一

去桑螵蛸三分黃耆三分人參三分去桂

心三分白茯苓三分五味子三分甘草一分炙龜

骨三分草解半兩

右件藥搗麤羅為散每服用獐猪腎一對切去脂膜以水二大盞煎至壹盞去滓入藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心溫服晚食前再服

治大渴後虛乏小便滑數腿脛無力日漸羸瘦鹿茸丸方

鹿茸二兩去毛塗酥炙令黃肉苁蓉二兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

附子一兩炮裂去皮臍黃耆一兩剉石斛一兩半去根剉五

味子一兩兔絲子一兩半酒浸二日曝乾別搗為末白龍骨

一兩桑螵蛸二兩微炒白蒺藜一兩微炒去刺

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以清粥飲下三十九

大全本草

市門象人溺坑中水主消渴重者取壹小盞服之勿令病人知之三度差

圖經曰崔元亮海上方治消渴丸云偶於野
人處得神驗不可言用上元板橋麥門冬
鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩
去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了
淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥
犬苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心卽於
臼中搗爛卽內黃連末白中和搗候丸得
卽併手丸大如梧桐子食後飲下五十九
日再但服兩日其渴必定若重者卽初服

藥每壹服壹百五十九第二日服一百二
十九第三日壹百九第四日八十九第五
日依本服丸若欲命藥先看天氣晴明其
夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知如
似可每日只服二十五丸服訖覺虛卽取
白羊頭壹枚淨去毛洗了以水三大斗煮
令爛去頭取汁可壹斗已來細細服之亦
不川著鹽不過三劑差
陳藏器本草云故麻鞋底註消渴煮汁服之

孟詵云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法
廣利方消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸
羸瘦生牛羊乳渴卽飲之三四合
唐本註云鹿頭主消渴煎之可作膠服之弥
善
藥性論云青牛膽主消渴利大小腸臘月牯
牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食
後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不
許多少

陳藏器本草云黃牛乳生服利人下熱氣冷
補閏肌止渴

食療云牛肚主消渴風眩補五藏醋煮食之
唐本註云羊肺療渴止小便數并小豆葉煮
食之良

崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁兔骨
和大麥苗煮汁服極効又一方用兔一雙
剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨
肉相離漉出骨肉斟酌五升汁便澄濾令

冷渴卽服之極重者不過三兔

孟詵云煮驢頭汁令服三二升治多年消渴

無不差者

陳藏器本草云鵝主消渴取煮鵝汁飲之

圖經曰蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其

法云取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌

中以器覆之一宿其虫自沿器上取水飲

不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者爲

勝久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆

陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛

入嬰孺藥爲最勝

簡要濟衆治消渴止煩悶以烏梅肉二兩衛生

易簡方三兩微炒爲末每服二錢水二盞煎取

一盞去滓入豉二百粒煎至半盞去滓食

後臨卧服

外臺秘要青粱米主消渴煮汁飲之差

外臺秘要治渴方糯米二升淘取泔飲訖則

定若不渴不須一方渴者服當飽研糯米

取白汁恣飲之以差為度肘後方衛生易簡方同

外臺秘要治瘡渴利葵根五大斤切以水五

升煮取三升宿不食平旦一服三升

圓經曰今醫以治瘡渴其方出了子蘿蔔三

枚淨洗薄切暴乾一味擣羅為散每服二

錢煎猪肉湯澄清調下食後臨卧日三服

漸增至三錢差

食療孟詵說滕熱消渴取濮瓜去皮每食後

嚼喫三二兩五七度良

外臺秘要治虛熱渴桃膠如彈丸含之佳

三因方

三消治法

真珠圓治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩

醫方大成南北經驗方承類鈐方七情酣飲過多皆致煩渴口

乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母壹法壹兩川連去毛壹兩苦參壹法壹兩玄參

壹法無○得效鐵胤粉壹兩壹分牡蠣煨壹兩壹分

分○玉機微義已朱砂別研麥門冬去心天

花粉各半 金箔 銀箔二伯片一法白扁

經驗方各三百片

右為末鍊蜜入生括樓根汁少許丸如梧

桐子人用金銀箔為衣每服二十九至三

十九先用括蕁根汁下壹服次川麥門冬

熟水下醫方集成補珍 病退日貳服忌炙

燂酒色次投菘蓉圓補

從菘蓉圓○醫方大成止消渴補心腎

菘蓉酒浸方 磁石煨熟地黃得效 山

茱萸得効方 桂心澹寮方 山藥炒 牛膝

酒浸○澹寮 茯苓澹寮方 皮得効 黃芪

方去蘆酒浸 澤瀉鹿茸去毛切 遠志

方鹽湯浸 石斛澹寮方 覆盆子 五

味子得効方 草薺 破故紙炒 巴戟酒 兔

絲子酒浸 龍骨澹寮方 杜仲去皮刺姜汁製 附

干炮去脂 澹寮方重六錢 ○得効方

右為末蜜丸如梧子大每服五十九空腹

米飲下醫方集成南見經驗方

姜粉散治消中多因外傷瘴熱內積憂思喜
啖鹹食及麪致脾胃乾燥飲食倍常不為肌
膚大便反堅小便無度

生姜 研汁 控粉 輕粉

右搜勻每服二錢匕長流水調下齒浮是

效次投猪肚丸 補方同

附子猪肚圓

附子 炮去 皮臍 檳榔 不焙 各 壹兩 鱉甲 醋煮 各半兩

錢常歸 知母 木香 炮 川練 剉炒 得 效方去核

秦艽 去苗 七 大黃 酒蒸 龍膽草 白芍藥

破故紙 酒浸 炒 枳殼 炒 去衣 各半兩

右為末分作三分將二分入猪肚內縫定

令蜜酒三升童子小便五升同入砂鉢內

熬乾爛研細入一分末同搜擣為圓如梧

子大每服五十九溫酒米湯下

烏金散治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾

飲啖肥膩熱積胃中致多食數溲小便過於

所飲亦有不渴而飲食自消為小便者

黃丹炒 細墨燒各壹兩

右研勻每服三錢食後先用水壹兩椀漱
口待心中熱索水便以冷水調下

爛金圓治熱中消渴止後將補精血益諸虛
解勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固
臟腑進飲食免牛瘡瘍

大猪肚壹兩 黃連三兩 蜜二兩 生姜各二兩

先將猪肚淨洗復以葱麵醋椒等洗控乾
用藥同水洒入銀石器內煮半日漉出黃

連洗去蜜酒令盡剉研為細末再用酒調
成膏入先洗猪肚內縫定入銀石器內水
熬爛研為膏搜下項藥

人參二兩 黃芪四兩 五味子二兩 山藥二兩 杜仲去皮

剉姜汁淹炒 山茱萸 石斛 車前子 鱉

甲醋炙 熟地黃 新蓮肉去皮 當歸各二兩 槐角

子炒 白茯苓 磁石煨碎各兩 川芎壹兩 沉香

不焙兩 麝香壹錢別研入 兔絲子酒浸濕研五兩

右為末用猪肚膏搜和得所膏少則添熟

蜜杵數千下元如梧子大食前温酒糯米湯任下五十丸一法有白朮二兩陽起石膏兩

石子薺苳湯治強中多因耽嗜色慾及快意飲食或服丹真氣既脫藥氣陰發致煩渴引水飲食倍常陰器常與不交精出故中焦虛熱注於下焦三消之中最為難治

腎遂致唇口乾焦精溢自出或小便赤黃五色浮濁大便燥實小便大利而不甚渴

白茯苓

胡桃肉

湯去薄皮別研

附子

大介壹枚去皮臍切

作片生姜汁壹盞蛤粉壹分同煮乾焙

右等分爲末蜜丸如梧子大米飲下三五丸或爲散以米飲調下食前服

古瓦湯治消腎消中飲水無度小便頻數

乾葛

天花粉

人參

雞臍脰

淨洗焙乾各等分

右爲末每服二大錢用多年古瓦確碎煎湯調下不以時候服

鹿茸圓治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸去毛切炙三分○得効方麥門冬去

二熟地黃得効方黃芪得効方雞臍脰炒

菴蓉酒浸山茱萸得効方破故紙炒牛膝

酒浸○得効方五味子各三分○澹寮方各茯

苓澹寮方去皮得効方玄參得効方無地骨皮各

兩○得効方人參三分○得効方去蘆

右為末蜜元如梧子大每服三十元至五

十元米湯下醫方大成集

遠志圓治心腎虛煩渴引飲胃間短氣小便
自利白濁泄遺

人參 白茯苓 川姜炮各半兩牡蠣煨取粉遠

志去心姜汁製

右為末用菴蓉一兩酒熬成膏圓如梧子

大每服五十圓糯米湯下

六神湯治三消渴疾

蓮房 乾葛 枇杷葉去毛甘草炙括樓根

黃芪各等分○得効方去蘆蜜炙

右爲剉散每服四錢水壹盞煎七分去滓

溫服醫方大成集或南北經驗方小便不

利加茯苓得効方加赤茯苓

子童柔白皮湯治三消渴病或飲多利少或

不飲自利肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止

渴利

童根桑白皮即未移栽者去粗皮日乾不焙茯苓得効方去皮

人參得効方去蘆麥門冬去心乾葛 乾山藥

桂心各一兩○得効方去麤皮甘草半兩○得効方右

剉散水壹盞半煎至七分去滓溫服

玄兔丹治三消渴利神藥常服禁精止白濁

延年

兔絲子酒浸通軟乘濕研白茯苓得効方焙乾別取未十兩

蒸療方鹽酒乾蓮肉各三五味子酒浸別爲末秤七兩

○得効方去梗澹寮方酒浸二宿

右爲末別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘

者添酒煮糊澹寮方少則搜和得所擣數

千杵丸如梧子大每服五十九米湯下空

心食前服 得效方每服五十圓 天花粉北

脚膝無力 木瓜湯下

梅花湯治三消渴利神

糯谷 旋炒作 桑根白皮 厚者切 細等分

右每用秤一兩許水壹大椀者取半椀渴

則飲不拘時 得效方同

猪脊湯治三消渴疾

大棗 四十九枚 去皮核 新蓮肉 四十九粒 去心 西木香 一錢

半甘草 二兩 炙

右用雄猪脊骨一尺二寸同煎藥用水五

椀於銀石器煮去肉骨濾滓取汁壹椀空

腹任意呷服忌生冷鹽藏等物以滓減去

甘草壹半焙乾為末米湯調服不以時

八味圓治消渴小便多以飲水一斗利小便

反倍

澤瀉 茯苓 牡丹皮 各三兩 桂心 附子

物去皮臍 山茱萸 山藥 各四兩 熟地黃 八兩

右為末蜜丸梧子大每服五十九米湯下

食前服也。○直指方治消腎補虛止渴見
瘧冷本方去附子以北五味子代之內澤
瀉截塊再蒸熟地黄再蒸朱氏集驗方治
消渴八味圓去附子加五味子用繭空及
茄空煎湯下聖濟總錄治消渴後熟乾地
黃焙四兩桂皮去麤皮牡丹皮山芋白茯苓去黑皮
山茱萸各壹兩澤瀉五味子各一兩右八味搗
羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十
丸薄鹽湯下

烏梅木瓜湯治酒食過度中焦蘊熱煩渴枯
燥小便併多遂成消中兼治澹寮方瘴渴所
謂瘴渴者北人往南方瘴地多有此疾。○得
效方治飲酒多發積爲酷熱熏蒸五臟津液
枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒
漿
木瓜澹寮方烏梅打破不麥蘖炒甘草
草菓去皮各
右剉散每服四大錢水盞半姜五片煎七

分去滓不以時候

渴疾有人候山谷万單用兔絲子酒浸透直
介抄服甚效亦有將黃芪陸兩甘草膏兩作
六一湯服之尤效又渴人病愈須預防發癰
疽宜服忍冬圓

忍冬草

不以多少根莖花葉皆可用一名
老翁鬚一名蜜啜花一名金銀花

以洗淨
用之

右以米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取
出曬乾入甘草少許為末即以前所浸酒為

糊元如梧子大每服五十元至百丸酒飲
任下不以時此藥不特治癰亦能止渴并

五痔諸漏

得效方澹
審方同

麥門冬煎治諸渴

麥門冬

去心

人參

黃芪

各二兩

白茯苓

山

茱萸

山藥

桂心

各壹兩

黑豆

三合煮去
皮別研

右為末地黃自然汁二椀牛乳二盞熬為

膏元如梧子大麥煮飲下五十九

竹龍散治消渴

五靈脂 牛兩生 黑豆 去皮

右為末煎冬瓜子湯調下二錢○聖濟總錄右二味擣羅為散每服二錢七煎冬瓜湯調下無冬瓜子用冬瓜苗葉子煎湯俱可一日二服不可瀉只宜服差渴定後不可服熱藥唯宜服八味丸仍更宜服五味

子代附子

澄源丹治三消渴疾神妙○得效方治氣實血虛熱在上焦心煩燥渴引飲無度小便數

晝夜一二十行有麩片甜者此疾多得之飲啖炙煨日就羸瘦咽喉唇焦燥吸吸少氣不能多語兩脚痠食倍於常不為氣力

牡蠣粉 苦參 蜜陀僧 知母 水銀

以白蠟半錢結沙五味各壹兩 括樓根 壹兩半○得效方壹兩 黃丹 壹兩與水銀沙同研

右為末男子用雌猪肚一个女人用雄猪肚一个入藥在內以線縫定用繩縛在新塼上別用生括樓根半斤切碎同煮早晨

至午時取藥出不用栝樓根只爛研猪肚和藥為丸如梧子大每服三十粒食前米湯下日三服十日可去病根

神巧萬全方

治消渴不止方聖濟總錄名金英丸

號丹 麥門冬去心○總錄焙 牡蠣總錄研如粉 知母

各壹兩○總錄焙 黃連總錄去須 乾栝婁根 苦參各

大金一百箔 銀二百箔總錄膏 栝婁

根二大兩杵如泥入藥中

右儔羅為散用生栝婁根汁和丸總錄如梧桐斤

大 每日食後服四十九以飲下日再服夜

又進費服當日渴止十日已來漸覺減即

壹日兩服服三十五丸一月外每日壹服

服三十九夏月即用蜜為丸服藥之次腹

中忽冷痛即取厚朴二小兩炙總錄去蘆皮薑汁炙

橘皮三分總錄去白焙 生薑二小兩以水二大

升煎取半升去滓分溫兩服服訖良久即

以飯壓之如腹中不痛即不喫此方前後

相傳數人無不神驗元和中權侍郎遇此疾至于舌上皴裂杜司徒與孕丹令依方服頓愈令狐章勒石三方此篇居首類試皆效

治癆腎小便多白濁或不禁黃連丸

黃連去須兔絲子酒浸三日曬五味子乾別研末肉

菴蓉酒浸一宿刮去皴皮炙龍骨各壹兩山茱萸兩磁

石半兩燒赤醋淬七遍研水飛過雞臍脰中黃皮壹兩半微炙

右件搗羅為末入研了藥和勻煉蜜丸如

助道方 梧桐子大每服二十九食前以粥飲燕下

治腎虛消渴病

心腎虛成消渴患晝夜飲水渾無筭連膠八味和為元數服須教減一半

消渴之病皆因腎氣虛弱又因少服乳食過度其病大渴引飲方用黃連阿膠元一貼乳為末八味元二貼合和為元如桐子大每服三十元至四十元煎蓮肉北棗栗

穀陳米各二錢重用水一大碗煎至七分
碗去滓分作四五服送下前合元子若病
久胃虛飲食減少更加陳橘皮貳片縮砂
二十粒搥碎同煎取滓再煎尤妙
是齋醫方

消渴

治消渴

得效方名麩餅圓永類鈴方名伏深
神授元急救仙方名神效元

鈴轄方沈德和尚書傳

蜜陀僧

二兩別研極細

川黃連

壹兩為細末
○仙方去須

右二味用蒸餅為元如梧桐子大每服五
元煎蠶空茄根湯下衛生易簡方鹽臨臥
服次日加至十元得効方以後每日加五
圓至三十圓止服藥之後以見水惡心為
度即不須服不過五六服必効若覺惡心
但每日食乾物壓之旬日後自定奇甚奇
甚蠶空是出蠶蛾了蠶殼○仙方右為細
末蒸餅糊為元梧桐子大濃煎蠶皮搥湯
或酒或茄根湯吞下一日五元日增五元

至三十九止不可多渴止勿服昔旅店有客患此病夜求水不得酌釜中湯飲之而愈且往視之乃練蠶湯也

治消渴錢有文知府方

牛鼻木二个洗淨細剉男患用雌女患用雄甘草 人參各半

兩白梅十个

右川水四盃煎至二盃濾去滓熱服為妙

治消渴郭都巡方以湯餠內減不拘多少研

如粉每服二錢沸湯或井花水調下不拘

時候

又方簡易方名括樓根簡易方用黃連簡易方去

鬚

右等分為細末研麥門冬取自然汁和藥

元如棗豆大每十五元至二十元熟水下

簡易方又云衛生方治消渴小便頻數滑

如油用黃連去須瓜萇連穰○衛生方易等分

為末以生地黃自然汁為圓梧子大每服

五十圓易簡方食後川牛乳汁下得效方

方或醉一日只兩服不可太多其妙如神

湯下得效方又云或忌冷水猪肉亦名漢連圓研麥門冬自然

汗爲元熟水吞下

瑣碎錄

天消渴豆大或十五天至二十天

治瘡渴兔絲子不拘多少用酒浸曬於日中

三兩日一次換酒用時洗去酒濃煎湯飲

○事林廣記兔絲子煎汁任意服之渴止

爲度

又方用黃連四兩洗淨去鬚槌碎爛研冬瓜

不拘多少拌勻盒之夏一宿秋冬三宿取

出曬乾爲末再用冬瓜汁煮麵糊圓如桐

子大每服三十圓浮萍煎湯吞下

又方一味蓴菜生食之用塩醋亦可湯定則

止向有一卒在途中壹飲左數斗遇道人

又于邸中道中有市蓴菜者道人曰汝以是

啖之未及半盞許已減三分之二其卒盡

啖詰朝則差固嘗試之累驗

止渴方遠行帶白梅則無渴患

治渴疾北五味子煎濃湯飲之事林廣記同

又方用桑椹子五斤取汁入白沙蜜四兩銀

石銚內熬成膏子以湯點任意服試之甚

又驗一劑藥菜少食之則熱漸平可試也

又北五味子爛研作餅含化生津止渴

簡易方立心木再川冬入竹葉湯開喉喘

不一清心林已盡之夏一劑冬三劑

清心蓮子飲治心中蓄熱時常煩躁因而思

慮勞力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜

夜夢走泄遺瀝澁痛便赤如血或因酒色過

度上盛下虛心火炎上肺余受克口舌乾燥

漸成消渴睡臥不安四肢倦怠男子五淋

婦人帶下赤白病後氣不收斂陽浮於外

五心煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養

神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣

麥門冬去心甘草炙黃芩得效方地骨皮得效

骨方去車前子各半兩得石蓮肉去心黃耆

蜜炙○得人參去蘆得效方白茯苓各七錢半
去皮以上四味各七錢

右剉散每三錢麥門冬十粒得効方水壹

盞半煎八分去滓水中沉冷空心食前服

癸熱加柴胡薄荷煎外論

瘡渴

衛生方天花散治消渴等疾歌曰瘡渴瘡

中瘡腎病三焦五臟生虛熱惟有膀胱冷如

水意中飲水無休歇小便晝夜不流通骨冷

皮焦心肺裂本因飲酒炙燻多酒餘色慾勞
無節飲水喫食日加增肌骨精髓轉枯竭漩
甜如蜜滑如油口苦咽乾舌如血三瘡良方

焦作三病狀最為危有此仙方真妙訣

黃連去須三兩童子白扁豆炒二兩○直

方姜制辰砂別研○直鐵艷粉別研各一

方去皮兩鈴方是初治小牡蠣殼知母苦

參下天花粉各半蘆薈壹分金箔十銀箔二

十片○直指方
加白茯苓半兩

右末取生瓜萋根自然汁和生蜜為圓如

梧子大每三十圓醫方大成集成袖珍方

麥門冬良方湯下無不應驗

家寶方地黃飲子瘡渴咽乾而赤煩燥

人參去蘆生乾地黃洗熟乾地黃洗黃耆蜜炙

天門冬去心麥門冬去心枳殼去穢炒石斛去根炒

枇杷葉去毛澤瀉炙各甘草等分

右粗末經驗良方每三錢水壹盞煎至六分

醫方大成集成南北去滓食後臨臥溫服

玉機微義此方乃全用二黃圓甘露飲料生

料補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎導二

腑使心火下行則小腑清利肺經潤澤則

大腑流暢宿熱既消其渴自止永類鈔造

化精深妙無踰此得效

桃谿方括萋根散解煩止渴

括萋根新掘者不以多少切

右研細每服壹錢米飲調服衛生方治

腎虛瘡渴難治者用天花粉豆大黑豆炒

等分爲末麵糊圍梧子大黑豆湯下百粒
名救活圓

家寶方大救生圓理三消渴疾日夜飲水百
盃不歇苦飲酒則渴愈甚者專心服餌之數
日後見酒與水若仇讎頓爾口中津潤小便
縮減五日後小便赤色是病毒歸於下也或
令人吐或腰背脚膝疼痛或嘔逆惡心精神
昏困此乃藥驗使病毒消散也或有不傳於
下者主生子母瘡或生於背或生鬚鬢間爲

五漏瘡並能致命但服此藥至八九服其病
自除大忌酒色熱麵鹹物豚魚葱蒜炙煨等
物一百日病根永除

牡蠣生用苦參生爲末瓜萋生爲末知母生爲末蜜陀

僧生用各兩白鐵研水銀研各八錢黃丹半兩研

右末男子患用未生子牝猪肚壹箇女人
患用獾猪肚壹箇貯藥以線縫合用繩子
繫在新磚上不令走轉更用瓜萋根半斤
細切入在水中壹處和磚煮早晨至午取

猪肚細切與諸藥末杵圓梧子大陰乾空心米飲下三十圓日三服家藏方用黑鉛與水銀結砂不用白鐵

衛生方瓜連圓治瘡渴

大冬瓜

一枚去穰入黃連末實冬瓜內浸十余日覺冬瓜肉消盡為度

右同搗爛為圓梧子大每服不拘多少冬

瓜煎湯下

經驗良方同

是齋方玉壺圓消暑毒止煩渴

方見諸暑門右每

服五十圓用人參煎湯放冷吞下

七寶洗心散治寒壅不調鼻塞聲重咽乾多

渴五心煩熱小便赤澁大便秘滯風壅壯

熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝

口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅塞涕唾稠粘心

神煩燥眼澁睛疼

和劑方

大黃

通與煨去麩

當歸

芍藥

甘草

燼

麻黃

不去

荆芥穗

各六兩

白朮

壹兩

右細末每二錢水壹盞姜二片薄荷三葉

同煎七分溫服小兒麩豆瘡疹欲發先

狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨臥服大人五藏壅實欲要澹加至四五錢熱服

龍腦飲子治邪熱蘊積咽乾多渴喉中腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄睡臥不寧痰熱咳嗽中暑煩燥一切風壅

甘草半斤山梔仁六兩石膏二兩瓜根縮

砂仁各一兩半藿香葉七錢

右末每服壹錢至二錢新汲水入蜜調下

傷寒餘毒潮熱作渴用藥二錢水壹盞竹葉五六片煎七分食後服

八味腎氣圓治下元虛憊小便頻數水火不能既濟心火炎上熏炙肺金為火燥是致渴生飲水無度宜先固本可愈其渴也

張仲景方方見諸虛門右每服三四十圓溫酒吞下忌猪肉冷水蕪荑葫荑等究原方去附子加五味子

直指方

消渴證治

降心湯治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣

血消

人參得效方遠志姜淹取肉焙○得効方

甘草姜汁常歸得効方川芎得効熟地黃

去土蒸白茯苓得効方黃耆蜜炙○得

北五味子得効方甘草微炙各天花粉膏

右剉細每三錢棗得効方水壹煎食前服

生地黃膏渴證通用

生地黃束如杏椀大二把冬蜜電人參兩

白茯苓一兩○得將地黃洗切研細以新冰壹椀調開同

蜜煎至半次入參苓末拌和磁器密收匙

挑服

黃耆湯治諸渴疾

黃耆伏神瓜蒌根麥門冬去心各

北五味子甘草炙各生乾地黃壹兩

右剉細每四錢新水煎服

猪肚圓治諸渴疾

川黃連五兩淨白乾葛二兩知母二兩伏神二兩麥

門冬去心熟地黃洗焙各二兩瓜蒌根二兩粟米

各三人參一兩

右木白中同搗為散入淨猪肚內縫密置

甕內蒸極爛乘熱再杵細若硬加沙密圓

桐子大蒸汁下五十九或粥飲下

又功一味黃連末入猪肚內縫密滿甕米上

蒸熟白過杵丸如前法

川黃連圓治諸渴

川黃連淨五兩白天花粉二錢麥門冬夫心各

右末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗圓桐

子大每三十九粳米飲下

玉泉圓治煩渴口乾

麥門冬去心人參二兩伏苓二兩黃耆半生半

烏梅肉焙甘草各壹兩瓜蒌根各壹兩乾葛各壹兩

右末煉蜜丸彈子大每壹丸温湯嚼下

止渴劉散

枇杷葉新布拭去毛白乾葛生薑各片焙大

烏梅七个大草果二个淡竹葉甘草半兩

右判每四錢新水煎服

蠟苓圓補虛治濁止渴得效方此下云潤腸婦人血海冷白帶白

淫白濁

黃蠟雪白伏苓各四兩○得效方去皮

右伏苓為末鎔蠟和圓彈子大每一丸不

飢飽細嚼下得效方此下云棗湯亦可

蜜絲湯治渴神效煮蜜搔絲湯任意飲之頓

效如非時以絲或絲煎湯服得効方同○朱氏

集驗方蠶繭湯有一人苦渴疾日飲斗水

下諸藥不效遂服煮蠶繭搔絲湯一蒸其渴

頓除恐不及時如無但以亂絲煎湯服經

驗良方右用看蠶人家繅蜜湯飲之亦効

辰砂妙香散治渴證小便滿數而瀝兼有油

瓜濁用燈草伏苓煎湯下得効方方見黃疽門及驚悸門

天花粉圓治消渴飲水多身體瘦

天花粉黃連去須各伏苓當歸各半

右末煉蜜圓桐子大每三十九茅根煎湯

天下條國常...

瓜連圓治消渴骨蒸

黃連淨剉用冬瓜汁浸一宿曬乾凡七次

右末冬瓜汁丸桐子大每三四十九半飢

飽熟水下或五十九米飲下承類鈐方同

王壺圓治消渴引飲無度

人參瓜萸根等分

右末煉蜜丸桐子大每三十九麥門冬煎

湯下承類鈐方同

天花散治消渴

天花粉 生乾地黄洗各壹兩 乾葛 大麥門冬

去心北五味子各半兩 甘草壹分

右籠末每服三錢粳米伯粒同煎服

錢氏白朮散治消中消穀善飢

人參 白朮 白茯苓 甘草炙○補珍方各半兩

藿香葉兩 白乾葛二兩○承類鈐方 葛粉 木香半兩 加

北五味子 柴胡 枳殼製各半兩

右麤末每二錢新水醫方大成集成煎服

伏神圓治消中煩熱消穀小便數木香

人參得効方伏神得効方生乾地黃得効方

土黃蓮淨麥門冬去心枳殼製牡蠣粉各

兩石蓮肉得効方黃耆炙○得効方知母各

兩○得効方瓜蒌根分三

右末煉蜜同搗三百杵丸桐子大每五十

丸清粥飲下

小兒絲子圓治消腎以天花粉北五味子煎

湯下方見黃

枸杞子圓治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞兔絲子酒浸白茯苓黃耆炙

蠣粉牛膝熟地黃洗麥門冬去心各

雞內金微炙桑螵蛸瓜蒌根各三分

菜萸牡丹皮各半

右末煉蜜和搗三百杵丸桐子大每五十

丸食前粥飲下

平補圓治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而

瀝如欲滲之狀不出則肉熱則小便澀澀而

兔絲子酒浸山茱萸酒浸當歸 益智仁

各泔川練肉牛膝林葫蘆巴厚杜仲

姜製巴戟心菘蓉酒浸焙各乳香二

右末糯米糊丸桐子大每五十丸棗湯或

鹽湯食前服

雙補丸治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠二沉香半兩○得効澤瀉蒸塊再

覆盆子白茯苓人參得効方宜木瓜

薏苡仁炒黃耆炙熟地黃洗再菘蓉酒浸

兔絲子酒浸蒸北五味子石斛炒當歸

酒浸焙各壹兩麝壹錢○得効

○得効方去尾麝方生麝別研

右末煉蜜圓桐子大朱砂衣每五十圓空

心棗湯下

煞虫方治消渴有虫出夷苦練根取新白皮

壹握切焙入麝少許小二椀煎至一椀空

米心飲之雖困頓不妨自後下虫三四條狀

如蛔虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一

證有虫耗其津液得効方永類鈔方同

朱氏集驗方不效自好不效三四發

消渴人飲少而水二淋

鹿茸圓治渴疾趙司法服之有效

鹿茸二兩兔絲子一兩浸酒蒸天花粉

右煉蜜為圓每服五十圓空心北五味子

湯服

治渴疾五味子湯黃耆六乙湯

棘飭子散治傷酒多或成渴證

棘飭子

本草載云距椽當門子五粒

右用棘飭子煎湯吞下當門子其渴立止

蓋棘飭最能口口口口凡人家若酒房畔

有此木不宜

冬瓜飲子治渴疾大冬瓜子去搗爛取自然

汁五大椀下五苓散壹兩去桂調成飲子

時時喫壹盞與藥時不得與水不過二料

立愈

白朮散治胃虛發渴

白朮一兩 人參得効方去蘆 伏苓得効方 甘草各半

右為末每服七錢水蒸半煎七分服凡吐渴之後多有腫疾仍預服復元丹數服國梁

加味四君子湯治消渴冬傳佐

人參 白茯苓 白朮 甘草 桔梗

神功散治消渴

北白芍藥壹兩 甘草壹兩

右咬咀每服三錢水盞半煎六七分無時服

麥門冬圓治消渴

麥門冬去心爛研成膏 瓜蒌根 黃連去鬚

右二味為末入麥門冬內搗勻為圓每服三十圓早晚食後煎麥門冬湯下

參耆湯治消渴

人參得効方去蘆 桔梗得効方去蘆 天花粉 甘草

各壹兩 白芍藥 蘇耆 鹽湯浸各二兩。白

伏苓 得効方 北五味 各壹兩半

右哎咀每服四大錢水盞半煎八分日進

四服留滓合煎 以上四方載 一方有木瓜

乾葛烏梅三味

雞蘇圓治病後虛羸發渴雞蘇圓用五味子

煎湯吞下仍服安腎圓 得効方方見血

嚴氏濟生方

消渴

加減腎氣圓治勞傷腎經腎水不足心火白

用口舌焦乾多渴而利 醫方大成而 精神恍

惚面赤心煩腰痛脚弱肢體羸瘦不能起止

山茱萸 取肉 白茯苓 去皮 牡丹皮 去 熟地黃 酒

五味子 澤瀉 鹿角 鎊 山藥 炒各 沉

香 不見火 官桂 不見火

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓用鹽湯米飲任下弱甚者加附子一

兩兼進黃芪湯 醫方集成南北經驗方補

黃芪湯 方見諸汗門

薺芫圓治強中為病莖長與盛不交精液自

出消渴之後多作癰疽多由過服丹石所致

薺芫 大豆皮去伏神木去磁石極細玄參

栝樓根 石斛根去地骨皮去熟地黃蒸鹿

角 各壹兩 沉香 不見人參各半

右為細末用猪腎壹具煮如食法冷爛杵

和為圓 永類鈞方如梧桐子大每服七十

圓空心用鹽湯送下如不可圓入少酒糊

亦可

十形三療

劉河間先生三消

神白散治真陰素被損虛多服金石熱藥或

嗜炙煇鹹物遂成消渴

桂府滑石 兩 甘草 兩

右為細末每服三錢溫水調下或大渴欲

飲冷者新汲水尤妙

猪肚丸治消渴消中

猪肚一枚 黃連兩 栝樓兩 麥門冬四兩 知母四兩

四兩如無以

疾神代之 右四味為細末內猪肚中線縫安置甌中

蒸極爛熟就熱於木臼中擣可丸如硬少

加蜜丸如梧桐子大每服三十九漸加至

四五十丸渴則服之如無木臼以沙盆中

用木杵研亦可以爛為妙

葛根丸治消渴消腎

葛根三兩 栝樓兩 鈎丹兩 附子一兩 者炮

右四味壽羅為細末煉蜜為丸桐子大每

服十九日進三服治日飲碩水者春夏去

附子南北經驗方

胡粉散治大渴百方療不差者亦治消腎

鈎丹 胡粉各半 栝樓二兩 甘草三兩

澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂各半

右八味為細末水服方寸匕日二服壯者

壹匕半壹年病一日愈二年病二日愈渴

甚者二服腹痛者減之如丸服亦妙每服

十九多則腹痛也
人參白朮湯治胃弱瘴熱煩滿不欲食或瘴
成爲消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲
而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致
脾胃真陰血液損虛肝心相搏風熱燥甚三
焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身
不得潤澤故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲
而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而
便注爲小便多也叔世俗流不明乎此妄爲

下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或
爲目瘡癰疽瘡瘍上爲喘嗽下爲痿痺或停
積而濕內甚不能傳化者變水腫腹脹也凡
多飲數洩爲渴多食數洩爲消中肌肉消瘦
小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病
也雖經所不載以內經考之俱燥熱之微甚
者也此藥兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭
目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃澁滯
壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病煩渴氣液不得

宣涌并宜服之

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山

梔子 澤瀉 已上各半兩 連翹 芩蘘根 乾

葛 茯苓 已上各一兩 官桂 木香 藿香 各

分 寒水石 二兩 甘草 三兩 石膏 四兩 滑石 一 盆硝

各半斤

右為麤末每服五錢水壹盞生薑三片同煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加十餘錢無時日三服或得藏府疏利亦不妨取

效更妙後却常服之或兼服消痞丸似覺

腸胃結滯或濕熱內甚自利者去大黃芒

硝

人參散治身熱頭痛或積熱黃瘦或發熱惡

寒畜熱寒戰或弱疾嘔吐燥熱煩渴或燥濕

瀉痢或目疾口瘡或咽喉腫痛或風昏眩或

蒸熱虛汗肺痿勞嗽一切邪熱變化真陰損

虛並宜服之

石膏 壹兩 寒水石 二兩 滑石 四兩 甘草 二兩 人參 半兩

右爲細末每服二錢溫水調下或冷水亦得

三消之論劉河間之所作也因麻徵君寓汴梁暇日訪先生後裔或舉教醫學者卽其人矣徵君親詣其家求先生平昔所著遺書乃出三消論氣宜病機二書未傳于世者文多不全止取三消論於卷首增寫六位藏象二圖其餘未遑潤色卽付友人穆子昭子昭乃河間門人穆大黃之孫也時覓官于京師方

且告困徵君欲因是而惠之由是余從子昭授得一本後置兵火遂失其傳偶於鄉人霍司承君祥處復見其文然傳寫甚誤俱依倣而錄之以待後之覺者詳爲刊正云續方栢亭東父亭寺僧悟大師傳經驗方治飲水百盃尚猶未足小便如油或如杏色服此藥三五日小便大出毒歸于下十日永除根本此方令子和辨過云是重齊可用悟公師親驗

水銀四錢錫二錢用小銀牡蠣兩蜜陀僧兩

知母兩紫花舌參兩貝母兩黃丹兩葑蕀兩

根半斤三五日小野火出...

右為細末男子用不生兒猪肚壹箇內藥

婦人用獾猪肚壹箇麻線縫之新瓦一合

而繩繫一兩遭米壹升更用栝樓根末半斤

却於新小煮熟取出放冷用砂盆內初爛

就和為丸如猪肚丸法用之

宜明論

消渴

人參白朮湯治胃膈瘴熱煩滿飢不欲食瘴

成為消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多

飲而數小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱

頭目昏眩風中偏枯酒過積一切腸胃燥澁

倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病產後煩渴

氣液不得宣通

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山

梔子 荆芥穗 薄荷 桔梗 知母

澤瀉已上各半兩茯苓去皮連翹 苡蕒根 乾

葛已上各兩官桂桂心青木香 藿香葉

各一分 甘草三兩石膏四兩寒水石二兩石珍方三兩

石加盆稍五錢右為細末每服抄五錢水壹茶盞入盆消

生薑三片煎至半盞絞汁入蜜溫服漸加

至十餘錢得臟腑流利取效如常服以意

加減兼服消痞丸散以散腸胃結滯濕熱

○袖珍方右吹咀每服一兩水二盞牛姜

三片煎至一盞去渣通口服無時

驗 絳雪散治消渴飲水無度小便數者大有神

驗

黃芩 黃丹 漢防已 括蕒實各等分

右為細末每服貳錢湯漿水調下臨卧併

參貳服即少

人參散治消腎善飲而食而數小便溺者

人參三分○補白朮 澤瀉 苡蕒 桔

梗 梔子 連翹各半 葛根 黃芩 大

黃 薄荷 白茯苓 已上各一兩 甘草 一兩

方生 石膏 二兩 滑石 各三兩 寒水石 方加砂仁三錢

右為末入縮砂仁參錢每服五錢水壹盞

煎至七分入蜜少許再煎參貳沸去滓食

前食後服消痞丸○袖珍方右吹咀水二

盞蜜少許煎至一盞去渣通口服不拘時

候

大黃甘草飲子治男子婦人一切消渴不能

止者

大豆 五升先煮三沸 甘草 大麓者四兩

黃 壹兩

右參味用井水壹桶將前藥同煮三五時

如稠強水少更添豆軟盛於盆中放冷令

病人食豆渴食湯汁無時候食盡如止渴

燥罷不止再煮前藥不三次病悉矣 此

方袖珍方玉機微義衛生易簡方同

東垣試效方

消渴

生津甘露飲子治高衛生寶鑑作隔消大渴飲水無

度舌上赤澁上下齒皆麻舌根強硬腫痛食

不下腹時脹痛蘭室秘藏此下云或渾身色

黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面鹿脫色

脇下急痛善嚏善怒健忘鬢腰背寒寶鑑雨

丸冷甚寶鑑此下云順德安撫張耘夫年四

小便數多先師以此藥治之旬日良愈古人

云泮渴多傳瘡瘍以此成不救之疾既效亦不

傳瘡瘍享年七十五歲終名之日生津甘露飲子方

石膏一錢二分○寶鑑二錢人參二錢牛黃一錢

藏壹錢炙甘草二錢山梔壹錢○寶鑑澄茄

錢壹錢白豆蔻壹錢白葵半錢○秘黃蘗酒拌壹

錢半香白芷壹錢連翹壹錢杏仁去皮一麥

門冬半錢黃連三分木香三分桔梗三錢升麻二錢姜

黃壹錢○寶鑑知母二錢當歸身半錢全蝎二

○秘藏去毒藿香二分柴胡三分蘭香半錢

消之為病燥熱之氣勝也內經曰熱淫所

勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則

無潤折熱補氣非甘寒之氣不能除故以

石膏甘草之甘寒為主啓玄子云滋水之源以鎮陽光故以黃連黃蘗梔子知母之苦寒瀉熱補水爲臣以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白芷白葵蘭杏甘草寶鑑作辛甘寒和血潤燥爲佐以升麻柴胡苦平行陽明少陽二經白豆蔻木香藿香寶鑑有反佐以取之又爲因用桔梗爲舟楫使浮而不下也寶鑑此下云東垣先生當謂予曰索人參大作湯劑多服之不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根大作湯劑廣服之

右件爲細末如法湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子晒半乾杵碎篩如黃米大食後每服二錢抄於掌中以舌舐之隨津唾下寶鑑或送以白湯少許玉機微義同亦可此制之緩也不惟不成中滿亦不傳寶鑑有字下消矣戊申正月七日葉律千戶服此大效

蘭香飲子蘭室秘藏名甘露膏治渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

石膏三錢 酒知母壹錢 生甘草壹錢 炙甘草半錢

人參半錢 防風壹錢 半夏二分 蘭香半錢 白苳菴

仁壹錢 連翹 桔梗 升麻各半錢

右同為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作薄

片子日中曬半乾碎如米玉機微粉 每服二

錢食後淡生薑湯下送下

地黄飲于治口乾舌乾小便數舌上赤脉此

藥生津液長肌肉

杏仁六分 生甘草三分 石膏壹錢 黃連酒製八分 桃仁

六分 生地黃酒製七分 黃蘗酒製壹錢 當歸酒製四分 柴胡

三分 炙甘草三分 升麻壹錢 紅花許少 知母酒製半錢 麻

黃根三分 漢防已酒製五分 羌活半錢

右件判如麻豆大都作壹服水二盞煎至

壹盞去粗溫服食後忌濕麵房事掠血戊

申仲冬張安撫服此大效

當歸潤燥湯治消渴舌上白乾燥唇乾口乾

眼澁黑處見浮雲大便閉澁乾燥結硬喜濕

蘭室秘藏玉飲陰頭短縮

升麻壹錢柴胡七分甘草六分○秘藏生炙各三分

分細辛壹分黃蘗壹錢知母壹錢石膏壹錢杏仁六分

桃仁泥子壹錢麻仁泥子壹錢當歸身壹錢紅花壹錢

少防風壹錢荆芥穗壹錢熟地黄三分○微小

椒三個

右件咬咀都作一服水二碗煎至一盞去

粗食後溫服秘藏熱服食遠忌辛熱物

清涼飲子蘭室秘藏名生津甘露湯治消中能食而瘦

乾舌乾自汗大便結燥小便頻數

羌活壹錢柴胡壹錢升麻四分防風五分當歸身六分

生甘草半錢炙甘草壹錢石膏半錢酒知母壹錢

漢防已半錢草龍膽酒製壹錢黃蘗壹錢紅花壹錢

少桃仁五介杏仁十介生地黄酒製半錢黃耆壹錢

芩酒製一錢

右件咬咀麻豆大都作壹服水二盞酒壹

匙煎至一盞去粗稍熱服食後秘藏○玉

機微義右咬咀作一服水煎入酒些小此

方減黃耆黃芩防風草龍膽加麻黃根三分

黃連八分名地黃飲子

清神補氣湯蘭室秘藏名前消渴證皆愈止

有口乾腹不能餐起

升麻壹錢柴胡七分生甘草五分黃蘗酒製壹錢

連酒製半錢知母酒製半錢石膏四分杏仁六分桃仁壹錢

常歸身壹錢紅花少許防風壹錢荆芥穗壹錢熟地

黃三分小椒二分細辛一分生地黃壹分

右件判如麻豆大都作一服水二盞煎至

一盞去粗稍熟食後服秘藏食遠服

甘草石膏湯消病全愈再添舌白滑微腫咽

喉嚨唾覺痛噎腫時有渴白沫如膠飲冷則

稍緩

升麻一錢柴胡七分甘草五分黃蘗壹錢知母壹錢

石膏六分杏仁六分桃仁一錢○蘭室秘常歸

身壹錢熟地黃三分小椒二分細辛一分黃連三分紅

花少許防風壹錢荆芥穗壹錢生地黃壹分

右件判如麻豆大都作壹服水二盞煎至

膏盞去粗稍熟食後服秘藏溫服

蘭室秘藏

消渴

和血益氣湯治口乾舌乾小便數舌上赤脉

此藥生津液除乾燥生肌肉

柴胡 炙甘草 生甘草 此未治口乾也 麻黃

根 已上各酒當歸稍分 酒知母 酒漢防

已 羌活 已上各石膏 便赤也 小酒生地

黃 七分 酒黃連 八分治舌赤脉也 酒黃蘗 升麻 已

各一 杏仁 桃仁 七上各 紅花 少許

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去

粗溫服忌熱濕麵酒醋等物

得效方

瘡渴

肺消澄源丹 真珠圓 菴蓉圓 方並見

生地黃膏 方見直指方

脾瘡之證飲食入腹如湯澆雪隨小便而出

落於溷僻溝渠中皆旋結如白脂肌膚日益

消瘦用熱藥則熱愈甚用涼藥則愈見虛羸

不能起止精神恍惚口舌焦乾或陽強興盛

不交而泄其斃不久無治法姑錄一二方聊

為備用 益壽食人難得如新製小男西川

薑粉散 附子猪肚圓 方並見 三因方

白朮散治消中消穀善飢 蘇容國三因方

人參 去蘆 白朮 去蘆 白茯苓 甘草 炙 藿香葉

去土各 白乾葛 二兩 木香 半兩 加北五味 去梗 柴

胡 去毛 枳殼 去穰各半兩

右剉散每服三錢新水煎去滓不拘時候

扶神圓 方見直指方

腎精加減八味圓治腎水枯竭不能上潤心

火上炎不能既濟煎熬而生心煩燥渴小便

頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削

或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩渴

頓止○澹寮方治腎虛津走心煩燥渴服此

不惟止渴亦免生癰疽或先患癰疽纔覺作

渴即當服此或有癰疽而無渴證亦宜以預

防蓋患癰之人多於欲愈未愈之際作渴而

不可救患渴之人多由患癰而命終故不可
不服此藥也久服永不生渴疾氣血加壯

熟地黃

大者洗焙乾切酒蒸七次焙乾
秤二兩○澹寮方酒下有飯上二

真山藥

炒微山茱萸
去核取肉焙
肉桂去

皮不見火澤瀉

水洗切酒潤蒸一次○澹
寮方酒濕蒸五次切焙一

方略

牡丹皮

去骨

白茯苓

沉者各八錢
取真

北五味

略炒別為末兩半
○澹寮方去枝梗

右為末煉蜜圓梧桐子大五更初未言語
時溫酒搗湯下三五十圓午前及晚間空

腹再服此方用真北五味下最為得力服

此不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾

氣血加壯○澹寮方又云陳良甫外科精

要亦云有一貴人病疽疾未安而渴作諸

醫盡用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎

等生津止渴之藥服多而渴愈甚數日後

茫無功效陳用此方三日渴止又云一士

大夫病渴治療累歲不安一名醫使服此

八味圓不半載而疾痊因疏其病源云今

醫多用醒脾生津止渴之藥誤矣其疾本起於腎水枯竭不能上潤是以心火上炎不能既濟煎熬而生渴今服此藥降其心火生其腎水則渴自止矣復云八味圓用真北五味子最為得力此一味獨能生腎永平補降心氣大有功效

天王補心丹寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣

熟地黃洗 人參去蘆 白茯苓去皮 遠志去心 石菖蒲去毛 黑參 柏子仁 桔梗去蘆 天門冬去心

丹參洗 酸棗仁去骨 甘草炙 麥門冬去心 百部洗 杜仲斷絲 茯神去木 當歸尾 五味子去枝梗

右為末煉蜜圓每壹兩作十圓金箔為衣每服壹圓燈心棗湯化下食後臨臥服作梧子大圓吞服亦可

鹿茸圓方見三因方

丹石毒瓜萆散治盛壯之時不自謹惜恣情
縱慾年長腎氣虛弱惟不能房多服丹石真
氣既盡石氣孤立唇口乾焦精液自洩小便
赤黃大便乾實小便晝夜百十行須當除熱
補虛

白茯苓夫天花粉夫宣連夫白扁豆夫人
參夫石膏夫甘草節夫寒水石夫白朮夫
猪苓各等分
右為末每服貳錢熱湯調服立效

石薺薺湯方見三因片

黃連猪肚圓治強中消渴服瓜萆散薺薺湯
後便可服此亦能補養

猪肚壹枚治如食法黃連去蘆小麥炒各五兩天花粉
茯神去木各四兩麥門冬去心二兩
右五味為末內猪肚中縫塞安甕中蒸之
極爛木臼小杵可圓如梧桐子大每服七
十圓米飲送下隨意服之如不能圓入少
煉蜜

嬰粟湯治腎渴解五石毒

嬰粟子

右煮稀粥入蜜飲之

加減三黃圓

方見

酣飲烏梅木瓜湯治飲酒多痰積為酷熱熏

蒸五臟津液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠

專嗜冷物寒漿

因方見

枳根子圓治同上

枳根子

二兩麝香一錢

右為末麵糊圓梧桐子太每服三十圓空

心塩湯吞下

三神湯治同上

烏梅肉

遠志

去心甘草水煮過却以薑汁拌炒各一兩枳實

去穢一兩夏加黃連五錢春秋冬不用

右剉散每服四錢水兩盞糯禾根一握煎

七分去滓不拘時温服若無糯禾根白茅

根亦可如無白茅根禾稗繩代之亦可

龍鳳圓治同上

鹿茸 火燎去毛壹兩酒浸炙 山藥 免絲子 酒浸炒各二兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食

前米飲下濃煎人參湯亦可

薑連圓 方見是齋醫方

朱砂黃連圓治心虛蘊熱或因飲酒過多發

為消渴

朱砂 壹兩另研 宣連 三兩 生地黃 二兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓燈

心棗湯吞下 醫方大成集南此經驗方永類鈔方玉機微義

同

酒蒸黃連圓治膈熱解酒毒止渴厚腸胃 方見

諸痢

通治玄兔丹 方見三 清心蓮子飲 方見簡六

神湯 方見三

梅花湯 方見三 文蛤散 方見金 羊乳圓 方見千金

益元散白虎湯去桂五苓散合和大治消渴

方見諸暑門 及傷寒門

生地黃飲子

方見簡易方

括樓粉

方見千金方

降心湯

蠟苓圓辰砂妙香散

方並見直指方

神效散治渴疾飲水不止

白浮石 蛤粉 蟬殼

澹寮方各壹兩

右為末用鯽魚膽七箇調七錢

澹寮方三錢

服

不拘時候神效

澹寮方此下云交州記云浮石體虛而輕煮飲止渴

三豕圓治消渴骨蒸宜連

去為末

不以多小

劉冬瓜肉研搗自然汁和成餅子陰乾

為末再用汁浸和如是七次即用冬瓜汁

為圓如梧桐子大每服三四十圓以冬瓜

汁煎大麥仁湯送下尋常渴止一服

澹寮方同

浮萍圓

方見千金方

白朮散

參耆湯

雞蘇圓

方並見朱氏集驗方

麵餅圓

方見是齊醫方

忍冬圓

方見

三因

牡蠣散治不渴而小便大利以牡蠣末取患

人小便煎服

單方治渴糯稻稈灰取中一尺燒淋汁飲或

不燒便煎服亦妙生牛乳細呷或生蘿蔔

搗取汁時飲少許

煞蟲方

方見直指方

澹軒方

消渴

細辛綠豆五靈脂等分先將豆去皮治渴將

何竹湯使煎冬瓜子最相宜

肘後方

治患消渴小便利數方

卒消渴小便多方入地三尺取桑根剝取白

皮炙令黃黑判以水煮之令濃隨意飲之

亦可內小米

備預百要方粳米同煮

勿入塩姚云熱

飲之同此藥治渴飲一斛者差

又方麥門冬膏兩土苻根二兩小麥二兩竹

葉壹把水七升煮取三升半再服姚云小

麥麥門冬活蕒並壹升竹葉三升

大渴日飲數斗小便亦余者活蕒漢防已黃

連鉞丹分等搗末以苦酒水各壹合和服

方寸匕日三服訖當強飲水須臾惡之不

復飲

此病須檢大方姚氏云消渴為病皆中熱所作小便多多所飲冷虛極短氣內消者食物皆消作小便而不渴經言腎實則消消者渴而利是也所以服石之人其小便利者石性歸腎腎得石則實實則消水漿故利利則不得潤養五藏人衰則百病生

消渴方煮竹根汁若煮梁米汁飲之並取止又須雞子吞之飲豉汁各隨多少

又消渴內消小便熱中六物丸栝蘆六分麥門

冬六分知母五分人參土瓜根苦參各四分擣下

以牛膽和為丸服如小豆二十九丸溺下之日三不止稍加之咽乾加麥門冬舌乾加知母脅下滿加人參小便難加苦參數者加土苡根隨病所在倍一分加之

渴喉口燥瀟瀟咽煎甘草三兩羊髓壹升無用

酥亦可白蜜一升內蜜等煎如薄糜含嚙

葛氏療小便卒人數非淋令人瘦不中水猪

肪如雞子炙之下取肥汁盡服之不過此

方並療遺尿

備預百要方同

又方石膏半斤搗碎以水一斗煮取五升稍

飲之

又消渴傳效取烏豆置牛膽中陰乾百日吞

之

備預百要方同

少小眠中遺尿不自覺方取鸞窠中葦燒取

一錢卽差

又主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中

螺五升水一升衛生易浸經宿渴卽飲之每

日壹度易水換生螺爲妙

簡要濟衆治消渴獨勝散出子了衛生易簡

蘿蔔三枚淨洗薄切日乾爲末每服二錢

煎猪肉汁澄清調下食後並夜卧日三服

易簡方此下云不過三劑大妙

經驗方治一切渴大牡蠣不計多少於臘日

端午日黃泥裹燒通赤放冷取出爲末用

活鯽魚煎調下壹錢匕小兒服半錢匕只

兩服差

斗門方治渴疾用晚蠶砂焙乾為末冷水下

二錢不過數服

衛生易簡方同

秦運副云有人消渴引飲無度或令食韭苗

其渴遂止法要日喫三五兩或炒或作羹

無入塩極效但喫得十斤即佳過清明勿

喫入醬無妨

澹寮方壽域神方衛生易簡方同

經驗方縮小便以麩塊雌黃壹兩研如粉乾

薑兩半切碎入塩四大錢同炒令乾薑色黃

同為末乾蒸餅入水為丸如菜豆大每服

于九至二十丸空心塩湯下

千金方療尿床方羊肚貯冰令滿繫兩頭熟

煮開取水頓服之即差

又集驗方雞肫脰一具並腸服服之男雌女

雄

外臺秘要近効尿床取麻鞋網帶及鼻根等

唯不用底須七量以水七升煮取二升分

再服之

澹寮方

消渴

鹿兔煎治三消渴利神藥常服禁遺精止白

濁延年

又兔絲子北五味各五自茯苓如玄鬼丹

法製鹿茸膏兩半鹽酒浸炙

干右為末朱地黃汁攪和為圓梧子大每服

五十圓空心搥酒下鹽

渴消方木

浮石船上青黛各等麝香少

右細末每服一錢溫湯調下

黃耆六一湯大治渴疾免患癰疽○醫方大

成治男子婦人諸虛不足胃中煩悸時常消

渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者並

宜服之玉機微

絲黃耆去又股者用箭箬者陸兩一半細

器盛飯上蒸三次焙乾細判粉草膏兩

用○大成去蘆蜜塗炙六兩粉草半生細

右為細末每服貳錢早晨日午以白湯點服患癰疽者亦可用酒調三因方云有人渴疾依山谷方單用兔絲子酒浸透直入抄服甚効亦有將黃芪甘草作六一湯服者尤効又渴人須防發癰疽宜忍冬圓○大成右咬咀每服三錢水一盞壽域神方壹盞半棗壹枚煎七分溫服不拘時醫方集成南珍方永類鈔方衛生易簡方與大成同衛生寶鑑

消渴治法

酒蒸黃連丸治消渴

拔粹方此下云飲水無度小便頻數○玉

機微義治消渴飲水無度至二三升小便五

七十次發熱瘦弱口乾食已如飢此名消瘴

今用味苦無毒除熱正氣消渴厚腸消渴之

人脾胃惡濕黃連為對

用黃連

拔粹方微義淨

半斤酒壹升湯內重蒸伏

時取出曬乾為末滴水為丸如梧子大每

服五十九

拔粹方五十九

溫水下

參苓飲子治口乾燥生津液思飲食

麥門冬去心五味子去心白芍藥熟地黃

黃芪各三兩白茯苓二錢天門冬二錢人參

甘草各五錢

右為粗末每服叁錢水壹觥半生薑三片

棗子二箇烏梅壹箇煎至壹觥去粗溫服

食後

麥門冬飲子治膈消胃滿煩心津液燥少短

氣多為消渴

人參 茯苓 麥門冬 拔粹方袖珍方知

母 五味子 生地黃 甘草 炒 栝藿根

拔粹方袖珍方知 葛根 各等分○袖珍方乾葛

右吹咀每服五錢袖珍方壹兩水二盞竹葉十

四片煎至七分去粗溫服無時

麥門冬湯治消渴日夜飲水不止飲下小便

卽利此方煎冬瓜飲子得之張文叔

麥門冬 玉機微義去心 黃連 冬瓜乾 各貳兩

右為粗末每服五錢水一盞煎至七分去

粗溫服如無乾者用新冬瓜一枚重叁斤

去皮穰子分作十貳片為十二服微義此下云每

日三次又方冬瓜一片擘破水叁盞煎七

分去粗溫服日叁或為水不化為下小貯

冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂

麩片日夜無度正發

冬瓜舊遺連十兩為末○聖濟總錄去須別擣為細末

布先取冬瓜割開去穰淨糝黃連在冬瓜

內再將頂蓋熱灰火中煨熟去皮細切爛

研用布取汁每服壹盞至貳盞食前日三

服夜二服

辨六經渴並治法

太陽渴脉浮無汗者五苓滑石之類

陽明渴脉長有汗者白虎涼膈之類

少陽渴脉弦而嘔者小柴胡加瓜樓根也

太陰渴脉細不欲飲水縱飲唯思湯不思水

四君子理中湯之類

少陰渴脉沉自利者猪苓湯三黃湯之類

厥陰渴脉微引飲者當少少與之
滑石治渴本爲竅不利而用之以其燥而能
太亡津液也天令濕氣太過當用之若無濕
而用之是爲犯禁假令小便不利或渴或
不渴知內有濕熱也小便自利而渴知內
有燥也濕宜滲世之燥宜潤之則可矣
雜證有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以
苦堅之
傷寒食少而渴者當以和胃藥止之不可用

涼藥恐損胃氣愈不能食白朮茯苓是也
太陽無汗而渴者不宜白虎汗後脉洪大而
渴者方可與之矣

陽明有汗而渴者不宜五苓若小便不利汗
少脉浮而渴者宜與之

若人病心肺熱而不渴者知不在太陰少陰
之本只在標也在標則不渴矣若渴者是在
本也膽痺治驗內經云有病口苦名曰膽痺
乃肝主謀慮膽主決斷盛汁三合爲清淨之

府肝取決於膽或不決爲之恚怒怒則氣逆
膽汁上溢故口苦或熱盛使然也主之以
龍膽瀉肝湯

黃芩七分柴胡壹錢甘草生人參天門冬拔

方去黃連知母龍膽草山梔子

麥門冬各五分○拔五味子十

右十壹味咬咀作壹服水貳盞煎至壹盞
去粗溫服食遠忌辛熱物此方因焦秀才
病口苦予制此方治之得效又名龍膽瀉

肝湯

聖濟總錄

消渴

消渴者渴而引飲乃復澀少是也得之五石
之氣內燥津液腎氣不化故渴甚而澀少也
久不治則經絡壅澀留於肌肉變爲癰疽
治三消渴疾消石散方

消石 茜根 鈎霜各壹兩

右三味搗羅爲散每服壹錢匕冷水調下

治三消渴疾桃紅散方

赤石脂 石膏各研 栝樓根 白石脂 鈇

丹各壹兩 甘草炙半兩

右六味搗羅為散冷水調下二錢匕

治三消渴疾鈇黃丸方

鈇丹 黃連去須各半兩 乾葛粉 栝樓根各參

分

右四味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大冷水

下二十九

治消渴香墨散方

墨壹兩 栝樓根參兩 鈇丹半兩

右三味搗羅為散拌勻第壹服藥末貳錢

匕新水壹盞調下次日壹服水調藥末壹

錢匕不計時候服藥時不得忌水任意飲

三兩盞後自然怕水服三五日見効

治消渴飲水無度沃焦散方

泥鱮魚壹十頭陰乾去頭尾燒灰碾細為末 乾荷葉碾細為末

右二味末等分每服各二錢匕新汲水調

下遇渴時服日三候不思水即止

治消渴日飲水數斗不止葛根丸方

葛根剉栝樓根剉附子炮裂去皮臍鉛丹炒令

各信

右四味先將三味搗羅為散入鉛丹同研

令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九

煎茅根湯下日三

治消渴飲水無休菝葜飲方

菝葜剉湯瓶內齮烏梅貳兩并核

右三味籠擣篩每服二錢匕水壹盞於石

器中煎至七分去滓稍熱細呷

治消渴飲水不休神應散方

滑石研各寒水石半兩

右二味碎研為散用生雞子一枚鑿破去

黃留清調和藥末令如稠膏却納在雞殼

內以紙封口用棉泥固濟暴乾炭火內燒

令通赤放冷去土并殼取藥研令絕細為

度每服大人二錢匕小兒半錢匕米飲調

下

治消渴銀寶丸方

水銀壹兩用銀結為沙栝樓根壹兩苦參壹兩牡蠣

粉煨為知母煨蜜蜜隋僧各壹兩鈇丹半斤

右七味搗羅為末若陽人患用未曾在長

雌豬肚一枚若陰人患用雄豬肚一枚貯

藥在內以線縫合用索子十字繫在一新

博上不令走轉又別用栝樓根半斤細切

入在水中一處同煮自平日煮至午時取

出候冷細切肚并及藥同搗為膏丸如栝

桐子大陰乾每服五丸溫水下

治消渴殊勝散方

烏賊魚骨大甲海浮石大栝梗剉炒葛根剉丹

砂研水虎杖燒過各

右六味搗羅為散渴時煎麥門冬湯調下

二錢七空心日午夜卧各一服

治消渴飲水不止栝樓根丸方

栝樓根剉黃連去須知母煨麥門冬去心各

右四味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大

每服三十九米飲下

治消渴飲水日夜不止生津丸方

青蛤粉各壹白滑石各壹

右二味研爲細末用黃頰魚涎和爲丸如

梧桐子大每服三十九煎陳粟米飲下

拘時候

治消渴累年不愈者莎草根散方

莎草根去毛白茯苓去黑皮

右二味搗篩爲散每服三錢匕陳粟米飲
調下不計時候

治消渴減食飲水不休楮葉丸方

乾楮葉炒桑根白皮剉人參 白茯苓去

皮 定粉各壹

右五味爲細末取楮汁和丸如梧桐子大
每服二十九煎人參湯下不計時候

治消渴疾久不愈楮葉散方

蝎牛焙乾蛤粉 竜膽去桑根白皮剉炒

分

右四味搗羅為散每服一錢匕煎楮葉湯調下不拘時候

治渴疾澄水飲方

銀湯餅內齷 水萍焙葛根剉

右三味各等分麤擣篩每服五錢匕水一盞半同煎至一盞去滓溫服

治消渴亥骨飲方

豬脊骨五斤棗二十枚甘草微炙乾薑炮各

右四味咬咀以水三升同煎至二升發時

量意加熱水服

治消渴及諸渴不止冬瓜飲方

大冬瓜壹斤黃連去須

右二味先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停淨去瓢子內黃連末於冬瓜中却取截下一頭蓋却按白麵厚裹冬瓜令徧即更以黃土鞭泥裹一重候微乾坐瓜在灰火中四面簇炭火燒令泥赤即

止候冷打去泥土并剝去麵揭開瓜頭裏
而有黃連汁不限多少濾過每服一盞渴
卽飲之立差未差更作一服白麩煎麥冬
治因好食熱麵炙肉及服補治壅熱藥并乳
石三焦氣隔心肺乾熱口乾舌焦飲水無度
小便日夜不知到數心欲狂亂服此救急止

渴枯樓飲方

信枚黃熟者去
枯樓皮用瓢并子 冬瓜壹枚中樣者割
瓢子在冬 瓜心內

右二味用黃土泥裹冬瓜令勻可半指厚
候乾簇炭火燒令泥通赤卽止去泥取瓜
就熟碎切爛研布絞取汁約七八合更入
白蜜兩匙頭攪令調勻候稍冷卽分三度
服藏府熱歇卽不思水自無小便如不是
枯樓熱時節卽獨燒冬瓜服之

治消渴疾人參煎方

人參壹兩 葛根劉貳兩
右二味擣羅爲末每發時須得燂豬湯壹

升已來入藥末三錢匕又入蜜二兩都一
虛於鐫子內慢火熬之至三合已來似稠
黑餈便取出於新瓷器內每夜飯後取壹
匙頭含化嚙津重者不過三服

治消渴口乾煩躁飲水無度鈆霜丸方不效

鈆霜兩半青黛兩括樓根末各一兩龍腦許少

右四味細研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大
每服二十九微嚼煎竹葉湯下新汲水下
亦得食後日三

治積年消渴好食冷物竹葉湯方

青竹葉剉碎白朮去黑皮地骨皮剉括樓根

各壹兩桂去麤皮甘草炙剉各半兩麥門冬去心焙

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入

小麥一撮煎至八分去滓食後溫服日二

治消渴膈熱煩躁生津液梅蘇丸方

白梅肉 紫蘇葉 烏梅肉各半兩人參壹分

麥門冬去心百藥煎參兩甘草炙剉壹兩半訶梨

勒炮去核壹分

右八味搗羅爲末鍊黃蠟汁拌和爲丸如
雞頭實大每服一丸含化嚙津不計時候
路行解渴

治消渴方

冬瓜

壹枚削去皮

右壹味埋在濕地中一月將出破開取清
汁飲之踰二三料遂愈

治渴疾飲水不止甘露散方乾猪胞十枚剪
破出却氣去却繫著處用乾盆子壹隻燒

胞煙盡取出研令極細每服壹錢匕溫酒
調下不拘時候

治消渴飲水不止薑魚丸方

乾生薑末

壹兩

右一味用鯽魚膽汁和丸如梧桐子大每
服七丸米飲下不拘時候

治消渴飲水不止水骨丸方

湯瓶內水

一

右一味研爲細末燒粟米飯和丸如梧桐

子大每服十五凡人參湯下不拘時候

治消渴發作有時心脾有熱飲水無度人參

湯方

人參 桑根白皮剉貳兩 麥門冬焙 知母

枇杷葉拭去毛炙 黃連去須微炒 葛根剉 白茯苓去

皮 地骨皮 淡竹根各一兩

右壹十味細剉如麻豆每服五錢匕用水

壹盞半煎取八分去滓溫服

治消渴飲水過多心腹脹滿桑白皮湯方

桑根白皮剉炒 人參 黃耆剉炒 草豆蔻去皮

枳殼去瓢 青木香 芍藥 半夏湯洗

檳榔剉各桂 大麓皮 枇杷葉拭去毛蜜

右壹十壹味麤擣篩每服五錢匕用水壹

盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服

治久渴旬日見効脍脍散方

鷄脍脍黃皮 雞腸各五具 鹿角膠炙白

龍骨 白石脂 漏蘆去蘆頭炙 土瓜根

黃連去須 苦參 牡蠣粉各貳兩 桑螵蛸二

籩

右一十一味為散每服一錢匕至二錢匕

米飲調下日三夜一

治消渴飲水過多麥門冬丸方

麥門冬去心 枯樓根 大麻人研 大黃蒸

度切 苦參粉 鐵粉各叁兩 雞臄脰黃皮炙

枚黃芩去黑心 瀉澤各壹兩半 龍齒研 土瓜根

知母煨 石膏研各兩 銀薄貳百片和龍齒石膏研入

右一十四味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子

大每食後煎生地黄湯下二十五丸日二服

治消渴黃連牛乳丸方

黃連去須一 麥門冬去心二兩爛研 牛乳 地黄

汁 葛汁並壹合

右五味合研衆手丸如梧桐子大每服二

十九空心粥飲下日再漸加至四十九

治消渴小便數少虛極羸瘦黃耆丸方

黃耆剉 鹿茸去毛酥炙 牡蠣煨壹 土瓜根

黃連去須白茯苓去黑皮人參壹兩

右七味搗羅為末研令細鍊蜜為丸如梧

桐子大每服三十九用何首烏湯下

治消渴飲水不止麥門冬丸方

麥門冬去心升麻 黃連去須黃蘗去蘆皮黃

芩去黑心生乾地黄焙人參各叁兩栝樓根

七苦參八兩

右九味搗羅為末以牛乳和衆手丸如梧

桐子大每服三十九食前米飲下

治消渴飲水不輟多至數斛竹葉湯方

甘竹葉切大麻人炒赤秫米各壹升鹿脚

四隻湯浸去皮白茯苓去黑皮薤白貳兩

右六味剉如麻豆分作八服每服先以水

三盞煎麻人竹葉取二盞去滓澄清入諸

藥鹿脚又煎去滓取壹盞微微飲之渴止

為度

治消渴小便數少菝葜飲方

菝葜 土瓜根各貳兩黃耆剉地骨皮 五

味子

各貳兩

人參

各壹兩

牡蠣

熬粉各壹兩

石膏

碎四兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓空腹溫服

治消渴及小便無度鈆丹散方

鈆丹

白石脂

研

赤石脂

研

胡粉

各半兩

石

膏

碎

甘草

如手指大者生

澤瀉

各壹兩

栝樓根

貳兩

半

右八味搗研為散每服三錢匕新汲水調

下日三更量虛實加減若渴甚夜二服勿

用酒一劑可救數人鈆丹久服腸痛則宜

減之小兒每服一二錢匕亦療酒渴

治消渴初因酒得人參湯方

人參

甘草

半生半炙

各壹兩

右二味麤搗篩以搗豬水去滓澄清取五

升同煎至二升半去滓渴即飲之永差

治消渴黃連丸方

黃連

去須

苦參

壹斤

麝香

壹錢

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服六十九空腹茶下日再任意喫茶不限
 多少
 止渴備急方右以大豆芽嫩者三五莖塗酥
 炙令黃熟擣羅為散每服二錢匕煎人參
 湯調下

醫方類聚卷之一百二十五

一濟川散
 人參
 長八
 別
 煎
 調
 下