

編 主 誇 士 陸

成 集 書 醫 本 基

臨

馮 紹 遵 編

牀

祕

典

世 界 書 局 印 行



26153

中華民國二十六年五月初版刷

馮紹遠臨牀祕典（全一冊）

實價國幣二角五

（外埠酌加運費酒費）

版權所有
不准印翻

主編者 陸士謙
印出 刷版者 陸士謙
發行者 世界書局
上海大連海路
世界書局有限公司代表人

發行所 上海及各省 世界書局

WKL73/17

仿古字版
醫學綱目

樓英先生髫年。潛心醫道。上自內經。下至歷代聖賢書傳。及諸家名方。晝讀夜思。廢食忘寢者三十餘載。而成是書。

本書之輯經傳方書。一以陰陽臟腑分病析法而類聚之。分病爲門。門各定陰陽臟腑之部於其卷首而大綱著矣。析法爲標。標各撮陰陽臟腑之要於其條上。而衆目彰矣。病有同其門者。立枝門以附之。法有同其標者。立細標以次之。

全書凡四十卷。以仿古大字排印。
藏之巾笥。以便考求。臨病之際。法度有歸。爲醫書之要籍。

經有衍文錯簡脫簡者。
一以理考而釋正之。
傳失經旨。衆論矛盾者。
各以經推而明辨之。

明山蕭英編纂

精裝四冊三元

世界書局發行

凡例

此書以法爲綱。以方爲目。再論關於此法。此方之病症。及所以用此法。此方之理由。原原本本。詳述無遺。可使閱者胸有成竹。則臨牀時。自得活法焉。

此書所錄之方法與方劑。皆是屢試屢驗者。不驗者不錄。此書專作醫家臨牀參考之用。故不載藥之分量。蓋症有大小。藥亦有輕重。必須自去配合。則不致有枘鑿之弊。

此書談病各條中。說出前醫誤治之理。及救治所以向愈之由。均和盤托出。其診斷之精細。審症之縝密。真是難能可貴。閱者能舉一反三。對於臨牀上有莫大之助焉。

有一法一方能治數症者。有不同之症。均以一方治者。此中深意。惟須揣摩得之。

一方劑不出寒劑。溫劑。熱劑。涼劑。補劑。表劑。吐劑。下劑。斂劑。滲劑。輕劑。重劑。和劑。潤劑。宣劑等。書中應有盡有。閱者能融會貫通。對於國醫已思過半矣。

治病之方法。無非以表裏臟腑三陰三陽爲對象。此書方法中。亦已概括無闕。

每法中雖至多不過舉數例。然各種疾病。已得十之八九矣。

是書所舉之例。大半多屬救治壞病。大症能治。則小症更易爲焉。

目次

益腎陽脾陽法（上）	一	反佐通陽法	一七
益腎陽脾陽法（下）	二	復陽消脹法	一七
急救心陽法	三	扶胃健脾溫運行法	一八
急救胃陽法	四	通陽泄濁開結驅陰法	一九
回陽救脫法	七	助陽開結法（逐冷化氣法）	一九
氣脫收陽法	八	大劑溫通驅陰逐冷法	二〇
回陽補虛甘溫治熱法	九	通陽洩濁法	二一
（回陽生陰法）	一	辛熱寒溫通降法	二二
復陽降濁化飲法	一	溫中散結法	二三
表裏先後救援法（附畜	一	表裏俱虛發汗利水兩難	二三
魚置介法）	一	法	二三
溫固中焦宣通腎氣法	一二	活血通脈法	二四
收斂溫通法	一三	發表溫經陰陽不偏法	二四
溫中通陽法（溫經通脈	一四	（養血通脈法）	二四
法）	一五	清肺瀉火救陰抑陽法	三四
復陽散寒溫煖腎氣法	一六	清金潤燥甘淡益胃法	三五
滋陰寧神安寐法	三六	補陰清肺法	三五
陽症似陰熱深厥深治法	三七	溫熱內結解散法	三八

養陰退陽法	三九
滋陰化氣法	四〇
滋腎通關平逆法	四一
表裏風熱汗下防護法	四二
解肌清熱表裏驅邪法	四四
表裏雙解法	四四
表裏交攻法	四五
和解表裏宣通胃陽法	四六
解肌清熱法	四六
和解升降法（和解表裏）	四九
寒熱法	四七
陰陽錯雜寒熱調治法	四七
苦瀉辛通法	四七
通經降火法	四九
變通小柴胡法（丹田有	五〇
木邪乘土下寒上熱法	五〇
（和解上下寒熱法）	五〇
平肝逐火法	五一
重鎮瀉肝法	五二
收魂鎮肝法	五三
養肝潤燥法	五三
養肝息風法（附畜魚置 介法）	五四
肝熱疏散法	五五
瀉肝平火法	五七
平肝清火寬中下行法	五九
清肝滌飲法	五九
平肝開鬱理痰法	六〇
苦辛酸殺蟲法	六二
補土制木安蟲止吐法	六二
大培土氣兼制肝木法	六三
清火殺蟲法	六四
補土制蟲法	六四
疎肝定逆溫瀉法	六五
甘溫填訥封固法	六五
火歸水中水能生木法	八一
通陽泄濁補血益精法	六六
補法（一）	六七
補法（二）	六七
補法（三）	六八
補法（四）	六九
補法（五）（陰陽兩補法）	七〇
補法（六）	七二
補法（七）	七四
補法（八）	七六
補法（九）（托裏散邪 法）	七六
補法（十）	七七
補法（十一）	七七
補法（十二）（附回陽 救脫法）	七八
補法（十三）	七九
肝血大傷腎水將竭法	八〇

陰陽並虧法	八一
補水調養法	八二
血枯治法	八三
專固奇經法（一）	八四
專固奇經法（二）	八五
養正托邪益血回火法	八六
生陰陽維法	八七
虛人泄瀉治法	八八
安胃理脾法（合生津解煩意）	八九
補虛清熱純甘養胃法	九〇
收神斂液法	九〇
補氣養血法	九一
降心火益腎水法	九一
寒溫並用平調寒熱法	九二
金水二臟並滋法	九二
陰陽兩虛剛柔並進法	九三
陰陽兩補濡精祕氣法	九三

扶陽濟陰法	九四
滋陰和陽養肝益心法	九七
益陽益氣降濁法	九八
升提法（升發脾陽法）	九九
疏肺益氣升陽降陰法	一〇〇
太陽救逆法	一〇二
汗法（一）	一〇三
汗法（二）	一〇四
虛體汗法（補法）（補土制肝法）	一〇四
虛人外感法	一〇六
托邪止嗽法	一〇六
開肺祛寒法	一〇七
表散風寒濕邪法	一〇八
辛涼解表法（亦爲清解法）	一一〇
一〇八	

啓皮毛開肺竅法	一一〇九
清嗽去熱止瀉法	一一一〇
微苦微辛開降肺氣法	一一一〇
苦辛開降肺氣法	一一一
疎肺滌臟法	一一一二
辛涼解表法（汗法）	一一二
導濕疏風清燥法	一一三四
治內伏風火法	一一三
潤內伏風火法	一一四
清養胃陰法	一一五
升發宣揚甘草緩火法	一一八
健脾緩痰法（助胃扶脾法）	一一八
驅風消痰法	一一九
疏風清熱通關化痰法	一二〇
通竅奪痰法	一二一
清風火痰熱法	一二一
攻刮搜逐法	一二三

痰流經絡治法	一一三
驅風堵截填竅法	一二四
驅風填竅法	一四五
行水散逆法	一二五
清暑法（一）	一二六
清暑法（二）	一二七
皮水驅除法	一二八
消補兼行疏通脾胃法	一二九
閉鬱泄火宣絡降氣法	一三〇
氣厥治法	一三一
辛溫流利法	一三二
舒氣降逆湯	一三三
散結破瘀養肝補血法	一三四
推蕩惡血法	一四五
虛損吐血逐瘀法	一三五
血寒溫通法	一三六
宣通竊隧瘀腐法	一三七

止衄法	一三七
通經入絡泄熱搜濕法	一三八
抑風制水流利經絡法	一三九
達腎搜邪解肝散結法	一三九
先攻後和兩法	一四〇
祛風清火通幽生津法	一四一
金水相生脾胃交治法	一四一
消癰降火法	一四二
熱瘡似驚治法	一四二
疏通經絡法	一四三
寒熱解散互用法	一四四
托裏散邪防治寒疝法	一四五
重鎮止呃法	一四六
流利關節祛濕潤燥法	一四七
吐下汗三法	一四七
排膿法	一五〇
吐法嚏法	一五一
點舌法	一五一

塗臍法	一五二
擦舌法	一五二
陰陽攝引法	一五三
括沙法	一五四

方劑索引

寒劑

竹葉石膏湯	二五十一三三
清心散	二五
白虎湯	二六
犀角地黃湯	二九十五七
黃連阿膠鷄子黃湯	三七
黃連解毒湯	三九
涼膈散	三七十三八十三九
防風通聖散	四二
葛根黃芩黃連湯	四四
雙解湯	四四
當歸龍蒼丸	五二一五七
龍膽瀉肝湯	五七
溫劑	
理中湯	四一九六

益元湯	九
溫運湯	一三
當歸四逆湯	一四一二四
枳實理中湯	一八
指迷七氣湯	二三
進退黃連湯	五〇

熱劑

扶陽丸	一
大回生湯	二
耆朮二龍湯	三
附子理中湯	五一一三
附桂理陰煎(即六味回陽 飲)	七十八

瀉白散	二七一
瀉黃散	二七
清胃湯	二八
天生白虎湯	二八
黃芩湯	二九

涼劑

附固鹿苑湯	一二
四逆湯	一四
白通湯	一四一六
白通加人尿豬膽湯	一七
消陰湯	一七
附桂理陰煎(即六味回陽 飲)	一〇七一一〇
乙李甘寒填竅方	三〇
丙字甘寒填竅方	三〇
普濟消毒湯	三七

白薇湯.....八七

補劑

八味地黃丸.....一四十九四

二丹丸.....二六

金匱腎氣湯.....四一十六七

溫通逐陰湯.....二〇

冷香飲子.....二二

赤金苓.....二三

甘草附子湯.....二三

復脈濟陰養肝湯.....五五

異功散.....六四一七六

辰進方.....六六

戌進方.....六六

養心湯.....六七

理陰煎.....六八一九六

十全大補湯.....六八一六九

人參養榮湯.....七〇

四君子湯.....七二

六君子湯.....七四

生脈散.....七六十

補中益氣湯.....九二一九四

大補陰丸.....七七

歸脾湯.....七七一八五

金水六君煎.....七八

大補元煎.....七八

右歸丸.....七九

虎潛丸.....八〇

地黃飲子.....八一

雙補湯.....八二

養肝潤燥補血湯.....八二

補血入奇湯.....八三

固任湯.....八五

天王補心丹.....八六

六神散.....八八

三聖湯.....九一

三才封髓丹.....九一

露姜飲.....九二

六味地黃湯.....九二

剛柔並補湯.....九三

雙補收攝湯.....九三

胃關煎.....九六

炙甘草湯.....九七

益氣聰明湯.....九八

建中湯.....一〇四

星附四君子湯.....一一八

星附六君子湯.....一一九

六君子湯.....一四五

當歸生薑羊肉湯.....一四五

桂枝湯.....二七一

表劑.....一〇〇一二七

麻黃湯.....一〇三

麻黃連翹赤小薑湯	一〇四
麻黃人參芍藥湯	一〇六
參蘇飲	一〇六
辛涼清溫湯	一〇八
蘇杏越膚湯	一〇九
甲字辛涼解肌湯	一一五
乙字辛涼解肌散	一六六
丙字辛涼解肌散	一一七
川芎茶調散	一一八
霹靂劫巢湯	一四八
稀涎散	一二〇
食鹽探吐方	一五一
下劑	
溫通湯	一九
半硫丸	二一
小承氣湯	一二二
木香檳榔丸	一二三

滾痰丸	一二二
桃仁承氣湯	一三四
牛黃奪命散	一四二
雄黃解毒丸	一四八
斂劑	
醫門黑錫丹	七七九
斂神鎮肝湯	五三
息風養肝湯	五四
益黃散	六五
溫封填納湯	六五
回陽鎮攝湯	七九
禹餘糧赤石脂湯	八四
收神斂液湯	九〇
侯氏黑散	一二四
玉關丸	一二四
玉屏風散	一二四
香連丸	一四二
滲劑	

滋腎丸	二二一
導赤散	三九
小半夏加茯苓湯	一二五
石韋滑石湯	一二六
五苓散	一二八
五皮飲	一二九
變通胃苓湯	一二九
鷄鳴散	一四四
椒豆湯	一四四
輕劑	
開鬱清溫湯	三四
解肌清熱湯	四六
生鐵洛飲	五二
旋覆代赭湯	四五
和劑	
金匱麥冬湯	四五
小柴胡湯	四四一

大柴胡湯	四逆散	柴胡變通湯	潤劑	藿香正氣散	升陽益胃湯
四逆散	四六一五二十一四〇	甲字安胃理脾湯	乙字宣肺起痺湯	助陽開結湯	止嗽散
黃連湯	四七	乙字安胃理脾湯	丙字宣肺起痺湯	風痺湯	烏藥順氣散
連理湯	四七	芪梅參桂石斛湯	生姜瀉心湯	降氣開鬱湯	五積散
柴胡變通湯	五〇	甘霖救液湯	甘草瀉心湯	杏仁冬桑湯	戊己丸
甲字安胃理脾湯	八九	潤燥生津益胃湯	半夏瀉心湯	透鬱湯	清風瀉痰湯
乙字安胃理脾湯	八九	補陰清肺湯	附子瀉心湯	導濕疏風清燥湯	清風瀉痰湯
芪梅參桂石斛湯	九〇	清燥救肺湯	左金丸	熱瘻續命湯	一九
潤燥養肝湯	三四	潤燥養肝湯	逍遙散	紅棉散	一三
人參敗毒散	一〇九一一一二	人參敗毒散	四奇湯	控涎丹	二〇
生津養胃湯	一一五	生津養胃湯	半龍湯	指迷茯苓丸	二三
甘露飲	一一六	甘露飲	溫膽湯	平胃散	二三
宣劑	一	升陽散火湯	三奇散	二陳湯	二七
	一	升陽散火湯	清暑散	清暑益氣湯	一二六
	一	升陽散火湯	消暑丸	清暑益氣湯	一二七

開鬱泄火宣絡降氣湯	一三〇
烏附散	一三一
越鞠丸	一三一
四七湯	一三三
七氣湯	一三三
四磨湯	一三二
五磨飲子	一三三
通竅宣隧湯	一三七
透關奪雄湯	一三八
抑風制水通絡湯	一三九
宣隧湯	一三九
搜風順氣丸	一四一
達原飲	一四三
清肺飲	一四三
殺蟲之劑	一四三
椒梅附桂連理湯	六二
雄黃丸	六二
安土安蛇湯	六二

尤姜椒梅湯	六三
殺蟲清火消疳湯	六四
清疳湯	六四
理血之劑	
花乳石散	一三五
黑神散	一三六
失笑散	一三六
白茅龍眼湯	一三七
瘡瘍之劑	
甲字排膿湯	一五〇
乙字排膿湯	一五〇
其他方劑	
嚏方	
通關散	一三一
陰陽攝引方	一五三
附括沙法	
燒褪散	

治法索引

中風

吐下汗三法 ······ 一四七

類中

火歸水中水能生木法 ······ 八一

慢脾

益腎陽脾陽法(上) ······ 一

益腎陽脾陽法(下) ······ 二

復陽散寒溫煖腎氣法 ······ 一六

甘溫填納封固法 ······ 六五

補法(六) ······ 七二

補法(七) ······ 七四

虛人泄瀉治法 ······ 八八

扶陽濟陰法 ······ 九四

陰陽兩救法 ······ 九六

瘡厥

表裏風熱汗下防護法	四二
解肌清熱表裏驅邪法	四四
變通小柴胡法	五〇
收魂鎮肝法	五三
肝熱疏散法	五五
瀉肝平火法	五七
生陰陽維法	八七
導濕疏風清燥法	一一四
建脾緩痰法	一一八
熱瘡似驚治法	一四三
癲狂	
重鎮瀉肝法	五二
補法(三)	六八
血虛發瘡	
補法(四)	六九
營衛不諧症	
塗臍法	一五二

補法(五)(陰陽兩補法) ······ 七〇

傷寒

清熱法(一) ······ 二五

滋陰寧神安寐法 ······ 三六

表裏雙解法 ······ 四四

表裏交攻法 ······四五

和解升降法(表裏寒熱法) ······ 四七

汗法(一) ······ 一〇三

溫熱

瀉熱清肺法 ······ 二六

胃中伏熱宣揚輕瀉法 ······ 二七

清火存陰法 ······ 二九

輕清味淡宣肺法 ······ 三三

清肺瀉火救陰抑陽法 ······ 三四

陽症似陰熱深厥深治法 ······ 三七

溫熱內結解散法	三八
養陰退陽法	三九
表裏風熱汗下防護法	四二
通經降火法	四九
辛涼解表法（亦爲清解法）	一〇八
微苦微辛開降肺氣法	一一〇
解肌清熱法	一一五
甘寒解暑法	二八
升提法（升發脾陽法）	九九
清暑法（一）	一二六
清暑法（二）	一二七
瘧疫	
溫邪入裏救治法	二九
風火症	
升發宣揚甘草緩火法	一一八
虛寒症	
急救胃陽法	四
補法（六）	七二
補法（八）	七六
補法（十三）	七九
扶陽濟陰法	九四
清金潤燥甘淡益胃法	三五
滋陰化氣法	四〇
補法（九）（托裏散邪法）	七六
補水調養法	八二
滋陰和陽養肝益心法	九七
虛體汗法（補法）（補土制肝法）	一一〇
虛人外感法	一〇六
脫法	七八
回陽救脫法	七
自汗症	
回陽救脫法	七
通陽泄濁補血益精法	六六
補法（五）（陰陽兩補法）	七〇
水停心下	
行水散逆法	一二五
皮水驅除法	一二九
吐瀉	
和解表裏宣通胃陽法	四六
補法（六）	七二
補法（七）	七四

(回陽生陰法) 九
表裏先後救援法（附畜魚置介法） 一一

通陽泄濁開結驅陰法 一九
補法（五）（陰陽兩補法） 七〇
補法（十二）（附回陽救

脫法） 七八
回陽救脫法

虛人泄瀉治法	八八	寒溫並用平調寒熱法	九二	辛溫流利法	一三二
治內伏風火法	一一三	扶陽濟陰法	九四	風痰	
解肌清熱法	一一五	滋陰和陽養肝益心法	九七	驅風消痰法	一一九
金水相生脾胃交治法	一四一	升提法(升發脾陽法)	九九	吐下汗三法	一四七
霍亂		清暑法(二)	一二七	風痰入絡	
溫中通陽法(溫經通脈 法)	一三	消補兼行疏通脾胃法	一二九	祛風清火通幽生津法	一四一
反佐通陽法	一七	急救胃陽法	四	辛溫流利法	一三二
泄瀉		陽症似陰熱深厥深治法	三七	風痰	
大培土氣兼制肝水法	六三	虛體汗法(補法)(補土制 肝法)	一〇四	驅風消痰法	一一九
寒熱解散互用法	一四四	平肝逐火法	五一	吐下汗三法	一四七
悶痧		平肝開鬱理痰法	六〇	風痰入絡	
括沙法	一五四	補土制木安蟲止吐法	六二	祛風清火通幽生津法	一四一
瘡		安胃理脾法(合生津解煩 意)	八九	辛溫流利法	一三二
急救胃陽法	四	滋腎通關平逆法	四一	風痰	
氣脫收陽法	八	補法(二)	六七	驅風消痰法	一一九
通陽泄濁補血益精法	六六	通陽洩濁法	二	吐下汗三法	一四七
補虛清熱純甘養胃法	九〇			風痰入絡	

平肝開鬱理痰法	六〇	解上下寒熱法	五〇
補法(二)	六七	平肝逐火法	五一
苦辛開降肺氣法	一一一	呃逆	
通利法	一二八	臍	
辛溫流利法	一三一	復陽消脹法	一七
散結破瘀養肝補血法	一三三	癲厥	
重鎮止呃法	一四六	清熱法(二)	二五
托邪止嗽法	一〇六	健脾緩痰法(助胃扶脾 法)	一一八
腸風下血	一一一	通竅奪痰法	一二一
肝血大傷腎水將竭法	八〇	氣厥治法	一三一
驅風堵截填竅法	一二四	吐法嚏法	一五一
苦瀉辛通法	四七	風痺	
木邪侮土下寒上熱法(和 關格)		風火內淫甘寒填竅法	三〇
濕		清金潤燥甘淡益胃法	三五
肺痺		補陰清肺法	三五
風勝肺痺法	三二	平肝開鬱理痰法	六〇
開肺祛寒法	一〇七	肝熱疏散法	五五
肝血大傷腎水將竭法		補法(六)	七二
陰陽兩補濬精祕氣法	九三	補法(十)	七七
消渴		肝血大傷腎水將竭法	八〇
腫脹		補法(二)	六七

急救胃陽法	四	火歸水中水能生木法	五	肝法)	一〇四
氣脫收陽法	八	升陽開鬱降氣法	九	平肝逐火法	五
復陽消脹法	一七	益陽益氣降濁法	九八	腿縫腫痛	一
扶胃健脾溫通運行法	一八	瀉肝平火法	五七	畜血腰痛	五七
陰陽並虧法	八一	肩胛腫痛	五七	平肝平火法	五七
疏肺益氣升陽降陰法	一〇〇	瀉肝平火法	五七	腎膝痠痛	一〇四
啓皮毛開肺竅法	一〇九	心腹痛	五七	平肝逐火法	五
疎肺滌臟法	一一二	平肝清火寬中下行法	五九	腿縫腫痛	一
辛涼解表法(汗法)	一二二	脘脇痛	五七	畜血腰痛	五七
通利法	一二八	陰陽錯雜寒熱調治法	四七	平肝逐火法	五
先攻後和兩法	一四〇	補法(六)	七二	腿縫腫痛	一
疏通經絡法	一四三	升陽開鬱降氣法	九八	畜血腰痛	五七
黃疸		腹痛		平肝逐火法	五
腳氣		汗法(二)	一〇四	推蕩惡血法	一三四
汗法(二)		表散風寒濕邪法	一〇八	大劑溫通驅陰逐冷法	二〇
偏頭風痛		溫固中焦宣通腎氣法	一二	開鬱泄火宣絡降氣法	一三〇
養肝息風法(附畜魚置介		肝熱疏散法	五五	諸痛症	一三四
虛體汗法(補法)(補土制		大培土氣兼制肝木法	六三	養肝潤燥法	五三
癰閉		復陽消脹法	一七		

助陽開結法(逐冷化氣法)	一九
風勝肺痺法	三二
滋陰化氣法	四〇
補法(七)	七四
通陽泄濁開結驅陰法	一九
瀉肝平火法	五七
宣通竅隧療腐法	一三七
便閉	
復陽散寒溫煖腎氣法	一六
扶胃健脾溫通運行法	一八
二便閉結	
通陽泄濁開結驅陰法	一九
辛熱寒溫通降法	二二
通經入絡泄熱搜濕法	一三八
達腎搜邪解肝散結法	一三九
痔	
平肝逐火法	五一
清暑法(一)	一二六
祛風清火通幽生津法	一四一
補土制蟲法	六四
清火殺蟲法	六四
補土制蟲積	六四
胎前有孕痛癆症	
活血通脈法	三四
產後氣血虛	
扶陽濟陰法	九四
補法(一)	六七
產後血枯	
血枯治法	八三
產後血虛感寒	
補法(九)(托裏散邪法)	七六
產後亡陽腹痛	一三
收斂溫通法	
產後瘡症	
補法(三)	六八

產後腹痛	
補法(三)	六八
虛體汗法(補法)(補土制肝法)	一〇四
托裏散邪防治寒疝法	一四五
產後胎漏	
發表溫經陰陽不偏法(養血通脈法)	二四
產後脹痛	
專固奇經法(一)	八四
墮胎晨瀉	
收神斂液法	九〇
產後少腹痛	
托裏散邪防治寒疝法	一四五
產後惡露壅積	
虛損吐血逐瘀法	一三五
血寒溫通法	一三六
血枯治法	八三
崩漏	

帶下

專固奇經法(二).....八五

狐惑

苦辛酸殺蟲法.....六二

蛇蟲症

補土制木安蟲止吐法.....六二

大培土氣兼制肝木法.....六三

蛔蟲症

補土制木安蟲止吐法.....六二

喉症

吐下汗三法.....一四七

盤腸氣痛

溫中散結法.....二三

瘡瘍

補氣養血法.....九一

疝

養正托邪益血回火法.....八六

辛涼解表法(汗法).....一二三

養正托邪益血回火法.....八六

游魂症

點舌法.....一五一

採舌法.....一五二

眼症

舌下蝦眼症

舌下蝦眼症

舌下蝦眼症

舌下蝦眼症

口瘡

急救胃陽法.....四

養正托邪益血回火法.....八六

肺脹

消脹降火法.....一四二

腿瘡

補法(四).....六九

腸癰

排膿法.....一五〇

陽強不痿

降心火益腎水法.....九一

陰菌下墜

補法(五).....七〇

重舌木舌

吐下汗三法.....一四七

瘡瘍

補法(六).....二二

肝熱疏散法.....五五

補法(五)(陰陽兩補法).....七〇

眉棱骨痛

清瀉陽明法.....二八

房後入水囊縮

脫法.....七八

肝熱疏散法.....五五

陰陽攝引法.....一五三

陰陽易症

甘溫填納封固法.....六五

肝熱疏散法.....五五

乳房紅腫

肝熱疏散法.....五五

脾弱胃強症

補法(七).....七四

舌下蝦眼症

舌下蝦眼症

臨牀祕典

慈谿馮紹遠編述

益腎陽脾陽法（上）

扶陽丸

專治小兒夏月吐瀉。致成慢驚。脾腎陽虛之證。兼治男婦中寒。嘔吐腹痛。一切火衰等證並驗。

白朮
附子
甘草
川椒
乾薑
砂仁
丁香
肉桂

某孫端陽後。忽吐乳未曾介意。廿日外。多吐。醫投藿香正氣。開腸洞泄。大熱發渴。余視面色浮白。兩目無神。吐無穢氣。瀉泄澄冷。唇雖燥而無縐紋。熱雖重而指尖冷。口雖乾而熱湯不畏。診脈沈微。最防慢脾。遂疏理中附子丁香服。後症減。但微渴微煩未除。更用七味白朮一方。（七味白朮散卽四君子湯加藿香葛根木香）囑進數劑。

勿圖速效。俟清陽復而渴可止。脾陽健而熱自除。適余他往。只服二劑。更醫大罪吾藥。用柴胡烏梅。藿半花粉。服數劑。人事默默。乾嘔身冷。偶遇余述及。余曰。此虛風內養。慢脾危候。言未畢。其家專報云。手足牽動。睡則露睛。喉中痰鳴。復延余視。昏迷不醒。掐之不哭。睡不交睫。翳膜遮睛。二便長流。四肢厥冷。時忽抽搐。喉如曳鋸。內外一探。陽氣竭絕。因其無陽藥可偏恃。但救危須在頃刻。藥餌一時難回。令胡椒五錢。津唾調敷於臍。立時身動似覺微煩。口中間有椒氣。哭聲漸出。隨調扶陽丹一兩。徐徐灌下。大嘔一聲。膠痰旋出。隨吐隨灌。隨灌隨吐。約吐膠痰半碗。其色青碧。係由無陽。津液冷凝所致。隨進大回生湯一劑。計十兩之重。每日夜三劑。連服二三日。敗症皆回。尤奇者。不過週歲兒。服乳後。自能以手探吐。余甚訝之。但胃中全賴乳食充養。因束縛其手。仍以回生湯加赭石。以

安其胃。前後共服回生湯五十劑。厥疾方瘳。愈後專理脾陽。兩旬而健。

益腎陽脾陽法（下）

大回生湯

專治小兒夏月吐瀉及雜病誤治成慢脾風。并脾腎虛寒。發癇驚風。實有起死回生之功。

人參 白朮 茯苓 甘草 黃芪
附子 肉桂 乾薑 丁香 白蔻 桂仁
用水一碗煎至不見水提起。入夏布巾內取汁。調赤石脂緩緩服下。如吐不止加赭石調服。姜夏同煎。肝木旺者。羚角汁調服。痰盛者加泡南星。天麻。腎陰虧者加熟地。枸杞不炒。泄止厥未回者。加當歸引入血分。服數劑後。或眼內翳膜不能退清。加冬瓜仁二三十粒。以潤肝燥。小便利者去茯苓。方內只有乾薑之性。取其大能補火生土。陰虛者未免有劫水之弊。用者量之。肺氣虛及津不生者加五味。

某子三歲尙不能行。皆由體稟素弱。夏月煩渴吐瀉。醫者不究其脾胃之虛。執用外感之治。誤投知連、陳半、延十日。愈危。余冒暑視之。神已大敗。呼吸將絕。視其眼生翳膜。肌膚削極。吐瀉交作。（脾胃敗也）小水赤濁。（泄多亡陰也）口中時渴。（津液虧也）聲微息促。（氣不相接也）昏睡露睛。（脾敗不能合也）四肢厥逆。（陽氣竭絕也）手足微搐。喉內痰鳴。（枯涎無統也）腦後腹上發熱。（虛陽外越也）通計諸狀。皆由脾腎兩敗真慢脾風症。然喜尙能飲乳不輟。但不能久乳（因其虛而乏力之故）衆曰。此症患者皆死。何治之有。余亦蹙額躊躇。然慢驚之證。固由脾腎之虛。至古人所製金石腦射之方。後賢已闢其謬。今極重之症。非取後賢所選理中六君之藥大劑急投。鮮克有濟。遂將十全理中六君。胃關之意。加入驅風之品。酌爲一方。每劑十兩之重。每日

夜令進三劑。緩緩與服。如灌漑之法。欲其周身空虛之地。無處不到。每藥照煎。毋令稍減。如此三日。敗症稍回。神已漸甦。四日內白珠赤脈貫眼。口舌糜爛。白垢滿佈。狀如積粉。如月內小兒鵝口之形。衆嗟熱藥之誤。急欲更醫。余曰。服補劑而眼紅口爛。不但世俗謂之燥。即醫者亦多謂之燥矣。殊不知虛火上沖。陽氣將回。游移不定。擾攘於外。尙未歸宅。正歧伯先師所稱陰病見陽者。生正屬可喜。此時若改用涼藥。勢必前功悉廢。遂將開水拭去口中白垢。仍令原方加熟地三錢。以和其陰。再進日夜三劑。次早視之。口中潤滑。眼內俱清。遂減一劑。每日令服二劑。逐日漸愈。不一月。前後共計藥三十劑。肌肉充盛。遂能趨步行走。衆始欽服。然余嘗嘆小兒之死於慢驚者。多由於此。卽如此症。設認定其虛。或知用其藥。而不能以重劑多劑救之。是謂病重藥輕。延綿致死。卽進此方後。多有陽回而現陽症者。咸疑爲熱。稍無定見。每多意亂心迷。乃至大變其法。改用涼劑。無不立斃。近年閱歷稍深。凡治慢驚。悉用此治。屢驗不爽。敢望同志之士。共明夏月伏陰在內之理。當先顧脾胃爲主。後察其六淫兼症。戰戰兢兢。毋傷其正。庶幾得焉。

急救心陽法

耆朮二龍湯

專治亡血失精後之各危證。如氣虛神傷。魂魄不安。驚惕昏沉。自汗盜汗。心腎虛憊。戴陽脫陽等證。急以此湯救之。

黃耆 白朮 鹿茸 薏炭 豉仁 五味 龍齒
連三劑。神少醒。自云身非已有。是神魂尙未歸宅。更加五味一倍。又一劑。

蒲姜散

專治舌腫大塞口。礙於言語。是瘀血爲患。即以此散搽之能縮。

蒲黃

乾薑

等分研末

調搽治舌白脹滿塞口。以此二味末搽舌。遂縮如原。

某內小產數日。惡露如崩。胸緊腹脹。氣迫窒塞。怒目而視。人事大困。自言見鬼於前。余視舌白脹滿塞口。外以蒲、姜末搽舌。遂縮如原。當余臨診時。猶用法師勅符噴水。燃火叫喊。余見之大爲驚駭。蓋知其心陽將脫也。急以耆、朮、鹿、姜、芩、龍齒。約重剉餘。其家因產後瘀血。且天令亢熱。不敢服。遂面令煎服。進藥時。神氣憤亂。目已半合。身已將僵。余大爲驚怖。蓋恐其藥之不及也。亟爲灌定。隨命復煎一劑。更服。毫不爲動。於是又煎一劑服之。而神少醒。自云身非已有。渺茫不知所從。蓋神魂尚未歸宅之驗耳。更加五味。倍又服一劑。是晚神魂略安。猶有時驚時惕。時恐時昏。不敢開目。次早脈猶未斂。按之豁大如空。下血淡少。仍與前方連進一劑。始敢開目。飲食大進。忽腹中作痛。下血水腥臭不堪。意者果有瘀乎。於是原方加澤蘭、益母、生蒲黃、肉桂一劑。下出朽腐白肉一團。衆婦不知何物。余曰此雙胎也。視之果然。痛除脹消。隨以歸脾湯加鹿茸、姜炭、肉桂。十劑始健。

急救胃陽法

理中湯

專主傷寒太陰病。自利不渴。寒多而嘔。腹痛鴨溏。脈沈無力。或厥冷拘急。或結胸吐衄。及感寒霍亂。此湯能分理陰陽。安和胃氣。

人參

白朮

乾薑

甘草

本方加青皮陳皮。名治中湯。治腹滿痞悶。兼食積者。

附子理中湯

專主下焦陽虛。火不生土。臟腑不調。食少便溏。及中寒腹痛。身痛拘急。踰臥沉重。嘔吐食少。少腹疼痛。便溏。脈來遲細等證。

人參 白朮 乾薑 甘草 附子 肉桂

治某妻中氣素虛。惡寒潮熱。誤作疫治。熱熾躁譖發狂。便祕。目紅面赤。亂言無倫。診脈下指洪大。按指索然。此五臟空虛。血氣離守之驗。急進養榮湯。藥未進口。忽咬齒撮空。又將原方四倍。加附子二兩。急煎服。譖未息而狂少止。與粥一盃。大嘔稠痰。色青碧。是又不得不先救胃陽。復煎附桂理中一劑。藥未下咽。寒戰咬牙。肉瞞筋惕。此假熱一去。真寒便生之應也。只恐油汗一出。孤陽立越。亟與服。自午至戌。藥連三進。亥刻果汗厥冷來。又與理中一劑。片刻汗收肢溫。復與粥飲不嘔矣。

治某十歲病童。發熱嘔惡。進藿香正氣。二日絕粒不食。所下血多白少。諸醫稱熱。進左金二陳。腹脹胸高。指尖時冷。余視其血先下者凝黑成片。後下者點滴晦淡。知爲脾胃虛冷。致陽氣浮越而發熱。陰氣不守而下奔。中焦困乏而不納。與乾姜甘草湯一劑。嘔止。再劑胃脹已消。以早米湯亦受。更方與理中。發熱下利頓止。蓋脾胃得權。陽氣乃運。使氣血各守其鄉耳。

某躬勤力作。感冒風寒。變瘡瘍愈。越三日。胸腹飽悶。時現寒熱。醫專消導。延至胸高氣急。脹痛交迫。手不可觸。臥不安枕。余視其色如饑。聞其聲先重後輕。問其苦晚間尤甚。切其脈浮大無力。知爲苦寒攻伐傷中。謂曰爾必先服楂枳。其痛尚可忍。後服大黃枳實。脹不可當。曰是也。疏以治中湯而重其劑。服下半日。脹痛不增。然腸胃漸舒。二劑安睡。二便通快如常。越日復視。惟四肢無力。胸喜推摩。更方附子理中數劑全愈。又以附子理中九數兩而健。此正嘉言先生所謂健脾中陽氣第一義也。

某姪兒素有腹滿食少之因。然行動如常。未曾調養。偶因飲食不節。患瘡。醫以傷食治之。下痢紅白。又以柴芍芩連木香地榆疊進。裏急後重。瘡則間日夜發。痢則一晝夜數十次。口噤不食。額冷時汗。惡症叢生。余見攻補兩難。惟憑唇淡口白。足徵臟腑陰寒。逕用理中加芍桂一劑如故。再劑仍然。但藥雖未效。而病情已中。一醫用補中益氣法。意欲升舉脾胃。瘡痢交治。亦有卓見。但置陰陽之理。剛柔之用於不講。姑從權一劑。是夜瘡發雖輕。而下痢後重愈甚。此豈升舉一端可盡耶。予又擬理中重姜桂。加白芍吳萸。一日二劑。大勢稍減。按服二日。瘡亦不至。飲食漸進。惟下痢純白而已。臉唇舌淺白如故。口仍不渴。毫不爲辛熱所偏竊。思此病想過半矣。越日傍晚。驟然神疲氣怯。胸腹鼓滿。兩脇俱脹。充斥腰闊。因思仲景有經病暴變之文。法皆祕而弗宣。內經有暴病非陽之旨。俱指陰邪而言。仍推原意。用理中去參加附桂苓澤以進。如故。再用肉桂研末調服。至子丑時。腹中呱呱作聲。瀉下穢水二三陳。諸脹漸消。神爽思食。足徵腹中之患。皆陰邪瀰漫之氣。雖藉藥之辛溫。猶待天之陽開始克有濟也。於是益悟嘉言先生所謂地氣混天之理。非臆說也。古稱痢病轉瀉。是腎病傳脾爲向愈之機。善後到底。辛熱溫補成功。非不治瘡而瘡自止。不治痢而痢自愈乎。

某尊堂高年。體清癯無病。舊冬傷風欬嗽。疏解已痊。隨患咽喉微腫。小舌垂下。鹽點無益。守不服藥。至喉塞。飲食維艱。始醫投疏風化痰藥。口舌糜爛。啜苓連知梗等。喉痛愈增。吐蛇二條。神困膚熱。諸醫俱稱風火。然不敢下手。余視牙關甚鬆。會厭口舌一帶俱白。細思咽主胃。喉主肺。今肺家無恙。故呼吸無礙。其吞吐甚難。是在於咽而非喉也。且滿口色白。其爲陰火明矣。如果陽火。咽喉要地。豈能久待累月乎。必高年脾胃既衰。中土聚濕。新進水穀之濕。不能施化。與內中素蘊之濕。挾身中生生之氣。鬱蒸如霧。上沖喉嗌。故作痛楚。延於口舌。則糜爛浮於肌膚。則身熱。是少火變爲壯火。良民變爲匪類矣。奈何反進苦寒。戕胃致中土濕而且寒。故蛇蟲外出而成種種危候。急與理中丸五錢。青黛爲衣。令其口含噙化。是夕咽痛減半。竟得安睡。繼進連理湯數劑。安其病愈後。同道咸

議余爲補醫。以咽痛爛舌之症。從無參、朮、乾姜之治。豈知病有陰陽虛實之不同治乎。

某年近六旬。形體素虛。今秋忽患目視不清。至晚直不見物。余視而萎黃。形憔悴。知由憂思抑鬱。損傷心脾所致。夫水能鑑物。而火能燭物。今至夜不見。則無火不能燭物可知。夫心爲陽而居上。心火過亢。則多妄見。心火衰微。則不能燭照。故至夜如盲也。與理中加固脂益智。間進歸脾湯十劑。乃得復舊。某內產後三日。潮熱腹痛。八珍、五積不效。熱愈潮。腹愈痛。至七日。口瘡唇爛。以爲實火。芩、連不納。以爲虛火。附、桂亦嘔。遂至呃噦神昏。人事大危。諸醫束手。余謂此症唇舌雖爛。然喜飲熱湯。臍腹雖痛。而手可重按。顯係內寒外熱。第寒熱格拒。藥當偷關而過。所謂求其屬也。宜與理中先調其胃。法取小丸二兩半。青黛爲衣。石膏爲衣。或呷或吞。任其緩進。蓋仿長沙白通人尿豬膽之遺意也。藥下果胃安。不嘔。隨製八味地黃湯。以導陰火。熱收痛止而安。

回陽救脫法

附桂理陰煎

治血虛戴陽。脾腎陽虛。腹痛惡寒。少氣身羸。少食便溏。並治崩漏久痢。及血寒不得歸經等證。

當歸 熟地 附子 肉桂 炙姜 炙甘草

醫門黑錫丹

治真元虛憊。陽氣不固。陰氣衝逆。上實下虛。或上攻頭目。及奔豚上氣。痰壅氣喘。頭痛腰重。男子精冷滑洩。婦人血海虛冷。赤白帶下。並治陰症陰毒。肢冷脈伏。不省人事。及腳氣上攻等證。

附子 肉桂 沈香 木香 固脂 小茴

胡芭 黑鉛 肉豆霜 陽起石 金鈴子

治誤表氣脫。某老年勞力感寒。醫不究其內傷色脈。極力疏散。乃至氣急神昏。煩冤莫耐。與水可飲一盃。與食僅嘗一口。問頭痛則云頭痛。問胸緊便云胸緊。此氣脫神昏。與熱盛神昏者迥別。余察其形羸色晦。黏涎滿口。二便如常。按脈衝指忽散如羹沸騰。知爲虛陽上攻。脫絕之候。急與大劑附桂理陰煎。吞黑錫數錢得安臥。重服前藥而健。

治陽虛自汗。某素稟陽虛。秋令傷風。寒熱間作。脈來浮緩。用桂枝湯重附子。將疏方寒戰鼓慄。熱汗驟至。進藥少安。後因汗止復出。想是腠理空疏。陽不衛外。用真武重加附子。少佐收攝之味。服下汗雖漸止。而四肢漸厥。口渴飲熱湯自救。仍以附子四兩。人參一兩。濃煎。服未終劑。汗收渴止。厥回。諸症悉安。越日汗渴厥逆交至。是爲去而復返。必有所因。經云欲伏其所主。必先所因。可使氣和。可使必已。茲者登投湯劑。悉皆剛燥。於陽不違。於陰有乖。宜其退而復返也。乃進四逆加童便未效。繼進白通加豬膽汁。吞黑錫丸數錢。藥方下咽。忽戰慄肢漸溫。陽氣得所。頃刻間諸症如失。善後之法。一月未棄姜附。并須一日再劑。迨至臥不受被。有時手梗略冷。或掌心作熱。是皆陰陽和而不合之勢。乃將歸脾養心、十全大補、進退酌用、兼吞八味地黃丸。又遵陰平陽祕精神乃治之旨。調理而安。

氣脫收陽法

六味回陽飲（景岳）卽附桂理陰煎

此方卽附桂理陰煎。主治見七頁附桂理陰煎

人參 附子 甘草 當歸 熟地 黑姜

治某嫗年老陰虧。寒熱後耳流血水。耳旁筋痛。服腎氣及歸、杞、萸、牡、菊、地並愈。比晚寒去熱來。是爲陰陽不和。致令偏寒偏熱。非瘧也。當多服養榮爲陰陽兩補之劑。不料投二劑。症無增減。更醫誤服升柴、陳半。是夜大寒、大熱。大汗。昏沈欲脫。復余診脈來。鼓指洪大無倫。聲微息促。氣高上迫。危在頃刻。細思此寒此熱。固宜調陰陽。而值此氣脫。又當收陽爲主。以大劑回陽飲。加芪、朮、龍眼、鹿茸。連進二劑。徐徐與服。次日人事清爽。寒熱亦除。某嫗於瘧疾流行之年。秋將盡。忽渾身戰慄。瞬息大熱煩躁。熱去寒復生。寒止熱復至。先寒後熱。心煩意躁。脈來洪大無倫。兩尺上湧。抵指唇紅面赤。喜飲熱湯。舌上白胎佈滿。時吐稠痰甚多。正經所謂陽維爲病苦寒熱。發爲勞瘈。證雖瘧名。方非瘧治。急宜引陽回宅。整頓綱維。大固中州。陰陽調和。寒熱自止。六味回陽飲爲主。加緩中攝下之藥。如益智肉桂白朮、澄茄半夏等。是晚連進三劑。寒熱頓止。次早精神爽利。仍服三劑。間日微寒微熱復至。再服原劑而痊。

某堪輿冒暑登山。因而瘧痢交作。醫者不究其勞。惟責其暑。凡胃苓、香薷、芩連數手雷同。乃致瘧痢未已。而氣急腫脹日增。余視敗症百出。忙進補中益氣。金匱腎氣。按治三日。瘧邪不至。痢轉滑泄。似有起色。然尚有三不治焉。水腫脈宜洪大。今見沈細一也。且囊與蒸俱腫二也。又滑泄而腫不消三也。以此告辭。求治不已。潛思火土傷敗。再用六味回陽飲。加白朮、固脂、肉蔻。兼進硫磺丸。日進三劑。按治不歇。五日之久。病全不減。扶至十日。附朮各進兩筋。硫磺丸已下九兩。始覺氣急略平。便轉溏糞。再旬日進藥不輟。方可著枕。便堅溺長。脈稍有力。皮膚繩紋旋以歸脾湯。吞八味丸。再經月餘。始得回里。

回陽補虛甘溫治熱法

回陽生陰法

益元湯（活人）

專治熱盛陽虛。格陽畏寒。面紅口渴。舌刺神昏譫語。喜飲熱飲。自汗盜汗。二便不通。脈來按之豁然。是津液內竭。孤陽外脫之候。必以回陽生陰之此方救之。

乾姜 附子 人參 甘草 薤艾

童便 麥冬 五味 知母 黃連 葱白

治某內寒外熱。夜半頭腦暈痛。脈來浮數。舌心帶燥。似表有熱邪。然其平時面色失華。聲音不揚。知爲中虛之體。不敢清散。姑以六君去尤加金鉗與之。是夜潮熱愈熾。口出譫語。次早脈仍浮數。日赤舌刺。汗出透衣。開目神昏。小水赤色。大便不通。頗似實熱。但熱雖重尚可覆被。否雖乾不喜冷水。與粥一盃。便如虎嗜。再啜發囁。參諸平時聲色。而又發自半夜。知其表雖熱。而裏實寒。若果陽明實熱。見此症候。便揚手擲足。安得覆被昏睡耶。又安得渴不消水啜粥輒嘔耶。昔喻嘉言云。熱邪既盛。真陽復虛。此是真陽既虛。而熱邪復盛耳。授以此湯。方中姜附參草艾葉。葱白。回陽補虛。合乎甘溫能除大熱之旨。浮火之泛。有黃連折之。陰氣下竭。有知母滋之。且二味苦寒。更藉制姜附之猛。庶於口乾舌刺之症。服之無礙。若大汗傷津。有麥冬、五味。生精斂液。仍以姜棗和諧營衛。更入童便冷服者。猶恐格陽之症。拒藥不入。合乎熱因寒用。其始則同。其終則異。統而言之。究歸清補之藥耳。一劑症減。再劑身涼。但愈後難健。以大劑養榮湯疊服。調理數十劑始痊。蓋由少年稟賦不足故耳。

治某傭婦年老體弱。辛苦勞力之人。得傷風小病。頭身作痛。發熱畏寒。醫者不以勞力傷風之例施治。乃以敗毒散二服。遂大汗而赤。神昏舌乾如刺。聞其小便不利。大解不通。儼似熱症。予知誤治所致。乃老年陰氣既衰。誤汗愈涸。故舌刺口乾。泉源既竭。二便必變。診脈洪大。按之寂然。雖無急疾之象。然恐誤表戴陽於面。元氣隨汗立散。意欲行真武坐鎮之法。但津液內竭。難受辛溫。將欲與生脈救陰之意。而甘酸之藥。又何以回垂絕之元陽。繼思獨陽不生。蓋陽無陰。則孤陽失所而飛越戴出矣。必得扶陽之藥。而兼濟陰可也。處古益元湯。回陽生陰。一劑熟

睡。舌刺少減。再劑身涼汗收。食進。與理陰煎數服而痊。

復陽降濁化飲法

芩薑朮桂湯（仲景）（加附子一兩）

專治痰飲喘滿。咳逆上氣。口渴慄眩。惡寒身腫等證。

茯苓 生姜 白朮 肉桂 加附子

某先生平日操勞。（勞倦思慮。俱傷脾氣。）素有痰飲。稍飲食未節。或風寒偶感。必氣喘痰鳴。十餘年來。臨病投藥。無非括痰降氣之品。邇來神衰病進。今秋暴寒。飲邪大發。喘息不休。日進陳半香砂。氣往上奔。咽中窒塞。喉如曳鋸。密室中重裘擁爐。尙覺凜凜痰如浮沫。二便難寒。余見其面赤足脛冷。（陽被陰逼外出）兩人靠起扶坐。氣逼咽喉。不能發聲。脈得左手沈濶。右手緩大。因思喘急沈濶已屬敗症。且四肢雖未厥逆。而足脰已冷。實未易治。繼思胸中乃太空陽位。今被飲邪陰類僭踞。陰乘於陽。有地氣加天之象。急以此湯加附子一兩。連進二劑。全不減。再診。左濶之脈已轉滑象。而右大之形。乃然如昨。乃知中土大虛。不能制水。飲卽水也。嘉言曰。地氣蒸土爲濕。然後上升爲雲。若中州土燥而不濕。地氣於中隔絕矣。天氣不常清乎。遂將原方重加白朮。減附子大劑。再進。而陰濁始消。胸次稍展。溺長口渴。病者恐藥過燥。余曰。仲景所謂短氣有微飲者。當從小便去之。况渴者飲邪去也。何懼其燥耶。仍將前藥疊進。乃得陽光復照。陰濁下行。其善後之法。仍仿嘉言崇土壤白之法。

表裏先後救援法 附畜魚置介法

真武湯 此安未絕之陽

治少陰腹痛。四肢沈重。嘔咳下利。小便不利。痰飲水氣並治傷寒汗多亡陽。筋惕肉瞤。氣虛畏寒等症。

回陽湯 此救既散之陽
白朮 茯苓 白芍 附子 生姜

專治脫陽亡陽。魄汗淋漓。氣喘痰鳴。身半僵冷。脈來重按全無。或外顯假熱內實真寒等之危證。

黃芪 二兩 附子 二兩 五味 龍骨

牡蠣各五錢 沈香 肉桂各一錢

治某宦由京歸里。路中忽渾身麻痺。自服靈寶如意丸。得少安。日西渾身大熱。譫語無倫。視之面如粧硃。熱勢沸騰。脈雖鼓指。重按全無。上身躁擾。下半僵冷。知爲腎氣素虛。真陽浮越肌表。恐其戰汗不止。藩籬洞開。勢必飛越而亡。宜用表裏先後救援法。因處大劑真武湯與之。坐鎮北方。以安腎氣。飲畢復預煎芪附五味龍牡沈香肉桂。備畜魚置介法。以救既散之陽。後藥方劑。人事已清亥刻。果渾身戰慄。魄汗不止。又手冒心。卽將預煎之藥急服。戰止汗收。蓋未絕之陽。先已安堵。而既散之陽。復以駟返。千金之軀。救援有數。非偶然也。重服養榮湯而健。

溫固中焦宣通腎氣法

附固鹿芭湯

專治命門火衰。火不生土。胃呆少食。少氣身羸。腹痛腰痠。便溏精冷。陽痿等證。

附子 固脂 胡芭 鹿茸 益志

某命門火衰。不能薰蒸脾胃。試之飲食惡寒喜煖。而脾胃之陽虛可驗。更徵腹痛綿綿不絕。而臟腑之陰寒可憑。藥當溫固中焦。宣通腎氣。但固中勿令壅閉。宣腎毋耗真元。如附、固、芭、鹿、益、志等味。殆所必需。陰味宜減。陽味宜

加密度得宜。務令真陽健旺。陰氣潛消。俾中焦不振。脾胃運化有權。下焦溫煖。腎元開闢有職。則身中元氣渾然太和矣。患腹痛之不愈也。

收斂溫通法

溫運湯

專治產後正氣大虛。惡露頓止。畜瘡成癰。面紅汗出。神昏譫語。攻補難施者。可用此湯治之。

人參

當歸

乾姜

肉桂

龍齒

五味

茯神

鈎藤

龍眼

某媳體氣孱弱。素稟木火。且針黹晝日夕勞神。今秋產後。卽下榻如常。因目中覺燥。自將地芍服之。立時惡露頓止。目瞪反張。逾時方醒。醒而復發。余坐視片刻。連發二次。醒時忽言見鬼。一身戰慄。診脈幸無洪大。知爲神魂不藏。隔壁喊叫。聞之卽發。探病客至。見之亦發。立時怒目上視。十指緊撮。牙關隨閉。面如塗硃。汗出如雨。片刻之久。稍嘔微涎。人事復清。余坐二時之久。已發三次。家人咸稱邪祟。又議惡露上攻。余曰。聞聲則驚。見生人則惕。顯屬正氣大傷。因生懼怯。且惡露雖止。腹無著痛。實因地芍酸寒凝滯之故。惟有收斂溫通一法。尙何惡露可破。邪祟可驅哉。重用參、歸、姜、桂、龍味、茯、鈎、龍眼。疊進不輟。其勢漸緩。惡露隨下而瘳。或問曰。病因血止而變。今用補血而反通者何耶。答曰。素問病機篇云。血氣者。喜溫而惡寒。寒則凝而不流。溫則消而去之耳。

溫中通陽法

溫經通脈法

附子理中湯

主治見四貢附子理中湯

人參 白朮 甘草 附子 乾姜

四逆湯

治脈沈體痛。溫溫欲吐。下利清穀。手足厥冷。內寒外熱。脈微欲絕等證。若大汗及大下利而厥冷者。亦主之。

白通湯

附子 乾姜 甘草 (冷服)

當歸四逆湯

治手足厥冷。脈細欲絕。四肢拘急等證。

當歸 桂枝 茯苓 細辛 甘草 通草 大棗

藿香正氣散

治外受四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱或霍亂吐瀉或作瘧痢等證。

藿香 白芷 橘皮 半夏 原朴 白朮 茯苓
甘草 紫蘇 桔梗 腹皮 生姜 大棗

八味地黃丸

治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛寒。飲食少思。大便不實。下元衰憊。脾腹喘急。腹脹等證。

山藥

山萸

地黃

丹皮

茯苓

澤瀉

附子

肉桂

治某寒毒中臟。居山業農。暑月闔家患腹痛嘔吐。已亡數日。傳染鄰族。死者不少。滿目淒涼。視之舌紅口渴。目泛神昏。因問初起。云先腹痛嘔吐。身熱肢厥。余曰此陰毒也。前醫進柴胡、香薷、芩連等。余曰是矣。不待診脈。先取藥至。疏以附子理中。隨進附子理中丸。於是湯丸互進。晝夜不輟。次早復視。濁陰潛消。但微陽復返之象。尙屬游移。遍身小泡。擴發膚腠。自汗濺濺。發熱。脈來浮大。舌亦無津。轉方以八味地黃加黃芪五味。大劑緩進。晝夜再周。方得起坐思食。膚泡漸退。遍身復發小硬癥。膚無空隙。乃陰濁之毒。內伏而外出也。仍與八味小劑頻服。於是合村求治。初起腹痛嘔惡。發熱惡寒。時以藿香正氣加附桂溫中而通陽。有陰寒極盛格藥不入者。與白通湯加豬膽汁引導而通陽。有陰寒入於脈厥。逆無汗者。以當歸四逆加附子吳萸溫經而通陽。隨治隨痊。然病風尚熾。因疑各家茶皆混濁不清。令取冷水視之。其色混濁。嘗之其氣冷劣。而味苦硬。因歎曰。此地毒也。遂視山下土井。溝井混濁。余曰毒也。凡井本清泉澄映。况六月酷暑未雨。若非地毒。此水安得混耶。衆皆醒悟。咸謂從無混水。或者山上舊冬所葬新塚之礙乎。嗟嗟。鄉愚昔清今濁。顯然不識。其斯地之數乎。蓋六月陰氣在下。人身陰氣在內。再逢山脈之變。陰毒侵臟。釀成種種寒症。急令他處掘地取水。並製貢仲甘草、雄黃、黃土各用觔許。煎湯一斛。與之皆服。更經半月。病風遂息。於是同道問曰。舌紅口渴。目泛神昏。人多認爲陽毒。何直決爲陰毒。而又敢進姜附乎。答曰。此症全因誤治所致。非病勢之自然也。余初亦駭疑問之。據述腹痛嘔吐。身熱肢厥。則厥亦暴矣。經曰暴病非陽。其厥爲陰厥無疑。况前醫肆進苦寒攻散。重竭其陽。逼其虛陽外越。故舌紅口渴。目泛神昏。勢將立竭。不得不以大劑姜附。急挽殘陽而驅陰濁。舍此安從治哉。要知此症初起。原屬內傷直中之例。故厥之來也暴。若外感傷寒。傳變之症。乃熱深厥深。熱微厥微。其厥之來也必漸。此陰厥陽厥最緊關頭。務在平日揣摩詳備也。

復陽散寒溫煖腎氣法

白通湯

主治見一四頁白通湯

葱白 附子

乾姜（附人參白通加豬膽汁）

治某體肥而弱。忽腹中泄瀉十指稍冷脈甚微。因與理中泄未止。而厥逆愈進。腹痛愈甚。再診無脈。知陰寒入腎。蓋理中者僅理中焦。與下焦無涉。改進白通湯安。

次某兄腹痛纏綿。漸至厥逆。二便阻閉。脈悶之極。已進攻下。而痛愈重。余診六脈俱無。且面青唇白。知爲寒邪入腎。亦與白通。溺長便利而安。

門人問曰。一泄瀉。一便閉。何以俱用白通而愈。答曰。少陰腎者。胃之關也。前陰利水。後陰利穀。其輸泄有常度者。原賴腎臟司開闔之權耳。若腎受寒侵。則開闔失職。胃氣告止。故厥逆無脈也。今兩症雖異。而受病則同一者。有開無闔。故下利不止。二者有闔無開。故二便皆閉。均用白通。復脈散寒。溫煖腎氣。使腎氣得權。復其開闔之舊。則開者有合。合者有開矣。噫。此金匱奧義仲景所隱。而未發者也。

某晚年舉子。甫半週。體肥面白。吐瀉。醫投二陳。養心。加煩渴。更醫進七味白朮。入口即吐。人事大困。余視時靜時擾。靜時氣急目閉。動時角弓反張。遍身如火。四肢獨厥。唇紅舌光。乾燥之極。頗沈濁。白頭項青筋累累。此乃陰陽虛竭。本屬不治。因思此症外顯假熱。內本真寒。四肢發厥。元陽亦敗。舌燥無津。元陰亦損。但救陰無速功。回陽宜急。治今格藥不入。可見中寒已極。必得反佐向導之法。庶克有濟。遂將人參白通。加豬膽汁。徐徐與服。入口不吐。乳食亦受。四肢漸和。余卽回寓。仍囑是夜再進一劑。其父慮膽汁苦寒。遂減膽汁。仍然吐出。因加日間所剩膽汁。

數滴。下咽即受。次早邀視。身體溫和。舌已生胎。尙有微泄未除。連服八味地黃加花椒而愈。

反佐通陽法

白通加人尿豬膽汁湯（仲景）

治陰盛格陽。厥逆無脈。大汗大利。服藥拒納。內寒外熱。四肢拘急等證。

葱白 乾薑 人尿 豬膽汁

治某善飲。衣食弗給。暑月吐瀉。大汗。口渴飲水。四肢厥冷。尙能匍匐求治。余見而駭之。忙與附子理中丸一兩。更與附桂理中湯一劑。俱嘔不納。尤可畏者。六脈全無。四肢冰冷。捫之寒徹指骨。頃刻間肌肉大奪。指掌尤甚。急以回陽火焮之。諸逆幸挽。始得酌方。以大劑附子理中湯加益志。又嘔而不納。因思胃者。腎之關也。寒邪直入。舍此大熱之藥。將安求乎。復悟腎胃之關。一臟一腑。寒邪斬關直入。與少陰腎寒之氣。滔天莫制。大熱之藥。勢必格拒。夫理中者。理太陰也。與少陰各別。原仲景治少陰病。下利厥逆無脈之症。格藥不入者。反佐通陽有其法。卽用此湯。按法煎進。下咽乃受。漸喜脈微續出。陰濁潛消。陽光復解。九死一生之症。賴以生全。

復陽消脹法

消陰湯

專治脾腎陽虛。腹痛腹脹。四體浮腫。水氣奔豚。飲食不運。元陽不固。上逆爲喘等證。單腹脹亦主之。

白朮 巴戟 附子 乾姜 熟地炭
固脂 菠巴 澄茄 肉桂 沈香 小茴香

某病纏服藥十有餘年初起腹痛時脹得食身重時愈時發漸漸而甚去冬足跗覺浮至春通身浮腫腹皮脹滿腹中鳴響上氣喘急胸前塞緊食飲不運左腎睾丸吊痛余曰此單腹脹難治幸脈尚有和緩之意可知胃氣以及真陽尚有微存足徵先天稟賦之厚急進大藥尚屬可治此症全是陰氣混擾所以腹中鳴響陰氣盛則中土無權所以飲食不運胸緊腹鼓皆土病也至於吊痛跗腫乃命門火衰之徵而上氣喘急在乎腎陽爲陰所迫無根之氣竚往上奔安之固之尚且不暇何醫者不明塞因塞用之法任行攻伐使非先天稟厚真陽早已撲滅矣吾許可治以崇土爲先而土賴火生又當以助火爲急火旺則土自堅土堅則萬物生矣火旺則陰自消陰消而陽自長矣照服後告予曰服白朮之擋阻胸前反寬腹中之氣竟走肛門而出余曰此正雲開霧散日將出也以後服五十劑毫不改味而腹脹足腫始消七十劑奏全効可見陽氣存留得於先天稟賦之厚者終克有濟也

扶胃健脾溫通運行法

枳實理中湯

此丸能補氣消結利濕治滿故治心下虛痞腹中脹痛食難運化神思懶倦欲成痞塊等證。

人參 乾姜 白朮 甘草 枳實

治某胸腹脹痛大解不通已服枳桔香朴無效又與滻痰仍閉飲食雖甘而食下作脹每日探吐痰水數口似覺稍寬有糞結於肛門努掙不下挖之略出余視時便閉已十日矣然脈來浮緩遲弱身無寒熱口不作渴舌無胎吐稍寬究竟津液愈涸傳送愈難與此湯加半夏厚朴服十劑仍如故因思蓄飲不行加入半硫丸四錢仍與前藥吞服又二日僅得半升溏糞而已如此飲食起居未費調理而健。

又某吸洋煙。好色多勞。忽因憂鬱氣結。漸至胸膈不舒。醫投消導散藥。腹脹便閉。嘔逆不食。更投承氣。腹中窒塞。痛楚愈增。前醫又謂病重藥輕。大黃今須加倍。余思凡病外感。或熱邪傳經。或熱結胃府。斷無不發寒熱之理。且有一攻不轉矢氣者。不可再攻之戒。况攻之愈塞。其非熱結也明矣。此脾氣衰敗。運行失常。出納將廢。而腹中所受苦寒之藥。一團陰氣瀰漫。身中沖和之氣。愈攻愈散。使非大助脾陽。其何以驅此滔滔之陰邪哉。疏枳實理中。連進二劑。得安睡。腹滿稍寬。復將原方加倍。計丸一兩。增桂一錢。服下腹響。二便齊通。所泄之糞。半綠半黃。盡是稀糜穢水。並無結糞相間。此腹中一團陰寒之驗也。愈後附桂理中數劑調理。自是飲食漸增。煙引亦止。

通陽泄濁開結驅陰法

溫通湯

專治大便因寒閉結。食不得入。厥逆面白。脈來沈伏。溲赤腹痛。此非承氣所能通。必以此方下之。

大黃 芒硝 附子 乾姜 草烏 牙皂（卽皂角）

治冷積阻格。某四肢逆冷。面色青白。吞酸嘔吐。食不得入。六脈沈伏。大便不通。小水短赤。細察諸症。皆爲陽氣不舒。理宜疏通下部。庶幾濁降清升。與大承氣三劑不動。余亦駭疑。繼知其人嗜酒。每患足疾。今足未病。濕熱未曾下注。致停中焦。將成關格之象。視舌滑潤。非燥症也。中焦必有停積冷痰。以致閉結膠黏。正所謂陽微陰濁。僭踞非僅承氣鹹寒。可能開者。法當通陽泄濁。開結驅陰。於是以姜附通陽以驅陰。硝黃開結以泄濁。加草烏、皂角。名爲霹靂通關之將。以直劫其巢。服未片時。下穢污數斗。小便清長。四肢溫煖。食粥二碗。不用再劑。

助陽開結法 遂冷化氣法

助陽開結湯

專治冷結關元。二便阻閉。四肢厥冷。腰腹脹痛。脈來沈遲等證。

附子 枳實 乾姜 桂枝 茯苓 甘草 沈香

治某體肥面白。一日二鼓時忽然腹痛。余見其腰屈不伸。自以兩手撫按。小腹膨脹甚痛。面唇俱白。十指稍冷。小水緊迫。欲解不出。脈來沈遲。內外一探。陽氣大虛。因問曰。日間曾服物否。應曰清晨無病。上午小便時。身中忽然戰慄。尙有一半未能解出。以後微覺小腹帶墜。服六一散。腹愈脹。大痛。余曰起先小便時寒戰。足見身之陽虛。再進滑石沈寒之物。凝而不化。是雪上加霜。自然關元冷結。時值二鼓。正陰氣充盛之時。陽愈不耐。故病見劇。法宜助陽開結。緩其水而冰自解。冰解而水自流。水流而壅塞自開。寒開而脹痛自消矣。疏方以附枳爲君。姜、桂爲臣。荅、甘爲佐。沈香爲使。意用姜、附、桂以消陰也。荅、甘以泄滿也。沈香以鼓升下焦氤氳之氣也。藥味精當。絲毫不雜。因病勢峻厲。重劑與之。恐其陰盛亡陽也。服後立時痛脹俱失。小水長行。又某病自腹痛連日服藥未愈。偶服車前。痛轉加甚。小水緊迫。膨脹不出。余診時痛悶於牀。呼吸將危。四肢厥冷。脈得寸部浮弦時止。尺部沈遲而疾。潛思陽明實痛熱結膀胱。痛極必汗。今無汗知非陽症也。又初無患寒頭痛。則於表裏無涉。此必生冷傷臟。是爲冷結關元。陽氣不化。經曰膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出焉。重用附、桂、加、茯、草。佐以枳實。合爲逐冷化氣一劑。稍甦。小便緊急十餘行。僅得半盞。再劑安睡一頃。下榻小水長行。痛止而安。

大劑溫通驅陰逐冷法

溫通逐陰湯

專治沈寒內結。痃癖痞塊腰脇牽痛。少腹脹滿。嘔利納呆等證。疝氣亦主之。

附子 白朮 乾薑 肉桂 固脂 胡荽 丁香

肉蔻 稍加枳實金鉛肉

兼進硫黃丸稍加黃柏

某得痃癖病。少腹作痛。左脇肋下有筋一條。高突痛楚。上貫胃脘。下連臍丸。痛甚欲死。或嘔或利。稍緩若無。嘔利則痛苦迫切。連宵累日。絕粒不進。或得腹中氣轉。稍覺寬舒。醫者不識。雜藥亂投。誤治兩載。病已瀕危。余視其形瘦骨立。腹脹貼骨。知爲誤藥減食所致。按脈滑沈。且覺有力。審病經兩載。形雖瘦而神不衰。疑是肝胃二經痼冷。沈寒。積凝膠聚。纏繆糾結而爲痃癖之症。蓋痃者玄妙莫測。癖者隱辟難知。非大劑溫通。何以驅陰逐冷。以附桂姜、朮、固脂、葫芭、丁蔻。稍加枳實、金鉛。以爲向導。兼進硫磺丸。火精將軍之品。用以破邪歸正。遂滯還清。冀其消陰回陽。生魂化魄之力。日夜交斟。按治半月。病全不減。再堅持旬日。雖稍減而脈不動。積未消。意想進亦金莖攻之。恐久病難勝其任。只得堅守前法。再進旬日。忽大便大通。所出盡如魚腦。其痛如失。姑減硫磺丸。仍與前藥。稍加黃柏。每日出魚腦半甌。再經半月。前藥不輟。魚腦方盡。冷積始消。前此腹脅高突之形。泯然無跡。厥後露出纏紋一條。如蛇蛻之狀。乃知先賢人身氣血痰水之積。均有澼築科臼之說。爲有徵矣。

通陽洩濁法

半硫丸

治老人虛祕。冷祕。不食大便。及痃癖冷氣。陽虛委弱。真火不足。或致未老先衰之症。此藥性緩而利。

冷香飲子

半夏 硫黃

治夏月貪涼飲冷。致上吐下瀉。陽氣暴脫。陰寒膈拒。反喜涼畏熱。脈伏肢冷等證。

生附子 草果 橘皮 甘草 生姜

某高年體盛。素多酒濕。時值嚴寒。飲食未節。濕邪不走。始則胸緊咳嗽。醫以陳、半枳、桔消導。氣急痰鳴。更醫謂腎氣不納。姜附沈丸。二香進之。益劇。氣急上冲。痰響窒塞。阻隘喉間。日夜不能貼席。尤可畏者。滿頭大汗如雨。氣蒸如霧。時當大雪。不能著帽。大便未通。小水涓滴。滿舌痰沫。引之不透。診脈沈而勁指。知爲陰濁上攻。雷電飛騰之兆。正經所謂陽氣者。若天與日失其所。則折壽而不彰。法當通陽洩濁。速進半硫丸。俾得冰開凍解。二便稍利。陽光復辟。陰濁下行。胸膈得舒。而痰壅頭汗氣蒸諸恙。不覺如失。亦陽氣得所。則壽考彰明之驗也。後與冷香飲數服而安。

辛熱寒溫通降法

赤金豆(景岳)亦名八仙丹

治血凝氣滯。胸腹脹痛。結聚癥瘕。堅硬不消。一切痰食蟲積諸症。

滋腎丸 巴霜 天竺黃 木香 皂角 碣砂 生附子 丁香 輕粉 滋腎丸

治腎虛蒸熱。腳膝無力。陰痿陰汗。衝脈上衝而喘。下焦邪熱。口不渴而小便閉等證。

黃柏 知母 肉桂 蜜丸

治某初起小水短赤。繼則腹脹便祕。服硝黃。腹愈窒塞。服車前尿愈涓滴。脹悶欲死。余視呃逆嘔吐。湯水難入。審知素耽酒色。濕熱壅於膀胱。冷積聚於胃府。故前阻小便。後塞大腸。氣無下降之權。只有升逼之勢。細察人迎氣

口兩脈緊急可駭。病屬關格難挽。勉爲推尋。因思胃府冷積。當宗熱以攻之。辛以通之。膀胱濕熱。宜遵寒以清之。溫以化之。於是攻與赤金荳。化與滋腎丸。連進未嘔。晝夜三服。俾濁污升逼之氣方得下降。不再劑痊。

溫中散結法

指迷七氣湯

專治小兒盤腸氣痛。驚怖搐搦。喘息目瞪。啼哭不乳。腹脇脹滿。肚顯青筋等證。

莪述 陳皮 菖蒲 半夏 甘草
益智 肉桂 香附 紅棗 丁香
右咬咀水三碗。煎至一碗。母子同服。

某子甫及旬日。苦於啼哭不乳。或時驚怖。或時搐搦。或胸緊氣急。或目瞪頭擡。衆云驚風。已服金石、腦射。余視之曰。誤也。夫驚風一症。月內之兒固有之。但雖啼哭不乳。必兼撮口噤口之類。今兒之病。苦於啼哭不乳爲急。至於他證不過時有之。所爲更緩耳。故方書云。口中之啼。多因腹中之痛。正所謂月內小兒盤腸氣痛是也。因視其腹果脹滿。肚上青筋累。隨用燈火焯之。其哭稍定。更悟此兒其父患阻病。曾效四磨飲者。斯兒稟受此根。仍與此飲。以散結氣。更因大便甚堅。用酒大黃水磨。以下其腹中之氣。不致久羈臟腑。一服悉安。後數日。治有某子。方月悉同此症。但多有嘔乳一病。乃臟腑陰陽不和。升降未順。是胎寒之屬。以七氣湯母子同服愈。

表裏俱虛發汗利水兩難法

甘草附子湯(仲景)

治風濕相搏。骨節疼煩掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫等證。

甘草 附子 桂枝 白朮

治風濕相搏。遍身骨節疼痛。手不可觸。近之則痛甚。微汗自出。小水不利。身面手足俱微腫。且天氣頗熱。尚重裘不脫。脈象頗大。而氣不相續。風本外邪。當從表治。但尊體表虛。何敢發汗。濕本內邪。須從裏治。而尊體裏虛。豈敢利水。遂處此湯。一劑如神。三劑悉愈。

活血通脈法

當歸四逆湯(仲景)

主治見一四頁當歸四逆湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草 通草 大棗 或加吳萸生姜

治某妻懷孕數月。四肢拘攣。周身痛痺。肌膚及手指掌皮。數變如蛇蛻之形。驚痛交併。恐成廢疾。診脈浮大。按浮爲風。大爲虛。此營衛不固。血虛風襲之候也。今某起居如故。飲食如常。外無六經之形症。內無便溺之阻格。惟苦肢節間病。風中血脈奚疑。處以此湯。當歸重用。佐一派祛風之味。連進四劑而愈。

發表溫經陰陽不偏法

養血通脈法

當歸四逆湯(仲景)

主治見一四頁當歸四逆湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草 通草 大棗 或加吳萸生姜

某女產後兩月。忽戰慄左脇微痛。胸中窒塞。屢進表散。寒慄愈甚。嘔吐清水。時令炎熱。諸醫莫辨虛實。余視面色紅中帶青。脈象甚微。久按覺弦。細揣知爲久寒在血。其左脇微痛。是肝氣鬱而不伸。肝挾相火。是以面色青紅。木邪侮土。是以胸中窒塞。嘔吐清水。因思厥陰中寒。相火內寄。非發表溫經。病必不解。但發宜養血。溫經忌助陽。宗仲景治厥陰久寒之例。與當歸四逆加吳萸生姜藥下即安。

某郎半歲夜半腹痛啼哭不已。以熱手重按其腹。似覺哭聲稍緩。久之仍然。醫以行氣消食。誤治兩日。目珠上瞪。四肢微搐。余視面色赤中帶青。目中白珠頗藍。手足指尖略厥。小水直無。指紋透甲。危急之頃。靜神默悟。知此病寒邪入裏。與方脈寒症無異。意擬姜桂通陽。然細察面色。唇舌二便。又非無陽可比。倘辛熱誤用。而耗陽之質。更恐熱藥劫陰。愈增筋掣痙攣。因思肝藏血。寒傷營。非養血通脈。寒何申解。痛何以除。先以燈火燒腹。疏通凝寒。以仲景厥陰篇當歸四逆湯一劑霍然。

清熱法（一）

竹葉石膏湯（仲景）

治傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐等證。

竹葉 石膏 人參 甘草 麥冬 半夏 糜米 生姜

治傷寒泄後。潮熱大作。口反大渴。知其裏舒熱出。三焦經絡之熱。法當清之以此。

清熱法（二）

清心散

治心火上盛。中焦燥實。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡唇裂。吐血衄血。大小便祕。諸風癥癰。發狂。及小兒驚風。痘瘡黑陷。

二丹丸 連翹 薄荷 芒硝 大黃 黃芩 黃連 竹葉 甘草 山梔 蜂蜜

治陰虛不足。金水並虧。五心煩熱。欬嗽口渴。舌燥咽乾。骨蒸弦暎。盜汗遺精等證。

丹參 丹砂 天冬 麥冬 人參 生地 菖蒲 茯神 遠志 甘草

治某女孫形體清瘦。夏月遍身紅塊。大小不一。醫愈秋初忽仆地神昏。喉內痰鳴。片刻復清。一日數發。醫用化痰順氣等劑不效。日夜數十發。余診脈得寸口洪大。兩尺弦緊。自云腹中如焚。欲飲冷水。忽又昏倒。口開手撒。身涼默默。面白唇紅。任揉不知。頭仰垂下。推原其故。中寒條下。決無此例。夏月君火專權之令。發出遍身紅塊。未經消解。誤用草藥探愈。逼毒入內。留於心胞。且素稟木火之質。腎水不足。可知心火過亢。肝木有餘。木盛生風。風火相煽。兩淫於中。先哲有云。心火內蘊。膻中如焚。涼膈清心功見一斑。又經云風淫於內。治以甘寒。理宜先進清心散。後服二丹丸。庶為合法。疏方翹薄清上焦之熱。硝黃救北方之水。芩連竹葉清心肺而治風。甘草山梔通三焦而瀉火。合蜂蜜為一劑。服之安睡。醒起更衣。其病如失。仍令二丹丸調理而愈。

瀉熱清肺法

白虎湯

治邪入陽明。反惡熱。大汗出。脈來洪大浮滑。大煩大渴等證。

石膏 知母 甘草 糜米

瀉白散

治肺熱咳嗽。喘滿腫嗽等證。

桑白皮

地骨皮

甘草

粳米

桂枝湯

治太陽中風。頭痛發熱。汗出惡風。脈緩畏寒等證。

桂枝

白芍

炙草

生姜

大棗

治溫熱病新愈半月。因怒復發。聲音悉閉。腰上發熱。腰下畏寒。脈寸浮數。尺緊濡。似乎上下阻截。其病全在於肺。服烏藥順氣散。開肺氣而祛寒。諸症悉瘥。惟聲音雖出。猶不清。時仍啞。用此合方。瀉其蘊熱。則肺可清而壅塞自除。一劑潮熱悉退。聲音清亮。前後兩劑。病如冰釋。後以保肺生津之藥。調理而健。

胃中伏熱宣揚輕瀉法

瀉黃散

治脾胃伏火。口燥唇乾。口瘡。口臭煩渴等證

防風

藿香

山梔

石膏

治某潮熱畏寒。服羌、防、柴葛。熱愈甚。大汗肢怠。食已即飢。復用柴、檳。加大黃、枳殼。牙關緊閉。口中流涎。面唇俱白。大汗嗜臥。腹中欲食。口不能入。前醫束手。余診脈弦小。惟兩關洪大之至。細察此症。雖屬三陽經病。但與太陽少陽。全無關涉。悉是陽明胃病。蓋胃中伏火爲中消候也。以瀉黃散加七釐升麻。大黃與之。方中最妙。防風升麻有升陽瀉水之用。所以能啓發胃中伏火。不致清陽邪火兩遏其中。使之盡行舒暢。又有七釐誘之。石膏涼之。大黃

泄之。梔子引之。甘草調之。蜂蜜潤之。井井有法。誠爲胃中伏熱之妙劑也。下咽後。熟睡一頃。牙關即開。流涎亦止。潮熱亦退。更以搜風潤腸之藥。頻服健。

清瀉陽明法

清胃湯

治胃火熾盛。眉稜骨痛。口瘡。口臭。牙齦腫痛。舌燥。口渴等證。

石膏 石斛 生地 丹皮 葛根

治某心腹氣痛。牽引頭顱。綿綿半載。猶可治事。偶因食椒炒雞兩塊。頭痛如破。神昏氣喘。不敢稍動。診脈如平人。不疾不徐。惟眉稜骨內痛。如刀刺。天明痛發。至午如刺。至夜如失。此症未曾診治。勉從厥陽上冒。雞性助肝之旨。且痛甚於左眉骨。用熄風和陽不效。更清肝涼血亦如故。竊思痛發天明。正肝木旺於寅卯。顯屬肝火爲患。治不中肯。何故。復將三陽頭痛。歸界辨別。計眉稜骨屬陽明。陽明者。胃腑也。經曰葛根。陽明藥。柴胡少陽藥。於太陽有何涉乎。此三陽之藥。治三陽之病。稍遜毫釐。尚無干涉。今眉稜骨痛。果陽明胃火。而治厥陰。宜乎罔效。乃疏晉斛、有丹。地以葛根爲使。服之果獲全愈。一日閱張氏醫通。頭痛門中有眉稜骨痛一條。分虛兩途。並用選奇湯。虛加歸芍。實加葛根。又曰虛痛天明時發。實痛晝靜夜劇。惟此與前治驗。痛發天明屬熱。稍異。足徵先賢纂述用心頗苦。想張氏特拈出眉骨痛多屬陽明風熱之語。亦一時之心裁。啓後人之端緒者多也。

甘寒解暑法

天生白虎湯 即西瓜

治陽盛劫陰。大汗大熱面紅脈洪。煩躁譫語口渴舌乾等證。

治夏月新婚後。觸暑病熱。頭腦大痛。誤補大熱焦渴。醫以瘡熱治之不瘳。節届大雪。病者因頭痛難忍求治。語以暑邪之症。於氣虛身熱。譫語自汗而之垢脈之長而知之也。先將一枚破而與之。病者心躁口乾。鯨吞之下頓覺神清氣爽。更與之食畢。汗收渴止。頭痛如失。

溫邪入裏救治法

犀角地黃湯

治傷寒及溫病。應發汗而不汗之。內蓄血者及鼻衄。吐血不盡。內餘瘀血。大便黑。面黃等證。

犀角 地黃 白芍

丹皮

黃連

黃芩

治瘍疫。醫進達原。大柴胡。潮熱不熄。燥渴反加。因而下利譫語。病經兩旬。身體倦怠。兩目赤濶。譫語聲高。脈來數急。知其下多亡陰。幸小水甚長。下源未絕。與此湯加蔗汁。桑汁。烏梅。甘酸救陰之法。頻進而安。

清火存陰法

黃芩湯

治太陽與少陽合病。協熱自利等證。

黃芩

芍藥

甘草

大棗

仲景治協熱下利存陰法也。病因膽火肆虐。移熱於脾。故用甘苦之劑。清膽火以存陰。

風火內淫甘寒填竅法

甲字甘寒填竅方

治痰火內盛。痰入經絡。上肢不利。下肢痿蹙。咳嗽上氣。口渴膠痰。四體痺麻。汗出面熱等證。

桂枝

白芍

黃芩

石膏

芥子

薄荷

桔梗

竹瀝

甘遂

麥冬

寒水石

乙字甘寒填竅方

治痰火竄入經絡。上肢不利。下肢痿蹙。咳嗽上氣。肺壅痰結。陰虛便結等證。

生地

白芍

丹皮

石膏

礬石

薄荷

牙皂

竹瀝

芒硝

薏苡

膽南星

枇杷葉

丙字甘寒填竅方

治津液枯燥。痰火爲患。咳嗽膠痰。口渴舌乾。肺氣不肅。大便燥結等證。

石斛

生地

秦艽

石膏

天冬

麥冬

蘇子

竹瀝

地骨皮

薏苡

黑芝麻

治某婦肢痛難動。醫進驅風燥濕清火補血之劑。煩熱出汗、耳聾、口燥、胸緊、氣促。四體不知痛痒。醫仍認筋骨之病。投附子、草烏、秦艽、獨活、牛膝、木瓜等愈劇。商於余。余曰此症原由體肥多痰。痰火內盛。而召風以入。風入空竅。痰火隨之。共入經絡。初猶不覺。迨至機關不利。而痰火與風結聚一家矣。書曰肺主周身之氣。雖痰火風併病。無不關乎肺臟。經曰肺熱葉焦。則生痿蹙是也。夫風藥多燥。故助熱加甚。經云風淫於內。治以甘寒。夫甘寒清火。人

所共知。而熄風誰能深信。不知風走空竅。原由火召。非甘寒厚味監督其間。不能填塞其隙。首方二劑。潮熱減半。汗止大便艱。卻無痞滿。尙屬枯焦。未敢議下。二方兩劑。熱除人事清。但時言痛楚。非病進也。蓋經脈流通之焦兆耳。三方服五劑。手足運動。再五劑。形骸如常人。皆謂奇實非奇也。

又治某婦。悉同前症。但初起多服黃芪、尤龍眼等藥。筋加短縮。與以前第三方。每劑加倍。半月而愈。

風淫甘寒熱淫鹹寒法

風痺湯

專治風痺。濕熱入於經絡。或四肢腫痛。痛無定所。四體麻木等證。

杏仁 桂枝 防己 防風 蟬砂 羚羊

桑葉 通草 加薏苡草薢

加石膏、黃柏、天冬、元參、茅根、桑枝、梨汁、竹瀝。稍加元明粉。

治某長夏臥風。夢遺後得風痺病。始苦左足腫痛。難以移立。脈大舌黃。身有微熱。頗類腳氣病。但無惡寒、發熱、胸溼、嘔吐之症。且脈大舌黃。必是風痺。此因風濕內蘊。久而化熱。著於經脈之中。法當輕揚辛涼之藥。宣通經隧。兼以甘寒味淡之屬。熄風滲濕。但濕凝爲腫。風勝爲痛。而風爲陽主動。恐四肢關節處難免流注。非比寒濕之邪。僅著一處。留而不散。是以內經有周痺行痺之稱。卽此症也。必邪去然後正安。不可因遺精起病。輒與溫補助邪。疏掌節肩髃各處。逐日游移。腫痛不堪。又以前方參加解柏、天玄、茅桑、梨汁、竹瀝。便閉。稍加元明粉。蓋遵經風淫於內。治以甘寒。熱淫於內。治以鹹寒。半月之久。按日兩劑。其功始半。續進地黃丸一劑。乃奏全績。

風勝肺痺法

甲字宣肺起痺湯

專治肺瘡心寒。喘息咳嗽。胸痺澀澀等證。

桂枝

桔梗

裏皮

蘇子

杏仁

紫苑

杷葉

乙字宣肺起痺湯

專治肺瘡來感熱甚。大汗。喘息胸痺等證。

紫苑

杏仁

知母

桔梗

半夏

加入桂枝湯中除姜棗

丙字宣肺起痺湯

專治肺瘡夾感熱甚。大汗。喘息胸痺。痰結咳嗽等證。

將前方去芍藥加蘇子、杷葉，兼入竹瀝姜汁。

清肺開痺湯

專治失表成痆。胸痺不舒。痰結便閉等證。及熱邪蒙閉上焦氣分。小便涓滴不通者亦主之。

葵蕤

石斛

知母

通草

桂枝

杏仁

紫苑

杷葉

某兒秋瘡。二日一發。以其邪氣內藏於風府。其道遠。其氣深故也。然病兩月而神不衰。惟發時心中寒。寒久熱甚。多驚。一日偶感外風。以致寒不成寒。熱不成熱。四肢僵硬。醫者不知內風召外風之理。猶以桂附燥血羌防升氣。乃至氣急上衝。兩人扶坐。不能著枕。危急延予治。診得便祕脈浮。許以一劑可愈。疏桂、桔梗、蘇、杏、苑、杷葉。果得便通氣平。諸症皆安。蓋經云。肺瘡令人心寒。又云。熱間善驚。肝主驚。有金剋水之象。方中桂枝、桔梗領風邪外出。餘

皆輕清疏降之藥。且桔梗能通天氣於地道。觀其有升無降。但得天氣下降。而地可自通矣。至取效之捷。原內經所謂風氣勝者。尋其治病易已也。

某患瘡先寒後熱。發時胸旁氣閉。喘咳不伸。熱甚口渴。自午至酉大熱。直至徹曉。微汗乃解。間日依然。屢治弗效。余以胸痺喘急之兼症。悟出內經肺瘡之例。而取法治之。夫人身營衛。晝夜流行不息。今肺素有熱。復感外風。則肺氣窒痹。毛竅不舒。經絡乃阻。故發爲寒熱。日晡金旺之時。故熱尤甚。胸膈之旁。乃肺位之道。淫氣壅聚。則喘咳不伸。法當疏利肺氣。使淫氣盡達於表。則內可宣通。瘡不治自愈耳。與苑杏知桔半。加入桂枝湯中。除姜棗一劑而安。孰謂不循古而敢自用哉。

附某孫年近三十。初起咳嗽。腹中覺熱。命妻煮雞子食之。便覺寒凜。胸緊氣急。四肢發痺。若作風瘡之狀。以後但熱不寒。大便閉塞。小水亦短。諸醫發表攻裏。作瘡愈形。此乃表寒束其內熱。亦是內經淫氣喘急瘡聚於肺之症。仍以前方取用。因未得汗。不取芍藥之酸收。大腸氣閉。更加蘇子、杷葉以宣肺。兼入竹瀝、姜汁流導經絡。以通四肢之痺。一劑症減六七。再劑全愈。按此二症。當與前某兒一案參看。

某先生年逾六旬。患瘡。尚未分清。醫以柴葛大黃治之。寒愈入裏。反至純熱無寒。口渴飲水。小水全無。時欲登桶。溺不得出。醫投四苓、芩連。神識昏迷。舌白乾刺。奄奄一息。無從措手。余曰。此症最急。全在小水不通。夫溺閉雖屬下病。然有上取之法。東垣云。渴而小便不利者。熱在上焦氣分。故脈之浮數。舌之白刺。口之渴飲。神之昏迷。非熱邪蒙閉上焦氣分乎。蓋上焦肺部主週身之氣。司治節之權。今肺熱痺。清竅已窒。濁竅自阻。非與輕清之藥何以解上焦窒塞之邪。上焦不布。降令弗行。其何以望輸瀉乎。疏以萎斛知通桂杏苑杷一派輕清之藥。果臻奇驗。

輕清味淡宣肺法

開鬱清溫湯

專治風溫犯肺。蒙閉上焦。神昏譫語。便閉溲赤。苔白乾刺。脈來模糊等證。

杏仁 桑白皮 枇杷葉 知母 通草 菓皮 山梔皮 天竺黃 燈草
治風溫邪入氣分。熱邪蒙閉上焦。神識昏迷。譫語不食。大使不通。小溲或遺。脈象模糊。舌白乾刺。唇乾色淡。致令肺氣壅極。古稱鬱冒者。卽此症也。藥下安睡。大便果通。次早復視。能述病苦。再加琥珀鎮心安神。仍以清肺藥而健。

清肺瀉火救陰抑陽法

甘霖救液湯

專治陽盛劫陰。五心潮熱。肌肉消瘦。唇舌眼鼻乾燥。眩暈膠痰。食下易飢等證。

蕤蕤 地黃 梨汁 蕉朶 蜂蜜 竹鹽

治五心潮熱。某肌體肥盛。客秋連餐炎燭。患傷風。自進橘附。但苦頭眩。坐臥片刻。少可。深慮暴脫。進參芪益劇。五心潮熱。肌肉消瘦。一日眩暈。飲龍眼湯少可。以後每服。逾年求治。面額黧黑。形如烟燻。唇齒乾燥。時食時便。完穀不化。脈雖細濶。然寸關勁指甚銳。此因飲食之火內燔。後加風寒外束。是內熱而外寒也。夫病先居於肺。當時辛涼解表便可。奈服橘附致熱邪愈固。肺失清肅。其頭眩氣升。火亦升也。且參芪龍眼復又銅閉。火無出路。只得奔走空竅。夫大腸者。肺之合也。下利奔迫。移熱可知。時欲得食。消中可知。至完穀固屬火性急速。不及變化。正嘉言所謂火焚之焦土。非膏沐之沃土。安望其生化耶。經云久病非陰。今病年餘。洞泄半載。其爲陽火甚明。旣屬陽火。其陰必傷。豈可再用參芪。因仿壯水鎮陽之法。使無上僭下竭之虞。放瀉南補北之意。而無金熱土傷之慮。爰引

一派甘寒潤濡之味。清肺瀉火。救陰抑陽。如仲景黃芩湯。(芩芍草棗)治協熱下利。雖清火迥殊。而存陰則一也。彼因膽火肆虐。移熱於脾。故用苦甘之劑。直清膽火而存陰。此因肺火肆虐。奔迫大腸。故取甘寒之味。耑清肺火而存陰。以萎蕤爲君。專清肺熱。乃水出高源。象乎天也。地黃爲臣。壯水保金。乃子母相生。象乎地也。佐以梨汁、肺
蔗漿、蜂蜜。竹瀝除腸胃激烈之燥。濟經絡津液之枯。象乎人也。無論其邪火、正火、君火、相火、陰火、陽火。得此甘霖。如飢求食。到口便消。服後便神魂返宅。安睡。二劑不飢不泄矣。至善後法。仍從肺胃立法。

清金潤燥甘淡益胃法

潤燥生津益胃湯

專治津液枯槁。二足痿蹙。形羸髮脫。脈來細數等證。

熟地

生地

天冬

麥冬

梨汁

蔗汁

石斛

薏苡

治肺熱葉焦。某年二十。當秋寒熱咳嗽。足跗浮腫。足大指潰爛。肌膚消削。已成癱瘓。諸醫以不痛爲不治。余視其形羸髮脫。脈象細數。腿股大肉已盡。腳垂縱緩廢弛。經云大筋裏短。小筋弛長。爲痿。又曰陽明虛。則宗筋失潤。不能束骨而利機關。法當耑取陽明。且秋病寒熱咳嗽。肺失清肅。誤進燥藥。津液枯焦。此燥氣焚金。當以肺熱葉焦。則生痿躉論治。蓋痿者。枯萎之象。非滋血液何以得生。惟胃爲生血之源。又爲金之母。故治痿獨取陽明也。於是以前湯日進大劑。按治十日。飲食少加。改進虎潛丸。加芪、朮、薏苡、桑枝、茅根。補助陽明。自秋至臘。按日不輟。僅得肌肉稍充。筋骨稍束。尙未能開步。次年繼進前藥百劑。至夏乃愈。

補陰清肺法

補陰清肺湯

專治燥氣犯肺。氣陰大傷。形體枯槁。毛髮脫落。二足痿躄。咳嗽膠痰等證。

萎蕤

首烏

當歸

狗脊

麥冬

丹皮

薏苡

石斛

阿膠

芝麻

或加早米、茅根

補助陽明

或減麥冬、丹皮

防損胃氣

或加竹瀝

桑枝

通經達絡

清燥救肺湯

(嘉言) 治諸氣贍鬱諸痿喘嘔。

專治痰火犯肺。口鼻眼竅乾燥。小兒涕淚全無。哭難聞聲等證。燥氣犯肺之喘嘔咳嗽亦主之。

桑葉

石膏

甘草

人參

胡麻仁

真阿膠

麥門冬

杏仁

枇杷葉

右水一碗。煎六分。頻頻二三次。滾熱服。痰多加貝母、瓜蔞。血枯加生地黃。熱甚加犀角、羚羊、或牛黃。

治燥氣犯金。某秋末患足疾。初起咳嗽筋痛。步履艱難。兩腿尤痛。並無紅腫。醫以燥濕利水益劇。更以歸脾養心微效。繼進無益。漸至腰屈不伸。夜多夢寐。深虞身廢。次年余祝憔悴枯槁。毛髮脫落。大肉盡削。驗其兩腿膝筋浮於外。抽束一團。追念此症。發自秋末。彼時肅殺氣深。水虧之體必挾燥氣而肺先受病。故初起咳嗽。當時若投清燥救肺。豈不金徹水清耶。無如誤藥。焚肺劫陰。加以芪朮壅機。雖曰補氣生血。其實助火耗津。所以身中筋骸無陰養榮。遂至抽束結聚。計惟清火爲先。而清火又慮其虛。則補陰清肺尤爲緊要。水果充足。火自平矣。且此症所恃者。尤在胃旺。使得生氣。甘藥亦可多投。疏前方。每日三劑。服至二十劑。筋舒痛除。三十劑。腰伸闊步。五十劑。肌膚充盛。面容潤澤矣。

滋陰寧神安寐法

黃連阿膠雞子黃湯（仲景）

治少陰病心中煩。不得臥等證。

黃連

黃芩

芍藥

右三味煎去滓。入阿膠烊盡。少冷入雞子黃攪勻服。

治暑邪解後。陰氣被陽熱之傷。尙未復也。夜仍微熱。咽微乾。睡不寐。仿少陰病咽乾口燥不得臥之例。三服而健。

陽症似陰熱深厥深治法

黃連解毒湯

治三焦積熱。咽喉腫閉。牙齒疼痛。口舌生瘡。心膈躁煩。小便赤澀。大便閉結。及消渴憔瘦。一切壯熱火熾之症。

普濟消毒飲（東垣）

專治大頭瘡。頭面頸項焮紅腫痛。食難下咽。及赤游丹等證。

黃芩 馬勃 甘草 牛蒡 元參 薄荷
連翹 疔蠶 升麻 柴胡 桔梗 陳皮

涼膈散

治心火上盛。中焦實熱。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡齒血。二便不通。諸風邪熱。神昏不清。癲癇狂語。胃熱發癰。小兒急驚。痘瘡黑陷等證。

連翹 甘草 薄荷 大黃 山梔 竹葉 芒硝 黃芩 蜂蜜

治陽症似陰。某得溫熱病。遷延旬日。胸腹飽脹。稍按甚痛。潮熱漸退。四肢冰冷。手足爪甲皆黑。舌苔乾燥。口不知渴。與水則嘔。大便五日未通。小便赤濁而少。咽喉腫塞。口不能言。耳聾不知所聞。六脈舉按皆無。醫者不審。熱深厥深之旨。鬱熱蓄盛。脈反滯濇之變。熱甚神昏。口不知渴之情。誤用四逆湯。附子一兩。某家就正於余。細探內外。知爲溫熱重病。陽邪亢熱已極。反兼寒化。如酷暑雨雹之象。明是在表失表。在裏失裏。釀成極重熱症。再診其脈。舉按雖無。而沈候至骨。勁指甚堅。根蒂未絕。喜其可治。因謂曰。此大熱症也。遂疏黃連解毒。合普濟消毒。重加大黃。囑其日夜兩劑。必須便通。則火不伏。而厥可回。脈可出。約二時之久。一劑已終。小水甚長。卽索水飲。人事略醒。復煎一劑。是夜連得大便。果厥回脈出。次早復視。更以涼膈散重服。清胃藥而健。

治某素善病。難嗣息。喜補畏涼。客春舉子。屬胎寒甚小。自週以來。未進涼藥。不知內經所謂久而增氣物化之常也。今秋深得挾熱下痢症。自進止瀉藥。痢愈甚。一醫謂熱用連翹。黃芩。清火。更嘔乳。於是畏涼如虎。余視症是一團火氣內焚。暴注下迫。諸逆上衝之大熱症也。非大寒不能勝病。而力爭明辨。不足以破其惑。乃佯爲發聲疏方。附桂、姜、朮、蔻、霜。合其見。但分量過重。又不敢服。乃佯曰。余有人參補丸。忙調灌之。豈知余用黃連解毒丸。反六一散。一服嘔止。神安。再服泄止。熱退。但口尚渴。與六一散令煎洋參麥冬湯。調頻服而健。

溫熱內結解散法

涼膈散

主治見三七頁涼膈散

連翹

甘草

薄荷

大黃

山梔

竹葉

芒硝

黃芩

蜂蜜

治溫熱起初惡寒發熱。後大熱不寒。飲水不輟。唇焦紅。舌燥裂。大便閉。胸前板痛。煩躁莫當。脈純躁無靜。剛勁沖

指病纔二日。卽一團邪熱內結。如火燎原。其勢已極。亦溫熱病之最速者。須防物極則反。或有痙厥之變。稍遲有
朽腸腐胃之事矣。所謂急症急攻。無庸迂緩。疏以此散大黃重用藥方煎時。掀衣發狂。怒目而視。牙關略緊。面紅
目赤。揚手擲足。乃邪火一概上沖。莫可止遏。忙進前藥灌至半勢。稍平。劑終人事略醒。自索前藥。滓煎再服。隨將
前方再進一劑。其病悉清。

養陰退陽法

涼膈散

主治見上

連翹

甘草

薄荷

大黃

山梔

竹葉

芒硝

黃芩

蜂蜜

導赤散

治心熱口糜口瘡。小便黃赤。莖中作痛。熱淋不利等證。

生地

木通

甘草稍

淡竹葉

黃連阿膠雞子湯

治少陰病心中煩。不得臥等證。

黃連

黃芩

芍藥

右三味煎去渣。入阿膠烊盡。少冷入雞子黃。攪勻服。

治風溫邪入血分。則入胞絡之內。舌胎當必黑刺。按法舉用。以積熱藉以宣散。而心胸和暢。脈漸以生。

滋陰化氣法 濉熱化氣法

滋腎丸

治腎虛蒸熱。腳膝無力。陰痿。陰汗。衝脈上衝而喘。下焦邪熱。口不渴而小便閉等證。

知母 黃柏 肉桂 蜜丸

治某郎將婚。服補養丸劑。半月反致兩足無力。陽痿不舉。醫加附子、鹿茸、頻服。漸至兩足難移。玉莖盡縮。診得腎脈獨大右尺尤甚。與此丸一劑。服一半陰已舉。藥畢步履如舊。此孤陽不生之義也。治某舟子大小便祕。腰屈不能伸。少腹脹痛。扶持求救。余視面赤鼻準微黃。額汗如珠。舌中黃。詰之曰。小便祕乎。口二日一夜並無半瀝。大便亦閉。余知鼻黃者多患淋祕。淋祕鼻黃必危。仲景云無尿額汗者死。恐難治。姑診之。尺寸沈小。幸勁指有力。雖危尚有救法。意仿無陰則陽不化之旨。欲舉東垣滋腎之法。病者忽云服車前六一散。大黃一劑。愈加脹痛難忍。此又寒涼不服。意者冷結關元乎。然脈證固非無陽。且似有火。乃寒之而反重者何耶。因思經云諸寒之而熱者取之。陰所謂求其屬也。遂訂六味地黃合滋腎作湯大劑以進。滋陰以化氣外用搗葱合鹽炒熟布包熨臍。通中以軟堅。自午至戌。內外按法不輟。俾得關通。二便頓解。

治某初起腹鼓腳浮。小水短少。大便甚艱。氣逆上衝。醫用五苓、八正。腹愈鼓。水愈短。按脈洪大。神彩尚存。足徵稟賦甚厚。方可耐此重症。此乃濕熱內蓄。恐成單腹脹膀胱氣壅不行。以致小水悉閉。今欲治此。須通小水為急。但通小水非氣化不出。因問欲湯水否。曰極口渴。乃知確由下焦濕熱所致。與東垣王某一案大同。遂以知柏之苦寒瀉其內蓄濕熱。肉桂之辛熱化其膀胱之氣。才下咽。腹中甚痛。小行遂行。脹滿亦消。後以八味地黃丸數服而痊。

治某善飲。素嗜炙食。每患淋祕。投五苓、八正、小效。漸至溺必艱澑。少腹覺滿。時平時篤。已半載矣。一日房勞。前症倍盛。仍進前法。溺愈不通。腹脹腰屈。不可俯仰。診脈兩尺堅搏。知爲素蘊濕熱。聚於下焦。膀胱之氣不化。仿東垣法。以知母三錢。黃柏三錢。肉桂一錢。服之半晌。安睡。症失厥後。一月數發。或一年數發。悉以此方必效。惟其酒色不節。調理不善。宜乎病源不清。濕熱日聚。腎陽日耗。他日腹鼓喘急之患。殆所不免矣。越歲果患是疾而卒。

滋腎通關平逆法

滋腎丸

主治見上條

知母 肉桂 黃柏 蜜丸

金匱麥冬湯

治大逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。此主之。

麥冬 半夏 人參 大棗 甘草 糯米

金匱腎氣湯(卽八味加牛膝車前子)

治虛羸少氣。命門火衰。喜煖畏寒。腰腎痠痛。腿足無力。咳嗽痰喘。陽虛水冷。四肢腫脹。及婦女飲食如故。煩熱不得臥。此名轉胞。不得溺。以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。此方主之。

某得衝氣病。每發氣上衝。咽喉窒塞。一身振戰不已。聳肩目突。不能出聲。家人以爲脫症。一日數發。諸醫亦稱氣脫。日進理中黑錫。綿數月。服黑錫効許。病愈進。余診脈右尺數盛。人迎亦大。因思經有諸逆衝上。皆屬於火之例。遂製滋腎丸。煎腎氣。麥門冬湯吞服。旬日始見微功。一月乃奏全效。未嘗更變藥味也。

表裏風熱汗下防護法

防風通聖散(河間)

此方發越表裏三焦。故治一切風寒暑濕。飢飽勞役。內外諸邪。有傷氣血。寒熱交爭。頭目疼痛。項強腰痠。並治初感風寒鼻流清涕。咳嗽無汗等證。

麻黃

荆芥

防風

石膏

芒硝

大黃

當歸

芍藥

川芎

白朮

大棗

生姜

黃芩

山梔

連翹

薄荷

甘草

滑石

桔梗

此方發表攻裏之外。更寓一補字於其中。故此下元素虛。患上中下表裏俱實者最宜。

治某婦下元素虛。今秋四肢十指腫痛。手足不能運動。有時右邊腫甚。卽右邊痛加似惡寒。或微熱。舌胎灰白。二便略通。面色枯黑。口不作渴。有以血虛風濕痰飲諸治。無一效。臥牀貼席。轉側維艱。脈得弦緊而數。時勁於指。認定爲表裏風熱之症。與此散。每日連進二劑。一劑而大便通。腫消肢軟。二劑連泄黑糞二次。遍體得汗。痛止身輕。次早下榻。自云服藥後。懵懂一日。至晚汗出始清。今晨周身輕快。惟步履尚艱。舌胎變黃。頗思飲茶。再進一劑。復泄二次。下午求泄止。原方除硝。黃加葛根服之。泄止渴住。安睡進食。其病如失。病者急求補養。令買白皮梨。每日啜四五枚。十日外。更取熟旱米煮稀粥調養。兩旬愈。按此症必先有飲食之熱。後受外入之風。因其體虛。不先傷衛。所以不病。身熱拘急。而直入於營。發爲筋攣。腫痛。與身中向有之熱。凝聚經絡。夫風無定所。走注疼痛。或左右不拘。流注關節。風入既久。鬱而成熱。末經解散。久之必入於胃。夫陽明胃者。主束骨而利機關。陽明既病。機關不利。手足豈能運動。惡寒發熱者。表邪之徵也。舌胎灰白者。伏熱之驗也。合推此症。是上中下三焦。表裏俱實。有非輕劑所能療者。又風邪散漫。非僅苦寒可以直劫。兼之下元素虛。卽用重劑。又恐放逸。更當以固護駕馭其間。由

是觀之。發表攻裏之外。尤當寓一補字於中。返思古人表裏門中成方。惟防風通聖散。最相符合。方中麻黃、荆防等。能逐在表之風熱。從皮毛而出。石膏、硝黃等。能驅在裏之風熱。從二便而出。風熱深入於營。有歸芎、引表藥而入於營。風熱淫聚於中。有羌芍引裏藥而入於中。而芎歸、羌芍又賴以扶持正氣。使上中下表裏之邪。悉從上中下表裏而出。雖經絡空隙之所。盡皆驅逐不致久羈遷延。兼之汗不傷表。下不傷裏。非比世俗補瀉雜投之治。余是以知效可計。日而獲耳。其自云藥後懵懂者。冒悶之謂。乃身中作汗使然。譬天欲雨必地氣蒸上爲雲。雲升於天。雨施於地。而天地清矣。至泄多而方仍不變。全不慮其虛者。此時補劑難投。只於原方除硝黃。以防身中在表之氣。因鹹寒而墜下。而加葛根升提。使身中清氣上升。自然泄止渴住矣。以後不再製方者。以病雖重。而表裏未傷。只身中風熱既久。津液必然受灼。故但以梨汁、粥飲灌溉之。飲食消息之。此余始終而紊亂如此。

某子二歲。潮熱不退。胸緊氣促。投柴前陳半枳桔芩連無效。手足抽掣。角弓反張。煩擾啼哭。夜間尤甚。余視體色白唇焦齒燥舌胎灰白。粘涎滿布舌尖略有紅刺。胸緊氣促。七竅乾燥。小水短赤。大便通而不燥。潮熱異常。四肢指尖微冷。細詳此症。乃風、熱、痰三字合爲病也。覽前醫用藥。頗是何故。更加抽掣反張。蓋醫只執迷清火化痰之方。而不知有下療瀉熱之法。柴胡發散於驅風無益。陳半枳桔。雖稱化痰。施於風熱之症。豈非愈燥痰涎乎。芩連只能清火。卻無瀉熱磨利之功。延久風無出路。痰愈膠粘。而熱愈盛。小兒筋骨柔脆。身中風熱既久。津液必然受灼。機關愈阻。經絡如焚。安得不爲抽掣反張耶。考古惟通聖散。正爲分清表裏。兼能驅風瀉熱。使風仍從外解。熱從下出。其痰不治。自除。其風不散。自止。遂開水調灌。大解一次。其哭稍定。反張略止。隨進通聖散。方除麻黃、白朮。加麥仁、桔梗二劑。下膠痰數塊。粘結腥臭異常。乃身中津液痰涎愈蒸愈結之物也。病隨藥愈。衆稱神治。此症小兒頗多。皆由在表失表。在裏失裏。延繚多日。遂成此候。醫家病家多執牛黃蘇合抱龍等丸。外用燈火亂燒。概不知用此也。

解肌清熱表裏驅邪法

葛根黃芩黃連湯（仲景）

治桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促。喘而汗出等證。

葛根 黃連

黃芩 甘草

或加生姜大棗

小柴胡湯

治少陽中風。往來寒熱。胸脇苦滿。心煩喜嘔。腹痛心悸。頭汗出。舌上胎白。及婦人熱入血室等證。

人參 柴胡 黃芩 半夏 甘草 生姜 大棗

某子週歲。發熱嘔吐。泄瀉逆迫。煩躁不能少睡。大渴飲水不休。醫誤脾胃不足之嘔。虛陽外發之熱。津液下陷之渴。與七味白朮散。兩口上吊。角弓反張。肢體痙強。牙緊氣促。唇口齒舌乾燥而不可解。余知此症乃疫邪傳胃。未經清解。以致挾熱下利。直以葛芩黃連湯一服。病氣大退。再以小柴胡去半夏加花粉二劑而安。蓋小兒病詳外略內。所以頭疼身痛。胸中膨滿。小便赤濁。大便熱瀉。人所不知。而醫者徒執白朮散爲渴瀉聖藥一語。致令疫邪愈熾。燒熱偏強。小兒筋骨柔脆。極爲難耐。欲其不筋脈牽引。變爲瘻症。其可得乎。余因解肌清熱。將表裏兩症。外內合邪。一同併解。此案不僅協熱下利之繩墨。尤爲幼科疫疾之鼓鐘矣。

表裏雙解法

雙解湯

治傷寒失表。寒鬱成熱。熱極變寒。潮熱結胸。譫語神昏。眼反牙緊。大渴大汗。脈來或洪實或細濶等證。

柴胡 薄荷 菖蒲 大黃 枳實 甘草

治傷寒失表。遂入於裏。寒鬱成熱。熱極變寒。其病潮熱大作。胸前板結。譫語耳聾。數日未食。猶不服藥。遂神識昏迷。眼翻牙緊。脈得細濶。十指微冷。面色黃白。不飲湯水。潮熱時有時無。象似虛極。古人謂大實有羸狀。卽此類也。又河間云。鬱熱蓄盛。神昏厥逆。脈反滯濶。有微細欲絕之象。使投以溫藥則不可救矣。如法兩劑。連泄三次。潮熱大作。口反大渴。此陽症如陰。裏舒熱出。三焦經絡之熱。法當清之。以竹葉石膏湯四劑而安。

表裏交攻法

大柴胡湯（仲景）

治傷寒十餘日。柴胡證仍在裏。而心下急。心中痞悶而痺。熱結在裏。往來寒熱等證。

柴胡 半夏 黃芩 茵陳 枳實 大黃 生姜 大棗

仲景治傷寒發熱。汗出不解。陽邪入裏。熱結在裏。表邪未除。裏邪又結之症。

治病後房室不謹。食物不謹。瘡來寒少熱多。自汗口渴。自服理中丸。次日瘧重。延醫誤稱熱症。與石膏知母等。熱勢雖輕。卻無退刻。乃熱邪內陷。非熱邪外解。果然裏急後重。下痢紅白相兼。煩渴譫語。其勢轉重。人事昏惑。按脈弦數勁。指重按有力。上則嘔逆胸滿。下則後重逼迫。中則腹痛拒按。且身雖發熱。尙有頭痛畏寒。此熱邪內陷。氣血拂鬱。充斥三焦。故有詰語妄見。是表裏內外交困。棘手重症矣。反復思議。與大柴胡湯症相符。照服寒熱紅白頓除。譫語亦息。仍與前湯除枳實再進而安。後與甘寒而健。又治某實熱挾風。寒痰火上攻。卒然頭痛。誤服附桂理中等。以至日晡尤甚。診得寸口洪大。令服大柴胡倍加大

黃兼進滾痰丸加茶葉二劑而愈。

和解表裏宣通胃陽法

四逆散

治少陽傳經熱邪。四逆。或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄痢下重等證。

柴胡 枳實 白芍 甘草

解肌清熱湯

治溫邪上受。壯熱不解。口渴畏熱。肌膚痞瘡。脈數。便赤等證。

防風 乾葛 連翹 赤芍 燈芯 瓢土

某孫因乳母冒暑哺乳。暑邪入胃。一時吐瀉交作。醫以夾食傷寒治之。投正氣散。辛溫發表。以致大熱燥渴。更擣以白虎大寒重墜。以致熱邪入裏。四肢厥逆。又醫與附子理中。冷過肢肘。不食不嘔。不哭不便。羣醫束手。余視四肢雖厥。而肌膚尚隱隱微紅。唇齒乾燥。滿頭猶熱。且眼眵乾燥。溺亦極臭。知爲暑邪入裏。與傳經熱症相同。所謂熱深厥深。熱微厥微之症也。意擬解肌清熱使邪氣分清。但四肢厥逆已久。胃陽抑遏已極。不能敷達於四末。先當和解表裏。宜陽胃陽。然後解肌清熱。方爲合法。即煎四逆散。以柴胡發少陽生氣。枳實疏陽明抑遏。芍藥斂陰和血。甘草和中補土。更煎米飲和服。取其助胃生津。服下果四肢溫和。神氣清爽。大便亦通。立時吮乳食粥。復與防葛翹芍燈心灶土果遍身紅赤搔痒之甚。再劑而安。

和解升降法 和解表裏寒熱法

小柴胡湯

治少陽中風。往來寒熱。胸脇苦滿。心煩喜嘔。腹痛心悸。頭汗出。舌上胎白。及婦人熱入血室等證。

柴胡 黃芩 人參 大棗 甘草 半夏 生姜

陰陽錯雜寒熱調治法

黃連湯(仲景)

治太陽少陽并病。胸中有寒。胃中有邪氣。腹中痛欲嘔者。腹脹痛下利亦主之。

連理湯

黃連 乾姜 人參 桂枝 半夏 甘草 大棗

治胸痞嘔吐。或泄利脹痛。或吞酸納呆等證。

人參 白朮 乾姜 甘草 川連

某腹脹脹痛。或嘔或利。醫誤與消食行滯。遂腹脹起塊有形。攻觸作痛。痛緩則泯然無跡。自冬迄春。食減肌削。骨立如柴。唇紅溺赤。時寒時熱。診脈兩手弦數。似屬木邪侮土之證。究歸陰陽錯雜之邪。正內經所謂胃中寒。腸中熱。故脹而且瀉。處仲景黃連湯。加金鈴、吳萸、白朮、川椒數劑而安。隨進連理湯。乃健。

苦瀉辛通法

生姜心瀉湯(仲景)

治胃中不和。心下痞鞕。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴。下利等證。

半夏 黃芩 乾姜 人參 甘草 大棗 生姜

甘草瀉心湯(上方除卻人參加甘草即得)

治傷寒中風。醫反下之。其人下利日數行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩不得安等證。

治誤下嘔泄。始病發熱惡寒。進表散藥。汗出不解。更醫用柴葛解肌法。反增氣逆。乾嘔。胸前板結。一醫進大柴胡一劑。遂腹中雷鳴。利下不止。止仲景云。胸中實下利不止者死。但此症雖險。猶可以法治之。服之果嘔。熱頓止。惟渴泄未止。更與甘草瀉心湯。渴泄亦止。歸語門人。此症頭緒錯雜。無非汗下傷胃。胃中不和。客氣上逆。伏飲搏結聚膈。夫胸前板結。卽心下痞鞕也。胃虛火盛。中焦鼓激。以致腹中雷鳴。蓋火走空竅。是以上嘔下泄也。生姜性溫。善助胃陽。甘草味甘。最益胃陰。因仿長沙之訣。汗後胃虛。是陽氣外傷。故用生姜之溫以助陽。下後胃虛。是陰氣內傷。故用甘草之甘以補陰。藥僅一味。意則有二。先後兩劑。欲起一生於九死者。敢操無師之智哉。門人問曰。甘草補陰止利之義。先賢開導來學。但此症胸前板實。生姜散滿固其宜也。甘草未免資滿。答曰。甘草味甘。補土。土健而滿自除也。况施火性急迫。陰氣不守之症耶。且甘草之功用甚長。惟仲聖方知舉用。試觀發表藥中。如桂枝、麻黃。大小青龍。必用甘草者。欲以載邪外達。不使陷入陰分也。若邪入裏。必無復用甘草之理。如五苓、承氣、陷胸。十聚諸方。俱不用也。至桃核調胃兩方。以其邪兼太陽。尙屬用之。若陰血大傷。竟重用甘草以復脈。可見前賢取舍自有法度。而後之葉天士、黃宮繡等。每畏甘草。致令良藥見屈。是不知取舍之妙。不察資溝泄滿之意也。又問曰。土健而滿自除。則凡滿症俱不必忌乎。曰非也。陰虛內盛之滿。法所必忌。陰氣下亡之滿。法所必施。如發表藥中之甘草。必不可少。攻裏藥中之甘草。有斷不可用者。

半夏瀉心湯

治嘔而腸鳴心下痞者。

黃連

黃芩

人參

甘草

乾姜

半夏

大棗

卽生姜瀉心湯。除却生姜，卽此方也。此湯治傷寒下之早。胸滿而不痛者爲痞。身寒而嘔，飲食不下。非柴胡症。凡用瀉心者皆屬誤下之症。非傳經熱邪也。

治某形瘦面白。當暑熱得嘔吐泄瀉病。醫見口渴溺赤。與竹葉石膏而泄嘔未止。反加心胸脹滿。神氣昏憊。躁擾不安甚危。診脈浮散。肌熱灼指。舌邊紅刺。滿舌白胎。中心黃黑。此症係胃寒陽熱。故脹而且瀉。然胃中之寒。其前原是盛暑逼於外陰。冷伏其中。而醫又以寒藥清胃。則胃愈寒。故雖寒熱錯雜。不得不先與連理。調其胃氣。分其陰陽也。然陽邪內陷。已成痞結。非苦以瀉之。辛以通之。又何以解寒熱錯雜之邪。故繼進半夏瀉心。果得嘔泄頓止。熱退納食而安。

通經降火法

附子瀉心湯（仲景）

治心下痞而復惡寒汗出等證。

大黃

黃連

黃芩

附子

治誤治初病。畏寒發熱。腹痛而嘔。不投五苓對症之藥。而以柴胡引入少陽。當歸引入厥陰。至熱甚。又誤以藿香。香燥劫胆津液。以助其火。致神昏語微。身熱如火。而衣被不離。四肢時冷如瘡。痛泄晝夜不寐。且久病體虛。欲服歸脾理中之劑。豈相宜耶。夫寒邪鬱而成熱。煩倒錯誤。已成壞症。理宜急通經絡。而兼以直降其鬱火。庶幾寒去。

而熱除。熱除而人事清。人事清而寤寐安矣。此湯以附子通經。芩、連降火。一劑便泄止小便赤。再劑症除。惟不寐加入溫胆湯四劑而愈。

變通小柴胡法

丹田有熱。胸中有寒治法。

柴胡變通湯

治頭痛如蒸。口苦嘔吐。腹痛心振。筋急撮指。脈來弦數等證。

桂枝 白芍 柴胡 半夏 黃連 乾姜

治肝風撮指。某起初嘔吐。繼而呵欠甚長。腹中絞痛異常。身搖心振。十指緊撮。自謂爪掐肉痛。頭汗氣蒸如雨。醒

而復發。醫用驅風化痰之藥罔效。診脈沈伏中忽顯弦數。弦數中忽又沈伏。以爲木強土弱。肝風病耳。試觀瘡發。始必呵欠。今嘔吐呵欠腹痛。顯係土衰木旺乘之。所以胃中不能容穀。肝陰被火所劫。是以筋急而牽引撮指。但肝爲剛臟。一切逐風辛散之藥。反能助火劫陰。豈非愈加其病。况風熱雖一。而木屬有二。若病在少陽甲木之風熱。固當仿小柴胡之製。今病在厥陰乙木之風熱。又當變通小柴胡之製。彷彿嘉言所謂丹田有熱。胸中有寒之例。服之二劑而愈。

木邪乘土下寒上熱法

和解上下寒熱法

進退黃連湯

(嘉言)

治太陽少陽并病。腹部畏寒。胸部畏熱。嘔吐泄利。腹痛脈弦等症。

黃連 乾姜 人參 桂枝 半夏 大棗

加吳萸、川棟、木瓜、烏梅、川椒、

治某妻小腹絞痛。裏急泄瀉。每欲小便。腹筋牽引陰部。諸醫見泄止泄。投盡理脾、濤劑。月餘不瘳。甚危。繼復嘔吐。湯水不入。胸以上發熱。腹以下畏寒。余診曰。若果內寒外熱。安得月餘痛泄之病。尚有弦數之脈。此必木邪乘土。下寒上熱。當推關格之例治之。仿進退黃連加吳萸、木瓜、川棟、蜀椒、烏梅。月餘重病三服而安。

平肝逐火法

左金丸

主治肝火鬱結。脇肋攻痛。吞吐酸沫。痞結泄瀉。疝氣淋閉。兼治噤口痢疾。不受湯藥等證。

黃連 六兩

吳萸 一兩

水丸

某郎患嘔氣上冲。似呃逆之象。醫進藿香、二陳。嘔逆更加。又用柿蒂、香砂、丁、蔻。遂至嘔逆不休。余曰。吾一劑可愈。以左金加大黃、柴胡、丹皮。藥下果平。次除大黃。重加石斛而安。此諸逆衝上。皆屬於火。所謂欲求南風。須開北牖也。

某少年嗜酒過度。致經隧凝痰。近來噴怒頻生。木火熾盛。今春肝陽暴升。肘膝痛楚重墜。寐難成睡。面白而光。舌黃而裂。鼻煤眼淚。腹痛便祕。舊痔復作。惡寒鼓慄。玉莖痿縮。脈得關弦尺數。洪而有力。固非陽絕。亦非陰虛。細按諸症叢雜。在乎肝陽拂逆。木盛生火。生風。內經病形篇曰。諸禁鼓慄。皆屬於火。所以左金丸爲君。加入山梔、蒼朮、白芍、瓜萎。連進十劑。接服搜風順氣丸。痊。

某子因食桃李過多。腹痛口渴。四肢厥逆。泄瀉半日。飲水即吐。以後大便不通。人事雖困。然吐聲甚洪。痛聲甚厲。舌雖不燥。而唇極焦。一醫不明先泄後閉之義。更不細審內伏之情。且不知沈滯之脈。妄謂無脈。迫以附子理中

急投。余見而止之。與左金合四逆散。加元明粉五錢。下穢物甚多而痊。蓋桃李生硬難化之物。最能助肝犯土。阻格中焦。以致胃氣抑遏。故腹痛而厥。乃陽不能舒佈之象。起初腹痛下利。不過熱結旁流之泄。究竟燥結未下。故雖利而痛不減。後因水入即吐。腸中槁而無下利矣。古云食不得入。是有火也。且因吐瀉甚頻。舌雖不燥。而唇已焦。勢雖篤而聲甚厲。奈何其不加察也。

四逆散方

治少陽傳經熱邪四逆。或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄痢下重等證。

柴胡 白芍 枳實 甘草

重鎮瀉肝法

生鐵洛飲(以清水浸一伏研澄飲水)

能墜熱開結。鎮驚。并可以下氣疾除狂怒。

生鐵洛未經煅煉。是爐冶間初槌生鐵。飛出如蛾者。蓋鐵之生者。氣寒味辛。其性直行內降。下氣疾速。用其槌出之花。庶得外走經絡。開結於木火之中。則狂怒自己。甲乙經云。飲以鐵洛。作為後飯。病能本論。又云。奪其食。則已是穀氣。又在禁例。或者以麥食為後飯。并可鎮肝存之。以俟君子。

當歸龍薈丸

治肝膽火升。神志不安。驚悸搐搦。躁擾狂越。眩暈耳鳴。胸膈痞塞。咽喉不利。腸胃燥澀。大小便閉。而脇引痛。肺燥欬嗽。亦治盜汗。

黃芩 山梔 黃連 黃柏 當歸 龍膽草 蘆薈 青黛 大黃 木香 蘿香

某內小產後。越月忽渾身戰慄。卒倒無知。目瞪手散。半晌略醒。旋發強言。或笑罵歌哭。一日兩發。驅風養血藥服之無效。余視其產後久病。猶氣旺神充。知必素多肝火。前之小產。必因多進補劑。以致血得熱則沸騰而下。產後人身中之火未息。衝任之血未安。胞宮之穢未盡。則污瘀之血勢必從火勢而冲心胞。以致神魂狂亂。稍頃火降而人事清。移時火升而神機似亂矣。故病發時渾身戰慄者。正內經所謂諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。病經兩旬。若謂血虛風動。安得久病而神不衰耶。用鐵洛合當歸龍鬚丸加漆渣、桃仁、花乳石下污血一升。而神清病愈。

收魂鎮肝法

斂神鎮肝湯

治眩暈胎癇。心悸難寐。風痰燥欬等證。

首烏

胡麻

茯神

酸棗仁

菊花

小麥

法半夏

鉤藤

麥冬
金銀花湯代水煎藥。
方中具有收魂、養神、鎮驚、消痰、補虛、潤燥、種種妙用。

治某媳肝風胎癇。春暮忽然仆地。眼翻口噤。兩手握固。半晌方醒。已而復發。脈沈實而滑。唇紅面赤。飲食微囁。以四物加荳。夏與之。仍然發閉。口中嘵語。曰我要銀子還。不然我要索爾命。衆議此必邪祟所侵。視爲胎癇小恙。此肝家枯燥。此刻胎中正肝經主事。肝藏魂。血燥神魂不安。所以目中見鬼。口中亂語。又肝屬木。木喜搖。所以兩手循摸如撮空耳。疏方與服。數日未發。旋停藥復發如前。服至足月後。獲弄璋母子俱安。

養肝潤燥法

潤燥養肝湯

治眩暈顫赤。肢麻厥冷。上氣痰鳴。睡中驚悸。脈來弦數等證。貧血而兼神經興奮之症亦主之。

當歸 薄荷 白芍 聚仁 丹參 黑蔴 丹皮 洋參 桑葉

麥冬 川貝 天冬 柴胡 甘草 金銀花煎湯代水

治某妻肝風眩暈。據述今春分娩。得子甚小。不育。今秋燥患咳。及大雪。正腎陰當權。得咳嗽。氣促。畏寒之恙。每臨夜兩顫火赤。亦不介意。一日五鼓時。忽眩暈肢麻。倏時冰冷。胸緊氣促。喉內痰鳴。逾時方醒。醒而復發。見其形體清瘦。脈來弦數。勁指。問知數日不寐。二則口中亂語。且睡中每多驚怖墜地。唇舌二便如常。因謂肝旺血燥。無以蔭胞。所以胎小而多風。卽今病亦屬肝風之症。夫人身心高腎下。水火固不相射。然須相濟。經曰君火之下。陰精乘之。今元陰澆薄。何供所乘。故火愈炎。木愈燥。風愈張。風火相煽。心主撩亂。而人事眩暈矣。治法發散攻下。溫補喜條達。風宜靜鎮。火宜滋潤。遂其生發之性。不令抑鬱枯槁。使守其常而不變。進數劑愈。越旬日。諸病悉除。進善後法。參用補水之劑。以歸地參、麥杞、芍、茯神、玉竹、阿膠九味滋潤之。不使枯槁作燃。

養肝息風法

附畜魚置介法

息風養肝湯

治陰虛貧血。虛火上炎。頭痛頭暈。乾欬口乾等證。

製首烏 黑芝麻 金釵 鈎藤 荷葉

治偏頭風痛。自汗不止。腦中覺有冷涕一陳。自鼻而出。脉左浮大。此風居空竅。擾亂不息。頭汗不止。是爲內風虛

桑葉

風可知。乃仿金匱侯氏黑散內。取桂枝、龍骨、牡蠣、菊花、驅風填竅。更取葉氏養肝息風法。如首、芝、釵、鉤、桑、荷之屬。數劑諸病如失。

復脈濟陰養肝湯

治肝腎均虧。虛火上炎。頭痛目眩。乾歎口乾。五心潮熱。夜有夢遺。凡一切陰虛火盛。下虛上實各證並驗。

首烏 阿膠 白芍 胡麻 麥冬 龜板 牡蠣 桑葉 菊花
治某肝腎陰虛。頭左大痛。服疏風清火藥愈甚。觀其脈盛筋強。縱欲必多。以致水因下竭。而火愈上熾。仿仲景濟陰復脈例。參嘉言畜魚置介法。與前等藥。其痛立止。惟其房勞不節。愈而復發。凡陰虛頭痛症準此。

肝熱疏散法

逍遙散(局方)

治血虛肝燥。頭痛目眩。頰赤口苦。倦怠煩渴。抑鬱不樂。兩脇作痛。寒熱往來。口便便濇。小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。

柴胡 白朮 當歸 白朮 茯苓 甘草

薄荷 煙姜 或加丹皮山梔

治夫病愈後。某妻忽微覺寒熱。少腹疼痛。小水緊急。欲解不出。痛甚牽引腰胯。兩目花亂。頭重莫舉。少腹痛引腰跨。小便不利。頭重。眼中生花。豈非陰陽易之症乎。處此散。調燒棍散。藥下果驗。治某體豐多勞。喜食辛酸爽口之物。醫者不知過食酸味。肝氣以津。脾氣乃絕。以致形肉消奪。輒用參朮培土。不思土不能生。徒壅肝熱。故復陽痿不起。顛倒三載。百治未效。經云筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋瘻。余診左數右濇。

知爲肝氣太過。脾陰不及。直以加味道遙散。令服百劑。陽事頓起。更服六味地黃丸。十餘劑。形體復舊。治某婦多氣多怒。喪子悒鬱。半月前患氣閉昏倒。服烏附散。越鞠丸愈。忽又胸緊頭昏。復倒無知。目瞪口張。脈象又伏。知非死候。因謂曰。前番目閉口噤。脈伏。今脈同症異。當從原意變通。言未已。開聲知人。并云頭暉目眩。重如石墜。面如火燎。轉瞬間狂言見鬼。歌笑呻哭。衆皆詫異。竊思中氣之後。因思復結。仆倒無知。固其宜也。然面赤神昏。妄見妄言。必因鬱久化火。挾肝邪爲患。應用清肝瀉火之劑。又胸緊氣急。頭重如墜。必緣鬱氣固結。經道久閉。故脈沈伏。與內經血并於上。氣并於下。心煩惋善怒之旨合符。遂疏以逍遙散加丹參。牛膝。玄胡。降香。兼進。當歸。龍蒼丸。服下神清。諸症漸減。再服病除。越日復視。脈轉沈數。沈無固結之患。數有流動之機。再詢經期果閉四月有餘。仍仿原意再投。後更方未費思索。直以解結通經而愈。

某內產後匝月。四肢僵痺。呼號思神。以爲邪祟。禱之不靈。余診脈得右大左伏。面青唇白。舌胎邊白中黑。兼之久未更衣。小便短少。按此症舌心帶黑。便閉溺短。當推實熱例治。然無口渴痞滿之患。舌黑而滑。四肢僵冷。當推虛寒例治。而脈候又非微細遲弱。復於色竅細審。面青目暗。似屬肝邪爲患。居多且左。脈隱伏。應有綑繆鬱結之情。原肝爲剛臟。體陰而用陽。魂被火迫外游。故探病客來。未至先知。况肝主筋。熱盛筋急。故目暗上視。四肢僵痺也。又肝主疏泄。臟病聯屬。故便閉不通也。此則肝氣憤鬱。足爲明徵。且病家述右乳腫痛。已經數日。原乳房屬陽明。乳旁屬厥陰。經曰營氣不從。逆於肉裏。乃生癰腫。故見症在陽明厥陰之部分。又肝之爲病。足爲明徵。直疏以逍遙散合龍蒼丸。進退酌用。是夜連進二劑。譖語肢痺俱止。惟於天曉時。前症猶萌。旋爾又止。是得前方疊進之力。設認症不確。小劑暫試。勢必病重藥輕。前症復萌。定歸咎於藥之不當。又作更方之想。則失之遠矣。其前症欲萌於天明時者。乃肝木旺於寅卯故也。後又將原方加疏肝導氣一劑。諸病潛消。視其乳房果紅腫逆迫。欲作膿潰之勢。繼將原方加蒲公英、香附、白芷。託裏排膿。果得出膿一碗。腫痛悉瘥。祇經數日。尙未更衣。渠母促用通劑。余

以下不嫌遲。用五仁以代通幽。連進數日。大便漸通。末症亦漸以除。未費調補而安。此症倘信前醫參、甘、歸、杞、守補之方。勢必肝氣愈結。四肢漸變厥逆。指甲皆青。神識愈形昏憤。舌卷乳縮有之。而參附姜桂。又安能禁之不用。值此錯亂紛更。則余亦無所適從矣。

瀉肝平火法

龍膽瀉肝湯(局方)

治脇痛口苦。耳聾耳腫。筋痿陰濕。熱癢白濁溲血等證。

當歸

生地

柴胡

澤瀉

黃芩

黃耆

山梔

龍膽草

木通

車前

甘草

當歸龍薑丸

治肝膽火升。神志不安。驚悸搖搦。躁擾狂越。眩暈耳鳴。胸膈痞塞。咽嗌不利。腸胃燥澀。大小便閉。而脇引痛。肺燥欬嗽。亦治盜汗。

黃連

黃柏

黃芩

山梔

大黃

當歸

青黛

龍膽草

蘆薈

麝香

木香

蜜丸

犀角地黃湯

治傷寒及溫病。應發汗而不汗之內蓄血者及鼻衄。吐血不盡。內餘瘀血。大便黑面黃等證。

犀角

地黃

白芍

丹皮

或加黃連黃芩

治某內人。形長肌瘦。平時喜進溫補。春暮乳房脇肋漸次作脹。初尚不以爲意。一日忽牙關緊閉。不知人事。手撒遺溺。張口精搖。諸醫咸稱手撒脾絕。遺溺腎絕。進補固脫。漸至筋斂抽掣。余診各部應指。急數有力。唇齒乾燥。大

便不通。乃知雖屬類中。實爲肝火厥逆之候。若果脫症。頃刻告變。安得苟延。且脈俱有力。只緣素稟木形。兼挾內火。當此木旺時令。肝氣燥急。故乳脇作脹。夫肝主筋。筋脈不繫。故四體不用。木火生風。故目精動搖。筋脈不和。頰車不開。故牙關緊閉。肝威沸騰。津液妄泄。故汗大如雨。汗邪熱熾。陰挺失職。故小溲自遺。津液被劫。故筋歛抽掣。總之皆肝火爲患。處龍膽湯合龍薺湯。連進二劑。病熱大減。後進犀角湯兼龍薺丸。進食能言。隨用八珍湯除川芎。重加白芍、丹皮、調理而健。

某婦居十載。年近三十。今春四肢腫痛。手掌足跗尤甚。稍觸痛極。倚仰轉側均難。日夜豎坐兩旬。身無寒熱。二便略通。面色不瘁。醫服養血驅風。至背附亦不見燥。惟腫痛漸加。余診兩尺弦數。兩頰赤色。且肢體關節近乎僵硬。而痛楚徹骨。手不可摸。此必熱傷營血。血液涸而不流。正丹溪所稱敗血入經之症。名爲痛風是也。緣寡居多鬱鬱。則少火變壯火。壯火食氣。鬱火焚血。惡血結而不行。失其周流灌溉之常。故關節腫痛。處龍膽瀉肝湯。加桃仁、澤蘭清火逐瘀。更入竹瀝姜汁。通經入絡。外以澤蘭搗敷腫處。內服外敷。按治十日。腫痛乃除。然尚關節不利。步履維艱。日與清肺之藥。緣秋令將至。恐燥氣焚金。痿軟無力。且肺主週身之氣。必得肺氣清肅。則關節清利矣。又肝強勁急。藉金以制之也。半月始痊。

某患左肩胛痛。入腋至脇。有一筋牽引作痛。晝夜叫喊。凡攻風逐痰不效。余視病雖痛悶。口不能言。然尚不停。且弦大洪數之至明。是肝火爲病。丹溪云。肝爲小腸經。胸脇膽經也。此必思慮傷心臟。未病而腑先病。故痛起自肩胛。是小腸經已先病也。及慮不能決。又歸之於膽。故牽引胸脇作痛。是膽經又病也。乃小腸火乘膽木。子來乘母。謂之實邪。與以人參木通湯。吞當歸龍薺丸。應手而愈。

某起初寒熱交作。次日右膀腿縫腫脹。狀如腰子。痛悶難忍。自疑癰毒。服瘍醫敗毒方。微痛非常。邀視余曉以橫痃之疾。乃酒醉入房。忍精不泄之因。以致精血凝結。挾肝經鬱火而成。決非毒也。授以龍膽瀉肝湯。加山甲、桃仁、

肉桂連服數劑。乃消此症。若奄縕日久。用藥外敷。不爲解散內結。必成魚口便毒矣。

某女十歲。六月發熱口渴。小便淋祕。溺則號痛不已。醫用利水藥。渴熱不減。陰戶腫脹。又敷三黃散。馬齒莧。潰爛不堪。臭穢之極。瘍醫解毒益劇。腿膀結核。畏解不解。少腹脹滿。內外兩治不效。余視內外色脈。悉是火象。獨唇舌不燥可疑。因思陰器屬肝。此必濕熱下陷。聚於肝經血分。故唇舌不顯燥象。若濕熱在於氣分。則唇舌必燥也。故清利無效。但十齡稚女。衝任未通。亦無熱入血室之症。因詢食桃子頗多。蓋未熟之桃。最能助肝燥血。熱結肝經。故耳。處龍膽瀉肝兼龍蒼丸。大使下血一甌。小便乃利。陰潰自愈。

平肝清火寬中下行法

四奇湯

治內蘊積熱。心腹疼痛。食下更痛。大便閉結。神昏懶言等證。

黃芩

黃連

白芍

檳榔

厚朴

油歸

澤瀉

某姪初起心腹間微痛。越二日。痛苦異常。汗大如雨。水米不入口。不作渴。小水清利。神昏懶言。坐難片刻。儼然虛象。自云素屬中寒。難以涼劑。診得六脈時伏。內外兩探。虛實難決。因思痛症脈多停指。况陽明痛極必汗。若三陰必面青背屈。何得汗大如雨。勢必內有積熱。所以飲食加痛。病方入裏。所以口不作渴。痛難支持。所以神昏懶言。乍觀雖惑。細究無疑。於是君以芩連芍平肝清火。臣以檳朴下氣寬中。佐以油歸潤腸。使以澤瀉下行。三劑通利而全愈。蓋此症極多。治不一法。尙大便旬日未解。如壯實者。宜承氣湯攻之。正所謂痛隨利減。通則不痛之意也。

清肝瀉飲法

半龍湯

治肝火上升。夾飲爲患。口苦咳嗽。嘔涎胸悶。經來紫黑等證。

半夏

茯苓

枳實

姜汁

當歸

赤芍

黃芩

黃連

膽草

蔞仁

按此乃小半夏湯合當歸龍蒼丸之意。以夏苓枳姜去飲劫涎。以歸芍芩連膽草入血分而清火。加蔞仁以潤下。庶金安木平而愈。

某內未診問方。據述咳嗆。口苦。咽喉如有物阻。時嘔清涎。臥難安枕。兼以經候愆期。紫黑成塊。余斷以肝火痰飲。經曰諸逆衝上。皆屬於火。以此觀之。雖經停三月。難斷有孕。前醫所服杏芥枳桔法非不善。而徒用開金化痰。卻無清火伐木之能。茲以病因大熾。兼以經義酌方。大抵此症根源多由情懷梗鬱。必須怡情開懷。庶可速愈。

平肝開鬱理痰法

溫膽湯

治大病後。虛煩不得眠。

陳皮

半夏

茯苓

甘草

竹茹

枳實

或加姜棗

左金丸

治誤以香燥之藥劫膽津液。以助其火。以致身熱不寐。

黃連六兩

吳萸一兩

水丸

治肝火嘔結。脇肋攻痛。吞吐酸沫。痞結泄瀉。疝氣淋閉。兼治噤口痢疾。不受湯藥等證。

治某病發時。渾身灑漸麻痺。腹痛、囊脹、蒸縮。一時燈火、薑附亂投。得少安。其後屢發。醫總以陰症爲治。而病者慮縮陽緊持。玉蒸誠恐縮完。診脈弦緊異常。日紅唇燥。令急服左金丸合溫膽湯數劑。頓安。後以一派養血陰鎮心潛陽之藥。調理而健。

治某潮熱泄瀉。嘔吐蠍蟲。咳嗽牽引。左脇疼痛。服清散溫補愈甚。夜半氣逆神昏。面紅目赤。汗大如雨。微然虛脫之象。但從來熱泄之症。最慮陰液消亡。斷無戴陽之理。診兩寸弦數。知其藏體屬陽。審脈審症。推肝火衝逆犯土侮金。是以嘔泄咳嗽諸苦並增。加以溫補誤投。以致熱盛神昏。與溫膽湯加石斛桑葉白附數劑安。某令堂年踰七旬。時微發熱。躁擾呻吟。大扇搊之稍安。口渴飲湯。輒嘔稠痰。醫用汗法。遂時熱時汗。飲食藥物入口即吐。大便阻格。又用下法。少解仍祕。而浮腹脹。胸緊氣促。心煩口苦。日夜不寐。身軟難支。補瀉兩難。求治。余診脈流利平和。喜其先天之厚。遂曰。其初起時微發熱。並非外感熱甚。身可受扇。實係骨蒸內熱。兼之先病嘔吐。後加汗下法。宜乎困倦神昏。口淡無味。而心煩口苦不寐者。其肝膽相火上升也。又病久表裏俱傷。脈宜細數短濶。今脈流利者痰也。心煩口苦者火也。胸緊嘔吐者痰也。腹脹便閉者氣也。發熱受扇者內熱也。口渴飲湯者痰。逢冷則愈凝。遇湯則暫開也。合觀諸症。類係內因七情之病。必因素有思慮鬱結之情。蓋思慮則火起於內。鬱結則痰聚於中。而五志厥陰之火。早已與痰飲結爲一家。夫心動則陽亢。痰聚則陰濁。乃病熱所自然。今陽氣結於上。所以嘔吐不食。陰液凝於下。所以腹脹便閉。若誤補則陽愈亢。誤攻則陰愈濁。此定理也。斯疾陰枯陽結。嘔吐便祕發熱不寐。凡此皆陽明不和之本症。經曰。九竅不和。都屬胃病。但胃屬陽土。較治脾陰土不同。蓋太陰脾土喜剛喜燥。陽明胃土宜柔宜和。故陽明無壅補之條。太陰有忌下之禁。此陰土陽土最緊疆界。世醫不察者多。然則治法當清胃和中。但病久陽氣亦憊。清胃又忌苦寒滯膩。老年陰精已竭。和中又非香燥可施。惟溫膽湯可用。加烏梅一味。取其和陰欬痰。一劑嘔吐略止。稍能納粥。大便亦通。腹脹頓減。再劑食已漸進。夜寐亦安。後以生津滋

陰藥。洋參、麥冬、石斛、麥門冬之屬。頻進而痊。

苦辛酸殺蟲法

椒梅附桂連理湯

專治上脣生瘡。則蟲食其臟曰惑。下脣生瘡。蟲蝕其肝曰狐。并治一切蟲症。

人參 白朮 乾姜 甘草 附子 肉桂 黃連 川椒 烏梅

雄黃丸

專治狐惑症。凡一切蟲症屬於頑固性者亦治之。

雄黃 當歸 檳榔 蘆薈 蕎香 麴糊爲丸

某冬月下脣燥裂時忽乾痛。謂爲傷風所侵。以豬膏塗潤。而掣痛反增。醫稱風火與清涼藥。因而糜爛。余許以一劑可效。再劑可痊。號椒梅附桂連理湯去甘草服之。果驗。門人疑問。唇爛不受寒涼。恐輩知爲虛火。既舉附桂理中。何以復加黃連。又何以更用川椒、烏梅乎。答曰此正所謂下脣生瘡。蟲蝕其肝。其名爲狐。若是虛火。豈有下脣已爛。上脣安然。且口舌無患乎。門人退而喜曰毫釐千里。良不誣也。

考狐惑謂狐疑不決。內熱生蟲之候也。上脣生瘡。則蟲蝕其肝曰狐。雄黃丸主之。不投雄黃丸而投椒梅理中。殆醫之不可盡以成法拘也。

補土制木安蟲止吐法

安土安蛇湯

專治嘔吐泄瀉脾虛蠶等證。

白朮 白芍 陳皮 防風 烏梅 川椒

某郎四歲。季夏泄瀉。不以爲意。後加嘔吐口渴。時言腹痛。泄瀉滿牀。皆汚瀉後。又言腹痛。並無寒熱。余謂時下霍亂。雖有嘔吐泄瀉。有寒熱之表。見今始終無之。非霍亂也。若云食積。固有腹痛泄瀉。然瀉後腹痛必減。今瀉後仍痛者。非食積也。此脾氣久虛。肝木乘之。責之土敗木賊。是以吐瀉不止。使非補土制木。何以救其急乎。瀉久胃中必虛。蟲無所養。諸多蛔蟲。必貞膈間吸其津液爲之拒食。所以嘔吐口渴亦有之。今仿劉氏所製痛瀉要方。加以制蟲之味。豈非病藥相當乎。以白朮補脾。燥濕爲君。白芍瀉肝緩痛爲臣。陳皮利氣爲佐。防風引經爲使。加以烏梅之酸。川椒之辣。既有安蟲制吐之妙。又有生津醒脾之功。方成藥就。數劑而安。

大培土氣兼制肝木法

朮姜椒梅湯

治病者靜而時煩。因臟寒。蛻上入其膈。爲蛻厥。當吐蛻。兼治嘔吐泄瀉等證。

茯苓 白朮 乾薑 肉桂 黃連 黃柏 烏梅 川椒

某孫向有痼疾。今秋痢後泄瀉。小愈食復。又溏泄身熱。嘔渴。煩擾躁急。乳食不進。察其神色。均屬脾胃大虛。十指稍冷。右手尤甚。外腎右睾丸脹大紅赤。醫擬痛治療。藥進辛散。余曰此脾胃大虛。土受木剋。當大培土氣。兼制肝木。否則厥陰陽明合病。最防吐蛻而生變。以荅朮姜桂連柏。烏梅酸苦辛熱之劑。藥方煎時。果吐蟲。急服略睡。再劑加川椒一味。安臥。熱渴。嘔瀉頓止。睾丸脹大。遂消。愈後某歸謂余畏姜桂之熱。故以連柏監之。豈知厥陰之症。每多寒熱錯雜之例。用藥安得不如是乎。

清火殺蟲法

殺蟲清火消疳湯

治小兒肝脾不和。疳積發熱。大便不調。小溲如泔。或生瘰癧結核。耳內生瘡。牙頸爛蝕。以致眼目生翳障等證。

胡連 黃連 膽草 山梔 雷丸 雉虱 臭黃
厚朴 雞內金 使君子 石決明

引用雞肝一具。或豬肝兩許代之。

某郎四歲。忽眼生翳膜。目科醫治。遮滿黑珠。直不見物。其家意爲目已瞎定。安心不奈。焦煩啼哭。晝夜不安。始延余治。余細審病雖久而體猶大。形雖瘦而腹甚高。知爲熱生蟲之候。所幸白珠尚有紅赤血絲。因慰之曰。不僅病可愈。且目可明。遂以二連、膽梔、雷梔、臭莫、雞金、君子石決、厚朴、一派清火殺蟲之藥研爲細末。每日用雞肝一條。日暮消去。大安閑月。蟲下數十條。眼內俱清。後以扶脾和胃之劑。加清肝之品而愈。

補土制蟲法

清疳湯

治小兒疳積。腹脹食積。面黃。不思飲食。發熱煩渴。肌體瘦弱等證。

異功散 白朮 硬君 金鉢 胡連 川椒 烏梅 厚朴

能調理脾胃各症。病後用之最宜。

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

某郎七齡。六月患消渴。日夜不安。醫稱實火。進芩連、齊、知。渴愈甚。溺愈多。更醫見小溲清利。唇舌亦淡。連投八味地黃。燥渴愈甚。余視病勢已深。四肢消瘦。腹脹如鼓。因思三消水火之病。斷無腹鼓之症。此必脾胃病也。幼讀瀕湖綱目。曾引夷堅志治奇疾。有消渴因蟲之患。詢之此兒。素啖瓜果。內必生蟲。蟲在胃脘。吸其津液。故口中發渴。飲水致多。土困弗制。小溲遂多。理當補土制蟲。以白朮爲君。兼用使君。金鈴、胡連、川椒、烏梅、厚朴、酸苦辛辣之味。只服二劑。下蟲十有餘條。消渴頓止。腹鼓亦消。以異功散調理而安。

蘋肝定逆溫濶法

益黃散(治食積溢汗)

治脾土虛寒。嘔吐泄瀉。食積溢汗等證。

陳皮

青皮

柯子肉

甘草

丁香

某子暑月。嘔吐泄瀉。視其面色青白。糞色清澄。乃木強土弱。肝氣乘脾。用益黃散一服。兼進六君子湯。加白芍二劑而痊。

甘溫填納封固法

溫封填納湯

專治腎虛。元陽不固。上沖脇間作搊。面白神衰。夜難成寐。脈來虛軟等證。

當歸 地黃 莱肉 山藥 附子 肉桂
棗仁 半草 柏杞 石脂 牡蠣

治腎虛不寐。某客秋患脫症。屬下元虛。連進丸。芪地歸桂附頗效。而左脇氣擴。夜難成寐。至今未除。服歸脾養心。不應。面色㿠白。舌尖深紅。肢體倦怠。脈來虛軟。此心脾肝腎俱病。前服之劑未能療及肝腎而不寐。由於氣擴。氣擴由於陽明脈絡空虛。肝風得以内鼓。是填納封固之法。萬不可少疏。以甘溫之品十劑。飲食倍常。夜寐得安。二十劑。脇氣亦不擴矣。

通陽泄濁補血益精法

辰進方

治腎陽大虛。精血亦虧。陽痿精冷。形體羸弱等證。兼治踰維失固。寒熱如慄。

首烏 當歸 枸杞 鹿茸

鹿角霜 黃芪 半草

戌進方

專治脾腎陽虛。氣血雙虧。形體羸弱。盜汗遺精。畏寒便溏等證。

白朮 附子 乾姜 蒲巴 固脂 五味

益智 牡蠣 棗仁 甘草 龍眼

治某先生素體陽虛。食慾發癟。躊躇維失固。寒熱交征。非關表裏。損在奇經。似瘡非瘡。連日受困。形容憔悴。面黃唇青。自汗盜汗。手足如冰。便頻遺泄。火衰明徵。診脈控弦。治宜扶陽。甘溫之劑。辰戌兩進。通陽泄濁。補血益精。

補法(二)

養心湯

治心神不足。夢寐不寧。驚悸健忘。久病虛損等證。

黃芪

當歸

茯苓

茯神

遠志

五味

柏仁

棗仁

人參

甘草

川芎

肉桂

半夏

某內產後寒熱腹痛。明是血虛發熱。氣虛生寒。本當溫養血液。如理陰煎等。乃誤認瘡治。以致大汗如洗衣被皆透。此產後津脫之症。亟投養榮等劑少痊。後復寒熱。大汗仍來。再進養榮不應。外以蕎麥粉撲之。亦不止。幸脈尚微。仍進養榮。五味加到八錢。外以龍骨牡蠣粉撲之。汗稍息。復將原方晝夜三劑。其汗始收。舌黑始退。白云心多驚怖。猶是血去液傷。重進歸脾湯、養心湯數十劑始健。

補法(二)

金匱腎氣湯(即八味加牛膝車前子)

治虛羸少氣。命關火衰。喜煖畏寒。腰腎痠痛。腿足無力。咳嗽痰喘。陽虛水冷。四肢腫脹。及婦女飲食如故。煩熱不得臥。此名轉胞。不得溺。以胞系弓反。故致此病。但利小便則愈。此方主之。

治某婦年逾七旬。素屬陰虧。春初微寒。微熱。以二陳加麥冬。一劑頗安。次日耳中忽流血水。耳旁筋痛。余曰耳門屬腎。老年下元先衰。非溼熱停耳之症。乃腎氣上奔之象。易曰龍戰於野。其血元黃。議早與金匱腎氣。晚進歸脾。杞、萸肉、牡蠣、菊花、熟地各二劑。筋痛血水齊愈。

治咳嗽喘促。某年五十。辛苦勞力。一向時寒時熱。咳嗽氣緊。恣服蘇子、桑皮、枳、桔。兩足浮腫。氣衝痰壅。臥不著席。醫者見其小水涓滴。不知其腎陽不化之故。又泥大腸壅滯。未識其肺氣不輸之因。復誤進滾痰丸。氣愈急。痰愈嗚。余視肩聳目直。脈辟辟如彈石。勢已危篤。姑疏腎氣。以附子爲君。互進黑錫丸五錢。此症僅存一線生機。以小便不長。大便滯濶。蓋上欲脫而下未遽脫也。次早復視。症未增減。猶未可恃。復將腎氣加五味大劑以進。每劑吞黑錫丸五錢。令其晝夜三劑。是晚雖未能安枕。然尚可著席。知其氣已返矣。越日復診。脈得柔軟沖和。再進三日。二便如常。臥亦安枕。其後真武右歸丸出入。調治亟培土金水三臟之本。經月之久。方得散步於外。此真起一生於九死者也。

古人以腎氣湯治消渴溺多。又治水腫溺少。一開一闔。無非蒸動腎氣法也。

補法（三）

溫養血液法

理陰煎（景岳）

治脾胃陽虛。血不歸經。崩漏血痢等證。貧血少氣者亦主之。

十全大補湯

當歸 熟地 黑姜 甘草

治男婦一切氣血兩虧。脾胃損傷。精神疲弱。真陰內竭。虛陽外鼓等證。

當歸

熟地

川芎

白芍

肉桂

人參

白朮

茯苓

甘草

黃芪

治四肢抽搐。某年二十。兩腿瘡毒。膿水淋漓。醫半年。愈加浮爛。一日忽微熱。身體抽掣。目瞪喉響。似小兒驚風之形。疏理陰煎加黃芪附子大劑與之。連服兩劑。而眼已不戴。身已不強。隨服十全大補數十劑。瘡毒全愈。

某室產後寒熱如癆。醫投五積不效。又與黑神更歸以爲血虛進八珍。潮熱煩躁。口乾舌裂。又用歸、芍、芩、連、火勢愈騰。唇口愈燥。咽喉望痛。胸腹脹迫。燥渴異常。脈來洪數。按之亦皆鼓指。內外一古。儼然大熱之象。但臨產艱難。神氣固喪。且血下甚湧。營陰亦傷。思人身陰陽相抱。始得資生。今陰精內竭。孤陽外擾。若非滋液歛神之法。勢必陰亡陽滅而已。因處大劑理陰煎加附子五味。另用龍眼二斤熬湯。攪服。服後寒戰。重複不減。唇舌俱淡。乃陽微之狀已彰。但明知產後血枯陰涸。且脈形未歛。尚不敢偏行辛溫。確守前意。滋液歛神。甘溫到底安。

按婦人產後血虛發熱、燥渴諸症。曾用理陰煎重加姜炭而安。蓋產後血奪。陽無所依。浮散於外。姜炭散虛熱之上品。引血藥以生血之靈丹也。

某內產後寒熱腹痛。醫以芎歸加入行瘀藥。兩投愈痛。人事困頓。余以血虛腹痛。當溫養血液。疏理陰煎。投弗服。明是血虛發熱。虛生寒之症。誤以遞治。大汗如洗。此產後津脫之症。余連進養榮。兼用五倍末。津調敷臍。其汗稍收。而寒熱迺除。後數日因換衣觸寒。寒熱復起。舌心灰黑。與理陰煎加附子一劑。寒熱便息。

補法（四）

十全大補湯

主治見前

地黃

白朮

當歸

茯苓

川芎

甘草

芍藥

黃芪

人參

肉桂

治癰瘍。醫進達原大柴胡。潮熱不熄。燥渴反加。因而下利譖語。其病不過三日。即身重如山。軀骸疼痛。譖語重複。聲微息短。脈來鼓指無力。此病雖未久。然表裏有交困之象。陰陽有立絕之勢。急進此湯。重加附子二十劑始安。又治某年二十。兩腿瘡毒膿水淋漓。誤醫益甚。一日忽微熱身體抽掣。目瞪痰響如驚風之狀。疏理陰煎加芪附。

大劑與之。兩劑而眼已不戴。身已不強。隨服十全大補數十劑。瘡毒全愈。蓋風邪之中。彼其陰血先已失守。津液涸枯。筋脈不禁。陽氣不藏。是爲陰陽兩竭之候。此際收攝已晚。尙堪辛散耶。况古云。治風先治血。血行風自滅。不但瘡家。凡誤汗。失血。泄瀉。痘疹。以及產後老弱。小兒諸人。此病最多。皆當審察。

又治某婦身弱。勤於針黹。並無寒熱。忽渾身戰慄。牙關緊急。舌可略露。口不能言。時有抽搐角弓之狀。小水仍利。疏風解表不效。病二日漸危。諸醫見大便未通。欲行攻下未決。余診脈緩大方。思議間。抽搐等恙。又作竊此症。其來甚暴。應知暴病非陽。且無寒熱。決非三陽實邪。若果外邪固閉。其人早已昏迷不醒。安得清明若是。必血虛風中。筋脈痺攏無疑。與大劑十全大補。重用桂附子。急進快齒灌入。略睡。勢稍止。一晝夜藥三劑。乃得口開能言。

補法 隱陽兩補法(五)

人參養榮湯

主治脾肺俱虛。惡寒作熱。肢體困倦。食少便溏。口乾心悸。自汗盜汗。氣血不足。形容羸瘦。精神短少等證。

人參	茯苓	甘草	陳皮	當歸	地黃
五味	白芍	肉桂	生姜	棗仁	遠志
治少年稟賦不足。平時面色失華。聲音不揚。中宮虛弱之體。					

治腎氣素虛。真陽易越。汗出難收者。善後法。

治某妻惡寒潮熱時。夏多疫。診脈緩大而空。舌白胎滑。又詢其素有腸風便血。經不及期。且外雖肥盛。內實不足。知中氣大虛。病從飲食勞倦中來。乃外耗於衛。內奪於營之症。與東垣益氣湯。托裏散邪之法。畏不敢服。更醫。謂疫邪初起。服達原飲。大熱譫語。大便不通。更與大柴胡二劑。熱熾躁擾。張目不眠。譫語發狂。且甚有力。醫見表裏皆熱。更疏白虎合承氣未服。復就正於余。余視其目紅面赤。亂言無倫。及診脈下指洪大。按指索然。此五臟空虛。血氣離守之驗。是日午刻以養榮湯。武火急煎。藥纔下咽。時忽咬齒。兩手撮空。余甚惶惕。恐昆蟲飛焰。挽救弗及。但審症既真。申刻又將原方四倍。加入附子二兩。急煎。逾時服畢。譫語未息。發狂少止。似寐非寐。與粥一盃。大嘔稠痰。其色青碧。又不得不先救胃陽。戌刻復剝附桂理中一劑。藥未下咽。寒戰咬牙。肉瞞筋惕。此假熱一去。真寒便生之應也。祇恐油汗一出。孤陽立越。幸藥已備。亟與進服。亥刻果汗厥冷來。又與理中一劑。遂安。片刻汗收肢溫。復與粥飲不嘔。差喜陰陽兩交。胃氣少甦。次早視之。陽已不戴。脈亦有根。然昏迷困懨。猶言見鬼。目尚赤。口尚乾。此陰火未息。虛陽未返。津液未生。神魂未斂。以歸脾。吞八味丸。數日。幸獲生全。但口苦少寐。與歸脾加山梔丹皮大便已閉十五日。至此始通。蓋腎氣素虛。倉廩空乏。經血不榮之故。更與十全大補。服半月方健。

治某婦年老陰虧。耳流血水。耳旁筋痛。與腎氣及歸杞、萸、牡、菊、地、二劑愈。比晚寒去熱來。是爲陰陽不和。致令偏寒偏熱。非瘧症也。法當人參養榮湯。爲陰陽兩補之劑。囑曰。藥固大劑。必多服。乃可。

某內產後寒熱腹痛。躊躇以行。加入行瘀藥。兩投愈。痛人事困頓。余以血虛腹痛。當溫養血液。疏理陰煎。畏而弗服。明是血虛發熱。氣虛生寒之症。誤以時行瘧症治之。大汗如洗。衣被皆透。復延余至。原知產後津脫之症。未敢輕許可治。所喜脈無躁擾。神明未亂。亟以大劑人參養榮湯。疊進三劑。外以五倍子末。津調敷臍。其汗稍收。而寒熱亦除。以後因換衣觸寒。復寒熱。舌心灰黑。與理陰加附子一劑。寒熱熄而大汗仍來。重進此湯。三劑不應。外撲

蕎麥粉。汗亦不止。全甚躊躇。其家以爲屍汗、不治。余曰藥雖未效。病尙未變。且脈亦甚微。亦屬吉象。仍將原訂養氣用五味子八錢。外以龍骨牡蠣粉撲之。其汗稍息。復將原方晝夜三劑。其汗始收。舌黑始退。某內因取乳服藥。患陰菌下墜。足腹腫滿。又誤治半載。忽變口噤舌縮。余診六部無脈。似屬不治。蓋心主血脈。舌關。故乳汁與月水相應。誤投下乳之藥。衝任大傷。以致子宮脫出。又因誤治腎氣散越。而爲腫滿。按少陰腎臟位雖居下。然其脈常繁舌本。今氣已墜散。脈道不能上朝。故脈不至。而舌本不能繁也。此際收攝之法。有斷然必用者矣。遂處大劑養榮湯。重加鹿茸、艾葉。頻進旬日。諸恙獲痊。噫。醫可不求其理哉。

游魂一病。原肝爲鬱臟。體陰而用陽。魂被火迫外游。故探病客來。未至先知。此實症也。虛症亦有肝不藏魂。能知宅外之事。而婦人產後血虛。尤多此症。宜養榮湯。

補法（六）

四君子湯

治脾胃氣虛。不能生津。食少形寒。體瘦面黃。痰多便澀。精神疲倦等證。

人參 白朮 茯苓 甘草

治某病後。足膝痿弱。其機關骨節。俱如平人。惟軟不能舉。難以行立。余思筋緩者。當責其無氣。筋急者。當責其無血。今軟弱不舉之症。是爲緩緩廢弛之疾。與血無關。但當偏益其氣。前所進十全大補。乃氣血平補之藥。猶是氣不勝血。所以不能取效。法當四君加黃芪、附桂。可收全功。如法治之。果愈。某質稟木火。晉染厚味不節。患脇痛沖、腕兩攢。痛時由左直上撞心。久之嘔稀涎。纏適始則日一發。繼則一日數

發神疲氣怯。焦躁嘈雜難以名狀。醫用控涎導痰不效。至春一日痛嘔甚。吐血二碗。神昏氣湧。目瞪如斃。卽進參、梔、豉、鬱草、葱管、歸鬚、柏仁、降香、新絳、泄鬱降逆法。兩載痼疾數劑而痊。然此法中病卽已。未可久恃。緣甘平之性少苦辛之味多也。亟當善爲轉方。所謂用藥如用兵。更訂四君子加白芍、遠志、續服。此乃多多益善也。

某女煩渴吐瀉。昏睡露睛。醫投丁蔻理中。手足厥冷。時靜時擾。形神驚怖。(風木侮土之據)面色㿠白。唇紅帶綰。滿舌白胎。中心黃燥。此脾虛有火。表邪內陷。陽氣抑遏不能敷佈於四末。風木肆侮於脾家。與四君子加柴葛、知芩服下。遍身搔痒。(風邪外達之徵)再劑而安。

某子四歲。季夏煩渴吐瀉。醫治轉劇。余視大驚。面現五色。惟目中神采尚存。生機只此。謂曰。此症全因剋伐過傷脾胃。中土困憊。其唇紅、口圈青黑者。卽脾胃敗也。鼻準黃而兩頰獨白者。肺氣敗也。幸五色中尚潤澤。真臟尚未枯槁。目中精光瞭然。雖吐猶可納弱。雖瀉尚不至於雞口牛後。通盤揆之。猶在方敗未絕之界。但非參朮疊進。固不能起。何也。先天之體質不足。後天之脾胃更虛。旣因飢飽乳食致傷。復因藥餌攻伐。是虛上加虛。脾胃一虛。便失傳運之職。關門失禁。所入水穀。遂走肛門而出。遂使津液下陷。不能上升。所以口乾煩渴。脾失傳運。肺亦言傷。失其治節下輸之道。而小水無矣。此與虛陽外發之症同類。並稱亟宜大固中州。兼以保肺生津。庶中土安而諸經健運。有常此必然之理也。倘誤認爲火。妄投苦寒。定然神機寂滅。成慢脾厥逆不治之症。疏四君加附子、合生脈散。並囑勿復疑遲。不意渠竟不信。及余回家旋延二醫。商進一派辛散寒涼之藥。以參朮爲不可服。後果厥逆。角弓反張而殞。

某子夏月吐瀉。口渴身熱無汗。手足時冷。余知脾胃素虛。連投六君。更加煩躁。唇紅舌刺。四肢發厥。所泄逆迫如箭。糞色鷄溏。余思唇紅舌刺。身熱似火。而糞溏肢厥。又類於寒。寒熱錯雜之症。其中必有伏匿之情。決非一途可

治。再爲詳密。見其躁時似有驚惕。糞色逾時變青。乃知脾胃久虛。加以風熱內熾。不能外達。以致抑鬱不舒。肝風乘虛侮土。而爲揮霍撩亂。致成此候。若非補土解肌。勢必強者莫制。弱者將絕。不變痘逆不止也。於是四君子補脾扶胃爲主。佐以葛根防風。丹皮、竈土諸味。解肌疏風。升陽散火。是日連進二劑。果遍體紅赤。喜人搔痒。發熱達。正爲可喜。常用原方再進一劑。諸症必除。果微汗退。紅消及睡醒時。則諸態如失。

補法(七)

六君子湯

治氣虛有痰。脾虛腹脹。食少神倦。面黃肌瘦。一切脾胃陽虛等證。

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

半夏

加柴芍。名柴芍六君

治某春月腹痛泄瀉。小水短濤。服五苓利水止泄。尿愈閉。腹愈痛。病劇。余曰分利而尿愈閉者。所謂木斂病耳。經云生鬱於下。病名木斂。蓋木者肝也。斂者束也。肝喜疏放。春月木氣當升。今木氣抑鬱斂束。再被滻利沈降之藥。致令生氣愈不得舒。是有秋冬而無春夏。安望其能疏放乎。用六君加防風。升麻。桑葉。數劑。遂其條達愈。某能言而瘦。時飢嘈雜。小便赤濤。胸膈間微有痛。醫誤認爲火。咸謂消中。連服地、麥、芩、連、知柏。數月不輟。遂至時欲得食。旋食旋餓。面黃形瘦。小水愈赤。余診脈息。屬虛。曰君幾誤死。能食而疲。此乃脾弱胃陽。法當扶脾抑胃。奈何認爲實火耶。其昆季問曰。小便赤濤。豈非火乎。余曰不聞經云。中氣大虛。溲便爲之變耶。且從來大小二便。豈定爲虛實之確據耶。遂疎六君。吞左金丸數劑稍愈。徐除左金。獨用六君湯。百餘劑而安。

某孫夏月吐瀉。視其神慢眼大。白珠帶青。發熱口乾。所泄澄澈青色。知其脾胃虛弱。進香砂六君。數劑不減。復視更用柴芍六君加防風三劑而愈。此風泄之症。乃土虛肝風侮脾。所以其色青綠。非補土制木兼用。宜乎不應。可見用意用藥。毫釐不可忽也。

某孫飲食未節。又啜冷水。因而吐瀉交作。發熱口渴。醫進藿香正氣。躁擾不安。揚手擲足。號哭不已。稍靜則氣急目閉。忽又嘔。渴交作。躁擾之極。看苗竅顏色。尚非虛象。以胡椒二十粒。荳豆四十粒。一寒一熱。搗碎煎水一甌。用以和其陰陽。另以棉紗一紮。取其一轉一旋。煎水一甌。二湯和服。安次早視面色淡白。舌苔浮黃。尚有微熱。微泄。知脾胃雖傷。而虛中挾火。常用清補無疑。與六君加石斛桑葉而愈。按此症急時不得其藥。而竟檢俗方用者。所謂理失而求諸野也。

某子六歲。瘧後惡食。醫以傷食治之。遂至顆粒不入。聊以糕餅度日。漸至肌膚瘦削。始延余治。見其面色浮黃。脣舌白。指紋淡淡。推之不動。確知脾胃大傷。慢症已成。以六君加乾姜二劑服之如故。再原方重用白朮二劑。飲食漸進。神氣稍爽。越三日復視。頭垂涎流。呻吟不已。安危只在呼吸。余愕然問故。渠母下淚曰。數月來時現寒熱。總因瘧未盡除。近日腹痛。必因糕餅之滯。昨進神麪一盞。乾嘔作泄。腹痛尤甚。自此呻吟不已。不識尚可治否。余曰。脾胃已困。倉廩久虛。溫補尚恐不及。反用神麪苦辛開降。嘔泄安得不至乎。姑以大劑附子理中湯。希圖救援。即於方末批云。小兒脾胃久敗。火土交傷。嘔嘔涎逆。難許生機。渠家見余言急切。復延幼科。謂脣紅腹痛。火積爲患。用胡連史君一派苦寒破氣之藥。是夜神氣壯旺。腹痛求食。方下咽。喉嚨痰鳴而癟。嗟嗟此兒。如已落井。而又下之以石。豈慈幼保赤之心哉。夫脣紅者。脾敗真形露也。頭垂者。真陽衰竭也。種種敗症。目所共睹。奈何以脣紅之假症。立火積之妄名。嘔泄呻吟。置之不究。可勝嗟哉。請詳幼科夏氏之論。以明斯症之誤。始見余言之不謬也。

補法（八）

異功散

能調理脾胃各症。病後用之最宜。

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮

生脈散

人參 麥冬 五味子

治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴出汗等證。

補法 托裏散邪法（九）

補中益氣湯（東垣）

治陰虛內熱。頭痛口渴。清陽不升。心煩不安。四肢困倦。動則氣喘。便溏腹脹。久瘧久痢等證。

人參 白朮 升麻 陳皮 黃芪 當歸 柴胡 生姜 大棗

治某妻濕漸惡寒。倏忽潮熱。夏初疫症流行。余診脈緩大而空。並非疫症。又詢素有腸風便血。經不及期。外雖肥盛。內實不足。此中氣大虛。病從飲食勞倦中來。乃外耗於衛。內奪於胃之症。與此湯託裏散邪之法最宜。治某媳小產。感冒寒熱咳嗽。余視其面白唇燥。脈來虛大。其熱忽有忽無。此產後血虛感寒。與此湯加熟地姜炭。

其家恐補仲寒邪療血。更醫進發表一劑。卽變氣促大汗復延。余治見其面紅目赤耳聾譫語脈來如湯沸騰。此陰虛陽越。勢已危險。疏與八味地黃重附子加五味。囑急服。尙可挽回。豈料復延。更醫妄稱熱入血室。竟用四物柴胡。一劑大汗發瘧而逝。豈非下井歷石者耶。

補法（十）

大補陰丸（丹溪）

此丸能壯水之主。以制陽亢。治陰虛火炎。肺痿勞熱。骨蒸盜汗。咳血耳聾等證。

知母 黃柏 地黃 鬼板 豬脊髓 蜜丸

治某媳足痛。醫謂血虛生風。凡疏風養血藥。自春至夏任服無間。至七月燥金用事。足不能移。形體羸瘦。又加痰飲。嘔逆不已。此火燉金傷。兼之陽明失節。以致機關不利。與此丸及虎潛合法。重加石斛、桑葉汁三十劑愈。

補法（十一）

歸脾湯

治思慮過度。勞傷心脾。怔忡健忘。驚悸盜汗。發熱體倦。食少不眠。或脾虛不能攝血。腸紅瘻痢及婦人經帶崩漏等證。

人參 白朮 當歸 黃芪 遠志 藜仁

木香 龍眼 升草 伏神 再加生姜大棗

治某妻中氣素虛。誤表亡陽。服過養榮附桂理中等。陽已不戴。脈亦有根。然昏憊見鬼。目尚赤而口尚乾。此陰火治

未熄。虛陽未返。津液未生。神魂未斂。以此湯吞八味丸。數日安全。但口苦少寐。與此湯加山梔丹皮。大便已閉十五日。至此始通。蓋胃氣素虛。倉廩空乏。經血不足之故。更與十全大補湯。半月方健。治某翁初蒞任。適報海寇滋擾。緝究爲艱。復值饑饉。亟籌賑救。數年辛苦百倍。突增太翁之變。驚憂備集。因而成病。語言恍惚。步履欹斜。頗似顛狂。歲杪病劇。余見人事瞀亂。兩目左右顧盼。有時發怒。亂走胡言。然禁之卽止。是不明中尙有明機也。且時以手按摩心胸。可知膻中必有鬱結。怔忡之苦。診脈浮大而軟。夫浮軟爲虛。大則病進。合脈審症。知先生病從七情憂勞中來也。訂歸脾湯。加龍齒、五味。孰知諸醫悉稱痰火閉竅。已服鐵落石膏、竹瀝。火且不衰。若投參朮芪。則以爲不可。救藥子復詳辨。狂病是陽鬱太過。挾膽胃兩陽之火上炎。故越人稱爲重陽。發則水火不避。笑罵聲強。登高踰垣。迅速非常。脈或弦勁有力。或鼓激沖指。故有唇焦齒燥。胃實不便。諸症治以鐵落等。乃制膽清胃。重而抑之使下也。此則不然。不過有狂之意。中無所持。故禁之則止。若痰火閉竅。則竅便塞矣。豈能禁之卽止乎。又果重陽之病。豈無鼓指之陽脈乎。蓋先生始於憂思不遂。抑鬱不舒。漸至心精日耗。神明喪失。君主之宮自然。謀慮之舍乃枯。如木將朽。何堪斧斤。內經有言。嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰距營。嘗富後貧。名曰失精。曰失曰脫。收攝之法。其可緩乎。衆皆唯唯。而不料竟執迷不返也。

補法(十二)附回陽救脫法

金水六君煎(景岳)

治肺腎虛寒。水泛爲痰。年邁陰虛。氣血不足。外受風寒。咳嗽嘔惡。多痰喘急等證。

大補元煎

茯苓 甘草 陳皮 半夏 當歸 熟地

治精血大傷。元海無根。咳嗽氣促等證。

人參

甘草 當歸

熟地 柏杞

杜仲 山藥

萸肉

醫門黑錫丹

附子 胡荽 沈香 补骨脂 茴香

肉桂 金鉛子 黑鉛 肉豆蔻 陽起石

木香

回陽鎮攝湯

精血大虧。元海無根。虛陽上升。大汗喘息等證。

人參

白朮

附子

肉桂

熟地

當歸

柏杞

牡蠣

沈香

治元陽素虧。咳嗽喘促。某憂怒後。旬日鼻塞聲重。咳嗽多痰。擬是肺胃虛寒。與金水六君。咳甚礙臥。氣喘痰鳴。再診尺脈浮大而空。氣促面赤。喉中痰響。元海無根。真陽上脫。急與黑錫丸。氣略平。痰亦少止。隨進大補元煎加桂。附。衆曰熟地滯痰。萬不可用。余曰下部之痰。非此不可服之安臥。氣亦歸源。猶然鼻塞咳嗽。以原方加固脂而痊。又越月行房後。入水脇旁微痛。發熱畏寒。誤投汗藥。身熱大汗不止。囊莖俱縮。脇肋脹痛愈盛。咳嗽帶紅。危在頃刻。不知仲景先生有動氣在下。不可發汗之戒。汗則肝腎陽亡。夫其肋痛者。腎氣奔也。咳血者。龍雷動也。身熱大汗。虛陽發外也。玉莖萎縮。陽氣敗也。法當鎮攝封固。外用回陽火救之。內服黑錫丸。鎮納真氣。疊服後方而愈。湯方列前。

補法(十三)

右歸丸(景岳)

治元陽不足。勞傷過度。命門火衰。脾胃虛寒。嘔惡膨脹。翻胃噎膈。臍腹多痛。虛淋寒疝。便溏泄瀉。肢節痺痛。水邪浮腫。眼見邪物。陽虛無子等證。

山萸
山藥
菟絲
當歸
熟地
附子
肉桂
鹿膠
杜仲
枸杞

真武湯

治少陰腹痛。四肢沈重。嘔下利。小便不利。痰飲水氣。并治傷寒汗多亡陽。筋惕肉瞶。氣虛畏寒等證。

白朮
茯苓
白芍
附子
生姜
二方爲培土。金水、三臟之本。

肝血大傷腎水將竭法

虎潛丸

治臟陰不藏。內熱生瘻。筋骨羸弱。足不任地。骨蒸勞熱等症。此丸以血肉有情之品。用補精血之不足。

知母
黃柏
當歸
生地
羊肉
橘皮
白芍
虎胫
龜板
鎖陽
牛膝

治某秋病寒熱咳嗽。足跗浮腫。足指潰爛似癱瘓狀。諸醫以不痛爲不治。次年求治。形羸髮脫。脈象細數。大肉已盡。二腳緩弛。經曰大筋輒短。小筋弛長爲痿。又曰陽明虛則宗筋失潤。不能束骨而利機關。法當專取陽明。況寒暑交遷。又值燥金用事。宜先清金潤燥。佐以甘淡益胃之藥。如二地、二冬、梨汁、蔗汁、斛薏等。大劑日進十日後。飲食稍加改進。此丸加芪、朮、薏苡、桑枝、茅根。補助陽明。計治一載。始獲全功。

又某初起便血。漸至兩足痿弱。不能稍移。服歸芪參朮。血愈下。足愈軟。余診兩脈細勁。面黑耳聾。曰此肝血大傷。腎水將竭也。然從來補陰之藥。難期速效。疏爲虎潛作湯。令服百劑。服後許以病根可拔。殊伊服五十劑。脚可趨

步。便血亦除。客費停藥。逾年腸紅復來。仍服前方稍愈。又停以致便血不息。竟至不起。惜哉。

火歸水中水能生木法

地黃飲子（河間）

治中風舌瘡不能言。足廢不能行。此少陰氣厥不至。名曰風瘡。急當溫之。

熟地

麥冬

石斛

蒼筭

芭戟

附子

肉桂

山萸

茯苓

薄荷

菖蒲

遠志

五味

生姜

大棗

法用飲子

治腦鳴肢痺。某年近五十。鬚髮皆白。左臂自肩膚肘腮。麻木不舒。腦中鳴響。見其滿面油光。飲食如常。尚謂氣血之華。誰知真陽外露。肝風內鼓。是平時不講內外之風故耳。且值冬初。寒風凜冽。木葉盡脫之際。漸顯頭眩耳鳴肢墮等症。診脈緩大。知水不濡木。肝風始張。腎氣將騰。卒倒床中之日來矣。處地黃飲子加鹿茸。大劑煎服。欲其火歸水中。水能生木。兼製扶桑丸。用以流利關節。祛濕潤燥。服至臘月。肢體勁強。神采內蓄。自覺神魂返宅。因歲暮停藥。頭眩雖息。而腦鳴未止。應知髓海難充。亦功虧一簣之過耳。

又治瘡厥風瘡。某初病惡寒發熱。繼則熱而不寒。喜睡羞明。二便略通。誤治症變。熱熾譖語。神識昏迷。更醫斷爲虛脫。與理中。舌胎乾黑。肢體若僵。絕食不進。求診。左脈沈緩。右脈數急。面黑目赤。耳聾不知所聞。上部捫之覺熱。下部捫之覺冷。統計有似水衰火炎之象。細視左肢微腫。捫之覺有痛色。於是知爲風邪所中。誤治至此。治參瘡厥風瘡之例。以地黃飲子服至二日方醒。七日全愈。

陰陽並虧法

雙補湯

治陰陽兩虧。五臟皆弱。脾腎尤虧。氣血不煦。精血亦虛。虛寒食泄。腹脹痛瀉利。食少神倦。或酒色過傷。臟真無火等證。此丸能補陰陽之虛。故曰雙補。

白朮 茯苓 山藥 女貞 熟地 桔杞子
附子 肉桂 小茴 鹿茸 鹿膠

治某翁陰陽均虧。五臟皆弱。中焦困鈍。氣機不宜。故以朮、苓、山藥大培土氣。建立中宮。以運四旁。則脹滿可磨。嬌金可旺。熟地女貞。杷子質純能滋陰。使水源充足。庶腎家有歸藏之安。附桂小茴氣厚能扶陽。俾火宅溫煦。中州無壅塞之患。鹿茸助陽而精府常富。鹿膠補血。則形骸自強。斯中焦運而四臟和。水火交而陰陽偶。身中元氣。豈不太朴純全乎。或議地丹之寒。桂附之熱。抑知非剛不足以化氣。非柔何以濟剛。且非從陰何以引其陽。亦非從陽何以引其陰。於理固合。於法不悖。

補水調養法

養肝潤燥補血湯

專治貧血及肝躁諸症。多悸多驚。多憂多怒。夜不成寐。面熱口乾。形體清瘦。肌膚乾燥。及婦人血虛經停等證。

人參 熟地 當歸 白芍 麥冬 茯苓 桔杞 玉竹 阿膠
治某妻玉體清瘦。脈來尺濤關弦。夫濤者血虛也。弦者肝燥也。且質稟木火爲人主性急正直。多驚多怒。善憂善敏。大抵木有凋謝之日。又有生發之期。火有遏止之時。又有炎威之候。而火生於木。木又畏火。前此之眩冒肢麻。肝風張也。吾不用驅風之品。但取養肝潤燥之藥。既已呈效。今囑善後。所云補水之劑。可參用矣。此滋潤苞稂。不

使枯槁作燃卽保無虞也。

血枯治法

補血入奇湯

治婦人羸弱。血虛經水不調。或月水漸少。崩漏帶下。骨蒸潮熱。不能成胎。恐成癆瘵。此丸能補奇經八脈。

熟地 柏杞 蔴蓉 鎮陽 牡蠣 故紙

桑螵蛸

鹿角霜

茜草

鮑魚湯煎

海螵蛸

按內經四烏鵲骨一蘆茹丸。素問治氣結肝傷、脫血、血枯。婦人血枯經閉。丈夫陰痿精傷。

烏鵲骨四兩。蘆茹一兩。(本草云卽茜草)丸以雀卵大如小豆。以五丸爲飯後飲。以鮑魚汁利腸中及傷肝也。
(內經除此外。惟有治心腹滿。且食則不能暮食。名曰鼓脹之雞矢體。一劑知二劑已。其方用羯雞矢乾者八合。炒香。以無灰酒三碗。煎至一合。瀝汁。五更熱飲。則腹鳴。辰巳時行黑水二三次。次日覺足面漸有皺紋。又飲一次。漸皺至膝下則愈。及陽氣盛。陽蹻之脈不得入於陰。陰虛故目不瞑。之半夏湯。以千里長流水揚萬遍。取五升。半夏五合。煮爲升半飲一小杯。稍益以知爲度。覆杯則臥。汗出則已。一劑知藥病相知。二劑已。謂病已除也。

某內年近五十崩漏。始則白帶淫溢。繼則經行不止。甚則紅白黃黑各色注下。綿綿不絕。遷延五載。肌膚乾瘦。面浮跗腫。胸脇作脹。穀食難進。所下已有腥穢。自分必死。所喜脈無弦大。可進補劑。然閱前方。十全歸脾。毫無一效。竊思婦人久崩。調補氣血不應。必是衝脈損傷。考內經逆順篇。以衝稱血海。又爲五臟六府之海。又云衝脈起於胞中。而胞中原屬命門。因推人身自頭至足。腹前背後。無不稟承於命門。今衝既不蓄。故任脈不爲之承任。帶脈

不爲之帶束。督脈不爲之統。督陰陽蹻維不爲之擁護。故身中之精華散漫無統。無所稟承。不及變化。所以諸般顏色之物。注於衝路而下。譬之漏卮。不竭不已也。所服參薯歸朮。計非不善。但甘溫守補。豈能趨入奇經。仿內經血枯血脫方法。特製烏鵲丸。義取鹹味就下。通以濟濇。更以穢濁氣味爲之引導。參入填下之品。立成一方。似於奇經八脈毫無遺義。且令其買閩產墨魚。間日煮服。亦是同氣相求之意。如此調理多月。按日不輟。五載痼疾。一告痊。

後某內悉同此症。但多有少腹下墜。未勞思索。逕取前方加黃耆而痊。

專固奇經法（一）

禹餘糧赤石脂湯

治傷寒服湯藥下利不止。心下痞硬。服瀉心已。復以他藥下之。利不止。醫以理中湯與之。利益甚。理中者理中焦。此利在下焦。此湯主之。

禹餘糧 赤石脂

某室年近四旬。素患小產。每大便必在五更。服蘆歸脾、四神、理中之藥。屢孕屢墮。今春復孕。大便仍在五更。諸醫連進四神。不僅解未能移。並且沈困更甚。余曰。此乃八脈失調。尾闊不禁。病在奇經。諸醫專事臟腑、腸胃藥。與病全不相涉。內經骨空論曰。督脈者。起於少腹以下。骨中央。女子入繫庭孔。又曰。其脈循陰器。合篡後。繞篡後。別繞脅。由是觀之。督脈原司前後二陰。尊閩督脈失權。不司約束。故前墮胎。而後晨瀉也。又衝爲血海。任主胞胎。治之法。惟有班龍頂上珠。能補玉堂關下穴。但久病陽滑。恐難以盡其神化。當兼遵下焦有病人難會。須用餘糧赤石脂。照服。五更之泄。今已移矣。十月之胎。今已保矣。內經一書。可不讀乎。

專固奇經法(二)

固任湯

治一切子宮病。經期失常。崩漏迭作。少腹脹痛。並治婦人房勞過度。衝任損傷各症均驗。

等證。丁香 肉蔻 鹿茸 小茴 川練 後加當歸、枸杞、蓀蓉、紫石英。

歸脾湯

治思慮過度。勞傷心脾。怔忡健忘。驚悸盜汗。發熱體倦。食少不眠。或脾虛不能攝血。腸紅瘡痢。及婦人經帶崩漏等證。

人參 白朮 當歸 黃芪 升草 伏神
遠志 薏仁 木香 龍眼 生姜 大棗

滋腎丸

治腎虛蒸熱。脚膝無力。陰痿陰汗。衝脈上衝而喘。下焦邪熱。口不渴而小便閉等證。

知母 川柏 肉桂

某室向有腹痛帶下之疾。用通經去瘀藥。獲效。詎痛雖暫止。而經水自此失常。迨至旬日一下。又旬日點滴不斷。累延半載。腹痛仍作。痛時少腹有塊。觸之則痛愈增。痛緩則泯然無跡。醫以拒按爲實。藥用通瘀。以爲通則不痛。而有形無形。置之勿論。自此腹痛愈增。無有緩時。嘔逆不止。大便不通。醫復於桃仁、靈脂中。更加大黃枳實服下。腹中窒塞。氣急上沖。咽嗌四肢冷汗時出。余視猶問巴霜丸可服否。余曰補之不暇。尚可通乎。况腹中真氣悖亂。愈攻愈散。於是以丁蔻鹿茸、茴、桔梗猛進二劑。所幸少年形體尚強。俾濁陰瀰漫之逆。藉以潛消。後加石英、杞、歸、蓀。

答。亟進。間以歸脾香滋腎丸。一月方健。緣此症多由房勞過度。衝任損傷所致。醫者不知專固奇經。反行破氣耗血。致有此逆。殊可恨也。

養正托邪益血回火法

歸脾湯

主治見前八四頁

人參 白朮 伏神 伏苓 黃芪 當歸
遠志 聚仁 木香 甘草 龍眼肉

或加丹皮、山梔、或加柴胡、白芍。

天王補心丹

治思慮過度。心血虛耗。善驚少寐。怔忡健忘。五心煩熱。口舌生瘡。津液枯竭。陰虧多汗等證。

生地 人參 元參 丹參 天冬 麥冬 聚仁 柏子仁
桔梗 遠志 當歸 五味 一方有菖蒲無五味

某內人年近六十。素多勞慮。患口瘡唇裂。頂生癩疹。久服祛風清火藥。漸至兩頰滿顱。浮爛淋漓。愈治愈劇。余視所患處悉白色。水液流注。並無穢膿。自口頰延及胸項。亦無漫腫。且喜脈象不大。肉食不喞。身亦涼。便亦利。因謂此症七惡不見。五善備陳。十分可治。但取效甚遲耳。疏方薛氏加味歸脾法。所謂養正則邪自除也。尊堂稟賦虛弱。素多勞慮。離宮自然。心火外炎。此本身元氣外越。收之養之不暇。尙可視為毒火而清之驅之乎。古云。有形之火不可從。無形之火不可殘。若能知火之邪正。則神可全。而病可卻。是生道在我矣。試觀瘡科癰疽潰後。氣血已

耗。每以補藥收功。如八診、十全、養營、歸脾之法。歷歷不爽。此豈予之創見乎。照服果安。旬日中服二十劑。其煩始斂。五十劑其功始半。但苦流注不乾。促余外藥。姑與古礦灰敷之。轉進十全保元間服而痊。

又某婦居有年。焦勞憂鬱。虛火外炎。口舌糜爛。日進清涼。虛火愈熾。余視其色甚白。脈息亦微。余謂並非外症。實皆心脾鬱結。虛火燦金。夫心主血脈。脾主肌肉。肺主皮毛。故皆受累。急當調養氣血。則虛火自藏。疏歸脾湯兼進天王補心丹。囑其多服爲要。

某項外結喉之間。忽生硬疽。醫與疏風化痰。疽形漸長。按之堅而不痛。將欲敷藥就正於余。曰。豈有不寒不熱不痒不痛乎。此症由於思慮鬱結。營衛留滯。以致氣結不行。當進益氣和營之藥。不治而治也。連服歸脾數十餘劑。其核疽自化而消。

某內人兩目紅赤。畏日羞明。左眼尤甚。眼科清火散寒。日愈難開。胃減形瘦。余思經云。五臟精華。皆上注於目。稟氣於脾。合於色脈。當推中氣久虛。五臟失稟。精不注目。虛火上炎。此內因之疾。既非發散可解。更非沉寒可清。當從甘溫瀉火法。授以歸脾加柴胡丹皮十餘劑。目赤漸退。光明如故。且從此氣充血盛。已叶孕矣。

生陰陽維法

白薇湯

人平居無苦疾。忽如死人。身不動搖。默默不知。目閉不能開。口瘡不能言。或微知之。或惡聞人聲。但如眩冒。移時方寤。此由出汗過多。血少氣升於陽。獨上而不下。氣壅而不行。故身如死。氣過血還。陰陽復通。移時方寤。名曰鬱冒。亦名血厥。婦人多有之。

白薇一兩
當歸一兩

人參五錢

甘草錢半

按訥庵先生云陰虛火旺。則內熱生風。火氣焚灼。故身熱支滿。痰陳火湧。故不知人。又曰汗出過多。血少陽氣獨上。氣塞不下。而厥婦人尤多此症。宜此湯。此方載於本草小註。每多泛泛讀過。治某婦形瘦多火。患風熱病。頭疼身痛。發熱畏寒。醫者不知風爲陽邪。寒爲陰邪。誤用辛溫發散。汗出昏厥。不醒人事。視之面紅脈大。知爲火氣焚灼。以血液衰弱之體。又值汗出過多之變。決非清降可投。蓋人身陰陽相抱。乃能動靜有常。今陽失陰守。是以陽氣獨上而不下。而爲厥逆之症。又與亡陽之症有別。法當生陰以維陽。用此湯以白薇達衝任而利陰。參歸生血液而固氣。合甘草以緩火勢。許其必效。藥下果然。

虛人泄瀉治法

七味白朮散

治一切吐瀉。煩渴霍亂。虛損氣弱。保養衰老。及治酒積嘔嘯等證。

六神散

人參 白朮 茯苓 甘草 薑香 葛根 木香

治脾胃虛弱。飲食不消。或吐或瀉。久服益氣和中。保肺生津長肥等證。

人參 白朮 茯苓 甘草 山藥 扁豆

某子夏月煩渴吐瀉。唇紅舌赤。尿短煩燥。其父自疏香薷。扁豆。車前。滑石。黃連。未服。商治於余。視其面白神慢。氣急多痰。脈息微細。顯係脾虛。非暑熱之燥。謂曰分利二便。解暑除煩。固醫門之法則。然必因人而授。因證而施。今苗穀顏色。知脾胃大虛。與此法全不相涉。斯疾唇紅舌赤者。津液因吐而上虧也。尿短煩渴者。津液由泄而下虧也。與七味白朮二劑。煩渴略減。再進六神加枸杞。十餘劑而安。凡泄瀉脾陰虧者。當仿此。若脾陽虧者。六神加乾

姜爲至穩至妥之法用者詳之

安胃理脾法

(合生津解煩意)

甲字安胃理脾方

專治吐瀉不已。陰液大耗。煩渴不寧。四體乾枯。目眩身直。狀如驚風之症。

人參 白朮 葛根 伏苓 麥冬
烏梅 半夏 赭石 覆花 早米

乙字安胃理脾方

專治吐瀉亡陰。煩渴不寧。四體乾枯。目瞪身直。形如驚風。吐雖止而瀉仍依然者。

人參 石斛 白朮 扁豆 烏梅 粉葛

早米 甘草 山藥 蔡苡仁 地骨皮

某舉子甚遲。今春末得子頗肥。奈乳食缺乏。夏中天氣燥熱。乳母不慎口腹。致兒受病。煩渴吐瀉。醫投清暑利水、生津消食之劑。愈劇。至慢驚之候。目瞪身直。四肢乾枯。求救。視其氣息奄奄。面唇青白。問其瀉下甚稀。只是乳食入口即吐。不能少停片刻。遍身如火。指尖畏冷。小水短少。口渴不止。一切敗症殊難逆挽。然此症重處正在嘔吐。口渴爲急。至於目瞪身直。都是津枯筋急之故。猶可用生津之藥。無奈胃不能受。將如之何。竊舍安胃一法。決無生理。仿仲景所謂汗下後。嘔氣不除。食不能下者。用旋覆代赭例。方中有赭石之重墜。乃安胃之最妙者。有旋覆花旋轉於上。誠爲胃虛客氣上逆之症而設。合之生津解煩。允爲定法。疏方與服。其吐瀉煩渴略止。二劑不復吐矣。仍與安胃理脾之劑。調理而痊。後遇此症頗多。悉以此法加減治之。皆得全安。

補虛清熱純甘養胃法

芪梅參桂石斛湯

治虛體營衛不諧。津液大傷。瘡發不已。汗大口乾。脈來躁亂。舌光如鏡等證。

黃芪 川石斛 人參 桂枝 烏梅

煎湯已成。另搗梨汁一杯。姜汁少許。沖服。

治孕婦九月得瘡病。寒少熱多。汗大口渴。迨至坐臥不安。勢難支持。腹胎亂動。諸醫安胎攻病。無從措手。余診脈略躁亂。舌已鏡光。面白唇紅。青筋滿露。(木邪侮土)乃津液大傷。胃火掀騰。雖年少體強。然汗後脈躁。最犯禁例。蓋恐明日瘡至。正虛邪盛。治不得法。則母子難保矣。因思胃火掀騰。而久瘡食減。芩連。決不能進。津液大傷。而土敗木賊。歸丸又難酌。投擬補虛清熱之藥。惟有純甘可採。因舉此方。照服。囑其卽服一劑。至夜備煎一劑。明天將曉再進。病者兩服後。俱云好藥。以味甘可口。與胃相適也。是日瘡竟不至。再與甘溫調理而健。謹按此症。脈來躁疾。面白唇紅。青筋滿露。若用柴芍。伐肝必斃。

收神斂液法

收神斂液湯

治汗出不禁。身熱煩躁。口乾發渴。舌光如鏡。舌邊刺燥。脈來重按無力。須以此方斂之。

黃芪 桑葉 麥冬 五味

某女產後兩旬。忽汗出二日。醫治數日。身熱煩躁。口乾發渴。余視舌光如鏡。邊刺紅燥。身熱烙指。汗出粘手。口雖

渴而熱湯不畏。脈雖洪而重按無力。可知汗血同源。內液枯涸之故。非收神斂液。勢必神喪而亡。急用芪、桑、麥、味、四味同煎。不雜他味者。蓋仿血生於氣。水生於金之意也。直進十餘劑而康。

補氣養血法

三聖湯

專治一切癰腫瘡瘍。及潰後氣血耗泄。久不收斂。必以此托補。可得排膿早斂。

黃芪

甘草

銀花

某郎自恃體質堅強。日食桃李。因患癧毒。頭項及身。大如卵者十數枚。及癧毒大潰。膿血交迸。理宜身涼安靜。反加身熱躁擾。醫者不以清金潤燥。日與柴葛知芩。胃氣益削。口渴飲水。小溲無度。用盡滋水制火之法。消渴愈熾。形羸骨立。始延余治。余曰。癧疽潰後。氣血耗泄。非補氣養血。渴不能止。處黃芪六錢。甘草一錢。銀花三錢。蓋黃芪。甘草。銀花。三藥合用。能生津液。潤肺止渴。又兼有清熱解毒之功。故名三聖。服之半月。果獲全愈。

降心火益腎水法

三才封髓丹（拔萃）

能降心火。益腎水。肺脾兼補。滋陰養血。潤而不燥。患遺精滑泄者最宜。

天冬

地黃

人參

黃柏

甘草

砂仁

治某沖年。困於酒色。陽道強而不痿。股脛痠而不堅。呻吟牀褥。百治不效。余謂此症。始則陽勝陰傷。金被火鍊。今則矯陽獨升。真陰欲盡。服藥苦寒。固謬。溫補尤非。記古降心火益腎水法。此丹最合。按方大劑令服。喜胃氣尚強。

每日服藥二碗六十劑。兩症並痊。

寒溫並用平調寒熱法

露姜飲

治氣虛體羸。食少困倦。久瘧不已。外邪已透。正氣未復之瘧。可用此截之。

人參

生姜

治某瘧發間日。寒時渴飲熱時汗出。久而弗痊。食少困倦。予診外邪已透。正氣未復。竟用截法。令煎參、姜二味。將曙卽服。瘧果不至。其內人小產後瘧。余以補血桂枝二方合劑與之。瘧雖輕而屢發不止。仍以參姜二味重用。按服其瘧亦止。某聞參姜二味。誠爲截瘧之妙藥乎。予曰非也。因子夫婦瘧邪已透。經絡無阻。但元氣未復。且中無大寒。又無內熱。參性寒。姜性溫。寒溫並舉。參補肺脾而回元。姜通神明而去穢。用以平調寒熱之疾。故藥不多味。而病已痊。

金水二臟並滋法

六味地黃湯

治腎陰不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰嗽。頭目暈眩。眼花耳聾。咽乾舌痛。齒牙不固。腰腿痿軟。自汗盜汗。便血。諸血失音。水泛爲痰。血虛發熱等證。

生脈散

熟地

淮山

萸肉

丹皮

茯苓

澤瀉

治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴汗出等證。

人參 麥冬 五味子

某子素稟木火。陰虧體質。及週季夏每多夜啼。漸至口糜舌爛。唇紅齒燥。面白頰赤。小便亦短。時忽驚叫。微有搐掣。用石膏、芩連、木通苦寒之藥。其火愈盛。前醫束手。余視果屬火症。爲何不效。正太僕所謂大熱加甚。寒之不寒。是無水也。當滋其腎。况此兒陰虧之質。純陽之姿。內火發外之症。豈六淫外入之疾者比。六味地黃湯合生脈散。數劑而安。

陰陽兩虛剛柔並進法

剛柔並補湯

專治陰陽兩虧。發熱泄瀉。飲食不甘。及久痢腹痛等證。此丸能緩胃固腸補腎益脾。

熟地 附子 枸杞 稗豆 吳萸 赤石脂 甘草 龍眼

某子夏月發熱泄瀉。醫治兩旬。氣短神倦。其熱夜重日輕。其泄日多夜少。毛髮枯槁。頤沈枕陷。唇舌乾燥。余曰陰陽二虛也。其家人曰曾服斛麥。其泄愈多。而食不進。服參朮其煩愈重。而口愈乾。余曰皆錯也。症屬陰陽並虛。藥當剛柔兩進。麥冬甘寒。非陽虛久泄所宜。白朮苦燥。豈陰虛久渴可投。酌此一方。連進而愈。

陰陽兩補濡精祕氣法

雙補收攝湯

治陰陽兩虧。脾胃交困。體瘦消渴。飲一溲二。口乾便燥。津液日亡等證。陽痿精冷。筋骨痠軟。血脉不充。亦主之。

熟地 人參 白朮 乾姜 柏杞 黃耆 蒿絲 牡蠣

五味 肉桂 鹿茸 半草 附子 桑螵蛸

某子三歲。脾胃素虧。今夏發熱口渴。醫者不知其脾虛發熱。投外感藥。其熱愈甚。其渴愈加。小便甚多。大便甚難。更醫又不究其津液。前陰已泄。致後陰津枯便難之理。投破氣潤腸藥。陡泄數次。肌肉清瘦。面唇俱白。舌光如鏡。飲水無度。小便不禁。飲一溲二。喜食酸鹹之物。亟求余視。謂曰此消渴之候。遍身肌肉血脈津液皆從二便消泄。而上愈渴。若不治其消。何以止其渴。且敗症種種。陰陽兩損。前賢已無治法。愚何敢任所恃。兩目精采尚存。聲音猶響。生機或在於此。但未審能捨此三分之命。服吾十分之藥否。曰無不信從。遂酌裁一方。陰陽兩補之意。加以滻精祕氣之藥。連服三劑而愈。以後連遇此症數家。消渴泄瀉。諸醫執用滋火之方。一經余治。悉用此法加減出入。皆獲全愈。(以龍眼蓮子湯代茶)

扶陽濟陰法

八味地黃丸

治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛寒。飲食少思。大便不實。下元衰憊。脅腹喘急。腹脹等證。

生脈散
山藥 山萸 熟地 丹皮 苍朮 澤瀉 肉桂 附子

治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴汗出等證。

人參 麥冬 五味

治某婦傷風咳嗽。用疏風清肺藥。漸至潮熱口渴。更以柴葛、知母、花粉、進之。遂面紅目赤。舌刺無津。渴汗譫語。予

固知其陽已戴於上也。而前醫尙謂傳經熱症。蓋僅知其上熱。而不知其下寒也。知其脈洪而不知其大空也。因令煎龍眼湯。効許。遂疏八味丸合生脈散。是晚進藥不輟。次早復視。俾無根飛越孤陽。纔得退藏於穴。復追進附桂理陰煎數十劑。全愈。

治某妻中氣素虛。誤表亡陽。服養榮、理中、等陽已不戴。脈亦有根。然困憊見鬼。目尚赤而口尚乾。此陰火未熄。虛陽未返。津液未生。神魂未斂。以歸脾湯吞八味漸痊。

治某小產後感冒咳嗽。面白唇燥。脈虛大。或熱或退。此產後血虛感寒。實宜補中益氣。加熟地姜炭。醫者誤進發表。卽變氣促大汗。余視其面紅目赤。耳聾譫語。脈來如湯沸騰。此陰虛陽越。勢在險篤。疏與八味地黃重附子加五味。囑急服。尙可挽回。不料其仍不服也。可惜。

某女子歸後。患瘡數月。自秋徂冬。百治不效。余視面黃肌瘦。唇淡口和。本屬虛象。閔前醫峻補。無一可投。詢其病。間日一發。或二日一發。甚或一日一發。總無定期。(此當著眼。須知脾主信。今無信。其病並不在脾胃也。)又詢發時或早或晏。亦無定候。(尤屬無信)且發時寒則身冷如冰。熱則身熱如焰。(有陰陽分離之象)口渴飲水。而赤如硃。(有虛陽外浮之擾)及診脈頗覺弦大。(當推水不生木)因謂此症全非瘡疑。乃陰陽不協。致亢龍有悔。故爲似瘡非瘡耳。處以八味。全服四劑。其瘡不治果愈。

某郎六月煩渴吐瀉。投清涼補瀉藥。漸至四肢冰冷。額腹發熱。手如數物。足忽抽掣。眼皮連劄。目珠瞓動。吐泄交作。所下白凍甚多。小便赤濁。時欲飲水。醫有疏竹葉石膏者。黃連解毒者。潔古芍藥湯者。有謂驚風不可治者。余細視其兩目。尚黑白分明。生機猶在。因再三闡其差謬。遂疏理中加附子。枸杞與之。面煎急灌回家。次早視病如前。因加黃蓍。大劑面分煎服。自早至晚。灌藥不輟。按治一日。諸風皆熄。四肢溫和。小水已長。瀉吐已止。次日煩躁之極。發出唇腫口瘡舌赤等症。衆議藥燥之誤。急於清涼。余曰未可。更用八味地黃。導其陰火而愈。數日後。復發

遍身紅腫。其家復議附子之毒。急於清解。余曰未可。更進理中加丹皮桑葉。收其浮火而痊。

陰陽兩救法

理中湯

專主傷寒太陰病。自利不渴。寒多而嘔。腹痛鴨溏。脈沈無力。或厥冷拘急。或結胸吐衄。及感寒霍亂。此湯能分理陰陽。安和胃氣。

人參 乾姜 白朮 甘草 加附子 猪膽汁

胃關煎

治脾腎陽虛。便泄不禁。津液日耗。外現熱象。脈來急數等證。

熟地 山藥 扁豆 甘草

理陰煎

治脾胃陽虛。血不歸經。崩漏血痢等證。貧血者亦主之。

當歸 熟地 黑姜 甘草

某子煩渴吐瀉。醫治二日。延診。視其眼沈頹陷。面青黃。唇紅如硃。舌紅乾刺。脈得急數無倫。睡時煩擾。此胃敗津傷。五臟精華盡發於外。中無所蓄。乃陰陽兩竭之候。誠爲死證。救陰礙陽。救陽礙陰。兩不能受。直辭無治。隨延別醫。是夜果卒。然此症倘遇相信之士。竭力挽救。以盡人功。當用理中附子豬膽汁。從陽引陰。從陰引陽。及胃關理陰二煎。陰陽兩救之法。或可回生於萬一也。

滋陰和陽養肝益心法

炙甘草湯(仲景)

治虛勞不足。汗出而悶。脈結心悸。行動如常。不出百日。危急者十一日死。

人參 蘭冬 地黃 阿膠 麻仁 甘草 桂枝 生姜 大棗 陳酒

治寒熱如瘧。某年二十。咳嗽多痰。微有寒熱。纏綿數月。體羸氣促。漸至潮熱。時忽畏寒。嗽痰食少。臥難熟睡。似成癆瘵。余見形神衰奪。知爲內損。脈得緩中一止。直以結代之脈取法焉。此陽衰陰凝之象。營衛虛弱之徵。衛陽虛則發熱。營陰凝則畏寒。蓋肺衛心營之機阻滯。氣血不得周流。故見爲結代時止之脈。諦思結代之脈。仲景原有復脈湯法。方中地阿、麥冬、滋腎之陰以保金。乃熱之猶可也。參桂、姜、清酒、益心之陽以復脈。乃寒亦通行也。服之數月。沉疴竟愈。按結代脈。必須緩中一止。方爲可治。若急中一止。便參五不調。乍疏乍數。安可治乎。故古人有警之徐行而怠。偶羈一步之語。旨哉斯言。堪爲結代之脈傳神矣。世人惟知仲景爲傷寒之祖。抑知更爲治虛勞之祖乎。

治第三載勞損。咳嗽多痰。大便常滯。呼吸急促。臥不著席。診得右脈數急。左脈遲軟。係陰液虛也。仿古救陰液。須投復脈。因與炙甘草湯百劑。逾年親謝病痊。

治某年二十。春時滿面青白。步履不前。咳嗽多痰。聲短語促。知其內傷甚重。匝月病劇。診脈弦數。時忽一止。自云別無所苦。惟少腹氣不上則已。上則心中戰慄。周身寒冷。片刻內外皆熱。沖至咽喉必咳嗽不安。諸醫服疏表藥。汗多熱重。補脾藥胸緊咳促。滋陰藥食少痰多。降氣藥氣愈升逼。余知其誤。因索紙書案。脈來弦數停止。訣稱乍疏乍數。三五不調。謂之死脈。但數而不急。此處尚可轉旋。據述氣上寒熱咳嗽等症。乃厥陰傷寒病也。緣陰精素

弱。腎氣衰微。不能領邪外達。僅依臟氣推遷。靈樞經云。厥陰之脈。自少腹上貫膈。循喉嚨。病則氣上衝心。惟其衝觸不已。故心主不安其位。見爲悸動。夫心主血脉。因營衛不調。遂悖亂失常。寒熱頓起。且脈來結代矣。若逆衝咽喉。乃肺腎脈絡之所。肝氣乘水侮金。故爲咳嗽多痰。實肝威猖獗。心主失象之象也。內經又謂主明則下安。主不明則十二宮危。可不畏哉。今欲治此。必滋腎之陰以補金。益心之陽以復腹。非剛不足以去暴。非柔何以濟剛。能識此意。方可言治。擬以炙甘草湯。滋陰和陽。養肝益心。庶肝火息而不升。則心主安而血脈復其常矣。其寒熱咳嗽。不治而治也。方中地阿、麥麻一派柔藥。濟肝之剛。乃乙癸同鄉。熱之猶可之義也。參桂姜酒一派剛藥。去肝之暴。乃木火明生。寒亦通行之義也。三劑諸苦減半。寒熱悉瘥。

益陽益氣降濁法

益氣聰明湯

治勞倦傷脾。清陽不升。濁陰不降。頭目昏暉。脈來浮緩等證。

人參

黃芪

白芍

甘草

升麻

葛根

蔓荆子

黃柏

治某清陽不升。暑月舟中風寒所客。惡寒頭痛。發表更甚。與歸附、芎芷。愈不耐。呻吟牀蓐。診脈浮緩。二便胸腹如常。聞所苦。惟頭痛。問畏寒亦惟點額。問飲食則曰。腹中難過。得食稍可。又不能多食。所以呻吟也。此中氣大虛。清陽不升。濁陰不降。以致頭痛不息。過辛過溫。非中虛可宜。本可補中益氣。但因前藥辛溫過亢。腎水被劫。故舌胎滿黃。小水短赤。改用此湯一劑而愈。

升陽開鬱降氣法

三奇散

治中氣虧虛。肝氣拂鬱。兩脅滿痛。脈來緩大。婦人少腹重墜。月經停閉等證。

黃芪 防風 枳殼

某青年寡居多鬱。素有肝氣不調之患。今仲秋大便下墜。欲解不出。醫用疏導藥。並進大黃丸。重閉愈增。(氣虛可驗)兩脅滿痛。(非補中可投)脈浮大而緩。(風邪確據)飲食不進。四肢微熱。(中虛可知)小水甚利。月經不行。(蓄血之症)據此諦審。不得其法。細思獨陰無陽之婦。值此天令下降之時。而患下墜之症。脈來浮大且緩。係中氣久傷。繼受風邪入臟。無疑。兩脅滿痛。肝氣鬱而不舒。惟有升陽一著。四肢獨熱。亦風淫未疾之義。月經不行。乃風居血海之故。執此陽氣下陷。用三奇散加升麻。以提陽氣。復入當歸。少佐桃仁。以潤陰血。果應手而痊。

升提法 升發脾陽法

升陽散火湯(東垣)

治溫邪失表。風熱內蘊。抑遏於中。苗竅盡閉。昏沈躁擾。脈來浮數等證。痧痘癰陷。毒火內閑。喘急躁煩等證。亦主之。

葛根 柴胡 羌活 獨活 防風 人參

升麻 白芍 甘草 生姜 大棗

治濕熱內攻。起初遍身瘡疹。形如麻粒。誤以涼血託裏之劑。瘡隱而濕熱內攻。惡寒發熱。頭痛身疼。(表邪確據)延醫又誤瘡。投清脾飲。以致寒不成寒。熱不成熱。人事昏惑。絕粒不進。按脈浮數。問之不應。捫之身熱。視之唇舌

俱淡。此風熱內蘊。抑遏於中。若再不外達。勢必內攻臟腑。機竅僵閉而斃。當與升陽之藥。提出肌表。服二劑。遍身發熱。躁擾不安。問之能答。神識將清。且粥飲亦進。胃氣有權。即是吉兆。夫躁擾不安者。正邪氣外達之徵。明日毒氣外出。則內可安。更與辛涼解表法。以人參敗毒散二劑。果瘡疹盡發。形如棗豆。再與前法。脅皆灌膜結痂而安。仍與清散藥而健。

某先生患瘧兩月。諸症弗效。問日一發。獨熱無寒。口不渴。身無汗。自覺熱從骨髓透發肌表。四肢如焚。捫之烙手。視舌潤脈又沈遲。繕思果屬瘧瘧。安得脈不弦數。口不作渴。且神采面色不爲病衰耶。此必過食生冷。遏抑陽氣於脾土之中。陽既被鬱。鬱極不通。而脾主信。故至期發熱如瘧也。必使清陽出上竅。濁陰歸下竅。則中焦之抑遏可解。與升陽散火果汗出。便利而安。

又某病瘧。脈象形色悉同。惟獨寒無熱。三月不痊。察其溺短無汗。知爲外寒內熱。伏火畏寒之症。蓋火鬱土中。而脾土主信。故至期如瘧。惟有發之一法。亦與此湯愈。按此二症。一寒一熱。俱用此湯。無非升發脾陽。與古人腎氣湯治消渴溺多。又治水腫溺少。一開一闔。無非蒸動腎氣。非深造微妙者。難與語也。

疏肺益氣升陽降陰法

升陽益胃湯(東垣)

治脾胃虛。怠惰嗜臥。四肢不收。時極濕熱。體重節痛。口乾舌燥。飲食無味。大便不調。小便頻數。食不消。兼見肺病。灑淅惡寒。慘慘不樂。而色不和。

羌活	柴胡	防風	獨活	黃連	白芍	人參	白朮
茯苓	甘草	陳皮	半夏	黃芪	澤瀉	生姜	大棗

照方每服三錢。在早飯午飯之間。羌、柴、防、升三陽經氣。獨、連、芍、瀉三陰鬱熱。佐六君和脾胃。其分量獨重於參、芪半草者。輕於健脾。而重於益胃。其升陽藥銖數少。則易升。仍宜久煎以厚其氣。用於早午飯間。借穀氣以助藥力。纔是升胃之陽。至荅澤。若小便利不淋勿用。因此是滲泄主降。非升陽也。

某甥秋盡咳嗽。氣急微有寒熱。服參蘇敗毒。如故。改瀉白一劑。小水短濶。身漸腫滿。與導濕利水、腹脹氣促。竊思表散不除。清裏反逆。固非盡屬實邪。又脈來弦數鼓指。唇皺紅舌灰白。此豈盡屬於虛。其中錯雜。非一途可盡。然既見寒熱咳嗽。氣急尿短。膚脹。無不關乎肺臟。肺氣受病。既不服表散。更不容清裏。其挾虛也審矣。况時值秋盡。燥金已虛。天令下降已極。人身莫不應之。肺虛便衰。其護衛失其治節。護衛衰。風寒得以外鬱。治節失。濕熱藉以內停。由是閉而不行。而肺家通調下輸之權已廢。邪氣正氣。清濁相混。窒塞於中。無由輸泄。只得遍溢皮膚。再加瀉肺利藥。以致陽愈下陷。陰愈上沖。故見腹脹氣急。診其脈來數急者。乃陰火上沖之明徵矣。法當疏肺益氣。舉陽降陰。爲法中之法。不能缺一。初欲仿補中益氣。加知柏之屬。雖有舉陽降陰益氣之能。卻少疏肺開鬱之力。後悟東垣之法。直取其方。加入黃柏一味服之。小水倍常。乃降陰潔淨府之驗。連服十劑。諸症悉痊。愈後遍身發瘡癩。可見裏蘊之熱。久被表寒外束。乃至內外交鬱成毒。緣得開鬼門之藥。逼其外出。不致內陷之明徵也。方中參、朮、芪、草、益氣升陽也。柴、陳、羌、獨、防風。升陽疏肺也。荅、瀉、連、柏。降陰導濕也。白芍、斂陰和血。散中有收。姜、荳、調和營衛。補中有散。一舉而諸法兼備。可謂先得我心矣。夫人知利藥可去濕。而不知風以勝濕。人知破氣以消腫。而不知益氣以收腫。又知發表以散邪。而不知升陽亦散邪也。外此以及通因通用。寒因寒用。寒因熱用。熱因寒用。上病下取。下病上取。陰病取陽。陽病取陰。醫家諸法。最當熟諳。倘學者能類推其餘。則於諸症皆可得法外之法矣。某郎患瘡敷藥。瘡愈發腫。飲食二便如常。醫不識爲瘡蠱之症。無非五苓平胃等劑。漸至下腫尤甚。囊若水晶魚泡。呼吸不利。余思邪氣內陷。必當提出於表。又思病甚於下者。當從舉之之義。乃與升陽益胃按投二劑。寒熱頓

起似瘡。其家驚怖。余曰。向者邪氣內陷。今已提出。乃得表裏交爭。方有寒熱相戰。不致內結。正佳兆耳。仍令再進。計十劑始消。噫。世人但知熱退爲病愈。抑知發熱亦爲病愈乎。按此症與服敗毒散之小兒俱在表不在裏。故飲食二便無恙。一則表實上壅。一則表虛下陷。表實非發汗不解。表虛非提邪不達。某先感風寒。繼以飲食不節。遂至腹脹面足俱浮。上半身時潮。下部足膝常冷。目黃尿閉。本屬寒濕結聚。因重與柴苓湯加蘇葉。連進數劑。小水便利。面部及兩手略消。而下半身及腹愈加腫脹。氣愈急促。蒸囊光亮。腫若魚泡。因思明是風寒外鬱。飲食內傷。理宜和解利濕。合乎開鬼門潔淨府之意。何上消而下愈腫。忽悟此症雖屬外鬱。內停實由脾胃失健運之權。中焦無升發之機。藥味滲洩過重。下降至極。必當升舉其陽。合乎下病舉之之義。方爲至理。曾記東垣有自病小便不通。謂寒濕之邪自外入裏。則甚暴。若用淡滲以利之。病雖卽已。是降之又降。反益其陰而重竭其陽也。治以升陽風藥。是爲宜耳。斯症寒濕內聚。積結。胃陽下降不化。法當用其方名曰升陽益胃湯。善者方之名也。不升陽何以能益其胃乎。一劑卽效。連劑而安。

某子三歲。自春至夏。肌膚熇熱。形體瘦極。慘慘不樂。大便泄瀉。每多鮮紅。醫投涼血泄瀉愈頻。又與四君。潮熱愈甚。口愈渴。余視其慘慘不樂。似屬陽氣不舒。且潮熱無汗。而雖白而帶青。舌雖淡而頗紅。再視所泄之糞。逾時愈青。此必風邪鬱於土中。正春傷於風。夏生飧泄之症。因風邪內擾。則營衛不固。而血液逆流。致陽氣愈陷矣。仿經旨。下者舉之之義。與升陽益胃數劑。安。

太陽救逆法

桂枝湯 加附子

治太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以伸屈者。

桂枝 白芍 甘草
生姜 大棗 附子

某郎半歲。肌膚嬌嫩。一日傷風。鼻塞咳嗽。醫投二陳、蘇防。得汗。卽嗽不出。氣急神揚。尙以不嗽爲效。不知外感。以有嗽爲輕。無嗽爲重。又誤進蘇子枳殼。下咽未久。忽目珠上瞪。四肢抽掣。又誤進鎮驚丸。諸醫因小水短少。更與疏風藥。加入淡滲之味。病急未服。懇余治。余疏桂枝附子湯與服。爾時變症愈出。忙煎與之一劑。而風痙自止。再劑而諸恙悉瘥。仲景云。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。此湯主之。蓋此兒陽氣素微。汗之有亡陽之變。夫汗爲心之液。四肢爲諸陽之本。小便爲陽氣之化。誤汗陽越於外。津弱於裏。營衛將離。機關大亂。是皆太陽陽亡之象。亦誠危矣。欲返太陽之陽。必當循經引治。故以桂枝色赤屬火入心之品。用附子以補心腎之陽。元府不密。賴白芍酸以歛之也。津弱筋急處。甘草以緩之也。營衛不諧。藉姜棗以和之也。一方妙用。乃仲景之深心。正爲太陽救逆之法。舉世徒事驚風之說。千中千死。總由不究六經之義耳。

汗法(一)

麻黃湯(仲景)

治太陽中寒頭身俱痛。發熱無汗。惡風而喘等證。

麻黃 杏仁 桂枝 甘草

治肢體怠惰。頭腰重墜。通身帶浮。面黃唇舌指爪皆白。二便如常。此太陽病未經發表。邪陷肌膚之中。非濕熱發黃之證。脈得三部浮緊而數。時或喘咳。過服黃疸草藥。頭上如蒙。腰間愈重。四肢忽麻。胸前時緊。服此湯加厚朴四劑。每劑令啜熱稀粥。以助藥力。俱得微汗。頭腰方輕。症稍減。然脈象仍如前。與五積散一料始愈。

汗法(二)

麻黃連翹赤小豆湯(仲景)

治傷寒瘀熱在裏。身必發黃。此主之。

麻黃 連翹 杏仁 甘草 赤小豆 生姜

大棗

治新婚匝月。得太陽傷寒病。頭痛發熱。畏寒。誤補邪無出路。骨節疼痛。滿頭大汗。熱蒸面目。小便俱黃。幸脈無陰。象腹無滿結。胸無嘔噦。原仲景有太陽病失汗。一身盡痛。頭汗發熱而黃者。用此湯。蓋發汗利水。令鬱拂之邪。表裏兩解之意耳。

虛體汗法

(補法
加黃芪名黃芪建中湯(補土制肝法))

建中湯(仲景)

治虛勞裏急。悸。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾口燥等證。

桂枝 茯苓 大棗 生姜 甘草 飴糖 或加當歸

治寒邪傷營。汗之不應。連進發表。皮膚乾滯。發熱愈熾。關弦尺遲。面白露筋。乃中氣虛而血不足。故寒邪外感。非滋其血液。何能作汗。汗既不出。熱何由解。宜與當歸建中湯。且糖乃米穀所造。所謂汗生於穀也。如法啜之。果微汗熱退而安。

治某石匠。夏咳秋甚。胸緊氣促。似屬傷寒感冒。然無寒熱舌胎之據。且聲音面色俱屬不足。此勞傷中氣。土不生金。金氣衰餒。氣耗咳嗽無疑。惟胸緊氣促。參朮難以驟進。姑先與建中三服。稍安。再加參芪歸芍。數劑痊。

治泄瀉不食。某母素體虛弱。頻年咳嗽。衆稱老癆不治。今春大咳潮熱。腹瀉胃呆。醫進參、朮、熱甚。用膠、地、而泄瀉胸緊尤甚。時當六月。予診脈俱遲軟。時多歇止。如徐行而怠。偶邁一步之象。知爲結代之脈。獨左關弦大不歇。有土敗木賊之勢。因思諸虛不足。當補之以味。但補脾胃之法。前轍可鑒。然舍補又無別法。因悟各臟俱虛之脈。獨肝臟自盛。忽記潔古云。假令五臟勝。則各刑已勝。法當補其不勝。而瀉其勝。重實其不勝。微瀉其勝。此病肝木自盛。脾土不勝。法當制肝。直取黃芪建中湯與之。蓋方中桂芍微瀉肝木之勝。甘糖味厚。重實脾土之不勝。久病營衛行濶。正宜姜棗通調。且姜以制木。棗能扶土也。用黃芪補肺者。蓋恐脾胃一虛。肺氣先絕。數劑得生。但掌心微熱不除。且口苦不寐。咳瀉雖止。肝木猶強。原方加入丹皮。重瀉肝木之勝。再劑而安。

治某腹痛下痢。紅多白少。醫以腹痛爲積。紅多爲熱。進消導不應。與芩、連、歸、芍、潮熱時起。下墜難支。余診左關弦大之至。唇舌雖紅。然不喜茶水。知爲勞傷中氣。以致營衛不調。蓋營虛則血不藏。衛虛則氣不固。而爲下痢紅白也。加之苦寒迭進。致令虛陽外擾而潮熱。中氣內傷而下墜。意擬理中焦之陽。使氣血各守其鄉。但脈無沈細。且有弦大。又兼腹痛。據症按脈。斯制木補土提氣三法。在所必施。與黃芪建中加姜炭四劑始安。後與附桂理中加固脂鹿茸十劑健。孰謂下利膿血定爲熱耶。

某婦素陰虧。常宜班龍丸。無病求診。予曰。脈來弦緊而沉。有凝滯之狀。腹中必有宿食。秋深恐成痢疾。但伏邪未潰。且可久居腸胃。其臟氣之虛實可知。既不可以暴攻。只得令其自散。以四君子加枳殼服一劑。腹中略響。正邪氣緩散之徵。詎婦爲既有滯積。竟服濃薑茶一碗。腹中絞痛難堪。下利數十行。頭身大熱。十指微冷。急延予商。所述所誤。蓋微積久伏腸胃。素薄可知。得此薑茶刮決之物。豈不大張其勢。然至圊雖勤。所下甚少。餘邪尚存。而未盡。既已誤治。惹動其邪。不如乘其元氣未敗。再與疏通。盡驅其邪。更以小劑行氣之品。一服瀉下。腹痛略減。但潮熱肢冷未除。次早問所下何物。曰一團白沫。隱然秋深腸澼之徵。此時人事困頓。脈仍弦緊。是知當理陽氣。投建

中湯。以大建中立中氣。弗投理中。以復削其陰氣。與金匱小建中湯。其症悉痊。
某內小產後。腹痛夜熱咳嗽。醫作療治。遂腰屈不伸。痰多食減。又以理中四物投之。致夜熱大作。少腹極痛。脈來
遲緊帶弦。余曰。此中虛而血寒也。四物泥膩。非痰多食減者所宜。理中壅燥。豈夜熱咳嗽者能任。遂疏黃芪建中
湯而安。

虛人外感法

麻黃人參芍藥湯(東垣)

治虛人肺癆感寒。且有咳血。咳嗽喘息。必須解外。此方主之。

麻黃 桂枝 人參 麥冬 五味 黃芪 當歸 藥芍 半夏

治咳嗽吐血。爲冬月衣被單薄。就爐向火。而嚴寒外束。虛熱內蘊。漸致嗽血。誤服養陰藥。遂至胸緊減食。臥牀不起。脈六部俱緊。重按無力略弦。無數大之象。密室猶惡風。厚被猶寒凜。明是風寒兩傷之病。若不疏泄腠理。則肺氣愈鬱。邪無出路。法當奪汗。則血可止。經曰奪血者無汗。奪汗者無血。奈體虛加以勞心過度。不敢峻行麻黃。然肺氣久閉。營分之邪。非麻黃何以驅逐。考古惟東垣此方。原治虛人吐血。內蘊虛熱。外感寒邪而設。與服一劑。微汗血止。再劑神爽思食。改進異功合生脈調理而安。亦仿古治血症以胃藥收功之意也。厥後遇有惡寒脈緊咳嗽痰血者。悉遵此法。皆獲全効。

托邪止嗽法

參蘇飲

治感冒風寒。頭痛發熱。憎寒欬嗽。涕唾稠黏。胸膈滿悶。脈弱無汗等證。

人參

蘇葉

半夏

陳皮

桔梗

枳實

茯苓

甘草

乾葛

前胡

木香

生薑

大棗

止嗽散

治咳嗽喘息等證。

鴻白散

桔梗

甘草

橘紅

百部

紫苑

白前

治肺熱欬嗽。喘滿腫嗽等證。

桑皮

地骨皮

甘草

粳米

治某年逾五十。形偉體強。忽患潮熱咳嗽。醫稱血因火動。連進寒涼。漸至胸緊頭疼。飲食愈減。咳紅日促。脈象緊數。且病經數月而形神未衰。聲音猶重。肌膚雖熱而厚衣不除。久病面色蒼黑。頭痛時似錐刺。內外諦審。並無內傷確據。一派外感明徵。伏思表邪入陰。擾亂營血。必當提出陽分。庶幾營內可安。以參蘇飲除半夏。加入止嗽散。與服二劑。助以熱粥。微汗。頭疼減。潮熱息。以後加減出入。不越二方。或增金匱麥冬。或參白散。調理一月。藥僅十服。沈疴竟起。

開肺祛寒法

烏藥順氣散

治肺氣閉塞。水濕蘊肺。聲瘡無汗。喘急碍臥。胸痞腹痛。上身畏熱。下身畏寒等證。

烏藥

桔梗

橘紅

枳殼

麻黃

桂枝

川芎
乾薑白芷
甘草葱白
生薑

治溫熱病瘡。半月後因怒復發。聲音悉閉。問其苦否。但點額搖頭。其心地尚明。惟啞不能聲。腰以上發熱去被。揚手摸胸。腰以下畏寒厚覆。兩足僵直。診脈寸部浮數。尺中緊滿。似乎上下阻截。原其病之所受。全在於肺。法宜先開肺氣而祛寒。使氣宣通。熱得下流。而胸結可散。疏方先以此散一劑。比曉遍體微汗。下身發熱減。腳可屈伸。胸前亦寬。惟音雖出。猶啞而不清。繼進瀉白散合白虎加桂枝湯。瀉熱清肺。乙劑病如失。

表散風寒濕邪法

五積散

治寒濕入絡。血瘀氣痞。頭脣重墜。四肢重痛。且覺麻木。通身浮腫。指爪皆白。或喘或欬。脈來浮緊等證。

白芷

陳皮

厚朴

當歸

川芎

芍藥

茯苓

桔梗

蒼朮

枳殼

半夏

麻黃

乾薑

肉桂

甘草

葱白

大棗

治農工暑月發熱畏寒。未藥已痊。漸次肢體怠惰。頭腰重墜。通身帶浮。面黃。唇舌指爪皆白。二便如常。此太陽病未經發表。邪陷肌膚之中。非濕熱發黃之證。脈得浮緊而數。時或喘咳。四肢覺麻。胸前時緊。先服麻黃湯四劑。微汗。頭腰輕。因脈象仍如前。服此散一料藥完病愈。

辛涼解表法

亦爲清解法

辛涼清溫湯

治風溫犯肺。發熱口渴。咳嗽眩暈等證。痧疹初起。亦可以此方透之。

葛根

薄荷

防風

杏仁

連翹

通草

白薇

甘草

治風溫表邪蓄熱。內侵經絡。外徹肌膚。清溫而不阻風之出路。驅風而不助溫之暴瘡。庶內外之邪表裏兩解。若犯香蘇羌獨葱薑陳半。是以溫治溫。故在禁耳。

啓皮毛開肺竅法

蘇杏越膚湯

專治通身浮腫。氣急碍臥。無汗溲閉。胸腹脹滿等證。

人參敗毒散（活人）

治傷寒溫疫。風濕風眩拘踳。風痰頭痛目眩。四肢痛。憎寒壯熱。項強睛疼等證。

人參

川芎

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

茯苓

甘草

薄荷

生薑

某內人初冬。忽遍身浮腫。小溲不利。服利水消導藥。脹滿日甚。氣急不能著枕。視其形色蒼赤。脈象浮大。獨肺部沈數。舌胎灰黃。以蘇杏防薑四味。連進二劑。氣急稍減。再與敗毒散加入生黃芪與服。小水通。腫脹遂消。緣此症時當秋盡。肺氣消索。天氣暴寒。衣被單薄。風邪內入。肺氣窒塞。致失清肅之令。又無轉輸之權。水邪泛溢。充斥三焦。故啓其皮毛。疏其肺竅。合內經開鬼門之法。蓋腠理疏通。天氣下降而水氣自行也。

清嗽去熱止瀉法

戊己丸

治肝脾不和。濕鬱氣滯。脘腹作痛。吞酸嘔吐。熱痢熱瀉。納穀不化等證。

黃連 吳萸 白芍

瀉白散

治肺熱咳嗽。喘滿腫嗽等證。

桑白皮 地骨皮 甘草 糙米

生脈散

治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴出汗等證。

人參 麥冬 五味

某女寒熱咳嗽。腹痛泄瀉。醫不知痛一陳瀉一陳屬火之例。木強反剋之理。妄用消耗之劑。漸至面涼氣促。食減羸瘦。又誤進耆朮之藥。潮熱愈重。痛泄愈多。延綿兩月。衆謂童勞難治。乞余診之。先與戊己湯二劑。痛泄頓止。繼以瀉白散合生脈湯二劑。潮嗽皆安。

微苦微辛開降肺氣法

瀉白散

主治見一〇九頁瀉白散

桑白皮 地骨皮 甘草 糜米

降氣開鬱湯

治肺氣閉塞。二便阻隔。氣升呃逆等證。

紫苑 杏仁 蕤皮 桑葉

柿蒂

某媳秋深患瘡。無汗。一日大衄不止。余視乃風溫暑熱合而爲瘡。迫蒸營中。以致營中擾亂。血行清道故也。然血爲紅汗。瘡邪當從衄解。惟衄血過多。神氣昏倦。令取茅根一握。入龍眼二十枚。同煎飲之。其衄遂止。但肺氣未肅。疏瀉自散。令其再進。其家因次日瘡止未服。越數日忽寒熱如瘡。牙關不開。二便阻閉。氣升呃逆。諸醫稱中風重症。無從措手。余至視之。知爲肺氣鬱滯。因慰爲病輕。一劑可愈。疏苑杏蕤桑葉之屬。另浸烏梅擦牙。牙開進藥。頃刻二便通利。呃逆頓止。

苦辛開降肺氣法

杏仁冬桑湯

治肺氣急閉。驟發呃逆。喘息上氣。面紅神昏等證。

杏仁 八錢 枇杷葉 二錢

某食犬肉。大熱腹痛。服巴霜丸。潮熱不退。口渴妄言。更醫進柴葛、石膏、芩連、大黃。忽發呃逆。又進丁香、柿蒂、呃逆愈甚。余視目赤舌乾。便閉。本屬實火。正思議間。忽聞大呃數聲。睜目直視。滿面紅赤。昏不知人。舉家大哭。適悟天氣不降。地道不通之旨。惟有苦辛開降肺氣一法。乃用杏八錢。杷三錢。忙煎與服。下咽未久。噯氣一聲。腹內雷鳴。再與前藥。二便通利遂安。竊思此症暴厲驚人。若非胸有定見。殊難下手。經云欲伏其所主。必先其所因。可使氣

和可使必已。一段經旨不可爲此治之明證乎。

疎肺瀝臟法

小承氣湯

治汗多微發熱。不畏寒。或小便數而大便硬。讌語者。與此湯微和胃氣。

熟草

厚朴

枳實 加蘇子、芥子、萊菔子、杏仁、黃芩、山楂。

木香檳榔丸

能疎導三焦。快氣化痰。消食寬中。泄瀉痢疾。裏急後重。二便不通。食痞實積等證。

木香

檳榔

青皮

陳皮

枳殼

香附

黃連

黃柏

大黃

芒硝

莪朶

山稬

牽牛

某郎八歲。體素堅實。章膩雜進。以致面浮腹脹。脚腫喘促。猶恃強勿藥。漸至鼻血譖語。便艱溺短。醫用翹荅枳壳套藥。胸前愈緊。脹滿愈加。四肢倦怠奄奄一息。余診知爲停食。中焦轉輸未能。以至肺氣壅塞。蓋脾主運行。肺主治節。二臟俱病。勢非輕渺。此症五實全具。非下不降。以小承氣湯推蕩臟腑壅塞。加以疏肺瀉熱藥數劑。始消後因誤食索麩。脹滿復作。喘促仍加。與木香檳榔丸數服卽清。隨以六君子湯加草果、枳殼調理而愈。

辛涼解表法（汗法）

人參敗毒散（活人）

治傷寒溫疫。風濕風眩拘踐。風痰頭痛目眩。四肢痛。憎寒壯熱。項強頸痛等證。

人參 川芎 羌活 獨活 柴胡 前胡
枳殼 桔梗 茯苓 甘草 薄荷 生姜

治風熱內蘊。遍身發熱。躁擾不安。邪氣將欲外達之徵。服二劑果瘡疹盡發。形如棗荳粒。再與升陽散火湯。瘡皆灌膿結痂而安。後與清散藥而健。

某內人初冬忽偏身浮腫小溲不利。服利水消導藥。脹滿日甚。氣急不能著枕。視其形色蒼赤。脈象浮大。獨肺部沈數。舌胎灰黃。以蘇杏防風薑皮等進二劑。氣急稍減。再與敗毒散加人生黃芪與服。小水通。腫脹遂消。緣此症時值秋盡。肺氣消索。天氣暴寒。衣被單薄。風邪內入。腠理閉遏。營衛不通。肺氣愈寒。致失清肅之令。又無轉輸之權。水邪泛溢。充斥三焦。故啓其皮毛。疏其肺竅。合內經開鬼門之法。蓋腠理疏通。天氣下降。而水氣自行也。某郎腋下腫痛。將欲成毒瘡。醫敷藥愈。忽遍身微腫。其飲食二便如常。幼科用消導利水藥。倏頭痛潮熱。腫勢甚急。腎囊腫大。狀若水晶。飲食頓減。神氣困倦。余謂五行之速。莫如風火。蓋因氣血凝滯。始發癰毒。未經疏散。氣血不宣。加以寒冷抑遏。致令邪氣內攻。凡陽氣被鬱之症。必當疏通經絡。啓發皮毛。庶肺氣宣達。外則腠理舒暢。內則水道通調。原肺主一身之氣化也。今肺氣窒塞。與消導利水。理脾行濕。何與疏方。以此散加蘇葉、防風、苦杏仁。助以熱稀粥。今其皮膚津津。連服二劑而消。

治內伏風火法

透鬱湯

治風火內伏。因感猝發。嘔吐煩渴。焦哭不安。熱鬱成驚等證。

石斛 麥冬 知母 桑葉 枇杷葉 丹皮

薄荷

荆芥 後加生黃芪、金銀花。

某郎素稟陽藏。形骸骨立。暑月焦哭不安。漸至煩渴。因而吐瀉。醫不察其吐瀉由煩渴而來。并不察其煩渴爲陽藏所生。誤以藿砂、燥胃參、朮、補脾。乃至手足搐搦。角弓反張。余視其頭毛作穗。獨左腦側隱隱覺高。知爲火毒內攻。熱盛生風之候。所喜腫色隱隱尚紅。許以可治。疏方以石膏爲君。合知、麥、桑、杷、丹、薄、荆、芥。服下。風痙火緩。吐瀉頓止。隨加生黃芪、銀花。再劑其左腦側。果高腫聳突。神識清爽。乳食寤寐如常。尚有微熱微渴。更以清胃疏風、排膿、託毒之藥。服至十餘日外。膿出而安。此症蓋察其陽藏爲患。而陽藏多火與焦哭之症相合。漸至煩渴吐瀉。較之陰藏猝然吐瀉者大不侔也。經云暴病非陽。久病非陰是已。且小兒風火內伏之症。吾嘗悟出治法。成效可紀。況彷彿仲景熱下陷。嘉言逆流挽舟之法而變通也。試觀小兒夏月之病雖多。然有瘡癰者少病。無瘡癰者多病。况瘡癰出則吉。不出則凶乎。

導濕疏風清燥法

導濕疏風清燥湯

治寒濕入絡。手足痺痛。血燥筋急。小水短赤。發熱畏寒等證。

荆芥 黃柏 桂枝 白芍 靈仙 防風

山梔 防己 甘草 生薑 大棗 寒水石

某子十歲。藜藿之兒。血燥之體。忽發熱惡寒。小水短赤。腹中甚痛。醫誤食積消毒。次日足不能移。並無紅腫。撫之慘痛。痛聲驚人。甚至口渴反張。醫又誤驚風。連進鎮驚抱龍等丸。病日漸重。余曰素稟血燥。其筋易急。先必涉水濕入內。繼必傷風。寒濕相搏。客於經絡。名爲痛風。非病症也。當與導濕疏風清燥之藥。如法治愈。此亦治病相體。

之一驗也。

解肌清熱法

甲字辛涼解肌湯

治溫邪內陷。發熱肢冷。躁口渴。吐瀉交作。勢作成瘡等證。

連翹	乾葛	防風	薄荷	知母	丹皮
木通	山梔	甘草	燈心	灶土	

清養胃陰法

生津養胃湯

治大吐瀉後。津亡口乾。或病後陰虛。脾胃衰弱。宜用此方調理之。

洋參	石斛	桑葉	麥冬	茯苓	薏仁
			甘草		大棗

某孫暑月吐瀉。發熱肢冷。躁擾口渴。醫以藿香、砂仁、陳皮、半夏、烏梅、扁豆進之。不知辛溫之藥已爲揚湯止沸。再加烏梅扁豆。固濡鬱火。迨反張直視。已無生機。余細視面色。旣非虛寒。亦非實熱。不決辭治。其家堅留察其滿頭癩毒。概已醫陷。惟左腦後大癩尚隱隱若紅。且腦側及項。漫腫頰濶。(主腦在此)余謂此兒生機或在於此。蓋風熱內蘊。未得外達。勢必內陷。擾亂腸胃。以致吐瀉交作。而爲霍亂之症也。醫者不知風爲陽邪。寒爲陰邪之理。概以風寒稱之。更不知辛涼幸溫之別。風火之病。誤以辛溫邪火內迫。筋膜乾急。則反張抽掣。近世不察者多。更治以抱龍牛黃等丸。勢不竭絕不止。疏方翹葛防薄知丹木梔甘草燈心灶土與服。乃孫不知藥苦。(口渴之故)

立時服畢安睡。吐瀉漸稀。風痙亦息。次早復視。兩癟高聳。仍與前藥二劑。小水甚長。吐瀉頓止。其家見頭項愈腫爲慮。前方除山梔。加參耆貝母二服。果得大膿腫消。後以清養胃陰之藥。洋參石斛。麥冬。茯苓。薏仁。甘草。大棗。桑葉。之屬而痊。

乙字辛涼解肌湯

治風溫內陷。變生流丹。吐瀉交作。發熱肢冷。身痙神昏。宜用此方透出。流丹不致內陷生變。

防風	乾葛	連翹	赤芍	蘇葉	白芷
半夏	黃連	甘草	燈心	灶土	

某孫吐瀉交作。發熱肢冷。醫以藿、半、辛溫之藥。致發剛痙。察其舌刺脣裂。皮膚隱隱帶紅。余謂此症。風火伏於血分。名爲流丹不達。內攻藏府。告變最急。症亦同前。連翹、乾葛一方。加丹皮、荆防。果得遍身紅赤。與疏風涼血安。某子半歲。大暑發熱。嘔吐泄瀉。色青。口渴飲水。溫涼補瀉雜投。漸劇。視之舌時外舐。胎現黃滑。脣紅帶縞。噫急氣促。且通面火光炎炎。炎時忽驚怖。顯屬熱症。理宜前醫清劑可效。爲何不應。更視其瀉色純青。知有風邪夾雜其中。其實熱蘊於表。風陷於裏。所以揮霍撩亂而爲上吐下瀉。理宜從感冒而治。法當風邪達之於表而出。令熱邪歸之於裏而下。則表裏清而上下和。不治吐瀉而吐瀉自止。表邪清則熱可退。裏邪清則渴可除。遂疏防風、乾葛等一方。下咽遍身發出紅塊。如丹癰甚癢。此名瘡瘍風。乃風熱久客。內蘊成毒之驗也。再二劑諸症悉痊。然此症若不如此體認。爲之解肌清熱。其丹決不能出。必致閉毒而死。後學當知取法焉。

甘露飲

黃芩	茵陳	枳殼	麥冬	天冬	石斛	生地	熟地
甘草	杷葉						

治丈夫小兒胃中客熱。牙宣齒爛。目垂欲閉。饑不欲食。及目赤腫痛。口瘡咽腫。瘡疹已發。又療脾胃濕熱。醉飽房勞。黃疸腹滿。或時身熱。並宜服之。

某子三歲六月吐瀉口渴煩躁。醫以藿香正氣。煩熱愈熾。吐瀉愈急。(可知不受辛溫之藥)余視面色皮膚俱蒼黑。二便苗竅俱有熱象。而腦後數癤。色晦不紅。已有陷狀。遍身雖熱。而指尖略有厥意。(此是熱深厥深)脣乾齒燥。揚手擲足。(熱邪確據)其家以爲驚風。欲與抱龍牛黃等丸止之。余知風火擾胃。癥毒因吐瀉內陷。急重用防風連翹。再劑腦後癥毒高突。出膽始安睡。再與甘露飲二劑。吐瀉頓止。熱退而安。須知風火內蘊。擾亂胃中。故見吐瀉交作。必使風火外達。庶幾中土安謐。胃氣一清。吐瀉自息。此症頗多。古罕發明。宜留意焉。

丙字辛涼解肌湯

治風溫失表。瘡癧隱陷。煩渴吐瀉。厥逆成瘧。宜用此方托之發之。則瘡起邪亦散矣。

人參

黃芪

荆芥

防風

連翹

白芷

木通

甘草

燈心

灶土

某子週歲暑月煩渴吐瀉。醫投柴葛蒼半四肢厥逆。角弓反張。余視其滿頭癩癧。已將醫陷。且頭項胸膈攢發天疱。大如龍眼。小如豆粒。俱平陷。知爲毒氣內攻。辭不治。病家再四挽留。惟左耳一竇。尚屬鮮紅。生機僅在於此。疏以參耆。荆防。翹芷。木通。甘草。燈芯。灶土。藥下四肢漸溫。耳竇出膿。煩渴吐瀉減半。晚視令前方重參耆。再進。次早又視。煩渴吐瀉頓止。天疱略起。生氣勃然。許以無憂。蓋風火透於外。腸胃得安也。然肝木尚旺。經絡不舒。故四肢搐掣未息。復將前方除荆芷。加鉤藤。羚羊米仁。菉豆殼。疏風清熱。囑其再服。其家見霍亂已愈。風痰未息。自取牛黃。抱龍與服。天疱一時自破。(原此二丸俱有麝片)角弓復震促。余再視。昏沈不醒。蠅集不去。事不可爲。嗟嗟。余焦思勞神。功虧一簣。惜哉。

某郎陽臟多火。煩渴吐瀉。病因乳母冒暑赴席。醫以夾食傷寒治之。大熱躁擾。蓋暑邪內攻。反以辛散溫胃。而火愈熾耳。視其頭面癤瘍已變平黑。氣急神昏。齦齒咬牙。舌胎黃刺。口渴不止。所泄逆迫如箭。余知爲陽熱怫鬱於胃。與甘露飲日夜頻進二劑。諸恙大減。再加黃芪。銀花。遂癥瘍奮起。仍轉紅潤而安。然癥瘍變色有陰邪內盛之黑氣。血內衰之黑。其顏色苗磼。與此不同。

升發宣揚甘草緩火法

川芎茶調散

治諸風上攻。偏正頭風。鼻塞痰盛。憎寒壯熱。頭目眩暉。惡風有汗等證。

羌活 防風 薄荷 荆芥 白芷 甘草 川芎 細辛 爲末。茶調服。

治某連日微惡寒。兩耳痛引及腦。然飲食自若。服吳醫川芎茶調散。渾身大熱。面紅目赤。牙緊脣腫。咽喉窒塞。癰疹紅塊滿項。諸醫無法。余仍用吳醫原方。加甘草五錢。并曰立可呈效。急煎與服。下咽微汗。熱退。疹消。頭目俱清。人事大爽。吳醫問曰。加病此藥。愈病仍此藥。其故何歟。答曰五行之速。莫如風火。此症本風火內伏。閣下特未出其隱而未出之故耳。原藥升發宣揚。治本合法。但一劑其伏邪只到肌表。宜乎逼蒸發熱。頭目赤腫。皮膚疙瘩。蓋發猶未透也。余乘機再劑解肌敗毒。攻其汗出。則邪可盡達。自然風靜火平。合乎火鬱發之之義。但風火交熾。勢甚暴急。故重加甘草。以緩其火勢。乃甘以緩之之意。法遵經旨。有何奇哉。吳醫拜服。

健脾緩痰法 助胃扶脾法

星附四君子湯

治小兒虛體中風。不省人事。痰涎塞口。面白失音。手足抽搐。角弓反張等證。

人參 白朮 茯苓 甘草 南星 附子

星附六君子湯

治小兒虛體中風。胸緊痰鳴。便泄氣短。黑珠上吊。手足抽搐。角弓反張等證。

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏 南星 附子

治某孫忽然默默。手足抽搐。口開眼閉。面白痰鳴。一日十數發。此症原因小兒脾氣未健。寒痰堵塞經隧。治宜健脾緩痰。於是以此湯治之。衆云前日治某孫女用大黃愈茲未遇之兒。敢用附子乎。余曰前之痰熱痰也。今之痰寒痰也。令服之一劑不發。二劑神爽。

某子忽眼翻抽搐。喉內痰鳴。胸緊氣促。發熱汗出。不知其爲虛風也。乃歸咎於神煞所害。醫巫雜治。余視面色黃白浮浮。兩眼白珠純青。知病全是虛怯。正當安神爲上。鑼鼓聲動。驚則氣散。藥入麝片。散氣耗神。且天氣暑熱。加以人氣滿房。熏蒸逼熾。雖有明醫亦當塞機。於是辭巫散人。診其額熱氣冷。胸緊痰鳴。便泄氣短。黑珠上吊。角弓反張。此乃脾虛癇搐之症。誠由胃氣久弱。不能運化乳食。痰涎凝滯於胸。阻塞靈竅爲病。蓋陽明胃者。主束骨而利機關。飲食入胃。游溢散精。上歸轉輸。宣布灑陳之義。全賴胃氣運行之力。今胃氣既困。機關不利。運行失常。所以反張直折。治法全在助胃扶脾爲主。但使胃氣旺。便能復其稼穡之常。運行之舊。其風豈非不截而自止乎。先與理中丸調灌。隨以星附六君湯加天麻鈎藤數劑安。

驅風消痰法

清風滌痰湯

治風痰病。咽腫牙緊。風痰入絡。四肢麻木。畏寒喘息。痰鳴脈滑等證。

防風 荆芥 薄荷 膽星 桔梗 犢蠶

白芷 磬石 甘草 薑汁 竹瀝

治風痰爲病。脈來浮滑。咽腫牙緊。身中麻木畏寒。蓋風邪中上。故多有咽喉上痺之症。先與稀涎散。調灌吐痰。再進此方二劑痊。

疏風清熱通關化痰法

熱痙續命湯

治風火內蘊。表裏均急。六脈急數。遍體痿軟。人事不知。牙關緊閉。面脣俱赤。膠痰滿口。二便阻滯等證。

荆芥 防風 連翹 薄荷 大黃 明粉 黃連
南星 犢蠶 草烏 牙皂 甘草 姜汁 竹瀝

稀涎散

治中風牙關緊急。並治單蛾雙蛾。

皂角 白礬

治某婦年十七。起日畏寒發熱。次早大熱不寒。不知人事。牙關緊閉。面脣俱赤。膠痰滿口。遍身痿軟。狀若無骨。六脈急數。二便阻滯。醫見其身軟。咸稱不治。不知寒則筋急。熱則筋弛。此真風火之症。古稱類中之屬也。詢知食炒豆子過多。蓋身中素積內火。加以外入之熱。繼受外入之風。風乘火勢。火借風威。所以卒倒無知。理宜兩徹內外之邪。使表裏清而神識朗。先以稀涎散吐之。隨進疏風清熱通幽化痰之藥而痊。後進生津之藥而健。

通竅奪痰法

紅棉散

治小兒受寒中風。忽然昏倒。痰鳴氣壅。目瞪鼻搗。兩手握固等證。

白礬二錢
臘脂一錢燒灰存性

通關散

治中風牙關緊閉。痰鳴氣壅。不省人事。以此散吹鼻。取嚏開竅。竅開則省矣。

細辛
皂角等分

某子五歲。忽然昏倒。目瞪鼻搗。咽喉氣壅。兩手握拳。舉家大哭。時已傍晚。同輩環視。莫敢用藥。余用通關散吹入鼻中。連搗二管。始得二嚏。復用紅棉散。葱搗調服一錢。令其裹取微汗。立時即瘥。此幼稚肺氣矯薄。腠理不固。感陰物惡毒之氣。阻塞肺竅。清道壅而不宣者。取其嚏。發其汗。則塞者開而壅者通矣。

清風火痰熱法

滾痰丸

治頭暈目眩。痰涎壅結。怔忡煩悶。神志癲狂。實熱老痰。怪症百病。惟虛寒者不宜。

礞石
大黃
黃芩
沈香

小承氣湯(仲景)

治汗多微發熱。不惡寒。或小便數而大便鞭謔語者。與此湯微和胃氣。

竹葉石膏湯(仲景)

治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐等證。

竹葉 石膏 人參 麥冬 甘草 半夏 穰米 生姜

治某痰火上攻頭痛嘔吐黃水膠痰。口渴喜飲熱湯。發熱惡寒。診得寸口洪滑。此諸逆衝上皆屬於火之症。因先滾痰丸繼小承氣。頭痛如失。嘔吐亦止。外症大熱。目赤鼻乾。小水短赤。咽喉作痛。口渴喜熱。細察悉屬陽明之火。其喜熱飲者。同氣相求之義。非中寒者可比。遂與石葉石膏湯加茶葉一劑。諸症方清。後與六味丸調理而痊。倘入庸醫之手。見其惡寒嘔吐。錯認外感。誤投數劑。其火不愈升乎。且口渴喜熱。亦可知不能拘泥於寒也。又治某卒然頭痛。誤服附桂理中。以至日晡尤甚。脈得寸口洪大。令服大柴胡倍加大黃。兼進滾痰丸加茶葉二劑愈。以上兩症乃寒熱挾風寒痰火上攻之患也。

攻刮搜逐法

控涎丹

治痰涎停留胸膈上下。使人頭項胸背腰胯手足筋骨牽引作痛。走注無定。及皮膚麻痺。頭不可舉。或睡中流涎。咳嗽喘急。痰迷心竅等證。非人實證實者不宜服之。

甘遂 大戟 芥子 等分爲末糊丸。臨臥薑湯服。

指迷茯苓丸

治風痰停滯中脘。脾氣不能流行。昏迷微熱。飲食不思。肩臂痠軟。及產後發喘。四肢浮腫等證。

茯苓

風化硝

姜汁糊丸

半夏麴

枳殼

治某年壯體強。性豪善飲。患肩臂疼痛。每晚痠麻尤甚。手不能舉。自慮風廢。疏風補血。醫不能瘳。余視聲音壯厲。大便頗堅。知爲酒濕內蘊。痰飲流入經隧。原人身衛氣。晝行於陽。陽主動。動則流。故晝輕。夜行於陰。陰主靜。靜則凝。故夜重。按此症實痰阻滯經隧。法當攻刮搜逐。先與控涎丹。繼進茯苓丸。旬日微泄數次安。

痰流經絡治法

平胃散

治濕淫於內。脾胃不能尅制。故有痰飲痞膈。宿食不消。腹滿嘔瀉。不服水土等證。

二陳湯

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

治肥盛之人。濕痰爲患。喘嗽脹滿等證。

半夏 茯苓 陳皮 甘草

余素胃氣不清。喉間有腐穢結痰。如荳粒者時出。一日倚欄片刻。覺右脇疼痛。右肩肘胛。重墜莫舉。身稍轉側。即牽引脇肋。頗疼痛。身略惡寒。投發表藥不應。因思此症非風非氣。必敗痰失道。偏注右脇之故。以平胃二陳加芥子。蔓仁。二劑安。

後治某翁惡寒胃痛。醫與疏滲藥。胃痛偶減。忽加左脇疼痛。時發眩暈。欲補未決。余診脈來濡滑。因推胃中痰飲。流注肝絡。故有風旋痰眩之象。與二陳加芥子、瓜萎、枳實而痊。

驅風堵截填竅法

侯氏黑散（金匱）

治大風四肢煩重心中惡寒不足者。

人參

白朮

茯苓

桔梗

防風

桂枝

乾薑

細辛

牡蠣

礬石

當歸

川芎

菊花

玉關丸（景岳）

專治小便不禁。腸風下血。遺精久泄等證。邪未盡者不可服。

麴灰

枯礬

蛤粉

五味

訶子

玉屏風散

治氣虛表弱。易感風寒。腠理不密。自汗不止等證。

黃芪

防風

白朮

治腸風下血。某年壯體偉大。便下血。醫以嗜酒。用利濕清熱以止血。如地榆柏葉薑連之類。不應。服補中胃風。四神之屬。亦罔效。求治。診脈小弦大。便溏泄不及至。圍每多自遺。其色清淡。中有鮮色。腹中無痛。但覺幅幅有聲。鼓動。因悟此必虛風內擾。以風屬無形有聲。與經旨久風成殞洩脗合。且脈弦者。肝象也。肝風內動。血不能藏。因與玉屏風。重防風加白朮。乃扶土制木之意。更加葛根。辛甘屬陽。鼓舞胃氣。荷葉仰孟。象震挺達。肝風。疊投多劑。其症或減。或增。輕重無常。予思虛風內動。何故不效。忽記經有虛風邪害空竅之語。蓋風居腸間。盡是空竅之地。非補填竅隧。舊風雖出。新風復入。無所底止。故暫退而復進。乃從侯氏黑散驅風堵截之義。悟出治法。填塞空竅。將

原方加入龍骨、石脂、兼吞景岳玉關丸。不數日，果獲全瘳。

驅風填竅法

侯氏黑散(金匱)

主治見一二三頁侯氏黑散

人參 白朮

茯苓

桔梗

防風

桂枝

乾薑

細辛 牡蠣

礬石

川芎

當歸

菊花

治偏頭風痛。某年逾五十。自汗不止。腦中覺有冷涕一陳。白鼻而出。醫錯認鼻淵症。與芥耳散。汗涕痛加甚。又誤陽虛頭痛。與真武湯。漸至火升便艱。更醫又與茶調散。滿頭筋脈。二便阻滯。蓋不識虛實內外之風故也。考虛風內動之症。仲景以後。惟近代葉天士養肝熄風。頗得其法。今此症脈左浮大。風居空竅。擾亂不息。頭汗不止。是內風虛風可知。夫風氣通肝。必養肝中。佐驅風之品。且頭腦空竅。隧道頗多。最難盡逐。必兼佐以堵寒之義。則空竅之風無隙可乘。乃效黑散內取桂枝、龍骨、牡蠣、菊花、驅風填竅。更取葉氏養肝熄風法。如首烏、芝蔴、金釵、鈎藤、桑葉、荷葉之屬。不數劑諸病如失。此症此方。經驗頗多。

行水散逆法

小半夏加茯苓湯(金匱三因名大半夏湯)

治卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。此湯主之。

半夏 茯苓 生薑

本方除伏苓名小半夏湯治支飲嘔吐不渴亦治黃疸。

本方除伏苓生薑加入參白蜜名大半夏湯治反胃食入即吐。

李東垣云。辛藥生薑之類治嘔吐。但治上焦氣壅表實之病。若胃虛穀氣不行。胸中閉塞而嘔者。惟宜益胃。推

揚穀氣而已。勿作表實用辛藥瀉之。故服小半夏湯不愈者。服大半夏湯立愈。此仲景心法也。

治暑月飲水過多。得胸痛病。大汗嘔吐不止。口不渴。脈不躁。投以溫胃之劑。胸痛遂愈。而嘔吐未除。自汗頭眩加甚。將原方加芪與服。亦不見躁。惟水氣頭汗抹拭。不逮稍勁。則眩暈難支。心下悸動。以半夏五錢。伏苓三錢。生薑一片。煎服少頃。汗收嘔止。頭眩心悸頓除。此症蓋緣飲水過多。水停心下。火位不安。故惕惕悸動。本僅當心下作痞。茲以陽氣素虛。更重爲心下作痛。故前投溫胃之劑。助陽消寒。其痛自除。但水飲猶未下耳。水氣上逆。則嘔吐不止。水氣上干。則汗眩難支舉。以大半夏湯行水散逆。使水下行。則嘔悸汗眩俱止。所謂治得其法。汗自歛耳。

清暑法（一）

石韋滑石湯

治暑濕纏綿。三焦阻塞。面黃浮黃。汗出日渴。小便短赤。大腹陰囊腿脣均浮腫等證。

西瓜 滑石 石韋 丹皮 通草 以上皆輕清微寒解暑滲濕之品

清暑益氣湯

治暑濕熱三氣。抑遏真陽。食少神倦。胸滿氣促。心煩身熱。口渴自汗。溲赤便溏。脈虛氣弱等症。

白朮 蒼朮 陳皮 青皮 人參 麥冬 五味 當歸 黃芪
黃柏 神麪 甘草 澤瀉 升麻 葛根 生薑 大棗

某當盛暑。陸路歸里。中途發瘧。每夜寒少熱多。汗出口渴。小水短赤。面目浮黃。舌苔堆粉。大腹陰囊及腿脛一帶悉浮腫。又發舊瘧。每日零星去血。約在升許。凡涼血消腫治瘧方。俱不效。按脈屬虛。而症似濕熱。病思瘧。腫便血。三症皆虛中挾熱。正合內經氣虛身熱。得之傷暑之旨。蓋病者原因途中暑熱。渴而啜瓜。濕熱蘊蓄於胃。三焦不化。四瀆閉塞。以致營衛失常。而成斯疾。必須先潔淨府。以少殺其暑熱之熾。順趨水道。令膀胱氣化先行。然後再提陽。陷於陰之瘧邪。從鬼門而出。則腠理自和。俾衛分有氣化之機。營中無擾亂之苦。而便血不治自止矣。方用西瓜滑葦丹。通二劑。小便甚長。身腫消退。隨以清暑益氣湯除芥尤。連服旬日。三症頓愈。

清暑法(二)

清暑益氣湯(東垣)

主治見上

白朮	荅朮	人參	麥冬	五味	黃芪	當歸	甘草
神麴	黃柏	澤瀉	升麻	葛根	生薑	大棗	

桂枝湯

治太陽中風。頭痛發熱。汗出惡風等證。

桂枝	白芍	甘草	生薑	大棗
----	----	----	----	----

消暑丸

主治伏暑。發熱頭痛。脾胃不和。停滯不化。胸膈脹滿。嘔逆煩渴。心疼肚痛等證。

半夏	茯苓	甘草
----	----	----

治傷暑自汗。起而腹痛泄瀉。自汗神疲。誤補二便。窘急日危。求診脈虛重。按若無額汗。溺短。氣虛煩渴。背微惡寒。四肢逆冷。此傷暑也。非陽虛也。經云氣盛身寒。得之傷寒。氣虛身熱。得之傷暑。今見煩渴溺短。氣促脈虛。傷暑矣。疑進清暑合桂枝。卽服一劑。病勢減半。二劑兼吞消暑丸一兩。二便通利。汗收渴止。煩退。復將原方除桂枝湯。二劑愈。此症用參芪歸朮合生脈散。養心而裕脈。固土而保金。其暑熱傷津。故口渴溺短。水多停胱。誤進溫補收斂藥。故二便不利。水氣上湧。頭汗如雨。消暑丸亦有半芩黃等治水氣頭汗。且方中升柏葛澤升清降濁。譬之雲行雨施。溝瀆自通。注之不盈。而頭汗自收矣。

某當盛暑中途患瘧。夜發寒少熱多。汗出口渴。小水短赤。面色浮黃。胎積如粉。大腹陰囊及腰脛悉腫。又發舊痔。去血甚多。接脈屬虛。而症似濕熱。蓋緣暑熱啜瓜。濕熱遂著於胃。以致營衛失常而成斯疾。必須先潔淨府以輕清微寒解暑滲濕之品。如西瓜滑石石韋丹皮通草。服二劑小便長。身腫消。隨進清暑益氣湯除朮連服旬日。三症頓愈。

通利法

五苓散(仲景)

治臍下有慄。吐涎沫。而癲眩。此水也。此方主之。霍亂頭痛發熱。多欲飲水者。亦主之。

豬苓

澤瀉

茯苓

白朮

官桂

治口不渴。身不熱。脈來弦滑無熱邪。實結在裏。不過痰飲阻滯腸胃。被前醫誤與承氣苦寒。徒損胃氣。遂至通腹脹滿。嘔逆上氣。以致傳化失常。濕邪不走。痰飲愈逆。故胃氣愈亂。脹滿愈增也。此方重桂化氣利濕。加入陳半甘遂。和中逐飲。一劑二便俱通。病者立時精神爽利。不勞再劑。蓋氣化濕走。又病機中當以小便不通之爲標急也。

治太陽腑症初起。畏寒發熱。腹痛而嘔。

某子三歲。六月煩渴吐瀉。醫治轉劇。余視汗出煩躁。飲水卽吐。泄瀉逆迫。小水赤短。舌乾芒刺。中心黃厚。時時將舌吐出。(因刺故也)細思與仲景所謂太陽中風。發熱六七日不解而煩。有表裏症。渴欲飲水。水入卽吐。名曰水逆。治與五苓相符。但此症煩熱鬱盛。三焦有火。宜加苦寒之味引之。屈曲下行。妙在劑中之桂。爲膀胱積熱化氣之上品。又合熱因寒用之旨。庶小便通而水道分清矣。以二苓瀉尤肉桂黃連山梔二劑愈。

皮水驅除法

五皮飲

治風濕客於脾經。氣血凝滯。以致面目虛浮。四肢腫滿。心腹脹脹。上氣促急。兼治皮水。妊娠胎水。

五加皮

地骨皮

桑白皮

大腹皮

生薑皮

某秋患瘡。發表後發進附桂理中小安。惟瘡未全止。私取截瘡膏貼背。瘡邪雖止。漸加浮腫。腹脹玉茎腫亮。狀似魚泡。咳嗽氣促。呻吟不已。視形容面色舌胎脈象俱屬大虛。擬以火土傷敗。與尤附薑桂。按服數日。色脈如原。莖腫尤甚。改進五皮飲。重加苡仁桑皮與服。俾得溺倍於常。莖腫乃消。此症原是脾肺兩臟氣化不行。水壅經絡。泛溢皮膚。徒然益火燠土。與皮膚無涉。故諸症自若。而莖囊原爲聚水之地。故腫尤甚。水溢皮膚。以皮行皮之義。故腫乃消。可見醫貴圓通。不可執一也。

消補兼行疏通脾胃法

變通胃苓湯

專治中暑中寒。頭痛寒熱。吐瀉瘧痢等證。

白朮爲君。佐以陳半草葉、苦杏仁、澤之屬。

治某秋患瘧。每日午發。寒熱相半。退時有汗。頭疼或不疼。口渴或不渴。二便無恙。夜寐亦安。此客邪尙淺。然治經二旬。凡發表清裏。和解補中諸治。投之漸劇。况體氣素虛。而煩惱莫耐。疊投補劑。而胸膈加痞。余診脈皆和平。舌胎黃滑。審症察脈。似當溫補。然前補不投。豈敢再犯。諦思不得其情。惟於審症時。察其略有噯氣。或時以手摸胸。知飲食傷胃。食滯未消。方書稱爲食瘧者也。法當消補兼行。疏通脾胃。庶中無阻滯。營衛自通。樞機流利。其瘧不治而治。照服一劑。瘧輕二劑果愈。

開鬱泄火宣絡降氣法

開鬱泄火宣絡降氣湯

治肝火拂逆。脇胱痕痛。氣上衝心。懊憹不寧。焦躁嘈雜。吐血嘔涎等證。婦人夾感經停。胸腹脹悶者。亦主之。

淡豆豉

黑山梔

鬱金

甘草

新絳

降香

當歸

柏子仁

葱管

某質稟木火。脊梁厚味。素所不節。患脇痛沖脫。兩載。痛時由左直上。撞心煩惱莫耐。痛久必嘔。稀涎數口。方安。始則一日一發。繼則一日數發。遂至神疲氣怯。焦躁嘈雜難以名狀。醫用控涎導痰諸方。毫不中窺。至春升痛。嘔倍甚。吐血二碗。(紅白相間。結成顆粒。是陽明離位之血留久而爲瘀者。)神昏氣湧。日瞪如鶗。卽進人參。當歸。二味漸甦。嗣後杜門靜坐。不樂對客交談。而氣上撞心。胸脹脹悶。仍是一日一發。守不服藥。惟日進參湯而已。余診脈來弦大。(弦爲肝強。大爲病進。)肝氣病也。記靈樞經篇云。足厥陰所生病者。胸滿嘔逆。又仲景云。厥陰之爲病。消渴氣上撞心。心中痛熱。飢不欲食。故見嘈雜焦躁等證。(竊意焦躁嘈雜。卽古所謂煩冤懊憹之狀。)知肝

氣橫逆。鬱火內燔。仿仲景治胸中懊憹例。用梔豉湯以泄鬱火。參入葉天士宣絡降氣之法。以制肝逆。酌投數劑。諸症全愈。然此暫行之法。中病即已。勿過用焉。緣甘平之性少。苦辛之味多也。善後法以四君加白芍遠志續服。多多益善。

氣厥治法

烏附散

治氣鬱不舒。胸腹脹滿疼痛。及因怒氣厥卒倒無知等證。

烏藥 香附

越鞠丸

治氣血痰火濕食。鬱滯中焦。吞酸嘔吐。飲食不化。脘脹腹痛。黃疸瘡疥等證。

香附 蒼朮 川芎 神曲 山楂

治某婦中氣。頃刻仆倒。目閉口噤。手散脚僵。其夫曰。早吃椒湯。身戰作寒。午吃圓湯。噯氣不舒。因而昏倒。診脈上浮下伏。與經言上部有脈。下部無脈。其人當吐之例相符。乃以鹽湯引之。不吐。再搗太衝穴。身略動。自以兩手捫胸。知心地尚明。無非會厭樞機不利。轉瞬四肢僵冷。細聆呼吸。狀如死人。再診脈伏。乃靜念曰。面色青白。必挾肝邪。爲患脈來緊伏。可是經絡皆痺。今日不過伏湯二碗。倉廩久已運化。故引之無吐。想非風、非痰、非食、非火。其閉而不通者。氣而已。再問素性好怒否。家人曰。多氣多怒。曾因妻子悒鬱。至今夫鬱氣素橫於中。加椒性助肝。龍眼棗氣。肝愈橫。鬱愈結。臍中之氣。無由轉輸。安得不猝然仆倒。例用烏附散。沸湯調灌。方下咽。喉間汩汩有聲。卽嘔稀涎。一口而甦。惟苦胸悶不舒。噫噯自揉。繼進越鞠丸一兩。氣暢鬱舒。安睡復舊。

辛溫流利法

四七湯(局方亦名七氣湯以四味治七情也)

治因怒發厥。氣鬱胸悶。或噎膈反胃。粒米不入等證。

人參

官桂

半夏

甘草

生薑

七氣湯(三因亦名四七湯)

治火被寒鬱邪逆成厥。氣鬱脘悶。甚或不省人事者。

或七情傷中抑鬱不舒。胸脘痞痛等證。

半夏

厚朴

茯苓

蘇葉

生薑

大棗

舒氣降逆湯

四磨湯(一方人參易枳殼。一方去參加枳實、木香。白酒磨服。名五磨飲子。治暴怒卒死。名曰氣厥。)

治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨悶不食。正氣又虛等證。

人參

檳榔

沈香

烏藥

等分。酒煎。三四沸。溫服。

某得噎症。咽喉阻塞。胸膈窄緊。每飯必嘔痰水。帶食而出。嘔盡方適。藥無一效。粒米未入者月餘。審其形氣色脈。

知爲痰火素盛。加以七情鬱結。擾動五志之陽。糾合而成斯疾。疏與四七湯合四磨飲而安。蓋察其形瘦性躁。色赤脈滑。且舌旁雖紅。而白胎涎沫。如粉堆積其中也。次年復發。自以前方再服不應。余以四七湯除半夏。加石斛。桑葉。丹皮。蓼皮。數劑安。蓋察其脈雖滑而帶數。且脣燥舌赤。故取輕清之味。以散上焦火鬱也。越年又發。又將舊方服之。益劇。余於五磨飲中用厚朴。蘇梗。加入旋覆花。鬱金。橘紅。淡豆豉。山楂。治

之。二劑安。蓋察其脈來浮滑。加以嘈雜胸痞。知其胃之上脫。必有陳腐之氣。與火交結也。後因七情不戒。飲食不節。逾年仍發。服連年諸方加減愈殆。余又用蘇子、芥子、萊菔子、巨勝子、火麻仁、搗漿取汁。合四磨飲服之。頓安。蓋察其脈轉濇。而舌心燥。粉堆積。加以氣壅便祕也。

某先生年近六旬。噎症。每食胃中痛。嘔。痰飲上泛。欲吐甚難。嘔盡稍適。投香砂六君。丁蔻理中無效。病五閱月。肌膚削極。診脈無緊濡。且喜浮滑。大腸不結。所解亦順。但苦吞吐維艱。咽喉如有物阻。胸膈似覺不開。古云上病過中下。病過中皆難治。今君原屬上病。數月以來。病猶在上。可治也。以四七合四磨一服。而胸膈頓開。再服而咽嗌稍利。始以米湯。繼以稀粥。漸以濃粥。進十餘劑。始得納穀如常。隨以逍遙散。間服六君子湯。調理兩月。精彩自加。某得痰膈。病發時。呃逆連聲。咽喉如物阻塞。欲吞之而氣梗不下。欲吐之而氣橫不出。摩撫按煩惱之極。醫治兩月。溫胃如丁蔻、薑、桂。清胃如芩連、硝黃。無寸效。余視其氣逆上沖。而呃聲甚厲。咽中閉塞。兩肩高聳。目瞪口張。儼然脫絕之象甚可駭。然脈來寸口洪滑。上下日胞紅突。辨色聆音。察脈審症。知爲痰火上攻。肺胃其痰也。火也。非氣逆不能升也。遂處四磨湯加海石、山梔、芥子、瓜蒌、竹瀝。煎汁連投數劑。俾得氣順、火降、痰消。再以知柏地黃湯加沈香。以導其火而安。

散結破瘀養肝補血法

五磨飲子

治暴怒卒厥。及七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。煩悶不食等證。

右四味。濃磨汁各一匙。沖入後藥。

烏藥

楂榔

枳壳

木香

沉香

當歸 水煎去滓。白芍 和入前汁同服。
鬱金 延胡索

某嘔吐拒食時平時甚已十年矣。今春喪子憂愁病劇每食氣阻格咽翻擁而吐甚至嘔血數口。肌肉枯槁衆議勞傷嘔食不治余曰非也此人全是操勞性急稍拂意必怒怒則傷肝所以目久欠明者皆肝病也。至於每食氣阻乃肝木剋土之象此屬七情中病當以七情之藥治之仿古四磨飲以治氣結氣結血必凝以玄胡鬱金破宿而生新久病實亦虛以歸芍養肝而補血合之成劑氣血交治蓋氣病必及於血血病必及於氣並囑靜養戒怒此方服至半月告余曰向者胸前覺有一塊今無之何也余曰木舒而鬱散耳服一月身體照常。

推蕩惡血法

桃仁承氣湯（仲景）

治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尙未可攻宜先與桂枝解外外解已但小腹急結此主之。

桃仁 大黃 芒硝 牡草 桂枝

某長途至家醉飽房勞患腰痛屈曲難行醫謂腰乃腎府房勞傷腎惟補相宜進歸杞杜仲漸次沉困轉側不能每日晡心狂意躁微有潮熱痛楚異常臥牀一月竟成廢人余診知濕熱聚於腰腎誤在用補妙在有痛此症先因長途擾其筋骨之血後因醉飽亂其營衛之血隨因房勞耗其百骸之精內竅空虛濕熱擾亂血未靜乘虛而入聚於腰腎之中若不推蕩惡血必然攢積堅固後來斧斤難伐矣以此湯加附子元胡乳香數劑下惡血數升而愈。

某腰屈不伸。右睾丸牽引腫痛。服補血行氣藥。益甚。余診脈弦濇帶沉。詢其二便。小便長利。不及臨桶。大便則數日未通。知爲蓄血無疑。處此湯加附子、肉桂、當歸、穿山甲、川練。下黑糞而愈。

某當酷暑。舟中夢遺。旋因食瓜。繼以膏梁。致患小溲淋痛。(濕熱乘虛入於精道)醫投利濕清火藥。淋痛雖減。又加少腹脹急。左睾丸偏墜。膀胱牽痛。腹脹日甚。小水清利。大便不通。更醫五苓合疝氣方。增車前木通。少腹脹不可當。左腎腫大如碗。煩躁悶亂。坐臥不安。余診脈得沉弦。遂處此湯。重用肉桂加當歸一服。便下瘀黑二升。愈。獨怪市醫反用利水耗氣之藥。其何以操司命之權耶。此症愈後。繼服後方。連服數劑。以杜其根。

附方

當歸

附子

肉桂

山甲元

胡桃仁

虛損吐血逐瘀法

花乳石散(局方)

(已有詳細主治。在二一〇頁中。故此處不復贅述)

花乳石五兩(一名花蕊石。在硫黃山中。狀如黃石。有黃點如花之心。故名。近世皆以玲瓏如花乳者爲充。欲試真僞。煅過置血上。血卽化水者真。)硫黃二兩。上二味同入煑成罐內。釀泥封固。煅一伏時。研如麪。每用二錢。食遠童便調服。

治氣虛血凝。瘀積壅聚。胸膈作痛。宜用重劑竭之。又婦人產後血逆血暈。胞衣不下。或子死腹中。俱宜服之。瘀血化爲黃水。然後以獨參湯調之。

某內產後惡露甚少。腹大如箕。作脹。小水甚長。大便不通。儼似蓄血之症。但口雖渴。喜飲熱湯。兩尺脈亦軟濡。可知血寒凝滯。投黑神散不應。更醫大黃、紅花、枳壳。腹脹愈甚。腹堅如石。再求余視。知爲寒邪凝結。必當溫通。連進

附桂、乾薑、歸芍似脹稍寬。四劑惡露不下。竊思舍此溫通之法。決無破血可進。然非血行。脹何由消。考古治虛損吐血逐瘀之法。有花乳石散之例。能化瘀血爲水。不動臟腑。可引以爲用。遂煎米飲調服二錢。少頃腹中氣響。前陰出穢水甚多。大便亦通。疊進前藥。脹消一半。惟腹右稍堅。十指擊急。足亦時僵。此氣血虛寒。今始大露。改進理陰煎重加附子。諸症悉瘥。後進養營湯數十劑。調理全安。

血寒溫通法

黑神散

治姪婦蓄瘀胎漏。及下產婦死胎。

地黃

當歸

赤芍

蒲黃

桂心

乾薑

甘草

黑豆

童便

蒲黃

五靈脂

等分。醋調服。

失笑散

治產婦惡露不盡。新血不生。血瘀少腹疼痛等證。

某內產後。一日畏寒發熱。惡露不下。滿腹作脹。手不可按。二便俱閉。胸緊氣迫。危迫邀視。知爲產後受寒所致。蓋血得寒。則凝泣而不行。非溫不通。先與失笑二錢。次進黑神。重用薑桂。加漆渣、山楂。急煎與服。頃刻小水先利。污水隨下。腹稍寬。氣稍平。再劑大便甚通。次日泄瀉不止。腹痛口渴。當斯時也。於泄宜補。於痛宜通。是通補兩難立法。詢知臨產食雞湯過多。緣腹中所蓄瘀血。今得溫通。腹中宣暢。惡露已從前陰而下。食滯又從後陰而出。津液暴失。宜乎口渴。然喜脈無洪大。神不昏迷。許以無憂。但身中之津液下泄。精氣不勝之症。當從釜底緩蒸。庶幾氤氳微頂。疏與芩桂固脂。薑炭木瓜甘草投之。渴瀉腹痛俱止。

宣通竅隧瘀腐法

通竅宣隧湯

專治敗精瘀濁。鬱於精道。小便淋濁。管痛艱澑。須用此方通導之。

牛膝 桃仁 黃柏 山甲 金鉛 遠志

琥珀 白朮 鹿角屑

某得淋濁病。溺則管痛艱澑。莖口時有敗精溢出。凡利濕、清熱、養陰、制火諸法不效。視其形肥年壯。溺出渾濁。停久底有膏積。據此精溺同出之症。決非小腸濕熱。細思溺管與精管外竅雖同而內竅各別。若果濕熱壅塞溺管。則前藥豈無一效。此必少年慾心暗萌。或房勞強忍。精血離位。忍而不泄。古云如火之有煙焰。豈能復返於薪哉。其離位之精。出而不出。日久必聚爲腐穢膠濁。且牽引新精妄動。故溺欲出而敗精先阻於外。是以管痛艱澑也。若不急驅精管腐濁。徒然滲利溺管。豈非南轍北轍乎。爰宜宣通竅隧瘀腐之法。以前藥合煎服之。穢濁果通。溺出如鴉膽子大者六七粒。每粒紅白相間。更有精裏血者。四劑始痊。須知精道之濁。亦有腎虛不攝之症。然必滑而不痛耳。

止衄法

白茅龍眼湯

治鼻衄。

茅根 一握 龍眼 二十枚

某媳秋患瘡無汗。一日瘡至大衄不止。促余視之。乃風溫、暑熱合而爲瘡。迫蒸營中。以致營中擾亂。血行清道。故

也。然而血爲紅汗。瘧邪當從衄解。惟衄血過多。神氣昏倦。令取茅根入圓肉同煎。飲之。其衄遂止。

通經入絡泄熱搜濕法

透關奪雄湯

專治腹中痃癖。嘔吐苦水。飲食難入。二便阻塞。痰涎壅盛。腹中攢痛。脈來沖指。四肢厥冷等證。

附子

吳萸

肉桂

草蔻

黃柏

桃仁

明粉

牽牛

草烏

牙皂

治酒毒內結。某有腹痛病。時嘔吐苦水。湯水難入。二便阻塞。向雖屢發得安。今春宿痰舉發。倍盛於前。四肢厥冷。嘔吐口渴。小水涓滴不通。大腸壅塞不行。旬日內遍嘗諸藥。未能下咽。絕粒不進。脈尚弦數。沖指攢腹攻痛。每痛極時索飲燒酒盞許。似少可。余曰此捨命嗜酒。其毒內結。已成酒癖。但酒客忌甘酸味。助肝最難相適。斯義惟喻嘉言。透此一關。必取其氣味俱雄之藥。所謂能變胃而不受胃變者。今師其意疏方。服數劑諸苦如失。方中附萸、桂、蔻之辛熱。以通經入絡。散痞消癥。然討寇之兵。性情暴烈。每多峻厲。恐其放肆僭佚。不得不以法度制之。故用柏、桃、明粉、苦寒鹹下者。以制其猛烈。且藉以泄熱也。但膈膜隱僻之區。道路常多曲折。恐非易入。亦難決勝。故復使丑牛、草烏、牙皂。氣味俱雄者。有鋒銳巧捷之能。且有逐水搜濕之功。如此下咽。猶號令一舉。各皆走而不守。直至達癖所。贊襄成事。取功易易。然銳兵利導之舉。可暫而不可常。則善後清淨之法。尤不可無。某亦從此堅志戒酒。亟求善後之方。疏平胃散打糊小丸。曬令乾堅。以攻寇也。另以理中加黃連研細末。護曬極堅。以安民也。每日空心沸湯吞服數錢。毋令間斷。逾年疾不再發。胸膈頓寬。肌膚潤澤。

抑風制水流利經絡法

抑風制水通絡湯

專治腎虛中風。水邪爲患。面目身體浮腫。語言不利。上氣流涎等證。

當歸

枸杞

附子

肉桂

白芍微加

細辛

防風

獨活

某先生年逾八十。身體堅強。聲音洪亮。尙御女不輟。舊冬曾舉一子。其先天之厚可知。適值春升。面足帶浮。語言不利。惟眠食猶安。醫進理中腎氣。漸加氣促。不能著枕。余診脈頗浮大。遍身腫而面部尤甚。語言壅塞。涎唾自流。予想腫症未聞有言塞流涎之例。此惟中風有之。繼思內經病機篇云。病腎風者。面跗龐然。壅害於言。緣邪之所湊。其氣必虛。大凡水病多由於腎虛者。况高年稟賦雖厚。而下元已衰。或加房勞驚恐。俱傷腎氣。值此春木司令。下虛不納。腎液奔騰。升越於表。適逢風襲。中於廉泉（舌根下兩旁穴）。故面跗龐然。兼壅害於言也。處以歸、杞、附、桂、白芍。抑風而制腎水。微加細辛。防風、獨活。用之流利經絡。稍開鬼門以逐邪。一劑熟睡。小水倍常。再劑腫消。語言清爽。流涎亦止。

達腎搜邪解肝散結法

宣隧湯

治關格二便阻閉。腹脹滿作痛。嘔吐青水。脈來弦強等證。

牽牛

桃仁

小茴

吳萸

橘核

苦棟子

外用米醋調元明粉拌炒諸藥。水煎熱服。

治某濕熱阻塞。內關外格之症悉具。本當死在旦夕。何五日尙未死耶。仲景云。小便不利。腹脹喘急者死。今幸未喘急。所以尙生。脈得肝部獨強而橫。忽悟婦人熱入血室一症。其義相同。夫婦人先因外感。傳經熱邪。經水適來。

熱邪既可乘虛而入血室。此亦必先因內傷、飲食。濕熱積聚於中。適值房勞。精道陡虛。所有積聚濕熱。亦可乘虛而入精道。其內外所傷雖異。其乘虛而入一也。惟其阻塞經隧。脹閉二陰。故前後二便皆阻。夫少腹者。肝經所屬。陰器者。肝脈所絡。今濕熱乘虛阻塞。如橫一門於中。濕熱之氣愈阻。肝木之氣愈橫。所以腹痛難忍。下既不通。無由疏洩。拂逆充溢。勢必上沖。直侮所剋。上乘於胃土。受木剋。而爲嘔吐。觀其吐出如青菜汁者。顯然肝威之現形矣。法用牽牛、達腎道。走精隧。搜熱逐濕。爲君。以吳萸、小茴、川練橘核、桃仁。解肝散結。爲佐。加以苦酒之酸。以入肝明粉之鹹。以入腎。二味化水。拌炒諸藥。引之以入肝腎。引上加引。使之直達。初劑小水長。僅得數屁。腹中氣響。而痛大減。二劑前後悉通。諸苦如失。

先攻後和兩法

木香檳榔丸

疎導三焦。快氣化痰。消食寬中。泄瀉痢疾。裏急後重。二便不通。食癟實積等證。

檳榔	木香	青皮	陳皮	黃柏	黃連	大黃	芒硝
山楂	莪朶	枳殼	香附				

四逆散

治少陽傳經熱邪四逆。或咳或慄。或小便不利。或腹中痛。或泄痢下重等證。

柴胡	白芍	甘草	枳實
			各等分

某愛發熱頭昏。目珠上視。四肢逆冷。然唇燥溺短。病情已露於外。余視曰。此夾食傷寒症也。雖四肢爲諸陽之分。因食停胃中。加以新寒外入。以致胃氣抑鬱。不能四遂。故發厥而昏沈。乃大實有羸狀。卽此類也。且既無吐瀉之

因。又非汗下之後。此先熱後厥。明是熱深厥深之病。安得認為陰症耶。以檳榔丸一劑。下膠黏之物。遂醒。但厥回復厥。更以四逆散升散表邪。推泄裏熱。復微熱微汗而解。此先攻後和法也。

祛風清火通幽生津法

搜風順氣丸

治濕熱內蘊。經隧凝痰。肘膝痛楚。重墜不寐。面白而光。舌黃而裂。腹痛便祕。惡寒鼓慄。玉莖痿縮。脈來弦數有力等證。

大黃 牛膝 火麻仁 山藥 獨活 豉肉
車前 防風 檳榔 蒴絲子 枳殼 蜜丸
某少年嗜酒過度。致經隧凝痰。近來嗔怒頻生。木火熾盛。今春肝陽暴升。肘膝痛楚重墜不寐。面白而光。舌黃而裂。鼻煤眼淚。腹痛便祕。舊痔復作。惡寒鼓慄。玉莖痿縮。脈得關弦尺數。洪而有力。此症肝陽拂逆。木盛生火。生風。以左金丸爲君。入山梔、蒼朮、白芍、瓜萎。連進十劑。接服此丸而愈。

金水相生脾胃交治法

香連丸

專治濕熱祕鬱。氣滯不宣。赤白痢疾。膿血不止。裏急後重。中暑腹痛等證。

木香 黃連 加熟地、白朮、早米

前方

加人參、麥冬、五味、竹茹、柿蒂

某三歲夏月煩渴吐瀉。醫投消食利水。愈劇。余視面色青白。兩目神陷。初泄逆迫如箭。自沫愈多。四肢虛軟。時忽驚叫。如此寒熱虛實錯見。必須錯雜之藥。仿古香連丸清火。以逐垢。加熟地補腎生水。用白朮健脾燥濕。以早米扶胃生金。有金水相生之妙。脾胃交治之法。服之渴止煩減。神清泄住。人事大清。隨令再進。毋飲茶湯。次日病減大半。但時乾嘔不止。胃虛發噦。何疑。微渴微泄。津液下陷未升之故耳。以前方加入參麥湯。正甘酸生津養胃之品。加竹茹柿蒂。止嘔清火二劑全愈。後以六神散。(即四君加山藥白扁豆)調理勝舊。此症近今頗多。故筆記之。

消癰降火法

牛黃奪命散

治肺脹喘急。汗大鼻搊。胸高痰鳴。目瞪上視。此胸膈積熱。心火凌肺等證。

黑牽牛半生半炒

錦莊黃酒潤咽乾

陳枳殼麸炒

加蘇子萊菔子

某郎忽喘嗽氣促。醫投解表。其氣愈緊。又加汗大。鼻搊。胸高。迫醫復視。誤認氣脫。忙煎人參五味。下咽。胸高喘迫。不能出聲。目瞪上視。汗大如雨。痰聲如雷。促余治之。知爲胸膈積熱。心火凌肺。脹喘急。變幻最速。幼科稱爲馬脾風者。即此是也。以集成牛黃奪命散。加蘇子以疏肝。又入萊菔子以反參。急煎與服。危狀皆平。更與清肺藥而愈。竊此症目不常觀。醫者學而不思。不亦罔乎。

熱瘡似驚治法

達原飲

治瘡疫邪入募原胎白。發汗不解。有內閉之險。急用此方。達邪於募原之外。則表可解而裏可清。兼治瘡癆等證。

檳榔 草菓 知母 花粉 白芍 黃芩 甘草

清脾飲

治熱多陽瘡。

青皮 陳皮 柴胡 黃芩 白朮 茯苓 千草

厚朴 草果 生薑 檳榔 口渴加知母、麥冬

某子四歲。潮熱不退。醫以消導發散。漸變昏睡露睛。默默不食。醫不知熱甚神昏之例。謬認脾土衰敗。誤投參、朮。愈加昏睡。目瞪上視。又以牛黃、抱龍。迭進益危。余揣其偏身熇熱、內熾。舌苔滿布。此是溫熱確據。未得分清。故變瘡耳。與達原飲一劑。夜汗熱減。次早仍熱如前。又與達原加元明粉一劑。方得表裏兩和。汗利熱退。身安。家想不藥。余曰未可。明日瘡至。又必熱。但少輕耳。轉方以清脾飲。果又熱。傍晚汗解。次日再加烏梅而退。余於此症治經多人。蓋小兒稚陽之質。三陽之邪。發熱、頭痛、畏寒、胸滿口苦之症。概不能言。醫者不加詳審。誤治死者。不知幾許。

考古法惟夏禹鑄有熱瘡似驚風之說。誠足補前人之未發也。
某孫體肥痰盛。暑月發熱嘔吐。昏迷不醒。目往上視。角弓反張。一二時久。汗出略醒。醒後微熱不息。人事昏沈。每日如此。醫投鎮驚、祛風化痰行氣數手雷同。其病愈重。余視面色黃滯。舌苔浮黃。雖嘔吐發熱。反張上視。然發作有時。知病在脾胃。以脾主信故也。仿夏禹鑄熱瘡似驚之例。連進清脾而安。須知瘡癆斷非發作有時耳。

疏通經絡法

鷄鳴散

專治腳氣。

蘇葉

吳萸

桔梗

木瓜

橘紅

檳榔

生薑

鷄鳴時冷服

某妻病始畏寒發熱。兩足僵硬。微腫疼痛。步立不能。醫不知爲腳氣。誤表氣急上沖。瞼皮紅赤。熱痛難忍。又疑毒氣所致。瘍科醫治。而氣衝熱痛。愈覺不支。余診右脈洪而無力。左脈伏而不見。形羸唇白。聲微舌潤。詢其體格。又屬素虛。理宜調補氣血。但氣衝便祕。足瞼紅腫。熱痛之極。此屬氣實明微。且腳氣古稱癰疾。又不可遽補。從此酌量先後。緩急諸法。當先治其標。而後治其本。緣按症以氣血雖虛。而經絡必滯。宜先疏通經絡。而後調補氣血。方爲合法。遂將古方鷄鳴散除蘇葉。恐再散也。加生芪以固表也。入桑皮以下氣也。減桔梗恐載濁也。而囑只服一劑。次日當視症定方。服後大便亦通。腫痛少除。氣衝大減。寒熱悉瘥。其家見藥已效。更進一劑。亦覺相安。越日瘍醫至。謬謂毒氣未化。當用敷藥。更仿余方加防己倉朮。內服外敷。是夜寒熱頓起。汗出衣髮俱濕。神魂飄蕩。氣上沖心。余復視時。張口瞑目。危險至極。急進十全大補湯二劑。始稍安。又數十劑方全安。原此症內經所言。因於氣爲腫。四維相代。陽氣乃壞。祇因氣衝便祕。訂一劑之方者。勢不得已也。

寒熱解散互用法

椒豆湯

專治生冷不節。阻遏中焦。寒熱交迸。霍亂吐瀉等證。

胡椒

荳豆

棉紗

六君子湯

治氣虛有痰。脾虛腹脹。食少神倦。面黃肌瘦。一切脾胃陽虛等證。

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏加石斛 桑葉

某孫飲食未節。又啜冷水。因而吐瀉交作。發熱口渴。醫進藿香正氣。躁擾不安。揚手擲足。號哭不已。稍靜則氣急。目閉。忽又嘔渴交作。躁擾之極。細看苗痏顏色。尚非虛象。惟情形張皇。躁擾可畏。竊思此症內傷飲食之寒熱。外感不正之邪氣。阻遏中焦。寒熱交逆。上下奔迫。腹中絞痛不安。故爾躁擾。號叫。方書稱爲濕霍亂。俗名絞腸痧。是以寒熱邪氣交迫。藥當寒熱解散。互用。於是取胡椒二十粒。荳豆四十粒。一寒一熱。搗碎煎水一甌。用以和其陰陽。另以棉紗一紮。取其一轉一旋。解其絞結。煎水一甌。二湯和勻。因口渴不知所辣。下咽亦受。啜盡乃安。次早復視。面色淡白。舌胎浮黃。尚有微熱微泄。知脾胃雖傷。而虛中挾火。當用清補無疑。與六君加斛桑而愈。按此症急時不得其藥。而竟檢俗方用者。所謂禮失而求諸野也。

托裏散邪。防治寒疝法

當歸生薑羊肉湯

治產後腹中疼痛。並治腹中寒疝。虛勞不足等證。

黃芪 人參 當歸 生薑 羊肉 煮汁煎藥

如惡露不盡。加桂行血。

某內冬月產後。少腹絞痛。醫謂兒枕之患。去瘀益劇。手不可觸。痛甚則嘔。二便緊急。欲解不暢。且牽引腰脅俱痛。勢頗迫切。諸醫咸議峻攻。庶幾通則不痛。余曰形羸氣餒。何勝攻擊。乃臨產胎下。寒入陰中。攻觸作痛。故亦拒按。

與中寒腹痛無異。然表裏俱虛。脈象浮大。法當托裏散邪。但氣短不續。表藥既不可用。而腹痛拒按。補劑亦難遽投。仿仲景寒疝例。與當歸薑羊湯。因兼嘔吐。略加陳皮。葱白一服。微汗而愈。可謂得心應手矣。

某內產後寒熱腹痛。醫以芍歸加入行瘀藥。兩投愈痛。人事困頓。余以血虛腹痛。當溫養血液。疏理陰弗。服是迺除。惟腹痛既非瘀血。必是內寒無疑。但血去液傷。辛溫難進。乃擬交骨未縫。寒入陰中。仿仲景產後腹中疼痛。屬寒疝之例。與此湯服下。腹痛果除。

重鎮止呃法

旋覆代赭湯(仲景)

治傷寒汗出吐下後。心下痞鞕。噫氣不除。此主之。

旋覆花

代赭石

人參

半夏

甘草

生薑

大棗

余某捕魚爲業。患呃逆病。醫以丁香柿蒂湯。服如故。余診脈來遲細。重按乃得滿而浮氣。狀如通草糊成。呃聲甚長。似空器中出。謂曰。此症之可望生者。正在脈之遲細耳。且細玩有神。毋容懼也。遂用此湯與服。下咽呃聲即止。二劑呃聲復起。越日又診脈症如前。呃則抬肩。聲類牛吼。潮仲景此方原爲重以鎮怯立意。今聲如牛吼。中虛可知。故一服呃止者。乃得重鎮之力。再服又呃者。足徵中州之虛。而倉廩空乏。尤恍然悟矣。因詳詣之。曰。始因感冒風寒。服櫃方寒除後。因胸前不舒。得食身重。所謂服藥似有檳榔。未久五臟翻裂。有如刀割腸斷之苦。始知已往之誤。於是以理中加赭石。當歸薑羊湯。日進二劑。呃漸休。脈漸充。再服諸症皆平。惟面部尙浮。以脾虛失統治之。安。按此症因胸前不舒。得食身重。理當健溫脾湯。或辛溫助胃。亦可奏效。

流利關節祛濕潤燥法

扶桑丸

治肝腎陰虧。虛風暗動。頭目昏暈。麻痺不仁。此藥除風濕。潤五臟。烏鬚黑髮。明目涼血。久服延年。

按此丸係桑葉與黑脂麻等分蜜丸。能除風濕。烏鬚明目。每年九月二十三日用桑葉煎水洗目一次。至老永不昏暗。且夜能細書。其妙無窮。但桑葉須五月五日六月六日立冬日採者爲佳。

治腦鳴肢痙。某年近五十。鬚髮已蒼。左臂自肩牖肘胛。麻木不舒。腦中鳴響。且值冬初。寒風凜冽。脈象緩大。誠恐卒倒。瘡中之日來矣。處河間地黃飲子加鹿茸。大劑煮服。兼製扶桑丸。用以流利關節。祛濕潤燥。服至臘月。肢體勁強。漸覺還原。

吐下汗三法

吐劑稀涎散 皂角四挺去皮弦莢

白芥兩或加桑蘆

治中風牙關緊急。並治單蛾雙蛾。

考古簡便方云。治重舌木舌。腫滿強硬。或疼不止。不能言語。宜用粗鍼線紮筋頭上。刺患處。甚者數十刺。只鍼舌尖及舌兩旁。舌中心及舌下俱不可刺。犯之令出血不止。而刺出之血。以紅色者爲毒。輕紫色者。黑色者最危。仍以蒲黃研末擦舌上即消。舌或脹大腫硬。卽時氣絕。名爲翫舌。用皂礬不拘多少。焙新瓦上。以火煅成紅色爲度。放地候冷。研細擦舌上立愈。重舌木舌皆效。舌腫滿不能出聲。以梅花冰片研爛敷之。或以食鹽百草霜共爲

末井水調敷卽效。
下劑 雄黃解毒丸

專治大便陰結。非承氣所能通者。膠痰瘀滯。凝於下焦者。均主之。

汗劑 雄黃一錢
鬱金三錢
巴霜一錢
醋糊丸

治中風身冷麻木昏迷不醒。牙緊手散。痰鳴等證。

草烏 全蝎 牛皂 南星 麻黃
細辛 雄黃 殘蠶 蒜汁 竹瀝
如便閉加元明粉。口臭加石膏。大解後除牙皂。加白朮茯苓以不畏寒爲度。

治牙緊舌脹。某婦著月。忽身冷麻木昏迷不醒。牙緊手散。舌脹出於齒外。喉間微有曳鋸聲。診視旣非木舌。又非癓舌。明是中風之病。但瘡厥風痙。未聞有舌脹出於齒外者。殆經所謂廉泉穴虛。風邪上入耶。竊思無病忽畏寒麻木。是外風內入之徵。風爲清邪。清邪中上。故見牙緊舌脹之症。今病最急處。尤在上也。經曰。病之高者。因而越之。非湧劑不可。考禁性涌吐。風涎最捷。用白礬一塊。開水調化。鵝翎蘸水。擎齒滲入。深探喉中。立時即嘔出痰涎。舌卽微縮開聲。觀舌下根旁。竟生兩小泡狀如鰓眼。明若水品。問之別無所苦。惟身不知熱。大便數日未通。因用疏風化痰藥。比日飲食亦進。次早復身麻舌大昏迷不醒。遂灌稀涎散下喉。卽嘔涎醒。惜未得大吐。兼之大便未通。內中必有結聚。膠凝難解之涎。恐非攻劑。不足以刮飲通幽。然宜溫通。最忌苦寒。進雄黃解毒九十粒。熱水調服。連泄二次。隨飲冷茶立止。自云輕快如常。遂不肯藥。雖吐下兼用。猶然未盡。病情越日復發。仍用稀涎散灌甦。梳洗如舊。厚衣不除。足見風涎尙未盡解。於是製鬱金劫巢湯。頻服。汗出知熱。減衣而安。然舌下蝦眼猶然未除。

興白礬、肉桂末放於舌下。一宿遂消。蓋桂能散風，礬能散痰故耳。後因瓜菓無忌，葷腥雜進，復發前疾，仍與前藥而痊。

又治某室年近三十，悉同前症。亦與稀涎散灌之，卽吐。復進辟靂湯。戒口慎寒，病隨藥愈。因此益悟實邪盤踞上焦，脹閉之症，隨其上而治之可也。如風熱痰飲，填食喉風胃癌及卒忤中惡，魘夢中毒之類。古人曾有瓜蒂散、稀涎散、葱豉湯、淡鹽湯、茱萸子末、生薑汁、葱白酒、雄黃丸等，隨症施治。若寒痰閉塞及中臟脫絕之症，古人曾有橘紅半夏湯、人參附子湯，因痰築喉間，稍爲變通，隨灌隨吐。痰隨藥出，又隨吐隨灌，拭出其痰，少頃痰閉下藥，隨症處方。其人立甦，皆古人成法，可效爲變通者。

又治某婦牙緊，咽葉木咽，腫牙緊，脈來浮滑，悉是風痰爲病。風邪中上，故多咽喉上痺之症。與稀涎散調水灌之，涎出口，最奇。舌下另生一齒，大如棗核，以白礬、肉桂末點於舌下齒旁，立時取落。遂乃開聲，疏以驅風消痰之方，如荆防、薄桔、芷礬、甘草、膽星、殼蠶、薑汁、竹瀝等二劑，痊，胎亦無恙。

某女年近二十，未出閣，素無病。六月夜食新炒花生，就睡。次早牙緊，氣促，遍身大熱，昏迷不醒。比晚余至，身冷僵硬，余思此症若非虛脫，必是閉塞，必欲一視，以明其症。於是持燭入室，去帛諦視，滿面紅色，鼻準尚有汗注。余曰：如此活人，何故埋之？遂與雄黃解毒丸合稀涎散，調勻一盃，微枕從鼻灌下，灌至一半，藥從齒縫中溢出，其口忽動，牙關忽開，觀者大驚。復將餘藥從口灌入，喉內有涎溢出手，足齊動，觀者益驚。余益振發精神，仍加前藥再灌。立時側面而吐，又與前藥，嘔出膠痰一甌，呻吟不已。人事乃甦。然尙不能發聲。時已鶴鳴，抱入臥牀，囑其開口細視，滿喉膠痰，紅絲繞塞，乃知繩喉風也。迨天色將曙，覓取土牛膝搗汁，調元明粉一兩，鵝翎捲出其痰，隨嘔隨捲，乃得發聲開目。與疏風清火藥三劑，又頻進生津藥而安。

某堂年逾五旬，形體肥盛，多痰。每投薑附，效厥後屢進，漸有肩胛疼痛，手足拘攣之狀。醫云當防中風，日進葷，

附。既不知久而增氣之例。又不審病因氣變之理。竟到危急邀視。牙關緊急。咽喉閉塞。且滿面火光炎炎。諸醫又認中風戴陽。余不暇辨。令取鹽梅搗汁擦牙。俾得牙開。始見滿口膠痰壅塞咽喉。隨用稀涎散調水捲取其痰。約嘔升餘。其聲始開。然尚不能言。又以元明粉攪洗喉中。隨嘔隨攪。又得升餘。方云要睡。次日連進控涎丹。二日中約進六十粒。得微泄。改進清肝化痰藥健。

排膿法

甲字排膿湯

專治瘡癰癰腫。堅不灌膿。服此方能灌膿出毒而早歟。腸癰亦主之。

黃芪 防風 銀花 山甲 丹皮 瓜蔞 連翹 白芷 甘草

某苦少腹脹滿。肛門重墜。欲解不解。時下膿血。醫稱休息利。百治不愈。繩繩半載。余視神色不變。少腹按之愈痛。所下盡是白滯。然亦有時汚血。診脈舉按皆滑。沈候略帶微數。疏方與芪防、銀甲、丹蔞、翹芷、甘草一劑。下白膿帶黑污而出。腥穢不堪者一勺。少復始舒。後重乃除。再劑除瓜蔞。加薏苡而痊。此腸癰症。故所用藥味。皆取法於排膿也。

乙字排膿湯

治感受溫熱。復生癧毒。或癧毒盤陷。溫邪內入。發熱肢冷。吐瀉交作。躁擾口渴。宜用此方達邪排膿。則諸恙可蠲。

連翹 乾葛 防風 薄荷 知母 丹皮 木通

甘草 人參 黃芪 貝母 檳榔 灶土

某孫暑月吐瀉。發熱肢冷。躁擾口渴。滿頭癧毒。概已盤陷。惟左腦後大癧。尚隱隱若紅。且腦側及項漫頑闊。此

風熱內蘊。未得外達。勢必內陷。擾亂腸胃。以致吐瀉交作也。先服前方。去參芪、貝母、加山梔三劑。小水甚長。風症吐瀉悉止。惟兩癧悉皆高聳。頭項愈腫。余曰。兩癧必俟透膿。其腫方消。前方去三梔。加參芪、貝母。每二服。果得大膿。頭項腫處皆消。後以清胃養陰之藥。洋參斛、麥、芩、桑葉之屬而痊。

吐法嚏法

食鹽探吐方

專治停食。痰飲。喉風。卒忤。中惡等證。均可以此方探吐之。

炒食鹽一兩。熱水灌服。兼用通關散吹鼻取嚏。燒鹽一兩。煎水一碗。灌之。

治某婦胸腹大痛。忽然昏倒。手足逆冷。口不能言。兩手握固。兩尺脈細。斷脈絕必死。余診兩尺果無。而症與脈反。若果真脫。豈有不面青大汗之理。書云上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。似此必傷食所致。故胸中痞塞。陰陽不通。上下阻絕。理宜先開上竅。俾其中舒。因問曾傷食否。伊姑應曰。啖油膩肉。遂放膽用法。而不用藥。令炒食鹽一兩。熱水灌服。兼用通關散吹鼻。大嘔大吐。傾刻而醒。吐出完肉數塊。麪蛋帶痰數碗。其病如失。又某年壯體強。早膳後。忽胸膈大痛。叫喊數聲。臥地昏倒。肢冷體溫。余診尺脈雖無。而寸關甚堅。且面色未變。喉無痰聲。如此卒暴之恙。決非中風。中寒。中氣之症。意揣食前無恙。食後即胸膈作痛。蓋胸中陽位。食物猶在賁門。阻遏陽氣。不得下行。合乎尺脈不至。古人原有食厥之條。當作中食之症。至於治法。有上部有脈。下部無脈。其人當吐之訓。於是燒鹽一兩。煎水一碗。灌之湧出痰食二升而愈。

點舌法

礬桂散

專治舌下蝦眼鬼齒。

白礬肉桂末

治舌下蝦眼。將末放於舌下。一宿遂消。以桂能散風。礬能散痰故也。蝦眼在於舌下根兩旁。狀如小泡。明若水晶。別無所苦。又治舌下另生一齒。大如棗核。摸之稜指。按之似痛。以此末點於舌下齒旁。立時取落。敲之即碎。外黃內白。總之蝦眼鬼齒皆風涎所生。風邪中上。故多在咽喉上痺之症。可見風無定體。其爲病之變態。人難測識。類多如此。

塗臍法

胡椒散

治脾腎虛寒。久瀉不止者。用此散敷臍。

胡椒

五錢研細。津唾調敷於臍。立時身動。

某孫吐乳日久。昏迷不醒。掐之不哭。睡不交睫。翳膜遮睛。二便長流。四肢厥冷。時忽抽搐。喉如曳鋸。內外一探。陽氣竭絕。因其無陽藥可偏恃。但救危須在頃刻。藥餌一時難回。令研胡椒五錢。津唾調臍。立時身動。似覺微煩。口中聞有椒氣。哭聲漸出。隨調扶陽丹一兩灌服。

搽舌法

蒲薑散

專治舌腫。舌脹大等證。

蒲黃乾薑 等分研末調茶。

治舌白脹滿塞口。在小產後惡露如崩。胸緊腹脹。氣迫窒塞。怒目而視。人事大困之候。以此二味搽舌。遂縮。

陰陽攝引法

燒棍散

治陰陽易病。其人身重少氣。少腹裏急。陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不舉。眼中生花。膝脛拘急等證。

治陰陽易症。少氣。颯颯寒熱。少腹痛。引腰膀。小便不利。頭重不舉。眼中生花。棍襪當也。因此病由淫情之不禁。而餘邪得以乘其隙。而移患於無病之人。遂令一身之精氣神形。皆受慾火之害。故非草木之味所能愈。仍須陰陽感召之理以制之。斯棍襪之以意相求也。棍襪者。男女陰陽之衛。陰陽之以息相吹。氣相聚。精相向者也。衛乎外者。自能清平內。感於無形。以之治有形。故取其近陰處。燒而服之。形氣邪感。得其隱曲。小便自利。乃清陽出上竅。濁陰歸下竅。而諸症悉除矣。然女病可服男棍。男病可服女襪。仍合陰陽交合之理。格物之義。雖至穢之品。却爲至奇之方。

括沙法

記讀景岳全書。有括沙新案云。予荆妻年及四旬。於八月終。新寒暴雨。中陰寒痧毒之氣。忽二更天。嘔惡胸腹攬病。勢不可當。藥餌不及。因以鹽湯探吐之。痛不減。連吐數次。氣愈升。痛愈劇。因而上塞咽喉。甚至聲不能出。藥不

可入。危在頃刻間矣。忽想到括沙法。乃擇一光滑細磁碗。別用熱湯一鍾。入香油一二匙。將碗口蘸油湯內。令其
煖而且滑。用兩手覆執其碗於病者背心。輕輕向下括之。以漸加重。碗乾而冷。再凌再括。良久。覺胸中脹滯。漸有
下行之意。稍寬。始能出聲。頃腹響。遂大瀉如傾。痛即減。瀉後睡一飯頃。通身養極。發出疮瘡。風餅如錢大者。不計
其數。至四更而退。愈後細窮其義。蓋以五臟之繫。咸附於背。故向下括之。則邪氣亦降。凡毒氣上行則逆。下行則
順。改逆為順。所以得愈。雖近有兩臂括法。亦能治痛。然毒深病急者。非括背不可也。至若風餅疮瘡之由。正以寒
毒之氣。充塞表裏。經臟俱閉。故危。今其臟毒既降。然後經氣得行。而表裏俱散也。可見寒邪外感之毒。凡臟氣未
調。則表亦不解。表邪未散。則臟必不和。此其表裏相關。義自如此。故治分緩急。權衡在人矣。愚竊思寒毒中臟。臟
爲裏。所以裏氣不達。外受之邪。表亦不散。非溫經通脈。鮮克有濟。(此案足與溫中通陽。溫經通脈法。內寒毒中
臟用附子理中。四逆自通。當歸四逆。藿香正氣。八味地黃之案。互相發明。)