


年并里有降仙者自呼純陽子
予舉是印之大書曰玄珠玄珠
遂以名云是且然乎哉進于技
矣

賜同進士出身徵仕郎中書舍

人故鄣丁元薦撰



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P. R. C.

自序

孫仲子奎曰先文學以儒術起家
 迺七尺孱弱始受易為諸生攻制
 藝過苦又屢上棘圍罷歸不無快
 快體罷憊而弱益甚余甫垂髫日
 侍咕畢見之輒隱心焉間嘗自念

易水五經

序

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN; R.O.C.

昔人有言事親者不可不知醫何
得究竟秘奧俾葆和吾親無恙乎
然猶之呻吟帖括未已也此稍長
先文學令視伯兄賈之括蒼道邁
異教家有僊僊也者指余曰孺子
何為者乃恂恂若爾吾懷秘密久

矣遇而後傳吾歷觀人間世無如
孺子可授若能受而讀吾方可以
衛生可以澤物所就匪直一手一
足烈矣何必劬劬奔走齷齪籌計
為哉余曰幸甚君之禁方豈能如
陽慶公所傳五色竒咳之術余小

子事親有所藉手矣及受讀而解
驗之果有槩於中而多奇中因趣
裝歸海陽語先文學以故且告之
欲舍業而事方術先文學沾沾喜
曰醫何不可為也良醫濟施與良
相同博比衆又何論良賈第異人

所授精良矣顧拘局而不通洽脫
非心融機變則其方泥而難用夫
飲水者必窮其源軒岐遺經非方
術家之崑崙乎而張仲景以下諸
家皆崑崙所達支委也彼習業者
專則精不專則雜稟心者一則恒

不_レ一_レ則_レ間_レ飛_レ衛_レ之_レ貫_レ虱_レ也_レ佞_レ倭_レ之_レ
承_レ蜩_レ也_レ專_レ一_レ故_レ也_レ小_レ子_レ第_レ勉_レ之_レ迺_レ
發_レ軒_レ岐_レ遺_レ書_レ以_レ及_レ諸_レ大_レ家_レ載_レ籍_レ下_レ
帷_レ誦_レ讀_レ口_レ玩_レ心_レ惟_レ無_レ間_レ寒_レ暑_レ可_レ三_レ
年_レ所_レ私_レ心_レ又_レ謂_レ索_レ居_レ而_レ闕_レ觀_レ孰_レ與_レ
廣_レ詢_レ而_レ遠_レ覽_レ方_レ今_レ明_レ盛_レ多_レ賢_レ宇_レ宙_レ

寥_レ濶_レ四_レ海_レ九_レ州_レ之_レ士_レ持_レ昭_レ曠_レ而_レ晰_レ
成_レ法_レ者_レ詎_レ無_レ其_レ人_レ余_レ何_レ卑_レ卑_レ以_レ丘_レ
里_レ自_レ隘_レ也_レ於_レ是_レ自_レ新_レ都_レ游_レ彭_レ蠡_レ歷_レ
廬_レ浮_レ沅_レ湘_レ探_レ冥_レ秦_レ淮_レ釣_レ竒_レ於_レ越_レ卒_レ
之_レ淹_レ跡_レ三_レ吳_レ焉_レ所_レ歷_レ之_レ地_レ遇_レ明_レ達_レ
而_レ折_レ伏_レ其_レ前_レ與_レ之_レ譚_レ支_レ順_レ闡_レ橫_レ之_レ

秘叩下遂上爭之旨辯陽入陰入
之殊闡經絡和代之異與夫鏡石
橋引案杭毒熨之法今三十年于
茲矣惟耳目漸廣故得於心者津
津漸融即未能為人治病決死生
多驗或庶幾診視鮮戾投劑靡乖

慰夙心而遂生平永親年而登大
耄矣惟是三吳諸名公遂信余有
知也忘分下交爭為延致余又懼
時過苦難因乘餘暇采先哲之名
言出已試之鄙見積以歲年纂輯
成囊上之期無負先文學之訓次



之希免徧閱之勞下之為子姓守
故業者立法程焉非以此而希有
聞也廼有客請余集而付剖劂夫
以名家稱者林林而著作之盈克
棟余何必置一株鄧林間哉客曰
榎楠豫章櫟社之樹皆木也良與

賤之分有目者能辨之君有國工
能而自秘其術何示人不廣也余
曰不佞固非榎楠豫章之良散木
之賤亦非甘心如客言當置之市
肆以竢工師運斤焉是所願也敢
自矜敝帚而秘之乎若曰懸書國



門ニテ以カク市カク譽ス非ス予カ所ニ敢ス

古歛黃鼎刻

生生子赤水玄珠目錄
一卷

風門

明風篇 傷風 真中風 類中風 瘖痲

瘟疫門

明疫篇 頭面腫俗呼鷓鴣瘟一名蝦蟇瘟

火熱門

明火篇 外內君相篇 病梳篇

論五臟有邪身熱各異 論表裏熱

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

論雜病發熱惡寒與傷寒不同

惡寒非寒惡熱非熱論

二卷

暑門

明暑篇 注夏 解佻

濕門

明濕篇

三卷

燥門

明燥篇

寒門

明寒篇 中寒 惡寒

頭痛門

頭痛 頭風 眉稜眶痛 雷頭痛

大頭病 風屑 頭重

四卷

面門

面 頰車病

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

目門

目 外障 內障

鼻門

鼻 鼻淵 鼻斂 鼻瘰肉

耳門

耳 耳鳴 耳聾 耳腫痛

口門

口 唇 舌 齒

咽喉門

咽喉 喉痺 梅核氣

五卷

腹痛門

腹痛 水鳥 小腹痛

脇痛門

脇痛

心痛門

心痛 胸滿 胸痛 胸痺 蟲痛

嘔吐噦門

嘔吐噦 胃風 惡心 嘔苦水 嘔沫

嘔膿 嘔長虫 酒嘔 嘔清水

腰痛門

腰痛

六卷

水腫門

針灸法

水腫通論 羅志無治 許魯齊藥案 論水氣証治法 脈經叙諸水形証 仲景治水大法

脹滿門

脹滿 一名鼓脹 一名单鼓

一名氣虛中滿

虫蟲

痞門

痞

七卷

吐酸門

論吐酸屬熱

論雜病吐酸與病机外邪不同

辨素問東垣論酸不同 停飲

痰飲門

怔忡驚悸門

心澹澹動門

怒門

善太息

善恐

善悲

附婦人妊娠善悲

八卷

欬嗽門

欬嗽

九卷

喘門

氣短

氣促

少氣

產後喘

哮門

善悲

肺痿

肺癰

十卷

瘡門

瘡

瘡母

產後瘡

泄痢門

泄痢

泄痢辯

泄瀉辯

痢門

十一卷

氣門

九氣見症

血門

嘔吐血

咳血

咯血唾血痰涎血

鼻衄

齒衄

舌衄

肌衄

小便血

大便血

十二卷

下血

九竅出血

中蠱下血

金瘡出血

虛怯虛損癆瘵總論

辨明醫雜著忌用參芪論

虛損治法

論精氣奪則虛

論形氣不足有餘用補瀉法

十三卷

癆瘵

傳尸癆

方外還丹

還丹秘要論

固精法

止瘻遺

取紅鉛法

取梅子法

製首經金鉛法

生取梅子

法

製紅鉛法

製白鉛法

製靈鉛法

製真土法

寶珠丹

煉乳膏法

製金乳粉法

取乳酥法

又取乳粉法

取碧玉仙苑

法

取交梨火束法

取後天月月一枝

花

陰煉秋石法

陽煉秋石法

又陽煉法

秋石水片法

煉伏火黃芽法

取秋石水花法

煉黃芽法

煉白雪法

晒甜秋石法

取秋石水法

製混元球甜石法

取秋石精英法

取秋露水法

取雪水法

三妙丹

三元丹

五精丸

補真膏

紫虛延齡丹

辯鐘乳石

煉鐘乳法

鐘乳丸

鐘乳煎

五子全鹿丸

紫石英散

駐顏小還丹

十四卷

欬門

欬

痿門

痿

脚氣門

脚氣

白濁門

白濁

十五卷

夢遺門

夢遺

汗門

汗 頭汗

手足汗

無汗

消痺門

上消 中消

下消

口燥咽乾

十六卷

痺門

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

行痺 痛痺 臂痛 肩背痛 着痺

鶴膝風 挛 一身盡痛 產後一身盡痛

十七卷 內傷門

傷飲傷食門

傷酒 傷食 不能食

積聚門

積聚 汪子良積聚論 附五臟積方

石瘕 腸覃

十八卷

癩狂癩門

明癩 明狂 明癩

顫振門

顫振

瘰癧門

瘰癧

瘰癧門

瘰癧 勞風

不得卧多卧門

不得卧 多卧

煩躁門

煩躁

健忘門

健忘

十九卷

秘結門

秘結

大小便不通門

大小便不通

關格門

關格

癃閉門

癃閉遺溺不禁辨 小便不通

二十卷

遺溺門

遺溺 小便不禁 溺赤

脫肛門

脫肛 截腸病

前陰諸疾

疝門 疝

二十一卷

霍亂門

霍亂 轉筋

中惡門

中惡 客忤

欬逆門

欬逆

噫氣門

噫氣

下氣門

下氣 漏氣 走哺

嘈雜門 嘈雜

眩暈門 眩暈

瘖門

舌瘖 喉瘖 姪娘瘖

瘰癧門 瘰癧

厥論吐法

二十二卷

傷寒門

二十三卷

傷寒門

二十四卷

傷寒門

二十五卷

婦人門

二十六卷

婦人門

二十八卷

婦人門

三十卷

小兒門

三十二卷

小兒門

三十四卷

二十七卷

婦人門

二十九卷

婦人門

三十卷

小兒門

三十三卷

痘疹門

三十五卷


痘疹門

三十六卷

外科門

外科門


終



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

生生子赤水珠丸例

一 是書專以明証為主，蓋醫難於認証，不難於用藥。凡証不拘大小輕重，俱有寒熱虛實表裏氣血八箇字。苟能於此八個字認得真切，豈必無古方可循，即於十二經藥性中表裡寒熱溫涼間，摘出治之，自然權變合宜，不失勝筭。故古謂審証猶審敵，知己知彼，百戰百勝矣。



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一 所引諸書名及諸家姓氏者欲人知有所自
且一証之中經書多有誤之未盡者前賢或
觸自感悟揭而補之俾後學得以宗做後之
人不究前人盡心用意處反謂其長于此而
對於彼其善于補而不善于攻迺以補其缺
略者反指以為偏駁豈知本之學哉且又不
贅師訪友局守一家之說濫稱專門焉能擴
先愚故不揣管陋每於一証之間有經文可

據者即以經文為首引無經文者采取各家
之言為証是則宗之非則黜之間有悞後人
惑來世者則援摭格言輿論以折其衷庶見
前人補缺之意匪偏而後之取法者得以履
其正也

一 辨証原經文有單立篇自則原依其篇自有
混稱未析者或古今名稱不同如古經以風
寒濕三氣雜至而成痺立名丹溪迺改痺為

痛風又如腸澀泄利腸風臟毒混論而未
如此者甚多設不辨而正之何所適從茲以
各証經文混論者列之于前以為之經以今
人嘗稱者析之於後而為之目下各列治
法庶古今照貫攻治不紊緩急檢閱免致疑
滯

一婦人臟腑經絡七情六氣感病與男子無以
異治法亦然所異惟胞門子戶月汛胎產陰

挺崩漏赤白帶內外吹俞特標婦人門五
卷使知同異端緒大方經畧庶家技不得稱
擅場局夫不得呼專秘隨俗為變醫之能事
斯無愧於扁鵲也與

一治小兒法惟臍風兜乳盤腸內疝驚疳痘疹
為差別餘皆與大方脉同但臟腑脆薄劑宜
較小俞三歲內者不形於診然虎口三關之
紋亦難盡憑當於聲色動靜哭咲大小便參

乏四歲後便可以一指按於經渠列缺之上
診左右手脉孰大孰小孰浮孰沉以辨內外
二傷率多應驗不可謂全不關於診也至如
痘疹尤小兒緊要方術及外科并列門後以
統其治用寓無可無不可之意云

一採用經史 國典群書諸雜家言統計二百
六十五種非淺騁博洽資口吻也以為不廣
搜遠引不且發明天人合一之旨而聖賢立

功立命之意夫古之人有不為良相忘為良
醫也者此何以故子輿氏曰老吾老以及人
之老幼吾幼以及人之幼然則惠溥當時澤
流後世是惟相與醫迺克踐之矣

一醫家著輯汗牛充棟不能一一購置但取其
書可宗法萬世無弊者一部中採數條一門
中採數法數方以為嚆矢要之緣辭契意神
而明之存乎其人而已况登彼岬若航筏尚

可棄乎

一醫寄生死之關非知性命者不足與有言也
儒之窮理盡性以至於命固當取以拆衷而
老氏性命兼脩釋氏明心見性道理自可參
觀故兼採二氏為翼夫知三教之所以者于
醫學思過半矣

一醫要先識人身內景臟腑形質手足經上下
宗氣營氣衛氣呼吸出納三焦終始及各經

表裏陰陽金木水火土部位配合命名之義
上下不得錯綜一經不得兩配與河洛周易
靈素洪範黃連性理諸家合一不背洞悉源
委始能言標本而測病機若內景不明羣書
不究局不然守草根樹皮之末方左右抵牾
逢原謂何如命門三焦包絡相火及手足經
配合自難經已下紛不決者余不揣菲譎
于醫旨緒餘中僭為剖析似與靈素洪範太

極百家照徹相貫敢以俟之具法眼者
一醫道肇自炎帝之本草而黃帝之內經伊尹
之湯液而周禮登之天官冢宰誠重之也諸
如上池金匱青囊或神或僊不可枚舉其顯
在六卿廊廟者齊則褚澄唐則王珪李世勣
陸宣公狄梁公劉禹錫李兵部宋則文潞公
蘓子瞻朱紫陽我明則劉誠意咸有著述
此皆上古良相之芳躅逸人之高致逮今風

斯為下廁之技流烏知醫之原自耶噫道無
汙隆顧人力行何如耳宣尼有言人能弘道
非道弘人吾黨共勗之哉

海陽生生子孫一奎識
菘城友人沈之疊書



示...

赤水玄珠第一卷目錄

風門

明風篇 傷風 真中風 類中風 瘖痺

瘟疫門

明疫篇 頭面腫 俗名鷓鴣瘟 一名蝦蟆瘟

火熱門

明火篇 外內君相篇 病機篇

論五臟有邪身熱各異 論表裏熱

論雜病發熱惡寒與傷寒不同

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



赤水玄珠第一卷

明新安休陽生生子東宿孫一奎著輯

友人楚銅壁山人桂峰黃 廉

古歙抱拙子鍾山程弘賓


和字方中聲校閱

門人婺邑汪甘節吉甫

潘士梧惟美

查道立仲脩

休寧程 銓惟衡



徐景奇士偉

余煌明德

子泰來中孺
朋來濟孺
校梓

○風門

○明風篇

生生子_カ曰風春之令氣也木之所司肝為之_カ主素
問六化篇云木之化風主於春春之為言蠢也
陽氣蠢動故風所以鼓舞萬物為天號令岐伯
曰東方生風風生木其臟為肝其志為怒故怒
傷肝風傷肝肝為足厥陰之經以六氣言之自
十二月大寒節起至二月春分節止是初之氣
厥陰風木用事人有感其令氣者為傷風其有

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不即發於令氣而四時亦有傷風之症者時人謂之四時感冒感有淺深治有緩急令既不同治亦有異故首述經文以明風之躰有所據而人天咸一之理實寓焉後別治法以見風之變症無常非簡約可盡先賢有言曰風乃百病之長善行而數變非易言也信矣

傷風

仲景傷寒論謂有汗惡風脉浮數為傷風外有六經之形症太陽症頭項痛腰脊強以桂枝湯治

之後若傳經當究仲景節菴治法治之其餘不過感冒耳四時皆有之以後法按治

九味羌活湯 治四時傷寒傷風頭痛遍身盡痛腰脊強發熱晝夜不散不思飲食

- 羌活 防風 川芎 白芷 細辛 柴胡
- 黃芩 生地 甘草 蒼朮 姜三片棗一枚
- 水煎熱服 如惡心減黃芩 如有汗加白朮減蒼朮
- 如口渴加知母石膏 如一二帖不解或天寒時月加麻黃 如鼻塞加紫

蘓荻白

夫此方予每用加柴胡乃總治傷風各經之活套也今人只知其治四時傷寒如神不知加柴胡總治各經之妙蓋羌活治太陽肢節疼大無不通小無不入乃撥亂反正之主也防風治一身盡痛聽君將命令而行隨所引而至柴胡治少陽頭疼在兩頭角及寒熱脇痛耳聾白芷治陽明頭痛在額蒼朮雄壯能除足太陰經濕氣使邪不得傳脾生地黄治手少陰心熱在內黃

芩治手太陰肺熱在胸細辛治足少陰腎經苦頭痛不已川芎治足厥陰頭痛在腦以方乃易老所製凡見表証悉宜服之不犯三陽禁忌實解利之神藥也然以一藥而類治各經之証苟用其方而不知其所以立方之意則未免有執一之弊故述各藥主治本旨使學者詳各經之症孰重以本經之藥為君迭為賓主則所治無不响應

和解散

治傷風鼻塞咳嗽胸脇吊痛發熱口渴

紫蘓 杏仁 陳皮 半夏 前胡 薄荷
葛根 甘草 炙桔梗 桑白皮

姜三片 葱白三根 棗子一枚 風邪重 勵傷

桂枝湯 治太陽頭項痛 腰脊強 自汗

桂枝 赤芍 甘草 炙姜三片 棗二枚 煎服 取微汗

此冬月即病宜服 春分後忌之 小便數及飲

酒人皆不宜服 飲酒人不喜甘 恐中滿而嘔也

參蘓飲 治傷風鼻塞 發熱惡心 有痰胸膈不利

橘紅 枳殼 桔梗 粉草 炙各木香一分

蘓葉 半夏 乾葛 前胡 人參 茯苓 各分

姜三片 棗一枚 咳嗽甚者 去人參 木香

熱盛喉疼 除半夏 加天花粉 酒茶

熱傷風 咳嗽喉疼 面熱 此素有痰 火鬱熱在內 熱極生風 或為風寒 所束 不得發越 此熱為本 寒為標 治宜清熱 散寒 經云 火鬱則發之 又曰 風寒外束者 可發

二陳湯 加桔梗 天花粉 玄參 薄荷 酒茶 前胡

嗽不轉 加瓜蒌仁 夜嗽多 加知母 喉疼 減

半夏 痰盛加貝母枳殼 肺熱氣壅輕則加桑白皮地骨皮重則加石膏
 肺氣虛發熱咳嗽服前發散藥其嗽愈其或被發散太過當用收斂之劑補之 日間嗽多吐白痰沫或惡心者為氣虛六君子湯加五味子薏苡仁款冬 夜嗽多口渴痰不易出發熱為血虛四物湯加知母五味子馬兜鈴麥門冬瓜仁
 肺氣實或素有痰為風寒所閉鼻塞咳嗽氣壅不得倒頭而卧

三拗湯

麻黃連根 甘草生用 杏仁去皮尖
 姜三片棗二枚煎服取清痰乃止
 痰盛者 瀉白散加石膏枳殼天花粉前胡
 効遲加玄明粉一錢調下立應

中風

內經云風之傷人也或為寒中或為熱中有中血脉有中腑有中臟
 東垣云中血脉者口眼喎斜 中腑者肢節廢面

加五色有表証拘急不仁。中臟者唇緩失音鼻塞耳聾眼瞽便閉性命危急此三者治各不同如中血脈外有六經之形症則從小續命湯加減及踈風湯治之。如中腑內有便溺之阻隔宜三化湯局方中麻仁丸通利之外無六經之證內無便溺之阻宜大羌活愈風湯秦芫湯中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜之。

綱目云中風世俗之稱也其證卒然仆倒口眼喎斜半身不遂或舌強不言唇吻不收是也然名

各有不同卒然仆倒者經稱為擊仆世又稱為卒中乃初中風時其狀又如此也其口眼喎斜半身不遂者經稱為偏枯世又稱為左癱右瘓及腸腿風乃中倒後之症邪之淺者狀如此也其舌強不言唇吻不收者經稱為癱病世又稱為風謔風氣亦中倒後症邪之深者狀如此也東垣以中脈中腑邪淺而易治中臟為邪深而難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故內經連名稱為擊仆偏枯也後世迷失經意以偏枯為

非病之旨一以中風名之遂指偏枯為枯細之
枯而非左癱右瘓之症習俗之弊至於如此也
殊不知仲景云骨傷則痿名曰枯蓋痿緩不收
則筋骨氣肉無氣以生脉道不利手足不稟水
穀之氣故曰枯非細之謂也積日累月漸成細
者間有之非可便指枯為細也此枯字柳初中
倒時隨即醒者宜治者不醒者宜搯人中俾醒
者痰涎壅盛宜吐之口噤亦吐之若口開手撒
遺尿者為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼

戴上者宜灸之

玄珠經云風病口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾
者五臟氣絕也蓋口開者心絕手撒者脾絕眼
者肺絕也若見一合者肝絕遺尿者腎絕如鼾
上散腎水及麩心火煎遺尿口開氣喘斷不救也
按已上皆真中風症也由人元氣素虛膝理疎
豁衛弱失護一遇風邪莫之能禦痊曰邪之所
奏其氣必虛救醒後多用驟補法丹溪獨參膏
加竹瀝姜汁之類與類中風症不同法也

附方

赤水玄珠

卷一

十五

小續命湯

麻黃去人參 黃芩 芍藥 防已 川芎
杏仁 甘草 桂枝一附子五錢防風五錢
每服五七錢加生姜五片水煎食前熱服
金櫃要畧有石羔當歸無附子

凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經云開則泄然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨症治之

中風無汗惡寒麻黃續命主之依本方麻黃防風

杏仁各加一倍宜針至陰解針入二分出血崑崙後跟骨舉取之

中風有汗惡風桂枝續命主之依本方芍藥桂枝杏仁各加一倍宜針風府項後入髮際一寸二分禁灸上二證皆太陽經中風也

中風有汗身熱不惡寒白虎續命主之依本方甘草加一倍外加石膏知母各二兩

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之依本方桂枝黃芩各加一倍外加乾葛二兩宜針陷谷根

指次指間本節
後陷中針五分
去陽明之賊刺厲兌指在足指
如非葉去爪甲瀉陽明之實上二證皆陽明經中風

中風無汗身涼附子續命主之依本方附子加一
倍甘草加三兩外加乾姜二兩宜刺隱白擬麻

側爪去太陰之賊此太陰經中風也

中風有汗無熱桂枝續命主之依本方桂枝附子

甘草各加一倍宜針太谿足內踝後跟骨上陷
崙以少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或

麻木不仁宜羌活連翹續命主之小續命八兩
外加羌活四兩連翹用六兩

舌之續命混淆無症之別今各分經治療又分經

鍼刺法厥陰之井大敦足大指甲後刺以通
其經少陽之經絕骨非葉聚毛間灸以引其熱是
鍼灸同象法治之大躰

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝
連翹 麻黃去節 薄荷 山梔 白朮 荆芥各五錢

石膏 桔梗 黄芩各二滑石 甘草各二
 每服一两加生姜水煎服

中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮矣秦艽湯主之

秦艽三兩 甘草 川芎 當歸 白芍 石膏各二
 細辛五錢 羌活 防風 黄芩 白芷 白朮
 生地 熟地 白茯苓各一 川獨活二兩
 右十六味剉每服一两水煎温服無時如遇天

陰加生姜如心下痞每兩加枳實一錢同煎
 中風外有六經之形症先以加減續命湯隨症治之
 之內有便溺之阻隔復以三化湯主之

厚朴 大黃 枳實 羌活各等分
 右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半
 終日服之以微利為度無時法曰四肢不仁俗
 曰癱瘓故經所謂太過則令四肢不仁又曰土
 太過則敦阜高也敦厚也既厚而又高則令
 除去以真所謂膏粱之疾非肝腎經虛也何以

明之經所謂三陽三陰發病為偏枯痿易四肢
 不禁王注曰三陰不足則發偏枯三陽有餘則
 痿易易為變易嘗用而痿弱無力也其治則瀉
 令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯
 選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則
 卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆
 稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟受也
 今脾不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣
 氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故

○

不用焉其治可補十全散加減四物去邪置正
 愈風湯中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以
 行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥
 加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣
 之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久
 則清濁自分榮衛自和如初覺風動服此倒不致
 羌活 甘草 防風 川芎 細辛 枳殼
 人參 麻黃 甘菊 薄荷 當歸 知母
 黃芪 柴胡 前胡 半夏 厚朴 生地

赤白芍藥

四兩

熟地 防已 茯苓 黃芩 白芷 蔓荊子
枸杞 地骨皮 兩 石膏 蒼朮 兩 桂 兩
芍藥 兩 獨活 杜仲 兩
右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服如遇天
陰加生薑空心一服臨臥再煎渣服俱要食遠
空心一服嚥下二丹丸為之重劑臨臥一服嚥
下四白丹為之輕劑是動以安神靜以清肺假
令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩均
作四服每服加生薑五片空心以粥投之得微

汗則佳如一旬之通利用愈風三兩大黃一兩
亦均作四服如前煎臨臥服得利則妙常服之
藥不可少四時之輔如望春太寒後加半夏柴
胡人參各二兩木通四兩此迎而奪少陽之氣
也望夏之月加石膏黃芩知母各二兩此迎而
奪陽明之氣也季夏之月加防已白朮茯苓各
二兩勝脾土之濕也初秋太暑之後加厚朴二
兩藿香二兩桂一兩木通二兩此迎而奪太陰
之氣也霜降之後望冬加附子乙兩桂一兩當