

エト 2B 15

81-250


餘興動物園
集 容

動物園目錄及解說

織 田 信 德 編

當園開設ノ趣意

動物學研究上動物園ノ必用ナルハ喋々論ヲ要セズ然ルニ内國中
 東京ニ於テハ既ニ其設ケアレモ當市ニ於テハ未ダ其設ケアルナ
 シ故ニ當園主澤田久米藏ハ今回ノ博覽會開設ノ好期ニ際シ奮ツ
 テ之レヲ設置セントテ企圖シ山岡千太郎ト謀リ茲ニ本園ヲ開設
 スルニ至ル諸氏幸ニ其意ヲ諒シ陸續縱覽アラントテ希望ス
 一抑モ動物學ハ博物學中最モ要用ナル學科ニシテ特ニ生時ノ形
 狀動作及ビ齒牙骨骼ノ組織等ヲ研究スルノ必用アリ然レモ當
 園収容ノ動物ハ急設ヲ要シタル爲メ採集後直チニ輸送シタル
 モノニシテ馴養ノ暇ナシ因テ食餌及ビ棲息地ノ温度等ニ就テ



ハ晝夜怠り無ク注意スルト雖モ尙ホ斃死スルモノアリ故ニ其生時ノ形姿舉動ヲ熟知セント欲スルノ諸氏ハ一日モ速カニ來園縱覽アラントヲ希望ス

一動物研究ハ生時ノ動作形狀ヲ見ルト最モ必用ナレモ尙ホ躰尺及ビ骨骼等ヲ熟知スルノ必用アリ此ノ如キハ生時ニ於テハ充分爲シ能ハザルトナレバ前項ノ如ク斃死シタルモノハ直チニ姿勢剝製ト爲スハ勿論其他ニ數多ノ剝製品及ビ骨骼等ヲ蒐集陳列シ置キ以テ研究ノ參考ニ供セリ

然レテ本園ノ設置ニ就テハ山岡千太郎ハ當地ノ準備諸事ヲ擔當シ澤田久米藏ハ南洋地方動物採集ヲ負擔シ緊急収容ノ手順ヲ運ラシ成ル可ク獲難キモノヲ蒐集スルノ目的ナレバ或ハ懸賞ヲ以テ捕獲セシモノアリ故ニ其費用ハ頗ル多額ヲ要シタレモ本園ノ趣意ハ原來營利的ニ非ラズ專バラ教育ニ資スルノ目

的ナレバ更ニ其費用ノ多キヲ厭ハス然レモ日數ニ限りアルヲ以テ充分ノ採集ヲ爲シ難キハ甚ダ遺憾トスル所ナリ

一此ノ解説ハ重要ナルモノヲ先キトシ動物學ノ順序ニ準リタルモノナレバ陳列順ニ非ラス故ニ其現物ト照合シ易カラシメン爲メ名稱ノ上ニ番號ヲ附ス又此ノ表外尙ホ多クノ種類殘レルモノアルハ後日追加スベシ

一各品名ノ上ニ左ノ印ヲ附シ、生物ト剝製品及ビ骨骼ノ區別ヲ爲シ置ケリ、又〔生〕〔剝〕トアルハ、生物ト剝製トノ兩種アルヲ示シ、〔生〕〔剝〕トアルハ、生物ト剝製ト骨骼トノ三種アルヲ示シタルモノナリ

〔生〕 ハ飼養シアルモノ

〔剝〕 ハ姿勢剝製ニ爲シアルモノ

〔骨〕 ハ骨骼ニ爲シタルモノニシテ、全躰ノモノ、或ハ頭骨ノミノモノ總テヲ云フ

有脊椎動物門

VERTEBRATA.

哺乳動物部

MAMMALIA.

四手動物

QUADRUMANA.

類人科

Anthropomorphae.

狹鼻猴類

Catarrhinae.

猩猩屬

Simia.

〔生〕〔骨〕〔和名〕

セウゼウ

牝牡

〔漢名〕

猩猩

〔學名〕

Simia Satyrus, Lin.

♀

♂

〔英名〕

Orange-ouang.

〔方言〕

Orange-koetan.

南洋蘇門答臘及ヒ「ボルネオ」島ニ棲息スル他動物ノ最高等ニ位スル種
屬ナリ當園収容ノモノハ南洋「ボルネオ」島「シントン」ノ産ニシテ形狀
ハ全身赤褐色、軀幹四尺六寸、肩幅一尺三寸、前肢三尺三寸、後肢二尺四寸
肩ノ毛ノ長サ一尺三寸、此類ハ四肢共ニ握ル、自在ニシテ常ニ立テ歩

行ス其身體ノ構造動作ハ略ボ人ニ似ルト雖モ思慮ニ至リテハ及バザ
 ルヲ遠シ食餌ハ蔬菜果物等ヲ以テ生活ス(牝ノ軀幹ハ比較的甚々小ナ
 リ)往古ヨリ我邦ニ山男ト云ヘルモノアリトノ俗説アレモ如何ナルモ
 ノナルヤ分明ナラズ然ルニ此獸棲息地ノ土人ガ之レヲ名ケテ森ノ人
 ト呼ブハ殆ソド我俗説ト符合スルガ如シ
 又亞弗利加ニ産スル大猩猩 *Gorilla* ハ同種類中最大ナルモノニシテ軀幹
 六尺ニ至リ肩幅三尺ヲ超エ力甚々強ク獅子 *lion* ニ拮抗スルト云フ性
 恰樹ニシテ常ニ喬木ノ梢ニ樹枝草蔓ヲ結び吊床ヲ構造シテ其内ニ棲
 息ス

猿 猴 屬 *Hylobates*

〔刺骨〕(二) テナガザル

(漢名) 猿 猴

(學名) *Hylobates*

(英名) *Gibbon*

(方言) *Siaman*
Siaman

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ形狀全身濃灰色ニシテ前肢頗ル長ク殆ソド

地ニ達ス此ノ屬ハ骨路能ク人ニ似タルヲ以テ類人科ノ内ニ數フ

獼 猴 科 *Cercopitheidae*

長鼻猴屬 *Nasalis*

〔刺骨〕(三) (和名) 新稱 テンゲザル

牝 牡

(漢名) 猴 一種

(學名) *Nasalis Larvatus*

♀

(英名) *Proboscis Monkey*

(方言) *Munglagan*
Munglagan

南洋「ボルネオ」島ニ産スル大ナル種屬トス其形狀異様ニシテ珍ナリ鼻
 甚々長ク(牝ノ鼻ハ他猴屬ニ比スレバ最モ高ク且ツ其形チヲ異ニシ牝
 ハ恰モ天狗ノ鼻ノ如シ)動作ハ常ニ四肢ヲ以テ這ヘモ時トシテハ立チ
 テ歩行スルコアリテ姿勢甚々人ニ似テ異狀ナリ當園ニ収容セルモノ
 ハ牡ノ軀幹三尺八寸前肢一尺八寸後肢一尺三寸三分尾ノ長サ二尺二
 寸牝ハ稍小ニシテ軀幹三尺前肢一尺二寸後肢一尺一寸尾ノ長サ一尺
 九寸アリ毛色ハ牝牡共ニ全身黃褐色ニシテ腰下部及ビ尾ハ白色ナリ

食餌ハ蔬菜果物等ヲ以テ生活ス此獸ハ飼養大ニ困難ナル故ニ未ダ生物ヲ收容スル能ハズ

長尾猴屬

Semnopithecus.

〔生〕〔骨〕(四)和名)假稱ナガラザル

牝牡

(漢名) 猴一種

(學名) *Semnopithecus Schistacelus*.

♀

♂

(英名) *Langur Monkey*.

(方言) *Rotoeng Poefi*.

印度「ヒマラヤ」山ノ産ナリ未ダ能ク人ニ馴レズ故ニ充分體尺ヲ檢スル能ハズト雖牝牡ハ其丈ケ約二尺餘尾ノ長サ四尺許リニシテ牝ハ稍ヤ小ナリ尾ノ形状「テンダザル」ニ似タリ毛ハ長クシテ全身淡灰色ニ少シク褐色ヲ帶ゾ然レテ年老ユルニ從ヒ次第ニ白色ヲ増ス胸部ノ毛下黒ク額上ノ毛亦タ黒ク其上毛ハ淡灰色ニシテ長ク眉庇ノ如シ又面部ノ周圍ノ毛ハ殊ニ長ク其内ニ黒色ノ顔面ヲ見ル四趾亦タ黒色ナリ

赤果然屬

Cercopithecus.

〔生〕(五)和名)假稱アカ、ヲナダザル

(漢名) 果然一種

(學名) *Cercopithecus* sp.

(英名) *Long-tailed Monkey, Species*.

(方言) *Galasy*.

當國收容ノモノハ南洋「ボルネオ」島産ナリ此猴ハ其數甚ダ少ナク眞ニ稀有ノモノトス加フルニ舉動最モ敏捷ナルヲ以テ容易ニ捕獲シ難シ其形状ハ全身褐色ニシテ尾ハ頗ル長シ其種名未ダ分明ナラズ

果然屬

Macacus.

〔生〕(六)和名)ボルネオヲナガザル

牝牡

(漢名) 果然

(學名) *Macacus Cynomolgus* ?

(英名) *Long-tailed Monkey*.

(方言) *Pandjang Ikee Moeni*.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ全身灰色ニシテ頭上ヨリ脊部ニカケテ褐色ヲ帶ブ其尾ハ長ク面部ハ頬縁及ビ口邊ニ毛アリ性能ク兒ヲ愛ス猴類

ハ總テ幼兒ヲ抱クコト人類ノ如シト雖此猴ハ現在飼養檻ノ内ニ於テ
兒ヲ抱キ居ルヲ見ル又猴類ハ舉動、猩猩ノ外ハ立テ歩行スルコト稀レナ
リ故ニ此猴ノ如キ兒ハ親ノ腹部ニ仰向テ抱キ付キ其尾ヲ少シク親ノ
尾元ニ卷付ケテ伴ハレ其親ハ活潑ナル運動ヲ爲スモ決シテ落ルコトナ
シ又食物ハ他ノ猴類ト同ジ

豚尾猴屬 *Macacus*.

(生) (刺) (七) (和名) 義譯ブタヲザル 牝牡 (漢名) 獼猴一種

(學名) *Macacus Nemestrinus*, ♀ ♂

(英名) Pig-tailed Monkey.

(方言) Boeroe.

南洋馬來半島ノ「メラ」、「ボルネオ」ノムリヤウ及ビ暹羅國ニ産ス體軀頗
強ニシテ全身黃褐色頭ヨリ背部ハ淺黒色ヲ帶ベリ其尾ハ豚ノ尾ニ似
タルヲ以テ此名アリ一種暹羅國ニ産スルモノハ尻ノ脾胝常ニ膨脹ス
或ハ別種ナルヤ未ダ分明ナラス性甚ダ伶俐ニシテ能ク人ニ馴ル故ニ

土人ハ此猴ヲ飼養シテ椰樹ノ實ヲ採ラシムルト云フ蓋シ該樹ハ棕櫚
ノ類ナレバ技ヲ生ゼス人登ルニ困シム因テ此猴ヲ使用シテ大ナル働
ラキヲ爲サシム

獼猴屬 *Macacus*.

(生) (八) (和名) シロザル又カハリブタヲザル 牝 (漢名) 獼猴一種 變生

(學名) *Macacus Nemestrinus*, (Aethio)

(英名) Pig-tailed Monkey. variety.

(方言) Moenjet, Poelji.

當園飼養ノモノハ南洋「ボルネオ」島「バネバン」ニ産出スルモノナリ毛色
純白ニシテ性質温順甚ダ伶俐且ツ能ク人ニ馴ル南洋地方稀レニ白色
ノ變生アリ甚ダ珍ラシク土人ハ之レヲ猴類ノ王ト稱シ神ノ如ク尊敬
スト云フ食餌ハ蔬菜果物等ナリ(但シ此猴ハ繼續種ニ非ラズ)

獼猴屬 *Macacus, Jinn. Inuus, temm.*

〔生〕(九)

サ ル

牝 牡

(漢名)

欄 猴

〔學名〕 *Macacus Speciosus*, Jinn.

〔英名〕 Japanese Ape.

此一種ハ内國ニノミ産ス形状全身灰褐色ニシテ面部及ヒ臀部ハ甚ダ赤シ性伶俐ニシテ能ク人ニ馴ル四國ニ産スルモノハ殊ニ智慧アリ教育スレバ舞蹈其他ノ藝ヲ爲ス

黑 猴 屬 *Cynopithecus*.

〔生〕(剝)(骨)(十)(和名)

クロザル

牝 牡

(漢名) 欄猴一種

〔學名〕 *Cynopithecus Niger*.

♀ ♂

〔英名〕 Black Ape.

〔方言〕 Moejet, Seleses.

南洋「スレベス」島「ムナド」及ビ「マカサ」「モロコス」島「アンボイナ」等ノ深林ニ棲息ス毛髮黑色、面部漆黑色ニシテ額上高シ性質他ノ猴屬ヨリ狡猾ナルヲ以テ害ヲ爲ヌコアリ又同屬ノ小ナルモノハ南洋「モロコス」島「アンボイナ」ノ産ナリ此種ハ最モ黑色ナリ或ハ別種ナルカ未ダ判然セズ

擬 猴 科 *Prosimiae, or Lemnidae.*

擬 猴 類 *Lemurini.*

懶 猴 屬 *Stenops.*

〔生〕(剝)(十)

(和名) 新稱ハチシロザル

牝 牡

(漢名) 懶 猴

〔學名〕 *Stenops Tardigradus*,

♀ ♂

〔英名〕 Gray Lorin.

〔方言〕 Konelang.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ常ニ樹上ニ棲息ス此種ハ他ノ猴類ト同シク四肢皆手ニシテ物ヲ握ル自由ナリ故ニ晝間樹上ニ棲息スルニ四肢ヲ以テ樹枝ヲ握リ頭ヲ腹部ニ付ケ形ヲ如クニナリテ眠リ夜間運動シテ食ヲ求ム形状ハ全身黃褐色ニシテ面部ニ毛ヲ生シ其中心ニ白條ノ斑アリ又食物ハ猴類ニ同シ

拳 猴 屬 *Tarsius.*

〔剝〕(十)

(和名) コノハザル又マンザル

(漢名) 拳 猴

(學名) Tarsius Spectrum,

(英名) Loris.

(方言) Lampas.
チレンス

南洋「ボルネオ」島ニ産ス形チ甚ダ小ニシテ全身灰褐色、軀幹五寸三分前肢三寸後肢四寸五分尾ノ長サ七寸、目ハ比較的甚タ大ナリ常ニ樹上ニ棲息ス頗ル異狀ナル動物ナリ

食蟲類 Insectivora.

肉翅科 Dermoptera.

擬蝙蝠屬 Galeopithecus.

(別註) (和名) 假稱カハホリモドキ

(學名) Galeopithecus Volans,

(英名) Bat (Species.)

(方言) Koeroang.
コボアヒ

(漢名) 猴一種

南洋「ボルネオ」島ニ産ス形狀ハ鼯ノ兩側及ビ四肢ノ間ニ開閉自在ナル

皮膚アリテ一見恰モ鼯鼠ノ如シ又尾ハ皮膚ノ中ニアリ四肢ハ肉翅ニ着キ爪ハ猫ノ如ク、毛色ハ全身黒灰色ニシテ脊ニ灰白色ノ斑アリ而シテ此ノ皮膚ハ樹枝ヨリ樹枝ニ遷ル時、風ヲ受ケテ飛翔スルノ用ヲ爲ス又食餌ハ小蟲果物等ナリ

食肉類 Carnivora.

靈貓科 Viverridae.

靈貓屬 Viverra.

(生) (和名) ボルネオ ジャカウネコ 此 (漢名) 靈貓

(學名) Viverra Zibetha, L.

(英名) Asiatic Civet Cat.

(方言) Moesan Jibat.
ムサシ

南洋「ボルネオ」島「スナゲカカツブ」ノ産ナリ夜間樹上ニ登リ小獸及ビ小鳥ヲ捕食ス此科中ノ種屬總テノ性質ハ捕獲セシモノ先ヅ生血ヲ吸ヒ其後内臓ヲ食シ肉ハ嗜マズ故ニ土人ノ飼養スルモノ若シ遁

逃スル時ハ近隣ノ家畜ヲ吸血シ殺スモノ多シト云フ其形狀ハ猫ニ似テ體細ク尾ハ甚ダ長シ其色ハ全身濃灰色ニシテ環狀ノ班紋アリ背ニ黒色ノ縷アリ、咽喉部ニハ黒色ノ線條班アリ、尾ハ長クシテ黒白ノ圈線四條アリ、四肢ノ先キハ黒シ、又下腹部外面ニ一個ノ腺囊アリ其内ニ黒色ニシテ凝固ナル香氣ヲ含ム液體ヲ停蓄ス故ニ土人ハ爭フテ此獸ヲ捕ヘ其香料(即チ麝香ナリ)ヲ採ルニ凡ソ一週間ニ一「オン」位ヲ收メ得ルト云フ又此夜獸ハ久シク飼養スルモ能ク人ニ馴レズ

靈貓屬 *Viverra*.

〔生〕(和名) 爪哇ジャカウネコ 牝 (漢名) 靈貓一種

〔學名〕 *Viverra Zibetha*, sp. ♀

〔英名〕 Java Civet Cat.

〔方言〕 Moesan Diabat.

南洋爪哇島及「ボルネオ」島「スタゲカカツプ」ノ産ナリ性質形狀共ニ

「ボルネオ」靈貓ト略ボ同シ唯ダ其異ナル点ハ牀稍ヤ小ニシテ尾ノ表面ハ黒色ノ縦線ニシテ兩側ニ大小十二ノ黒斑アルト又腺囊ノ小ナルト液體ノ白色ナルノミ

靈貓屬 *Viverra*.

〔生〕(和名) 假稱七筋ダンドラヲ、ネコ 牝 (漢名) 靈貓一種

〔學名〕 *Viverra Malaccensis*, ♀

〔英名〕 Genet.

〔方言〕 Moesan Java.

南洋爪哇島ノ産ナリ全身淡黄褐色ニシテ脊部ニ七條ノ環斑並列ス性質靈貓ニ同シト雖モ腺囊ナシ

樹貓屬 *Paradoxurus*.

〔生〕(和名) 假稱タヌキネコ 牝 (假稱) 樹貓

〔學名〕 *Paradoxurus Niger*, ♀

(英名) Tree-cat.
 (方言) Moesan Akar.
 南洋「ボルネオ島」シヨハンノ産ナリ靈貓ニ近接セル種屬ニシテ形狀
 黒ク面部白斑アリ顔容甚ダ狸ニ似タルヲ以テ假リニ和名トス舉動
 食餌ハ靈貓ニ同ジケレモ香料ヲ藏スル腺囊ヲ有セズ性質輕捷、出沒
 自在、常ニ家畜ノ血ヲ吸フ故ニ土人ハ防備ヲ輕視セズト云フ

樹貓屬 Paradoxurus

(生) (大) (和名) 假稱七筋タヌキネコ 牝 (假稱) 樹貓

(學名) Paradoxurus Hermaphroditus.

(英名) Tree-cat.

(方言) Moesan.

本園飼養ノモノハ馬來半島ノ産ナリ全身茶褐色ニシテ脊上ニ七條
 ノ黒線ヲ有シ四足ハ黒ク尾ハ長クシテ幽カナル斑紋アリ又其動作
 ハ狸貓ニ同ジク腺囊ヲ有セザルコモ亦々同ジ

樹貓屬 Paradoxurus.

(生) (大) (和名) 假稱チャイロ、タヌキネコ 牝 (假稱) 樹貓

(學名) Paradoxurus Larvatus?

(英名) Tree-cat.

(方言) Moesan.

南洋「ボルネオ島」産ニシテ全身褐色ナルモ其頭部及ビ脊上ニハ幽カ
 ニ黒條ノ斑紋アリ又口ノ上及ビ四足ハ共ニ深褐色ヲ帶ベリ其舉動
 性質ハ狸貓ト同ジク腺囊ヲ有セザルコモ亦々同ジ

貓鼬屬 Herpestes.

(生) (示) (和名) イタチネコ 牝 (漢名) 貓鼬

(學名) Herpestes Mongo.

(英名) Mongoose.

(方言) Topai Kaja.

南洋「ボルネオ島」バレンハンノ産ニシテ大サ貓ヨリ小ナリ全身灰色ノ

胡麻斑アリ尾ノ元ハ毛甚ダ太クシテ先キ尖ル性温順人ニ馴レ易シ故ニ能ク飼養シタルモノハ頸ニ鈴ヲ附ケ遊歩ノ際ナド伴ヒ行クモ決シテ主人ヲ見失フコトナク共ニ歸リ來ル眞ニ愛ラシキ獸ナリ其食餌ハ小ナル鳥獸爬蟲及ビ鳥蛇ノ卵蟹等ナリ(此獸モ亦タ香氣ヲ蓄フベキ腺蓋ヲ有セズ)

卷尾貓屬 *Arctictis*.

(生) (和名) 假稱クマネコ 牝牡 (假稱) 卷尾貓

(學名) *Arctictis Binturong* ♀♂

(英名) Binturong.

(方言) Bantoeong.

南洋馬來半島「マラツクワ」ノ産ナリ、性頗ル強烈、尾先キニ甚ダ力アリテ樹木ニ上ルニ尾ヲ樹枝ニ卷キテ其牀ヲ支ヘ四足ト共ニ充分ナル動作ヲ爲ス其ノ形狀ハ全身黒色ナルモ毛尖ハ白ク或ハ褐色トナル尾ノ毛ハ深黒ニシテ大ク長シ、亦耳ノ尖ニ長毛アリ耳縁ハ白色ニシ

テ聲ハ長ク黒白相交ル此ノ獸ハ甚ダ獲難ク頗ル珍ラシキモノナリ

貓科 *Felidae*.

貓屬 *Felis*.

(生) (和名) ホルネオヤマネコ 牝 (漢名) 野貓

(學名) *Felis Catus*, sp. ♀

(英名) Wild Cat.

(方言) Koeching Hoetan.

此科ハ肉食類中最高等ニ位スル野獸ナリ性質殘忍猛烈ニシテ人ニ馴レズ齒ハ鋭ク尖リ舌ニハ逆立チタル小刺アリ又趾端ニハ鋭キ鈎狀ノ爪ヲ有シ趾掌ハ軟カニシテ頗ル彈力アリ故ニ歩スルニ響キナクシテ甚ダ疾ク竊カニ小獸、鳥類ニ近ヅキ突然身ヲ跳ラシテ之ヲ捕殺ス其形狀ハ全身黃褐色ニシテ黒斑アルコト恰カモ豹斑ニ似タリ又頭部ニ線斑アリ腹部ハ白クシテ尾ハ長シ本國飼養ノモノハ南洋「ホルネオ」島「サンパス」ノ深林ニ棲息セシモノ

ナリ

貓 屬 Felis.

〔生〕(註)

(和名) 假稱 アカ、ヤマネコ 牝

(漢名) 野 貓

(學名) Felis ♀

(英名) Wild Cat. (Species)

(方言) Koecheng Hoetan.

南洋「ボルネオ」島「サンパス」ノ産ナリ其性質及ビ動作ハ「ボルネオ」山貓ト同シク牀形野貓ト異ナリ圓クシテ家貓ニ似タリ毛色ハ赤褐色ニシテ斑紋ナシ(種名未ダ分明ナラズ)

貓 屬 Felis.

〔生〕(註)

ハ ッ 牡 (漢名) 豹

(學名) Felis Pardus, L.

(英名) Leopard.

(方言) Rimau Bimbang.

此種ハ恐ルベキ強暴ナル肉食獸ナリ全身濃黄色ニシテ環状ノ黒斑アリ舉動輕敏ニシテ一躍三間ヲ飛ブト云フ又時トシテハ樹木へ攀登ス食餌ハ生物ノ肉ヲ食シ且ツ血ヲ吸フ若シ飢渴ニ迫レバ人家ニ近ヅキ家畜ヲ捕食シ又往々人ヲ害ス本園飼養ノモノハ「パンカリヌ」島「シャ」ノ産ナリ

貓 屬 Felis.

〔生〕(註)

クロ、ノウ 牝 (漢名) 豹 ♀

(學名) Felis Variegata, (Melanism.)

(英名) Leopard (Variety)

(方言) Rimau Hitam.

豹ハ變生多ク斑点ノ種々異ナレルハ通例ナレモ全身黒色トナルハ稀レニシテ頗ル珍ラシク其色漆ノ如シ然レモ熟視スレバ豹ノ如キ環状ノ斑紋幽カニ殘レリ軀幹ハ尋常ノ豹ヨリ稍ヤ小ナリ此獸ハ能ク人ニ馴レ家貓ノ如ク戯レヲ爲スト雖モ若シ其意ニ逆フイアレバ

忽チ猛烈ナル性ヲ現ハスヲ以テ甚ダ危険ナリ或ハ云フ其性極メテ
悍猛ニシテ已ノ牀ノ小ナルヲ忘レ常ニ巨大ナル他獸ニ抵抗スルガ
故ニ却ツテ其殘害ヲ受ケ爲メニ兩耳ノ如キハ殆ソド全形ヲ留ムル
モノナシト其舉動、食物等ハ豹ニ同シ、因ミニ云フ黑豹、茶鼠豹二種ハ
變生種ニシテ繼續種ニアラズ依テ學名ノ末ニ Melanism ト附記ス
本園飼養ノモノハ「マラツクワ」平島「ペラ」ノ産ニシテ未ダ幼獸ナリ

貓 屬 Felis.

〔生〕(英) チャネヅミ、ノウヅ 牡 (漢名) 豹

(學名) Felis Variegata, (Melanism.)



(漢名) Leopard. (Variety.)


(方言) Rimau Hitam.

新嘉坡「シヨナホー」ノ産ナリ毛色茶鼠ニシテ幽カニ斑紋ヲ殘セリ威
勢烈シク譎詐、殘忍ナルノ性質ハ虎、豹ニ同シク其食餌ハ生物ノ肉及
ビ血等ナリ蓋シ此ノ獸ハ黑豹ノ老ヒタルモノナリ

貓 屬 Felis.

〔生〕(母) (英) ト ラ 牝 (漢名) 虎

(學名) Felis Tigris, L.



(英名) Tiger.

(方言) Rimau Berang.

老虎ノ軀幹ハ約貳間餘ノモノアリト云フ齒牙強剛、視力、聽力共ニ
鋭敏ニシテ性殘忍ナル肉食獸ナリ形狀ハ頭圓ク耳短カク、毛色ハ
面部ハ白色ニシテ斑紋アリ、咽喉部及ビ下腹部ハ純白ニシテ横線
狀ノ黒斑アリ、其他ハ濃黄ニシテ線條ノ黒斑アリ尾ノ斑紋ハ環狀
ヲ爲ス其ノ歩行スルヤ趾端ノミヲ地ニ附ク蓋シ趾ノ裏面柔軟ナ
ルガ故ナリ又趾端ニ伸縮自在ナル銳キ爪ヲ有シ最モ恐ルベキ動
物ナリ敢テ人ヲ殺スヲ好ムニ非ザレハ危害ヲ受クル時カ又ハ飢
レハ何物ヲモ恐レズ故ニ人モ亦タ其害ニ罹ルヲ多シ
本園ニ飼養セルモノハ南洋馬來半島「マラツクワ」ノ産ナリ

貓 屬 Felis.

(生) (和名) ト ラ 社 (漢名) 虎

(學名) (英名) (方言) 共ニ前記ノモノニ同シ故ニ略ス

南洋馬來半島ノ産ナリ此虎ハ未ダ齡若クシテ詳カナラズト雖モ斑紋稍ヤ異ニシテ甚ダ美麗ナリ或ハ變生ナラン

貓 屬 Felis.

(生) (和名) シ シ 牝 牡 (漢名) 獅

(學名) Felis Leo, L. ♀♂

(英名) Nubion Lion.

(方言) Singa.

熱帶地方ニ棲息スル肉食獸ニシテ古ヘヨリ獸類ノ王ト呼バンタル威アル猛獸ナリ軀幹凡ソ六七尺ヲ通常トスレモ牝 Lioness ハ牡ヨリ小ナリ全牀ノ毛髮黃褐色ニシテ斑紋ナク牡獸ハ頭頸部ニ長毛ヲ有シ下腹部及ビ前肢膝後部等ニモ亦タ長毛ヲ生ジ其他ノ部分ハ總テ短

毛ナリ又其爪ハ甚ダ銳利ニシテ最モ恐ルベキモノトス性質晝間ハ穴居シテ休眠シ夜間ハ遊行シテ牛、馬、羊、山羊、麒麟、水牛、斑馬、麋、鹿、駱駝若キ象及ビ獐、其他大小ノ鳥獸ヲ攻撃シテ捕食ス平時ハ遙カニ人聲ヲ聞ケバ逃ゲ必ラズシモ人ヲ殺スヲ嗜マズト雖モ若シ危害アラントスル際カ或ハ餓ユル時ニハ人畜ヲ擇ハズ運ビ去リテ食フ其ノ場合ニハ高サ一丈ノ塀、廣サ數間ノ溝渠ヲ飛ビ越ユルヲ甚ダ容易ナリト云フ又其ノ餓エテ食ヲ欲スルヤ必ラズ眼ヲ瞰リ鬣ヲ舉ゲ尾ヲ振り動カス此レ其ノ特兆ナリ故ニ土人此ノ狀ヲ見ル時ハ忽チ警戒ヲ加フト云フ靜夜猛ク吼ユル時ハ其ノ聲一里外ニ達シ大小ノ動物皆戰慄ス又此ノ獸ノ交尾期ハ春時ニアリ受胎後約百五十日許リニシテ一回ニ四、五兒ヲ分娩ス而シテ兒ハ六ケ月間哺乳シ其ノ後漸次肉食ヲ習ヒ從テ跳躍捕殺ノ術ヲ學ビ以テ獨立スルニ至ル本園飼養ノモノハ北亞弗利加産ニシテ未ダ若獸ナリ即チ牡ノ方ハ當年四歲牝ノ方ハ同ジク三歲半、明後年ニ至リテ初メテ交接ノ齡ニ達スルモノナリ

鰭脚族

Pinnepedia.

海獺科

Otaridae.

海獺屬

Otaria.

(生) (三)

アシカ又ウミヲソ

牡

(漢名) 海獺

(學名) Otaria Stelleri, L.

♂→

(英名) Seal

北海ニ棲息スル肉食動物ナリ全身濃褐色ノ短毛ヲ生ジ頗ル光澤アリ又上唇ニハ剛キ疎髭ヲ有ス前肢ハ鰭ノ如キ形チニシテ游泳、歩行共ニ用ヒ後肢ハ魚尾ノ如キモノニシテ游泳スル時指ノ用ヲ爲スノミ而シテ尾ハ甚ダ短カシ此動物ハ聽感及ビ嗅感共ニ鋭敏ニシテ晝間水面ニ睡眠シ居ル時ト雖モ若シ異響ヲ聽クカ或ハ異臭ヲ嗅グ時ハ忽チニ遁逃ス故ニ其眠ルヤ必ラズ風下ニ於テス又海濱ノ岩石或ハ浮氷ノ上ニ睡眠セントスル場合ニハ一匹ノ非常ヲ警衛スルモノアリテ若シ危險ノ生ジ來ルト認ムル時ハ高ク叫ビテ以テ急ヲ告グ其ノ食餌ハ魚類及ビ鳥賊等ヲ多ク食ス又其ノ游泳ノ度ハ陸前、陸中

等ノ沿海ニテハ五十哩乃至百五十哩北海道附近ニテハ三十哩乃至五十哩ノ海洋ヲ游泳シ其動作ハ活潑ニシテ海面ニ飛揚スト雖モ平時ハ進行頗ル徐々ナリ又四、五月頃生殖期ニ近クハ急行シテ適當ナル島々ニ上陸ス然レニ暑氣ニハ堪エズシテ呼吸艱メル時ハ後肢ヲ以テ體ヲ扇グト云フ北海道千島群島ニハ最も多ク棲息ス本國飼養ノモノハ隱岐國ニ於テ捕獲セシモノナリ

熊科

Ursidae.

熊屬

Ursus.

(生) (世)

馬來島クマ兒

牡

(漢名) 熊

(學名) Ursus Malayanus.

♂→

(英名) Malay Bear.

(方言) Borogang.

「クマ」ハ漢名ヲ熊熊ノ二屬ト爲ス熊ハ性溫柔能ク人ニ馴ル全身光澤アル黑色ノ毛ヲ生ジ咽喉部ニ一條ノ白斑アリ俗ニ之ヲ月ノ輪ト云

フ此ノ類ヲ蹠行類ト稱シ時トシテハ前肢ヲ舉ゲ後肢ノミヲ以テ直
 行ス冬季ハ積雪前ニ豫テ穴ヲ穿テ置キ其内ニ食餌ヲ蓄ヘ棲息セリ
 又此ノ種類ハ肉食獸ニ屬スル動物ナレモ常ニ果實、植物等ヲ好ミテ
 食ス又熊ハ北海道ニ産スル「ヒグマ」ナリ全身褐色ニシテ性强烈人ニ
 馴レズ其舉動怒ルベク徐々村里ニ出デ來リテ人ヲ襲ヒ家畜ヲ捕食
 ス
 本園收容ノモノハ南洋馬來島ノ産ニシテ甚ダ珍ラシキ種屬ナリ未
 ダ幼兒ナルガ故ニ牛乳ヲ以テ充分ニ餌養セリ

啮齒類

Rodentia.

栗鼠科

Sciuridae.

栗鼠屬

Sciurus.

〔生〕〔剝〕〔世〕

假稱 ミイロ、リス又ミイロ、キネズミ 靴牡

〔漢名〕 栗鼠

〔學名〕 Sciurus



〔產地〕 南洋「ボルネヲ」島「サンパス」

〔英名〕 Squirrel.

〔方言〕 Toepui.

毛色、脊ハ頭部ヨリ臀部ニ至ル迄黑色ニシテ肩ヨリ胸部ニカケテ
 ハ赤褐色ヲ帯ビ横腹部ニハ白色ノ線條斑アリ又口邊ハ白色ニシ
 テ後肢ト尾ニ胡麻斑アリ

〔剝〕〔世〕

〔和名〕 假稱 チャイロ、リス又チャイロ、キネズミ

〔漢名〕 (學名)、(英名)、(方言) 上ニ同シ、(產地) 南洋「ボルネオ」島

毛色、全身淡褐色ニシテ尾ハ甚ダ長シ

〔剝〕〔世〕

〔和名〕 假稱 コゲチャ、リス又コゲチャ、キネズミ

〔漢名〕 (學名)、(英名)、(方言)、(產地) 上ニ同シ

毛色、全身濃褐色ニシテ横腹部ニ黑白ノ線條斑アリ

〔剝〕〔世〕

〔和名〕 假稱 クロ、リス又クロ、キネズミ

〔漢名〕 (學名)、(英名)、(方言)、(產地) 上ニ同シ

毛色、全身黑色ニシテ咽喉部及ビ胸部ハ白色ナリ

啮齒類ハ啮食スルヲ以テ齒尖キ爲メニ磨滅スルガ故ニ其ノ齒絶エ

ズ成長ス、栗鼠ハ常ニ草根、果實ヲ好ミテ食シ性温順ニシテ舉動活潑
常ニ樹上ニ登リ果實ヲ食シ樹木ノ洞穴ニ棲息ス
此ノ四種ハ種名未ダ分明ナラズ依テ屬名ノミヲ記ス

鼯鼠屬 Pteromys.

〔和名〕新稱アカ、モモンガ

〔漢名〕鼯鼠

〔學名〕Pteromys Palanista.

〔英名〕Flying Squirrel.

〔方言〕Tekoes Tarabuan.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ全身赤褐色ニシテ毛アル^{ツハヤナク}肉翅ヲ有シ前後
ノ肢ニ連ル此ノ翼翅狀ノ膜ヲ以テカヲ助ケ樹枝ヨリ樹枝ヘ飛ビ遷
ル^ルト恰モ鳥類ノ如シ内國産ハ全身灰色ニシテ腹部白シ晝間ハ總^ズノ
如キ尾ヲ以テ脊ヨリ顔部ヲ掩ヒ日光ヲ避ケテ睡眠セリ食餌ハ栗鼠
ト同シ
下野國ノ人多ク云フ夜間山中ヲ通行スル時提灯ノ火ヲ消シ人ノ面
部ヲ蔽フト、眞ナルヤ分明ナラズ

豪緒科 Hystriidae.

豪緒屬 Hystrix.

〔生〕(和名) ヤマアラシ

牝牡

〔漢名〕豪緒

猪

〔學名〕Hystrix Cristata, sp.

ヤ

オ

〔英名〕Porcupine.

〔方言〕Banda.

晝間ハ穴中ニ潛ミ夜間出テ草根、蔬菜ヲ食ス全牀堅キ管毛ヲ生シ其
色頭部ヨリ肩ノ邊迄ハ褐色ナル短毛ニシテ先キ白ク其他ハ「ペン」軸
様ノ長キ白毛ニ黒斑アリ、尾ハ鳥羽ノ軸ニ似タル毛ヲ生シ總テ毛尖
ハ鋭クシテ針ノ如シ、怒ル時ニハ全身ノ毛ヲ逆立テ異音ヲ發ス蓋シ
敵ヲ防グ護身ノ利器ナリ此ノ管毛ヲ以テ「ペン」軸及ビ器物ヲ造ルニ
甚ダ美ナリ又其性質ノ奇ナルハ交接期ニ至レバ同族ノ毛ヲ嚙ミ切
リ殆ンド裸牀ト爲ス
本圖収容ノモノハ南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ

多蹄類又厚皮類 *Multungula.*

長鼻科 *Proboscidea.*

象屬 *Elephas.*

(生) (和名) ザウ又キザ 牝牡 (漢名) 象

(學名) *Elephas Indicus, Asiaticus, Bhum.*



(英名) *Asiatic Elephant.*

(方言) *Gadia.*

陸接動物中極大ナル種屬ニシテ亞弗利加及ビ亞細亞ノ熱帶地方ニ産シ其ノ大ナルモノハ高サ一丈六七尺ニ至ル皮膚堅韌ニシテ虎ノ如キ鋭キ齒ヲ以テ嚙ミ銳利ナル爪ヲ以テ搔クモ通ラズ故ニ虎狩ヲ爲スニ多ク象ニ乗ズ若シ猛虎怒テ象ノ足ヨリ登リ來ルモ更ニ恐レズ獵夫ヲシテ銃殺セシムト云フ形狀ハ全身灰色ニシテ短毛ヲ生ズレモ一見毛ナキガ如シ鼻ハ圓筒狀ヲ爲シ頗ル長ク伸縮自由ナリ又二孔ノ間ニ一個ノ突起セル指ノ如キ出肉アリテ把握自在ノ作用ヲ爲ス故ニ針ノ如キ細小ナルモノト雖モ能ク之レヲ拾フ食物ハ先ヅ

鼻ノ先キニテ把ミ口中ニ運ビ入ル又水ヲ飲ムニモ鼻ヨリ吸ヒ入ル總テ食物ハ鼻ヲ以テ口中ニ運ビ入ル然レモ幼獸ノ乳ヲ呑ムハ直チニ口ニテ吸ヘリ其ノ棲息ノ狀ハ河邊ノ林中ニ群居シ進退常ニ隊ヲ爲シ老獸之レヲ導キ一羣能ク親和シテ老獸ノ命令ニ背クコトナシ此ノ獸ハ馴養スレバ種々ノ技藝ヲ爲シ或ハ騎馱耕耘ニ使役スル時ハ牛馬ヨリハ數倍ノ働キヲ爲ス性温順ニシテ穎敏能ク人ノ厚遇ト冷遇トヲ記憶ス又時トシテハ鼻ヲ以テ小兒ヲ背上ニ乗セ大切ニ其守ヲ爲スモノナリ本園飼養ノモノハ亞細亞産ニシテ南洋馬來半島セラシコトノ出生ナリ未ダ幼獸ナレバ牙ハ漸ク二寸許リ又牝ノ軀幹ハ七尺九寸高サ背上ヨリ地上マデ六尺二寸足ノ周圍二尺五寸鼻ノ長サ三尺四寸アリ吐ハ牝ヨリ稍ヤ小ナリ

奇蹄科 *Perissodactyla.*

獐屬 *Tapirus.*

(生) (梵)

印度

牝牡

(漢名)

縞又封豕

(學名) Tapirus Malayanus, Sam.

♀♂

(英名) Malayan Tapir or Asiatic Tapir.

(方言) Tenoe.

動物學上單ニ一類ヲ爲シ奇蹄類ト稱ス前脚ハ四趾後脚ハ三趾ナリ
 常ニ卑濕ナル深林ニ棲息ス尋常ノモノハ南亞米利加ニ産シ毛色全
 身淡灰色ナリ土人ハ之ヲ馴養シテ使役スト云フ
 本圖飼養ノモノハ印度種ニシテ南洋「スマタラ」島「ジャンピ」産ナリ尋
 常ノモノト異ニシテ甚ダ獲難キモノトス形狀ハ毛色肩下ヨリ尾ノ
 上部マデ及ビ腹部ノ兩側并ニ耳ノ先キ等ハ白色其他ハ濃灰色ナリ
 軀幹七尺、高サ三尺、鼻ノ長サ約五寸、尾ハ太クシテ甚ダ短シ、牝ハ稍ヤ
 小ナリ此ノ屬ノ鼻ハ略ホ象ニ似テ食物ヲ卷キ口ニ運ビ伸縮最モ自
 由ナリ、性甚ダ強力ナルヲ以テ取扱ヒ上頗ル困難ナリ又牝ハ既ニ妊
 娠シ居ルガ故ニ來ル七月ニハ分娩スベシ蓋シ縞ハ受胎後六ヶ月ヲ
 經テ分娩ス、食餌ハ木皮、木葉、蔬菜等ニシテ他獸ニ比スレバ飼養甚ダ

困難ナリ

反芻偶蹄類又雙蹄類

Artiodactyla. or Ruminantia.

洞角科

Cavicornia.

牛屬

Bos.

(生) (學)

印度

牝

(漢名) 牛一種

(學名) Bos Indicus, SP.

♀

(英名) Indian Zebu ox.

(方言) イニカフカモ

印度牛ハ家畜ナリ總テ牛屬ハ反芻類ニシテ胃腑ノ構造重復シ四室
 ヲ分有セリ故ニ一度吞ミ下シタル食物ヲ初メノ二室ニ於テ濕氣ト
 熱トヲ與ヘテ之ヲ團メ其ノ後再度吐キ出シテ咀嚼スルモノナリ
 本圖飼養ノモノハ印度「コロンボ」産ニシテ牝二頭ナリ一頭ハ軀幹六
 尺五寸、高サ背上ヨリ地上マデ四尺五寸、角ノ長サ七寸、耳ノ長サ一尺
 二寸、又肩ノ上ニ大ナル贅疣アリ、全身白色ニシテ脊部及ビ耳ノ裏面

ハ淡灰色ヲ帶ブ、又一頭ハ牀軀稍ヤ小ニシテ角長ク一尺九寸五分アリ、毛色ハ白地ニ褐色ナル不規則ノ斑紋アリ、其使用ハ内國産ノ牛ト同ジ、性甚ダ柔和ニシテ力頗ル強ク能ク勞役ニ堪エ又其ノ乳汁ハ最モ良品ナルヲ以テ本園主澤田久米藏ハ之ヲシテ内國産種ト接合セシメ其種ヲ蕃殖スルノ目的ヲ以テ集容セシモノナリ、但シ二頭ノ中牀稍ヤ小ニシテ角ノ長キモノハ既ニ畢丸ヲ抜キ取リアレハ殖種ノ用ヲ爲サズ

山牛屬

Bubalus.

(生) (學)

方言義譯

ヤマウシ

牝

(漢名)

牛一種

(學名) *Bubalus Gaurus*, ?

(英名) Anoa.

(方言)

Hoelan Roemboc.

南洋「スレベス」島「ロロンタール」ノ産ナリ性暴クシテ能ク牀尺ヲ檢スル能ハズト雖モ軀幹約五尺餘、高サ二尺五六寸、角ノ長サ八寸許、尾ハ

尋常牛ノ如クニテ甚ダ短ク約八寸許ナリ、形狀ハ全身光澤アル赤褐色ノ短毛ヲ生ジ四足ノ先キ白ク、雙角ノ形チハ「カモシカ」ニ似タリ、此獸小ナリト雖モ力頗ル強ク又走ルコ最モ快速ナリ馴養シテ使役セハ實用ヲ爲スナランカ、然レモ種族甚ダ少ナク人自ニ觸ル、コ稀レナルヲ以テ容易ニ捕獲シ難ク頗ル珍奇ナルモノトス

綿羊屬

Ovis.

(生) (學)

ヒツジ又ラシヤメン

牡

(漢名)

綿羊

(學名) *Ovis Aries*, L. Var.

(英名) Sheep. (Variety.)

(方言)

Kaunling.

新嘉坡「ジヨナホー」ニ産出セシモノナリ形狀ハ全身長キ軟毛ヲ生ズ性質溫柔能ク人ニ馴ル此ノ獸ハ定期ニ毛ヲ刈リ取り其毛ヲ以テ羅紗其他ノ織物ヲ製造スルノ材料ニ供スルモノナレバ家畜中頗ル重要ノ動物ナリ又此種屬ハ變種甚ダ多シト雖モ本園ニ飼養スルモノ

ハ四本ノ角ヲ有セリ此ノ如キ變生ハ眞ニ稀レナル奇觀トス、加フルニ毛色亦タ甚ダ美麗ナリ

麋鹿科 Cervidae.

鹿屬 Cervus.

(生) (四十三) (和名) シカ又カノシシ 牝牡 (漢名) 鹿

(學名) Cervus sika, TEMM. ♀♂

(英名) Japanese Deer.

大隅國屋久島ノ産ナリ牡ハ又枝アル雙角ヲ有ス其角ハ毎年夏季ニ至レハ脱落シ秋季ニ及ビテ更ニ生ジ年ヲ經ルニ隨ヒ枝ヲ増加ス又其角ノ初生ハ毛色ヲ以テ被ハレ之レヲ鹿茸ト稱シテ藥劑ト爲ス毛色、冬季ハ全身褐色ニシテ尾ノ先キ白ク夏季ハ褐色ニ白斑ヲ生ズ之レヲ「カノコ」ト云フ食餌ハ五穀ヲ好ミ又果實、蔬菜ヲ食ス性温順ニシテ能ク兒ヲ愛ス内國ニ棲息スル鹿ハ海外ニ棲息セザル種屬ナリ大和國奈良市ノ春日神社ニ古ヘヨリ多數放養シアリ

水鹿科 Tragulidae.

水鹿屬 Tragulus.

(生) (剝) (四十四) (和名) 新稱 ヒメシカ又マメシカ 牝牡 (假稱) 水鹿

(學名) Tragulus ♀♂

(英名) Chevrolain.

(方言) Pland トラウ

南洋「ボルネオ」島ノ産ニシテ軀幹一尺三寸、高サ七寸五分餘、牙長サ四分許リ、牝牡共ニ角ナク上脰ニ牙アリテ口外ニ出ル「麋獸」ノ如シ性溫柔ナレモ走ル「迅速」常ニ群ヲ爲シ列ヲ崩サズシテ陸上或ハ淺水ヲ進行ス故ニ土人ハ「ブランド」ト稱シ、軍隊ヲ意味スル名ヲ附シ居ルナリ、毛色、鹿ノ冬毛ト同シ其異ナルハ咽喉部ト腹部ニ白條ノ斑アリ又尾ハ白シ(種名未ダ詳カナラズ)

貧齒類 Edentata.

鯨鯨科 Manidae.

鯨 鯨 屬 *Manis.*

〔刺〕(四) (和名) ホルネオセンザンカウ (漢名) 鯨 又 穿山甲

(學名) *Manis Tricuspis, sp?*

(英名) Pangolin.

(方言) *Tingling.*

南洋「ホルネオ」島ノ産ナリ全身堅キ鱗甲ヲ以テ覆ヒ其間ニ硬毛ヲ生ズ、尾ハ身ノ丈ケニ半ハシ、口ハ小サクシテ齒ナク、舌甚ダ長シ常ニ蟻其他ノ小蟲ヲ舌ヲ以テ吸食ス、性不活潑ニシテ晝間ハ光線ヲ恐ル、ガ爲メニ頭ヲ腹ニ附ケ目ヲ隠クシ圓ク屈シテ睡眠シ夜間ハ出テ食ヲ求ム、往時漢醫ハ此ノ獸ヲ藥劑ト爲セリ

〔刺〕(四) (和名) 支那センザンカウ (產地) 支 那

(學名) *Manis Pentadactyla, L.*

(漢名) (英名) ハ前項ニ同シ

形状ハ「ホルネオ」鯨ト少シク相違スル處アルモ大同小異ナルヲ以ス略テ

禽 部 *Aves.*

猛禽類又捕生類 *Falconiformes.*

鷲 鳥 族 *Raptores.*

鷲 鳥 科 *Accipitrinae.*

鵟 屬 *Halietus.*

(生) (四) (和名) ヲ シ (漢名) 鵟

(學名) *Halietus Pelagicus, PAUL.*

(英名) *Steller's sea-eagle.*

猛禽類ハ有脊椎動物中哺乳類ニ次グ卵生族ニシテ嘴及爪曲リテ鋭ク翼最モ強勁ナル威嚴アル鳥類ナリ而シテ鵟ハ此類中ノ最大ナルモノトス、羽色ハ全身褐色ニシテ肩、腿、及ヒ尾ハ白色、又嘴ト足ハ黄色ナリ、性、嘴太クシテ鋭ク且ツ趾ノ力強ク又視力ハ尤モ鋭敏ナルガ故ニ其捕獲セント欲スル鳥獸ノ遙ニ見ユル時ハ忽チ飛翔シテ近ヅキ之レヲ擱ミ食フ、食餌ハ小獸、鳥類、爬蟲及ビ魚類等ナリ

本圖收容ノモノハ奈良縣大和國吉野ノ産ニシテ同國人吉野鋏三郎氏ノ寄贈ナリ

◎禽類躰尺標準

軀幹 トハ嘴尖ヨリ尾尖マデヲ云フ
翼 トハ肩ヨリ翼尖マデヲ云フ
嘴 トハ上嘴ノ長サヲ云フ
脛 トハ腿下ノ關節ヨリ趾上ノ關節マデヲ云フ

鷹 屬 *Falco*.

(生) (和名) ハヤブサ一種 (漢名) 隼一種

(學名) *Falco* sp.

(英名) *Falcon*.

此鳥ハ隼ニ類似スレモ種名未ダ分明ナラズ且ツ其產地確定シ難シト雖モ内國ニ産スル鷹屬ト異ナルモノナルハ分明ナリ、日本郵船會

社汽船加賀丸ノ乗組員岡熊之助氏ノ寄贈品ニシテ該船ガ北亞米利加英領「ピクトリヤ」ヲ距ル一千五百哩、地位北緯五十六度、西經百六十一度ノ太平洋沖合航行中ニ捕獲セシモノナリト

鷂 屬 *Accipiter*.

(和名) コノリ 雌 (漢名) 鷂

(學名) *Accipiter Nisus*, L.

(英名) *Common Sparrow-hawk*.

「コノリ」ハ「ハイタカ」ノ雄ニシテ古ヘヨリ雌雄和名ヲ異ニス、軀幹一尺一寸四分、翼六寸二分、嘴五分五厘、脛一寸六分アリ、羽色ハ頭部ヨリ尾ニ至ルマデ灰色、而シテ尾ニ淡黒色ノ横斑アリ又腹部ハ白色、若鳥ハ褐色ノ縦斑アレモ老ユルニ從ヒ變ジテ鮮明ナル横斑トナル、又足ハ黄色ニシテ爪甚ダ鋭ク食餌ハ鳥類ヲ搏食ス、蓋シ鷂ハ小ナリト雖モ勢ヒ強猛ナルガ故ニ鶴及ビ鷹等ノ大ナルモノヲ搏殺ス
本圖收容ノモノハ南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、内國産種

ト異ナラズ

野擦鷹屬 Buteo.

〔剝〕(平) (和名) ノスリ一種 (漢名) 鷹一種

(學名) Buteo sp.

(英名) Buzard.

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ(學名分明ナラズト雖凡案ズルニ此屬ナラン)軀幹一尺七寸五分、翼一尺二寸三分、嘴九分強、脛一寸三分五厘、羽色ハ頭部ヨリ頸部及ビ胸部ハ白色、背部ハ尾ニ至ルマデ褐色翼ハ淡黄灰色ナリ、又腹部ハ白色ニシテ褐色ノ縦斑アリ、食餌ハ小ナル鳥獸魚類等ナリ

燕雀類 Passeres.

雀科 Fringillidae.

假稱五色雀屬 Fringilla?

〔生〕〔剝〕(平) (和名) 假稱ゴシキ、スシメ 雌雄

(學名) Fringilla? 十〇 (漢名)、(英名)、(方言)詳カナラズ

馬來半島ノ産ナリ、軀幹三寸七分五厘、翼一寸九分、脛四分、嘴ハ四分ニシテ圓ク黒シ、羽色ハ背部青色、上嘴ノ際ヨリ頬部及ビ咽喉部ハ淺藍色、腹部及ビ上尾ハ濃紅色ニシテ一雙長ク尖リ、下尾モ亦タ濃紅色ニシテ青灰色ヲ交エ、下腹部ハ淡褐色ナリ、又雌ハ胸部ノ色淡ク、腹部ハ淡黄色ノ部分多シ、食餌ハ小穀類ナリ

慈鳥科 Corvine.

秦亨屬 Gracula.

〔生〕〔剝〕(平) (和名) キウクワソソテウ 雄 (漢名) 秦亨

(學名) Gracula Religiosa. 〇

(方言) Boerong Baeoc.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、軀幹一尺餘、翼六寸、嘴一寸、脛一寸二分アリ、羽色ハ全身鳥羽色ニシテ翼ノ中心ニ白斑アリ、頂部ハ短毛ニシ

テ天鷲絨ノ如ク又後頸部ニ黄色ノ毛ナキ冠アリテ其先キ一寸許
ハ木耳ノ如キ形状ヲナス而シテ嘴ト足ハ黄色ナリ、性馴レ易ク能
ク人語及ビ他動物ノ啼聲并ニ種々ノ音響ヲ真似ルコト恰モ鸚鵡ノ
如シ、食餌ハ鳥ト同ジ

怪鷓科 Coraciidae

蚊母鳥屬 Caprimulgus

〔別〕〔註〕(和名) ホルネオカスヒドリ又ヨタカ (漢名) 蚊母鳥

(學名) Caprimulgus aegyptius

(英名) Nighthawk

南洋「ホルネオカスヒドリ」鳥「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺一寸五分、翼八寸三分、嘴六分、脛六分、口甚ダ大ニシテ兩側ニ髭ヲ生ズ、羽色ハ全身淡灰色ニ褐色ノ斑紋アリ、咽喉部ノ兩側ハ白色、又脛部ニハ褐色ノ斑アル短毛ヲ生ジ、尾ニハ褐色ノ鷹斑アリ、性晝間ハ暗澹ナル茂林中ニ棲息シ夜間出テ蚊其他ノ昆蟲ヲ吸食ス、其形状ハ大ナル口ヲ開キ、集マリ居

ル小蟲ヲ吸ヒ込ミ、時ニ兩側ノ髭ヲ以テ蟲ノ逃ゲ出スヲ支ヘテ之レヲ吞食ス

霧鳥科 Paradiseidae

霧鳥屬 Paradisea

〔別〕〔註〕(和名) フウテウ (漢名) 霧鳥又練鵲

(學名) Paradisea Apoda

(英名) Paradise Bird

南洋「ニウギニヤ」鳥ノ産ナリ、軀幹一尺一寸、翼六寸強、嘴一寸一分、脛一寸四分アリ、嘴及ビ足ハ黒灰色ナリ、其羽色ハ嘴ノ上際及ビ咽喉部ハ乾紅青色、頭部ハ淡黄色ニシテ天鷲絨ノ如ク光澤アル短毛ヲ生ジ、其下部亦タ淡黄色ナリ、又腰、腹部及ビ尾ハ紫紅色、兩側ノ綫毛ハ長短アレハ其長キ分ハ約一尺二寸アリ、其形状蘇鐵葉形ノ軟毛ニシテ翼ノ内側ヨリ立チテ尾ノ兩側ニ垂ル、其色半ハマデハ光澤アル黄色、他ハ白色ナリ、又尾ハ紫紅色ナル針金狀ノ上尾二條アリ其長サ約一尺五

寸、全肺ノ羽色甚ダ美麗ナリ、性常ニ喬木ノ梢ニ棲息シ飛翔スル時ハ甚ダ高クシテ容易ニ捕獲シ難キモノナリ又此類ハ好ミテ花蜜ヲ吸ヘリ

霧鳥屬 *Paradisaea*

〔剝〕(和名) 假稱カバミノ、フウテウ (漢名) 霧鳥又練鵲

〔學名〕 *Paradisaea Minor* (英名) *Paradisae Bird*

南洋「ニウギニヤ」島ノ産ナリ、軀幹約一尺二寸、翼六寸五分、嘴一寸一分、脛一寸二分ニシテ、嘴ハ黒灰色、足ハ淡紅灰色ナリ、羽色ハ嘴上部ノ際ヨリ咽喉部ニカケ乾紅青色、頭部及ビ背部ハ赤黄色、腰ノ上部ハ灰色ヲ帯ビ、以下ハ紫紅色ニシテ羽尖黄色ナリ、又翼尾及ビ腹部ハ紫紅色胸部ハ紫黒色ニシテ光澤アル「天鷲絨」ノ如シ、又毳毛ハ紫紅色ト樺色ト相交ル、其形狀前項ノモノニ同シ、而シテ上尾ハ一雙ノ線條ヲナシ、全肺ノ羽色頗ル美麗ナリ、性前項ニ同シ

霧鳥屬 *Paradisaea*

〔剝〕(和名) 假稱アカミノ、フウテウ (漢名) 霧鳥又練鵲

〔學名〕 *Paradisaea Rubra* (英名) *Paradisae Bird*

南洋「ニウギニヤ」島ノ産ナリ、軀幹約一尺五寸、翼六寸、嘴九分五厘、脛一寸三分アリ、嘴ハ淡黄色ニシテ嘴根黒色ヲ帯ビ、足亦タ黒シ、羽色ハ頂部ノ半バ及ビ咽喉部ハ乾紅青色、頸部淡赤黄色ノ短カキ軟毛アリテ其光澤天鷲絨ノ如シ、其下部ハ背上マデ稍ヤ長キ淡赤黄色ノ羽色ニシテ羽尖ニ丹紅色ヲ帯ブ、上胸部ヨリ肩ハ淡赤黄色ニ丹紅毛交ル、背部ハ紫紅色、尾ノ上ハ紅色、他ハ紫紅色ナリ、又毳毛ハ濃紅色ニ丹色ヲ交ヘ其羽尖ハ白クシテ長サ約八寸七分アリ、而シテ上尾ハ恰モ「ガム」ノ如キ黒色ノ橢圓形ナル溝ノ如キ線條双列シテ垂ル、性前項ニ同シ

霧鳥屬 *Paradisaea*

〔別〕(毛) 假稱 アライタヅキ、フウテウ (漢名) 霧鳥又練鵲

(學名) *Paradisea Gmelini*,

(英名) Paradise Bird.

南洋「ニウギニヤ」島ノ産ナリ、軀幹一尺一寸五分、翼五寸七分、嘴一寸二分、脛一寸四分アリ、嘴ハ灰黒色、足ハ淡赤灰色ナリ、羽色ハ頂部及ヒ咽喉部乾紅青色、後頭部ヨリ背部ハ淡黄色、他ハ紫紅色ニシテ翼ノ兩側ニ蘇鐵葉形ノ軟カキ羽毛少シク生ゼリ、性前項ニ同シ

霧鳥屬 *Paradisea.*

〔別〕(天) フウテウ 雌 (漢名) 霧鳥又練鵲

(學名) *Paradisea.* ♀

(英名) Paradise Bird.

南洋「ニウギニヤ」島ノ産ナリ、軀幹一尺五分、翼五寸五分、嘴一寸二分、脛一寸、嘴ハ灰黒色、足ハ淡赤灰色ナリ、羽色ハ頂部ヨリ咽喉部ニカケテ濃紫紅色、後頭ヨリ背部ハ淡黄色、他ハ紫紅色ナリ、此鳥ハ霧鳥ノ雌ナ

レ凡種屬ヲ定メズ、性前項ニ同シ

尾長霧鳥屬 *Parotia.*

〔別〕(毛) 假稱 尾長フウテウ 雄 (漢名) 霧鳥又練鵲

(學名) *Parotia Seifata*, ♂

(英名) Long-tailed Bird of Paradise.

南洋「ニウギニヤ」島ノ産ナリ、軀幹三尺五寸強、翼六寸八分、嘴二寸四分強、脛一寸八分アリテ嘴ト足ハ黒色ナリ、羽色頭部ハ光澤アル青黒色、背部ハ灰黒色ニ光彩アル青黒色ヲ交ニ、胸部亦タ灰黒色、翼ノ兩側ニ飾毛アリ、長短相交リ、羽尖開キタル美羽、翼ノ兩側ニ双立シ其長キ羽ハ四寸六分許アリ、又尾ハ青黒色ニシテ頗ル長ク約二尺六寸(軀幹ノ内)巾一寸二分アリ、全身ノ形容珍奇ニシテ甚ダ美麗ナリ、性前項ニ同シ

糸尾霧鳥屬 *Schlegelia.*

〔剝〕(卒)

假稱 フタイトドリ

雄

(漢名) 霧鳥一種

(學名) Scelopelia Wilsoni, Cass.



(英名) Magnificent Bero of Paradise.

南洋ニウギニヤ島ノ産ナリ、軀幹約六寸、翼三寸八分、嘴六分、脛九分五厘、尾ハ一寸五分(軀幹ノ内)又糸ノ如キ上尾二條アリテ左右ニ卷狀ヲナス、其次ケ約八寸五分アリ、羽色ハ頂部及ビ腰部褐色、後頭部ニ約一寸三分アル淡黄色ノ先キ廣キ光羽アリ其形狀恰モ肩掛ケノ如シ、其以下ハ赤褐色ナリ、又兩覆羽ハ黄色ニシテ羽尖黒ク、風切羽ト尾ハ黒褐色、咽喉ト腹部ハ乾紅色ナリ、性前項ニ同シ

比翼鳥屬

Ciennurus.

〔剝〕(卒)

(和名) ヒヨクドリ又ヒヨク

雄

(漢名) 比翼鳥

(學名) Ciennurus Regius,



(英名) King Bero of Paradise.

南洋ニウギニヤ島ノ産ナリ、軀幹約五寸、翼三寸六分、嘴六分、脛八分、尾一寸二分(軀幹ノ内)上尾五寸アリ、羽色ハ頭部及ビ背部濃紅色、尾ノ上

丹紅色、胸部紫紅色、腹部純白、翼丹紅色、又翼ノ兩側ニ羽尖乾紅青色其下タ白色、尙ホ其下ハ灰色ナル細ク集リタル飾羽アリテ恰モ鷓鴣ノ「オモヒ」羽ノ如ク立テルモノ八枚アリ、又尾ハ半ハ丹紅、半ハ黒灰ニシテ、針金ノ如キ二條ノ上尾アリ、其先キハ幅二分強ノ乾紅青色ナル蕨手ノ如キ羽毛渦卷ス、全身ノ美麗ナル「」形容シ難シ、性前項ニ同シ

管霧鳥屬

Drepanornis.

〔剝〕(卒)

假稱 カンザシ、フウテウ

雄

(漢名) 霧鳥一種

(學名) Drepanornis Albertisi,



(英名) Six-wired of paradise.

南洋ニウギニヤ島ノ産ナリ、軀幹約一尺五分、翼五寸六分、嘴五分、脛一寸六分アリ、嘴ト足ハ黒シ、羽色ハ全身黒色ニシテ光澤天鵝絨ノ如シ頂上ニ三角形ヲナセル銀色ノ短羽ヲ生ゼリ、後頭及ビ胸部ノ上ニ最モ光澤アル黒青色ノ疎毛列生ス、又頭部ノ兩側ニ長サ五寸七分餘ノ針金ノ如キ飾毛三條宛アリ其先キハ幅五分許リノ圓狀ヲナス其形

狀恰モ簪ヲ挿セル如シ、又翼下ノ兩側ニ廣キ飾毛アリ、全身ノ羽色頗ル美麗ナリ、性前項ニ同シ

糸袋霧鳥屬 *Selencides*

〔刺〕(空) 假稱 イトミノ、フウテウ 雄 (漢名) 霧鳥一種

(學名) *Selencides Ignotus*

(英名) *Paradise Bird. sp.*

南洋ニウギニヤ島ノ産ナリ、軀幹約一尺、翼五寸六分、嘴一寸六分、脛一寸三分、嘴ハ甚メ細クシテ黒ク足ハ淡黄色ナリ、羽色ハ頭、背部及ビ翼尾等皆紫黑色ニシテ天鵝絨ノ如キ光澤アリ、翼下ノ兩側ニ白黄色ノ長サ五寸五分許ノ軟カキ羽毛アリ、一見綿ヲ束ネタル如ク而シテ其先キハ黑色ニシテ長サ六寸二分許ノ針金狀ヲナス線毛約八本乃至十本アリテ尾ノ先ニ出ヅ、又胸部ハ黑色ニシテ下部ノ兩側ニ乾紅青色ノ飾毛アリ、全体甚メ艶麗ナリ、性前項ニ同シ

燕尾霧鳥屬 *Dissemurus*

〔刺〕(空) 假稱 ツバメヲ、フウテウ 雄 (漢名) 霧鳥一種

(學名) *Dissemurus Paradiseus*

(英名) *Drongo.*

南洋ニウギニヤ島ノ産ナリ、軀幹八寸五分、翼四寸八分強、嘴八分五厘脛六分アリ、全身鳥羽色ニシテ嘴ト足ハ黒ク、又尾ハ燕ノ如クニシテ兩側細ク延ビ其丈ケ六寸、其先キ一方ニ五分許ナル開キタル飾羽アリ性前項ニ同シ

蜂雀科 *Trochidae*

蜂雀屬 *Trochilus*

〔刺〕(空) ハチスズメ (漢名) 蜂雀

(學名) *Trochilus*

(英名) *Humming-Bird.*

南洋ニウギニヤ島ノ産ナリ、軀幹三寸八分、翼二寸二分、嘴五分五厘、脛

五分強、嘴細クシテ長シ、羽色ハ頭部ヨリ尾マデ紫紺色、咽喉部ハ灰褐色、腹部ハ黄色ナリ、性好ミテ花密ヲ吸フ、此種屬ハ甚ダ美麗ナルモノ多ク極メテ小鳥ナリ、此ノ中極小ナルモノハ拇指ノサキ程ノモノアリ、地球上ニ最小ナル禽類ハ蓋シ此種中ニアルナリ、又其羽毛金色ヲ帯ヘルモノ多ク就レモ皆鮮麗ナリ、

攀禽類 Scansores.

對指族 Zygodactyli.

啄木鳥科 Picaridae.

啄木鳥屬 Picus.

〔剝〕(英名) 假稱ボルネオクロゲラ 雄 (漢名) 啄木鳥 一種

(學名) Picus Marilus, L.

(英名) Woodpecker.

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺五寸四分、翼七寸六分、嘴一寸九分、脛一寸二分アリ、羽色ハ全身黒色ニシテ腹部白色、頂部

及ビ頰部ハ深紅色ナリ、又頭上ハ毛冠狀ヲ爲シ、嘴ト足トハ黒クシテ趾ハ前後ニ双列セリ總テ啄木鳥屬ハ嘴堅牢ニシテ尖銳、尾尖亦タ硬クシテ針ノ如シ、蓋シ此鳥ハ常ニ嘴ヲ以テ樹木ヲ啄キ穿テ、樹中ノ蟲ヲ長キ舌ニテ吸食シ又常ニ直立シテ樹木ヲ速攀スルガ故ニ躰ノ平均ヲ失フ時ハ尾尖ヲ以テ支ユル爲メニ斯ル構造ヲ爲セルモノナリ

啄木鳥屬 Picus.

〔剝〕(和名) 假稱タカブゲラ (漢名) 啄木鳥 一種

(學名) Picus

(英名) Woodpecker.

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹九寸、翼四寸三分、嘴八分、脛五分五厘アリ、羽色ハ頭上濃紅色、後頭部ハ黄色ニシテ毛冠狀ヲナス、咽喉部ヨリ腹部全躰ハ白色ニ黒キ鷹斑アリ、翼ハ黒色ニ淡褐ノ斑点アリ、又雨覆羽ハ濃紅色ニシテ尾ハ黒シ、性前項ト同シ

鸚鵡科 Psittacine.

鸚鵡屬 *Cacatua*.

〔剝〕(充) アウム 雄 (漢名) 鸚鵡

〔學名〕 *Cacatua (Cacatua)*

〔英名〕 Cockatoo.

南洋「スレベス」島ノ産ナリ、軀幹一尺八寸五分、翼一尺二寸、嘴一寸四分五厘ニシテ尖曲ル、脛ハ一寸二分アリ其趾ハ前後ニ双列ス、羽色ハ全身白色ニシテ頂部ニ黄色ノ毛冠アリ其長サ五寸、又兩覆羽ノ下ハ黄毛、尾ノ裏亦タ黄毛ニシテ嘴ト足ハ灰黑色ナリ、性嘴ヲ以テ樹枝ヲクハエ脊ヲ下ニ向ケルコトアリ常ニ嘴ト足トヲ以テ種々ノ舉動ヲナシ又世人ノ知ル如ク能ク種々ノ物真似ヲナス

黑鸚鵡屬 *Calyptorhynchus*.

〔剝〕(充) クロアウム 雄 (漢名) 鸚鵡 一種

〔學名〕 *Calyptorhynchus (Black)*, sp?

〔英名〕 Cockatoo.

南洋「スレベス」島ノ産ナリ、軀幹二尺四寸、翼一尺三寸、嘴三寸四分、脛六分五厘アリ、羽色ハ全身烏羽毛ニシテ頂部ニ長サ五寸許ナル幅細キ多ク集リタル毛冠アリ、又嘴ハ甚ダ大ニシテ曲リ、頬部ニハ毛無シ、性鸚鵡ニ同シ

尾長鸚鵡屬 *Palaeornis*.

〔剝〕(半) ヲナガ、インコ (漢名) 鸚鵡

〔學名〕 *Palaeornis (Long-tailed)*, sp.

〔英名〕 Macaw.

南洋「モロコス」島ノ産ナリ、軀幹一尺三寸七分、翼六寸六分、嘴八分、脛六分アリ、羽色ハ頸部ヨリ背部及ヒ腹部ハ乾紅青色ニシテ下腹部ハ濃紅色、腰部ハ紺色尾ハ紫色ニ青色ヲ帶ブ、又嘴ト足ハ黒褐色ナリ、性鸚鵡ニ同シ

青鸚鵡屬 *Palaeornis*.

〔刺〕(七) アライシコ (漢名) 鸚 哥

(學名) *Palaeornis ?*

(英名) *Micaw.*

南洋「モロコス」島ノ産ナリ、軀幹約八寸、翼四寸五分、嘴七分強、脛四分五厘アリ、羽色ハ全身青色ニシテ嘴根ノ兩側少シク丹紅色ヲ帶ブ、翼ハ半ハ青藍色、半ハ黑色ナリ、又嘴ハ赤灰色、足ハ黒ク、尾ハ短クシテ尖レリ、性鸚鵡ニ同シ

翡翠類 *Coraciiformes.*

翡翠科 *Picaridae.*

翡翠屬 *Haleyonnes.*

〔刺〕(三) ミヤマ、シヤウビン又ヤマ、シヤウビン 雄 (漢名) 翡翠

(學名) *Haleyonnes Coronanda, LATH.*

(英名) *Ruddy Kingfisher.*

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹七寸五分強、翼三寸四分

嘴一寸七分五厘、脛四分五厘アリ、羽色ハ頭部ヨリ翼及ビ尾ハ紫紅色上尾ハ白色ニシテ先キ淺藍色ヲ帶ビ、腹部ハ黃褐色ニシテ羽尖紫色ヲ帶ブ又嘴ト足ハ丹紅色ナリ、性深山ノ谿淵ニ棲息シ小魚類ヲ捕食ス、又此鳥ハ夏季旱魃ノ候、夜間空中高ク飛翔シテ鳴キ渡ル、其聲快明ト呼ブハ則チ此鳥ナリ、又一名「トウガラシ、ゴマ」ト云フ、蓋シ其嘴ハ唐辛ニ似、聲ハ「コマドリ」ニ似タルヲ以テ名ヅケシモノナリ(蚊母鳥モ亦タ夜間飛行シテ鳴クモノナレバ誤ルベカラズ)

魚狗屬 *Alced.*

〔刺〕(三) カハセミ又シヤウビン 雌 (漢名) 魚 狗

(學名) *Alcedo Ispida Bengalensis, GM.*

(英名) *Eastern Common Kingfisher.*

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹五寸八分、翼二寸四分、嘴一寸一分五厘、脛三分アリ、雄ノ羽色ハ光澤アル淺藍色ニシテ腹部褐

色、嘴ハ長クシテ下嘴ノ元ト淡紅色ヲ帯ベリ、又雌ハ其色少シク淡ク
其他ハ黒色、足ハ丹紅色ナリ、性常ニ河邊ニ棲息シテ小魚ヲ捕食ス

魚狗屬 Alcedo?

〔刺〕(和名) 假稱クビシロ、カハセミ (漢名) 魚狗 一種

〔學名〕 Alcedo ?

〔英名〕 Kingfisher.

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺二寸、翼五寸五分、嘴
二寸五分、脛六分アリ、羽色ハ頭、頸部ヨリ腹部ハ白色ニ淡黄色ヲ帯ビ
翼及ビ尾ハ藍色、背部ノ中心ハ最モ光澤アル淺藍色ニシテ、嘴ト足ハ
丹紅色ナリ、性魚狗ト同シ蓋シ、此種ハ内國ニ棲息セズ

魚狗屬 Alcedo?

〔刺〕(和名) 假稱ゴシキ、カハセミ (漢名) 魚狗 一種

〔學名〕 Alcedo ?

〔英名〕 Kingfisher.

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺五分強、翼四寸八分
嘴一寸六分強、脛五分アリ、羽色ハ頭部及ビ背部黒色、翼亦タ黒色ニシ
テ上層ニ光澤アル淺藍色ヲ帯ブ、頸部ヨリ咽喉部ハ白色、胸部及ビ腹
部ハ濃褐色ナリ、性前項ト同シ

太嘴鳥科 Bucerotidae.

段太嘴鳥屬 Rhytidoceros.

〔刺〕(和名) 假稱キザ、フトバシトリ (漢名) 角嘴鳥

〔學名〕 Rhytidoceros Undulatus.

〔英名〕 Crested Hornbill.

〔方言〕 Boaloce.

ボアロ

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹三尺五寸、翼一尺四寸五
分、尾一尺、(軀幹ノ内)脛二寸、嘴ノ上部ハ屋狀ヲナシ其色淡黄ニシテ長

サ八寸而シテ齒ニ鋸齒ノコギリアリ、又嘴上ニ五個ノ横條即チ段キマアル骨質ノ飾リアリテ嘴側ノ高サ(飾骨共)三寸一分ナリ、羽色ハ頭部ヨリ頸部及ビ胸部ハ黄褐色、尾ハ白色、其他ハ總テ鳥羽色ヲナス、又足ハ黑色ナリ、性常ニ喬木ノ梢ニ棲息シ、飛行スル時ハ甚ダ高ク翔リ容易ニ銃殺スルヲ得ズ、且ツ此鳥ハ飼養最モ難キモノナリ、食餌ハ好ミテ芭蕉ノ實ヲ食ス、其他ハ不明ナリト雖モ堅キモノヲ食セズ

鳥冠太嘴鳥屬 *Buceros*.

〔剝〕(老) 假稱トリカブト、フトバシドリ 雄 (義譯) 角嘴鳥

(學名) *Buceros Bicornis*.

(英名) Hornbill.

(方言) *Gongang*.

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹四尺三寸、翼一尺五寸五分、尾ハ一尺三寸七分(軀幹ノ内)ニシテ中央ニ二寸四分ノ黒斑アリ、脛二寸三分、嘴ノ上部ハ屋狀ニシテ長サ九寸齒ハ鋸齒ナリ、嘴上ニ鳥冠形ノ大ナル飾骨アリ、嘴ノ横側(飾骨共)高サ四寸二分ナリ、又其嘴根ハ

黒色ニシテ他ハ淡黄色、飾骨及ビ上嘴根ハ淡紅色ヲ帶ベリ、羽色ハ全身鳥羽色ニシテ脛ハ白色尾モ亦タ白クシテ中程ニ大ナル黒キ横斑アリ、性常ニ喬木ノ梢ニ棲息シ飛行スル時ニハ虚空高ク翔リ(鳴聲亦タ高ク「カン」ト聞ユ)容易ク獵獲シ難シ、又此鳥ハ飼養最モ困難ナリト云フ、食餌ハ前項ニ同シ

鳥冠太嘴鳥屬 *Buceros*.

〔剝〕(夫) 假稱トリカブト、フトバシドリ、ノ雌 (義譯) 角嘴鳥

(學名) *Buceros Bicornis* (Young).

(英名) (方言) 前項ニ同シ

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹三尺一寸、翼一尺四寸二分、尾ハ一尺一寸七分(軀幹ノ内)脛二寸、嘴ハ淡黄色ニシテ長サ三寸六分、質甚ダ軟カクシテ未ダ嘴上ニ飾骨ヲ有セズ、羽色ハ親鳥ト略ボ同シク、唯項部ヨリ腹部ノ羽毛甚ダ軟ラカナリ、蓋シ嘴ハ成長スルニ從ヒ漸次堅ク且ツ大トナリ又飾骨ヲ生スルモノナリ

頸白太嘴鳥屬

Buceros ?

〔剝〕(和名) 假稱クビシロ、フトバシドリ

(義譯) 角嘴鳥

(學名) Buceros ?

(英名) Hornbill, sp.

(方言) Boeroeng Buro.

南洋「ホルネオ」島「ボトス」ノ産ナリ、軀幹二尺六寸、尾ハ八寸五分、(軀幹ノ内)脛二寸、嘴ハ三寸八分アリテ其側面高サ二寸、上下共ニ淡黄色ニ赤色ヲ帶ブ、上嘴ハ屋狀ヲ爲ス、又翼ハ切截シアルヲ以テ詳ラカナラズ羽色ハ頭上、褐色ニ黑色ヲ帶ビ、頸及ビ尾尖ハ白ク、他ハ總テ烏羽色ナリ又足ハ黒シ、性前項ニ同シ

烏羽太嘴鳥屬

Buceros ?

〔剝〕(和名) 假稱カラスバ、フトバシドリ

(義譯) 角嘴鳥

(學名) Buceros ?

(英名) Hornbill, sp.

(方言) Boeroeng Buro.

南洋「ホルネオ」島「ボトス」ノ産ナリ、軀幹ハ其尾拔ケ失セアルガ故ニ檢スル能ハズ、翼モ亦タ切截シアルヲ以テ詳ラカナラザレモ、嘴尖ヨリ尾元マデ一尺五寸、脛一寸五分、嘴ハ屋狀ヲナシ、白黄色ニシテ上下ノ嘴根ニ黒斑アリ長サ四寸九分而シテ足ハ黒シ、羽毛ハ全身烏羽色ニシテ腹部ハ濃灰色ナリ、性前項ニ同シ

太嘴鳥屬

Buceros ?

〔骨〕(和名) フトバシドリノ、カシラボネ

(義譯) 角嘴鳥頭骨

(英名) Skull of Hornbill.

南洋「ホルネオ」島「ボトス」ノ産ナル角嘴鳥ノ頭骨ナリ、上嘴ハ屋狀ヲナシテ鋸齒アリ、色ハ元ト黒クシテ淡紅色ヲ帶ビ上部ニ三個ノ皺狀アル淡紅色ノ飾骨ヲ有シ、下嘴ニハ斜ニ四個ノ凹條即チ段アル覆骨アリ、又上嘴ノ長サ五寸一分、側面ノ高サ飾骨共ニ二寸五分アリ

佛法鳥科 *Coraciæ*

佛法鳥屬 *Eurystomus*

〔別〕(♂) プツバウソウ 雄 (俗稱) 佛法鳥

(學名) *Eurystomus Orientalis*, L.

(英名) Broad-Billed Koller.

南洋「ボルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺、翼六寸四分強、嘴ハ
圓ク太ク丹紅色ニシテ長サ九分五厘、脛七分五厘、足ノ色ハ淡赤ナリ
羽色ハ頭部灰黒色、咽喉部ハ光澤アル紺色、背部及ヒ腹部ハ青黒色、翼
蹠ノ兩覆羽ハ灰藍色ト黒色トニナリ、下面ノ一方ハ紺色ヲ帯ビ、又風
切羽ハ黒色ニシテ半ハ淺藍色ニ其端紺色トナル、尾モ亦タ黒色ニシ
テ元ヨリ裏ノ中部ハ紺色ナリ、此鳥内國ニモ産スレモ極メテ少ナク
且ツ人跡稀レナル深山ニ棲息スルモノナレバ容易ニ獲難シ、世人ガ
紀伊ノ國ノ麤山、高野ニ於テ時ニ佛法僧ト啼ク鳥ノ聲ヲ聞クト云フ
ハ蓋シ此鳥ニシテ該山ニ棲息スルコトハ確實ナリ又他地方ニテモ稀
レニ獲ルコトアリ、形狀頗ル美麗ナリ


鳩類 *Columbæ*

鳩科 *Columbinæ*

鳩屬 *Columba*

〔生〕(♂) 新稱カムリバト 雌雄 (漢名) 鳩 一種

(學名) *Columba Colanata*,



(英名) Crowned Pigeon.

(方言) Beroeng, Kandi,
Papan, Napan.

南洋「ニウギニヤ」島ノ産ナリ、牀大ニシテ圓ク、頂ニ蘇鐵葉形ノ軟ラカ
キ毛冠アリ、羽色ハ頭、頸部及ヒ背、腹部共ニ灰藍色胸部ハ紫紅色、翼
ノ外面中程ニ白斑アリテ其先キ紫紅色トナル、又嘴ハ灰藍色、眼ハ紅
色、足ハ淡赤灰色ニシテ鱗皮紫紅色ヲナス、又雌ノ羽色ハ胸部紫紅色
ニアラズシテ灰藍色ナリ、而シテ翼ノ中心ニアル白斑ハ細シ、其他ハ
雄ニ異ナラズ

鳩屬 *Columba*

(生) (公) チヨウシヤウバト 雌雄 (漢名) 鳩 一種

(學名) Columba 鳩

(英名) Pigeon. sp.

(方言) Poenai.

南洋爪哇島ノ産ナリ、形チ伯勞ヨリ大ナリ、羽色ハ頂部褐色、背部亦タ褐色ニシテ羽尖灰黑色トナル、頭上及ビ嘴ノ際並ニ咽喉部ハ鼠色、頸部及ビ胸部ノ両側ハ白色ニシテ羽尖ニ黒褐色ノ横斑アリ、胸部ノ中心ハ淡赤色、腹部ハ白色ニ赤褐色ヲ帶ズ、尾モ亦タ赤褐色、而シテ嘴ハ灰色、足ハ紫黑色ナリ、

鳩 屬 Columba.

S (生) (公) イハバト又ドバト 雌雄 (漢名) 鳩

(學名) Columba Domestica, GMEL.

(英名) Dove.

内國ノ産ナリ、鳩ハ世人ノ熟知スルモノナレバ其形状等ヲ詳記セズ又此種ハ總テ鳩ノ變種ナルヲ以テ其羽毛ハ種々ニ變レリ、此屬中一

種傳書鳩ト稱スルモノアリ頗ル有用ナル鳥ニシテ其足又ハ他部ニ書狀ヲ結付ケ之レヲ放ス時ハ速カニ送達シ且ツ其返信ヲ携へ歸ルヲ以テ戰場ニテハ此鳩ノ陣營上ヲ飛翔スルヲ見ル時ハ敵味方互ヒニ忍チ銃殺スト云フ、現ニ本園ニ出品シアルシ、エフ、ライメルス氏ノ傳書鳩ハ神戸ヨリ長崎マデ九時間ニ飛行スト云フ、

斑鳩屬 Turtur.

(生) (公) シラコ、バト又ジユズカケバト 雌雄 (漢名) 斑鳩

(學名) Turtur Risorius, L. 斑鳩

(英名) Common Indian Dove.

(方言) Poenai.

南洋爪哇島ノ産ナリ、羽色ハ全身赤色ヲ帶ベル淡灰色ニシテ腹部白ク頸ニ黒色ノ横斑アリ、又嘴ハ灰色、足ハ淡紅色ナリ、内國産ト同シ

鳩 屬 Turtur ?

〔剝〕(和名) 假稱ゴシキ、ハト (漢名) 鳩 一種

(學名) Turtur ?

(英名) Pigeon. sp.

(方言) Poenai

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」産ナリ、軀幹一尺八分、翼五寸八分、嘴六分五厘、脛五分強アリ、羽色ハ頭部淡灰色、肩ヨリ背部及ビ尾ハ乾紅青色、胸部ヨリ腹部ハ紫紅色、以下ハ橙黄色ニシテ足ハ黑色ナリ

鳩 屬 Turtur ?

〔剝〕(和名) 假稱ナナイロ、ハト (漢名) 鳩 一種

(學名) Turtur ?

(英名) Pigeon. sp.

(方言) Poenai

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹八寸四分、翼四寸八分、嘴六分、脛六分アリ、嘴根ハ黑色ニシテ其尖キ白色ニ灰色ヲ帶ズ、足ハ紅色ナリ、羽色ハ頭部ヨリ胸部ニカケ灰藍色ニシテ紫紅色及ビ濃赤褐色

鳩 屬 Turtur ?

〔剝〕(和名) 假稱カキイロ、ヤマハト (漢名) 鳩 一種

(學名) Turtur ?

(英名) Pigeon. sp.

(方言) Poenai

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺七分、尾ハ四寸三分、(軀幹ノ内)翼四寸四分、嘴五分強、脛五分アリ、羽色ハ頭ヨリ背部赤褐色、尾モ亦タ赤褐色ニシテ黒キ鷹斑アリ、又腹部ハ淡褐色ニシテ嘴ノ色黒シ

鳩 屬 Turtur ?

〔剝〕(和名) 假稱ニシキ、ハト (漢名) 鳩 一種

(學名) Turtur ?

(英名) Pigeon. sp.

(方言) Poenai. #ナイ

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹約七寸七分、翼四寸六分、嘴ハ黒クシテ長サ五分、脛ハ淡黄色ニシテ羽毛ヲ生ズ其長サ六分アリ、羽色ハ頂部紫色、後頭ノ兩側ハ青色、肩上ハ赤褐色、背部ハ青褐色ニ黒キ斑点アリ、尾モ亦タ青褐色ニシテ半ハ黒ク其尖キハ白シ、翼ハ黒色、胸ハ上部紫色ニ羽尖灰色ヲ帶ビ、其下ハ黒ク、腰部ハ青褐色、腹部ハ白クシテ其下部ハ青色ノ羽毛交リ、羽色甚ダ美麗ナリ

鳩 屬 Turtur ?

(和名) 假稱ムラサキ、バト

(漢名) 鳩 一種

(學名) Turtur ?

(英名) Pigeon. sp.

(方言) Poenai. #ナイ

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹約七分五厘、翼約四寸五

分、嘴ハ赤褐色ニシテ長サ五分強、脛亦タ同色ニシテ長サ一寸、羽色ハ頭部茶褐色、咽喉部ヨリ腹部白色、背部及ビ翼ハ紫紅色、尾モ亦タ紫紅色ニシテ其羽尖鼠色トナル、

鳩 屬 Terton ?

(和名) 假稱ホルネオ、アラバト

(漢名) 鳩 一種

(學名) Terton ?

(英名) Green Pigeon. sp.

(方言) Poenai. #ナイ

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹七寸五分、翼四寸五分、嘴四寸五分、脛六分五厘ニシテ羽毛ヲ生ゼリ、羽色ハ背部ヨリ尾マデハ青色、兩覆羽ニ藍色ノ斑点アリ、又胸部ハ灰青色ニシテ以下淡紅色ト青色ト交ル

撥類 Gallatores-razores.

接地禽科 Galline.

野雞屬 Gallus.

〔別名〕 ヤマ、ニハトリ (漢名) 野雞

〔學名〕 Gallus Bonkiva, temm.

〔英名〕 Wild Fowl, or Jungle-fowl.

〔方言〕 Ajam Hoetan
アヂム
ウマシ

南洋「モア」島ノ産ナリ、頂ニ冠ナク頸ニ赤色ナル海綿狀ノ皮膚アリ、軀幹一尺五寸八分、翼七寸五分、嘴一寸一分、嘴根灰色ニシテ尖キハ白色ニ黄色ヲ帶ブ、脛ハ二寸五分、灰色ニシテ蹠爪ヲ有ス、羽色ハ頭部ヨリ背部ニカケ濃灰色ニシテ中心ニ細キ白條及ビ淡灰色ノ細カキ斑点アリ、腰部ハ羽尖褐色、上尾ハ鳥羽色、尾ハ淺丹黄色、胸、腹部ハ略ホ背部ト同色ニシテ中心ノ白條頗ル鮮明ナリ、蓋シ此種ハ家雞ノ祖鳥ナリ性質、雞類ハ常ニ多ク地上ニ棲息シ飛翔スルヲ稀レニシテ其飛ブト高カラズ、食餌ハ穀粒、蟲類等ヲ趾ヲ以テ搔キ搜シ啄ハミ食フ

雉屬 Phasianus.

〔生〕 (齒) キシ又キギス 雌雄 (漢名) 雉

〔學名〕 Phasianus Versicolor, vicill.

♀♂

〔英名〕 Japanese Green Pheasant.

内國産ナリ、軀幹約二尺五寸、翼七寸九分強、嘴一寸強、脛一寸二分、羽色ハ頭、頸部ハ乾紅青色、咽喉部ハ光澤アル濃紺色ニシテ、後頭ニ一雙ノ短キ束羽ノ毛冠アリ、背部ハ黑色ニ白キ半楕圓形ノ條斑アリテ毛尖褐色トナル、腰部ハ淡灰藍色ノ細長毛ニシテ毛尖黃褐色トナル、又胸腹部ハ乾紅青色ニ黑色ヲ帶ブ、尻ニハ灰黑色ノ軟細毛アリ、翼ハ肩部淡灰色ニ淺藍色ト赤色ヲ帶ビ、兩覆羽ハ褐色ニ赤褐色及ビ黑白ノ斑アリ、風切羽ハ灰色ニ白斑アリ、尾ハ鼠色ニ黑色ノ横斑列リ、又黑色ノ細点アリ、而シテ嘴ハ淡黃灰色、足ハ灰色ニシテ蹠爪アリ又眼ノ周圍ニ丹紅色ノ皮膚アリテ生殖期ニ瀕メバ此皮膚膨大トナリテ甚ダ麗ハシク内國ニ産スル羽色ノ美艶ナル鳥類ノ中ニ數フ、且ツ其肉ハ味ヒ頗ル佳シ、或ハ云フ此鳥地震ノ際ニ必ラズ鳴クト、其性雞類ト同シ

鷩雉屬 Phasianus.

〔生〕(和名) キンケイ 雄 (漢名) 鸞 雌

〔學名〕 *Phasianus pictus*, L. →

〔英名〕 Gold Pheasant.

支那國ノ産ナリ、形狀ハ頭ニ光澤アル黄金色ノ毛冠アリ、後頭ヨリ頸部ハ赤色ヲ帶ベル黄金色ニシテ小羽ノ尖キニ黑色ノ横斑アリ、其以下ハ黒青ノ横斑トナル、又腰部ハ光澤アル黄色、上尾ハ淡紅色、尾ハ長クシテ黑色ニ褐色ノ斑点アリ、咽喉部ヨリ腹部ハ濃紅色、翼ハ淡褐色ニ灰白色ノ線斑アリ、下腹及ヒ腿部ハ茶褐色、而シテ嘴及ヒ脛ハ淡黄灰色ナリ、此種ハ山鳥及ヒ雉ト同種屬ナルヲ以テ其形容甚ダ相似タリ、蓋シ此鳥ハ古ヘ支那ニ多ク産シタルモノナルガ近世ハ殆ンド絶ユ、故ニ支那人ハ頗ル珍重シテ之レヲ持チ歸リ他國ニ輸送ス、又我國ニテハ接續シテ飼養ス而シテ其羽毛ハ甚ダ美麗ナルヲ以テ種々ノ裝飾ニ使用スル爲メ諸外國ニ輸出セリ

鸞 屬 *Argus*.

〔別〕(和名) セイラン 雌雄 (漢名) 鸞又鸞雞

〔學名〕 *Argus Giganteus*, L. ♀ ♂

〔英名〕 Argus Pheasant.

〔方言〕 Baereng Koera.
フナツ ヲラ

南洋「ボルネオ」島「ポンテヤナク」ノ産ニシテ雌雄収容ス、雄ハ軀幹五尺二寸、翼一尺三寸五分、(風切羽ノ長キ部分ナリ)其數、十枚、兩覆羽二尺三寸(長キ分)其數、十五枚アリ、嘴一寸五分、尾ハ三尺六寸五分、(軀幹ノ内)脛二寸七分アリ、羽色ハ頂部黑色ノ軟毛ニシテ毛冠狀ヲ爲ス、背及ヒ肩ハ淡褐色ニ黑色ノ斑点アリ、風切羽ハ淡褐鼠色ニ褐色ノ斑点アリ、兩覆羽ハ深褐色ニ圓形ノ大ナル斑紋並列シ、其上部ニ黑色ノ細斑点アリ腰部ハ黄褐色ニシテ黒点アリ、又尾ノ上半面ハ灰色ニ藍色ヲ帶ビ而シテ白点アリ、其下部半面ハ黄褐色ニシテ黒キ環狀ノ内ニ白点アリ、又雌ハ軀幹二尺三寸強、翼一尺一寸五分、尾ハ一尺一寸許、(軀幹ノ内)脛二寸七分、羽色ハ少シク異ナルモ略ボ雄ニ同シ、唯ダ頸及ヒ咽喉部ヨリ腹部マデハ赤褐色ニシテ黑色ノ細横斑アリ、性質雞類ト同シ

孔雀屬 Pavo.

〔生〕(名) クシヤク 雌雄 (漢名) 孔雀

〔學名〕 Pavo Cristatus, L. ♂

〔英名〕 Peacock.

南清ノ産ナリ、此類中最モ美麗ナル種屬ニ數フモノニシテ雄ノ羽色ハ頂ヨリ咽喉部ハ乾紅青色、頂上ニ同色ノ束ネタル毛冠アリ、頸部ハ金色ノ光彩ヲ帯ベル乾紅青色ニシテ其中点ハ紺色ニ黄金色ヲ帯ブル楕圓ノ半形トナリ、眼ノ周縁ハ灰藍色ニシテ嘴ニ近キ邊ハ紫紺色トナル、背部ハ楕圓半形ノ光紺色ニ黄金色ノ縁アル細羽羅列ス、肩部ハ最モ光澤アル紺色及ビ黑色、翼ハ風切羽黃褐色、兩覆羽ハ青黑色、腹部ハ光澤アル黑色ニ青色ヲ帯ブ、又上尾ハ頗ル長ク黒灰色ニシテ殆ンド躰ノ二倍アリ、其色ハ羽軸ヨリ黄金色ニ乾紅青色ヲ帯ブル光澤艶美ナル總ノ如キ線毛列リ垂ル、又尾端ニハ乾紅青色ニシテ其内ニ紺色ナル寶珠狀ヲ現ハス或ハ公孫樹葉狀トナリテ其兩側ニ黄金色ノ線毛垂ル、而シテ嘴ト足ハ灰黑色ニシテ脛裏ニ蹠爪ヲ有ス、又雌ハ

躰形稍ヤ小ニシテ羽色略ホ雄ト同シケレモ尾ハ短カクシテ尾端ニ飾羽ナク且ツ足ニ蹠爪ヲ有セズ又雄ハ交接期ニ至レハ時々其尾ヲ立テ美ナル上尾ト共ニ押シ開ク一扇ノ如クナスハ蓋シ雌ノ歡心ヲ買フ爲メナリ、性前項ト同シ

珠雞屬 Numida.

〔生〕(名) ホロホロ 雌 (漢名) 珠雞

〔學名〕 Numida Meleagris ♀

〔英名〕 Guinea-Fowl

濠洲ノ産ナリ、形狀ハ頂ニ骨冠突出シ、其周圍及ビ頬、後頭ノ両面ハ灰白色ニ淡藍色ヲ帯ビ、骨冠ノ後ヨリ頸ノ中央ニ紫黑色ノ條斑アリ、鼻上ヨリ兩側ノ嘴根ニ赤色ノ皮膚アリ、頬下ニ亦タ同色ノ皮膚垂下ス羽色ハ頸ヨリ胸部ハ紫灰色、他ハ總テ灰黑色ニシテ細カナル白環点アリ、性前項ト同シ

白露國雞屬 Meleagris.

〔生〕(壳)

(和名) カラクンテウ又シチメンテウ (漢名) 白露國雞 *Meleagris*.

(學名) *Meleagris Gallopavo* ♀

(英名) Turkey.

白露國ノ産ナリ、体中形ニシテ頂ニ凸凹ノ皮膚皺狀ヲ爲セル「トサカ」アリ、嘴上ニハ紐狀ノ「トサカ」垂下シ、胸部ニモ亦凸凹セル皮膚垂下ス、其色、時ニ紫紺色トナリ又赤色、藍色トナリ種々ニ變色(其皮膚亦タ節々伸縮ス)スルヲ以テ七面鳥ノ名アリ、羽色ハ背、腹部ハ青褐色、翼ハ灰黑色、雨覆羽ハ褐色ニ細カキ黒褐色ノ斑点アリ、其羽ノ一方ハ灰白ノ條斑ト白色トニナル、腰部ハ背部ト同色ニシテ羽尖白ク尾ハ褐色ニ黑色ヲ帶ブル細カキ斑点アリ其羽尖白ク、而シテ胸部ノ中心ニ黑色ナル獸毛ノ如キ束毛アリ、又嘴ハ淡黄色、足ハ淡赤色ナリ、性略ボ、雞ト同ジク唯ダ異ナル点ハ時々腰部ノ羽毛ヲ逆立テ、尾ヲ扇ノ如ク開ク「殆ンド孔雀ニ似タリ、又雌ハ羽色、雄ト大同小異ナレ尾ヲ開ク「ナシ

走禽類

Cursors.

駝鳥科 *Struthionidae.*

駝鳥屬 *Struthio.*


〔骨〕(骨)

ダテウ

雄

(漢名) 駝鳥

(學名) *Struthio Camelus*, L.



(Skeleton.)

(英名) Ostrich.

(方言) Boereing Meyer.

オナシ

南亞弗利加産駝鳥ノ骨格ナリ(本年三月中同地方ヨリ雌雄二羽ヲ輸送セシガーハ航海中ニ斃レ一ハ航海中ノ疲勞及ビ温度食餌等ノ異ナル爲メガ充分注意ヲ加ヘテ飼養セシモ収容後僅カニ三日ヲ經テ斃死シ、生物ヲ縦覽ニ供スル能ハサルハ甚ダ遺憾トスル處ナリ)鳥類中ノ最大ナルモノニシテ軀幹六尺ヨリ八尺ニ達ス、總テ他鳥ノ羽毛ハ羽軸ヨリ生ズル細毛密接シテ一枚ノ如ク見ユレ此鳥ノ羽毛ハ密接セズ、又其翼ハ退化シ甚ダ不完全ニシテ飛翔ノ用ヲ爲サズ、唯ダ奔馳スル時、脚ヲ助ケテ迅速ナラシムルノミ、殊ニ其脚ハ太クシテ甚ダ強ク、力亦タ強キガ故ニ荷物ヲ負ハシメ使役スルコトアリ、其用ヒ方

ハ險阻ナル坂路ニテハ牛馬ノ如キ四足動物ハ足ノ多キガ爲メニ意
ノ如ク登降スル能ハズ、故ニ此鳥ヲ用フ、又沙漠旅行ノ時等ニ用フレ
ハ甚ダ便宜ナリトス、此種類ハ大概牝形巨大ニシテ濠洲産ノ食火雞
Casarius、「エミツ」Dromaeus、南亞米利加産ノ「リヤ」Reh.等即チ是ナリ、又新「ジ」
ランドニ産スル「キウイ」Apteryxハ小形ニシテ全ク翼ナシ、且ツ同鳥ニハ
近代迄「モア」Moaト稱シテ高サ一丈ニ達シ、同ジク無翼ノ鳥、數種アリシ
ガ、今ハ全ク盡滅シタリト云フ、而シテ此屬中單ニ駝鳥ノミハ趾ノ指
二本ニシテ恰モ哺乳類中ノ双蹄類ノ如ク又嘴ハ扁平ニシテ水禽ニ
似テ大ナルモノナリ

火雞屬 Casarius.

〔生(骨)〕(和名) ヒクヒドリ

(漢名) 火雞又食火雞

(學名) Casarius Indicus.

(英名) Cassowary.

(方言) Casuari.
カアア

南洋「モロコス」島「アンボン」ノ産ナリ、形チ駝鳥ヨリ小サク全身光澤ア

ル深黒褐色ニシテ蘇鐵葉形ノ細キ軟毛ヲ生ズ、翼ハ羽軸ノミニシテ
甚ダ完全ナラズ故ニ飛翔ノ用ニ適セズ、脚ハ極メテ強ク走ルヲ頗ル
迅速ナリ又嘴ハ灰黒色、足ハ灰色ニシテ頸ニ淡黄色ノ骨冠ヲ有ス、其
下部及ビ咽喉部ハ紫紺色、又頸ニ丹紅色ノ皮膚アリ咽喉下部ニモ亦
タ同色ノ皮膚垂ル

火雞屬 Casarius.

〔割〕(和名) ヒクヒドリノヒナ

(漢名) 食火雞 雛

(學名) Casarius Indicus, (Young)

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、軀幹一尺、全身ノ羽毛ハ柔軟ナル黄褐色ニ
シテ恰モ雛雞ノ如シ、其色ハ頭部ニ黒褐色ノ斑アリ又背部ハ黒褐色
ノ太キ線條アリテ野猪ノ兒(ウリボウ)ノ毛色ノ如シ

涉禽類

涉水禽科 Grallae.

鶴屬 *Circus*

〔生〕(和名) 丹頂ノヅル又タヅ 雌雄 (漢名) 鶴

(學名) *Circus japonensis*, Mill. ♀♂

(英名) Sacred Crane

内國産ニシテ此種屬中最大ナルモノナリ、形狀頸太ダ長ク足亦タ頗ル長シ、頂上ハ丹紅色ニシテ嘴ハ青灰色、足ハ黑色ナリ、又其羽色ハ頸部黒灰色、上尾^{ウラビ}黒色ニシテ他ハ總テ白色ナリ、性常ニ池沼或ハ河海ノ汀渚ニ出テ小魚及ビ介類ヲ啄食ス、此類近時迄ハ内國ニ多ク棲息セシモ銃獵者ノ年毎ニ加ハルヲ以テ之レヲ避ケ朝鮮國ニ遁ゲ去リシモノナランカ同國ニハ近來頗ル多ク棲息スト云フ、北海道ニテハ稀レニ此屬ヲ見ルコアリ

水雞科 *Fulicariae*

田雞屬 *Gallinula*

〔刺〕(和名) ホルネオバン (漢名) 田雞一種

(學名) *Gallinula Chloropus*, L. sp.

(英名) Water-hen

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹一尺二寸二分、翼七寸八分、嘴約七分、足ハ長クシテ脛二寸アリ、羽色ハ全身灰褐色ニシテ頸部鼠色ナリ、形狀内國産ノ田雞ニ似ルト雖モ少シク異ナレリ、此類ハ常ニ池沼ニ棲息ス

秧雞屬 *Crex*

〔刺〕(和名) ホルネオクヒナ (漢名) 秧雞一種

(學名) *Crex undulata*, sp.

(英名) Crane

南洋「ホルネオ」島「ボンテヤナク」ノ産ナリ、軀幹八寸五分、翼三寸八分五厘、嘴一寸二分、羽色ハ頂ヨリ頸邊ハ深褐色他ハ濃灰色ニ白横斑アリ又咽喉部ヨリ胸部ハ灰色、以下ハ細カキ白横斑アリ、趾ハ黒褐色ニシテ長シ、性常ニ池沼ニ棲息シ、小魚及蟲類ヲ啄食ス、此屬中内國産ノ秧雞^シ學名ヲ(*Crex fusca erythrorhynchos*)、英名ヲ(*Siberian Ruddy Crane*)ハ夏季交接期ニ向ヘ

ハ晝夜ヲ分クズ類リニ鳴ク、其聲恰モ板ヲ叩クニ似タリ、故ニ雅人ハ「叩ククヒナ」ト稱シテ其聲ヲ聞クヲ樂シミ、吟詠ノ材料トナセリ

鸛鷺科 Ciconiidae.

鷺屬 Ardea.

〔和名〕 クロサギ (漢名) 鷺一種

〔學名〕 Ardea Jugularis, WAGL.

〔英名〕 Eastern Reef-heron.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、軀幹一尺八寸五分、翼九寸三分、嘴二寸六分強、脛二寸三分強アリ、形狀足甚ダ長ク、全身灰黑色ナリ内國ノ對馬及ヒ肥前ノ五島邊ニ産スルモノト同ジ、此類ハ總テ河海或ハ池沼ノ汀渚ニ行キテ魚類ヲ啄ミ食フ、又白鷺ハ世人能ク知レルナレモ黑鷺ハ未ダ多ク知ラザルナリ

鸛屬 Leptophilus.

〔和名〕 スマタラ、コウノトリ (漢名) 鸛一種

〔學名〕 Leptophilus Crumenifer,

〔英名〕 Marabou.

〔方言〕 Boerong Bali.

南洋「スマタラ」島ノ産ナリ、内國産ノ鸛ヨリハ稍ヤ小ナリ、嘴ハ淡灰色ニシテ太ク長シ、足亦タ頗ル長シ、頂ニハ毛ナクシテ禿顛トナレリ、羽色ハ後頭ニ黑色細長ナル軟ラカキ疎毛アリ、又頸部ハ短カキ軟毛ヲ生ズレモ一見毛無キガ如ク、頸ノ全部黄色ナリ、而シテ背部及ビ翼ハ總テ烏羽色、胸、腹部ハ白色ニシテ、胸ニ黒斑アリ、全軀ノ形狀甚ダ醜ク性質亦タ溫柔ナラズ、注意セザレバ不意ニ人ノ眼ヲ突撃スルコトアリ食餌ハ小魚及ビ軟軀動物等ニシテ殻アルモノモ其儘吞食ス

扁嘴類又水禽類 Tamehirostres.

鴻鳧科 Anatidae.

鴻屬 Anser.

(生) (和名)


トウガンヌガテウ

雌雄 (漢名)

鶖

(學名)

Anser



(英名)

Domestic Goose

内國産ナリ、鶖(鶖ノ祖鳥ハ鴈ナリ)ハ家禽ニシテ、此類科ハ總テ蹠膜アリ巧ミニ游泳ス、其嘴ハ扁平ナリ、蓋シ水中或ハ水底ノ泥土中ニ潜伏スル魚類ヲ捕食スル爲メ此ノ如キ構造トナル、羽色ハ頭ヨリ頸部褐色、咽喉部ハ淡褐色、前頭部ハ白色、背及ビ翼ハ褐色、風切羽ハ灰褐色、胸ハ淡褐色、腹ヨリ尻部ハ灰白色、腹ノ兩側ハ羽尖褐色、尾ハ又褐色ニシテ先キ淡灰色トナル又足ハ橙黄色、嘴ハ黑色ニシテ上嘴根ト前頂部ニ黑色ノ贅疣冠狀ヲ爲ス、或ハ全身純白ニシテ嘴ト足ハ橙黄色ノモノアリ、性蛇類ヲ見ル時ハ忽チ啄ミ殺シ小ナルモノハ之レヲ食フヲ以テ蛇類ハ大ニ怖レ此鳥ヲ飼養シアル處ニハ近付カズ、南洋地方ハ殊ニ蛇類多ク棲息シ其類中ニ有毒ナルモノアリ、故ニ同地方ノ住民ハ競フテ此鳥ヲ多ク飼養シ、蛇類ノ防備トナス、又此鳥ハ食料ニ宜シ

鳧 屬

Anas

(生) (和名)

マガモ

雄

(漢名)

鳧

(學名)

Anas boschas

(英名)

Mallard

内國産ナリ、羽色ハ頸部乾紅青色、背部及ビ翼ハ灰黑色、其表面ハ黒紺色ニシテ羽尖白シ、胸部褐色、腹部灰白色、腰ヨリ尾ノ上ハ黒紺色又同色ナル短カキ上尾双列シ其先キ卷狀ヲナス、尾ハ灰色ニシテ羽尖白シ、嘴ハ青黄色、足ハ橙黄色ナリ、性水邊ニ棲息シテ魚類其他ノ軟体動物ヲ捕食シ又穀類ヲモ食ス、此鳥ハ味美ナルヲ以テ食料ニ宜シ

鶖 屬

Anas

(生) (和名)

假稱

ワタボウシ、アヒル

(漢名)

鶖一種

(學名)

Anas

(英名)

Domestic Duck

(方言)

Kabe Ie

カ

南洋「ホルネオ」島「シントン」ノ産ニシテ家禽ナリ、(總テ鶖ノ祖鳥ハ鴨ナリ)羽色ハ全身純白ニシテ頂ニ集毛ノ毳狀ヲナセル毛冠アリ又

嘴ハ黄色、足ハ橙黄色、形容普通ノ鶩ト同フシテ美ナル珍ラシキ種ナリ、性通常ノ鶩ニ同シ、亦タ食料ニ宜シ

刁鴨屬 *Anas*

(生) (二) (和名) コガモ 雌雄 (漢名) 刁鴨

(學名) *Anas crecca*, L.

(英名) Common Teal.

内國産ナリ、雄ハ頂ヨリ頸部赤褐色、眼ノ周縁ヨリ頸ノ両側ハ乾紅青色、背部ハ灰色ニシテ黑白ノ縦斑交リ列ス、胸部ハ白色ニシテ黒色ノ環斑アリ、腹部ノ両側亦タ白色ニ灰色ノ細横斑アリ、翼ノ風切羽ハ表羽乾紅青色トナリ、尾ハ尻部ノ両側及ビ尾尖黒色、其両側ハ黄白色トナル、而シテ嘴ハ白ク足ハ黄灰色ナリ、又雌ハ全身褐色ニ黒キ斑点アリ、嘴ト足ハ雄ト同色ナリ、性鳥ニ同シ

巴鴨屬 *Anas*

(生) (三) (和名) トモエガモ又アジガモ 雌雄 (漢名) 刁鴨一種

(學名) *Anas formosa*, GEORGI.

♀♂

(英名) Speckled Teal.

内國産ナリ、雄ノ羽色ハ頂部黒褐色、後頭ノ下部乾紅青色、頬ハ淡褐色咽喉ヨリ下ハ紺色、頂下及ビ頸部ニ白條アリ其形チ巴ノ如シ、脊部ハ黄褐色、胸部ハ淡赤色ニシテ黒キ環点アリ、其兩側ニ白條アリテ其前後ハ灰藍色トナル、又翼ノ上ニ黒、白、黄褐色等ノ線狀ノ飾羽アリ、尾ノ兩側ハ赤褐色、尻部ハ黒色、嘴亦タ黒クシテ足ハ黄灰色ナリ、又雌ノ羽色ハ全身褐色、胸部淡褐色ニシテ黒キ斑点アリ、上嘴ノ際、兩側ニ圓狀ノ白斑アリ、而シテ嘴ハ灰黒色、足ハ淡灰色ナリ、性前項ト同シ、亦タ食料ニ宜シ

鴨屬 *Anas*

(生) (三) (和名) ヨシガモ 雄 (漢名) 鴨一種

(學名) *Anas platyrhynchos*, GEORGI.

↔

(英名) Pintail Teal.

内國産ナリ、^{アケヒ}躰、尾ヨリ小ニシテ甚ダ美麗ナル種屬ナリ、羽色ハ頭部乾紅青色、其中央及頬下紫紅色ニシテ後頭ノ毛長シ、嘴際中心ノ上部羽毛ニ白環点アリ、咽喉部ハ純白其下面ハ黒キ横條斑トナル、頸ノ下部及肩ト腹トハ灰色ニシテ其羽尖キ緑リ白シ、又背部ハ灰色、翼ノ両側ニ長キ鼠色ト褐色ノ縦條ナル飾毛アリ、翼ハ鼠色ニシテ其下ハ白キ細綠斑トナル、尻部ノ両側ニ淡黄ノ斑アリ、尾ハ鼠色、腰ト尻部ハ黒色ナリ、而シテ嘴ト足ハ灰黒色ナリ、性、巴鴨ト同ジク、亦タ食料ニ宜シ

鵞屬 Anas.

(生) (和名) フシドリ 雌雄 (漢名) 鵞 鵞

(學名) Anas Galericulata, L.

♀♂

(英名) Mandarin Duck.

内國産ナリ、雄ノ羽色ハ頂上ニ紫黒、黄褐又紫紺色ノ毛冠アリ、眼ノ兩側ハ白色、頸ノ兩側黄褐色ニシテ尖キ少シク白シ、胸ハ紫黒色ニシテ下部黒白ノ横斑トナル、腹部白ク、背部黄褐色、翼ハ灰白色、而シテ翼ノ

上部ニ公孫樹葉形ナル黄褐色ノ飾羽双立ス、又兩翼ノ下ニ淡黒色及ヒ黄褐色ノ先キ黒キ細横斑アリ、嘴ハ濃紅色、足ハ黄色ナリ、又雌ノ羽色ハ眼ノ周縁ニ白條アリ、他ハ灰褐色、胸ヨリ腹部ニ白灰色ノ環斑アリ、翼ノ表面ハ青紺色ニシテ其尖キ白ク、嘴ハ灰黒色、足ハ黄灰色ナリ、性常ニ水面ニ棲息スレテ、時々樹枝ニ止ルヲ好ム、故ニ其巢ハ樹梢ノ枝間ニ造リテ産卵ス

洋鴨屬 Anas.

(生) (和名) ハリケン (漢名) 洋鴨又番鴨

(學名) Anas sp. ♀♂

(英名) Domestic Duck. Species.

(方言)

南洋「ホルネオ」島「シントン」ノ産ナリ、躰、尾ヨリ稍ヤ小ナル家禽ニシテ、形状全身白色ニ黒斑アルハ通例ナレテ、本園飼養ノモノハ全身純白ナリ、又嘴ハ黒クシテ嘴尖淡紅色トナリ、嘴根及ヒ眼ノ周縁ニ紅色

ニシテ皺狀ヲ爲セル皮膚ノ「トサカ」アリ、而シテ足ハ黄灰色ナリ、性驚ニ同シ又食料トシテ味ヒ佳ナリ

爬虫部 Reptilia.

龜鼈類 Testudinata.

鼈科 Trionidae.

鼈屬 Trionyx.

〔生〕(二六) (和名) スツホン又トチ又ドチガメ (漢名) 鼈又跋奴

〔學名〕 Trionyx sinensis, sp.

〔英名〕 Snapping Turtle.

〔方言〕 Kan Lab Lake.

南洋馬來半島「マラックワ」ノ産ナリ、軀軀一尺八寸七分、幅(廣キ部分)一尺三寸二分、背面灰黑色、腹部淡黄色、臍扁平ニシテ背甲ハ中央ノ部分ノミ堅硬、其周縁ハ軟骨ヨリナル、又腹甲ハ短クシテ狭シ、形狀内國産ト異ナリテ嘴圓シ、性、河、川、湖、沼ノ淡水^{マミズ}ノ水底ニ棲息ス、食餌ハ小魚及

ト淡水ニ生活スル小動物等ナリ

蠍龜科 Chelone.

蠍龜屬 Chelonia.

〔割〕(二七) (和名) ウミガメ

(漢名) 蠍龜又帆蜃

〔學名〕 Chelonia Quonana, sp.

〔英名〕 Marine Turtle.

〔方言〕 Kan Penjo.

南洋「スマタラ」島「ジャンビ」ノ産ナリ、形狀背甲ハ主甲十三枚、緣甲二十五枚、腹甲ハ四枚ニシテ第一ノモノハ末ノモノヨリ大ナリ、前肢ノ爪ハ一個、後肢ハ二個ヲ有ズ、其色背甲ハ褐色ニシテ黒灰色ノ斑アリ、性常ニ海洋ヲ回泳シ時々海岸ニ上ル、交接期ハ十二月頃ヨリ翌年四月頃迄トス、而シテ六七月頃ニ至リ夜間海濱ニ上リ沙礫ノ間ニ穴ヲ穿チ産卵シ後肢ニテ土砂ヲ搔キ寄セ、其上ヲ覆ヒ腹ヲ以テ壓シ、所在ヲ晦マシテ去ル、其卵數ハ約百六十餘ニ至ル、夫レヨリ六七十月ヲ經テ

孵化ス、食餌ハ魚類其他海中ニ生活スル小動物等ナリ(此種内國産ノ「アカ、ウミガメ」ニ似タレモ明瞭ナラズ)此甲ヲ以テ瑠璃ノ代用トナシ器物ヲ作ル

瑠璃屬 Chelonia.

(生) (三) (和名) タイマイ (漢名) 瑠璃

(學名) Chelonia Imbricata, L.

(英名) Hawk-Bill Turtle.

(方言) 海南 瑠璃

南洋「モロコス」島近海ニ於テ捕獲セシモノナリ、形状背甲ハ相接シテ覆瓦状ヲ爲ス、主甲十三枚、縁甲二十四枚、尾ハ甲外ニ出デ左右ニ屈曲スル「自」在ナリ、嘴尖ハ彎曲シテ鷹ノ如ク、又爪ハ前肢ニ二個、後肢ニ一個ヲ有ス、背面黒褐色ニシテ黒色ノ斑点アリ、腹ハ黄黒色ナリ、内國ニテハ小笠原島、沖繩、臺灣等ノ海洋ニ棲息ス、此甲ヲ以テ製造シタル器物ハ最モ美麗ナリ、食餌ハ蠃^{ウミガメ}ニ同ジ

因ニ云フ、古ヘヨリ瑠璃ヲ以テ婦人ノ櫛、笄等ヲ造リ用ヒタルガ、往時節儉ノ沙汰、時ノ政府ヨリ出デタル「ア」リシニ、其頃商人ハ之レヲ「鱉」(スツボン)ノ甲ト云ヒ替ヘテ賣買セシ「ア」リ、(蓋シ鱉甲ハ價廉ナレバナリ)故ニ「ベツカウ」ト云フ通稱遺レリ

鱉類 Crocodilia.

鱉科 Loricata.

鱉屬 Crocodilus.

(生) (二) (和名) ワニ (漢名) 鱉魚又鱷

(學名) Crocodilus Prosus.

(英名) Crocodile.

(方言) Boeaja, アナヤ

熱帯地方ニ棲息スル爬蟲類ノ最大ナル種屬ニシテ長サ二丈餘ニ達スルモノアリ形状ハ口大ニシテ圓錐狀ノ齒ヲ並列シ、全身堅甲ヲ以テ被ハレ彈丸モ尙ホ穿貫スベカラズ、性水中ヲ自在ニ游泳シテ魚類

ヲ捕食シ、牛、馬、羊、豚等ノ河邊ニ近接スルモノアル時ハ不意ニ起テ之
 レヲ一嚙シ、水中ニ引入レテ食ヒ、又河岸ニ土人ノ洗濯スル下ニ忍ビ
 來リ尾ヲ以テ彈キ落シ水中ニ溺ラシテ食フコアリト云フ現ニ當園
 委員藤田孝誼ガ新嘉坡附近動物採集ノ爲メニ出張ノ際、友人ガ釣漁
 ノ爲メ「ジヨチホー」近海ニ赴クモノト其海岸迄同行セシコアリ、而シ
 テ該友人ハ直ニ乗船シ、藤田ハ友人ノ養犬ト共ニ海濱ニ残り其海洋
 ヲ眺メ居タルニ大ナル樹木ノ如キモノ漂流シ來レリ、時ニ犬ハ主人
 ノ船ニ乗ラントシテ水邊ニ近付キタルニ樹木ト見エシハ大ナル鱈
 魚ニシテ尾ヲ以テ陸上ニ居ル犬ヲ彈キタリ、犬ハ豫テ鱈魚ノ斯ル舉
 動ヲナスヲ知り居ルガ故ニ速カニ飛ビ除キテ危難ヲ避ケシガ、鱈魚
 再ビ尾ヲ以テ陸上ヲ拂ヒタレトモ犬ハ疾クニ去リテ其處ニアラザレ
 ハ左、右ニ兩度拂ヒタルノミニテ止ミタリ、友人ハ此ノ様ヲ見テ大ニ
 驚怖シ速カニ上陸シタリ、又當園飼養水槽中ニ在ルモノモ常ニハ甚
 ダ溫和ナル如ク見ユルモ、既ニ過般雨天ノ際縱覽者ノ中覆ヒ綱ノ上
 ニ傘ヲ置キタル人アリシニ、忽チ跳リ上リ之ヲ彈キ落サントスル舉

動ハ頗ル猛烈ニシテ飼養者ト共ニ驚愕セシコトアリ
 當園收容ノモノ五疋アリ内大一疋小二疋ハ南洋「モア」島「モア」河ノ産
 他ノ二疋ハ新嘉坡「ジヨチホー」ノ沙濱ニ於テ捕獲セシモノナリ、又大
 ナルモノハ長サ約九尺餘アリ、冬季ハ華氏七十五度ヨリ八十五度迄
 ノ温湯中ニ飼養ス

蜥蜴類 *Sauria*

裂舌科 *Fissilingua*

蛇舅母屬 *Tachydromus*

(三) (和名) 假稱 シマ、カナヘビ (漢名) 蛇舅母
 (學名) *Tachydromus*

(英名) Lizard

(方言) *Rejawan*

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、軀幹九寸六分、形容内國ニ産スル蛇舅母ト
 同シ、(此科ノモノハ皆舌先キ裂テ並列シ共ニ尖レリ、又形容石龍子

ニ似テ細鱗ノ皮膚全躰ヲ覆ヒ能ク發達シテ内部ヲ保護ス其色全身
褐色ニシテ背ノ兩側ニ白色ナル二線條アリ、咽喉ヨリ腹部ハ淡黄色
ナリ、性山野ノ礫石ノ間或ハ樹木ニ登リテ棲息シ、食餌ハ蟲類ヲ捕食
ス

大、蛇舅母屬

Varanus

〔生〕〔骨〕〔三〕〔和名〕

假稱 オホ、カナヘビ

〔漢名〕 蛇舅母一種

〔學名〕 Varanus Niloticus

〔英名〕 Lizard

〔方言〕 Bejawa Darit.

ベヤワ

南洋「ボルネオ」島「サンパス」ノ産ナリ、軀幹八尺餘ニ至ルモノアリト云
フ、本圃飼養ノモノハ其長サ約五尺、躰色ハ全身黒灰色、咽喉ハ淡黄ノ
斑ニシテ又腹ト尾ニ同色ノ横斑アリ、而シテ尾ハ堅ニ扁平ニシテ淡
黄褐色ト黒灰色ト交ル横斑トナリ尾上ハ鱗狀トナル、性常ニ池沼ヲ
匍匐シ或ハ樹木ニ登リ小鳥ヲ捕食ス、又此動物ハ其躰色ヲ居ル所ノ

樹色、地ノ色等ニ變ズルノ特性ヲ有ス蓋シ他動物ノ矚目ヲ逃ル、防
備ノ爲メナリ、其變化頗ル自在ナルガ故ニ南洋地方ニ於テハ自己ノ
説ヲ容易ク變ズル者ヲ「ビヤワ」ト云フ

星、蛇舅母屬

Monitor

〔別〕〔三〕〔和名〕

假稱 ホシ、カナヘビ

〔漢名〕

蛇舅母一種

〔學名〕 Monitor sp.

〔英名〕 Lizard

〔方言〕 Bejawa Darit.

ベヤワ

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、軀幹四尺九寸三分、全身灰黒色ニシテ頭ヨ
リ背部及ビ腹ノ兩側、尾ニ至ルマデ、白黄色ナル環狀ノ斑紋アリ、又尾
ノ中央ヨリ廣キ同色ノ横斑アリ、咽喉ヨリ腹部及ビ尾ノ裏面ハ白黄
色ニシテ斑紋ナシ、而シテ尾ハ扁平ニシテ上ハ鱗狀トナル性「オホ、カ
ナヘビ」ニ同シ

疣襟、蛇舅母屬

Monitor

〔生〕(三) (和名) 假稱 イボエリ、カナヘビ (漢名) 蛇舅母一種

(學名) Monitor sp.

(英名) Lizard

(方言) Bejawa Darat.
ベジャウ ダラ

南洋「ボルネオ」島「シタング」ノ産ナリ、軀幹約三尺五六寸、頸ノ表面ニ尖リタル疣^{イボ}様ノ鱗甲並列スルヲ以テ假稱トス、躰色ハ背ヨリ尾ニ至ルマデ淡黄色ノ横斑アリ、又兩側ニ同色ノ斑点アリ、而シテ腹部ハ淡黄色ナリ、性前項ト同シ

ボルネネ 蛇舅母屬 Monitor.

〔生〕(三) (和名) 假稱 ボルネオ、カナヘビ (漢名) 蛇舅母一種

(學名)、(英名)、(方言)前項ニ同シ

南洋「ボルネオ」島「シタング」ノ産ナリ、軀幹約三尺、全身灰色ニシテ咽喉ヨリ腹部、尾ノ裏面ニ至ルマデ橙黄色、又咽喉ニ灰黑色ノ條斑アリ、而シテ尾ハ堅ニ扁平ナリ、性前項ニ同シ

鱗襟、蛇舅母屬 Agana.

〔測〕(三五) (和名) 假稱 ヒレエリ、カナヘビ (漢名) 蛇舅母一種

(學名) Agana sp.

(英名) Prilled Lizard.

濠洲「クキンスランド」ノ産ニシテ深林ニ棲息ス、軀幹二尺五寸強、全身黒灰色ニシテ面ノ形容蟾^{ヒキガハル}蝥ニ似タリ又兩肩部ヨリ胸部ニカケテ扇形ノ皮膚附生ス、此鱗狀ノモノヲ開キテ恰モ襟卷ノ如キ形ヲ爲ス、而シテ尾ハ頗ル長シ、躰色ハ淡黄ト黒色ト交ル斑紋アリ咽喉ヨリ腹部ハ淡黄色ナリ、性前項ト同シ

蛇 類 Ophidia.

潤口族 Colubriformia.

無毒科 Inocua.

蟒蛇屬 Python.

〔生〕(三) (和名) ウハバミ (漢名) 蟒 蛇

(學名) Python Reticulata.

(英名) Huge Serpent.

(方言) Oer Sawa.

總テ蛇類ハ全躰ノ形容繩狀ヲナス、而シテ四肢ナシ、其背部ハ皮膚ノ上層變化シタル鱗ヲ以テ被ハル、躰色淡褐ニシテ黒キ斑紋アリ、又腹部ニハ横長キ鱗並列シ、匍匐スル時ハ其鱗ヲ逆立テ四肢ノ代用ヲナシ樹木ニ攀登スルモ亦タ此鱗ノ働キニ依ル、而シテ鱗蛇ト稱スルモノハ「ブラシル」ニ産スル ^{ボテ}Red 及ビ南洋「スマタラ」島ニ産スル二種類トス其長サ三四丈ニ達スルモノアリ、本園ニ飼養スルモノハ「スマタラ」島「ジャンピ」ノ産ニシテ其數三匹アリ、其内大ナルモノハ長サ二丈二尺胴ノ周圍二尺二寸ナリ、又此蛇ハ明治卅五年十月一日新嘉坡出發三池丸便ニテ當園ニ收容セシガ、輸送ノ途上船中ニ於テ五百有餘ノ卵子ヲ産セリ、食餌ハ鳥獸等ナリ其舉動ハ獲ント欲スル動物ニ卷付キ生物ノ勢ヒ漸ク衰フルヲ待チ之レヲ吞食ス、性大ニ沈靜ナルヲ以テ遇々人ノ深林ヲ過グル時、路上ニ横ハルヲ知ラズシテ害ヲ受ルモノ

アリト云フ、又此種ハ無毒ナレモ總テ蛇類ノ齒ハ内ニ向ヒテ生ズルガ故ニ一度口ニシタルモノハ自然放ツ能ハズ、サレバ人ノ嚙マル、時ハ之レヲ放スニ尤モ困難ヲ極ム、加フルニ「大ナル」種屬ナレバ有害恐ルベキモノナリ

蛇 屬 Elaps.

(三) (和名) 方言 ヒトリ、ヘビ (漢名) 蛇一種

(濱水藥) (學名) Elaps Corallinus. ?

(英名) Snake sp.

(方言) Oer Koemban.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、長サ六尺六寸強、全身灰黑色ニシテ腹部ノ色ハ淡ク、而シテ頭部ヨリ尾尖マデ白色ノ横線斑アリ、性夜間燈火ノ元トニ近付クヲ以テ此名アリ

蛇 屬 Zamenis. ?

(三) (和名) 方言 アヲ、ハナヘビ (漢名) 蛇一種

(濱水藥)

(學名) *Zamenis* sp.?

(英名) Snake sp.

(方言) Oer. Poege.

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、長サ三尺三寸八分、全身青灰色ニシテ腹部ハ色淡ク又背ノ兩側ニ白條アリ、性敏捷ニシテ數間アル樹上ヨリ飛び下リ、且ツ匍匐スルヲ甚メ速カナルガ故ニ容易ニ捕獲シ難シ

蛇 屬 *Zamenis*?

(三九) (和名) 方言 ハナ、ヘビ (漢名) 蛇 一種

(漢水類)

(學名)、(英名)、(方言)前項ニ同シ

南洋「ボルネオ」島ノ産ナリ、長サ三尺一寸五分、軀色ハ背部褐色ニシテ兩側ニ白條アリ、其下タ亦タ褐色トナル而シテ腹部ハ灰色ナリ、性前項ニ同シ

溝 牙 族 *Proteroglypha*.

有 毒 科 *Venosa*.

杓子蛇屬 *Naja*.

(一〇三) (和名) シヤクシ、ヘビ (漢名) 毒蛇 一種

(學名) *Naja* *Trindiana*,

(英名) *Cobra*.

(方言) *Boeroug* *Breec*.

印度及ビ瓜哇島ニ産スル有名ナル毒蛇ニシテ之レニ嚙マル、時ハ即時治療セザレバ生命ヲ絶ツベシ、故ニ棲息地ノ人民ハ恐ル、ト猛獸ヨリモ甚ダシ、總テ毒蛇ハ毒ヲ腦ノ一部分ニ貯ヘ管ニナレル齒牙ヲ有シ、其齒ヨリ毒ヲ注射スルモノナリ、内國ニ棲息スル種類ハ蝮蛇并ニ沖繩及ビ其附近ニ棲息スル飯匙倩又蛇婆一種等ナリ
本國收容ノモノハ南洋瓜哇島ノ産ニシテ長サ九尺九寸、全身黄褐色頸部扁平ナルヲ恰モ杓子ノ如シ故ニ此名アリ

81
853

不復
許製

明治廿六年五月廿一日印刷
明治卅六年五月廿五日發行

著者

織田信德

大阪市東區船屋町一丁目
番外三番地

發行者

山岡千太郎

大阪市東區北濱三丁目
五十七番屋敷

印刷者

渡邊益夫

大阪市東區高麗橋二丁目
八十六番屋敷

印刷所

大林帳簿製造所

大阪市東區高麗橋四丁目
十五番屋敷

發行所


第五回內國勸業博覽會
餘興動物園


大阪市南區北霞町

定價金貳拾錢

10/26

IT 2B15





81

853

057664-000-7

81-853

余興動物園集容動物目錄及解説

織田 信徳 / 編

M36

CAR-0268



