



良藥彙集

中華民國三十三年九月第七版

NEO-LIVEX

注射無痛補血特效



信誼

最新出品 新力弗肝

每二公撮之新力弗肝含有由一百公分鮮肝提出之生血素合美國藥典規定十單位主治各型貧血惡傳染病後貧血內外產婦各科手術後流血孕婦及哺乳婦女貧血烟癮貧白血病萎黃病代謝低落一級衰弱用之皆效另有超力弗肝每二公撮含有由二百公分鮮肝提出生血素合美國藥典規定二十單位標準最高效力最強

信誼藥廠最新發行

N.L.2

信 誼 藥 廠

各地辦事處經理處及代理處一覽表

總公司	上海洛陽路三九七號	電話八八六八〇
	電報掛號七五六九（有線無線）	
總廠	上海藍田路二〇號	電話七〇〇二〇
第一分廠	上海大同路九一四號	電話三四八五九
第二分廠	上海廬山路一二〇號	電話二二六五〇
第三分廠	上海普陀路二〇一號	電話三七九八一

華北區

天津辦事處 天津興亞三區中街八二號

秦皇島代理處 東魯藥房

唐山代理處

北京辦事處 北京前門西皮市九號

張家口代理處 佛惠藥房

大同代理處 佛惠藥房

保定代理處

石門代理處 素波藥房

新鄉代理處

太原代理處 素波藥房

濟南辦事處 濟南緯二路緯五路南五三號

濟甯代理處 濟衆藥房

濟州代理處

開封代理處 素波藥房

青島辦事處 青島湖南路二六號

濰縣代理處 承興藥房

周村代理處

博山代理處

烟台辦事處 烟台北馬路瑞成巷三號

華東區

南京辦事處 南京中華路金沙井七號

蕪湖代理處 下長街四〇號信亞藥房
六合代理處

蘇州辦事處 蘇州王洗馬巷四八號

崑山代理處
常熟代理處 縣南街濟華藥房
吳江代理處

蚌埠經理處 蚌埠華盛街一三七號興盛號

徐州代理處 中法藥房

鎮江經理處 鎮江大西路三三三號大中西藥行

揚州代理處 轅門橋國華藥房
泰縣代理處 大林橋南街四〇號
南通代理處 大街七六號永民西藥行
高郵代理處
鹽城代理處 西大街新生藥房

無錫經理處 無錫大市橋街一三一號

常州代理處 南大街六家弄二號
江陰代理處 東門外蘆橋福仁醫院
宜興代理處
溧陽代理處

杭州經理處 杭州保佑坊八〇號華德藥房

嘉興代理處 中法藥房
松江代理處
長安代理處
餘杭代理處
紹興代理處
甯波代理處 廠堂街二二號大任西藥行
金華代理處 法院街四四號通惠公司
平湖代理處 東大街中法藥房
湖州代理處

其他

廈門代理處 水仙街建泰行
汕頭代理處
廣州代理處

七 版 序 言

本廠發行良藥彙集，其目的在廣諭全國醫師以最合用之成藥，并說明其臨診用途，出版以來，已歷六次。每版銷路，向在二萬冊以上，具徵國內醫界愛護本廠及賞用本廠出品之熱忱，感篆之深，非可言喻。惟是此種熱忱，其動機固在於提倡國貨，然國貨中若者為值得提倡，若者能不負社會屬望，固有待於試驗而證實。本廠以十餘年之歷史，擁百數十種之出品，雖未敢以出類拔萃自詡，願每次出品，必經悉心研究，延藥學專門人才，藉相當儀器設備，由生物實驗而臨床實驗，工作不厭其繁，標準務求其確，兢兢業業惟虞隕越之用心，固可昭告於各方者也。

慨自最近事變以後，海運斷絕，工業原料每感困難，製藥業自難例外。本廠鑒於非常時期，撙節物力，故生產方面，宜適應目前急需，凡屬次要藥品，或普通非特效成藥，咸在緩製之列，而化學製劑特效品，則努力加產，惟期精益求精。緣此準繩，最近出品，較前此略有參差。凡目前緩製各藥以及製而應用不廣常告缺貨者，一律暫緩推銷，於本版良藥彙集內，僅列名於目錄，不詳載於說明，另加符號，以示區別，存此一格，藉備他年取捨標準，倘蒙海內醫藥先進，督促進教，則幸甚矣。

中華民國三十三年九月三十日

信誼藥廠編輯部

交 易 簡 章

價目 本廠另印就價目表，函索即寄。表中價目，均係臨時核定，遇有漲落，照市增減，恕不預先通知。交易概用現款，裝箱須照本收價。外埠交易，請就近向各辦事處或代理處接洽，如不便則直接向上海總公司購買亦可。

轉運 凡貨物轉運，本廠均妥當包裝，輸出許可證，於可能範圍內代辦，但一經交付轉運公司，則本廠之責任已盡。如在途貨物有遺失損壞，及遇兵災盜劫等情，本廠概不負責。

退貨 如欲退貨，須預先通知本廠，並申明理由，如未經本廠許可者，一概不理。

貨幣兩交 本公司對於外埠交易，概用現款，於交貨地之總公司或各辦事處交付。凡遇關津稅款以及運費保險費等，均歸客戶自理。

第七版良藥彙集目錄

(以品名英文字母爲序)

品名	頁數
定滅勢	Acemidin 1
淋克惜	Acicrin 2
文拉夫惜	* Aciflavira
鈣淋克	Acrincal 3
命地	Admin 3
素腺上	Adrenalin 4
痢脫米	Amoetren 5
蒙德	Andromon 6
敷的	Antiflasal 7
啡嗎朴阿酸	* Apomorphin Mur
水餚蒸重菌	* Aqua Bi-destilata
喘抹氣	Asthmasal 8
霖天	Atilin 9
品託阿酸	Atropine Suif. 11
速熱	Bagsal & Bagsal "Strong" 11
淨可	Bencozin (Lotion & Ointment) 12
通	Beton 13
斯固西	* Bicicosa
命握西	Biciomin 13
汁菌痢	B.D.Phage 14
而撒莫司	Bismosal 15
淨雨	* Brosan
因啡	* Caffein
啡因	* Caffein Sodium Benzoat
啡因	* Caffein Sodium Salicylate
斯固深	Calcicose 16

溴	化	鈣	Calcium Bromide	17
鎂	化	鈣	Calcium Chloride	17
碘	化	鈣	Calcium Iodide	18
四	維	爾	Calsin ABCD Amp. & Tab.	18
鈣	爾	生	Calsin D Amp. & Tab.	20
樟	腦	油	Camphor oil	21
康	補	心	Camphorsen	21
果	百	雅	Capaya	21
開	提	心	Cardisin	22
克	滋	殺	* Chromersal	
西	他	新	Citasin	23
高	滋	丁	Corlutin	24
透	阿	蘇	Croosote Pure	24
苦	路	平	Curopin	25
疼	克	因	Deatcain	26
毛	地	素	Digitalin Pure	26
華	歐	諸	Dermacol	27
恩	匹	命	Embromin	27
靈	酸	素	Emetin Hydrochloride	28
靈	酸	素	Ephedrine Hydrochloride	29
麥	角	素	* Ergotine	
一	明	藥	* Eye-min (Eye drops)	
高	力	皇	Gallina & Solu-gallinan	30
長	命	新	Glucocal	32
純	淨	葡	Glucose	32
甲	維	葡	* Glucose A	
乙	維	葡	* Glucose B	
丙	維	葡	* Glucose C	
丁	維	葡	* Glucose D	
四	維	葡	Glucose ABCD	33

甘	油	磷	酸	鐵	* Glycerophosphate of Iron	
甘	油	磷	酸	鈉	* Glycerophosphate of Sodium	
刻		立		通	* Glyton	
戈		拿		殺	* Gonosal Solution & Tablets	
怪	阿	冠	砒	錫	* Guaiacol Cacodylate	
快		痢		福	Guanifa	34
好		力		生	Halisun & Halisun Strong	35
海		石		維	Hexavite	36
衰				汞	* Hydrarg. Cyanide	
砒	酸	鐵	士	的	* Iron Arsenite & Strychnine	
砒		矯		善	Iron Cacodylate	37
廢		可		立	Jecoromide	38
香		韻		鈣	Jodinal	39
香		妥		礪	Jotodin	39
藥		泰		平	* Lactobin	
蛋	黃	素	(來	* Lecithin	
力	弗	肝	及	新	Livex & Neo-livex	40
力		康		肝	Livex Compound	42
藥		培		林	* Lobeline	
癆		可		靈	* Lungcholin	
胃		痛		靈	Magnoxide	43
饑		散		爾	* Magsal	
鹽		酸		嗎	* Morphine Hydrochloride	
鹽		酸		嗎	* Morphine Hydrochloride & Atropine	
新		重		啡	Neo-Gluccol	43
新	聖	露		阿	Neo-Solu-Thiazon	44
奴	佛	克		託	Novocasal	45
奴	佛	克	賽	品	Novocasal & Adrenalin	46
婦		美		鈣	Omensal	46
婦		萬		龍	Ovaden & Ovaden Strong	46

婦	萬	靈	Ovarin	48
婦	萬多	年	Ovartonic	49
戈	拿	殺	* Gonosal	
百	哥	消	* Pepcosal	
模	脫	咳	* Pertucal	
安	樂	瀉	Phenalsal	49
肺		片	Phicon	50
凡	癆	可	* Philacosin	
拔	痔	根	Piles Cure	52
腦		藥	* Pituitary	
撲	垂	腺	Promadin Tab. & Amp.	52
變	滅	定	Quinine Bi-hydrochloride	53
鹽	鹽	奎	Quinine Bi-mur. Carbamid	54
奎	酸	甯	Quinine-Glucocal	54
奎	甯	新	Sinadin	55
息	熱	定	Sinabrin	56
息	瘧	靈	Sineco	57
信	甯	咳	Sinequin Tab. & Amp.	57
雪	瘧	奎	Siac Ointment	59
信	誼	藥	Sinestron	59
信	乃	通	Sine Thyroid Tab.	61
甲	狀	腺	Sine Vaccine	61
信	誼	疫	Cholera Vaccine	
霍	亂	疫	Cholera Vaccine ("Forte")	
霍	亂	疫	Cholera Vaccine ("Forte")	
痢	疾	疫	Dysentery Vaccine	
腦	膜	炎	Meningitis Vaccine	
噬	夫	萬	Typha-Vaccine	
傷	寒	霍	Typhoid-Cholera Combined Vaccine	
傷	寒	副	Typhoid-Paratyphoid-Cholera Vaccine	
傷	寒	副	Typho-Paratyphoid Vaccine	

信	誼	醇	母	* Sine Yeast	
性		痢	素	Sinlarsol	64
息		那	倫	Sinolen	64
足		可	淨	Socosin	65
銷	化	砒	基	Sodium Cacodylate	65
食		鹽	水	Sodium Chloride	67
礦		化	鈉	* Sodium Iodide	
柳		酸	鈉	Sodium Salicylate	67
滅	菌	樂	克	* Solution Lockes	
滅	菌	林	格	* Solution Ringer's	
賜		保	命	* Spermin	
賜	保	蛋	黃	* Spermin-Lecthin	
賜	保	多	年	* Spertonic	
司		得	命	Stamin	67
司		泰	靈	Starin	68
康	毗	箭	毒	* Strophantin	
士		的	甯	* Strychnine Arsen.	
硝	酸	士	的	* Strycanine Nitras	
硫	酸	士	的	* Strychnine Sulf.	
超	力	弗	肝	Supper-Livex	41
甘		油	栓	* Suppositoria Glycerine	
丟		病	速	Terpinsal	69
消	治	龍	及	Thiazon & Solu-Thiazon	69
消	治	龍	眼	Thiazon Eye Drops	71
消	治	龍	藥	Thiazon Ointment	71
消	治	龍	藥	Thiazon Soap	72
消	治	龍	牙	Thiazon Tooth Paste	72
多		年	可	Tonicol	73
託	靈	保	養	Transpulsal	75
烏	羅	透	賽	* Urotrosal	

萬	可	靜	Vecosin	75	
胃	天	定	Ventidin	76	
維	康	通	Vigoton	77	
甲	種	維	他	命	* Vitamin A
乙	種	維	他	命	* Vitamin B
丁	種	維	他	命	* Vitamin D
戊	種	維	他	命	* Vitamin E
維	他	新	Vitasin	77	
維	他	賜	保	命	Vita-spermin
維	他	多	勁		Vitastgin
食	母	生	Zyniasun	82	

楊 氏 良 藥

Preparations of Yang's Chemo-therapeutic Institute

新	借	花	散	Neo-sypharsin	y1							
腦	絡	借	花	滅	Neurosyhamide	y2						
肌	安	借	花	散	Thiosypharsan	y3						
消	發	滅	定	及	聖	露	消	發	滅	定	Sulfamidine & Solu-sulfamidine	y6

[附 啓] 凡上表所列各項藥品,有星號* 標明者,乃本廠原有出品,目下暫時缺貨,將來或再行製造,惟現在概不應市,尙希鑒諒爲荷。

中華民國三十三年九月十五日

信 誼 化 學 製 藥 廠 啓

過勢滅定 (ACEMLDIN)

對氨基醌酸磺醯胺製劑

【總說】「過勢滅定」乃本廠藥物研究所經多年研究後所得之球菌特效劑，本品為對氨基醌酸磺醯胺中之新製品，毒性甚微，即用至大劑量時，亦無不良作用。臨床實驗確切證明「過勢滅定」不但效力高強，且具耐受性。茲本品雖為醌酸複合劑，然其酸根作用，不在胺基而在磺醯胺，故毒性低而治效強，可稱兼美。凡淋病併發各症，皆能迅速治療，如淋性副睪丸炎，攝護腺炎，輸卵管炎及淋性關節炎等。此外，本品對於內外科各症之由球菌傳染而起者，無不具強大之效力。

本品為綜合化學製劑，分丸劑與針劑兩種。

【主治】泌尿科：急慢性淋症，淋性關節炎，攝護腺炎，膀胱炎，腎盂炎，副睪炎。

外科：壞疽，膿性發炎，盲腸炎，瘰，癬，丹毒，軟下疳，膿皰，紅斑性狼瘡，手術後傳染病，以及各種發炎症。

內科：猩紅熱，肺炎，心臟炎，流行性腦脊髓膜炎，流行性感冒等。

婦科：產褥熱，白帶，子宮內膜炎，乳頭炎，輸卵管炎，女性陰道炎等。

本品得用以治療眼耳鼻喉及牙科各症。據 Nagell, Vankermal, Korth 及 Bauer 等各大醫師之臨診報告，由淋菌或大腸菌而起之尿道病，用對氨基醌酸磺醯胺治愈者，約佔百分之八十至九十三例。

禁食辛辣油膩食物。

【用法及劑量】「過勢滅定」之使用，應照醫師囑付。

下列各症，易為病人所接受：

第一日服用四次，每次三粒。第二第三日服用四次，每次二

[1]

(商)

粒。第四第五日服用三次，每次二粒。

「退勢滅定」針劑，計分5%，10%及30%三種，無論肌肉或靜脈注射，皆無不良作用。本品毒性極低，故小孩孕婦及月經來潮時之婦女皆可使用。

【包裝】丸劑 每管二十粒，每粒0.5公分。針劑 5×2c.c.
5×5c.c.

愛惜克淋(ACICRIN)

【總說】本品之主藥為吡啶 Acridin 誘導體，其化學名為3.6-氨基-10 甲氫化吡啶 (3.6 Diamino-10 methylacridinium chloride)，係殺菌消毒劑之巨擘，以之製為黃色溶液，雖煮至120°C，亦不至分解變性。

本品除主成分外，尚含有葡萄糖奎寧及咖啡因。製成靜脈注射劑，裝入有色瓶中，絕無見光變色之虞。

【成分及功效】本品之主成分已如上述，其殺菌力至巨。稀釋至四十萬倍，已能殺滅新鮮活潑淋疾雙球菌，即一千萬倍之淡液，尚能限制淋菌之生活力。除淋菌以外一切細菌，幾盡奏殺滅之效。十萬倍之稀釋液，能殺滅大腸菌及其同類菌。二十萬倍之溶液，能殺滅黃金色葡萄狀球菌。百倍稀釋液對白喉桿菌有特殊消毒力，五十萬倍稀釋液，能撲殺痢菌及化膿性鍊球菌。

本品不但可用於淋病及其併發症，即對於其他急性傳染病，化膿性疾病，用之亦無不如響斯應也。

- 【主治】
- (1) 急性淋疾、慢性淋疾、淋性睪丸炎、淋性副睪炎、淋性關節炎、淋性尿道炎及其他淋疾併發症。
 - (2) 急性傳染病如傷寒、副傷寒、痢疾、腦膜炎……。
 - (3) 菌血症及敗血化膿性疾病。
 - (4) 腎盂炎、膀胱炎。
 - (5) 子宮內膜炎、頸管卡他。

【用法及劑量】 靜脈內注射，視病情輕重，用1%安甌(5c.c.或10c.c.)或2%安甌(5c.c.或10c.c.)不等，一日一次。

【包裝】 0.5% 5×5c.c. 25×5c.c.
0.5% 5×10c.c. 25×10c.c.
1.0% 5×5c.c. 25×5c.c.
1.0% 5×10c.c. 25×10c.c.
2.0% 5×5c.c. 25×5c.c.
2.0% 5×10c.c. 25×10c.c.

愛克淋鈣(ACRINCAL)

【總說】 吡啶 Acridin 誘導體 3,6 Diamino-10 methylacridinium chloride 之消毒作用，膾炙人口，加以鈣質及葡萄糖，製為注射劑，用於淋疾及其他傳染病，自奏殺菌、消毒、利尿及營養之效。故本廠除發行「愛惜克淋」，更製成「愛克淋鈣」。

【成分及效力】 本品為黃色素與鈣之合劑，含主藥25%，葡萄糖鈣(Calcium Gluconate)3.8% 以及適量之純淨葡萄糖，製成滅菌注射液，每十公撮中，含鈣0.0353公分，注入時全身略有溫感。厥效能透入深層組織而殺滅病菌(平時宜置於適溫不見光之處)。

【主治】 淋病、淋性睪丸炎及其他淋疾併發症、丹毒、肺炎、敗血性病、產褥熱、肺炎、化膿性炎症、猩紅熱、腦膜炎……

【用法及劑量】 靜脈內緩緩注射，間日或每日一次，最初每次用十公撮，可漸加至二十公撮。

【包裝】 5×10c.c. 5×20c.c.

愛地命(ADMIN.)

天然甲丁二種維他命溶解于中性油中之濃縮注射劑

【總說】 「愛地命」為天然甲丁二種維他命濃縮物，溶解於

中性胡麻油中，而作為注射之用。其特點如下：

(1) 在人體內立刻創造一種適量維他命之滯存。

(2) 避免濃厚甲丁二種維他命之腥臭，此乃多數人所難以忍受者。

(3) 全體臟器機能，得確實利用之。

(4) 醫師對於各期之治療，易於管理。

【主治】「愛地命」最主要之適應症為肺結核，軟骨質及懷孕。當患傳染病時及病愈後而缺少維他命及各種慢性疾病與病人不能耐受藥力而吸收之，及由普通方法攝取油狀維他命困難時，甚為適用，在骨折時，如與鈣燐療法，聯合用之，可使遲延之治療，賴以加速。

【用法】「愛地命」須作肌肉注射，並無疼痛，吸收極速，更無局部反應，注射器必須完全消毒，注射針須用粗而長者（約1吋）而深深注入于臀部外上方之缺陷部肌肉內，然後徐徐將本品壓入，注射畢後，按摩數分鐘，在寒季，「愛地命」須浸在熱水內，使油溶解，其溫度須與體溫相等，然後吸入而注射之。

「愛地命」每盒裝十安瓿，每安瓿半公撮，含甲種維他命二萬五千國際單位及丁種維他命二千五百國際單位，其治效較普通高級魚肝油高出數百倍，成人之適用為半公撮，每隔二日或三日注射一次，或遵醫師所指示，兒童用量，應按照其體重比例加以調整。


【包裝】 成人用，每盒十安瓿，每安瓿半公撮。

腎上腺素注射液及液劑(ADRENALIN)

【總說】 腎上腺素者，腎上腺之內分泌素也。腎上腺在吾人腎臟之上端，其內分泌液周流全身，能興奮心力，增高血壓，又能收縮血管。故以本品，內用於各種出血，既奏止血之效，又可恢復元氣，洵標本兼顧之劑也。急行收縮之枝氣管肌，亦得由本品而弛解，故於氣喘時用本品注射，厥功甚偉。以本品加入麻醉

液中，可控制局部流血，其麻醉力持久，故廣用於眼、耳、鼻、咽喉等科。

本品為無色透明之腎上腺素液，有注射劑及液劑二種。綜其功用為止血、增高血壓、強脈及平治氣喘。急救時最宜。其構造公式如下：



【主治】（內科）胃、腸、子宮出血、氣喘、傳染病時心臟衰弱、虛脫、妊婦嘔吐等。

（外科）局部出血、點於出血部、混於麻醉液中增加麻醉劑之效力、減少副作用、止血（眼、耳、鼻、咽喉各科）、眼結合膜充血、鼻衄、耳及咽喉出血等（點滴用）。

【用法】 皮下注射：用於心臟衰弱、氣喘、虛脫及消失結合膜充血等，靜脈注射：效力更大。吸入：用於氣喘及鼻炎。外用：滴於局部以止血及消退充血。

【劑量】 皮下注射：用一比一萬溶液，〇·一至一·〇公撮
 靜脈注射：用一比一萬溶液，〇·二至〇·五公撮
 ，和於生理食鹽水五公撮中。

內服：用一比一千溶液，每次10—30滴。

眼科：用一比一千溶液，點眼一滴。

【包裝】 注射液 1: 1000 10×1cc 12×1cc
 1: 10000 10×1cc 12×1cc
 液 劑 1: 1000 一兩瓶裝

阿米脫痢 (AMOETREN)

【總說】 痢疾以其病原之不同，分為菌性痢疾及阿米巴蟲性

痢疾二種，在一般的治療上所用藥劑，雖為共通的，但原因的治療則殊途，如菌性痢疾之注射痢疾血清及內服滅痢菌汁，蟲性痢疾之注射鹽酸吐根素等。本劑則供內服之用，有消毒防腐之確效，於各種痢疾有效，即一般由大腸菌感染或一般原因不明之傳染性腸病，用之亦克奏奇功也。本品於阿米巴性痢疾，尤有特效，設能與吐根素注射劑共用之，則為極美滿之療法。

「阿米脫痢」之主要成分，為碘化氧化喹啉磺酸鈉 (Iodo-hydroxy-Quinoline-Sulphonate-Sodium) 製為丸劑，供內服之用。每粒含主成分 0.25 gm.，相當於純碘 0.075 gm. 以其為有機的結合，故於胃腸之局部的刺激甚少，有之亦不過輕微泄瀉而已。

【主治】 主治各種痢疾，（尤以阿米巴性痢疾為最有效），又能預防之，此外大腸菌感染或原因不明之腸病，阿米巴痢後肝膿腫及腸潰瘍等，亦可用本品治之。

【用法及劑量】 急性病症每日三次，每次一至三粒或粉劑 0.25—0.75，食後內服，如是連服三四日後，可逐漸減少，至每日三次，每次一至二粒或粉劑 0.25—0.5，數日以後，再行遞減。慢性病症，宜連服一月，每日服二至三次，每次一至三粒或粉劑 0.25—0.75，食後服。上述係一般的用法，如由醫師規定特別用法時，應從醫師之命。小兒用量約為成人之半，嬰兒用量約為成人之八分之一至四分之一。預防用每星期內服二日，每日服二至三粒。

【包裝】 普通包裝，片劑有二十五粒裝及五十粒裝二種。醫院用包裝，每瓶一千粒。粉劑有十公分，二十五公分，及百公分三種。

恩德蒙 (ANDROMON)

最有功效之男性荷爾蒙製劑

【總說】 男性荷爾蒙，在生理上之主要機能，為促進性慾活力，與發展男性之各項特性。關係人生幸福及正常生活之維持，

殊非淺鮮。查人類及其他雄性動物荷爾蒙之分泌與繁殖，爲睪丸所專司。經多數科學家作長時期之觀察與研究後，發見下列各點：

(一) 睪丸官能不良或在血液內分泌荷爾蒙不足時，能妨礙生殖器正當活力與男性特性之發達。

(二) 動物睪丸內提出之精汁，對於人類生理上，極爲有益。其功效不僅能恢復正常性慾機能及特性，舉凡人體各項內臟，以及體力上，精神上一切虧耗，皆收調整與補益之效。

「恩德蒙」係由強健雄牛之睪丸精汁提煉而成之注射劑，又名「睪丸素」。該項注射劑，含有大量之男性荷爾蒙。分油溶液及水溶液兩種。所具荷爾蒙素，無分軒輊。兩種互用時，其功效較單用一種爲勝。本品曾經嚴格之消毒并照生物學標準上規定成分，即作長期使用，決無任何反應或不良之副作用。

「恩德蒙」注射液分下列兩種：

(甲) 每安瓿二公撮，含雄牛睪丸煉成之水溶液素0.10公分。

(乙) 每安瓿一公撮，含雄牛睪丸煉成之油溶液素0.05公分。

【主治】 神經衰弱，寒冷無力，發育遲緩，陽萎不舉，未老先衰，幼稚病，睪丸不降及其他男性生殖腺體上各項官能疾病。

【用法】 「恩德蒙」須作肌肉注射，每日一安瓿。水溶液及油溶液兩種須互用，例如今日注射水溶液則明日注射油溶液，依此類推。

【包裝】 每盒十支 (水溶液五支，每支二公撮)

(油溶液五支，每支一公撮)

安的敷消腫退炎膏 (ANTIFLASAL)

【總說】 本品由白陶土、硼酸、薄荷油、柳酸甲胺、麝香草酚及成形劑精密混合配成，幾經改良，爲最完美之國產貼布藥膏。

【形性】 本品爲灰白色黏軟膏劑，加適當之溫度塗貼之，效

力穩妥而無流弊，無刺激及副作用。

【功用】 本品塗布患部後，能使表層血管擴張，深部血管收縮，改善局部之循環，減輕疼痛，驅除充血，促進毒素之排泄，增加疾病之治愈轉，故對於一切炎症及充血（尤以肺炎）外科損傷等，有偉大之消炎、退腫、止痛、催進滲出液吸收等功用。

【主治】（1）流行性感冒、肺炎、肺炎卡他、肋膜炎、腹膜炎、枝氣管炎、心包炎、及其他胸腹部炎症、骨炎、骨膜炎等。本品作保溫貼布藥應用之，奏效甚速。

（2）傷風、神經痛、外科損傷、腰痛、齒痛、肩痛、肌肉痛、關節炎、中耳炎、腮腺炎、扁桃腺炎、咽喉卡他、乳腺炎、橫痃、睪丸炎、副睪炎、痔炎、膿腫、癰疽、濕疹、丹毒、麥粒腫、眼瞼炎、齒槽膿腫、齒根膜炎、智齒周圍炎、淋巴腺炎、湯火傷、凍瘡、日暈、（此三症不必加溫）及婦人月經困難（厚塗本品於下腹部，施以繃帶，至經流良好為止）等，均可應用。

【用法】 先宜加溫（但用於凍瘡湯火傷、日暈、盲腸炎等時則否），至攝氏五十度左右，熱至病人堪受程度時為適當；然後將加溫之本膏，勻塗於絨布或紗布（依患部範圍，先剪較大之塊，則貼時不致污染衣服），約一二分厚，再用脫脂棉、繃帶等妥為包紮固定，一晝夜祇須交換一次。

【包裝】 150公分 500公分 2500公分

壓氣抹喘注射液及片劑(ASTHMASAL)

【總說】 本品乃以國產之麻黃素、腎上腺素、腦垂體前葉素、賜保命四種精製混合而成。為強有力的機器製劑中之氣喘治療劑。

（甲）麻黃素 Ephedrine 由國產良藥麻黃中提製而成。具有興奮交感神經之作用，與下述之腎上腺素，功能相似，夫氣喘為一種交感神經異常之症狀，以本品治之。能將已收縮之枝氣管肌擴張，解除或頓挫其發作，兼能治咳。

(乙)腎上腺素 Adrenalin 爲止血強心之要劑，對於氣喘，亦有特殊效能。

(丙)腦垂體前葉素Hypophysin 具與禽生殖腺之效能，足使未成熟之生殖腺起成熟變化。

(丁)賜保命 Spermin 由睪丸十字形內分泌素精製而成，功能鼓舞調節內分泌機能，使身體上得生理的強壯愉快。

「壓氣抹喘」既如上述由四種成分精製而成，故與氣喘之病因，有極密切之關係。使之漸愈，以迄全治，其理由簡述如次。

(甲)內分泌之機能，本受交感神經系支配，今「壓氣抹喘」能直接作用於該神經系，故有調節與禽內分泌之機能。且使血液起變化作用，故新陳代謝得以旺盛，呼吸調整，而衰弱之心臟，亦因而強矣。

(乙)「壓氣抹喘」除能緩解枝氣管平滑肌之強直性痙攣外，並能同時作用於血管運動神經中樞，以消退枝氣管黏膜之腫脹，且因其有麻黃素與腎上腺素之協同作用，不僅一時的能使氣喘發作輕快，且其發作與繼發間之間隔，亦可漸次延長，以迄治愈。

(丙)「壓氣抹喘」除治氣喘確有特效外，兼可強心。

【主治】心臟性氣喘、枝氣管性氣喘、頑固咳嗽、各種呼吸困難與急性傳染病之心臟衰弱等。

【用法及用量】注射液專供皮下，間日一次，必要時每日一次，片劑一日三次，每次一片，祇供成人用，或依醫師之囑咐亦可。

【包裝】注射液每盒十支，每支二公撮，片劑每盒十或二十片。

一天霖(ATILLIN)

【總說】「一天霖」爲最優秀之「(對氮·苯磺酸胺)噻唑」製劑，其內容成分，在嚴密監督之下，用科學方法配製而成，吾人皆知「(對氮·苯磺酸胺)噻唑」，係最近發見之多價殺菌劑

，但在「一天霖」除含「(對氮·苯磺醯胺)噻唑」外，因其他更有確效藥物之加入，其殺菌力量，更為加強，且極易從小便排泄。「一天霖」之耐藥力極佳，服後不發惡心嘔吐，遠在其他純用「(對氮·苯磺醯胺)噻唑」及市上各種治淋成藥之上。

【主治】 急性，亞急性，慢性淋病·淋性副睪丸炎，淋性膀胱炎，淋性攝護腺炎，淋性尿道炎，淋性陰道炎，淋性子宮炎，淋性輸卵管炎等。

【用法】 (一)在強健之成人：「一天霖」十片於二十四小時內分服之。在治療開始時，內服五片，即每隔二小時服一片。至第二日，仍用同樣劑量，繼續服用，唯每隔三小時服一次。用此方法，以治男性急性淋病，其尿道管內之灼熱刺痛，在八小時內，迅速停止，其膿性小便，在十二小時後，大為減少，在二十小時後，變為澄清，因此男性淋病，僅需一日，病勢大為減輕。

(二)普通成人：可用下列劑量，即每日服五次，每隔三小時服一次，每次一片，連服二日。

(三)為求確實治療起見及為身體瘦弱及體重不足之成人：則下列服法，可以採用。

第一日服四片(每隔四小時服一片)。第二日服三片(每隔五小時服一片)。第三日服二片(早晚各服一片)。
。第四日服一片(在清晨內服)。

服用「一天霖」時，必須將藥片在口內嚼碎，以溫開水送下。水分須儘量多飲，每日至少四五大杯，愈多愈佳。關於本品之服用時間，飯前或飯後，均無關係。休息亦極重要。飲酒，運動及晏睡等，概須禁止。在服「一天霖」時，絕對不宜再服其他藥品。病者宜素食及少食鹽類。肉，魚，雞蛋及鹹味食品，必須儘量少食，俾服藥後，可見大效。

【禁忌】 對於金屬及砒素劑療法以及其他疾病，如惡性貧血，血友病，內臟重症，均禁用本品。

【包裝】 每管十片 每片含「(對氮·苯磺醯胺)噻唑」合劑)·九公分。

硫酸阿託品 (ATROPINE SULF.)

【功用】 用作皮下注射，有三種功用：

(1) 興奮心臟能 本品能刺激心臟，麻醉迷走神經，使緩慢之脈搏變為頻數，血壓昇進。

(2) 限制各腺分泌機能 本品有麻痺各腺分泌神經末梢之作用。減少汗液、涎液、膽汁、乳汁等分泌量。

(3) 鎮制各種平滑肌痙攣 本品有麻痺各腺臟器平滑肌運動之作用，其尤著者，為腸蠕動之被鎮制是。此外對於胃、脾、肺、氣管、枝氣管、子宮、膀胱等平滑肌皆顯呈作用。外用點眼，顯散瞳作用。

【主治】 注射本品以預防心臟麻痺，如嗎啡中毒時用之最宜。神經痛、盜汗、胃、腸、膀胱之痙攣性疼痛，膽石、疝痛、流涎、便秘、枝氣管炎、神經性氣喘等，均可用之。點眼用時，可作散瞳之各種適應。

【包裝】 10×1 cc. (0.001) 12×1cc. (0.001)

敗熱速及敗熱速濃

(BAGSAL and BAGSAL STRONG)

【總說】 本品為鹽酸奎甯 (Quinine Hydrochloride)、咖啡因 (Caffein) 及烏來糖 (Urethane) 之無色混合注射液，呈中性反應。其化學公式為 $C_{26}H_{34}N_2O_2 \cdot C_3H_{10}N_4 \cdot CHCl$ 。每一公撮中，含鹽酸奎甯 0.068 公分，咖啡因 0.0175 公分，烏來糖 0.0145 公分。每片內含量鹽酸奎甯 0.100 公分，非那宗 0.050 公分，咖啡因 0.025 公分。

本品之主藥奎甯，在治療上效用甚偉，且因咖啡因之強心，烏來糖之鎮靜，其效益彰，故以治各種瘧疾、流行性感胃、肺炎、扁桃腺炎、咽喉炎等急性高熱性疾患及痛風、神經痛、偏頭痛、婦科炎症性諸疾病，均奏卓效。此外如百日咳及他種兒可用

奎甯劑諸症，在醫者斟酌之下，用之皆有良效。

【用法及禁忌】 肌肉或靜脈內注射，成人每日一次，每次二公撮至五公撮，小兒減半。藥片每次一至三片。

本品中所含奎甯有催進陣痛作用，故對於妊娠末期患者，以不用為妥。

【注意】 遇有結晶析出時，須用溫水加熱，溶解透明後方可使用。

【包裝】 注射劑 10×1cc. 10×2cc. 50×2cc. 5×3cc.
5×5cc. 片劑 分一百粒及廿五粒二種

【附告】 另有「收熱速濃」每2cc含奎寧0.5及安替比靈（即非那宗）0.3，治效較強。

皮可淨(BENCOZIN)

【總說】 皮膚病雖為疥癬之疾，殊令人厭。苛痒也、濕潤也、分泌也、使人坐立難安，其妨及安眠也、引起傳染也、更有較大之危險焉，顧皮膚病種類頗多，但除特殊之數種外，一般治療法，皆以殺蟲（或絲狀菌）止痒，去污生新為原則，然市售藥品，類多空冒號召，本廠有鑒於此，乃以化學的方法用人工合成一種新結合體。為白色結晶。其熔融點為攝氏128°-128°.5有硫之效，無硫之臭，在水中不溶，在醇及木醃Aceton揮發油中，為可溶性。於是即以此可貴材料，製成「皮可淨油膏」及「皮可淨藥液」，效力相同。以治各種皮膚病，如響斯應，迥非普通輕重不宜之粗製品所可比擬，誠新藥界之新貢獻，早經專家證明有效矣。

【主治】 統治一切皮膚病，如急慢性濕疹、苔癬、金錢癬、花斑濕疹、白癬虱、香港足、陰囊濕疹（繡球風）、毛髮癬、濕疹、陰囊瘡、疥瘡、神經性皮炎、糜爛等。

【藥效】 止痒、殺蟲、去濕、生肌、生皮、除污。

【用法】 每日搽塗1—2次，皮破用油膏，未破用藥液。

【包裝】 油膏每罐分五公分，十五公分二種。

液劑每瓶二十五公撮，

鼻通傷風鼻炎特效劑(BETON)

【總說】 感冒傷風，往往引起鼻炎或鼻竇炎，極易流涕，非常難受，且日久不治，每易釀成咽炎，扁桃腺炎，枝氣管炎及肺炎等嚴重後果，故欲治傷風感冒，必須先治鼻炎，本廠最新出品「鼻通」，功能消散粘膜腫脹，減除鼻腔充血，專治鼻塞鼻炎，預防傷風感冒併發各症，極為有效。「鼻通」為麻黃素與消發噠啞混合劑，製成油膏，芳香適用。緣麻黃素為血管收縮劑，功能消炎退腫。對於鼻炎鼻竇炎，確具治效。消發噠啞為滅菌劑，對於多數傳染病菌，皆能殺滅。兩劑合併，效力之強，無與倫比。兼消炎殺菌之美，使傷風病程縮短，不致併發其他疾病。

【性狀】 本品為油膏，裝置於錫管內，管上有尖頭，以便插入鼻腔，有開竅殺菌止涕之功。

【主治】 本品奏效迅速，作用持久，凡鼻腔發炎各症，用之皆佳。由傷風而起之鼻炎鼻竇炎及乾草熱等，尤為有效。

【用法】 將錫管尖端插入鼻腔，然後掀膏管之一端於管口，徐徐擠出油膏，使停滯於鼻內，每日一二次，治愈為止。

【包裝】 每管裝十公分

皮西握命(BICLOMIN)

注射劑及片劑

【總說】 溯自愛克曼 (Eijkman 1897) 及喬克 (Casimir Funk 1911) 等諸氏發現維他命以來，方知吾人日常生活除必需之數種營養素以外，維他命實亦居重要地位，本廠茲將乙一維他命及丙種維他命兩者合成一種注射劑，名曰「皮西握命」，非惟功效增強，且可收相得益彰之妙。

本品每公分中含乙一維他命五百國際單位及丙種維他命（左旋阿斯奇皮克酸）(L-Ascorbic Acid) 五百國際單位。

「皮西握命濃」每安瓿二公分，內含乙一維他命暨丙種維他命各五千國際單位。

【主治】 脚氣（衝心型，浮腫型，神經性炎）水腫，麻疹，傷寒，赤痢，結核，食慾不振，肝臟疾患，壞血病，質勒飽羅氏病（Moller-Barlow's Disease），疲勞，及一般虛弱。

【用法】 皮下或肌肉內或靜脈內均可注射，成人每日一二次，可用至二公撮者二支，小兒依年齡酌減，一切均視症狀輕重而定。

【針劑】 5×1cc., 20×1cc. 每一公撮含 $\begin{matrix} 500 & B_1 \\ 500 & C \end{matrix}$

5×2cc., 20×2cc. 每二公撮含 $\begin{matrix} 1000 & B_1 \\ 1000 & C \end{matrix}$

「皮西握命濃」

3×1cc., 10×1cc. 每一公撮含 $\begin{matrix} 2500 & B_1 \\ 2500 & C \end{matrix}$

3×2cc., 10×2cc. 每二公撮含 $\begin{matrix} 5000 & B_1 \\ 5000 & C \end{matrix}$

【片劑】 分二十片及一百片二種，每片含 $\begin{matrix} 500 & B_1 \\ 500 & C \end{matrix}$

滅痢菌汁 (B. D. PHAGE)

抗菌痢之生物學製劑

【總說】 噬菌體為 Twort 及 d'Herelle 二氏所發現，具有過濾性及下述二特點，（一）能溶化特種細菌，（二）能於細菌被溶化時繁殖，其噬菌力繼續不輟，愈增愈大。

噬菌體遇特種細菌時，即能阻止該菌之繁殖及生存，於實驗室中如此，於人體內亦如此。

「滅痢菌汁」含有高價之噬菌體及二萬五千萬多價痢疾桿菌被噬化之液汁，菌體採自國內及東亞流行區，故國人應用於菌痢尤稱對症，其效果之佳，自非菌種各異之外貨所能望其項背。

服用「滅痢菌汁」愈早愈妙，凡遇類似菌痢病人，可不待檢驗之結果，逕服本藥，免失早期治療之機會。

【服量】 成人及二足歲以上兒童，每三小時服一安瓿，至病

愈爲止。

二足歲以下孩童，則以一安甌之菌汁，和入溫水三湯匙，每小時服一湯匙，至病愈爲止。灌腸新法：小兒菌痢用「滅痢菌汁」一百二十公撮灌腸，每日一二次，不必內服。（成人可以與口服並用，效力更大）。但用菌汁之前，先須用食鹽水灌腸一次。

【預防用法】在菌痢流行時，清晨空腹時服一安甌，每三日一次。

【用法】（一）用鋸刀鋸斷安甌之一端，另一端鋸一切痕，將安甌直豎於盛有溫水之玻璃杯上，再折斷其上端，菌汁即流入水中。（二）水之溫度，應與人體溫相等。（攝氏三十七度）。至多不可超過攝氏四十度。

【注意】（一）凡用本品治療菌痢時，不能與其他具有防腐殺菌性之化學藥品同時並用，免噬菌能力之消滅，而失治療之本意。（二）如安甌內容渾濁，切勿取用，可以免費掉換。

【包裝】（一）內服用 每盒分六支及十二支二種，每支三公撮。

灌腸用 每盒一支，每支一百二十公撮。

鉍司莫撒而 (BISMOSAL)

驅梅及治瘧良劑

【總說】驅梅舊法，主用汞鹽，但其殺滅螺旋菌之功效既屬可疑，且每易釀成不良後果，以致慢性中毒，自鉍劑問世後，醫界方面一致倡導，其治療價值與砒劑有輔車相依之功。

本廠出品「鉍司莫撒而」，係一種油製混懸劑，內含鉍鹽百分之十，混懸於純淨橄欖油中而成，經精密配合，嚴格消毒，故注射後絕無疼痛及副作用。

本品對於各期梅毒，以及一切梅毒併發症，無論有否砒禁忌之病人，無不相宜，凡無砒禁忌者，能與「新惜花散」及砒劑等並用，尤著功效，有砒禁忌者，可單獨注射本品。

【主治】（一）第一第二及第三期梅毒，腦脊髓梅毒，梅毒

性瘋癲，先天性梅毒，梅毒性口肛潰瘍以及梅毒性神經痛等，用之皆效。(二)本品得用以防止瘧原蟲活動，輔佐金雞納霜治瘧之不足，凡患頑固瘧疾者，如以本品與本廠「雙鹽酸奎寧」聯合注射，其功效相得益彰。

【用法及劑量】 本品在臀三角肌肉注射，注射前將安瓿浸入溫水中振盪之。每日一次，每次一管，連續注射一星期後，宜停止數日。

本品不可驟放沸水內，恐致爆裂。如見安瓿內含有粒屑，此係便於均勻振盪者，請勿誤會以為雜質或變壞。

【包裝】 每盒十支，每支二公撮。

瓶裝分四十公撮及一百公撮兩種。

鈣深固斯 (CALCICOSE)

葡萄糖鈣注射液

【總說】 葡萄糖因有營養、強心、利尿、解毒等之優良效果，故年來臨診家對於葡萄糖之應用，日見重要。近更有與鈣相混合，以應用於各種適應症者，此即「鈣深固斯注射液」之所由作也。

【成分】 本品共分五種。第一二兩種各含葡萄糖百分之十成(10%)、氯化鈣二成(2%)。第三四兩種各含葡萄糖百分之十成(10%)、氯化鈣百分之五成(5%)。第五種含葡萄糖百分之四十五成(45%)、氯化鈣百分之五成(5%)。專供靜脈注射之用。

【主治及功用】 葡萄糖有營養、強心、利尿、解毒等功，已如前述，而鈣則有止血、消炎、鎮痙，及抑制滲出液等作用。今以二者合而為一。主治肺癆、肺炎、肋膜炎、枝氣管炎、腺病性出血、胃出血、滲出性炎症、氣喘、敗血症、神經衰弱、由心臟或營養衰弱，新陳代謝障礙所起之中毒症，細菌及藥物之中毒，妊娠嘔吐、中毒性或神經性嘔吐。舉凡屬於鈣葡萄糖能治之症，

以本品代之，均奏卓效。較之二者分別單用者，功效尤著。

【用法及用量】 靜脈注射，每次用十或二十公撮，視病者情狀，斟酌採用第一、二、三、四、五種。連日或隔日一次行之。

【包裝】 第一種 每盒五支或十支，每支十公撮。（含純葡萄糖十成氫化鈣二成。）

第二種 每盒五支或十支，每支廿公撮。（含純葡萄糖十成氫化鈣二成。）

第三種 每盒五支，每支十公撮。（含純葡萄糖十成氫化鈣五成。）

第四種 每盒五支，每支廿公撮。（含純葡萄糖十成氫化鈣五成。）

第五種 每盒五支，每支十公撮。（含葡萄糖四十五成氫化鈣五成。）

溴化鈣注射液(CALCIUM BROMIDE)

【總說】 溴劑之功用，為吾人所素知，然與鈣合用之，則其效更隆，專治神經衰弱，腦力耗等症。此外對於蕁麻疹，凍瘡及一切瘡癬皮膚病之癢感難受者，尤有奇效。本品含溴百分之二十至百分之三十，係用科學方法製成，毫無溴鹽之副作用。

本品主治神經受傷，神經衰弱，煩燥怔忡，顫癇病，痙攣病，各種癢性皮膚病，兼為戒煙戒酒時之最佳補助品。

【用法】 靜脈內注射，每日一次，每次五公撮或十公撮，連續應用時，隔日注射一次。

【包裝】 2% 5×5c.c. 2% 5×10c.c.
3% 5×5c.c. 3% 5×10c.c.
10% 5×5c.c. 10% 5×10c.c.

氫化鈣注射液(CALCIUM CHLORIDE)

【總說】 本液係用精純之氫化鈣，經嚴密消毒手續，溶解於

重蒸餾水中，爲無色透明液，供注射之用。

【功用】 凡患血毒症、肺炎、痙攣性諸症，以及一切循環障礙，一經本液治療後，即能霍然全愈。此外更能止血、消炎、制止氣喘、促進瘢痕組織之生成、減少滲出物及增加骨部之鈣質。

【主治】 蕁麻疹、痙攣病、氣喘病、血毒症、水腫病、漿液性肋膜炎、肺結核盜汗、皮膚病、骨質軟化症等。

【用法及用量】 靜脈注射，每日或間日一次，先用淡者，後用濃者。

【包裝】 5×20cc. (1%, 2%, 3%, 4%, 5%)

5×10cc. (1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%)

5×5cc. (10%)

碘化鈣注射液(CALCIUM IODIDE)

【總說】 本藥液乃由本廠悉心研究後始調製而成者，原料之採取，亦異常注意。醫治上之功用甚廣，如肺癆等各種癆症、氣喘、肺氣腫、肺膿腫、慢性枝氣管炎、妊娠惡阻、動脈硬化症、佝僂病、腺病質、萎黃病、梅毒、風濕等。

【用法】 以靜脈注射爲最宜。

【用量】 有1%、2%、3%、4%及5%五種，隨宜酌用，每隔日或三日注射一次，間亦可供皮下注射，但皮下用者，不宜太濃。

【包裝】 5×3c.c. (1%, 2%, 3%, 4%, 5%)

5×10c.c. (1%, 2%, 3%, 4%, 5%)

四維鈣爾生注射液及片劑

(CALSUN ABCD)

膠性鈣與甲乙丙丁維他命合劑

【總說】 「四維鈣爾生」，爲膠性鈣與甲乙丙丁四種維他命混合製劑。在人體內，鈣質能強健骨幹齒牙，更有緩和神經興奮

，促進新陳代謝，加強抵抗力及增進血液凝固力之功效。

維他命甲之效力在補助吾人體力，藉以抵抗普通傳染疾病之侵襲。人生在幼稚時及發育期間，極宜服用適量之維他命甲，否則此時如感缺乏，其後終身莫補。

維他命乙之治療價值，在糾正及防止由於飲食方面所引起之食慾缺乏。

維他命丙為氧化及還原劑，對於人體細胞氧化還原作用，極為需要。該項維他命如感缺乏，人體即易發生病理變化，如壞血性病人所患之瘀斑及出血斑，即為維他命丙缺乏所致。

維他命丁有調節人體內鈣磷二質之功用，尤能預防或治療佝僂病，癆瘵素質，小兒骨質軟化及其他畸形疾病。

「四維鈣爾生注射液」，內含甲乙丙丁四種維他命，製為注射之用。每一公撮含膠性鈣0.5公絲，維他命甲五千國際單位，維他命乙一千國際單位，及維他命丙五百國際單位，維他命丁二千五百國際單位。本溶液應用作皮下或肌肉注射劑。

【主治】（一）各種慢性消耗疾病，如結核病，貧血，傷寒，關節炎，癩癩及其他營養不足各症。

（二）病人飲食受有限制，或需特種飲食時，如患潰瘍，酮原性食餌，或患糖尿病，肥胖，嗜酒性多發性神經炎及慢性胃腸失調等症。

（三）營養不良之兒童及成人。

（四）在復康期內之病人。

（五）懷孕及哺乳之婦女。

（六）手術後毛細管出血，停經後子宮流血及其他子宮出血

（七）血管舒縮異常如急慢性蕁麻疹，神經病性浮腫及凍瘡等。

（八）皮膚病，如溼疹頑癬等。

【應用】每次注射一公撮，可每日注射或隔日注射，或每週注射二次，視需要而定。

【包裝】每盒六安瓿 每安瓿一公撮

每盒五十安瓿 每安瓿一公撮
每瓶十公撮及三十公撮（瓶口用消毒膠質帽，清潔
簡便）

【附告】 另有片劑，每盒五十片，成人每服二至三片，每日
數次，兒童減半，或照醫師囑咐。

鈣爾生丁注射液及片劑(CALSUN D)

膠性鈣與丁種維他命合劑

【總說】 「鈣爾生丁注射液」為膠性鈣與丁種維他命合劑，
在人體內鈣質對於骨骼髓幹齒牙，担任重要工作，更有和緩神經
興奮，充進新陳代謝，加強身體抵抗力，及增進血液凝固力之功
效。

丁種維他命管理人體內鈣磷二質之利用，尤能預防或治療軟
骨病，痙攣素質，小兒痙攣，骨軟化症及其他骨畸形症，但同時
須有適量鈣磷二質之攝取，方顯著效。鈣鹽及丁種維他命，在嬰
兒期，兒童期，懷孕期及哺乳期，其需要更大。

丁種維他命在臨床上證明，對於維持正常齒質及骨組織，甚
為重要，故為健康齒牙所最需要之物質。

【主治】（一）肺結核症：一對於肺結核肺門淋巴腺結核及其
他結核症，在正當治療上，大有輔助之價值。（二）毛細管出血，
對於手術後，毛細管出血之預防及治療，月經停止後之出血與子
宮出血。（三）對於血管舒縮之異常，如急性及慢性蕁麻疹神經病
性浮腫及凍瘡，均能限日全愈。（四）皮膚病如濕疹，頑癬等。

【應用】 應用前，將注射液妥為搖勻，每針一公撮或二公撮
，可每日或隔日或隔數日注射一次，依其需要而定。

【包裝】 每盒六支裝，每支一公撮。

每盒五十支裝，每支一公撮。

每瓶十公撮及三十公撮（係用消毒膠質蓋瓶裝，吸
收注射液，甚為簡便）

【附告】 另有片劑，每盒五十片，成人每服二至三片，每日三次，兒童減半，或照醫師囑咐。

樟腦油及康補心(CAMPHORSEN)

【總說】 樟腦為強心要藥，普通製為油劑，本廠更經多時研究，成水溶劑「康補心」，不獨效力迅速，注射時更感便捷。注射本廠樟腦油或「康補心」，能使心搏正常，血循環增盛，呼吸暢快。故以治咳喘虛脫及麻醉中毒甚效。

【主治】 凡因傳染病性熱病如肺炎、腸病、心臟病、心衰弱，及各種中毒性虛脫，使用本品，效速如神。

【劑量】 共分四種；10%樟腦油，20%樟腦油、0.5%康補心、2%康補心、10%康補心。

【用法】 樟腦油，深部皮下或肌肉注射，每次一至二公撮，可反覆注射之。「康補心」皮下(2%)或靜脈內(0.5%)注射，每次二公撮，急要時可反覆注射。

【包裝】 (油) 10×1c.c. (10%,20%)

12×1c.c. (10%,20%)

(液) 10×2c.c. 50×2c.c. (0.5%)

10×2c.c. 50×2c.c. (2.0%)

20×1c.c. (10%)

果百雅(CAPAYA)

最有價值之植物性消化劑

【總說】 「果百雅」為本廠最新製成之酵酶液劑，內含番瓜酶及澱粉酶。性質穩固，芬芳適口，能於短時期內，將胃腸中之蛋白質及澱粉，完全消化，因其含分解蛋白酶及分解澱粉酶極為豐富也。此外，本品之特點，為除上述酵酶外，并加入適量之(乙一)維他命，藉以促進食慾，使成為理想的消化劑。每百公撮之「果百雅」所含各藥如下：

酵素合劑	5.000	公分
維他命(乙一)	0.006	公分
芳香油	0.125	公撮
(甘油及芳香性醃劑)		適量

每一茶匙之「果百雅」(4cc.)，能將10—15公分之乾澱粉轉化成糖，並能消化6公分之蛋白質。

本品含有芳香油及甘油，味甘合胃，故能助消化而促食慾。

【主治】 本品治療各項胃腸失調，極為有效，例如消化不良，因鹽酸缺乏而起之胃發酵，飲食過度所致之胃腸不適及其他胃腸疾患。

【劑量及服法】 成人每日三次，每次二茶匙至四茶匙，開水沖服。

小兒及嬰孩，每日三次，每次一至二茶匙。

本品可於飯時或飯後服之。醫師處方，應請注意，勿與稀釋鹽酸同列方內，因其性質相忌也。同時，本品甘芳異常，極為適口，用作賦形藥品，無不合宜。

【包裝】 瓶裝六兩及十二兩兩種

開提心(CARDISIN)

【總說】 樟腦之強心興奮作用，膾炙人口，無煩贅述。致樟腦之所以有此作用者，為其能迅速刺激心臟，使擴大之血管歸於收縮，俾一時能將多量之血輸入於心。故在一切中毒及他種原因而心臟癱時，注射樟腦劑後，即可使其恢復原狀。本廠除原有康補心(Comphorsen)外，更製成新劑一種，名之曰「開提心」，其功效勝於普通樟腦製劑。

本品為10% Pentamethylene tetrazol 之滅菌液，分注射用及內服用二種。其特點為吸收迅速，並不發生任何局部刺激作用，對於呼吸中樞，亦具興奮性，使肺胞氣體交換暢達，此外又無蓄積作用及任何副作用。本品每一公撮中，含主藥0.1公分。

【主治】 急性心衰弱，心麻痺，呼吸停止，呼吸困難，吸吸，促迫，各種傳染病初期，各種中毒，窒息，尿毒症，各種虛脫，失神，手術前預防虛脫……。

【用法及劑量】 (1) 內服液一日三至四次，每次一公撮，小兒酌減，並可伍入處方中。

(2) 注射液每次注入一公撮，皮下及靜脈內注射均可，每隔兩三小時，可反覆行之（小兒酌減）。

【包裝】 內服液 10c.c. 注射液 5×1.1c.c.

西他新(CITASIN)

丙種維他命注射液及片劑

【總說】 丙種維他命對於人體之營養及發育與某種疾病之預防，甚為重要，缺乏丙種維他命，則發生壞血病，賀勒飽羅氏病，顯著之貧血，齒齦之軟化及出血，皮膚及黏膜下之出血，故嬰兒飼養之不當，均為缺乏本品所致。「西他新」對於丙種維他命缺乏而致之各種疾病，既可用之預防，又可用於治療。

「西他新片」 每片含丙種維他命二·五公絲或丙種維他命五百國際單位

每安甌一公撮 二·五%溶液 = 二五公絲 = 五百國際單位

每安甌一公撮 五%溶液 = 五十公絲 = 一千國際單位

每安甌二公撮 五%溶液 = 一百公絲 = 二千國際單位

每安甌五公撮 十%溶液 = 五百公絲 = 一萬國際單位

【主治】 壞血病，賀勒飽羅氏病，各種出血，中毒症，熱性傳染病，齒齦出血，高血壓，流產之預防，鼻出血，營養不良及發育障礙等。

【用法】 皮下，肌肉或靜脈注射，按照病情，每日注射一次或二次。內服片劑，作為預防用最佳，劑量：每日三四次，每次一二片。

【包裝】 片劑 二十片 百片

注射劑	5×1cc	500I.U.	10×1cc	500I.U.
	5×1cc	1000I.U.	10×1cc	1000I.U.
	5×2cc	2000I.U.	10×2cc	2000I.U.
	5×5cc	5000I.U.	3×5cc	10000I.U.

高濾丁 (CORLUTIN)

婦科良藥中之黃體製劑

【總說】「高濾丁」為黃體製劑，計分針劑片劑兩種。針劑係由黃體液汁提煉而成，片劑則由焙乾妊娠性豕之黃體製成。

黃體之生理上機能，與婦女月經及妊娠發生密切關係。如果卵子成熟，則黃體機能繼續存在，功能安胎保孕，反之，卵子發生壞變而月經隨即來潮矣。

查黃體功效，在其自身分泌之荷爾蒙名曰 (Progesterone)，通常未妊婦女如缺此種荷爾蒙時，即致各項月經疾病，例如痛經及月經多等。此在懷孕婦女，一感缺乏，則致流產。

本廠最新出品之婦科良藥「高濾丁」，為一種最名貴之黃體製劑，功能調治痛經，月經過多及由於內分泌失調而引起之流產。歷經生物實驗，臨診研究，證明效力準確，極為可靠。此外如劇性妊娠性惡心嘔吐，用之亦效。

【主治】痛經，月經過多，習慣性流產，惡性妊娠性嘔吐，不育及因黃體活力不足而引起之各種月經疾病。

【用法及劑量】(甲)「高濾丁」針劑 每一公撮內含有 2 公分新鮮黃體之液汁，每日或間日作肌肉注射一針。

(乙)「高濾丁」片劑 每片含焙乾黃體腺 0.15 公分，等於一公分之新鮮腺體，每日二次或三次，每次一片至二片，飯前服之。

【包裝】針劑 每盒六支，每支一公撮。

片劑 每片 0.15 公分，每瓶五十片。

幾阿蘇注射液 (CREOSOTÉ PURE)

【總說】本品乃治癆良劑，久著盛名，專治一切消耗病，衰

弱、久咳、肺癆、腸癆及各種癆症。

【形狀及性質】 幾阿蘇乃黃色微香並無惡味之溶液，不溶於水、溶於酒精及油類。

【功用】 本劑能殺菌，注入身體之後，多分由呼吸道排泄而出，故又為清肺祛痰之良藥，若遇晚期之肺病，則其功力較遜，然本品尚有一特殊優點，凡用後必能祛痰健胃，增進食慾，興奮精神，故無論其病為二期或三期，一經使用此藥，皆能減輕疾患，不至再行蔓延，若初期肺癆及久咳虛損者，用後即能無上述各病之發生。

【主治】 傷風咳嗽，久咳不止，肺癆，腸癆，虛弱，肺炎，肺氣管炎，枝氣管炎，小兒癆瘵，潮熱咯血，咳嗽多痰及腺病瘦弱等。

【用法及劑量】 皮下注射，每日一次，或隔日一次，每次一公撮，注射次數可依症狀而定，無副作用，注射部亦無疼痛硬結等弊。

【包裝】 10×1cc (10%)

苦路平(CUROPIN)

【總說】 甘油磷酸之鹽類，能催起人體內蛋黃素(Lecithin)之生成，「苦路平」中，以甘油磷酸鈉為主要成分，於注射後能使體內產生大量之血小板，此外尚含有營養，補血及鎮靜各劑，故合用於戒烟，如再輔以遞減法及注射維他賜保命及賜保蛋黃素等，則迅速戒絕，可操左券。

【成分】 本品為無菌黃色透明液，每支二十公撮，其中含有葡萄糖4.0，甘油磷酸鈉0.15，Sodium monomethylarsenate 0.03，可溶性巴比特魯(Soluble Barbitalum) 0.1。

【主治】 戒烟、戒毒、癲癇。

【用法】 靜脈內注射。(1)用於戒烟：先行健康檢查，如有疾病者，先行治療之，然後開始戒烟。或在戒烟中併用其他治

療法。用本品戒烟，癮大者每日用二支，癮小者每日用一支，保無禁斷現象，同時用遞減法，亦可迅速遞減，縮短戒絕時間，再按照信誼良藥分類中之戒烟各藥擇宜兼用，收效更宏。

(2) 癲癇：每日或隔日一次，但連用十日後，應休止十日。

【包裝】 5×20c.c. 50×20c.c.

【注意】 寒冷內容有結晶析出，可連玻璃管放入溫水內，這時即可溶化。

疼克因 (DENTCAIN)

【成分】 「疼克因」為牙科用局部麻醉劑，每公撮中，含有鹽酸普魯卡因 (Procain hydrochloride) 〇・〇二，氯化鈉 (Sod. chloride) 〇・〇〇五，硫酸鉀 (Pot. sulphate) 〇・〇〇四，氯化鈣 (Calcium chloride) 〇・〇〇一。其麻醉作用，速迅持久，絕無副作用，且奏止血之效。

【適應】 齒科及小手術麻醉用。

【用法及劑量】 專供注射，每次用一公撮，至多可用至十公撮。

【包裝】 10×1cc. 50×2cc.

洋地黃素注射液 (DIGITALIN PURÆ)

【總說】 「洋地黃素」為洋地黃葉中提出之有效成份，功能亢進血壓，緩慢脈搏，利尿。故凡各種心臟病如瓣膜狹窄，瓣膜閉鎖不全、心肌脂肪變性、心臟過勞、心包炎等，及由種種原因，肺受壓迫致成肺氣腫而心臟衰弱者，慢性腎臟病，如萎縮腎等致成全體水腫而心臟衰弱者，若用本品，則頻數不整之心搏，漸緩慢整調。此外更能奏奇效者，莫如將本品用於肺炎症，蓋功能盛旺肺循環，可除去肺部充血及炎症之故。

【主治】 本品由純淨洋地黃素結晶提製，每公撮含有有效成分 0.001。主治：心包炎、心內膜炎、心臟瓣膜狹窄及閉鎖不全、肺

氣腫，急性肺炎，枝氣管炎，慢性心病，慢性腎病，心臟合併症，或併發之心悸亢進等。

【用法及用量】 皮下注射，每次一公撮，視病情需要，可反覆注射，或與樟腦水溶液交互注射之。

【包裝】 10 1c.c. (0.001) 12 × 1c.c. (0.001)

導默諾(DORMANOL)

鎮痛，安眠，治羊癇特效劑

【總說】 最近二十年來，“肥羅那”一藥，已被醫界公認爲鎮痛安眠良劑，用以治療羊癇一症，尤著功效。

本廠最新出品「導默諾」，係將著名安眠藥“肥羅那”中之二烷曼，易爲石炭酸而成。其效能遠勝“肥羅那”，而其毒性則較低。

「導默諾」功能鎮痛止癇，并滅除羊癇病各種症狀。絕無不良反應或副作用，久用不成習慣，對於心臟，並無妨害。

用本品以治療羊癇病，其功效較任何溴劑爲可靠，而無溴劑之缺點。

本品製成一公撮注射液，專供皮下及肌肉注射之用，注射次數之多寡，應由醫師決定之。

【主治】 羊癇瘋，失眠，頭痛，神經痛，妊娠嘔吐，及嬰孩驚風等症，莫不奏效。

【劑量】 每日作皮下注射20%溶液一公撮，或10%溶液一公撮者二支，持續七日至十日。此後應即停止若干日，方可繼續注射，以防蓄積作用，發生流弊。

【包裝】 10 × 1cc. (分10%及20%兩種)。

恩胚命(EMBROMIN)

最新特種胚胎荷爾蒙製劑

「恩胚命」 Embromin 乃王汝嘉醫師經十餘年之苦心研究，

耗無限之精神，化無量之代價，而製造成功，對於癌腫，有特殊確著之效力，實為中國首創，開世界癌病治療之新紀錄，在近代治癌史之開展上，增其燦爛之一頁焉。

本品乃最新特種之胚胎荷爾蒙製劑，由制止發育之胚胎中取出，為高級類脂酸蛋白結合體，對熱、酸之抵抗力極強，長期貯藏，效力不變。

【功用】 1.關於診斷者 本劑能結合癌腫之毒素，而產生沉澱素，此種沉澱素之檢出，得用於癌病之早期診斷，病症之有癌腫可疑者，反復注射本劑十五至二十五公撮，抽血五公撮，取出之血清，用遠心沉澱器沉澱後，加等量之本劑，顯混濁而起沉澱反應者，即得診斷為癌腫。（健康者及其他病者注射後不顯此反應）

2.關於預防者 本劑能萎縮卵子染色體，亦能萎縮項塞曼氏染色體，故得預防癌前期疾患（Precancer）之發生。

3.關於治療者 本劑能溶解癌腫之發育，而收治愈之效。故初期癌腫之使用本劑持久注射，則能溶解消滅。初期糜爛，因本劑之溶解作用，漸漸潔淨，潰瘍癒合。在末期，全身衰弱，惡液質疼痛者，其衰弱之消除，體力之恢復，儘先儘速，其次惡液質消滅，而疼痛亦隨之減退，以趨治愈。

4.關於合併治療者（在治療時與X光或鐳錠並用，則效力更屬偉大迅速，而X光及鐳錠之反應變為減低）

由上述數項觀之，足徵本劑之於癌病，實能兼收診斷，預防及治療三大功用，為癌腫治療最完美，最有效之聖品。

【用法及用量】 「恩胚命」每日一公撮，注射於皮下或臀肌肉，視病症之輕重，得漸漸的增其用量。本劑之注射，並無不良之副作用，皮下注射，稍有疼痛及潮紅腫脹，然不久即行消散。

【禁忌】 「恩胚命」之使用，對於青年婦女，在月經期注射，促使一年之不妊，尚無關重要，若在產褥期注射，則成嚴重之不妊症，即十至十五公撮之小量，適足以促致不妊症，是宜切實注意。

【包裝】 每盒十安瓿，每安瓿一公撮，另有五公撮瓶裝一種。

鹽酸吐根素注射液 (EMETINE HYDROCHLORIDE)

【總說】 「鹽酸吐根素」者，乃吐根中之植物質鹼類，用於人類與能嘔吐之動物，則發嘔吐效力，與阿朴嗎啡相類，吐根中更含西麥林 Cephaelin，然本品製造時，乃用純粹之吐根素，絕對無此物之混合，故於治療上效力一致而正確，「鹽酸吐根素」於臨證上且為赤痢特效藥，其有效之理由，因其能殺寄生於腸之偽足蟲 Amoeba (即阿米巴赤痢原蟲) 也。

【主治】 本品為吐根中之主要植物質鹼製成白色之溶液，能撲滅痢疾偽足蟲，因其殺蟲之力非常強大，故雖稀薄至萬倍溶液，尚不失其效力。

【用法及劑量】 皮下，肌肉及靜脈內注射均可，每日注射一次，每次一至二公撮，視症狀之輕重，定注射液之濃淡。

【包裝】 (甲) 〇・〇一公分，每盒五、十、或十二支，每支一公撮。(乙) 〇・〇二公分，每盒五、十、或十二支，每支一公撮。(丙) 〇・〇三公分，每盒五、十、或十二支，每支一公撮。(丁) 〇・〇四公分，每盒五、十、或十二支，每支一公撮。(戊) 〇・〇五公分，每盒五、十、或十二支，每支一公撮。(己) 〇・〇六公分，每盒五、十、或十二支，每支一公撮。

鹽酸麻黃素注射液及片劑 (EPHEDRINE HYDROCH.)

【總說】 本品乃自著名國產良藥麻黃中提製而成。吾國舊醫，每用麻黃為發汗治咳之劑。前年陳克恢博士闡明本品之化學的性狀成分後，知本品具有興奮交感神經之作用，與腎上腺素之功用相似，而效力較勝。杏頑固難治之氣喘，實為一種交感神經

異常之症狀，若以本品治之，因而擴張枝氣管收縮肌，可解除或頓挫其發作。腎上腺素雖亦能治氣喘，然其效力不能持久。本品則有持久性，尤為平喘之良藥也。又因其擴張枝氣管收縮肌之作用，故亦可用於百日咳，能縮短其痙攣發作期，且減輕其症狀，此時如兼用顛茄及其他祛痰劑尤佳。

【成分及性狀】 按麻黃內含左旋光性與右旋光假性麻黃素及其他之副質鹼等，生理上效力，以左旋性者最為準確。本廠所製之「鹽酸麻黃素」，不含有右旋假性及其他之副質鹼，乃為純粹之左旋性質鹼，為無色透明已經消毒之溶液，其化學方式為 $C_6H_5CHOH-CH-CH_3NH_3CH_3-HCL$ ，呈中性反應，注射液注射時毫無痛苦。

【主治及適應症】 枝氣管氣喘，由枯草熱而起之氣喘，氣喘，嗎啡中毒，莨菪中毒，流行性感冒，肺炎，異物過敏性感覺症，血清病，蕁麻疹，濕疹，疥癬，各種皮膚病及疫痢，傷寒，痛經，妊婦嘔吐等症。

【用法】 皮下及肌肉注射均可，每次一至二管，初次注射時如無反應，（如心跳，手顫，眩暈，惡心等，此等反應殊為僅有之象，即使遇較強之反應，如即停止注射，移時亦即消失，並不為害，要為箇人之特異質，實非流弊或副作用也。）以後可漸加注射次數及劑量，片劑每日三次，每次一片，祇供成人用。

【包裝】 注射劑，每盒五支，每支一公撮。

片劑，每管分十片，二十片及六十片三種。

高力皇及聖露高力皇二「對氨·苯磺醯胺」吡啶 (GALLINAN and SOLU-GALLINAN)

【總說】 「高力皇」之化學構造，與「消發吡啶」Sulfapyridine 相同，此種「對氨·苯磺醯胺」之「吡啶」衍化物，因吡啶類之存在，故對於肺炎球菌，及淋球菌有顯著之殺菌作用。

【主治】 「高力皇」，是一種多價殺菌劑，其最重要之適應

症，爲急性及慢性淋病，淋性結合膜炎，腦膜炎，肺炎，肺臟充血，氣管支性肺炎，化膿性肋膜炎，尿道炎，子宮炎，輸卵管炎，關節炎，癰，疽，瘡，癤，丹毒，脾脫疽，及各種淋菌性，肺炎菌性，連鎖菌性，腦膜炎菌性，及葡萄球菌性等疾患。

【劑量】 因症狀之複雜，「高力皇」之用量，必須按照病情，加以調整，故每一病人，應服從醫師之勸告。通常治療，都用遞減法，即在治療開始數日，應用較大劑量，而此後數日，則徐徐遞減，茲舉例於左。

【服法】 成人：第一日及第二日，每日三次，每次二片（共服六片）（三·〇公分），第三日及第四日，每日二次，每次二片（共服四片）（二·〇公分），第五日及第六日，每日二次，每次一片（共服二片）（一·〇公分），第六日以後，每日一次，每次一片（共服一片）（〇·五公分）。

兒童：照成人劑量服二分之一。

嬰孩：照成人劑量服四分之一。

「高力皇」片，或直接用溫開水送下，或在口腔內嚼碎後，用溫開水送下，對於兒童，可將藥片挫碎，和以菓子漿，或和以糖水服用均可。

「高力皇」，在飯前或飯後，均可服用。

「聖露高力皇」，係肌肉注射劑，成人每日注射一安瓿或二安瓿（每安瓿三公撮），兒童則按照其年齡遞減。

【禁忌】 服「高力皇」時，除醫師另有指定外，勿與其他藥同服，本品對於重篤貧血，血友病，及重症內臟疾患，以及金屬及砒劑治療時，均禁用。

如服用「高力皇」，在十日以上，則對於該病人，應作血液檢驗，以計算血球及其百分比，及檢驗小便。

【包裝】 片劑「高力皇」，每片重〇·五公分，每管二十片，每瓶一百片。

注射劑「聖露高力皇」，每公撮含〇·三三公分。

每安瓿一·五公撮，分五支裝及二十五支裝。（每安瓿等於

○·五公分「高力皇」)。

每安甌三公撮，分五支裝及二十五支裝。(每安甌等於一○公分「高力皇」)。

長命新鈣 (GLUCOCAL)

注射液，粉劑，片劑

【總說】 葡萄糖有營養、強心、解毒諸功，鈣有止血、消炎、鎮痙、治癆及抑制滲出液等效。鈣與葡萄糖混合注射液，為治療肺癆、神經衰弱及敗血症等不可缺乏之藥劑。惜一般葡萄糖鈣劑。祇可供靜脈內注射，若行皮下或肌肉注射時，則局部紅腫熱痛；故凡脈管細小之婦女及小兒與不能行靜脈內注射之患者，難於應用。曠是，對於人身安全無害及無須行靜脈內注射之鈣劑，久為醫家所渴望。今本廠經多時之研究，將葡萄糖之氧化物與有機性之鈣劑，用化學方法化合而成，定名為「長命新鈣」。注射液含葡萄糖鈣10%，可供肌肉注射，經多次之實驗，奏效卓著，且注射後無硬結及其他副作用。另有粉劑及片劑，以便病家之內服。

【成分及性狀】 本品為葡萄糖之氧化物(13%)與有機性鈣劑化合而成，溶於水而不溶於酒精及醚。

【主治】 肺結核、肺炎、肋膜炎、腹膜炎、腺病、佝僂病、肺出血、胃出血、膀胱出血、炎症及滲出性疾患、神經衰弱、體力衰、痙攣性疾患及皮膚病、丹毒、蕁麻疹等。

【用法及用量】 注射液可供肌肉或靜脈內注射。每日或隔一日注射一次。小兒用小量，成人用大量。粉劑成人服每日三次，每次一茶匙，小兒依年齡酌減。片劑成人服每次四片，小兒服每次一至二片，亦每日三次。

【包裝】 注射液每支分五與十公撮。每盒分五支、廿五支、五十支或一百支。粉劑每瓶裝一百公分。片劑每盒八十四片或五百片(每片含量為○·七五公分)。

純淨葡萄糖注射液 (GLUCOSE)

營養強心解毒利尿

【總說】 葡萄糖有偉大之營養價值，能補償疲勞心肌之工作力，已爲人所周知。自1917年Budinger氏之高張葡萄糖溶液對心肌營養障礙有卓效之報告發表後，引起學者之注意，復經多數學者實驗研究，應用範圍益大，且將口服應用全廢。凡不能用口服者，皆可藉注射以攝取。本品即爲最純淨之葡萄糖注射液，有營養全身及心肌之作用，並能強心解毒及利尿。本品計分兩種，一種爲白色純液，一種爲另有黃色加緩和劑之改良品，任憑選用。

【功用】 葡萄糖液之注射，不僅可以補給一般及心肌之營養，兼能急變循環系之滲透壓，對於組織中之毒素，有稀釋、洗滌及排泄等之作用。凡患傷寒、赤痢、霍亂及慢性腸病等，因失血誘起之營養失調，患強度心臟衰弱，用洋地黃素未能奏效時，應用葡萄糖注射，均奏奇效。

【主治】 肺炎、肋膜炎、丹毒、尿毒症、白血症、心衰弱、各種傳染病、腎病、肝病、膿毒、水腫性疾患、細菌或藥物中毒、預防新砒劑副作用、失血、子宮內膜炎及其他附屬器疾患。

【用法及用量】 靜脈注射，酌用各分劑，注入時須徐緩。

【包裝】

5% 3× 50cc.	10% 10× 10cc.	25% 5× 10cc.
5% 2× 100cc.	10% 5× 20cc.	25% 5× 20cc.
5% 5× 10cc.	10% 10× 20cc.	50% 5× 10cc.
5% 5× 20cc.	20% 5× 10cc.	50% 10× 10cc.
5% 1× 3 0cc.	20% 10× 10cc.	50% 5× 20cc.
5% 1× 50cc.	20% 5× 20cc.	50% 10× 20cc.
10% 5× 10cc.	20% 10× 20cc.	50% 3× 5 cc.

四維葡萄糖 (GLUCOSE ABCD)

【總說】 葡萄糖爲單糖體，易於吸收，爲絕好之養料。本廠除發行甲維葡萄糖、乙維葡萄糖、丙維葡萄糖、丁維葡萄糖之外，更製成「四維葡萄糖」即 GLUPOLYMIN 一種，以供一般營養障礙及一般維他命缺落症之需要。「四維葡萄糖」中，除以右

旋精爲基材外，加入甲乙丙丁四種維他命。本品每盎司（英兩）中所含單位如次：

天然甲維他命	2000 I.U.
結晶乙維他命	400 I.U.
結晶丙維他命	400 I.U.
結晶丁維他命	250 I.U.

其貴重可知，故可以之防治一切維他命缺落症及補給營養上之需要。本品對於各種維他命缺落症，效力極大。可以代糖，最合於小兒服用，平時常服之，可助長發育，預防各種疾病。

【主治】 本品爲高等滋養劑，因含有四種高貴之維他命，適應範圍極廣。凡體虛身弱，消化不良，營養不良，四肢無力，小兒瘦弱，妊娠嘔吐，一般維他命缺落等，均爲適應，平時常服，補身益體。其味甘芳，可以代糖。

【用法】 每日三次，每次一至二食匙。視需要可加增其次數及用量。

【包裝】 每瓶四百五十公分（一磅裝）

每瓶一百六十八公分（六兩裝）

【附告】 另有片劑分二十片及一百片兩種，每片含量 1.5 公分。

快痢福片劑(GUANIFA)

對氨基磺酸尼汀

【總說】 自多價化學殺菌劑「磺醯胺」及其衍化物發明以來，實爲研究化學治療學上劃時代之進步，對於醫學界貢獻之大，不亞於馴梅專劑六〇六之發明。願「磺醯胺」一類之化學劑功用誠大，然用作腸內殺菌劑時，其功效每難圓滿。緣藥物之能作腸內殺菌劑者，其殺菌力既須強烈，而其作用，又須具備下列條件：（一）有水溶性，（二）在腸內吸收性較弱，使藥物滯留患處，得充分發揮殺菌力量，（三）無刺激性胃腸性，俾能大量服用，

不致損害。

最新發明之「磺醯胺」衍化物「對氨基磺脲尼汀」，對於上述各項優點，率皆有之，故為良好之腸內殺菌劑。

本廠藥物研究所，經廣博之研究，作臨床之實驗後，製成該項特效良藥，名為「快痢福」，乃「磺醯胺」衍化物「脲尼汀」類之製劑。

本品水溶性甚大。內服後，在腸內之濃度高而在血液及細胞組織內之濃度低，毒性甚微，故無惡心嘔吐等之不良副作用。對於腸內各項桿菌之滋生，（包括痢疾菌與其他桿菌類），具有強大之殺滅力，尤以革蘭氏染色法呈陰性類之桿菌為然。誠為治療菌痢，傷寒及各種原因不明之腸病之惟一理想良藥。

【主治】 菌痢，傷寒，副傷寒，鼠疫，霍亂及他種腸內桿菌傳染病。用本品以預防腸部手術後之桿菌傳染病，亦著功效。

【用法】 每片含純粹「磺脲尼汀」〇·五公分。每日三次，每次二至三片，飯後服用或照醫師指示。

【包裝】 每管二十片（每片〇·五公分）
每瓶百片（每片〇·五公分）

好力生及好力生濃（膠囊劑及滴劑） (HALISUN and HALISUN STRONG)

比目魚肝油精及天然丁種維他命之混合劑

【總說】 精純之魚肝油固有甲丁二種維他命，可以供適當之需求，然非惟有腥味難於下嚥之弊，且欲得適量維他命時，需服用多量魚肝油，於是消化負擔加重。惟「好力生」則既無上述缺點，而內含維他命成分之豐富與服後效力之宏大，尤不可以道里計，誠現代大補劑也。

「好力生」為比目魚肝油及足量之天然丁種維他命混合製劑，每顆含比目魚肝油三滴。

「好力生」	含甲種維他命	丁種維他命
液劑每公分 (gm.)	15,000 國際單位	5,000 國際單位

膠囊劑每顆	3,000	,,	1,000	,,
「好力生濃」	含甲種維他命		丁種維他命	
液劑每公分 (gm.)	60,000國際單位		10,000國際單位	
膠囊劑每顆	12,000	,,	2,000	,,

【主治】 (1) 適應於成人者 傳染病抗力薄弱，呼吸器病，尤以肺癆（防及治）、妊婦、乳婦、需用甲丁二種維他命補給營養者。

(2) 適應於孩提者 佝僂病、營養失調、抗傳染病力減弱、癱瘓症、助長發育、尤合用於生後之最初二十四個月，即出生後至二足歲階段之嬰孩。

【用法及劑量】 「好力生」最合用於預防及輕症或小兒之治療，每日服一至二顆或十至二十滴，小兒減半，嬰兒減至四分之一，其需大劑量者，可用「好力生濃」。

「好力生濃」膠囊劑，成人預防用每服一顆，治療用每日二顆。十歲以上小兒防治用均每日一顆，或從醫者之囑。「好力生濃」滴劑，成人每日八至十八滴，預防用減半，小兒每日三至九滴，預防用減半。嬰兒每日一滴至五滴，預防用減半。兒童比照膠囊劑之量減服。

【包裝】 膠囊劑：每瓶裝二十五顆及一百顆二種。

滴 劑：每瓶裝十公撮及五十公撮二種。

海石維膠囊劑 (HEXAVITE)

維他命甲, 丁, 乙₁, 丙, 乙₂, 乙₆, 菸草素酸及鎂鹽等複合大補劑

【總說】 吾人日常生活之維持，健康之促進，有賴於四種營養要素，即蛋白質，脂肪，炭水化物及鎂鹽是也。除此以外，則各種維他命（亦稱維生素）亦關重要。據最近科學家發見，每種維他命對於人體健康，皆屬必需，且莫不有其特殊功用。缺乏一種，即易致病。

本廠最新出品「海石維膠囊劑」，為維他命甲，丁，乙₁，

丙，乙₂，乙₆，淨純菸草素酸結晶體及微量鎂鹽之複合劑，補力偉大，面面俱到。因維他命丙與重金屬不相融合，故鎂鹽中不含銅質。製造嚴密，採用特殊方法，避免維他命丙與維他命丁之抵觸性。每顆「海石維丸」之構造，與衆不同，使甲丁二種維他命存貯膠囊以內，而乙丙二種維他命則和入膠囊衣中。各項成分，融和一體，保持適當性能，成爲理想良劑。

每丸「海石維」內容如下：

維他命甲	10,000國際單位
維他命丁	1,000國際單位
維他命乙 ₁	330國際單位
維他命丙	500國際單位
維他命乙 ₂	200gammas
維他命乙 ₆	100gammas
菸草素酸	10公絲
鎂鹽(不含銅質)	微量

【主治】 結合膜炎，角膜軟化，夜盲，脚氣，各型神經炎，多發性神經炎，壞血病，賀勒鮑羅氏病，流血症，齒齦出血，佝僂病，骨質軟化，肺結核，一般衰弱，病後元氣未復，陪拉格拉或黑舌病，營養不良性貧血及由於維他命甲，丁，乙₁，丙，乙₂，乙₆之缺乏而起各病。

【服法及劑量】 成人預防用：每日一丸，治療用每日二丸。

兒童預防用：每日一丸或照醫師囑咐。

【包裝】 瓶裝分廿五顆及百顆兩種。

本品必須存放於乾涼處所，以免潮霉。

砒矯基鐵注射液(IRON CACODYLATE)

【總說】 本品爲鐵與有機性砒酸之化合物，鐵爲血液中色素之主要成分，砒能使吾人體內同化作用旺盛，刺激造血臟器，產生血球，兩者相合，補血之功益偉，故用以治療諸虛百損，如

響斯應，且砒酸兼補神之功效，故使用之後，即覺食慾佳良，體重增加，以是使用者頗多。

【成分及性狀】 本品為淡褐色之透明溶液，質地精純，毫無毒性，每一公撮中含有鐵加可地 $\text{O} \cdot \text{O}$ 三公分，(1gr.) 即百分中含有鐵質十二成，砒質四十八成。

【主治】 貧血，尤以因惡性癌而起之惡性貧血，萎黃病，病後營養不良，(用於調理之際)，婦女月經不調，(如背脹腰酸)，神經衰弱，白血病，外科病如淋巴腺病，皮膚病如濕疹，鱗屑癬，紅色苔癬，癬瘡，濕癬，及梅毒性疾病等。

【用法】 皮下注射，每日或隔日一次，每次一支，注射一二週後，須停止一週，再行注射。

【包裝】 10×1cc.

癢可立沒注射液(JECOROMIDE)

【總說】 瘙癢及濕疹，為皮膚病中所常遇，治療時頗感困難，尤以濕疹瘙癢為然，患者往往以不潔之指搔，致炎症增劇，常於舊濕疹旁復生新濕疹，如是蔓延寔廣，終至不堪收拾，苟無適當藥劑以治療之，其不陷於危境者幾希，往日治療濕疹，僉以藥膏外敷，收效既微，流弊滋多，自Lehejew 及 Wadfi兩氏，倡用溴化鎂溶液靜脈注射，以治療濕疹瘙癢及蕁麻疹等以來，其功能使瘙癢停止，以達治療之目的，臨證家頗多賞用，是誠瘙癢及濕疹最美滿之治法也。

【性狀及功用】 本廠為臨證醫家之需求計，特根據上述理由，製成一種無色透明可注射之溶液，內含百分之五之氫化鈣，及百分之五至十之溴化鎂，富有止癢消炎之功，以治瘙癢及濕疹等，見效靈速，並能縮短濕疹之經過，且性質和平，毫無流弊。

【主治】 濕疹皮膚瘙癢症，蕁麻疹，一切伴有瘙癢之疾患，神經性泌尿疾患，一般神經性疾患，並可以代替濃厚食鹽水以治各種內出血。

【用法及劑量】 靜脈注射，視症狀之如何而酌用百分之五者五公撮至十公撮，或百分之十者五公撮至十公撮，每日或間日行之。

【包裝】 5×5cc 5×10cc

喬碘鈣(JODINCAL)

【總說】 藥理學所詔示，碘之爲用甚夥，尋常所用者，大率爲無機鹽，如碘化鉀、碘化鈉、碘化鈣等，雖有殊效，然有敗胃及易致慢性碘中毒之弱點。本廠以最新方法，以 Calcium moniodobehenate 爲主藥，製成有機碘內服劑，名之曰「喬碘鈣」，安全無害，服後碘之分解，極爲均勻，其中所含之碘，吸收與排泄，均有一定。

本品爲片劑，每片含上述主藥0.33，其中含碘百分之二十五，鈣百分之四。一成，無臭味，易於內服。凡碘劑之藥效，本品皆有。

【主治】 (一)第二期及第三期梅毒：如頭痛、骨膜梅毒、關節梅毒，血管梅毒(動脈硬化)樹膠樣腫，腦梅毒，因梅毒而起之精神病等。(二)其他：如慢性枝氣管炎，甲狀腺腫，心性喘息，血管運動神經性心絞痛，肝硬化症，非病毒性腦出血等。

【用法】 食後隔二小時方可內服，每日二至三次，每次二至四片，服前將本品研碎用開水送下，嚼碎後開水送下亦可。

【包裝】 每管二十片，每片含主藥0.33

喬託碘(JOTODIN)

【總說】 碘爲有效之變質劑(Alterantia)，且能排泄病的細胞組織及滲出物。故臨證上爲用甚廣，惜普通用之無機碘劑，不免有副作用，劑量過小不能奏效，劑量稍大，又易中毒，本廠有鑒於此，特製有機碘劑「喬託碘」一種，專供注射用。

【成分及性狀】 本品爲 Hexamethyl-Diamino-Isopropanol-Diiodide 之20%液，其主要成分一百分中，含純碘六十分，故本品一公撮中，共含碘量爲0.12，係有機碘劑，無副作用，有催起病組織及滲出物吸收之效，於呼吸器分泌少時，有使液化之利。預防氣喘發作，亦甚有效，發作時用之，有平喘之效。

【主治】 第二期第三期及腦脊髓梅毒，梅毒性腦膜炎，梅毒動脈內膜炎，偏癱，主動脈炎，心絞痛，枝氣管氣喘，肺氣腫，枝氣管炎，斯科夫拉性淋巴管擴張。

【用法及劑量】 皮下，肌肉或靜脈內注射，每日，間日或三日一次。每次半至一安瓿(1—2c.c.)

【包裝】 10×2c.c.

力弗肝(LIVEX)

專治貧血及其類似疾病之特效劑

【總說】 治病貴知病因，病因明則藥到病除，查貧血一症(俗稱血虧)無論種類，其病因皆由於內臟中缺乏若干要素，使肝臟及骨髓不易產生正常數量之血球，因以致病。據醫學權威報告，如將哺乳動物體內之肝臟輸入人體，即能組成赤血球，使貧血或體弱病人早趨康復，故醫界方面採用肝臟以治貧血等症，已成慣例。

本廠本學理研究，歷經實驗所得，監製確合標準之肝劑，名爲「力弗肝」，去生肝之缺點而保有生肝要素，其提煉方法，尤爲新穎嚴密，質他純淨，功效卓越，計分三項製品。

1. 「力弗肝」針劑

本品經科學提煉，并經生物實驗，規定標準，不含無用之蛋白脛，膽脂素及其他蛋白質等。每二公撮之「力弗肝」含有由五十公分鮮肝提出之生血素，合美國藥典規定五單位。吸收迅速，並無痛楚或其他不良反應。

2. 「力弗肝」液劑

本品配製精良適口，不帶腥味，頗易飲服。每一湯匙所含成分等於生肝六十公分，凡不慣注射之病人，用之尤宜。

3. 「力弗肝」片劑

本品在應用上最爲便利，貯藏經久不壞，長服尤爲合宜，每片所含肝質等於生肝十二公分。

【主治】 貧血，惡性貧血，各種貧血症狀，內外婦產各科流血症，妊娠期貧血，腎臟炎，斯撥盧，白血病，萎黃病，肺結核，敗血病，神經衰弱，代謝失調，烟癮貧血，病後體力難復，傳染病後衰弱，由於陸海空旅行而起之暈眩及胃腕不適，愛克司光治療之禁忌證等，用之皆效。

【用法及劑量】 針劑 成人：每次二公撮，肌肉注射，每日或間日一次。兒童：每次一公撮。液劑 成人：每次一湯匙，開水沖服或單服，一日三四次，飯前服之。兒童：每次一匙茶。片劑 成人：每次四五片，一日三四次，飯前服之。兒童：照年齡遞減。

凡患劇性貧血之病人，除注射「力弗肝」針劑外，并可服用液劑或片劑，以相輔助。

【包裝】 針劑：10×2cc 10×1cc

液劑：每瓶百公分。

片劑：瓶裝分百片，二百片，五百片及千片四種。

【附告】 本廠另有最新穎最強力之肝臟製劑如下：

1. 「新力弗肝」注射劑 (NEO-LIVEX)

每一公撮，含有由一百公分鮮肝提出之生血素，合美國藥典規定十單位。

包裝 6×2cc 6×1cc. 50×2cc.

2. 「超力弗肝」注射劑 (SUPER-LIVEX)

每二公撮，含有由二百公分鮮肝提出之生血素，合美國藥典規定二十單位。

包裝 6×2cc 50×2cc.

力康脾(LIVEX COMPOUND)

專治貧血及一般虛弱之複方肝腎大補劑

【總說】自公歷一九二六年，密那與穆非 (Minot and Murphy) 發明貧血症之肝臟治療法，旋於一九二八年，由其同事康宏 (Cohn)，於肝臟中析出有效成分，製成濃縮劑，厥後肝精對於貧血或血虧之治療價值，乃為各方所共認。願肝精防治血虧之功效誠著，若治其他虛損各症，無論體力上或神經上之衰弱，因作用單調，故補力尙感不足。本廠新出品「力康脾」，為肝精大補劑，製法特殊，提煉純淨，除備存極量之鮮肝汁補血素外，兼備各種性質融和之有效補劑。其目的不在僅充貧血症之特效藥物，并能補益其他一切體力上及精神上之虛損，如響斯應，功效獨到。

每百公撮之「力康脾」，所含成分如下：

全鮮肝膏	300公分	骨髓浸膏	3公撮
乙一維他命	1000國際單位	丙種維他命	500國際單位
菸草素酸	50公絲	血色素	3公分
枸橼酸鐵銣	2公分	甘油燐醇鈣	1公分
鐵質錳鹽	少量	麥精	適量

本品所用之肝精，臨床上業已確立標準，其內容與效力完全與同量之鮮肝相等。

據此，可見「力康脾」確為貧血症及一般虛弱之理想大補劑，生血強精，成分名貴。對於胃腸消化不良以及食慾不振之貧血病人，尤收治效。

【主治】初發及續發性貧血，兒童生長期貧血，佝僂病，陪拉格拉，營養不良，神經衰弱，食慾不振，妊娠期及哺乳期婦女，康復期及傳染病後虛弱，與體力上精神上過勞致弱。

【劑量】每日三次，每次二至四茶匙，開水沖和，飯後服之。

【包裝】瓶裝分六兩及十二兩二種。

胃痛靈片 (MAGNOXIDE)

【總說】胃痛發生之際，輒起吞酸、嘔雜、噯氣、嘔吐等症狀；如能除其原因，則胃痛自止。凡消化不良，食物腐敗時，易生有機酸而刺戟胃，故有此等病象；胃中胃酸過多時亦然。一般僅知小蘇打為治胃痛惟一之劑，不知多服之反能發生碳酸，對於有潰瘍者頗不適宜，且每有習慣性，易成胃酸缺乏症，欲求完美無疵，最適於治療胃痛之良藥，莫如過氧化鎂。非特絕無流弊，其功效且遠勝於小蘇打。過氧化鎂內服入胃，逢酸溶解，分解為鎂鹽及過氧化氫。過氧化氫又分解為水及氧，此氧特稱為發生氧，消毒力頗強，有防腐之效能。至於鎂鹽，則具有中和胃酸之功用，兩者合作，相得益彰。本品含有過氧化鎂百分之二十五。

【主治】消化不良，胃酸過多，惡心反胃，腹脹，胃痛，噯氣，胃腸發酵，常習性便秘，胃擴張。

【用法】每日三次，每次一至三片，飯前飯後一刻鐘，用溫湯少許化之送下，便秘、消化不良，每晨空腹服二至三片。

【包裝】分20, 100, 500, 1000片 四種。

新重鈣注射液 (NEO-GLUCOCAL)

複合葡萄糖鈣溶液供靜脈及肌肉注射之用

【總說】本廠從前出品「長命新鈣」，為葡萄糖與鈣合劑，蓋葡萄糖為營養劑而鈣又為止血消炎鎮靜及止癢等劑，兩藥相合，效力偉大。

「新重鈣」為本廠最新出品，其成分除葡萄糖及鈣外，另加一種富有營養質之糖類，相當於10%之葡萄糖鈣。此種有機鈣鹽，得製成高濃度溶液，不必加入其他穩定劑，並不發生沉澱，故「新重鈣」注射液之性能，較之任何僅含葡萄糖鈣劑皆為優。

本品保持各項鈣劑之長，同時其應用之範圍亦較廣。鈣劑中得用作靜脈及肌肉注射而不生痛癢不致損及組織者，以本品為第

【主治】 肺結核，癲癇及驚風，腸胃或膀胱內流血，婦科流血，外科手術後預防流血（黃疸症），發炎及滲出性疾病，皮膚發癢，變態反應及過敏現象，銻銻及汞中毒，藥物禁忌特性，如六〇六，金鹽製劑等，嬰孩，孕婦及哺乳婦女鈣質缺乏。

【用法】 靜脈或肌肉注射，成人每日十公撮（百分之十溶液），兒童每日二至五公撮（百分之十溶液）。

作靜脈注射時，應將病人衣袖高捲，勿使妨礙血液循環，並須將溶液徐徐輸入之。倘病人已經使用高度之毛地黃，則鈣劑必須禁忌，不能不知。

【包裝】 每盒五支，每支五公撮或十公撮（10%）。

每盒十支，每支五公撮或十公撮（10%）。


每盒廿支，每支十公撮（10%）。

新聖露消治龍 (NEO-SOLU-THIAZON)

苯丙基氮（苯磺醯噻唑）雙磺酸鈉

最新口服及注射用之化學治療劑

【總說】 自公曆一九三五年磺醯胺類製劑發明後，化學治療界之進步，一日千里，在各項磺醯胺衍化物中，其性能以磺醯胺噻唑為最佳，因其對於人體組織之毒性較低，而其殺滅細菌之效力較強，尤以球菌一類為然。職是之由，磺醯胺噻唑之地位乃取對位氮因磺醯胺與磺醯胺吡啶而代之。為求藥性吸收迅速，反應減少，及毒性減低起見，信誼化工廠同人歷經辛苦研究，製成最新磺醯胺噻唑特劑，可供口服及皮下，肌肉或靜脈注射三用，名為「新聖露消治龍」，以示有別於前此發行之「消治龍」與「聖露消治龍」，因該劑完全中性，毒性低微，且功用又極為普遍也。其化學公式如下：



本品極度純潔，毒性極低，故用時不易引起噁心，嘔吐，白

血球減少，胃納不佳，及損傷腎臟等不良副作用。凡我醫界同人，欲得有效而經濟之最新式化學治療劑，請儘先試用本廠之「新聖露消治龍」，非敢自詡，差堪自信。

【主治】 本品適應症候，與「消治龍」及「聖露消治龍」相同。惟其作用較為迅速可靠，除防治鏈球菌類，金色膿球菌類，肺炎菌類，淋菌類，腦脊髓膜炎菌類，及其他桿菌病原類而起各項病症外，并能治療痧子，傷寒，痢疾破傷風，鼠疫，氣性壞疽，丹毒及土拉倫斯菌病等。

【禁忌證】 本品忌與金屬劑砒劑等同用。其他禁忌證則為惡性貧血，血友病及各種剝性內臟疾病患者。

【用法及劑量】 本品製成三公撮及五公撮安瓿，每公撮含純淨新消治龍0.2公分。得充口服及皮下，肌肉或靜脈注射之用。其口服或注射次數，視病情之演變而定。大致初起宜用三公撮，其後劑量得逐漸酌加。兒童用量，比照成人四分或二分之一，視其年齡與體重而定。

【包裝】 5×3cc. 25×3cc.
 5×5cc. 25×5cc.

奴佛克賽注射液(NOVOCASAL)

【總說】 本品乃局部麻醉藥品中之最優良者。其效力較“可卡因”尤著。因其毫無副作用及毒性，故更為醫界所稱頌。

本品為無色無臭之結晶品，甚易液解於水，呈中性反應，性質極為和平，吸收力甚強。

本品之功用甚廣，無論大小手術，皆可採用之。雖用極大之量，亦從未見有中毒者，其功效神妙，遠非其他麻醉藥品所能望其項背。

【主治】 一切大小局部手術、眼、耳、鼻、齒科等，無不靈驗。

【用法】 皮下注射，須視疾患之大小而定用量之多寡。

【包裝】 每盒十支或十二支，每支一公撮或二公撮，內含

「奴佛克賽」2%。

【附告】 另有「奴佛克賽」與「腎上腺素」混合注射液，每盒五支及十支，每支二公撮。

婦美素液劑及片劑(OMENSAL)

【總說】 當歸係繖形科植物根，為吾國特產，其功效明載於本草綱目。數千年來，為吾國舊醫界治療婦科中主要藥物，年來德人在青島創設之醫院中，採取當歸，從事研究，確定當歸之生理作用，為鎮靜大腦及興奮延髓諸中樞，又能治療婦科諸病，如躁症，月經不調等，遂用當歸製成浸膏，以之治患者，都得良好效果，歐洲婦女界今日已漸採用。按當歸種類甚多，不易分辨，且易霉腐，不堪久儲，若製成膏汁，則手續頗繁。吾國有斯天然良藥，遺棄不用，實為可惜。本廠特選最上等當歸為原料，用冷浸法製成流膏，俾有效精油及固有香氣得完全析出保存，定名為「婦美素」，（或當歸精）以供婦女界應用，茲將其成分主治及服法等詳述如下。

【成分】 本品為黑色液劑或片劑，乃當歸中之有效成分，為天然調經補血品，製法嚴密，含量準確，且氣味芳香，服用適口，絕無毒質。

【主治】 躁症，月經不調，月經閉止，經痛，月經來潮前神經不安，產後血虧，頭痛，心腹痛，潤腸胃及排膿去白帶等。

【用法及劑量】 每日三四次，液劑每次服半茶匙，片劑每次服二或三片，均食後服。

【包裝】 液劑一百公撮，片劑一百片，每片含當歸精乾膏○
·三公分，等於流膏一公分。

婦萬定(OVADEN)

【總說】 據現代生理學所示，卵巢有兩種荷爾蒙，一為卵巢格拉夫氏濾胞Folliculi oophori vesiculosi “Grafi” 所生者，一為黃體 Corpus luteum 所生者。前者曰濾胞荷爾蒙 Hormone of

，為促進性器發育，改變更年期（即經絕期）之老衰現象，故能充進新陳代謝，改良血行，於是奏厥膚功，以之治濾胞荷爾蒙不足而起之病，如響斯應。「婦萬定」者，即有標準單位之結晶卵巢濾胞荷爾蒙 Crystalline hormone of ovarian follicular 製劑也。

【化學構造及標準單位】 本品之化學的構造式為 $C_{18}H_{22}O_2$ ，係無色菱形板狀結晶，對於溫熱的及化學的抵抗甚強，但為脂溶性而不能溶於水，故製為油劑以供注射之用。其所含結晶濾胞荷爾蒙即奧司太龍（Oestone），相當於一定之國際標準濾胞結晶單位，如下表：

婦萬定	每安瓿或每片中所含之濾胞荷爾蒙結晶即奧司太龍	相當於國際濾胞刺激素單位
(1)	○·一公絲	一千國際單位
(2)	○·○五公絲	五百國際單位

上表中所謂一安瓿即一公撮，因本品每安瓿均裝一公撮也。片劑每片祇有含五百國際單位一種。

【功用及主治】 本品為濾胞荷爾蒙，製為注射劑之外，更製成片劑，供內服用。其功用對於發育遲滯之少女，能促進其生理的機能，對於經絕期即更年期所起之一切故障，均能由本品解除之。蓋本品為濾胞荷爾蒙之純結晶體也，又據醫師報告，試用於惡阻，亦有良效。主治卵巢荷爾蒙缺落各症，女子性器發育遲緩，發育不全，不妊，惡阻，更年期之不適及其他一切合用濾胞荷爾蒙之疾病。

【用法及劑量】 (1) 子宮發育不良，月經過少過多，月經痛等，每日服「婦萬定」二至四片（共一千至二千單位），重者宜用一千單位「婦萬定」肌肉內注射（每三日一次，一個月經週期即二十八日中共十次），更重時則可用「婦萬定濃」。(2) 子宮內膜炎出血，每次用五百至一千單位之「婦萬定」，肌肉注射，一二次後，即可止血。(3) 經絕期或卵巢摘出後及 X光絕育術

之痛苦，可每日內服「婦萬定」一至二片（五百至一千單位），必要時可用注射劑。（4）月經時及經絕期之關節痛與皮膚病。可用內服片劑一日二至四片，重症用「婦萬定濃」注射。（5）續發性無月經之輕者，一日服片劑二至四片，重症則宜注射。

【注意】 藥片服時，不可嚼碎，用微溫開水吞服。

【包裝】 注射劑 5×1c.c. (500I.U.) 10×1c.c. (500I.U.)

5×1c.c.(1000I.U.) 10×1c.c.(1000I.U.)

片劑 36片 (每片500 I.U.)

【附告】 另有「婦萬定濃」OVADEN STRONG，性能相同。

包裝 3×1cc. (10,000I.B.U.)

3×1cc. (50,000I.B.U.)

1×1cc. (50,000I.B.U.)

婦萬靈注射液 (OVARIN CRYSTALLINE)

【總說】 「婦萬靈」乃卵巢濾胞內泌素成純粹之結晶形者。

規定標準，每管二公撮內，含一百白鼠單位。

其顯著優點，厥為絕無任何粗劣之卵巢及濾胞製品所存種種分量之蛋白質雜質而致引起之副作用。其主要之臨證上優點，為適於大量應用。在一公絲（剋）中，務使至少適合三千個白鼠單位，供臨證上所用之溶液中，製成每二公撮中含有一百個白鼠單位，依此標準發行之。所謂一白鼠單位，係就體重約一百四十公分之剔除卵巢而性機能成熟之白鼠，依陰道液而決定其與完全角化同時催進性慾所需之內泌素之分量。

【用法及劑量】 本品用量為一至二公撮（即五十至一百個白鼠單位），普通每日注射一次，連續一星期，必要時再可繼續注射。如為催進月經時，應在經期後數日或在月經初淨時開始，用量之大小及二次應用間之間隔，當視患者之性質及所得之影響變動而作皮下或肌肉注射。

【包裝】 10×2c.c. 5×2c.c.

婦萬多年注射液 (OVARTONIC AMPOULES)

【總說】自最近內分泌學進步以來，荷爾蒙治療已占有重要之地位。本廠自卵巢中製出一種濾胞內分泌素結晶體 (The Ovarin Follicular Hormone Crystalline)，更配他種內分泌腺，如垂體腺、腎上腺等，以增強其功效。更伍以消化強壯諸劑，洵為今日治療界傑出之珍品，達到根本治療之域矣。

【成分及性狀】本品含下列各劑：

(1) 卵巢內分泌素結晶體 為無色長菱形或六邊管狀結晶，可由各種溶劑中再行結晶而不至失却生理的效能，毫無副作用，效力準確。在一絲(釐)之結晶體，至少有三千個白鼠單位。
(2) 垂體荷爾蒙 (3) 腎上腺素 以上兩種，與卵巢內分泌素有相互間之共同關係。能增強其功用。

(4) 土的寧 有協助消化及強壯神經之功用。(5) 甘油磷酸鈣 用於佝僂病、軟骨病、亦為一般強壯劑。

【主治】月經閉止、月經過多或過少、月經不調、月經障礙、痛經、癢、不妊、肥胖病、性慾缺乏、貧血、萎黃病、卵巢缺落症狀、戒烟、病後、產後等。

【用法及劑量】皮下注射，一次二公撮，每日或隔日施行，重症一日二次，注射於上膊或肩胛間皮下，須長期連用，約一二十次，方獲卓效。

【包裝】 10 2c.c. 5×2c.c.

安樂瀉片 (PHENALSAL TABLETS)

【總說】本品係由 Aloin, Strychnine, Bellad., Ipecac., Phenolphthalein 五良藥精製配合而成，為緩下劑中最王道者，舉凡大便閉結及因大腸失職而起一切不快感覺者，服之甚驗，此片功力和緩不猛，且服後不令腹中絞痛，尤為一般所樂用。

【成分及功用】 本品既由上述五成分而成，今將其分別說明如次，以明本品治療之功用，

(甲) 蘆薈素 Aloin 爲帶黃色結晶或結晶性粉末，味苦易溶於水，蘆薈中之有效成分也，其化學式爲 $C_{16}H_{16}O_7$ ，能作用於大腸下部，經五至八小時間，排泄半硬便，且不成習慣性，

(乙) 土的甯散 Powd. Strychnine 爲促進胃腸消化機能之藥劑，能增加消化管之自動的與反射的運動，胃腸疾患中不可少之良劑也，

(丙) 顛茄浸膏 Ext. Belladonna 與東莨菪浸膏 Ext. Scopolia 同一成分，爲麻醉鎮痛劑，胃腸病中之止痛藥也，

(丁) 吐根散 Powd. Ipecac. 除催吐祛痰外，又能治胃腸疾患，阿米巴赤痢與肝臟腫脹等，多利用之，

(戊) 非諾夫他林 Phenolphthaleia 係帶黃白色無味粉末，不溶於水，其溶液爲鹼性，內服至腸，溶解爲鹼鹽，呈緩下作用，經四至六小時間排泄糜粥樣便，然腸管不易吸收，其八成以上經大便排洩於體外，對於常習性便秘，甚有奇效，

由上所述，「安樂瀉片」之爲緩和劑，固也，而對於習慣性便秘，服之能得暢快之大便，精神快適，又爲社會所歡迎，然因有蘆薈素之易使骨盤臟器充血，故於月經，妊娠中，禁用爲妥，小兒亦然，

【主治】 一切便秘，均可適用，對於習慣性便秘，更有奇效，

【服法及劑量】 臨臥時服一二片，或早起服一片，正午再服一片，服後約八至十二點鐘之間，當可大解，

【包裝】 每瓶二十片，及一百片。

肺康(PHICON) (雙氮雙苯樹葡萄糖磺酸鈉)

最新肺結核化學治療劑

【總說】 近年以來，「泡魯明」對於人類結核症之治療，已

爲醫界中前進之士所採用。凡肺癆及其聯繫疾病，如初發性肺炎，手術後肺萎肺炎等，皆可用該項化學劑治療之。用法方面，曾作口服，肌肉注射及靜脈注射等各種試驗，但爲病人易於耐受起見，以口服最爲合宜。

本廠最新出品「肺康」，乃直接治癆良藥，即屬「泡魯明」製劑，毒性低而治效高，略述如次：

【臨床實驗】「肺康」爲信誼化工廠歷經多年辛苦研究所得之結果，爲治癆各劑中之富有效果者。

據臨床經驗而言，用「肺康」以治各類結核症，必須持續至若干時日或歷數月之久，直至見效爲止。本品業經醫界著名人士予以臨床上有系統之實驗，獲得優良效果，例如熱度降低，咳痰減少，以迄檢查痰內無癆菌發現爲止。即用愛克司光檢驗，亦可發見進行性肺癆，於用「肺康」若干時日後，確被控制而停止進行。此爲事實上最具體之答復。

【主治】肺結核，肺炎，肺膨脹不全，肋膜炎，單側或雙側纖維性及粟粒性肺結核，滲出性結核等，尤以粘連性肺病，不適宜於人工氣胸者，服用本品，更爲適合。

【禁忌證】凡對於磺胺製劑感覺性過敏者，有肝病及腎病者，皆須忌用本品。

【用法及劑量】「肺康」之治療量，因人而異。普通成年病人，初服時自〇·二五公分至〇·五公分，每日三次。其後劑量漸增至每日三公分止，視病人之耐受力而定。連服十日後，須間歇五日，以資休息。此種治法，須由專門醫師監視，持續至兩月或三月，爲一治療期。在此治療期內，如發生反應時，得暫時停用或將劑量減輕至相當限度，乃爲至要。

「肺康」爲片劑，每片重量〇·二五公分，專供內服。在服用本品期間，同時仍須注意營養與休息。至服用本品後，病狀好轉紓緩者，乃由病症性質使然，並非藥性關係，故受治病人，須具有絕對忍耐性，當知欲速不達，古有明訓，經年沉痾，非可一蹴即幾也。

【包裝】 每片○·二五公分

管裝： 每管六片（管蓋須嚴密緊蓋，以免潮霉）

盒裝： 每五管裝六片者 每五十管裝六片者

本品中醫師處方可買

拔痔根藥膏(PILES CURE)

最新治痔外用劑

【經說】 痔瘡一症，極為普遍。吾人患痔後，無論內痔或外痔，即感時痛時癢，坐立不安。本廠為服務人羣，企圖解救痔疾之痛苦起見，本多年之研究，配製一種功效卓絕之油膏，名為「拔痔根」。

「拔痔根藥膏」之主要成分為次硝酸鉍，外加鞣酸，水化氫鹽及金縷梅汁等名貴藥料，精密監製，裝入膏管，另附有孔尖端，以便應用。本品業經臨床試驗，多數病人於用後極為滿意，緣藥膏性質優良，功能止血滅菌，去腐生新，減除痛楚，並使創口迅速愈合。凡患痔後發生各種症狀，如流血，發癢，痔漏，肛門破裂以及直腸發炎等，莫不迅奏奇功，如響斯應。本品兼能消除積糞，使腸部利於排洩。故「拔痔根」乃是痔瘡之特效良劑，救苦除痛，久用無害。

【主治】 痔瘡，脫肛，痔漏，肛圍炎，肛門破裂及各種原因不同之直腸發炎等。


【用法】 先以溫水洗滌患部，再以藥棉拭乾，然後將膏管去塞，裝上有孔尖端，插入肛門，緩緩撤出藥膏，使滯留於肛內，男女老幼，皆可應用。

【包裝】 每管裝二十五公分。

撲滅定片劑及注射劑 (PROMADIN)

自一九三五年杜曼克氏發明「對氮·苯磺酰胺」以後，產生

多數同樣製劑為醫療上應用，基于努力之研究與臨床之試驗，本廠化學藥物研究所創製「對氮·苯磺酸鹽」衍化物，定名「撲滅定」，已證明為最有效之殺菌劑，其化學構造如下：



「撲滅定」為橘紅色結晶性粉末，熔點約攝氏二百二十八度，毒性極微，不易溶于水，對於溶血性連鎖菌，葡萄球菌，肺炎球菌，淋球菌，腦膜炎球菌等，用以治療，甚有價值，「撲滅定」不僅對於球菌類，即由大腸菌，赤痢菌及其他桿菌而起之疾病，亦有相當效力。

【主治】——由溶血性連鎖菌而起之疾病，丹毒，扁桃腺炎，敗血症，產褥性敗血症，猩紅熱，中耳炎，癰，疽，以及由肺炎球菌及腦膜炎球菌而起之疾病。

【用法】——「撲滅定」紅色片劑，專供內服之用，每片含主藥半公分，成人每日三次，每次一片或二片，兒童及嬰孩，可用成人量之半或四分之一，「撲滅定」須在飯後服用，未吞嚥前，先須嚼碎，然後用溫開水送下，內服之後，小便變呈紅色，此為該藥之色素，並非血液，故不必驚惶，如紅色染及衣服時，可用蘇打與氫硫化鈉混合溶液沖洗，至退色為止。

【包裝】——每片含主藥半公分(0.5 gm.)

每管二十片 每瓶分一百片，五百片，一千片三種。

【附告】 本品另有注射液，供肌肉注射之用，盒裝分五支及廿五支，每支五公撮。

雙鹽酸奎寧

(QUININE BI-HYDROCHLORIDE)

【功用】 「雙鹽酸奎寧」為殺滅瘧蟲及半月狀體之要藥。

【主治及禁忌】 各種瘧疾，如日發瘧、間日瘧、三日瘧、昏
迷性瘧、惡性瘧等，又如產褥熱、傷寒、肺炎、回歸熱及一切傳
染病之寒熱等亦用之。孕婦忌用。

【用法】 肌肉或靜脈注射。每日或間日一次，用量由醫師主
之。

(甲) 每一公撮內，含鹽酸奎甯〇·二五公分。

(乙) 每一公撮內，含鹽酸奎甯〇·五公分。

【包裝】 (1) 5×1cc. (0.25) (4) 5×1cc. (0.5)

(2) 10×1cc. (0.25) (5) 10×1cc. (0.5)

(3) 12×1cc. (0.25) (6) 12×1cc. (0.5)

【注意】 如析出結晶時，可將安瓿放在熱水中使之溶化後注
射，效力上毫無變更。

【附告】 另有「奎寧烏來糖注射液 (Quinine-bi-mur car
bamid)，功用相同，充肌肉注射之用。

【包裝】 10×1cc (0.25)，10×1cc (0.5)

奎寧新鈣 (QUININE-GLUCOCAL)

【總說】 長命新鈣之消炎制泌各功能及對於循環器之補益作
用，無庸贅述。今再加入葡萄糖酸奎寧，用現代化學方法，製成
最新合成注射劑，因奎甯之鎮靜退熱及抗傳染作用，則該劑之用
途，自較單用長命新鈣及奎寧為廣。

【成分】 本品每十公撮中，含有葡萄糖酸奎甯〇·六公分，
餘為長命新鈣液，即十成葡萄糖鈣（相當於奎寧鹽基〇·三七公
分及鈣〇·〇九公分）。

本品有10c.c. 5c.c. 3c.c. 三種。所含奎甯及鈣之量，可
依此算出之，茲不贅述。

【主治】 格魯布性肺炎、纖維性肺炎、枝氣管肺炎、流行性
感冒、咽喉炎、扁桃體炎、枝氣管炎、產褥熱、傷寒等。

【用法及劑量】 肌肉注射或靜脈內注射。

成人肌肉注射，一次用 10c.c. 一支，在重症可兼用緩緩之靜

脈內注射（一方面仍用肌肉內注射一日兩次）。

小兒惟有用肌肉注射之法。三歲以下每次用1c.c.已足，三歲至六歲，每次2--3c.c.。六歲以上，每次5c.c.。

【包裝】 1×10c.c. 5×10c.c.
 5×5c.c. 10×5c.c.
 5×3c.c. 10×3c.c.

息熱定 (SINADIN)

【總說】 自母希 Much 氏根據免疫學原理倡導蛋白質及脂肪治療法以來，各國均有所謂普遍疫苗 (Voll Vaccine) 之出品。蓋吾人不幸而罹有傳染病時，體內除產生對於該病原體有特殊性之抗體外，血液及組織液中，仍不絕產生對於各病有普遍性之免疫物質，以普遍的抵制一切病原，對於病體，獲益匪鮮。現代各種名稱不同之普遍疫苗所以昌行於治療界者，職是故也。一般名之曰非特異性刺激療法。

「息熱定」為信誼出品之普遍疫苗，在治療傳染病之際，診斷未定時，以之注射，固可使抵抗力加增，高熱退降，即診斷已定，亦可與特殊療法併用，而治效益彰。「息熱定」由細菌學專家自製，其中含有三大刺激要素：(甲)由非病原性裂殖菌體中所提出之蛋白質；(乙)由獸類膽汁中提出之類脂肪體 (Lipoid)；(丙)動植物性脂肪。

【主治】 「息熱定」能普遍的適用於一切熱性病，如流行性感胃、肺炎、麻疹、產褥熱、子宮及其附屬器之炎症、敗血症、丹毒、猩紅熱、淋巴管炎、菌痢、傷寒、扁桃體炎、扁桃體周圍膿腫、中耳炎、乳腺炎、蜂窩織炎、腎盂炎、膀胱炎、闌尾炎、胸膜炎、腹膜炎、大腸菌性疾病、急性關節炎、多發性肌炎、癰疽。凡由球菌而起之病，如與消發滅定 Sulfamidine 併用，收效更大。此外治傳染眼病、神經痛、癱瘓質斯，亦有奇效。

【用法】 肌肉或皮下注射，每日一至二次，每次一安瓿 (2 cc.)，成人小兒劑量均同，運用無害。

【包裝】 3×2c.c. 12×2c.c. 50×2c.c.

息癘靈片劑及注射液(SINABRIN)

最有效之化學抗瘧劑

〔息癘靈〕為抵抗瘧疾絕對有效之化學抗瘧劑，以最小量內服之後，則體溫在二三日內，降至常溫，因其對於殺滅原體（瘧疾原蟲），有迅速效力及持久之作用，故絕不致再發。本品更為瘧疾預防優良劑，抗治黑水熱病，亦極著效。對於孕婦及有金雞納霜特異性之病人，毫無禁忌。

【劑量】 「息癘靈」為○·一公分之片劑，對於瘧疾之治療，除醫師另有指定外，最普通之用法如下：

成人及八歲以上發育健全之兒童	每日三片
四歲至八歲之兒童	每日二片
四歲以下之兒童	每日一片

本品在飯後服用，服時須飲多量水分，可連服五日至七日，在普通病症，服用五日，足資痊愈。在治療終末時，皮膚偶發黃色，此因本品之色素，沉著於皮膚之下，乃為暫時性質，其黃色在數日內自行消滅。對於黃疸病絕無絲毫關係。本品對於心肝及其他臟器，完全無害。

為保證絕對不復再發起見，在用本品後，再服「雪瘧奎」數日，以策萬全。

【預防】 在瘧疾流行區域內，為預防瘧疾之攻襲起見，可服「息癘靈」每星期二日，其法如下：

成人及四歲以上之兒童	二片
二歲至四歲之兒童	一片半
二歲以下之兒童	半片

以上所述，係每星期劑量，但亦可在一日內服完。在瘧疾傳染嚴重區域，如每星期再服「雪瘧奎」○·○二公分，則預防效力，更為增強。

【包裝】 片劑每瓶十五片及三百片，每片含主藥○·一公分

注射用 每盒六安甌，每安甌含「息癆靈」之可溶性乾燥粉末○·一公分

每盒二安甌及二十五安甌 每安甌含「息癆靈」之可溶性乾燥粉末○·三公分。

信甯咳 (含磷酸科第印) (SINECO)

化痰止咳良劑

【總說】 普通咳嗽往往為一般人所忽略，馴致日久失治，釀成其他併發疾病，如哮喘，枝氣管擴張，肺炎及肺結核等重症，諺云久咳成癆，故吾人宜於輕微性咳嗽初發生時，即予治療，杜微防漸，是不能不注意者。本廠為切實治咳起見，歷經多時研究，配製一種特效良劑，名為「信甯咳」，其方單如下：

每一液兩含

磷酸科第印○·三二哩，氯化鎂五哩，焦油磚硫酸鈣八哩，川貝母流浸膏二十量滴，遠志流浸膏二十量滴，桔梗流浸膏二十量滴，氣仿一·五量滴，複方海葱構漿四十八量滴，妥路糖漿適量。

【主治】 傷風咳嗽，枝氣管炎，肺炎，百日咳，乾咳，夜咳，哮喘，痰嗽，嬰孩性咳嗽，及其他原因不明之咳嗽。

【劑量】 成人每次一湯匙（約十五公撮）每日三四次。

兒童依年齡遞減。本品得配合其他止咳名藥，並無妨礙。服用時宜以開水沖和之。

【包裝】 瓶裝分六兩，十二兩二種。

【附告】 另有不含「科第印」之「信甯咳」，包裝相同。

本品由醫師處方可買。

雪癆奎片劑及注射劑 (SINEQUIN)

抗瘧特效劑

【總說】 「雪癆奎」與息癆靈之功用相異，緣息癆靈為殺滅瘧疾原蟲主劑，而「雪癆奎」則具摧毀各種瘧蟲配偶交合之特殊

效能。在瘧疾流行區域，居民應常服本劑，以資預防，苟能服之有恒，則傳染蔓延當可遏止。

【主治】（一）本劑與息瘧靈或奎甯合用以治各種瘧疾，功能減少復發次數。用於間日瘧，凡原蟲生殖體非息瘧靈或奎甯所能殺滅者，「雪瘧奎」悉能摧毀之。

（二）在瘧疾流行區域，本劑或單獨應用，或與息瘧靈奎甯等相合用。本劑既具摧毀各種瘧蟲配偶交合之功能，故瘧區居民皆應常服，藉以防止傳播，極為有益。

（三）為瘧區居民個人預防起見，除用息瘧靈外，必須輔以本劑，以收確效。

（四）用本劑以治黑尿熱症，亦著效能，無論孕婦或忌服奎甯者，皆可服用，並無禁忌。

【用法】（甲）本劑與息瘧靈合用：一

一 成人及兒童八歲以上者，先服○·一公分之息瘧靈，每日三次，每次一片，服至四日至七日後，再服本劑○·○一公分者，每日二至三次，每次一片，約服三日至五日為度。

二 兒童五歲至八歲者，先服○·一公分之息瘧靈，每日二次，每次一片，服至四日至七日後，再服本劑○·○一公分者，每日二次，每次一片，約服三日至五日為度。

三 孩童在四歲以下者，先服息瘧靈每日一次，每次一片，服至四日至七日後，再服本劑○·○一公分者，每日一次，每次一片，約服三日至五日為度。

（乙）本劑與奎甯合用：一

其劑量之規定，應以本劑一份與奎甯三十份之比例為準。

（丙）藥物預防：一

在瘧疾流行區域，藥物預防頗關重要。除用息瘧靈外，更應輔以○·○二公分之「雪瘧奎」，每週一次，以期妥善。

【包裝】 每管十五片，每片○·○一公分，每瓶五百片。

【附告】 另有「雪瘧奎注射劑」，功用相同。

【包裝】 10×1cc.

信誼藥膏(SINE OINTMENT)

最優良之皮膚病外用藥

【總說】 信誼藥膏爲消治龍〔(對氨·苯磺醯胺)噻啞〕與甲種維他命及其他消毒及收斂諸藥之混合製劑，製成油膏而應用之，對於各種皮膚病之外用，極爲可靠，且無毒性及臭味。

【主治】 (1) 急性及慢性濕疹：— 「信誼藥膏」能制止癢感及抑止竇出，因濕疹爲皮膚受刺激之炎症，尤以四肢及趾間（香港腳）爲最常見。

(2) 疥 瘡：—「信誼藥膏」能治癒疥瘡，因含有消治龍，乃強力之殺菌劑也。

(3) 瘡 癤：— 均由葡萄球菌及鏈球菌而起，此種細菌「信誼藥膏」立能殺滅之，故如預早應用，決不形成膿瘍或潰瘍。

(4) 水火燙傷：— 如敷以本品，則迅速吸收，吸入組織，故患部得迅速乾燥治癒。

(5) 凍瘡及痔瘡：— 用「信誼藥膏」塗敷數日，立奏奇效。

(6) 挫傷切傷小創傷，及其他酸性皮膚病：— 「信誼藥膏」產生消毒及和緩作用，制止癢感，殺滅微生體，促進患部迅速治癒。

【用法】 用熱水清潔患部後，以軟毛巾按吸之，不可摩擦，塗敷足量「信誼藥膏」于紗布或法蘭絨，貼在患部，一日數次施行。

【包裝】 分大盒及小盒二種。

信 乃 通(SINESTRON)

(行經烷酚雙丙酸酯製劑) 專治婦女卵巢機能不足病之有效良藥

【總說】 婦科各症中，以月經疾病最爲普遍，例如閉經，及月經過多等，其結果每使女性生殖器官發生衰老而致壞變。


查閉經一症，無論初發或續發，其原因雖繁，然多數由於卵巢機能之不足。

荷爾蒙治療對於卵巢機能不足而起之婦女病，為近世治療學上一大進步。顧舊法臟器治療之藥物，皆由臟器本身提出，其所含之荷爾蒙頗不準足，而新法則採用化學上人工綜合之行經酮素（Synthetic oestrogenic substance），其效果較勝。在各項行經酮素中以行經烯醇（Stilboestrol）及行經烷醇（Hexoestrol）為最有效力。據最近科學家研究所得，行經烷醇及雙丙酸酯合劑之吸收較易，而其活動性且較單獨行經烷醇為經久。

本廠藥物研究所經多年之研究與實驗，製成一種最有效之行經酮素，（行經烷醇雙丙酸酯合劑），專治婦科月經疾病，名為「信乃通」。

本品治效與天然行經二醇（Natural oestrodol）完全相等，而其持久性，且較同量之行經酮（第一種國際標準行經荷爾蒙製劑）或苯甲酸酯（第二種國際標準行經荷爾蒙製劑）為長。

「信乃通」具有各種天然濾泡荷爾蒙之生物學上作用，而不致發生毒性症狀。無論肌肉注射或口服，皆收優良效果，其化學公式如下：



【主治】 閉經，痛經，不育，經絕期疾病，婦女生殖器環變，嬰孩性陰道淋等症，並得用以抑制乳汁分泌，及治療其他由於濾泡性荷爾蒙不足而發生之各項婦科疾病。

【用法及劑量】 初發及續發性閉經 在三星期內注射五次，每次三公絲或服用片劑，每日三四片，連服十四日。凡經絕期疾病如血管舒縮病，失眠，傷頭痛及精神鬱結等，須日服片劑一二

片，連續三四日，如感不足時，得輔以注射劑。

凡痛經不育等症患者，須在行經後兩星期，服用本品，每日一片至二片。如遇必需時，得在第二次行經前最後三日至五日內，每日注射一針。

凡嬰孩性陰道淋及老年性生殖器萎縮患者，須於行經後一星期注射兩針至三針。

【包裝】 片劑 每片0.6公絲=6,000國際單位 每管五十片
針劑 每安瓿3公絲=30,000 國際單位 每安瓿一公撮，每盒五安瓿。

甲狀腺片劑(SINE THYROID TAB.)

含充分腺體功效之甲狀腺製劑

【總說】 劇性之甲狀腺機能遲鈍各症，例如粘液性水腫，克汀病，及基礎的新陳代謝病等，必須用新鮮或乾燥之甲狀腺，為對症良藥，此乃醫界所一致公認者。據病原而言，上述各症，大半皆由於甲狀腺所分泌之一種荷爾蒙，名曰“甲狀腺素”之不足而來，惟此種不足，得用一種甲狀腺製劑以補足之，此項製劑之主要成分，乃為一種有機碘，即甲狀腺素是也。

本廠監製之「甲狀腺片劑」，係由美國藥典規定之甲狀腺乾粉製成，內含高度碘質，極為名貴，主治克汀病，粘液性水腫，肥胖病，發育不足，幼稚病，新陳代謝病，營養不良，及由於甲狀腺失調之各項疾病。本品并得用以長期治療各種輕微性甲狀腺機能遲鈍病，惟劑量須較輕，尤以青年及兒童身心發育遲緩等症，用之極效。

【用法及劑量】 本品規定標準含有有機碘不下 0.3%，每日服用三次，每次半片至三片，由醫師指示之。

【包裝】 每片0.03公分，每瓶百片。

信誼疫苗(SINE VACCINE)

信誼疫苗，專為健康個人之預防接種而製，以抵抗某種流行

性傳染病，其效力確實，毫無危險，吾人行動於已患傳染病之地及居住於傳染病流行區者，此種預防接種，極為需要，不僅保護個人免受此疾病之傳染，更可預防此種疾病流行之繼續擴大。

創製此種疫苗之培養基，其苗種須向本國各地，及外國各流行區，選取其毒菌型，加以分離，形成多價抗體原質，供給強大之免疫力。

信誼疫苗，現分兩種發行，即（一）懸垂液：一為注射用。

（二）片劑：——為內服用

（1）信誼疫苗為注射用者：——乃消毒之懸垂液，其中所含細菌，均經嚴密殺死於生理食鹽水中，再加百分之〇·二 Trikresol 為保藏劑。

【劑量】 第一次注射 0.5 公撮，第二次一公撮，第三次一公撮，每隔七日至十日注射一次；如環境不便，不能注射三次時，則注射二次，每次一公撮亦可，但總以注射三次為宜，兒童體重五十磅，或年齡在十歲左右者，注射量減半，十歲以下者，則按其年齡遞減之，但如注射一次，對於預防功效，或尙未能確實。

【用法】疫苗用前，必須妥為搖勻，使其中所含細菌，平均混和於液中，不用時須藏於暗涼之處，溫度在攝氏五至十度，更須注意封簽上所標明之無效日期。

凡身體健康者，應予接種，婦女懷孕四月及在月經來潮時不宜接種。本疫苗均行皮下注射，注射前應行一般消毒法，注射部位，普通在三角肌之直下，但在其他富脂肪部份，亦可施行。注射之日及翌日，不宜運動及飲酒，因其能引起反應之故也。

疫苗注射之後，有時有局部或全身反應，但皆為時甚暫，不必驚惶，故注射時間，最好在下午舉行，如有反應發生，如發熱，頭痛等，適在晚上睡眠時間，約十二小時內，迅即消滅。

現在所製各種疫苗，列舉如下：——

信誼霍亂疫苗：——每公撮含霍亂弧菌二十萬萬個。

信誼霍亂疫苗（濃）：——遵照遠東醫學會議決定，每公撮含霍亂弧菌六十萬萬個，雖注射之後，略有反應，但其免疫力則

更爲加強。

信誼傷寒霍亂混合疫苗：——每公撮含傷寒桿菌十萬萬，霍亂弧菌二十萬萬。

信誼傷寒副傷寒混合疫苗：——每公撮含傷寒桿菌十萬萬，副傷寒桿菌甲乙二型各五萬萬。

信誼傷寒副傷寒霍亂混合疫苗：——每公撮含霍亂弧菌二十萬萬，傷寒桿菌十萬萬，副傷寒甲乙二型各五萬萬。

信誼痢疾疫苗：——爲預防痢疾之特效藥，每公撮含志賀氏 (Shiga)，福來克司耐而氏 (Flexner)，赫斯氏 (Hiss)，及“Y”型等菌屬各五萬萬。

信誼腦膜炎疫苗：——對於流行性腦脊髓膜炎之預防，頗具特效，每公撮含腦膜炎球菌四十萬萬。

【包裝】 除腦膜炎疫苗每瓶裝十公撮外，其餘每瓶均四十公撮。

信誼內服疫苗：——按照潘史來特加氏 (Besredka) 法精製之，其細菌用真空乾燥特別裝置殺死，一部以電氣分解，再和以特種有效成分，故能從大腸壁大量吸收，發揮其效能。

根據 Besredka 氏方法，在服用疫苗前，應先服小量之牛胆汁，因此腸上皮發輕微落屑，抗原體即由此吸收，信誼胆汁片含新鮮牛胆汁 0.3 公撮，以之乾燥，再加以極易溶解之物質。

用法：——在空腹時先用溫開水吞服綠色片一片，(即牛胆汁片)，隔一小時，服疫苗片一片，服後一小時半以內，不宜食各種物品，第二日第三日再全樣服用。各內服疫苗均有成人用及兒童用之別，購時務祈注意。

【包裝】 每盒兩管(一)每管三片(抗原片)

(二)每管三片(牛胆汁片)

信誼內服疫苗，業經發行者，列舉如下：——

(一) 預防霍亂內服疫苗：——每一抗原片，內含乾燥細菌粉末十六公絲，即等於乾燥細菌體約一萬「密立洪」(Million)。

(二) 信誼傷寒內服疫苗：——含量全上。

(三) 信誼痢疾內服疫苗：——每一抗原片，內含乾燥細菌粉末十六公絲，等於志賀氏，福來克司耐而氏，赫斯氏菌，「Y」型細菌，各三十三萬萬。(兒童用劑量減半)

(四) 信誼傷寒霍亂內服疫苗：——每一抗原片，含乾燥細菌粉末二十四公絲，等於霍亂弧菌之乾粉末一萬「密立洪」，及傷寒桿菌之乾燥粉五千「密立洪」。(兒童用劑量減半)

性痢素(SINLARSOL)

【總說】 化學療法，層出不窮，「性痢素」者，為最新發明之內服用有機砒劑，消毒殺菌之效甚宏，且毫無副作用。

【性狀及成份】 「性痢素」為一種最新片劑，係以主藥氧乙酰基氨基苯次砒酸(Oxy-Acetyl-Amino-Phenylarsenic-Acid)製成者，含砒雖多，但性和平而無毒，每片含主藥 0.25gm.，臨牀上用途頗廣，詳主治條下。又本品對於螺旋體亦能殺滅之。

【主治】阿米巴性痢疾(Amoebic Dysentery)，冷勃利阿滴蟲病(Lambliasis)，文生氏咽峽菌(Vincent's Angina)，瘡疾等，對於梅毒之防治，亦可用本品內服，以避靜脈注射之勞，因本品含砒甚富，能殺滅梅毒螺旋體也。

【用法及劑量】 (1) 本品專供內服。(2) 食前或食後，則因病症之不同而異，宜由醫師指示。(3) 服時或用溫開水吞嚥或溶於水中後服下均可。(4) 劑量應由醫師核定，普通劑量，每日約服一至二片；特別劑量，雖有每日服三至四片者，但至多連服五日。(5) 小兒用本藥，宜特別謹慎，最好避免之。不得已時，其劑量宜減少至最小量，且非醫師指示不可。

【包裝】 分三十片及百片。

息那倫(SINOLEN)

無菌蛋白體注射液

【總說】 本品係用精密鑑定之牛乳，經滅菌消毒步驟及提出。

其不合用之成分而製成者，用之既無不良反應，復得保證病者於最短期中促進體內一般的抗力，從而緩解各種適應之疾病，乃至全愈。

【主治】 本品既能促進體內一般的抗力，以對制傳染病菌之猖獗，臨證上適應下述各種疾患：

(1) 化膿性傳染病：瘡癤、疔、癰、丹毒、乳腺炎、淋巴腺炎及扁桃腺炎等。

(2) 婦產科各症：骨盆臟器病，產褥收血症，淋毒性產褥熱等。

(3) 泌尿生殖器疾病：橫痃、淋病、蜂窩織炎、淋毒性關節炎、淋毒性攝護腺炎、慢性尿道炎、軟性及硬性下疳等。

(4) 皮膚病：溼疹、乾溼癬及其他。

(5) 眼科病：化膿性眼疾如化膿性角膜潰瘍、傳染性眼球穿孔、化膿性虹膜炎，膿腫，白喉管及淋性結合膜炎角膜炎等。

(6) 呼吸系疾病：慢性鼻卡他、感冒等（行皮下注射或皮下與肌肉交替注射法）。

(7) 急性傳染質斯性發熱：高熱時本品無禁忌之必要，因其藥理作用並不產生過高之體溫也。

【用法】 本品可行肌肉內或皮下注射，如交替施行，亦無不宜。行肌肉內注射時，尋常用五至十公撮，小兒未滿二歲者一至二公撮，二至三歲者二公撮，四至七歲者三公撮，七至十歲者可用四公撮乃至五公撮，成人五至十公撮。注射時宜插入臀肌之深部，與行汞療法相同。臂之兩側當交替施行，以防止局部反應。注射時宜極徐緩，受術者即不至感受痛苦。

【包裝】 1×5c.c. 1×10c.c. 5×5c.c. 5×10c.c.

足可淨 (SOCOSIN)

表皮癬菌病（香港腳）特效藥

【總說】 趾間濕氣，俗稱香港腳，流行於熱帶地方，如香港上海等處，患者頗多，時發時愈，纏綿不已。該症極易傳染，且

性質頑固，不易治愈，其原因由於多種黴菌（紫色毛髮黴菌及尖銳毛髮黴菌等），此種黴菌，一經傳染，即深入皮膚組織，發生奇癢，搔破之後，往往引起其他疾病，招致不良後果，是又不能不留意者，查治療該項濕氣藥品，頗少特效者。緣藥性過於溫和，則滅黴菌能力不強。反之，凡猛烈殺菌各劑，摧陷靡清，易於損傷皮膚組織，及上皮細胞，故最適當之治療劑，應具強度之殺菌作用，同時並能彌散於細胞粘膜，不致損傷皮膚。

本廠藥物化學研究所，歸納科學原理，與夫實驗及臨牀試驗之結論，製成一種新化合物，名「足可淨」（2-異丙基 4-卞基 5-甲基 6-氯苯酚）。

「足可淨」為一種最有力之殺菌劑，其效能為苯酚之三百十倍，具有苯酚、甲基苯酚及卞基氯苯酚所有之綜合治療能力，功能滲透組織，肅清全部菌類，並不損壞皮膚及上皮細胞，實理想中最佳之濕氣或香港脚治療劑。

【主治】 香港脚，金錢癬，濕疹及其他黴菌傳染各病。

【用法】 先以溫開水洗淨患部，再以棉花棒蘸本品徐徐敷之，每日數次，治愈為止，凡香港脚初發或愈後復發時，均得用本品防治之。

【包裝】 每瓶五十公撮。

鈉化砒矯基(SODIUM CACODYLATE)

信誼清血針

【總說】 「鈉化砒矯基」，含有高量砒劑粉末，色白易溶於水，嗅之似汗尿氣味。砒劑本為神經系要藥，惟從前無注射之劑，專恃內服，效力難於準確。近年藥學進步，供注射用之砒劑，日新月異。本廠有鑒於斯，創製本品，以治世人之患虛弱症及皮膚病者。

【主治】 神經衰弱、心悸、眩暈、營養不良、白血球病、貧血症、肺結核及各種神經性疾病、皮膚病等。

【用法及劑量】 本品含量有二種，其一每支含〇.〇五，其

二每支含〇·一，宜依病情而選用之。皮下或肌肉注射均可，每日或隔日一次。注射次數較多者，宜於中間作數日休息。

【包裝】 10×1c.c. (0.05) 20×1c.c. (0.05)
 10×1c.c. (0.10) 20×1c.c. (0.10)

生理食鹽水注射液

(SOD. CHLORIDE AMP.)

本品用化學純粹食鹽溶解於滅菌蒸餾水內而成〇·四之淡量食鹽水。消毒嚴密。為無色透明之注射液。

【用法】 專供稀釋各種藥品及溶解六〇六注射等用。

【包裝】 每盒五支。每支二十公撮。十公撮。

【附告】 另有0.85%生理食鹽水，包裝每管 300cc及500cc，
10%生理食鹽水，包裝10×10cc.

柳酸鈉注射液

(SOD. SALICYLATE AMP.)
(0.25GM)

【總說】 「柳酸鈉」在藥理上有止痛、消炎、退熱三大作用。然除此等作用外，尚有利尿作用。故為止痛、退熱、利尿之要藥。消毒嚴密。無副作用。

本品為白色無臭之粉末。味甘絨稍帶辛辣。易溶於水。

【主治】 急性關節痠痛、尿酸性關節炎、胆石症、卞他兒性黃疸、心臟性水腫、滲出性肋膜炎、腹水、心臟性氣喘及急性腎臟炎。

【用法及劑量】 皮下注射，每日一次。

【包裝】 10×1cc.

司得命 (STAMIN)

【總說】 吾人遇休克、虛脫、暈厥、失神以及一切急性心衰

弱，暨延髓呼吸中樞麻痺時，尤宜用有效之興奮循環呼吸之劑。此種藥劑，市上品類雖多，欲求其有救急之確效者，百不得一。本廠有鑒於此，特製成新劑一種，名之曰「司得命」。

本品爲 Pyridine - beta - carbonic acid diethylamide 之 25% 水溶液，此種複雜的化學物質，對於心及延髓呼吸中樞之作用，不特與樟腦相同，且猶過之。

【主治】 (1) 傳染病經過中之心衰弱及虛脫：如傷寒、流行性感、白喉……等。(2) 中毒：如鴉片、砒、燐、 CO 、 H_2S 、安眠藥及酒類等急性中毒。(3) 急性虛脫及休克：如手術後心衰弱、失神……等。(3) 其他：如一切呼吸困難、窒息、癱、溺等。

【用法及劑量】 (1) 注射液：普通用皮下或肌肉內注射，重症不妨注射於靜脈內。每次用 1—3c.c. (小兒酌減)。應其需要反覆用之。(2) 內服液：每次 1—2c.c. 每日 2—4 次，小兒照減。

【包裝】 (1) 注射液 5×1cc. 5×1.7cc. 3×5cc.
內服液 10cc. 100cc.

司泰靈 (STARIN)

【總說】「司泰靈」之主藥爲醋醯柳酸，內服入胃，不礙消化，及達腸內，始將柳酸分解而顯其退熱作用。此外本品又能作用於中樞，而呈鎮痛作用，性質和平，絕無副作用，故可用於一切熱症及痛症，功效卓著。

【主治】 感冒、發熱、閉汗、偏正頭痛、風火牙痛、風濕骨痛、各種神經痛、及各種手術後疼痛等。

【服法】 每片含主藥 0.5 公分。

感冒發熱日服三次，每次一片或一包，重者每隔二時服一片（連服以二次爲度）。

頭痛、牙痛及各種神經痛等日服一次或二次，每次一至二片。

風濕骨痛，每日服二三次，劑量同上。

【注意】 本廠「司泰靈」另有粉劑，為家庭良藥。

【包裝】 10片 20片 100片 1000片

丟病速 (TERPINSAL)

【總說】 自刺激療法之說興，治療方法，另闢一新徑。松節油劑治法，亦為刺激療法之一種，創始於克林買勒氏 (Klingmuller)；跡其效能，注入後能促進體內自然之防禦性，舉凡一切化膿性炎症，用之有效，且此種療法，可與其他治療並行，故極便利。

本品為信誼藥廠幾經改良方始發行之百分之十松節油製劑，以上等橄欖油為成形劑，原料精純，一無雜質，且除主藥之外，復加入百分之一歐苦病 (Encubin) 及適量之阿那山信 (Anesthesin)，加以消毒嚴密，注射後並無疼痛硬結及局部化膿之弊，以之治普通瘡癤膿疱潰瘍，不難消退，而對於軟下疳，橫痃、副睪炎、淋性關節炎，及其他淋性併發症、膀胱卡他、白癬、紅色苔癬、傳染性膿疱疹等，亦可以輔助他種療法所不及，又可試用於子宮內膜炎及產褥熱。

【用法】 所用注射器最好用煮沸消毒法，如用酒精消毒，務宜用滅菌蒸餾水再三洗清。本品專供肌肉注射，以臀肌為最宜，切勿誤入血管內，有時亦可用於皮下。間日一次，或每三日一次，每次一公撮。

【包裝】 12×1c.c. (1%) 50×1c.c. (1%)

消治龍及聖露消治龍_二(對氨基·磺醯胺)噻唑 (THIAZON and SOLU-THIAZON)

【總說】 本廠所出之「消治龍」「THIAZON」牠的性質，和「Sulfathiazol」一樣。照試驗上證明，「消治龍」的毒性，比「Sulfanilamide」或「Sulfapyridine」約低百分之三十五至百分之四十，應用「消治龍」的時候，並無嘔心嘔吐等副作用，牠的劑

化作用的速率，比「Sulfapyridine」為快。

「消治龍」對於各種病症，由葡萄狀球菌，連鎖菌，淋球菌，肺炎球菌及其他病原菌而起者，在用極微量治療的時候，也特別有效力。

【主治】 各型肺炎，因寒冷而起的氣管支肺炎，急性及慢性淋病，淋性睾丸炎，攝護腺炎，陰道炎，子宮炎，輸卵管炎。淋性眼炎，癬疽瘡癤與其他由連鎖菌及葡萄狀球菌而起的各種化膿性疾病，本品並得用以治療傷寒痢疾及鼠疫等。

【用法】 除醫師別有指定外，每日三次至六次，每次一片至二片，飯前或飯後內服，服後應進多量之水。

(一) 每日四公分(八片)服二日。每日三公分(六片)服二日。每日二公分(四片)服二日。以上共服十八公分。

(二) 四公分(八片)服五日至七日。

茲為增進效力及易於吸收起見，本廠創製「聖露消治龍」，此乃滅菌純潔溶液，依照最新科學方法製成，「聖露消治龍」現已發行百分之二十滅菌溶液，每安甌分三公撮及五公撮二種，每公撮溶液含〇·二公分(「對氮·苯醯磺胺」噻唑)，更為便利應用於兒童起見，又創製百分之十滅菌溶液一種，每盒裝五安甌或二十五安甌，每安甌含二公撮，每公撮含主藥〇·一公分，「聖露消治龍」必須注射於臀部上外方陷凹處之肌肉內，則注射之後，不發疼痛，不生反應。

【禁忌】 「消治龍」對於金屬與砒素劑療法，以及其他疾病如惡性貧血，血友病，內臟重症，均禁用。

【包裝】 「消治龍」每片〇·五公分，每管二〇片，每瓶一〇〇片。「聖露消龍」每公撮含〇·一及〇·二公分「消治龍」。

5×2cc. 25×2cc. (每安甌等於 0.2 公分「消治龍」)

5×3cc. 25×3cc. (每安甌等於 0.6 公分「消治龍」)

5×5cc. 25×5cc. (每安甌等於 1.0 公分「消治龍」)

【附告】 另有「新聖露消治龍」可供口服及皮下肌肉靜脈注射等三用，包裝 5×3cc. 5×5cc. 25×3cc. 25×5cc.

消治龍眼藥水 (THIAZON EYE DROPS)

最新含“新消治龍”之特效眼藥水

【總說】 據近年眼科專家臨床研究之結果，知國人盲目原因多數由於沙眼一症，是欲求減少盲目數字，必先醫治沙眼。顯沙眼頑固難治，舊法局部磨刮以及滴入銻劑等，不但痛楚難忍，抑且遷延時日，而豫後如何，尙難肯定。自現代化學治療發明以來，醫界方面對於國人傳染最廣醫治最難之沙眼，其治療過程，大見縮短。在各類磺醯衍化物中，多數專家主用性能最優效力最宏之磺醯吡嗪唑化合物，輔以其他有效藥品，確爲治療沙眼及其有關眼病之最好辦法。

本廠新出品之「消治龍眼藥水」，其主要原料卽屬磺醯吡嗪唑化合物之“新消治龍”。不僅爲眼科收斂劑，并爲防治沙眼及其他輕微眼症之特效良藥，其優點如次：

- (一) 品質中性，不帶刺激。
- (二) 效力神速，應用便利。
- (三) 收斂小血管，退炎消腫。
- (四) 功效超越他種藥品，絕無不良副作用。

綜上各點，凡欲醫療沙眼及赤眼，眼部發炎，膿漏等症者，以本品最爲穩速可靠。

【主治】 卡他性，格魯布性，化膿性及濾泡性結合膜炎，沙眼性角膜炎，角膜化膿，赤眼，眼部充血，膿漏，羞明流淚及有關沙眼各症。

【用法】 本品裝入特製眼藥瓶內，攜帶應用，極爲便利，眼科病人，每日得點滴數次，或照醫師囑咐。

【包裝】 瓶裝十五公撮

消治龍藥膏 (THIAZON OINTMENT)

最有效之皮膚病聖膏

【總說】 「消治龍藥膏」之成分，內含5%消治龍(對氮·羰

「噻唑」，20%白羊毛脂，5%氧化鋅，70%乳溶製劑與足量之甲種維他命混合而成，對於各種皮膚病之外用，效力佳良，且無毒性及臭味。

吾人皆知人身之皮膚，終身暴露於空氣中，極易為細菌所侵犯及刺戟，故如遇傳染，應及早醫治，「消治龍藥膏」對於下列各症，極為適宜：

(1) 膿皰病：— 用「消治龍藥膏」，極易治癒，尤以兒童患膿皰病者，治癒更為迅速。

(2) 香港腳：— 「消治龍藥膏」產生消毒及和緩作用，制止癢感，殺滅細菌，促進患部之迅速痊癒。

(3) 疥瘡：— 用「消治龍藥膏」，立可獲癒，因其顯著之殺菌作用，可使寄生於皮膚內之疥蟲，一掃而光。

(4) 瘡癤：— 「消治龍藥膏」殺滅葡萄菌及連鎖菌，故預先應用之，決不變成膿瘍及潰瘍。

(5) 水火燙傷：— 敷以「消治龍藥膏」，吸收極速，透入組織內，使局部迅速乾燥而治癒。

(6) 挫傷，割傷及各種小損傷與其他癢性皮膚病：「消治龍藥膏」得預防其化膿，殺滅細菌及使迅速痊癒。

(7) 急慢性濕疹，凍瘡痔瘡：— 用「消治龍藥膏」亦有相當效力。

【用法】 用熱水洗患部，而以軟毛巾按吸之，（不可磨擦），然後塗「消治龍藥膏」於紗布或法蘭絨上，敷於患部，一日數次。

【包裝】 每盒二十公分。

【附告】 另有「消治龍藥皂」THIAZON SOAP，芬芳潔白，專治面部粉刺及濕疹等，可供化粧及醫藥兩用。

消治龍牙膏 (THIAZON TOOTH PASTE)

潔齒固齦及保護口腔之「消治龍」製劑

【總說】 據現代醫學理論，口腔衛生之重要性，不下於人體

者器官之衛生。願國人因醫學知識之缺乏，對於口齒牙齦，向少注意。各地男女學童以及生長期青年之患齲齒（俗稱蛀牙）及齒槽膿漏等症者，隨處可見，結果所屆，往往招致消化不良性胃病及風濕病等嚴重後果，誠衛生上一大問題也。

「消治龍牙膏」與普通牙膏有別，因本品採用科學上特殊方法，煉成化學製劑，功能殺菌潔齒，嚴密保護齒齦以及口腔粘膜，消產防腐，無微不至，堪稱齒科聖劑。吾人每日採用本品，能使口腔清潔，齒堅齦固，適合衛生。

本品以殺菌專劑，「消治龍」為主劑，配製新穎，芬芳適意，對於齲齒，齒槽膿漏及口腔任何部分粘膜發炎，用之莫不迅奏膚功，長用本品，尤收預防之效。凡常患口腔疾病，欲求有效防治者，曷試用之。

【主治】 齒槽膿漏，齲齒，齒齦及口腔粘膜發炎等症。

【用法】 每日晨起及晚間臨睡前各用本品一次。搽牙膏致於牙刷，斜插齒外，用手推動，由上向下，再由下向上，圓轉輪推，勿過用力。使齒縫所嵌食屑完全清除，以防齒穢蓄積，釀成牙病。

【包裝】 每管六十五公分。

多年可 (TONICOL AMP. & SYRUP)

補血健神注射液及糖漿

【總說】 吾人每日所攝取食物中之營養成分，常感不足，或選擇不得其法，所食者無補於營養，或烹飪不得其道，雖食之而被攝取於體中者仍屬少數。又食物中常含有各種維他命，若食物取舍失宜，或加熱不得其法，即被破壞或喪失。

夫供給之量既不足，而一日工作仍繁忙不減，勢必致體內營養分不足，寢假而血虧矣，形銷骨立矣，疾病乘間侵入矣。吾人處此生存競爭劇烈之時代，對於當前之重要問題，又曷可不求補救之方法哉？本廠有鑑於此，特精選人體必需之養素，如血色素、肝膏、甘油磷酸鈣、甘油磷酸鈉、鈉化砒糖基、及維持人體生

存必要之乙種維他命與丁種維他命，更配以強壯健胃良藥如規那皮、可拉、番木鱈等，運用特殊的化學技術，精製一種入體即起同化，迅被吸收之滋養品，名曰「多年可」健神補血注射液，並製成內服糖漿。以貢獻於當世。此等原料，實即各種飲食品之精華，以之供給人體，不特足以彌補其虧耗，且使精神益形煥發，體力愈臻壯實，長久注射或服用，洵能達到延年益壽之域者也。

【成分及性狀】 注射液分強弱兩種，分量上稍有差異。其中所含，為：(1) 治神經系要藥之鈉化砒矯基 (Cacodylate Sod.)。(2) 治神經衰弱、營養障礙、腺病、結核等之甘油磷酸鈉 (Sod. Glycero-phosph.)。(3) 有增進食慾及興奮胃機能性之硫酸士的甯 (Strychnine Sulf.)。

糖漿之成分：(1) 血色素 (Haemoglobin)。(2) 枸橼酸鉄鹽，功能加生血液及增進體重。(3) 甘油磷酸鈉 (Cal. Glycero-phosph.)。功能補骨。(4) 乙種維他命 (Vitamin B) 增加人體對於傳染病之抗力，治脚氣病。(5) 可拉 (Extr. Kola) 有補腦開胃之功。(6) 番木鱈流膏 (Liq. Strychnine Sulphate) 有健胃強壯之效。(7) 香料及防腐劑 (Flavor & Antiseptics)。

本品為補益腦髓、神經、肌肉、骨骼之滋養品，故職務繁忙者用之，能補養其所耗廢之腦神體力，防禦身體之疲勞現象（如頭痛、精氣不爽之類）。因其易於同化，故又可用為老年人營養品。性質王道，宜於常用，絕無習慣性，為最完美之大補劑。

【主治】 舉凡諸虛百損、憂勞過度、惡性貧血、胃呆、失眠、健忘、產後、癆瘵、瘧疾、病後或各種傳染病後之營養不良、體弱善病、可用之。

【用法】 注射液分強弱兩種，每盒均裝十支、每支一公撮（強弱均有）；或每盒十支、每支二公撮（強）。每星期注射三至五次，皮下注射。

糖漿每瓶含量為八兩，成人每日三次，每次一湯匙，飯後服之。兒童視其年齡遞減。

託靈保賽爾 (TRANSPULSAL AMP.)

【總說】「託靈保賽爾」乃將奎甯樟腦溶化於植物油內，專爲肺炎與支氣管炎等症治療之用，爲合理的新藥。

本品中之奎甯，對於肺炎球菌等之染疫性，有強力之抗菌力，即本品中之樟腦，更有協助減去肺部充血之特效，用後使各藥同時運輸至肺，再由呼吸道排洩出外。排洩之時，在黏膜上發揮其解毒消炎祛痰作用，故本品之功效全集於肺，誠惟一良藥也。

【主治】急性慢性氣管炎、發臭性支氣管炎、支氣管化膿性加答兒、支氣管肺炎、手術後肺炎、氣管擴張、肺膿腫、肺壞疽等。

【用法及劑量】本品供肌肉內注射（臂部），每日一至二公撮，用至一二星期爲止，慢性支氣管炎，在起初二星期內，每日注射一次，每次二公撮，以後每間二三日或一星期注射一次，每次一至二公撮。

【包裝】每盒分五支、十支及五十支裝三種。每支一公撮及二公撮二種。內含奎甯○·○三公分，樟腦○·○二五公分。

萬可靜片 (VECOSIN)

止痛新藥

【總說】本品由非那西汀 (Phenacetin)、肥羅那 (Veronal) 及咖啡因 (Caffein) 三者所合成。三者合而爲一，鎮痛作用加強，催眠作用消失，乃根據於合併治療的學理而成。

【性質】「萬可靜」爲淡白色之結晶性粉末，有一定之熔點(95°C.—97°C.)，冷水中不易溶解，在熱湯中及有機性溶劑中，容易溶解，其水溶液呈黃色。無副作用，不成癮，不礙心臟。

【主治】各種頭痛、偏頭痛、各種神經痛、外科手術後疼痛、創傷痛、跌打損傷痛、牙痛、拔牙後及一切手術後疼痛、經期腹痛、經前腹痛、產後痛、小產痛、月經閉止期之頭痛及子宮痛

、風濕骨痛……………等。

【用法及劑量】 普通每日一次，每次一片，溫湯送下。如欲多服，須由醫師規定。

【包裝】 每管分10、20、50、500片四種，每片含量為0.4公分。

胃天定(VENTIDIN)

(鹽酸希司的定) 胃潰瘍及十二指腸潰瘍特效藥

【總說】 胃天定(希司的定)為一種氨基酸，乃正常營養所必需。據埃龍 Aron 及韋司 Weiss 發見，胃及十二指腸潰瘍，是由缺乏某種氨基酸之故。又據孟氏 Mann 及威廉生 Williamson 云，如以十二指腸液，胰液，胆汁等天然分泌物，由十二指腸切除部逆流入於迴腸終末，則胃中發生潰瘍，而營養即起障礙，此因腸中缺乏腸活素，更因消化液中缺少遊離「希司的定」之故也，如以此種氨基酸(希司的定)供給之，則無潰瘍發生，而其變化，亦得預防。臨床上證明，在輕症潰瘍，用「希司的定」治療，而食物不加限制時，則病人之症狀，立予改進。愛克司光上所見之異常，立即消失，體重增加，病人一般營養，立刻復元。

【主治】 胃潰瘍，十二指腸潰瘍及胃酸過多等。

【用法】 用「胃天定」治療時，當以肌肉注射二十四次為一劑，一日注射一安瓿(五公撮)，連注二十四日，此種療法，對於一般可忍受之休息及鹼性營養規則，為有力之輔助劑。

「胃天定」為滅菌百分之四等滲性溶液，立可應用，其效力在注射至第四或第五針後，即可發生，疼痛消失，嘔吐，酸汁過多，及胃上部之膨滿，大為減輕，注射至第十針以後，則主要症狀消失，胃臟正常空虛時間及正常蠕動，均可復元，胃痙攣亦消失，此後則食慾增進，體重增加，而病者健康如恆矣。如果復發，則仍以本品注射，以資預防。

【包裝】 每盒分六安瓿及二十五安瓿，每安瓿容五公撮之百分之四滅菌鹽酸「希司的定」溶液。

維康通(VIGOTON)

十全營養大補劑

【總說】「維康通」爲一般衰弱症最有效之大補劑，氣味芬芳，其中因甘油磷酸鹽之存在，效力更佳。本品之特點，爲乙一乙二維他命及丙種維他命之加入，此種藥物，在普通補劑中，極少含有者，其他成分，均經科學分配，含量極爲準確，此又與其他補劑不同之點。內服之後，即從消化器吸收，而使各臟器之機能，立加調整。每一百公撮中，其內容成份，含量如下：

乙一維他命	二千國際單位	乙二維他命	四百雪門單位
丙種維他命	五百國際單位	核素酸	四百公絲
甘油磷酸鈣	八百公絲	甘油磷酸鉀	八百公絲
甘油磷酸鈉	四百公絲	甘油磷酸鐵	二十公絲
甘油磷酸奎甯	十公絲	甘油磷酸鎂	十公絲
甘油磷酸香木鱈鹼	六公絲		

【主治】「維康通」對於神經衰弱，貧血，萎黃病，軟骨病，均極有效，尤以急性傳染病之恢復期，如傷寒，肺炎，流行性感冒，妊娠期及哺乳期以及食慾不振，消化不良，皆極適用。

「維康通」作爲一般補劑應用之外，更在戒鴉片，海洛英及其他麻醉品之前後，用之甚爲有效，如長期服用，效力更大，毫無流弊。

【用法】成人每日三次，每次一至三茶匙，食後服用。兒童半至一茶匙，和以溫開水內服，或按其年齡及疾病之性質而斟酌之。

【包裝】每瓶十二兩

維他新及維他新濃

(VITASIN AND VITASIN STRONG)

乙種維他命結晶標準製劑

【總說】爲調和身體之生活現象，且使發揮其自體機能之故

，需向外界攝取養素，但除五大養素以外，尚另需某種重要之成分，即維他命是。此為(Casimir Funk)氏在公歷1911年所定之名稱，但當時最初所發見者，即為現時所稱之乙種維他命 Vitamin B。自乙種維他命發見後，甲丙丁……等相繼發見，然乙種維他命實為嚆矢也。

今以標準品為原料。按照國際聯盟所定標準單位，嚴密定量，製成信誼乙一維他命 Vitamin B₁ Crystal 製劑，特名之曰：「維他新」。歷經各大醫院臨診試驗，認為與市售粗製品有霄壤之別，其化學方式，為 C₁₂ H₁₆ N₄ SO (B₁)，屬水溶性維他命，為白色結晶體，微苦無臭，溶融點為攝氏250°，呈中性反應。

【主治】 脚氣 Beri-beri (衝心性·浮腫性，神經炎性，) 乳兒脚氣，自己中毒，中毒性多發性神經炎，細菌毒性多發性神經炎，各種原因不明之神經炎，白喉後麻痺。

本品並供各外科臨證及上列各病之預防。

【用法】 (一) 注射液每日注射一次，以皮下注射為原則，必要時可作靜脈注射，或每日皮下注射二次。

(二) 片劑分每片含B₁晶體0.375公絲即(125國際單位)及1.5公絲即(500國際單位)兩種，一日三次，每次服一至二片，為預防用；每次服二至四片。為治療用；無論食前食後時間皆可。

(三) 液劑每公撮含乙一維他命二百國際單位，成人每日用一茶匙，幼童減半服用。

(四) 粉劑每公分含乙一維他命五百國際單位，成人預防用每日半公分，治療用每日一公分，幼童減半服用。

【包裝】 片劑： 有 125國際單位(0.375公絲)，及500國際單位(1.5公絲)，分二十片及一百片兩種。

滴劑：五十公撮及一百公撮二種(每公撮等於二百國際單位)

粉劑：五十公分一種(每公分等於五百國際單位)

注射劑：每支一公撮1.5公絲=500國際單位

每盒分五支及十支

每支一公撮3.0公絲=1000國際單位

每盒分五支及十支

每支一公撮4.5公絲=1500國際單位

每盒分三支及十支

每支一公撮7.5公絲=2500國際單位

每盒分三支及十支

每支一公撮15.0公絲=5000國際單位

每盒分三支及十支

每支十公撮，每公撮含2500國際單位及

5000國際單位二種

【維他新濃】片劑：分二十片及一百片，每片含B₁結晶體 6
公絲。

注射劑：每支一公撮30公絲 每盒分三支及十支裝二種

每支二公撮60公絲 每盒分三支及十支裝二種

每瓶五公撮，每公撮含B₁結晶體30公絲

維他賜保命針劑及丸劑

VITA-SPERMIN (AMP. and TAB.)

【總說】本廠曾經多年之科學的悉心研究，製成一種完全無
偶之臟器治療劑，即舉世聞名之「維他賜保命」，供給於各大醫
師應用。

「維他賜保命」為牲畜腺臟器之自主性荷爾蒙精汁，合以各
種必要之維他命與礦物質而成，乃最前進之科學的臟器治療法也。

。「維他賜保命」更為一般大補劑，效力確實，振奮新陳代謝機
能，而具解毒作用，經嚴格試驗，絕端有效。

【維他賜保命】針劑之成分

(甲)男用：牡牛睪丸之荷爾蒙結晶

胎盤、腦下垂體「全體」、腎上腺、甲狀腺、鹿茸精、乙維
他命結晶、丙維他命結晶。

(乙)女用：卵巢荷爾蒙結晶

胎盤，腦下垂體「全體」、腎上腺、甲狀腺、鹿茸精、乙維他命結晶、丙維他命結晶。

【多腺治療法】生物學家指出，人體內各種臟器，組成一種系統，各種不同器官，均有互相依賴之作用，如一臟器發生疾患，則其他臟器，遲早必受其影響，而其系統不能繼續調整，所以多腺之紛擾，較一腺疾患之遭遇為多，故用藥治療，必須幾種腺中精汁同時應用，此種治療方法，通常謂之多腺治療法。

「維他賜保命」為一種多腺製劑，能刺激內臟分泌，促進基本新陳代謝，增強神經及維持內分泌系統之平衡，因此關於多數生理的及精神的疾患，本品為基本治療之要藥。

【主治】「維他賜保命」主治下列各種疾病：

神經衰弱、一般衰弱、精神上及身體上之消耗、陽萎、貧血營養不良、失眠、食慾缺乏、記憶力減退、睡眠不足、心臟衰弱、心悸、未老先衰、肥胖、胃腸疾患、青春發育之遲延、無月經、月經困難、月經閉止期之疾患、躁病、(歇私的里)性感缺乏、不妊娠、腳氣、軟骨病及其他維他命缺乏之各種疾病。

【用法】「維他賜保命」針劑，分男用女用二種，普通劑量，每日皮下或肌肉注射一安瓿，在重症，一日可注射二次至四次，(即二至四安瓿)。

連續注射三十針之後，需休息數日，再行繼續注射，當用於戒鴉片，海洛英，及其他麻醉品嗜好時，則必在發覺前半小時注射之。

在毒癮極深者，則每一日間可注射四至六安瓿。

「維他賜保命」對於心臟神經系及身體其他各部，縱長時期應用，亦絕不發生有害作用。

【包裝】男用10×2cc 女用10×2cc

【附告】另有「維他賜保命丸劑」功效相同，分男用女用兩種。

【包裝】男用每瓶五十片，百片。

女用每瓶五十片，百片。

維他多勁(VITATOGIN)

【總說】本品爲高價蛋白質乳酪素，及有機磷鎂鎂等煉製而成。夫有機磷對於人身關係之重要，在具有醫藥常識者，類都知之，毋庸贅言，尤其對於腦及神經細胞關係更密，因有機磷本爲神經組織之主成分，及其他細胞之必需物，能促進細胞之再生，及機能之活躍；假如一旦缺乏，則細胞及營養必大受損害。準是言之，故本品對於神經衰弱及一切虛損無不奏偉大之功效，即蛋白質及乳酪素本爲滋補營養劑，復經化學煉製，故無論胃腸消化力如何薄弱，仍極易吸收輸送身體各部，而發揮其效力。

本品原料精純，消毒充分，故雖經久貯，決不變性，常能保有高超之醫療價值。

【功用】本品因內含豐富之有機磷，爲神經組織之主成分，前已言之，對於腦及神經細胞之再生力甚強，對於該組織機能之活力，亦能迅速催進。故凡患記憶力減退、思想遲鈍、精神疲乏、腦力薄弱、失眠、憂鬱等神經衰弱患者，或用腦過度者，本品爲無上之對症妙藥，如能時常服用，無不克奏奇功。

此外貧血萎黃病，月經過多，產後失血等之血虧症，能常服本品，因中樞主宰之興奮，鼓動造血臟器，促進血液之新生，短時期內產生適當量之新鮮血液，輸送各部，於是向之面黃肌瘦頭暈目眩，形容枯槁者，能漸變爲儀貌豐腴，皮色紅潤，精神煥發矣。他若月信之愆期者，服之亦奏偉效。

其他因胃腸慢性炎症所致之消化機能薄弱，或營養不良，癰腫，或結核之惡液質，及痛風腎臟炎等，常服本品，必獲奇效。

糖尿病患者，吞服本品，效果亦佳，因本品內並不含有糖質澱粉以及炭水化合物，並可增進營養以維持體力，而漸趨痊癒之途。

【主治】神經衰弱，腦燥病，怔忡症，貧血，腦力減退，思想遲鈍，未老先衰，營養不良，食慾缺乏，消化不良，一般虛弱，先天不足，病後調理。

【用法及劑量】 用本品兩茶匙，約加三倍量之冷水調和，使成漿狀，然後徐徐加足適當量之水（約一茶杯）即成。冷熱均可，或用牛乳、朱果力、可可調製，味更鮮美。

成人每日三次，每次兩至四茶匙，食後服用，小兒十歲以下減半，嬰兒於生後一月，即可調服少量。

【包裝】 每瓶四百五十公分（一磅裝）

食母生(ZYMASUN)

酵母·麥芽胚胎膏·維他命·營養素合劑·

【總說】 生理學上所詔示：「吾人之成長，發育與繁殖，皆惟酵素是賴。」故酵素之作用設有欠缺，必予健康以大影響。以吾人營養生理言：「蛋白質，脂肪，炭水化合物，三者為主要之營養素，攝入體內，供新陳代謝同化作用之材料，營種種分解作用而作成有效之營養材料」，此又為吾人所夙知者。

本品之調製，以上述之理論為根據，以助消化，利營養，輔治療，增抵抗為應用目標，故患胃病者，虛弱者，肺癆病者，神經衰弱病者，設投以本品，行見其食慾增，血液足，精神振，體重增加，睡眠安暢，大便通利，精力恢復。如以本品投與孕婦，則直接可增進妊娠之健康，間接可使產褥平安，泌乳作用昂進，並使嬰兒易於發育，又因本品之能催起白血球噬作用等之故，有殺菌作用，故能解除飲食中毒及輔佐傳染病治療焉。

【成分】 1.維他命甲，乙₁，乙₂，丁，及戊。 2.酵酶如蛋白酶及澱粉酶等。 3.銻基酸。 4.鈣鐵磷等。

【主治】 「胃腸病」食慾減退或缺乏，急性及慢性胃腸炎，胃酸過多，胃弛緩，習慣性便秘。「血液病」各種貧血。「腎病」浮腫，腎臟炎。「衰弱病」神經衰弱，衰老，營養不良。「維他命缺乏」腳氣，陪拉格病，佝僂病……。「兒科」消化不良，營養障礙，吐乳，便青，乳兒腳氣。如加入人工營養品中用之，能助長發育，消除疾病。「婦產科」產前產後虛弱，惡阻，子癇，浮腫，乳汁不足。

【用法】 成人每次服四至六片，飯前飯後皆可。如欲催進食慾，應於食前一小時服之，每日三至四次。小兒七歲以下者，每日八片，四歲以下者六片。一歲未滿，每日至多用四至五片。嬰兒以一片起始，漸次增至二片爲止，可混入乳汁中。


【包裝】 片劑一瓶裝分一百，三百及一千片。

粉劑一瓶裝分廿五公分，一百公分及五百公分。


【注意】（一）本品無配合禁忌，儘可與他藥配合同服。

（二）本品有引濕性，須放於乾燥寒冷處，宜將瓶徑密塞。

（三）另有液劑，包裝分三十公撮及百公撮兩種。



凡有信誼商標的藥
品，皆屬良藥。
品質高超，
成分準確。



藥膏 針劑 片劑

最新磺醯胺噁唑化學製劑

消治龍

消治龍為本廠獨特出品譽滿全國之特效良藥主治肺炎腦膜炎淋病傷寒痢疾丹毒瘡癩喉蛾各種化膿性疾病暨由練球菌葡萄球菌所引起諸病練製精純不起反應功效之神超過一切類似製劑

TH.5

信誼批發製藥廠監製



楊 氏 良 藥

楊樹勳博士為現代名化學家，
創辦楊氏化學治療研究所，發明各
項化學治療專劑，其成績及貢獻，
彰明昭著，茲將本廠經售各項楊氏
良藥，開列於後，以供醫界先進之
採擇，儻亦愛護國產新藥之士所樂
予賞用者也。

中華民國三十三年九月

信誼化學製藥廠謹啓

使先覺後 使先覺後 知後覺先 知後覺先

羊頭牌

新惜花散



吾國先哲創造發明聖蹟
簡篇今有楊樹勳博士創
製之新惜花散治梅毒瘰
癧疾藥力安全收效迅速
與舶來品比較有過之無
不及目的為滅絕病源實
担挽回國家瀕危一

四. 禹高
疏濬河流
以治水患



五. 秦始
皇築長城
以禦胡人



六. 華佗
精於方藥
以醫聞名



七. 楊製
新惜花散
以治梅毒

一. 伏羲
氏畫八卦
以定乾坤



二. 神農
氏嘗百草
以療疾病



三. 黃帝
作指南車
以滅蠻元

信誼藥廠



楊氏化學治療研究所 製 造 者

NE.4

新惜花散 (NEO-SYPHARSAN)

吾國首先發明之有機砒製劑

「新惜花散」爲吾國首創之新砒素驅梅毒特效藥。夫砒之應用於梅毒，已行於古代，泊夫耳氏發明六〇六及九一四劑後，治療界上，放一異彩。各國學者，踵起研攻，數十年來，世界各國均有出品。我國學者在近十年來，研究此種製劑者頗多，楊氏化學治療研究所所長楊樹勳博士，爲當世化學專家，對於化學療法之研究，早登堂奧，就其以前在美國洛氏醫學研究院，北平協和醫學院，國立中央研究院之研究業績，早爲本國學術家所震驚，今楊氏所發明之「新惜花散」，卽治梅毒特效之新砒劑，其化學構造，臨證治效，悉與耳氏所發明者無甚差別，早經數萬次之生理學及化學試驗，證明其合於新砒劑之標準，卽對於螺旋體撲殺之效力著，對於人或動物組織之毒性輕，並無副作用，又經各大醫院各專家臨證試驗，均有詳細之報告，認爲確實有效，始敢問世。

「新惜花散」自着手研究至首次發行，計費時七載有餘，最初成功之年，爲民國二十五年。

「新惜花散」一切之試驗，均合國際標準。

【性狀】「新惜花散」爲淡黃色粉劑，裝入真空玻璃管中，雖久藏不起變化。在臨用鋸開時。聞得特殊芬芳之味，鋸開後須立即應用，否則卽起化學的變化。以之溶解於水，呈淡黃色液，成中性或弱鹼性(故可免除加入鈉鹼液以中和之勞)，含砒量約19%。

【用法】「新惜花散」溶於重製蒸餾水，約製成5—10%液，(卽0.45之「新惜花散」，可溶於10—5c.c.之水中，餘稱是)，或用生理食鹽水，葡萄糖液作爲溶劑均可，惟製就後須立即注射。

「新惜花散」專供靜脈內注射之用，注意勿使漏出靜脈管之外，如有點滴流出，可用信誼重蒸餾水注入其周圍以稀釋之。

【指證】「新惜花散」專治各期梅毒。

此外主治瘰癧，回歸熱，鼠咬病，雅司，楊梅癩，假性白血

病及一切螺旋體惹起之疾病。

【用量】 「新惜花散」每安瓿之含量如下：

(1)	0.15	(2)	0.30	(3)	0.45
(4)	0.60	(5)	0.75	(6)	0.90

「新惜花散」之用量，依年齡及病象而定：

病人	新惜花散
成人	0.45—0.60gm.
女子	0.30—0.45gm.
小兒	0.15—0.30gm.
嬰孩	(體重每一公斤)	0.01—0.03gm.

每滿一星期，注射一次。可依病情自小量用起，繼續加增之，與汞，碘，銨劑之能否並用，視病情而定。

【包裝】 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 均有，每匣分一支，十支，五十支三種包裝。

腦絡惜花滅(NEUROSYPHAMIDE) (TRYPARSAMIDE)

【總說】 「腦絡惜花滅」之化學成分為 Sodium salt of N-p henylglycineamide-p-arsenic acid. 其分子式如次：



本品為白色無臭之結晶體，易溶於水，在普通情況下尚屬安定；惟不能置於高溫度中，直接日光下潮濕之處，并不可與化學類氣相接觸。

本品含水百分之二·五至三·五，含砷百分之二五·一至二五·五，含氮百分之九·二五至九·六。

【主治】 「腦絡惜花滅」為最佳之神經梅毒治療劑。對於神經系之透入力甚巨，故除為中樞神經梅毒之特效藥外，對於腦膜

血管神經梅毒、全身瘰癧、癩疾瘋癱、癩波症、脊髓癆、癩痺症等，均有藥到病除之功。

【用法及劑量】「腦絡惜花滅」，普通行靜脈內注射，但亦可作皮膚下或肌肉內注射。施行靜脈注射時，須斟酌病狀之輕重，大約用一至三公分之本品溶於十公撮之消毒蒸餾水內。

成人量為一至三公分。就普通情形論，大約每公斤之體重，至多只宜用〇・〇四至〇・〇五公分。每次注射之距離。至少需隔一星期。

「腦絡惜花滅」之晶體或其溶液，均不宜再事消毒，因本品在高溫或直接日光下，均易分解，而增加其毒性，且減低其治療力也。

【注意】一、「腦絡惜花滅」極易溶於水，故其水溶液應極清明。倘溶液略呈混濁，絕不可用。


二、用「腦絡惜花滅」注射之前，及注射之後，一星期或二星期內，必須檢查病人之視力及其眼球週圍之大小。

【包裝】第一劑—安瓿(1.0) 第二劑—安瓿(2.0)
第三劑—安瓿(3.0)

肌安惜花散 (THIO-SYPHARSAN)

專供肌肉注射用之阿斯反納明劑

【製造與鑑定】「肌安惜花散」為 Dihydroxy-diamino-arsenobenzene-N-Dimethylene sulphonate 之鈉鹽，如下列之化學構造式：



「肌安惜花散」係由楊氏化學治療研究所楊樹勳博士監製，製造完全歷程中，均異常謹慎，十分正確，以防鼻入毒性之副產品。每批「肌安惜花散」在發售供臨牀應用之前，均先付化學的與生理學的檢查以及臨牀實驗。至於毒性及治療的效價，係由醫學博士楊菊貞依照美國衛生試驗所之標準予以測定。其所用之試驗動物為白鼠。

【理化學的性質】「肌安惜花散」為黃色輕性粉末，極易溶解於冷蒸餾水中而成橘黃色溶液，此溶液為中性或弱酸性。每批粉末色澤之輕重不同，並不重要，乃屬於物理的原因者。「肌安惜花散」化學上雖極似「新惜花散」，然二者之構造式，自有不同之點，茲不贅言。「肌安惜花散」之含砒量為百分之二十，其最大優點，為不易氧化。

【治療功用】「肌安惜花散」普治初期梅毒、早發的及遲發的第二期梅毒，並防阻梅毒之進行性移動性失調症。其對於密螺旋體作用較慢，故得用於循環器及神經器之梅毒。其治療效能顯出於注射後第三或第四日，而新惜花散在二十四小時中顯出。

「肌安惜花散」最適用於兒童婦女之靜脈太小，不易行靜脈內注射而適用於肌肉注射者。

【劑量及用法】普通劑量，由年齡及體重而不同，如下表：

病人	用量
小兒	體重五公斤以下者 0.005—0.01 gm
	體重六至十公斤者 0.01 —0.03 gm
	體重超過十五公斤者 0.05 —0.1 gm
成人	0.3 —0.6 gm
成人每體重一公斤可用「肌安惜花散」	0.01 gm

「肌安惜花散」謹慎裝入安瓿中，每安瓿之含量、計分六種：

- (1) 0.1 gm (2) 0.2 gm (3) 0.3 gm
 (4) 0.4 gm (5) 0.5 gm (6) 0.6 gm

如欲用極小量之「肌安惜花散」，可以最小量(0.01)溶於蒸餾水十至十五公撮中，酌取若干公撮即得，例如欲用「肌

安惜花散」〇・〇一，則即取「肌安惜花散」之1%液一公撮可也。

溶解「肌安惜花散」所用之蒸餾水，小劑量至少需用一至二公撮。0.3至0.6之劑量，至少用三公撮。

【注意】「肌安惜花散」注射時所調製之注射液，愈新鮮愈妙，既將安甌錫開後，逕宜應用，不可放置。在注射時須注意確實注射於肌肉內，切勿侵入皮膚。

【包裝】（1）每匣一支 每匣十支（各種劑量）

消發滅定片劑及粉劑

(SULFAMIDINE TAB. and PULV.)

(P-Aminobenzene-sulphonamide)

【總說】本品用純粹之白色對位氨基磺醯胺P-Amino-benzene-sulphonamide 之結晶品，加工製成。無臭，微辛辣，有合乎法定標準之輕毒性，具極高貴且極確實治效。依生物檢查，白鼠每體重二十公分，平均致死量需一百公絲，故毒性極輕。本品對溶血性鍊球菌屬原因性之病症，奏化學的治效，〔惟對於普通鍊球菌無效〕，對於由大腸菌、赤痢菌、氣體桿菌等原因而起之疾病，為效亦宏。最近又知本品可用於瘧疾等血液寄生病。

【主治】因溶血性鍊球菌而來之疾病，因瘧疾病原蟲、肺炎球菌、腦膜炎球菌等原因之病、丹毒、猩紅熱、膀胱炎，敗血性疾病，敗血症、膿毒炎、產褥熱、中耳炎……。

【用法】（1）治療用：輕症一日三次，每次用〇・五者一片或〇・三者二片，食後，連服數天，症狀即可消失。中等症一日三次：每次用〇・五者二片或〇・三者三片。服若干天後，症狀漸減，則每次用〇・三者二片或〇・五者一片，一日三次，繼續用二日或二日以上，至症狀全失為止。重症一日三次。每次用〇・五者三片，或〇・三者五片，食後，症狀略減，每次可減其用量，即一日三次。每次用〇・三者三片，或〇・五者二片，連

服若干天。

(2) 預防用：本品可預防一切可致敗血膿毒症之疾病及流產，各種傳染病之化膿性續發症，如中耳炎、內耳炎、關節炎、齒齦炎等，適用於原因於溶血性鍊球菌之病症，如猩紅熱、麻疹、扁桃體炎、風濕等疾病。且可預防扁桃體之傳染。每日三次，每次用○，三者二片或○，五者一片，食後嚼服，或含於口內，用牛乳或茶送服均可。

【注意】「消發滅定」，實為六〇六號後化學治療空前之大發明，對於鍊球菌疾病，及其他傳染病之適用本品者，罔不收水到渠成之效，惟不能不為醫界告者，此種製劑，亦與新砒劑同，每有在意料中之副作用，最輕者為胃之障礙，其時每有惡心，如有此等症狀，宜將劑量減少，同時內服稀鹽酸即可解之。

凡有腎病者。用本品宜特別注意，因腎既有病，排泄必較普通為遲，防其有蓄積作用。

用本品時，忌用一切麻醉催眠及Aniline類，Phenyl-hydrazine類止痛劑瀉藥，如必需用瀉藥者，僅許用流動石蠟。

在用本品之經程中，應隨時檢查血液，恐血色素起化學的變化也。

【包裝】 (一) 每瓶二十片，每片○·五公分 (二) 每瓶一百片，每片○·五公分 (三) 每瓶二十片，每片○·三公分 (四) 每瓶一百片，每片○·三公分


購買時請指定一種

【附告】 另有粉劑，性能相同，包裝分25公分，100公分，500公分三種。

聖露消發滅定(SOLU-SULFAMIDINE)

【總說】 本品為楊氏化學治療研究所出品，在楊樹勳博士親自監督之下，製成及檢定，極合於醫師對於注射用的需要。

牠的化學上名稱：是 disodium salt of N (phenylproyl)-Sulfonamido- α - γ -disulfonic acid，牠的化學上構造：



本品為白色粉末，在水中很易溶解，為無色及中性的溶液，牠抵抗連球菌及傳染性的力量，是很大的，同「消發滅定」一樣，但是牠的好處，就是易溶於水，且可作為注射之用。

【適應症】 本品的適應症，同「消發滅定」一樣，因為「消發滅定」僅可用於內服，所以對於預防方面，是很有用的。「聖露消發滅定」能迅速產生高度作用，所以對於治療方面，是很有力量，且是必需的。

本品的主要適應症是溶血性連球菌，淋球菌，腦膜炎球菌所引起的疾病，丹毒，扁桃腺炎，膀胱炎，敗血症，產褥性敗血症，猩紅熱，中耳炎等。

對於本品的治療，要牠發生強大效力，須內服與注射聯合施用，其結果必佳。

【用法】 本品可用於靜脈，筋肉及皮下注射，有時也可注射於脊髓管內，靜脈注射以及用大量注射，並無任何危險的。一次的注射量為20c.c.；應疾病的需要，每天可注射數次，24小時內可用至60c.c.的分量，總要按照病情輕重，而定用量的多少。

最好的方法，先試驗病人的耐藥力，起先注射「聖露消發滅定」5c.c.，再內服「消發滅定」每天四片至六片，以收雙管齊下的效力。

如果不能行靜脈注射，或有困難存在的時候，可注射「聖露消發滅定」10c.c. 於肌肉內或皮下。如果病人能耐受，那再可增加到20c.c.，如用本品行肌肉注射，因其耐藥量的關係，似可反復注射。

兒童的用量，與他的年齡及體重有關，可用大人量四分或二分之一。「聖露消發滅定」也可用於局部，像由連球菌所傳染的傷口，可用本品洗滌，也可用於子宮腔及子宮頸部的灌洗，

與子宮的局部消毒。所以本品的外用，也有相當的效力與價值。

【包裝】「聖露消發滅定」是一種6%的溶液，適等於2%的「消發滅定」。牠的盒裝是：

5×5cc.


10×5cc.

5×10cc.

10×10cc.

請位醫師購買的時候，請指明包裝及容量，庶不致誤。

消 治 龍 集 團 製 劑



治效高強

毒性低微

新聖露消治龍

消治龍藥膏

消治龍牙膏

消治龍藥皂

消治龍眼藥水

消治龍

針劑

信 誼 化 學 製 藥 廠 榮 譽 出 品

良藥索引

THERAPEUTIC INDEX

內科類 Medicine

頁數

貧血及萎黃病 (Anemia and Chlorosis)	Pages
* 皮西固斯	Bicicose
皮西握命	Biciomin 73
鈣深固斯	Calcicose 16
四維鈣爾生	Calsun A B C D 18
西他新	Cit'sin 23
長命新鈣	Glucocal 32
四維葡萄糖	Glucose A B C D 33
* 甘油磷酸鐵	Glycerophos. of Iron
* 甘油磷酸鈉	Glycerophos. of Sodium
海石維	Hexavite 36
砒矯基鐵	Iron Cacodylate 37
* 蛋黃素	Lecithin
力弗肝	Livex 40
力康脾	Livex Compound 42
新重鈣	Neo-Glucocal 43
新力弗肝	Neo-Livex 41
婦萬多年	Ovartonic 49
鈉化砒矯基	Sodium Cacodylate 66
** 滅菌樂克氏液	Solution Locke's
* 賜保多年	Spertonic
超力弗肝	Super-Livex 41
多年可	Tonicol 73
維康通	Vigoton 77

維他賜保命	Vita-spermin	79
維他多勁	Vitastegin	81
氣喘 (Asthma)		
腎上腺	Adrenalin	4
壓氣抹喘	Asthmasal	9
氯化鈣	Calc. Chlor.	17
鹽酸麻黃素	Ephedrine Hydroch.	29
喬安磷	Jotodin	39
信甯咳	Sineco	57
脚氣症 (Beriberi)		
四維葡萄糖	Glucose A B C D	33
海石維	Hexavite	36
力康許	Livex Compound	43
維他命乙	Vitamin B	77
維他新	Vitasin	77
維他賜保命	Vita-spermin	79
食母生	Zymasun	83
枝氣管炎 (Bronchitis)		
喬磷鈣	Jodincal	39
* 撲脫咳	Pertical	
信甯咳	Sineco	57
心臟及呼吸器病 (Cardiac and Respiratory Diseases)		
退勢減定	Acemidin	1
腎上腺	Adrenalin	4
壓氣抹喘	Asthmasal	9
* 咖啡因	Caffein	
* 安息香酸鈉咖啡因	Caffein Sod. Benzoat.	
* 柳酸鈉咖啡因	Caffein Sod. Salicylate	
樟腦油	Camphor oil	21

開提心	Cardisin 22
洋地黄素	Digitaline pure 26
鹽酸麻黃素	Ephedrine Hydrochloride 29
葡萄糖	Glucose 32
* 樂培林	Lobeline
* 漢脫咳	Periual
信甯咳	Sineco (with or without codein) 57
司得命	Stamin 67
* 康毗箭毒子素	Strophantin
* 士的寧	Strychnine Arsen.
霍亂 (Cholera)	
痧藥水	Cholera Drops
口服霍亂疫苗	Sine Cholera Oral Vaccine 61
霍亂疫苗	Sine Cholera Vaccino 61
傷寒霍亂混合疫苗	Sine T.C. Combined Vaccine .. 61
四合疫苗	Sine Tetra Vaccine 61
* 滅菌樂克氏液	Solution Lockel's
* 滅菌林格爾氏液	Solution Ringer's
食鹽水	Solution Sodium Chloride 67
便秘 (Constipation)	
* 刻立通	Glyton
安樂瀉片	Phenalsal 49
* 信誼酵母	Sine Yeast
食母生	Zymasun 82
腹瀉 (Diarhea)	
快痢福	Guanifa 34
* 百哥消片	Pepcosal
* 信誼酵母	Sine Yeast
消發滅定	Sulfamidina y6
消消龍	Thiazon 69

維他多勁	Vitatogin	81
疾痢 (Dysentery)		
阿米脫痢	Amoetren	5
滅痢菌汁	B. D. Phage	14
鹽酸吐根素	Emetine Hydrochloride	29
快痢福	Guanifa	34
* 樂泰平	Lactobin	
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
* 百哥消片	Pepcosal	
痢疾疫苗	Sine Dysentery Vaccine	61
性痢素	Sinalarsol	64
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
發熱 (Fever)		
敗熱速	Bagzal & Bagzal Strong	11
雙鹽酸奎寧	Quinina Bi-hydrochloride	53
柳酸鈉	Sodium Salicylate	67
司得命	Stamin	67
司泰靈	Starin	67
託靈保賽而	Transpusal	75
胃腸病 (Gastro-intestinal Diseases)		
四維鈣爾生	Calcun A B C D	18
果百雅	Capaya	21
* 樂泰平	Lactobin	
胃痛靈	Magnoxide	43
新重鈣	Neo-Gluccal	43
* 百哥消片	Pepcosal	
* 信誼酵母	Sine Yeast	
胃天定	Ventidin	76
食母生	Zymasun	82
一般虛弱 (General Debility)		

* 皮西固斯	Bicicose	
皮西握命	Biciomin	13
鈣深固斯	Calcicose	16
長命新鈣	Glucocal	32
葡萄糖甲	Glucose A	
葡萄糖乙	Glucose B	
葡萄糖丙	Glucose C	
葡萄糖丁	Glucose D	
四維葡萄糖	Glucose A B C D	33
* 甘油磷酸鐵	Glycerophosphate of Iron	
好力生	Halistan & Halisun strong	35
海石維	Hexalite	36
* 樂泰平	Lactobin	
* 蛋黃素	Lecithin	
力弗肝	Livex	40
力康脾	Livex Compound	42
新重鈣	Neo-Glucocal	43
新力弗肝	Neo-Livex	40
婦萬定及婦萬定濃	Ovaden & Ovaden Strong	46
婦萬多年	Ovatonic	49
* 賜保命	Spermin	
* 賜保多年	Sper tonic	
超力弗肝	Supper-Livex	40
維康通	Vigoton	77
維他賜保命	Vita-spermin	79
維他多勁	Vitrogen	81
頭痛 (Headache)		
司泰靈	Stard	68
萬可靜	Vccobin	75
痔瘡 (Hemorrhoid)		

拔痔根藥膏	Piles Cure	53
安的敷藥膏	Antiflasal	7
高血壓 (High Blood Pressure)		
喬安碘	Jotodin	39
消化不良 (Indigestion)		
果百雅	Cupaya	21
* 樂泰平	Lactobin	
胃痛靈片	Magnoxide	43
* 百哥消片	Pepcosal	
* 信誼酵母	Sine Yeast	
維康通	Vigoton	77
維他賜保命	Vita-spermin	79
維他多勁	Vitalogin	81
食母生	Zymasol	82
傳染性病 (Infectious Diseases)		
遏勢滅定	Acemidin	1
愛惜克淋	Acicrin	2
愛克淋鈣	Acincal	3
高力皇及聖露高力皇	Gallinan & Solu-Gallinan	30
快痢福	Gumifa	34
新聖露消治龍	Neo Solu-Thiazon	44
撲滅定	Promadin	52
腦膜炎疫苗	Sine Meningitis Vaccine	61
尼可淨	Socosin	65
消發滅定及聖露消發滅	Sulfamidine & Solu-Sulfamidine	76
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
* 烏羅透賽	Urotrosal	
感冒 (Influenza)		
敗熱速	Bagsal & Bagsal Strong	11
鼻通	Beton	13

鹽酸麻黃素	Ephedrine Hydrochloride 29
* 撲脫咳	Pertucal
雙鹽酸奎寧	Quinine Bi-hydrochloride 53
信寧咳	Sineco 57
司泰靈	Starin 68
皮膚癢症 (Itching of Skin)	
皮可淨	Bencezin 12
癢可立沒	Jecoromide 18
新重鈣	Neo-gluco-cal 43
足可淨	Socosin 65
消治龍藥皂	Thiazon Soap 72
瘧疾 (Malaria)	
敗熱速	Bagsal & Bagsal Strong 11
新措花散	Neo-sypharsan yl
雙鹽酸奎寧	Quinine Bi-hydrochloride 53
鹽酸尿素奎寧	Quinine Bi-mur. Carbamid .. 53
奎寧新鈣	Quinine Gluco-cal 54
超力弗肝	Supper-Livex 40
息癩靈	Sinabrin 56
息熱定	Sinadin 55
雲糖奎	Sinequin 57
腎臟炎 (Nephritis)	
邊勢減定	Acemidin 1
愛惜克淋	Acicuin 2
愛克淋鈣	Acrincal 3
* 克渴梅殺	Chromersal
* 烏羅透多	Urotrosal
神經痛 (Neuralgia)	
司泰靈	Starin 68
萬可靜	Vecosin 75

神經衰弱 (Neurasthenia)

恩德蒙	Andromon	
* 皮西固斯	Bicicose	
皮西握命	Biciomin	13
鈣深固斯	Calcicose	16
溴化鈣	Ca'cium Bromide *	17
長命新鈣	Glucocal	32
四維葡萄糖	Glucose A B C D	33
* 甘油磷酸鐵	Glycerophosph. of Iron	
* 甘油磷酸鈉	Glycerophosphate of Sodium	
好力生	Halisun & Halisun Strong	35
海石維	Hexavite	36
* 砒酸鐵士的寧	Iron Arsenite & Strychnine	
* 樂泰平	Lactobin	
力弗肝及新力弗肝	Livex & Neo-Livex	40
力康脾	Livex Compound	42
新重鈣	Neo-Glucocal	43
鈉化砒錳基	Sodium Carodylate	66
* 賜保命及賜保蛋黃素	Spe min & Spermin-lecithin	
* 賜保多年	Spertonic	
* 士的寧	Strychnine Arsen.	
超力弗肝	Supper-Livex	40
多年可	Tonical	73
維康透	Vigoton	77
維他賜保命	Vit ₁ -spermin	79
維他多勁	Vitatogin	81
神經梅毒 (Neuro-syphilis)		
喬磷鈣	Jodincal	39
喬安磷	Jotodin	39
腦絡惜花滅	Neuro-Syphamide	y2

鴉片 (Opium Addiction)

* 皮西固斯	Bicicose
皮西握命	Biciomin 13
鈣深固斯	Ca'cicose 16
苦路平	Curopin 25
長命新鈣	Gluccal 32
四維葡葡糖	Glucose A B C D 33
* 刻立通	Glyton
好力生	Halisun & Halisun Strong 35
* 蛋黃素	Lecithin
力弗肝及新力弗肝	Livex & Neo-livex 40
* 鎂散爾	Magsal
* 鹽酸嗎啡	Morphine Hydrochloride
婦萬定	Ovaden & Ovaden Strong 46
婦萬多年	Ovartonic 49
* 百哥消片	Fepcosal
* 賜保蛋黃素	Spermin-lecithin
多年可	Tonicol 73
萬可靜	Vecosin 75
維康通	Vigoton 77
維他賜保命	Vita-spermin 79
維他多勁	Vitatogin 81
食母生	Zymasun 82

百日咳 (Pertusis)

* 撲脫咳	Pertical
信寧咳	Sineco 57
維他多勁	Vitatogin 81

肋膜炎 (Pleuritis)

安的敷	Antiflasal 7
* 安息香酸咖啡因	Caffein Sodium Benzoate

鈣類製劑	Calcium Preparations
長命新鈣	Glucocal 32
好力生	Halisun & Halisun Strong 35
新重鈣	Neo-Glucocal 43
肺炎 (Pneumonia)	
退勢滅定	Accenidin 1
安的敷	Antifiasal 7
收熱速	Bagsal & Bagsal Strong 11
鹽酸麻黃素	Ephedrine Hydrochloride 29
高力皇及聖露高力皇	Gallinan & Solu-Gallinan 30
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon 44
肺康	Phicon 50
雙鹽酸奎寧	Quinine Bi-hydrochloride 53
信甯咳	Sileco 57
消發滅定及聖露消發滅定	Sulfamidine & Solu-Sulfamidine y6
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon 69
託鹽保賽而	Transpulsal 75
多發性神經炎 (Polyneuritis)	
葡萄糖乙	Glucose B 33
海石維	Hexavite 36
維他命乙	Vitamin B
維他新	Vitasin 77
中毒 (Poisoning)	
開提心	Cardisin 22
新重鈣	Neo-Glucocal 43
* 烏羅透賽	Urotrosal
維他多勁	Vitatogin 81
肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)	
愛地命	Admin 3
* 皮西周斯	Bieicose

皮西握命	Bicionin	13
鈣深固斯	Calcicose	16
氯化鈣	Calcium Chloride	17
碘化鈣	Calcium Iodide	18
四維鈣爾生	Calsun A B C D	18
鈣爾生	Calsun D	20
稜阿蘇	Creosote Pure	24
長命新鈣	Glucocal	32
* 怪阿寇砒矯基	Guaiacol Cacodylate	
好力生	Halisun & Halisun Strong	35
海石維	Hexavite	36
力康脾	Livex Compound	42
* 癆可靈	Lungcholin	
新重鈣	Neo-Glucocal	43
新力弗肝	Neo-Livex	40
肺康	Phicon	50
奎寧新鈣	Quinine Glucocal	54
超力弗肝	Super-livex	40
維他命製劑	Vitamin Preparations	
回歸熱 (Relapsing Fever)		
砒製劑	Arsenic Preparations	
新惜花散	Neo-sypharsan	yl
雙鹽酸奎甯	Quinine Bi-hydrochloride	53
風濕痛 (Rheumatic Pain)		
安的敷	Antifiasal	7
* 柳酸咖啡因	Caffein Sodium Salicylate	
苦路平	Curopin	25
奎甯新鈣	Quinine Glucocal	54
息熱定	Sinadin	55
司泰靈	Starin	68

萬可醇	Vaccosin	75
佝僂病 (Rickets)		
鈣類製劑	Calcium Preparations	
好力生	Halisun & Halisun Strong	35
海石維	Hexavite	36
力康拜	Livex Compound	42
維康通	Vigoton	77
* 維他命丁	Vitamin D Liquid	
維他多勁	Vitatogin	81
血清病 (Serum Diseases)		
腎上腺	Adrenalin	4
鈣劑	Calcium Preparations	
鹽酸麻黃素	Ephedrine Hydrochloride	29
腦垂腺	Pituitary	
性神經衰弱 (Sexual Neurasthenia)		
恩德蒙	Andromon	6
* 皮西固斯	Bicicore	
皮西握命	Biciomin	13
鈣深固斯	Calcicore	16
四維葡萄糖	Glucose A B C D	33
海石維	Hexavite	36
力康拜	Livex Compound	42
婦萬多年	Ovartonic	49
* 賜保命	Spermin	
* 賜保蛋黃素	Spermin-Lecithin	
* 賜保多年	Sper tonic	
多年可	Tonicol	73
維康通	Vigoton	77
維他賜保命	Vita-spermin	79
維他多勁	Vitatogin	81

皮膚病 (Skin Diseases)

砒酸鐵製劑	Arsenic & Iron Preparations ..
皮可淨	Bencosin 12
* 皮西固斯	Bicicose
皮西握命	Eiciomia 13
鈣深固斯	Calcicose 16
溴化鈣	Calcium Bromide 17
癢可立沒	Jecozomide 38
信誼藥膏	Sine Ointment 59
* 信誼酵母	Sine Yeast
足可淨	Socosin 65
鈉化砒嚮基	Sodium Cacodylate 66
丟病速	Terpinsal 69
消治龍藥膏	Thiazon Ointment 71
消治龍藥皂	Thiazon Soap 72
維他命製劑	Vitamin Preparations

失眠 (Sleeplessness)

導默諾	Dormanol 27
維他多勁	Vitatogin 31

胃病 (Stomach Diseases)

果百雅	Capaya 21
* 樂泰平	Lactobin
胃痛靈	Magnoxide 43
* 百哥消片	Pepecosal
* 信誼酵母	Sine Yeast
胃天定	Ventidin 77
食母生	Zymasun 82

梅毒 (Syphilis)

鈹司莫撒而	Bis nosal 15
碘化鈣	Calcium I cide 18

* 汞	Hydrarg. Cyanide
喬碘鈣	Jodina 39
喬安碘	Jodoin 39
新借花散	Neosypharsan y1
腦絡借花滅	Neurosyphamide y2
* 碘化鈉	Sodium Iodide
肌安借花散	Thio-sypharsan y3
破傷風 (Tetanus)	
導默諾	Dormanol 27
* 鎂散爾	Magsil
* 烏羅透賽	Urotrosal
甲狀腺 (Thyroid)	
信誼甲狀腺片	Sine Thyroid Tablets 61
傷寒及副傷寒 (Typhoid & Paratyphoid)	
愛借克淋	Acicrin 2
* 皮西固斯	Bicicose
皮西握命	Biciomin 13
鈣深固斯	Calcicose 16
純淨葡萄糖	Glucose Ampoules 32
四維葡萄糖	Glucose A B C D 33
快痢福	Guanifa 34
息熱定	Sinadin 55
* 信誼酵母	Sine Yeast
消治龍及聖露消治龍	Thiazon and Solu-Thiazon 69
傷寒霍亂混合疫苗	Typho-cholera Combined Vaccine 51
四合疫苗	Tetra Vaccine 61
* 烏羅透賽	Urotrosal

外科類 (Surgery)

麻醉劑 (Anesthesia)

疼克因	Dentcain	26
奴佛克賽	Novocasal	45
盲腸炎 (Appendicitis)		
遏勢滅定	Acemidin	1
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
消發滅定及聖露消發滅定	Sulfamidine & Solu-Sulfamidine	y6
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
橫痃 (Bubo)		
安的敷	Antiflasal	7
一天霖	Atilin	8
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
息那倫	Sinolen	64
消發滅定及聖露消發滅定	Sulfamidine & Solu-Sulfamidine	y6
丟病速	Teipinsal	69
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
癌腫 (Cancer)		
恩胚命	Embromin	27
丹毒 (Erysipelas)		
遏勢滅定	Acemidin	1
安的敷	Antiflasal	7
高力皇及聖露高力皇	Gallinan & Solu-Gallinan	30
新聖露消治龍	Neo Solu-Thiazon	44
奎寧新鈣	Quinine Glucocal	54
消發滅定及聖露消發滅定	Sulfamidine & Solu-Sulfamidine	y6
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
* 烏羅透賽	Urotrosal	
出血 (Hemorrhage)		
腎上腺	Adrenaline(only local application) †	
鈣深固斯	Calcicose	16
氯化鈣	Calcium Chloride	17

鈣爾生丁	Calsun D	18
西他新	Citasin	23
* 麥角素	Ergotine	
長命新鈣	Glucocal	32
葡萄糖針	Glucose Amp.	32
* 鹽酸嗎啡	Morphine Hydrochloride	
新重鈣	Neo-Glucocal	43
* 滅菌樂克氏液	Solution Locke's	
* 滅菌林格爾氏	Solution Ringer's	
食鹽水	Solution Sodium Chloride	67
局部麻醉 (Local Anesthesia)		
奴佛克賽	Novocasal	45
奴佛克賽與腎上腺素	Novocasal & Adrena'in	45

婦產科類 Obstetrics and Gynecology

子宮內膜炎 (Endometritis)

退勢滅定	Acemidin	1
愛惜克淋	Acicrin	2
愛克淋鈣	Acrincal	3
安的敷	Antiflasal	7
* 戈拿殺	Gonosol	
新聖潔消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
婦美素	Omensal	46
信乃通	Sinestron	59
消發滅定與聖潔消發滅定	Sulfamidine & Solu-Sulfamidine y6	
消治龍及聖潔消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
維他賜保命	Vita-spermin for Female	79
催生 (Induce Labour)		
* 腦垂腺 (即催生針)	Pituitary	
白帶 (Leucorrhoea)		

邊勢滅定	Acemidin	1
愛惜克淋	Acicrin	2
愛克淋鈣	Acrincal	3
一天霖	Atilin	8
氯化鈣	Calcium Chloride	7
* 克濁梅殺	Chromersal	
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
婦美素	Omensal	46
消發滅定及聖露消發滅定	Sulfamidine & Solu-Sulf.	y6
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
月經病 (Menstrual Disturbances)		
高適丁	Coriutin	24
* 麥角素	Ergotine	
婦美素	Omensal	46
婦萬定	Ovaden & Ovaden Strong	46
婦萬靈	Ovarin Crystalline	48
信乃通	Sinestron	59
萬可靜	Vecosin	77
維他賜保命	Vita-spermin	79
敗血症及產褥熱 (Septicemia & Puerperal Fever)		
邊勢滅定	Acemidin	1
愛惜克淋	Acicrin	2
愛克淋鈣	Acrincal	3
高力皇及聖露高力皇	Gallinan & Solu-Gallinan	30
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
息熱定	Sinadin	55
消發滅定及聖露消發滅定	Sulfamidine & Solu-sulf.	y6
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
* 烏羅透賽	Urotrosal	

不孕 (Sterility)

高濾丁	Corlutin	24
婦萬定	Ovaden & Ovaden Strong	46
婦萬靈	Ovarin	48
婦萬多年	Ovartonic	49
信乃通	Sinestron	59
* 維他命戊	Vitamin E	
維他賜保命	Vita-spermin for Female	79
妊娠嘔吐 (Toxemia Pregnancy)		
* 皮西固斯	Bicicose	
皮西握命	Biciomin	13
鈣深固斯	Calcicose	16
西他新	Citasin	23
高濾丁	Corlutin	24
葡萄糖丙	Glucose C	33
四維葡萄糖	Glucose A B C D	33
維他多勁	Vitatogin	81
食母生	Zymasun	82

齒科類 Dental Diseases

* 愛惜夫拉文	Aciflavin	
西他新	Citasin	23
疼克因	Dentcain	26
海石維	Hexavite	36
消治龍牙膏	Thiazon Tooth Paste	72

眼耳鼻喉科類 Eye, Ear, Nose and Throat

腺體增殖 (Adenoid)

* 皮西固斯	Bicicose	
皮西握命	Biciomin	13
鈣深固斯	Calcicose	16

碘化鈣	Calcium Iodide	18
長命新鈣	Glucocal	32
四維葡萄糖	Glucose A B C D	33
* 甘油磷酸鐵	Glycerophospate of Iron	
好力生	Halisun & Halisun Strong	35
海石維	Hexavite	36
* 砒黃鐵土的膏	Iron Arsenite & Strychnine	
* 蛋黃素	Lecithin	
力康脾	Livex Compound	42
新重鈣	Neo-glucocal	43
超力弗肝	Supper-Livex	40
甲狀腺片	Thyroid tab.	61
多年可	Tonicol	73
維康通	Vigoton	77
維他命甲乙戊	Vitamin A B E	77
維他新	Vitasin	77
維他多勁	Vitatogin	81
咽喉炎 (Angina)		
* 愛惜夫拉文	Aciflavin	
敗熱室	Bagsal & Bagsal Strong	11
司泰靈	Starin	68
消治龍及聖露消治龍	Thiazon and Solu-thiazon	69
眼病 (Eye Diseases)		
* 一明眼藥水	Eyemin Eye Drops	
葡萄糖甲	Glucose A	33
好力生淚	Halisun Strong	35
海石維	Hexavite	36
新聖露消治龍	Neo Solu-thiazon	44
消治龍眼藥水	Thiazon Eye Drops	71
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-thiazon	69

* 他維命甲	Vitamina A	
鼻症 (Nasal Diseases)		
腎上腺	Adrenalin Solution	4
鼻通	Beton	13

泌尿生殖器類 Genito-urology

下疳 (Chancre)

遏勢滅定	Acemidin	1
新惜花散等	Neo-sypharsan, etc	y1

淋病及其併發症 (Gonorrhoea & Gonorrhoeal Diseases)


遏勢滅定	Acemidin	1
愛惜克淋	Acicrin	2
愛克淋鈣	Acrincal	3
安的敷	Antifagal	7
一天霖	Atilin	8
* 克濁梅殺	Chromerol	
高力皇及聖露高力皇	Gallinan & Solu-Gallinan	30
* 戈拿殺	Gonosol	
新聖露消治龍	Neo-Solu-Thiazon	44
撲滅定	Promadin	52
息那倫	Sinolen	64
丟病速	Terpinsal	69
消治龍及聖露消治龍	Thiazon & Solu-Thiazon	69
* 烏羅透賽	Urotrosal	

尿道消毒劑 (Urinary Disinfectant)

愛惜克淋	Acicrin	2
愛克淋鈣	Acrincal	3
* 烏羅透賽	Urotrosal	

[附 啓] 有星號各藥，暫不應市。

清治能牙



齒槽膿漏之嚴重性

此病之起所以甚速者由於牙齦之腐敗

清治能牙之特點


(一) 清治能牙之特點

本牙齦主要原料為清治能
 這藥能殺菌殺菌不傷牙齦
 治癒齒槽膿漏
 殺菌力強偉大可避免蛀牙
 得使口腔粘帶防止發炎
 防止腐乳酸臭各種喉病
 細膩雪白原料異常名貴
 牙齦肉不令肥厚
 每次刷牙用半英寸用量較
 他種見者

最新發行



信誼 藥廠



各大公司
 藥房商店
 均有出售



9126
P3C
7611

459

[Illegible text columns]

[Illegible text at the bottom of the page]