

醫方類聚卷之三十九

傷寒門 十三

傷寒指掌圖

傷寒賦 八韻 并註

傷寒為病反復變遷賴先師究詳之遺旨成

後學診治之良詮太陽則頭疼身熱脊強太

陽之脈從頭項連風府行陽明則目痛鼻乾

於腰背故頭項痛腰脊強

不眠足陽明之脈從目絡於少陽耳聾脇痛
寒熱嘔而口為之苦於耳故病脇痛耳聾太



陰腹滿自利尺寸沉而津不到咽足太陰之脈布於脾

胃絡於嗌喉故腹少陰舌乾口燥足少陰之脈絡於肺

藟舌本故厥陰煩滿囊拳厥陰之脈循陰器

記口乾煩厥陰煩滿囊拳絡於肝故煩滿而

縮一二日可發表而散表一二日邪在三四日

宜和解而痊半表半裏可用五六日便實方

可議下熱傳下焦五六日如七八日不解又

復再傳病至六日為傳經滿七日當日傳二

經病名兩感經傳六日應無一全常病日傳

日傳足當愈兩感傷寒一日傳太陽少陰勝

膀胱與腎俱病二日傳陽明太陰胃與脾俱病

三日傳少陽厥陰膽與肝俱病二太陽無汗

日傳偏至六日再傳不可救矣

麻黃為最太陽傷寒服太陽有汗桂枝可先

太陽中風服麻黃湯發散太陽有汗桂枝可先

桂枝湯解肌小柴胡為少陽之要領少陽一

小柴大柴胡行陽明之祕堅陽明內實便難

胡湯當服大柴胡湯

至陰則難拘定法或可溫而或可下太陰自

藏寒也四逆湯理中湯太倉腹痛甚者桂枝

加大黃湯少陰小便色白甘草乾薑湯少陰

口燥咽乾大承氣湯厥陰下之利不止四逆

湯下之者不可宜數變以曲全生意或可方

而或可圓

且如陽證下之早者乃為結胃病發於陽下
下堅滿按之石硬而痛則為結胃也陰證下之早者則心
病發於陰下之早者則癸狂為血畜于內又
曾滿而不痛為痞氣也大便之極實發狂有血畜下焦癸黃乃熱積于中兼小便之不利黃乃宿穀
搏而生熱又水微喘緣表之未解微喘而脈
道不通故發黃貴桂枝之類解之喘滿而不惡寒者當下而
陽證才罷再用麻微煩為陽之相勝
桂枝之類解之喘滿而不惡寒者當下而
喘滿不惡寒此表證已微煩為陽之相勝
罷當用大小承氣下之微煩為陽之相勝
脈浮身熱微煩屬太陽此煩極而反癸厥者
陽勝於陰大青龍湯證也

乃陰所致陰勝於陽則發厥脈沉狐惑蓋緣
而煩躁不已者死證也失汗蟲食臟及食肛其人素有蟲始因失汗
與肛門治以雄黃虻厥却緣多飢蟲攻咽及
桃仁殺蟲之義也攻胃飢蟲逆上而出治以烏梅丸渴乃煩
多斑為熱熾故發斑爛陽明內實則為寒熱
往來者乃陰陽相勝也若內實太陽中風因作
剛柔二症有汗為柔症發則強急口噤如癩
通用小衄血雖為欲解者為欲解也動陰血
續命湯者為厥竭之憂鼻耳目出為下厥上竭乃死

證厥利雖若尋常反能食者有除中之忌日經也厥而利當不能食反能食者為除中不可治也厥有二端治非一類陰厥脉沉而細初緣利過未厥前下利不渴後發厥者陰厥也陽厥脉滑而沉始因便秘未厥前大便秘煩渴後發厥者陽厥也治陽則芒硝大黃大承氣湯也治陰則附子薑桂四逆湯也死生係反掌之間脉藥可折肱而治傳云三折肱知為良醫因知風温汗不休當用漢防已發汗後身猶灼熱名風温胃痞利不止宜服禹餘糧痞而利不止當治下併病歸于焦赤石脂禹餘糧湯

一經邪不傳兮表解疾愈併病者始於二陽若併於太陽仍用微汗併於陽明仍用微下若併於少陽仍小用柴胡湯戰汗分為四證陽勝陰兮熱退身涼戰汗四證以寒矣此陽勝於陰戰勝而愈咳送者羌活附子脉微細咳逆陰戰勝而愈活附腹痛者桂枝大黃關脉實腹滿按之微子湯虛相搏則為短氣氣不接續也風濕不欲去衣者甘草附子湯太陽下之水停心下硬陷胃湯勞食再復乃成內傷勞力傷食再復熱者枳殼桂子湯麥門冬湯陽明背惡寒而唇口燥懸知白虎為最背惡寒口燥渴少陰身體

痛而筋肉惕乃聞真武至強少陰有汗筋肉

武將欲發黃先出頭汗頭汗出劑頭而還始

因火迫終至亡陽亡陽煩躁驚狂者柴胡龍

骨吐渴欲飲水水入即吐者五苓散渴欲飲

逆五苓散水燥欲漱水水入不下者犀角湯明

身熱頭疼漱水不欲飲此痰况乃大青龍兼

血必發狂並用犀角地黃湯况乃大青龍兼

理風寒傷寒見寒大青龍湯小承氣正蠲潮熱後

潮熱不惡寒腹滿不得眠而煩燥甚雞子入

而喘者小青龍湯不得眠而煩燥甚雞子入

於黃連少陰病二三日心煩但有熱而嘔噦

頻薑汁加於竹葉應熱而嘔者竹葉一七瓜

帶散吐傷寒中脘痰涎三物桃花湯理少陰

下利膿血濕毒下利膿厚朴半夏治腹脹為

偏宜太陽病發汗後腹脹者葱白麻黃理頭

疼為至截頭疼如破連須葱白湯葛根調溫

毒可用黑膏發斑脈洪數者黑膏散亦斑當行紫

雪陽毒發斑吐血者須前黃連麋皮熱毒深

者栝皮湯方用咽痛者通用猪膚甘桔少陰

當咽痛治用猪三物白雖云頗峻散結胃寒

實中焦寒實結胃三物小十棗湯固非泛常

治痞滿痛連兩脇表證罷心下痞乾區欬而

而有伏飲加以大熱錯語呻吟乾嘔者黃連

解毒傷寒已得汗解因飲酒復劇煩悶脈逆

熱多寒少血弱者黃耆建中傷寒熱多寒少

也黃芪汗之過多動悸而惕汗為心液汗多

建中湯宜服桂枝甘下之先時懊懣在胃表木解而

草湯以和之胃中故懊懣不安以梔旋覆代赭理心痞而

噫不息發汗吐下後心下痞噫桂麻各半療

身痒而汗不通桂麻各半湯理太陽面有熱

汗出其勞復身熱湯名猴鼠糞勞後身熱及

身必痒鼠糞腸垢臍熱藥用白頭翁協熱而利臍下

疫癘者春夏秋冬各有法用須十全九證疫癘

者四時不止之氣也各行治法百合者行

住坐臥皆不定號為百脉一宗百脉一宗悉

不能食欲行坐又不能行坐藥致其病欲食

有鬼神百合知母湯百合地黃湯清石代赭

湯常謂多眠身猶灼熱風温可用萎蕤身後

灼熱自汗喘息嘿嘿欲不眠心蘊虛煩飲汗

必須酸棗 吐汗下後晝夜不得眠者酸棗湯 手足攣搐當末

牛旁根 汗出時蓋覆不周致腰背痛手足攣搐牛旁根散 咳嗽生痰宜

行金沸草 傷寒咳嗽生痰不可汗本有數種動

氣與風濕脉虛 氣左上下皆不可汗不可

下自非一端動氣與陽浮在表 表證未罷區

右不可下 濕證不可汗傷 中濕風濕濕霍亂

多絲熱惱 霍亂與中暑相類多因天暑地沸

分其清濁不渴 濕病發於春夏要須柴葛以

解肌 溫病有風溫濕溫多發於春初及夏 奔

豚協逐寒邪多用桂苓為可保 奔豚從小腹上衝心者桂

枝加桂湯

蓋聞乍寒微熱名似虐不嘔清便必自愈 後寒熱往來如虐日一發或濟痛引陰名臧

二三發不嘔清便必自愈也 臧

結下利白胎不可醫 舌如結胃時自下利

者名藏結 口燥咽乾雖少陰下莫可緩 少陰病得

之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣肉

腸筋惕發動氣汗以致羸 經日動氣在左不

腸肉 陽明與少陽合病脉弦者名曰負 陽明少陽

合病脉長者為順脉弦者為負負傷寒與熱者死蓋少陽之木克陽明之土也
 病將痊食多者號曰遺遺病已愈多食日遺自
 汗有風温濕温若亡陽則木附可用風温濕温皆不
 宜汗汗多亡身痛有表證裏證若陰毒則四
 陽宜木附湯身痛有表證裏證若陰毒則四
 逆尤遲頭發散而愈若身痛如被杖厥逆下利
 此陰毒也用四脾約者大便難而小便數治
 逆湯尤恐遲矣脾約者大便難而小便數治
 用大黃枳殼經曰大以溲數則大便難其脾
 芍藥麻子為約脾約丸杏仁枳殼大黃白
 仁等藥也協熱者小便澀而大便利者此為協熱
 連當歸發熱小便澀而大便利者此為協熱
 用赤石脂九黃連當歸赤石脂乾薑

等藥嘔吐有寒有熱寒則當温熱當以解寒
 也而嘔者理中湯小橘皮湯熱多而識語有虛
 嘔者竹葉加生薑汁湯猪苓湯識語有虛
 有實實則可下虛不可為胃實識語大小承
 視喘滿讞語者死此正氣陽毒則狂斑煩亂
 脫絕言語妄誕故不可為陽毒則狂斑煩亂
 以大青升麻可迴困篤陽毒用青黛一物陰
 毒則唇青厥逆以正陽甘草或拯顛危陰毒
 陽散陰毒發厥時自煩尤甚此藏氣厥而精
 甘草湯發厥時自煩尤甚此藏氣厥而精
 神散發厥時自煩尤甚此藏氣厥而精
 此陰陽交而魂魄離汗後不為汗衰嗟夫生

死之關陰陽是主陽脉見於陰經其生也可
知經曰陰病見 陰脉見於陽經其死也可許
陽脉者生 土衰木王則為賊能無剋制之災
陽則死 少陽陽明合病脉當長而弦少陽膽木也陽
明胃土也 陽明脉不王獨見弦急之脉此木
克土也 為鬼賊之脉名 水升火降則為和會
日負負者相負也不治 見歡欣之舉 水為腎火為心病將痊愈心火
上升則津液生而 緣傷寒傳變之不常非雜
精神回此生意也 病徑直而可取是用潛篤心神洞窺臟腑推
測隱之端以濟乎 今拯疲癯之疾以遵乎古

庶幾可登仲景之堂不負乎諄諄之語

指掌圖

此圖之設蓋取其易覽耳今以司天在
 泉運氣主客冠於首者所謂風寒燥濕
 君相之火上下相臨陰陽勝復五運化
 紀六氣主治醫者不可不知也仲景曰
 治傷寒不知運氣如涉海問津不識經
 絡如觸途冥行此則具其大略繼以傷
 寒治證始於發熱終於不治之證計八

十九圖惟經絡圖傷寒諸書悉有之茲
 不復贅雖不能兼該具備其閒如同類
 之證併而為一所不
 者亦散在諸證
 中觀者幸觸類而長之


圖 泉 在 天 司 一	
金燥 西 火君 司天 在泉	明陽 卯 陰少
水寒 戌 土濕 司天 在泉	火君 午 金燥 司天 在泉
木風 亥 火相 司天 在泉	土濕 未 水寒 司天 在泉
陰厥 巳 陽少	陰太 丑 陽太
陰厥 寅 陰厥	陽少 寅 陰厥

經云先立其年以明其
 氣是知司天在泉上見
 下臨為其始也如子午
 卯酉陰陽互換六氣在
 其中矣勝復之理補瀉
 之法可從而推之

訣言

子午少陰君火天陽
 明燥金應在泉丑未
 太陰濕土上太陽寒
 水兩連綿寅申少陽
 相火旺厥陰風木地
 中聯卯酉却與子午
 辰戌巳亥亦皆然

二 五 之 運 圖



歲會者甲巳化土而遇辰戌丑未之歲乙庚化金而遇申酉歲之類是也太乙天符如乙酉歲乙庚化金而遇酉又上見燥金司天是也天符者如庚子庚午歲下臨燥金在泉同歲會者如辛丑辛未歲下臨寒水在泉是也歲遇天符歲會則為平氣陽干陽辰則為太過陰干陰辰則為不及也

三 六 之 氣 圖



天以六氣動而不息上應乎客

地以五行靜而守位下應乎主

太陽寒水治宜甘熱陽明燥金治宜苦溫少陽相火治宜鹹寒大陰濕土治宜苦熱少陰君火治宜酸寒厥陰風木治宜辛涼六氣之行各居六日有奇以其時而化其氣過猶不及病乃生焉故察其盛衰以味折之以正其氣經云必折其鬱氣而取化源益其氣無使邪勝使暴過不生奇疾不起是理歲之大要也

類聚

十一

大柴胡湯	大承氣湯	湯胃承氣	湯六承氣	葛根升麻	四根升麻	石膏湯	麻黃湯	麻黃湯	一黃湯	婢一枝湯	桂枝湯	桂枝湯	四發熱上
太陽	太陽	惡風	惡風	自汗	太陽	然脈浮者	汗出	太陽	惡風	桂枝	桂枝	太陽	太陽
解屬胃也	日蒸汗不	太湯病三	氣湯之大承	汗多者急	陽明	承氣湯	寒但熱者	汗後不惡	承氣湯	實者調胃	瀝然脈	身熱汗出	陽明
寒者榮中	熱無汗惡	則傷榮發	中風也寒	惡風者衛	風寒客之	理不密故	液不分	津液實	津液實	也	也	也	太陽初受

白朮九湯	真武湯	三青龍湯	大青龍湯	小青龍湯	六經湯	竹葉加姜	桂湯	小柴胡湯	四柴胡湯	小柴胡湯	湯十加減	葛根三十	四十二
太陽	後麻黃湯	和者白虎湯	大柴胡湯	大柴胡湯	嘔吐下痞	心下痞硬	傷寒	胡大柴	惡熱大柴	汗不實	內實	湯	調胃承氣
蓋寒為陰	然後發熱	增寒微慄	寒邪則必	太陽初也	故即熱也	風性解散	蓋風為陽	隨而發熱	中風邪則	法太陽初	此不易之	黃以發散	肌中寒發

類聚

十一

十白參白
虎加人
湯七
八子
八子
猪苓湯
廿四湯百

惡寒一麻不可與白
葛根升麻
湯脈浮
太無汗
緊自汗者
愈一天行時
疾熱二日
身熱如火
頭痛肉瞤
脈洪大
根湯枝湯
服下之仍
或項痛
頭無汗心
下利小便
不利桂枝
惡寒一麻不可與白
虎渴欲飲
水無表證
者白虎加
人參湯
陽明脈浮
而緊咽燥
口苦腹滿
而喘發熱
汗出不惡
寒反惡熱
身重若發
汗則燥心
憤憤反熾
語則加燒
針則必怵
得陽煩躁
下

寒性勁急
怫結於經
方變熱也
若陽明證
已能表證
惡寒而但
身熱此邪
可入於府
下也方

去桂加茯苓
苓白朮湯
太陽而渴
無汗而渴
小柴胡湯
不渴外有
發熱小柴
胡加桂湯
應加而
嘔汁葉加
薑汁湯
太湯未
解心下未
水氣乾嘔
或而欬
或小便不
利小腹痛
之則胃中
空虛客氣
動膈心中
懊憹舌上
胎者梔子
鼓湯
陽明脈浮
飲水小飲
不利者便
多者不可
與恐奪津
也

類聚
三十九
十一

類聚
三
九

竹葉石膏
八門五湯
麥門冬湯
百九四湯
枳殼子
湯九十四

加人
參湯
少陽
口
咽乾
小柴
胡而
嘔而
胃小
滿小
便不
利小
柴胡
湯

小便
難吐
之則
大便
利並
湯萎
知母
葛根
湯漢
防己

乾薑
也死
證

麻黃附子
細辛湯二
十肌湯三

傷寒
少陰
病始
得之
反
具以
胡證
日柴
五六
日柴
得病
之始
陰

而渴
不惡
寒為
溫病
湯解
肌

大下
後食
氣弱
其人
亡血
病當
惡寒
後
無時
止抵
大抵
湯寒
八日
大已
治者
難

新食
後食
復竹
葉石
膏湯
新差
後胃
氣弱
湯食
則食
十則
子則
殼子
湯枳

傷寒其脈弦細身熱或往來寒熱至于煩渴
 微嘔則熱在半表半裏矣是以少陽一證止
 用小柴胡和解之三陰無身熱惟少陰則有
 熱是未離於表故用麻黃細辛附子藥發散
 溫中也發汗已身灼熱名風溫是風與溫相
 合故用去風解溫之劑若汗後食勞復發熱
 者隨證治之經有翁翁發熱者若合羽所覆
 燻熯而熱明其熱在外也若蒸蒸發熱者如
 重蒸之蒸明其熱在內也若脈陰陽俱虛熱
 不止者死發熱脈躁盛重表之無汗者死大
 汗後發熱愈盛者死發熱下利厥逆煩躁不
 得臥者死此皆藥所不及也

六潮熱

可下

未可下惡證

潮熱如

大承氣湯
 六承氣湯
 小承氣湯
 六十七

實者大脈
 承氣湯
 汗後

日晡發熱
 脈虛
 者微汗

傷寒五日
 六日吐
 汗下後

應候不
 失其時
 屬陽明
 胃經也

大柴胡湯
 四十二
 小柴胡湯
 四十三
 桂枝湯
 小柴胡湯
 十柴胡湯
 四

寒腹滿陽明中
 而喘經浮
 明胃經
 也大小
 承氣湯
 下後大便
 復硬大便
 柴胡湯

晡見鬼
 狀循衣
 摸房微
 喘直視
 脈承氣
 者生脈
 瀉者死

其候應
 於未申
 所以潮
 熱多晡
 於日晡
 經曰潮
 熱者實
 也又曰
 其熱不
 潮未可
 與承氣
 湯以此
 知傷寒
 潮熱則
 是表解

大柴胡湯
 百一

結胸
 一屬太

腹滿鼻
 乾心脇

是表解

十黃二赤麻湯
三苓十小黃八子
湯五豆連十驪
七 湯 軺九皮

陷浮陽
胃者脉
湯大不

湯汗脉冬豆軺麻藥也明身痛
黃或浮陽湯赤黃皮梔中黃
苓盜明小連湯子風陽

之證先于未便便罷潮若為復裏
而隨裏全溇難或表熱想下氣
治其當入是大小未矣之將

七 往來寒熱

和解

如瘧

可卜

經曰邪氣

小柴胡湯
四十三

心煩喜
嘔脅滿

寒熱發
風續得

日結餘

反發寒邪

參棗加五
味乾姜湯
四柴胡湯
大柴胡湯
四十三

食小柴
胡湯
少陽

經水適裏
斷此為

裏熱在

發熱此半
表非裏證

柴胡枳實
湯五十四
桂枝各半
湯十越

嘔頭汗不
出小便便
不刊胃

太陽陽証
似再發一

桂枝湯

桂枝湯
小柴胡湯
日二三發

一婢桂枝湯
一桂枝湯
湯十越

胡桂姜
一者桂枝
湯麻黃

經水適斷

室經水適

經水適斷

類身二十九
 卷之三十九
 十一

桂枝二麻
 黃一湯十
 湯不嘔清厥陰惡
 便寒熱似瘧為
 日二三欲愈桂
 發桂枝支麻黃
 麻黃各半湯
 半湯脈
 微惡寒
 而熱不
 可更發
 汗桂枝
 一越婢
 二湯

而續得寒
 熱謂有留
 邪必須治
 之如先患
 湯寒發熱
 經水適來
 晝明暮昏
 如見鬼訟
 經曰無犯
 胃氣及上
 二焦必自
 愈蓋經水
 斷後熱隨
 血去必自
 愈矣無犯
 胃氣不可
 下焦無犯
 上焦不必

八嘔吐
 熱
 寒
 水飲
 無聲日嘔

小柴胡湯
 四苓湯百
 猪苓湯百
 廿四皮湯
 大橘皮湯
 百六八湯
 葛根加半
 夏湯三十
 五湯而曾
 理中湯百
 熱而發
 熱者小
 柴胡湯
 中者不
 飲水而
 吐者湯
 中先去
 赤茯苓
 為嘔故半
 表裏証多
 云嘔也吐
 則飲食入
 口即吐是
 寒多而
 先滿
 後停
 水飲
 服小柴胡
 湯動衛氣
 也無犯中
 焦不必刺
 期門動榮
 氣也
 有聲日嘔
 無聲日嘔

頁三十九

類聚
三
九

竹葉 加生	四 十 柴胡 湯	大 柴胡 湯	十 六 黃連 湯	黃 連 湯	七 五 九 苓 散 百	百 廿 三 苓 湯	赤 茯 苓 湯	三 九 武 湯	真 武 湯	四 三 參 湯	人 參 湯	黃 連 黃 芩	四 五 胡 湯			
腹 痛 欲 滿 吳 茱 萸 小	有 邪 氣 中 足 冷 小 發 汗	熱 胃 中 有 足 冷 小 發 汗	胃 中 有 足 冷 小 發 汗	胃 中 有 足 冷 小 發 汗	根 加 半 葛 但 若 姜 子 湯 去 附 武	下 利 自 合 湯 去 附 武	病 必 自 合 湯 去 附 武	陽 明 與 湯 少 陰 武	不 安 大 湯 人 參	滿 虛 煩 連 黃 芩 黃 連 黃 芩 散	芒 硝 胃 吐 乾 姜 名 水	胡 湯 加 虛 冷 而 即 吐 也 嘔 自 熱				
用 茯 苓 半	逆 水 飲 當	溫 之 如 水	多 寒 必 當	吐 則 雖 緣	故 用 四 逆	上 有 寒 者	沫 頭 痛 嘔 涎	乾 嘔 吐 涎	嘔 而 胃 滿	柴 胡 之 類	也 故 用 小	者 此 熱 而 嘔	發 熱 而 煩	而 渴 虛 煩	有 寒 如 嘔	也 嘔 自 熱

百 廿 六 夏 湯	小 半 夏 湯	七 二 梗 湯	八 湯	夏 湯	生 姜 汁	百 六 菜 黃 湯	百 六 菜 黃 湯	小 橋 皮 湯	十 五 姜 湯	生 姜 湯	昔 芩 半 夏	十 五 姜 湯	姜 汁 湯
姜 半 湯	嘔 黃 芩 生	白 利 而	陽 合 病	太 陽 少	葉 加 牛	胃 者 竹	餘 熱 在	差 後 有	胡 湯	煩 大 柴	鬱 鬱 微	心 下 急	連 湯
治 脚 之 氣	當 脚 氣	乃 是 氣	或 是 氣	脚 弱	而 復	若 患	夏 湯	小 半	不 下	諸 穀	湯	半 夏	夏 寬 中 行

類聚
三
九

類聚
三十九
二十一
十一

湯陽 六毒 十升 四麻	十 發 狂	中陰 湯小 建太	一 一 之 鑿 太 武 便 嘔 或 有 利 痛	甚 者 踰 自 下 氣 此
踈陽 發毒 斑狂	陽 毒			
焦畜 其血 人下	畜 血			
者火 鑿邪	火 邪			
重主 盛動 則陽 陰氣	者經 狂日 蓋重 陽陽			

湯桂 十支 六牡 蠟	五救 逆湯 十減	桂支 枝湯 加減	桂枝 湯一	五抵 當丸 百	六二 奴丸 百	黑奴 丸百	湯百 卅五	桔梗 大黃	八十 七黃	梔子 仁湯
枝者 湯與 桂解	外不 解愈	下者 愈下	血自 狂驚	人如 其狂	解熱 結不	太陽 不其	九痛 抵當	黑抵 下當	大便 反利	腹滿 小於
牡蜀 蠟漆	藥加 芍枝	去桂 枝日	臥安 起然	驚狂 以勝	煩躁 陽寒	必假 之寒	治之 法法	不踰 垣上	棄衣 而走	如見 鬼神
人無 表証	亂也 但病	狂者 非若	然仲 景但	如畜 血於	以勝 之至	必假 之寒	治之 法法	不踰 垣上	棄衣 而走	如見 鬼神

頁三十九

白虎加倉	刺卅八	四期門三	小柴胡湯	十柴胡湯	白虎湯	牡蠣湯	柴胡龍骨	湯五枝	柴胡枝	四當百	瓜當百	四當百	大柴胡湯	六柴胡湯	小承氣湯
承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯	承氣湯
湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當	湯室抵當
胡加	可柴	重不	利身	便小	驚小	滿小	後小	日小	入小	傷小	多小	桂小	柴小	下小	不可
殆必矣又	病見陰危	又見沉微	陽脫陰勝	其汗以勝	氣及風溫	後重虛陽	或吐下之	汗多亡陽	為順虛者	當下之此	則不識人	行大數劇	血攻衝脉	下宜訛謬及	昏亂語言

類身三十九

二二二

二米湯七十

大便	惡寒	惡熱	虎湯	三陽	病腹	身重	以中	口吐	遺溺	滑脈	可下
秘	反	白	合	難	難	難	不	不	必	必	宜
傷寒	熱	來	日	則	見	此	熱	室	湯	遲	焦
發	水	晝	了	晝	晝	晝	晝	晝	晝	晝	晝
湯	壯	龍	骨	湯	壯	龍	骨	湯	壯	龍	骨
濕溫	妄言	白	蒼	湯	壯	龍	骨	湯	壯	龍	骨
而聲	鄭	聲	乃	虛	而	聲	鄭	聲	乃	虛	而
也	當	用	溫	而	聲	鄭	聲	乃	虛	而	聲
若	實	若	實	若	實	若	實	若	實	若	實
若	實	若	實	若	實	若	實	若	實	若	實

頁三十九

三三三

類聚三十九
二十四

三十發黃

茵陳湯九
十陳五苓
茵陳五苓
散九胡七
小柴胡湯
四十三
抵當丸百
五承氣

入吐發
紫黑是
毒熱陷
於內不
可治矣

畜熱

頭汗出
劑頭引而
還渴引而
水漿引而
茵陳五苓
茵陳五苓
茵陳五苓
沉浮大脈

陰黃

六日斑
出猪膽
雞子湯

小便不利
利四肢不
沉重似
飲不飲
茵陳五苓
茵陳五苓
茵陳五苓
湯小散便

畜血

生瘡
咳而
下利
黃連
湯橘皮

畜血濕
下焦血濕
其人焦
欲狂人
少腹硬
滿硬
小便不利
大便不利

當汗不當汗

利小便黃不
利亦生黃不
夫脾屬土
其色黃土
於肌肉黃
熱相搏於
陽明溼於
又屬土陽
故間於真
肉故間於真

湯犀角地黃
百五

短氣腹利如皂
滿心脅乾
痛鼻乾
無汗嗜便
臥一身悉
及目悉
黃小便
難有潮
熱少陽
中風也
小柴胡
湯

黑睛色見也譬
猶醫過濕
與熱搏氣
不得透鬱
而生黃病
者濕熱在
內又宿穀
未消則黃
生矣治之
之法當通
熱去濕通
利小便分

茵陳三物
湯七十八
理中加茵
凍湯百四
大子藥皮

大便自傷
利而黃
者茵陳
梔子黃
連三物
湯

傷冷中
寒脈弱
氣虛小
便如常
變為陰
黃理中

發熱
一身痛
盡身痛
俱身痛
太陽黃

導其氣則
為愈矣若
瘀血狂言
小腹滿硬
按之則痛
此血證明

類聚三十九

二十四

湯八十九	麻黃連	赤小豆	二五	瓜蒂	法二	六
往來寒	熱一身	柴胡湯	加梔子	茵陳	陳	中濕也
也故用	當桃仁	承氣也	當氣也	當氣也	當氣也	當氣也

水	中	出	甚	黃	鼻	搐	法	搐	鼻	散	瓜	以	初	豆	赤	連	麻	皮	子	也	中	
濕	也	故	用	抵	仁	承	氣	也	當	桃	仁	承	氣	也	當	氣	也	當	氣	也	當	氣

四十結胃
熱實寒實
血結水結
病發於陽

大陷胃湯	百一	小陷胃湯	百二	三黃瀉心	湯百卅	小柴胡湯	四三	枳實理中	丸百五	三物白散	百八	增損理中	丸百九	四逆湯
汗未	解之	下氣	邪氣	乘虛	結於	心下	硬滿	而痛	或喘	為大	證下	必之	及硬	忘小
無熱	結而	寒實	此實	熱入	為水	而散	柴胡	湯小	去棗	加壯	項強	寸關	沉大	若再
飲水	散水	成散	表邪	而遠	邪氣	客於	其病	堅滿	石硬	項強	寸關	沉大	若再	若再

湯	調	五	小	七	牡	防	五	小	湯	桂	湯	桂	六
六	胃	八	建	七	風	九	續	三	枝	枝	枝	枝	十
八	承	中	中	湯	白	命	湯	葛	根	葛	根	葛	六
	氣	湯	湯	百	木	湯	湯	根	根	根	根	根	一
藥	可	桂	可	者	更	若	成	也	中	太	惡	發	太
甘	芍	枝	行	不	數	小	湯	承	調	便	而	汗	陽
液	此	自	小	湯	柴	散	香	者	渴	內	霍	中	陽
內	亂	服	湯	柴	胡	小	滿	多	發	湯	四	有	明
利	吐	霍	冷	漏	止	滿	遂	汗	逆	汗	冷	法	中
附	桂	亡	漏	風	日	不	遂	汗	逆	汗	冷	法	暑
子	枝	湯	風	日	不	遂	汗	逆	汗	冷	法	法	陰
													證
而	桂	浮	詳	桂	用	表	汗	施	脈	風	者	無	傷
小	枝	而	細	枝	實	實	當	自	受	則	當	汗	傷
便	後	弱	若	須	表	當	汗	汗	汗	汗	汗	汗	戰
數	煩	服	脈	用	然	多	實	實	實	實	實	實	慄

草瀉心

類聚二十九

二十九

七	五	桂	小	六	苓	小	湯	木	桂	十	赤				
九	苓	湯	柴	湯	湯	斗	子	子	枝	十	石				
		散	五	百	百	夏	七	枳	湯	湯	脂				
		百	十	十	十	茯	三	穀	一	二	禹				
												硬			
逆	虛	益	下	鳴	腹	心	附	汗	硬	心	湯	浮	氣	乾	硬
也	氣	甚	之	心	中	之	子	出	惡	下	十	十	脈	嘔	引
甘	上	此	再	下	雷	後	瀉	者	寒	一	棗	不	短	下	瀉
															心
															服
															湯
															散
															五
															不
															小
															利
															便
															滿
															諸
															而
															心
															湯

類聚二十九

二十九

甘 草 乾 薑	廿 四 湯	汁 二 百	四 逆 猪 膽	湯 六 附 子	桂 支 附 子	四 五 湯 百	理 中 湯 百	八 逆 湯 百	四 三 胡 湯	小 柴 胡 湯	百 十 五 二	香 薷 散	十 七	白 虎 湯 七	百 二 十 七	蜜 導 煎
湯 葛 通	葛 根	桂 枝	風 也	陽 中	瘥 太	名 柔	惡 寒	出 汗	張 反	背 反	口 噤	搖 頭	沉 細	熱 脈	病 發	太 陽
導可可硬便竭 煎蜜攻不雖大																
中湯四渴絕脉足 湯理逆者不沉冷手																
草 乾 薑	逆 甘 漏	吐 厥 陽	乾 嘔 止	白 因 多	小 復 及	少 陰 表	汁 湯 可	猪 膽 數	逆 加 湯	脉 四 桂	絕 通 難	微 欲 屈	厥 脉 拘	出 而 自	止 汗 云	吐 利 者
桂 枝 黃 芪	漏 非 附 子	陽 如 器 之	止 名 日 亡	多 遂 漏 不	及 發 汗 過	表 虛 自 汗	可 與 也 如	數 者 慎 不	湯 若 小 便	桂 枝 附 子	難 者 可 服	屈 伸 小 便	拘 急 難 以	自 汗 四 肢	云 太 陽 病	者 不 可 再

湯黃湯
五芪百
七建十
中四

中 小 礪 木 風 卧 不 | 惡 煩 湯 續 用
湯 建 湯 牡 白 防 得 | 風 燥 命 小

湯 建 黃 次 痰 温 不 汗 薑
中 芪 服 之 粉 止 多 湯

條 汗 之 不
自 風 足
有 温 以
本 自 實

七十
下利

協熱

協寒

合病

維病
下利

三黃
芩湯
七

腸
垢
即

鴨
溘
者

太
陽

多
因
寒
之

黃芩湯

太陽

維病
下利

十煩躁

表證裏證
湯禹餘糧
陽虛
陰盛

也
煩為內不
安躁為外
也

大青龍湯

太陽
無汗
日五六
復發
少陰

有不安躁

卅六散百

大青
繞大
日五六
汗晝
手足利

陽所大熱

小承氣湯

龍湯
痛此
日五六
不晝
厥逆

脈浮大熱

六承氣湯

太陽
有躁
得眠
欲死

證也治以

湯連阿膠

汗後
有躁
夜而
吳茱

寒涼陽為

大柴胡湯

不承
氣小
不安
少陰

沉微厥脈

四姜附子

眠欲
傷寒
證熱
躁不

利乃陰證

干姜附子

水者
傷寒
證熱
躁不

也治以溫

四草湯百

少者
傷寒
證熱
躁不

此躁愈極

茯苓四逆

與之
日六
草湯
雞子

陰躁增

湯百十甘草

消渴
此為
發汗
下利
極發厥物

芍藥甘草

入陰
之病
嘔咳
而利

湯百十六

黃連
仍不
嘔咳
而利

黃連雞子

解者
得臥
謂之
戴

湯七八

惡寒
扶苓
湯盛
也下虛

猪苓湯百

而蹇
四逆
陰盛
謂之
可便

廿四湯百

時時
逆陰
躁盛
謂之
可便

小建中湯

煩自
悸而
名躁
謂之
可便

五八湯百

欲去
煩而
躁四
謂之
可便

四逆湯百

衣被
煩小
逆湯
謂之
可便

八逆湯百

大柴
建中
傷寒
謂之
可便

百四散二

胡大
湯柴
建中
傷寒

九十渴

內熱

吐汗下後

少陰

有渴之二大率

黑七五散茵廿猪	奴九苓九陳四苓	丸散七五湯百	左百百苓	利小便	而便	上乾燥	猪得眠	之法不過
便飲熱脈	不水一浮	利小欲發	利小欲發	利小欲發	利小欲發	利小欲發	利小欲發	利小欲發
微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消
微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消
微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消	微熱消

可與身細吟
桂枝與
宜芍
藥甘
草湯
水不飲
靈散
飲不
可與

湯甘九括六竹減小四乾柴十白參白四小六	百草八婁葉湯柴胡柴胡柴胡	十乾姜百	四胡加	小柴胡湯	二胡加	白虎湯	參湯	白虎湯	四二胡加	小柴胡湯	六三
--------------------	--------------	------	-----	------	-----	-----	----	-----	------	------	----

惡表與者不黑熱大狂陽散	風裏不不奴咽一煩毒	脇證半可	收四出足中參虎煩大桂太湯	白肢煩冷汗手	虎不汗	薑草也虛下色小	湯乾甘寒焦白便	意但不可令極
惡風脇收白虎	表裏證半可	者不不奴咽一煩毒	狂煩大桂太湯	陽毒發	散五苓	微熱消	便不	微熱消
惡風脇收白虎	表裏證半可	者不不奴咽一煩毒	狂煩大桂太湯	陽毒發	散五苓	微熱消	便不	微熱消
惡風脇收白虎	表裏證半可	者不不奴咽一煩毒	狂煩大桂太湯	陽毒發	散五苓	微熱消	便不	微熱消
惡風脇收白虎	表裏證半可	者不不奴咽一煩毒	狂煩大桂太湯	陽毒發	散五苓	微熱消	便不	微熱消

湯小滿而柴胡加人參

竹括葉湯 加人參 去柴胡 小柴胡 多而明 陽明汗 乾姜枝 心煩柴 來寒往 而不利 便不利 胃滿小 汗復下 太陽已 易人參

十二頭痛 太陽少陽陽明厥陰 風溫汗 出而湯 括葉湯

瓜百	瓜三	四柴	小柴	湯十	桂麻	湯三	葛根	湯百	連須	桂枝	麻黃	十二
蒂廿	蒂三	柴胡	柴胡	十各	麻各	三各	根葱	百九	須葱	枝湯	黃湯	頭痛
摘五	散二	湯	湯	三半	各半	各半	葱白	九白	葱白	湯一	湯廿	
鼻												
如破	發汗	汗未	已發	枝湯	汗桂	有桂	湯有	麻黃	無汗	太陽	太陽	太陽
緊不	發寒	及承	次蒸	湯非	柴胡	細小	脈弦	往來	寒熱	少陽	少陽	少陽
	脈寒	承氣	及蒸	非氣	胡實	小大	弦惡	來寒	熱惡	陽明	陽明	陽明
		胃也	所胃	所胃	胃便	便熱	惡反	寒惡	惡	明	明	明
湯建	愈為	厥陰	湯黃	茶沫	吐涎	乾嘔	厥陰	得犯	邪三	太陽	太陽	頭痛
中痛	小欲	陰	黃	吳	陰	之	陰	犯之	邪三	陽	陽	痛本
若厥	連目	痛則	至不	陰少	陰中	太	太	邪三	皆	經	經	屬
陰	入頃	無頭	於	而	太	太	太	皆	皆	三	三	屬

白五小十附芍四六四理
虎八建七子藥二柴五中
湯 中 湯 甘 胡 湯 百

湯桂盡表 | 多汗脉陽湯麻
枝也末 | 微出遲明 黃也未者 | 但下雖
有

湯婢二桂枝胡
一越枝湯桂柴
胡大厚不
湯柴衣欲煩

發後大虎熱裏 | 時渴熱解日七下湯建者足
汗復下湯白俱表 | 時而發不八後吐中 小温

本惡不表蓋系若也寒表下證寒之也細
條寒慎裏以爲尋惡方俟必卡雖但方此
自○不此甚常寒可不當可有微可陰
有背可別重所雖攻惡解遠裏惡温虛

類聚
三十九
三十五

類聚
三十九

下更可吐
不俱虛
表裏
陰陽
而此
脉微
尺寸
攻瘧
然後
枝湯
用桂
汗先
痞無
心下

百五十六小四黃葛麻	八味七承氣湯	十子湯	湯	廿	喘	二	廿
陽苓黃者而解者止利反桂	與湯連葛而汗也表脉遂下	陽太黃根出未促不之	陽太黃根出未促不之	太	陽	無	無
氣下湯承	湯小承	承宜屬	承宜屬	陽	明	後	潮
湯承	承宜屬	承宜屬	承宜屬	陰	厥	中	小建
麻邪當滿明下潮寒汗黃	黃故先而合太熱而喘有	湯亦散喘病陽宜	湯亦散喘病陽宜	明	身	二	證
全	至	全	全	明	而	太	陽

小苓麻小八夏生十朴桂湯甘麻	青湯黃青龍	龍四加扶	百廿	汁半	杏子湯	枝加厚	廿三膏	杏子
解者之太石于麻大而枝可之太	也表微陽膏甘黃熱上汗行後	桂未下湯草杏者無出桂不	加杏子	黃龍上小	髮	汗	出	若
取其酸收	子湯以	姑吉兆也	陰陽相背	喘促者此	方不可	滿不惡寒	沉實腹堅	大便也若
取其酸收	子湯以	姑吉兆也	陰陽相背	喘促者此	方不可	滿不惡寒	沉實腹堅	大便也若

蘇黃柳杏子湯卅九

枝加厚湯

甘緩之意

倘身汗如油喘而不休此為命絕矣

似徹心非憤憤者

肺為五臟

三卅嗽

太陽少

陽明證雜

少陰

華蓋猶覆

卅八青龍湯

太陽發

腹滿脈

少陰

主於氣氣

小柴胡湯

熱而發

浮弦數

四肢

分則無嗽

小三柴胡湯

太陽發

小潮熱

厥逆

濁氣上干

咸湯卅九

乾胸得

痛或

唐世

以協水停

加味四逆散百九

而小

汗嗜臥

而逆

飲肺不得

柴胡湯

風也小

散加

矣或用杏

罷表未

柴胡湯

五味

子阿膠者

解心下

汗後傷

姜乾

也若太陽

有水乾

水欬小

姜乾

少陽在表

嘔發熱

而喘小

姜乾

之邪于於

而一曾

麻黃加

姜乾

之氣則當

熱往來

痰而一

咳陰

若陰証停

脇滿或

大半夏

真武

之

泄利小

傷寒秋

少陰

之

柴胡去

傷寒秋

少陰

之

棗人參

濕欬

沉重

之

百六五	吳茱萸湯	百一湯	黃生姜湯	四逆加茱	四逆湯	理中湯	湯百廿九	茯苓甘草	三苓湯	各半湯	桂支麻黃	百八十湯	五味子湯
心傷	汗而解	湯時大	麻黃各半	兼與桂枝	味子湯或	足急服五	綿衣包手	汗也多用	必是有正	一手足無	忽無脈或	面色不澤	寒熱而一
黃湯	欲死	吳茱萸	吐利手足	子湯五	而促脈伏	喘促五	生薑湯	逆加歸四	無當歸四	清熱中湯	微寒謂之	手足指頭	湯下之若
不可不察	不可不察	不可不察	宜詳審蓋	惟湯厥最	武湯溫之	四逆湯真	厥也急用	獨勝名陰	者此陰氣	熱證而厥	利不渴無	未厥前自	湯下之若

四十三	柴胡湯	小柴胡湯	五建中湯	八建中湯	七九散百	萬苓散百	桂枝湯一	四十二湯	大柴胡湯	五廿	表裏俱見		
和其胃	柴胡湯	宜用大	便赤澁	燥熱小	若煩渴	却當下	下痞悶	其人心中	大是表而	者宜先治	水次服		
表裏俱	柴胡湯	反浮而	證也脈	此陽明	反惡寒	不惡寒	熱汗出	而喘滿	苦腹滿	苓甘草湯	脈浮大		
利不止喘	芍藥湯	痛桂支加	之因介腹	太湯醫下	支人參湯	下痞更桂	利不止心	之遂協熱	解而數下	弦細	脈浮緊		
											脈浮大	脈浮緊	脈遲
											弦細	脈遲	悞下

類聚三十九

口

數大便 硬小承 氣湯本 傷寒復 吐醫之 食入口 即此乾 薑黃連 黃芩人 參湯	

廿七 汗後不虛	解	芎藭 附子湯 十惡寒者 但惡熱汗後 汗後	病之初感 始於人 經故以 汗為既 汗之既 如油然 雲沛然 下
實		發汗病 發汗後 病太易 汗後	
渴		燥不愈 得表未 欲然邪 水者裏 少者而 與之或 令胃因 氣和邪 則愈各 若脈不 子小各 便不微 利不消 者	

真武湯百 卅九新加 桂枝附子 湯六甘草 桂枝二湯 四逆湯百 八逆湯百 厚朴人參 湯百承氣 調胃承氣 湯六承氣 麻黃湯二 千柴胡湯 大柴胡湯 四十二	虛也芎 藥甘草 附子湯 脈細身 蹠者方 可服 太陽發 汗汗出 不汗仍 發熱心 下悸身 下動振 調動振 振欲擗 地真武 湯發熱 身疼後 脈沉者	及蒸蒸 發熱者 實也調 胃承氣 湯承氣 服桂枝 湯與桂 大與桂 支湯如 前法若 九如瀉 汗再發 解麻必 湯發熱 山不汗 心中痞 渴者	大汗 胃氣 中乾 燥不 得表 欲然 水者 少者 與之 令胃 氣和 則愈 若脈 子小 便不 利不 消者	汗有雲 愈倘汗 不者或 表邪未 而然或 然專裏 或汗而 過多而 或因邪 虛內客 各之所 不之也
---	---	--	--	--

類聚三十九

口

一參白七五十三廿麻湯扶
湯虎九苓三草黃百苓
七加散湯杏廿大
十人百二人

心自多發子友屈急四小人不汗太湯參芍桂
下冒又汗湯加仲難支便惡止遂陽新藥支
悸心手過附桂以微難風其瀉發發加人加
甘黃熱喘汗行不發湯草枳豚欲濟缺柴下硬
草杏者無出桂可汗後大棗甘苓奔悸後胡湯大吐
湯人麻大豚不解煩出大汗枝服苓者煩浮已發散
人虎大白洪解渴大汗湯桂散五
參加白洪解渴大汗湯桂散五苓

八下後不解

身熱利不胷腹煩

參半朴脹汗湯寒下四內熱大草桂欲
湯夏生滿後湯四逆惡疼急去出甘按
人薑厚腹逆惡疼急去出甘按

湯

去傷寒之邪不過汗

九廿過經不解

枝去桂加茯苓白朮湯

大便利

嘔煩

調胃承氣湯 小柴胡湯 柴胡芒硝 柴胡前胡湯 大柴胡湯 四十一

傷寒十三日不解過經二三日下之當利也 若大便不利者下之當利也 若下利者不可下 若下利者不可下

太陰病過經二三日下之當利也 若下利者不可下 若下利者不可下

治之先氣 謂之實 汗吐下之 不差溫補 針灸之適 當則十日全 得矣若過 經者以六 七日為一 候若不愈

知醫以丸 藥下之非 其治也其 自利者脈 當微厥今 反和者內 實也調胃 承氣湯三 傷寒十三 日不解胃 滿而嘔日 晡潮熱已 而微利此 本柴胡證 下之而不 得利今反 利者知醫 以丸藥下

大柴胡湯 太陽過經 十日餘日 心下欲吐 胃脘微滿 微煩者不 經吐下者 當與柴胡 湯若會經 吐下者則 邪氣乘虛 入胃為實 湯調胃承 氣

至十日三 日乃再傳 經盡所以 謂之過經 也

類聚三十九

四十七

十三火邪

桂支加減 救逆湯十 五胡龍骨 柴胡龍骨 牡蠣湯五 五支甘草 桂支甘草 龍骨牡蠣 湯十六

虛邪

芒硝湯加 服柴胡後 以解外湯 小柴胡湯 實也先宜 也潮熱者 之非其治

實邪

傷寒脈浮 以火迫之 亡陽驚狂 臥起不安 桂支去芍 藥加蜀漆 牡蠣龍骨 救逆湯柴 胡龍骨牡 便難火熱 於內則小 發黃熱搏 於外身必 重灼熱發 火熱兩陽 邪因劫之 以太陽中 以火劫之 邪因劫之 火熱兩陽 汗不出服 邪凡傷寒 故謂之火 火而用之 其不當用 火邪者謂

也其證固 津液內竭 汗不再行 于三藥至 發汗不出 汗不藥至 邪凡傷寒 故謂之火 火而用之 其不當用 火邪者謂

犀角地黃 湯百五八 麻黃杏仁 蕙苾甘草 湯廿七

礪湯下之 火逆下之 因燒針煩 躁桂支甘草 草龍骨牡 礪湯下之 太陽汗下 心下痞表 裏俱虛復 加燒針胃 煩面青膚 潤者難治 色黃手足 温者利治 少陰被劫 氣劫故也 小便必難

太甚則手 足躁擾捻 衣摸床為 難治小便 利者尚氣 未劇尚火 治也尚火 太湯以火 熏之不得 汗發躁不 解必下清 血者名為 火邪角為 地黃湯角 脈浮宜以 汗解邪無 從出病從

危若尋常 汗證藥末 至切而汗 不行於以 火迫於劫 場取汗於 奪取汗邪 氣熏併變 熱交併邪 為驚狂等 證實者則 煩躁不巳 虛亡當量 脫虛實而 其散之而 解散之而

類聚三十九

四十七

宜滋津

腰以下必重而痺名
杏仁
甘草湯
意苡

一卅急下急少陰急陽明急少陰急溫

溫

下

下

急

溫

大承氣湯
六六
四逆湯百

少陰病陽明發少陰者非若它
得之二二熱汗多脈沉證尚可緩
三日口者急下之四溫也少陰屬
燥咽乾之承下逆湯腎主水乃
者急下承氣湯不逆湯熱邪內炎
之承病解腹滿少陰湯熱邪內炎
氣湯病解腹滿少陰湯熱邪內炎
少陰病解腹滿少陰湯熱邪內炎
自利純之痛急下承飲乾如腹脹不

二
百
合
決
王
黃
六
十
餘
上

青水心氣湯傷寒六可嘔不
下必燥咽七日目急溫水也亦常
乾者急下承氣湯了睛不逆湯屬胃上汗
承氣湯少陰病表證大液腹滿痛
六七日微熱急下承氣湯為土實急
腹脹不微熱急下承氣湯當下之熱
大承氣湯下承氣湯危矣須急
下承氣湯急下承氣湯急下承氣湯
承氣湯承氣湯承氣湯承氣湯承氣湯

大便土勝
水也亦常
急下陽明
屬胃上汗
多熱盛急
下以存津
液腹滿痛
為土實急
當下之熱
病目不明
熱不已者
死今日睛
不和證亦
危矣須急
下之少陰
急溫二證
內寒已甚
急溫無疑

也

百竹皮湯二	百燒棍散二	三卅陰陽易	湯滑石代赭	百五洗方	百合洗方	湯百合地黃	百合知母	二卅百合
-------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	------

百合者百脈一宗悉致其病無復
 經絡其狀欲食復不能食欲臥復
 不能臥欲行復不能行如不寒又
 無寒如有熱又無熱常然不知
 所以口苦小便赤服藥入即吐
 利如有鬼邪蓋此病因病後失於
 調理餘證在陰則攻陽餘證在陽
 則攻陰攻陰者或發其汗攻陽者
 或反下之以此為逆各不得解故
 用百合等藥取其和合於百脈也
 男子病新差婦人與之交曰陽易
 婦人病新差男子與之交曰陰易
 如交易之易互為病也男子則陰
 腫小腹絞痛婦人則裏急腰膝連
 腹內痛男女或熱上衝胃頭重不
 舉眼中生花百節解散燒棍散竹

二卅猴鼠糞湯	五苓散百	七九	卅狐惑	治蜜桃仁	湯二二百十	六黃連犀角	湯八銳散	二卅雄黃
--------	------	----	-----	------	-------	-------	------	------

皮湯猴鼠糞湯小便不利則用五
 苓散其氣外動邪熱痛引入腹
 其內損真氣外動邪熱痛引入腹
 陽脫邪盛多不可治矣
 千金方云傷寒不發汗變為狐惑
 又緣傷寒腹內熱飲食少腸胃空
 虛三虫行作求食蝕人五藏及下
 部為蠱其候齒無色並惡飲食面
 目乍赤乍白乍黑舌上白唇黑有
 瘡四肢沉重忽忽喜眠其飲其喉
 為惑其聲啞虫食下都為狐其咽
 乾甚者虫食其藏而死當看其唇
 有瘡虫食藏也下唇有瘡虫食
 也殺人甚急或因下利而得之狐
 惑者取其進退
 猶豫之義也

五卅虻厥

虻厥者病人元有食虻此為藏寒
 虻上入膈故時或發煩須臾復止

烏梅丸百
八六九百
理中丸百
四八湯百
四逆湯百

得食而嘔又煩者或因其汗胃中冷
人當自吐或因其汗胃中冷
故長蟲出又有胃氣困乏雖飢不
能食比食到口或聞食氣而上虛
寒併於胃中所以食與蛇并生而
出也厥者此屬厥陰又厥逆之義
也仲景止用烏梅丸活人謂胃中
虛冷先服理中丸亦佳或用四逆

六卅白胎

惡寒嘔

喘滿

舌為心之

小柴胡加
減湯四十
九理中丸百
四八胡湯
小柴胡湯
四十三

脈陰陽俱
陽明脈浮
緊舌上胎
滑惡寒者
小柴胡去
半夏加人
參括婁湯
腹痛者理
懷舌上鼓

本津液之
地熱澗其
邪液枯而
心乾故舌
上白胎若
邪在表則

八十八
振子鼓湯

中丸
脅下硬下
大便而嘔
舌上胡湯

湯吐之

裏則生胎
若舌色黃
未下者下
之生至
為熱劇至
七八日已
七反大熱
者為難治

七卅
七卅

太陽

少陰

血本為陰

桂枝湯一
麻黃湯廿
葶花湯百
九一
澤魚地膏
湯百五八
黃芩湯
湯百十四

太陽病白
黃湯後服
者為欲解
有汗脈浮
緩再與桂
支湯與桂
無汗脈浮

強發小陰
汗必動血
為大動血
耳目口鼻
出又日下
難治為犀
脈微者犀

為氣變則
為汗血與
汗一也太
易表之未
解得日其
人發煩目
頭劇者必

五苓散百
七九
竹葉湯八
十六

緊而一者
再與麻黃
湯
一血不止
葦花湯

用黃湯
與芍藥
湯
而渴欲
飲水入
即吐先服
五苓散次
服竹葉湯

解蓋陽盛
劇欲如故
也若不當
汗而強汗
之必動血
或從口中
耳目中出
是為厥也
故難治也

八廿
口燥咽
陽明
少陽
少陰

此陽明燥渴
胃緣土能
制水故用
白虎加人
參滋津液
水少陽邪
在中焦口
苦舌乾則

白虎加人
參湯七十
一參湯七
小柴胡湯
四十三

陽明無
大熱背
微惡寒
往來而
嘔口苦
舌乾小
急下

少陽脈
少陰

大承氣湯
六十
白虎加
人參湯
柴胡湯
之承氣大
以承氣小
和之若少
陰熱在下
焦銷燥腎
水當急下
之不可緩
也

承氣大
湯承氣大
者此乾
者此乾
津液燥
枯燥
慎不燥
可發
汗
若欲
眠聲
乾者
當者
孤感
治之

一四下後熱

太陽

陽明

治為傷者難

桂枝加減湯 桂枝九湯 八子鼓湯 八子八湯 亭歷苦酒 湯百九七 梔子乾姜 湯九十二

太陽證服 仍外熱心 中候饑 不能食頭 汗出梔子 後則傷血 故脈瀉亭 歷苦酒湯 醫以丸藥 下之熱不 去微煩梔

仲景云大 發其汗使 陽氣微又 八下之使 陰氣弱其 八亡血病 汗寒後乃 發熱無休 止時陰陽 既虛氣血 俱弱故其 息不可止 梔子亦

酸苦湧泄 之義也 此二證仲 景不言治 法益於表 裏陰陽之 論已見之 矣百問所 施標本光 後亦仲景 之餘議也

二四表裏寒

表寒裏熱

表熱裏寒

子乾姜湯

酸苦湧泄

熱

白虎加人參湯 參湯七十 一麻黃 廿支麻黃 各半湯十 三柴胡湯 四柴胡湯 七柴胡湯 小柴胡加 桂湯五十

病人身大 寒不欲近 衣寒在皮 膚熱在骨 也先與人 白虎加參 湯熱除 服桂枝麻 黃各半湯 脈沉遲手 足或微厥 下利清穀 此陰證發

病人身熱 反欲近衣 熱在皮膚 寒在骨髓 也先與陰 旦湯寒已 次以桂湯 胡沉遲手 脈沉或微 足或微厥 下利清穀 此陰證發

論已見之 矣百問所 施標本光 後亦仲景 之餘議也

八 四逆湯百惡寒而熱四逆湯

時時自煩
不欲厚衣
下大柴胡湯

三 四無表熱
過經
瘀血
無表裏證

小柴胡湯
傷寒四五
下後脈數
者俱非
四柴胡湯
日至十三
不解至六
證俱可用
大柴胡湯
日過經無
七日不大
小柴胡湯
證與裏無
七日不大
大柴胡湯
證與裏無
六承氣湯
證與裏無
六承氣湯
證與裏無
四當湯百

柴硬者愈
日消穀六
亦瘀血證
七柴胡湯
中六日亦
也亦瘀血
證

四 四水氣
表不解
裏
表裏
水為至陰

小青龍湯
傷寒表結
胃無中風
其性則寒

廿八散二
不解心大
熱此發熱
得水則消

文蛤散二
下有嘔
水結在
六七日
熱之若身

百三散百
發熱喘
頭汗出
日煩
熱內寒得

大陷胃湯
或利或渴
胃大陷
水飲水
相搏故水

百一陷胃湯
小便利不
傷寒厥
即吐
小青龙湯

類聚三十九
五十二

茯苓甘草湯
真武湯
卅九

利少腹而心下悸
滿小青
病在陽
解以汁
冷反以
之其熱
被却熱
得去不
更益堅
肉上要
起欲水
反不渴
文蛤散
五苓散
傷寒心
下有

治苓甘草
水茯苓
陰腹
利四便
不疼此
下利此
或有欬
或欬嘔
利小便
湯真武

裏證
名水
逆五散

以乾姜細
辛半夏之
辛行其水
也
苓等劑取
其能下畜
水若水結
在管但頭
汗出徧身
無汗是外
飲不用得
池用之少
湯內寒必
當陰溫也

五血證

四抵當湯百
五抵當丸百

少腹滿硬

喜忘喜飢

之血乃人身

喘熱不
渴服湯
已渴者
此寒去
欲解小
青龍湯

太陽身黃
脉沈結少
腹硬小便
白其人如
狂血證諦
也抵當湯
傷寒有熱
少腹滿應

陽明喜忘
必有畜血
屎雖硬其
色黑抵當
湯無表裏
發熱七八
日脉雖浮

通則無疑
滯之患若
為邪熱所
攻抑而不
行初為畜
血次為瘀
血故以抵
當之劑抵

小便不利者利者
今反利者
有血也抵
當丸

效可下之
假令已下
脈數不解
至六七日
不大更有
當湯也抵

泄苦熱勝
血也

六熱入血
室

經水適來

經水適斷

婦人熱入
血室有三

刺期門二
百廿八
小柴胡湯
四十三

婦人中風
發熱惡寒
經水適來
得之七八
日熱除
遲身涼
胃

婦人中風
七八日續
得寒熱發
作有時經
水適斷此
為

藥者蓋以
經水適來
二條不言
而氣乘虛
去矣故熱
止則熱亦

臨滿如結
胃狀嚴語
者此為當
刺期門隨
其實而瀉
之婦人傷
發熱經水
適來晝日
明語如見
鬼狀此為
無犯胃氣
及上二焦
必自愈

結故使柴
瘧狀小柴
胡湯下血
陽明此為
譎語此為
但頭汗出
者利期門
隨其實而
瀉之減然
汗出愈

可用汗下
藥犯其胃
氣及上二
焦如其胃
滿竅語此
內實也刺
期門以瀉
之若經水
適斷續得
寒熱其血
必結故用
小柴胡湯
若陽明熱
入血至此
男子夫血
刺之證但
也

七便膿血協熱

協寒

犀角地黃
下利不止

少陰下利

桃花湯
必協熱而

少陰二三日

傷寒先熱

日腹至四五

後厥後復

謂之協熱者

日傳經至七

協寒者謂之

者其熱不退

約其熱則當

先厥而利

清其熱則當

利當自止

下也當固共

八乾嘔

寒

熱

水氣

嘔而有物

通脈四逆

少陰下自汗

表不解

嘔而無物

白通加猪

外熱微枝湯

水氣有腕是

胃之本屬

四逆湯百

欲絕通微枝

水氣有腕是

胃之本屬

八逆湯百

脈四逆涎沫

水氣有腕是

胃之本屬

生薑湯七

逆元脈湯反

身涼寒嘔故

不

一五 小便數

可溫

可利

甘草湯 芍藥湯 湯百十 調胃承氣湯 小承氣湯 六承氣湯 脾約丸 五二約丸

太陰自汗 四肢拘急 難伸 心煩微惡 寒脚舉者 不可行 支宜與甘 草乾姜湯 芍藥甘草湯

太陰後汗 下而胃不吐 和譫語者 少與調胃 承氣湯吐 太陰後汗 下大便因 硬者小便 澀數則小 便堅而大 尤便堅脾 約

乃小便數者 腎與膀胱 俱虛客熱 乘之虛不 能制水則 小便熱澀 水行澀不 則小便數 快故令數 起也若大 便堅約者 脾約也脾 主者為大 強液行其 束不弱約 致

二五 多眠

太陽

少陰

風溫

狐惑

大便數而

小柴胡湯 四三 萎蕤湯 九六 四逆湯 八

太陰尺寸 浮滑傷寒 如 傷寒反多 眠 欲解則多 眠 此神將 復也如少 陰脈沉細 但欲寐者 陰證少寐 或發汗後 身熱猶有 喘息者當 治了病故 多眠風溫 為病常不 神恍惚也

太陽病俱沉寸 浮滑傷寒如 傷寒反多眠 欲解則多眠 此神將復也 如少陰脈沉 細但欲寐者 陰證少寐或 發汗後身熱 猶有喘息者 當治了病故 多眠風溫為 病常不神恍 惚也

五不眠

吐下後

汗後

煩熱

條

梔子鼓湯
酸棗湯百
八八
乾姜附子
湯百四二
猪苓湯百
廿四
梔子烏梅
湯九三
黃連解毒
湯八二

吐下後
心懊憹
虛煩
得梔子鼓湯
吐下後
晝夜酸
得棗湯復
汗無表

大陽大
汗出胃
中乾欲
飲水者
少與
之差後
梔子烏
梅湯

大熱
語錯
連解黃
少陰
二三日
日上已
煩心

汗為心之
液汗多則
神大熱則
眠不熱則
神不熱則
不眠太下
則動血故
主血後熱
眠差後熱
氣與諸陽
并陰氣未
復亦不眠

黃連雞子
湯七八百
五苓散百
七九

證脈沉
乾姜附
子湯而
下利而
渴利得
湯猪苓

五身痛

陽證

陰證

濕證

連雞
子湯
脈浮
小便
不利
不得
苓散

麻黃湯廿
桂枝湯一
陰毒甘草
湯百八
四逆湯百
八
真武湯百
卅九

大陽脈
浮脈
無汗麻
黃湯
汗後霍
亂與桂
枝湯

陰毒嘔
逆下利
一
被杖昏
內面黑
陰毒甘
草湯四
真者反
甘決

中濕
一
大便利
不利
死即皮
以此別
之

太陽之痛
但拘急耳
中濕之痛
不可得則
會毒之痛
死即皮篤
以此別之

黃芪建中湯 甘草附子湯 木附子湯 三七散 五苓散 桂枝芍藥湯 半夏生薑湯 白虎加朮湯 湯七二

武湯後脈 汗後脈 沉血不 足也黃 芪延中 湯桂支 芍藥非 夏生姜 湯

草附湯 小者便 利者便 湯附者 木附子 湯中濕 中利便 五苓散 太風陽 中風而 因濕而 傷身重 痛

五咽痛

少陰有熱

少陰無熱

熱證

黃連龍骨湯 猪膚湯 百六湯 甘桔湯 七二湯 半夏桂枝湯 四逆散 四順丸

少陰腹痛 細猶有 熱黃連 者骨湯 龍骨湯 脈陰陽 緊主無 汗有汗 日亡陽 屬少陰

少陰脈 微而 下利先 用半夏 桂湯 次用四 逆散 下利不 止手足 冷

麻黃湯 加朮 湯 赤爛瘡 口瘡 赤爛瘡 黃連 汁升 麻六 物湯 咽中 閉塞 不可

咽痛有寒 之脈絡於 咽主 熱太陰 之脈絡於 咽主 陰邪熱乘 氣邪熱乘 痛若汗多 下利虛而 主熱亦能 咽痛也

甘草瀉心湯
 湯承氣湯
 小承氣湯
 六十七法
 硫黃麩法
 二百三十法
 三

五吐血
 八

熱毒
 當汗失汗

虛寒
 大下後寸

抵當丸
 五
 桃仁承氣
 湯六九氣
 犀角地黄
 湯百五八
 者桃仁承
 升麻湯
 黃

汗當汗失汗
 愈其故宜
 治以寒涼
 若寒氣疑
 血則當温
 之使血得

胃有寒水
 飲以水
 寒相搏而
 成咳逆則
 當温之
 加温以頭
 譫語又腹
 微喘又見
 欬逆此危
 殆甚矣

三黃瀉心
 湯百卅三
 栝皮湯百
 尤三湯二
 地血湯二
 百八升麻
 麻黃升麻
 湯廿二
 理中湯百
 四

熱則行也
 熱則行也
 熱則行也

五動悸
 九
 小柴胡湯
 四三桂甘
 茯苓桂甘
 大棗湯百
 廿一
 桂支甘草

汗後
 發少陽
 汗則譫
 語柴胡
 小柴胡
 湯後悸

水氣
 水氣承
 心振寒
 而悸茯苓
 湯甘草
 厥而心

脉代
 脉結
 代心
 一其由有
 二為氣虛
 三為汗多
 氣虛神弱

動悸即怔
 忡心動傷
 而由不安
 其由有三
 一為氣虛
 二為汗多
 三為汗多
 氣虛神弱

湯二真武湯百
廿九甘草
茯苓百十
湯百十
炙甘草湯
百十六

欲作奔下悸悸
豚茯苓者怔忡
桂甘大也先治
棗湯多水茯苓湯
心下悸
衍得按
桂支甘
草湯
汗出仍
發熱心
下悸身
潤動欲
擗地真
武湯

心不自持
一也水氣
承心火
思水二也
汗為心液
液去心空
如魚無水
三也以療之
証以

十六勞食復
根殼梔子

勞復
新差後津

食復
新差後胃

傷寒大病
邪毒犯於
府藏如水

湯九四湯
鼠矢枝湯
二鼠百十
二鼠百十
麥門冬湯
百九四
枳殼湯
大黃湯
五葉石膏
湯八五

液未復血
氣尚虛勞
動則生熱
宜用枳殼
梔子湯
矢鼓湯
門冬湯
麥

氣尚弱飲
食稍多則
為食復發
熱腹滿宜
服枳殼湯
子大黃湯
竹葉石膏

浸墻壁水
退七尚未
寒乃隨至
是謂勞復
非但強力
寺重若梳
浴動氣則
為勞矣食
復者經曰
病已差尚
微煩設不
了了者以
新虛不勝
谷氣故令
微疔推殼
則愈

六兩感

可攻可刺關元
仍與小柴胡湯

四逆湯百

太陽表
少陰裏

陽明表
太陰裏

桂枝湯一

少陽表
厥陰裏

○雙傳

兩感者乃陰陽雙
傳也膀胱與腎為
表裏一傳之項
疼身熱煩滿而渴
其脈沉而大胃與
脾為表裏二日傳
之身熱鼻乾妄言
不食中滿不睡其
脈沉而長不與膽
為表裏三日傳之
耳聾囊縮厥逆水
漿不入口其脈沉
而弦三日而死再
傳止於六日矣云
仲景無治法且云
下利清穀身體疼

六陽毒

陽毒升麻

湯六四

青黛一物

湯百六

玄參升麻

水漬法二

百卅二

陽毒之證初受病時所感邪毒深
重加以當汗失下常下失下或吐
下後邪熱乘虛而入或誤服熱藥
便毒熱散蔓如抱薪積火無不延
燎至于六脈洪大舌卷焦黑鼻中
如煙煤身面錦斑任言直走踰垣
上屋登高而歌弃衣而走皆其證
也五日可治六七日不可治可用
陽毒升麻湯若熱甚者時狂

痛急當救裏宜四
逆湯身熱疼清
便自調急當救表
宜桂枝湯又云治
有先後則知先救
裏內才覺溫急當
救表是或自可生
之埋但不能必

時昏口燥咬牙藥不可下者用小
清法候牙寬在亂稍定投藥亦良
如黑奴丸不可輕用

六六 陰毒
湯百廿八
真武湯百
附子湯百
卅六海二
卅氣四二
百卅元二
百卅七二
葱熨法二
百卅二
廿九法二


陰毒之証初受病時所感寒邪
深重致陰氣獨盛或汗吐下後
變或自下利四肢沉微腹中絞痛
虛汗如嘔逆唇青面黑手足厥冷
身如被杖短氣不得息此陰毒
之候三日可治四五日不可治
先服陰毒甘草湯真武湯附子
湯次灸氣海關元三二壯或
用葱熨臍下以手足溫和脈息
漸應為效如厥逆極寒縮
者可用薰法嘗有回生之驗

六七 衄血
亡血
脉遲弱
淋瀝
婦人經水適下
風温灼熱
温毒
動氣在右
動氣在左
動氣在上
動氣在下

不可汗○汗之則


下厥上竭
寒慄而振
傷血亡陽
小便血
齁冒不知
讞語
重囑不治
衄而渴
筋惕肉瞤
氣上衝
大煩而吐

汗為在表之邪始自得
病時腠理不密寒邪客之
故令人洒淅惡寒頭痛身
熱而腰脊強乃用輕劑就
表而以汗解既汗之後病
尤未愈雖裏訂悉具微有
惡寒亦表未解則當先解
表而後攻裏也若表已解
脉不浮與夫諸虛濕温動
氣暑暈等證若更汗之是
重虛其虛此為逆也以致
病之反覆表裏舛雜至予
不救為醫者可不敬慎歎



初病之時邪在於表故汗之若太陽證罷轉屬陽明五六日不大便不惡寒反惡熱脉沈而實方為可下比至表證已罷悉歸於裏若少陰脉沈細口燥咽乾此熱結下焦銷燬腎水故當急下之余如胃實諷語腹滿而喘潮熱蓄血无表證不大便皆可下也若大便雖硬小便清者知不在裏猶未可下小便少者津液未老亦未可下加以浮虛之脉動氣等證或下之太早皆致危篤者多矣死生之系可不究諸心乎

病合陽三六九



黃芩 湯七三太陽與少陽合病自下利者黃芩湯嘔者黃芩加半夏生薑湯
黃芩加半夏生薑湯 湯七五太陽與陽明合病喘而胃滿不可下宜麻黃湯
麻黃 湯升 太陽與陽明合病必自下利葛根湯

太陽病為 為熱惡寒頭 痛腰脊強


少陽病為 胃脇痛而耳聾口苦 舌乾往來寒熱而嘔

陽明病為 目痛鼻乾不得卧

葛根加半夏湯 卅五太陽與陽明合病但嘔而不下利葛根加半夏湯
大承氣湯 湯六六陽明少陽合病必自下利脉長者為順脉滑而數者為負者
白虎 湯七一剋賊也脉滑而數有宿食可大承氣湯三陽合病表裏有熱自虎湯

三陽明合病

升麻葛根湯六二
白虎湯七十
調胃承氣湯六八
大柴胡湯四二
大承氣湯六六
小承氣湯六七



七一併病

病


併者始初二陽合病後則一陽氣盛一陽病衰歸併於一經也

小柴胡湯四三
麻黃湯
大承氣湯六六

太陽少陽併病心下痞而眩少陽也頭項強太陽也

二陽併病太陽經未罷桂枝麻黃各半湯微發汗

少陽不勝陽明不負是不相刺為順



刺大椎三真九
刺肺俞全上
桂枝麻黃十三
各半湯

太陽少陽併病心下硬頭項強而眩當刺大椎肺俞慎勿下之

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足汗出大便難謾語承氣湯

負者失也少陽勝陽明脈負是鬼賊相刺為逆

湯也利汗陽 茵大必心小明 陳承發中便病 湯氣黃一不無	之頭飢心而熱之陽 子汗不中不手共明 豉汗能一結足外病 湯出能一胃溫有下 吐梳食一胃	方復隨也陷下是 可逐其治於承表 安其虛之當心虛邪 也邪實當當隔內因
-------------------------------------	---	--

七短氣
結胃
風濕
短氣者似

甘草附子 湯百十五 大陷胃湯 百一 十棗湯百 八苓散百 五	反下之煩 躁一 中懊憹心 下硬則為 結胃大陷 胃湯	風濕相搏 汗出不利 小便不利 惡風不欲 去衣甘草 附子湯下 水停心下 熱及結胃
---	--	--

七九
乾嘔
汗出不惡
寒十棗湯
散
五苓

五七疝瘕
春
夏
秋
冬
非疫癘者又

升麻葛根 湯六二 解肌湯卅 一敗毒散五 六理中湯百 四射干湯二 百夏桂甘 半	春應夏應 溫而者而 清氣折之氣 折之則責 責在邪在 身熱心或 頭眩身熱 目眩頭痛 嘔吐腹滿 長幼自利	秋應冬應 涼而寒反 大熱大溫 抑之抑之 則責則責 邪在邪在 肺濕腎民 熱相病咽 搏民痛或 多病生赤 瘴欬疹喘	短氣者則 當散其水 邪若可分 心下可分 而利之 非溫病者 比此皆寒 暑不調四 時不正之 氣是以一 方之內長 幼率皆相 似謂之天 行時氣治 法與傷寒 不同又日 不可拘於
---	---	--	---

湯百二七	金沸草散	二白虎加蒼	白虎湯	木湯七二	散陳五苓	九六製湯百	廿三桔湯百	散毒湯	散毒湯	散毒湯
率皆長幼	相似率皆	升相似皆	葛根理中	湯射中	蒼術湯	癰疽痛者	黃茵湯	陳五毒散	苓散	毒散
嗽喘欬	急金痛欬	散白升	虎加葛	虎加葛	虎加葛	虎加葛	虎加葛	虎加葛	虎加葛	虎加葛
數仲景曰	疫氣之行	無以脈診	施治時以	平為期不	可過取四	無正位分	括四當	隨其經而	取之	取之

六中	七中	六中	六中	六中	六中	六中	六中	六中	六中	六中
白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人	白虎加人
太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱	太陽中熱
發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁	發熱煩躁
候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗	候自汗

九小柴胡湯
 四葉石膏
 竹葉石膏
 湯六十五
 葱餅熨法
 二餅法

發熱惡寒
 身重痛脈
 弦細花遲
 小便秘已
 然毛聳手
 足冷勞即
 熱口開前
 板齒燥白
 虎加人參

發熱煩躁
 冷服小柴
 胡湯
 中暑發熱
 不惡寒竹
 葉石膏湯
 昏饋不省
 葱餅熨法
 便為佳小

寒不身痛
 為中賜手
 足雖冷脈
 雖虛不可
 用熱藥當
 以清暑之
 劑及利小
 便為佳小

七七奔豚
 衝心
 汗吐下後
 奔豚者腎

桂枝湯
 傷寒或因
 發汗後
 積因傷寒
 之邪攻衝

膏湯百四
理中湯百

而不可用者
切不可用者
附子等燥
熱藥如抱
薪救火也
止可用白
虎湯及解
暑藥極冷
服

飽盛於夏
秋縱寒月
有之亦猶
伏暑而然
脈疾雖沉
手足難厥
亦不可遠
用熱藥若
煩渴甚者
當以五苓
散之婁分
利陰陽不
得已而用
溫藥當稱
涼服之
邪熱遇
亦相競也
近世劉守

一八濕病

麻黃杏子
蒼朮甘草
湯廿七
防己黃芪
湯百七
湯百六
甘百附子
湯百五
五苓散百
七附九
木附湯百
卅七
杏仁湯百
八四

風濕

風與濕
氣相搏
肢體不
重不可
轉側汗
上微汗
不欲身
衣被不
微腫汗
可大取
但可取
微汗麻
黃杏子

濕痺

太陽病
關節疼
痛而煩
脈沉而
細濕名
痺小濕
利大便
反快逆
當利小
便五苓
散利者
木附湯

濕溫

其人傷
因暑而
中因濕
名曰暑
濕溫日
兩脛冷
逆冷濕
痛則身
勝如素
其濕又
於風是
風濕則
微表以

真用益元
散治此義也
亦此義也
東南之地
水潦歸焉
居其處者
多濕不加
風雨不特
山澤蒸氣
因冒襲之
若但中其
濕則身燥
痛則素中
勝如素中
其濕又為
於風是為
風濕則當
微表以去

黃連橘皮湯
葛根橘皮湯
黑膏百六

小柴胡湯
煩躁大者
湯發渴者
葛根湯者
小柴胡湯者
括婁湯者
身重下湯
出漢防

橋皮異矣所忌
湯葛者風温切
依橋不可發汗
皮甚若汗之為
黑膏大逆多不
可救也

八四證類
傷寒

脚氣
痧證

傷食
虛煩

越婢湯
小續命湯
五九散
木瓜散
八玉

傷寒傳
外證
壯熱
傷食
諸虛
煩熱

傷食
諸虛
煩熱
傷寒相
惡

橫柳散
九約九百
脾約丸
五二散
大三脘散
百八二夏
柴胡半夏
湯百五三
瓜蒂散
百廿五二
大橘皮湯
百六八
二陳湯
大柴胡湯
四二草散
金沸草散
二半夏湯
大半夏湯

其證頭寒
息但頭關
不強若之
項平水可
其位則不
可實
支節痛
亦隱隱
平水可
其位則不
可實
或嘔但頭
寸疼脈
右手煩
不
止
梔
初病時有
寸浮關
前子
內寒
外熱
起於脚者
亦有氣
口內
寒外
熱
不能移寸
以伏者
其位
者陰
且湯
動為異之
以意參
其脈
叔和
謂虛
耳感於半
柴胡
緊盛
煩自
熱去
寒所患
金沸
草湯
知為
可攻
熱去
必冷越散
大柴
胡湯
宜服
竹葉
續命湯
小夏
大皮
湯
石膏
湯
入生薑
瓜蒂
散
腹滿

其證頭寒
息但頭關
不強若之
項平水可
其位則不
可實
支節痛
亦隱隱
平水可
其位則不
可實
或嘔但頭
寸疼脈
右手煩
不
止
梔
初病時有
寸浮關
前子
內寒
外熱
起於脚者
亦有氣
口內
寒外
熱
不能移寸
以伏者
其脈
叔和
謂虛
耳感於半
柴胡
緊盛
煩自
熱去
寒所患
金沸
草湯
知為
可攻
熱去
必冷越散
大柴
胡湯
宜服
竹葉
續命湯
小夏
大皮
湯
石膏
湯
入生薑
瓜蒂
散
腹滿

百廿五膏
竹葉石膏
湯八升
梔子升麻
湯九一
陰旦湯百

感於暑
所患必
熱小續
命湯去
附子減
桂壹半
脚腫木
瓜散榔
檳散大
便秘大
約元脾
三腕散

痛者
大柴
胡湯
下之
胃滿
嘔吐
者瓜
吐散

八雜證

頭項強痛
頭汗
在裏
瘀血
陽太

頭搖
額汗
風濕
裏痛

獨頭面搖
面戴陽
下虛也
赤色

面怫鬱
解表未

面慘不光
寒傷

面光不慘
中風

面乍黑乍白

面斑斑如錦

面垢中暑又

乍赤
惑狐

紋毒

日中生花
易陰

目痛
明陽

目睛黃
小腸

目不慧
不流利

目中不了了

睛不和
不和

目不慧
也上實

謂不明了

未解

目瞑
必

目直視不能

目脉赤
病痊

鼻中燥
必

胸家發汗

鼻乾
明陽

口噤
病痊

耳聾
少陽

鼻鼽
風温

口難言
足榮不

鼻如煙煤陽毒

口燥少陰

舌黑熱劇

極熱少

唇瘡狐惑

咽中瘡上實下虛

口苦陽少

咽痛陰少

讖語邪氣盛而神識昏

口傷爛赤下應

聲啞狐惑

怔忡即心下悸

而汗熱上行也

咳逆水相搏

逆

舌生芒刺結熱

聞食臭胃虛

叉手冒心汗多虛也

也甚

漱水不欲嚥耳必聾

筋惕肉瞤汗下虛也

咽乾腎虛燥

身痛如被杖必動

一身盡痛濕風

鄭聲精神不奪

身痛如被杖

一身盡痛濕風

全

懊憹胃虛

陰毒

身黃小便不利

喜忘如狂畜血

身重多睡風濕

背惡寒陰勝

洒然毛聳惡

身痒陽虛汗未盡

多眠神倦

寒中

身痒陽虛汗未盡

手足痲痺也插搦

身微腫風濕

身痒陽虛汗未盡

下利清穀寒

身如虫行表虛

身痒陽虛汗未盡

下利清穀寒

腹脹氣偏不和

身痒陽虛汗未盡

下利清穀寒

不眠神虛

身痒陽虛汗未盡

下利清穀寒

類聚三十九

坐而下一脚鴨溘也

腰痛也

腸垢也熱

八不得汗陽虛

表實

自太陽傷

麻黃湯廿
桂枝湯十
各半湯十
三附湯百
木附湯百
廿七建中
黃芪建中
湯五七
葱豉湯百
九寸

脈浮而遲
遲為無陽
不能作汗
其身必痒
桂枝湯黃
各半湯有
陽明主無
汗身反如
汗行皮中
虫行皮中

傷寒無汗
服麻黃湯
葱豉湯等
藥汗不出
者死不用
已乃用蒸
法圭支湯
服圭支湯
或下之仍
頭痛項強

寒無汗而
下數証始
則無汗服
藥後則以
汗解今汗
証雖具服
汗藥不至
劑汗不津
此陽虛為
汗枯不能
故云熱

蒸法二
百廿六
桂枝湯一
桂枝加減
湯十九

久虛故也
木附湯黃
芪建中湯

發熱無汗
心下滿小
便不利桂
支夫利桂
茯苓白木
湯也

病脈躁盛
不得汗者
謂之極
故不可治

八汗後惡

表未解

大便實

大便

汗後惡寒

寒

麻黃湯廿
芍藥甘草
附子湯百
十柴胡湯
大柴胡湯
四二氣湯
小承氣湯
六承氣湯

汗後熱
汗後微寒
利大便

汗後惡寒
微寒者
惡寒者
先解表者
表解後者
胡大湯小
子藥附

汗後惡寒
汗法當再
盡則為輕
伊表解未
汗後惡寒

汗後惡寒
汗法當再
盡則為輕
伊表解未
汗後惡寒

類聚三十九

八十九

四逆湯百

承氣湯

草湯

下之若汗

八頭汗

汗下發黃水結

餘證

遍身有汗

後汗下發黃水結餘證

柴胡桂姜湯
五苓散
茵陳湯
茵陳五苓散

後汗下發黃水結餘證
四禮也若
熱氣越於
四禮也若
不熱在裏
痰熱在裏
不熱在裏
鬱於陽經
况頭乃諸
陽所會是
以但須汗
出知其熱

散九七
小半夏
苓湯百廿
六柴胡湯
小柴胡湯
四三

熱心
煩出
五散
茵陳湯
柴胡湯
柴胡發於內必
解之證証以
則適証証以
解之證証以

者出 子 鼓

八背惡寒

口燥渴

口中和

寒邪客於

白虎加人參湯

傷寒無大熱口燥渴

少陰病一

表則一背

附子湯

心煩口燥渴

和二日口中

惡寒者背

卅六

惡寒白虎湯

無熱也附

為陰又背

加參湯

子湯

為五藏之

所乘於陽

氣乘於陽

也當別其

內外寒熱

以解之口

燥渴知其

內有熱口

燥渴知其

內有熱口

八不治證

兩感 陰陽雙傳 日二經也

陰陽毒 過七日者

黑斑出

厥陰舌卷囊縮

藏厥 煩躁不安

陰陽交 汗後

陽證見陰脈

結胃 悉具煩燥

衰汗 不為

脈陰陽俱虛發

除中 厥而利

下厥上竭 發

熱不止發風溫

發動氣汗

陰汗而

汗

咳逆不止 間有

重暍 發濕

中和知其 內有寒智 者思過半 矣

少陰吐利煩躁
面黑陰毒腎色
大發溫家汗

四逆不得汗謂
爪甲青陽衰也
汗出不止謂

劑發汗而不出
喘而不休衛氣貫珠絕

唇吻反青肝絕
循衣摸床邪熱結
環口黧黑脾絕

直視搖頭心絕
脉弦生脉瀦死
柔汗發黃脾絕

陰陽易手足攣
脉瀦死

者陰陽易手足攣
柔汗冷

洩便遺失腎絕

釋音

脊強 <small>下聲去</small>	劬 <small>乙六切</small>	噫 <small>如切</small>	暱 <small>倫切</small>	澀 <small>阻切</small>	蹇 <small>拳音</small>	眴 <small>縣音</small>	瘕 <small>子切</small>	瘕 <small>計上切</small>	瘕 <small>下切</small>
痞 <small>備音</small>	咳 <small>苦切</small>	赭 <small>者音</small>	羸 <small>雷音</small>	齋 <small>色音</small>	漬 <small>字音</small>	瞑 <small>冥音</small>	怔 <small>征音</small>	怔 <small>冲下音</small>	怔 <small>音上</small>
肛 <small>扛音</small>	噦 <small>於切</small>	豨 <small>加音</small>	讖 <small>職切</small>	浙 <small>昔音</small>	暍 <small>謁音</small>	駟 <small>下切</small>	溘 <small>唐音</small>	溘 <small>唐音</small>	溘 <small>唐音</small>
虺 <small>回音</small>	虺 <small>必切</small>	萎 <small>於切</small>	危 <small>誰切</small>	疲 <small>誰切</small>	隆 <small>下音</small>	翁 <small>吸音</small>	瘵 <small>巨切</small>	瘵 <small>巨切</small>	瘵 <small>巨切</small>
瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>	瘵 <small>充切</small>

陽脈陰病見陽脈則生

大為血虛 大為病進 大為氣盛
大為血虛 中緩而大為胃土正脈

浮 重按不足 浮而緩為太陽中風
浮而緊為太陽傷寒
浮而數浮為風數為虛則洒淅惡寒也

數 去來促急 數為熱 為實 浮而數可發汗
頻至 浮數而微邪氣不傳也

動 當關如豆 陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形令
惡寒此三焦傷也數脈見于關上下無頭尾
如豆大厥之動搖名曰動 為陽虛 為痛

滑 伏如轉珠 翕奄沉為滑翕合也言張而復合也故曰翕為正
陽沈言忽降而下故曰沈為純陰方翕合而降下也
而實 奄謂奄忽之間此陰陽和合也 為實 為吐

四時 春 屬肝 夏 屬心
秋 屬肺 冬 屬腎

脈 脾脈中緩分王於辰戌丑未之月各一十八日冬七十二日也

六 大尺寸 陽俱浮 明俱長

經 少尺寸 太尺寸 陽俱弦 陰俱沉細

脈 少尺寸 厥尺寸 陰俱沉 陽俱微緩

陰脈陽病見陰脈則死

沉 輕按不足 重按有餘 沈為在裏 為寒 為實 為水
沈細夜加 沈則榮氣微也

瀦 戰慄如刀 榮氣不足也 為少血 為亡汗
為逆冷 陰脈遲滯故知血亡

弱 無輕軟 衛氣弱名曰慄榮氣弱名曰卑慄卑相搏名曰損
陰脈弱則血虛血虛則筋急也

弦 狀如弓弦 脈浮緊名曰弦 為痛 為寒
為水氣 純弦勁急死脈也

微 極細 衛氣衰也 為衄 為泄 為亡汗
為亡陽

弦緊浮滑沉瀦

此六者名曰殘賊能為諸脈作病也

風則脈浮 寒則脈緊 中暑脈滑 中濕脈瀦 傷於陰則脈沉 傷於陽則脈浮

弦為痛 純弦為死脈

寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解此脈陰陽為和平雖劇必愈

法 圖 上

微	弦	弱	瀦	沉
若似而極不緊弓狀欲按無輕刮如戰按有重不輕	似有而細不移動弦如絕之力軟竹刀慄之	無輕軟	如刀	重按不足
為亡陽	為水氣	搏名曰損	為逆冷	沈為在裏
衛氣衰也	純弦勁急	陰脈弱則血虛	陰脈遲滯	為寒
為泄	為痛	血虛則筋急	故知血亡	為實
為亡汗	為寒	則筋急也		為水

殘 賊 脈 等 同

脈	本	經	六	脈	四	時
少尺寸	陽俱弦	少尺寸	大尺寸	脾脈中緩	春 屬肝	秋 屬肺
厥尺寸	陰俱沉細	太尺寸	陽俱浮	分王於辰戌丑未	夏 屬心	冬 屬腎
陰俱沉	陽俱微緩		明俱長	各一十八日		
				冬七十二日		

傷		寒		脈	
結	促	濡	緩	緊	時
往來 脈來 時止 復來	往來 脈來 時止 復來	虛弱 按之 復來	動無 偏勝 去來 微遲	去來 過常 動如 轉索	脈數 脈時 脈微
脈來緩時一止復來名曰結陰盛則結結者陰陽氣不相雜 脈詰如車蓋者陽結也陽氣結於外 脈累累如循長竿者陰結也陰氣結於內	脈來數時一止復來名曰促陽盛則促 蓋陰陽之氣緩數不相續也故為病脈非若 結代之脈動而中止為飲為痰	陽脈寸口也浮大而濡陰脈浮大而濡 尺中也上下同等為和 又為虛為痺為自汗	陰陽脈浮大而濡上下同等名曰緩 緩為病後陰陽將復而和緩也小快於遲 若尋常遲緩則為虛為風	陽脈緊霧露之氣中上焦陰脈緊寒邪 中下焦上焦為太陽主頭痛項強下焦為少 陰主內慄足膝逆冷	脈微如羹上肥者陽氣微也 脈紫如蜘蛛絲者陽氣衰也 脈綿如瀉茶之絕者亡其血也 脈浮而洪身汗如油喘而不休此為命絕
微	脫	沉	遲	數	脈
脈微	脈脫	脈沉	脈遲	脈數	脈時
脈微如羹上肥者陽氣微也 脈紫如蜘蛛絲者陽氣衰也 脈綿如瀉茶之絕者亡其血也 脈浮而洪身汗如油喘而不休此為命絕	脈微如羹上肥者陽氣微也 脈紫如蜘蛛絲者陽氣衰也 脈綿如瀉茶之絕者亡其血也 脈浮而洪身汗如油喘而不休此為命絕	諸浮為在表為陽 諸沈為在裏為陰 諸遲為在藏為寒 諸數為在府為熱	諸浮為在表為陽 諸沈為在裏為陰 諸遲為在藏為寒 諸數為在府為熱	諸浮為在表為陽 諸沈為在裏為陰 諸遲為在藏為寒 諸數為在府為熱	立夏得洪大脈是其本位其人 病身體若疼重者須發其汗若 明日身不疼不重者不須發汗 若汗濺自出者明日便解矣 何以言之立夏得洪大脈是其 時脈故使然也四時倣此

法		圖		下	
遲	北	散	革	代	代
極緩 一息 三至	中空 傍突 浮之 又浮	按之 解散 陰陽 離也	氣血 改革 不循 常度	動而 中止 不能 自還	動而 中止 不能 自還
遲為在藏遲為寒 陰脈遲瀦故知血亡	榮氣不足也 為虛為失血	傷寒咳逆上氣其脈散者死 謂其形損故也	脈弦而大強則為減大則為芤減則 為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革 婦人則半產漏下男子則亡血失精	真氣衰極脈不能自動因呼 吸相引而動為死脈也	真氣衰極脈不能自動因呼 吸相引而動為死脈也
或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰 雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩 何止曰雜病以弦為陽者脈近乎浮 實也傷寒以弦為陰者強乃陽為陰 所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越 故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也 若緩者傷寒以大為病進緩為邪 退邪退病除則氣脈和緩故為欲愈 之脈雜病以緊為七表傷寒以緊為 少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛 損多汗等證然在陽經則浮而緊在 陰經則沈而緊也若時疫流行經所 謂天地之氣勝復之作不形於證診 當於運氣內求之	或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰 雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩 何止曰雜病以弦為陽者脈近乎浮 實也傷寒以弦為陰者強乃陽為陰 所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越 故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也 若緩者傷寒以大為病進緩為邪 退邪退病除則氣脈和緩故為欲愈 之脈雜病以緊為七表傷寒以緊為 少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛 損多汗等證然在陽經則浮而緊在 陰經則沈而緊也若時疫流行經所 謂天地之氣勝復之作不形於證診 當於運氣內求之	或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰 雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩 何止曰雜病以弦為陽者脈近乎浮 實也傷寒以弦為陰者強乃陽為陰 所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越 故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也 若緩者傷寒以大為病進緩為邪 退邪退病除則氣脈和緩故為欲愈 之脈雜病以緊為七表傷寒以緊為 少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛 損多汗等證然在陽經則浮而緊在 陰經則沈而緊也若時疫流行經所 謂天地之氣勝復之作不形於證診 當於運氣內求之	或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰 雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩 何止曰雜病以弦為陽者脈近乎浮 實也傷寒以弦為陰者強乃陽為陰 所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越 故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也 若緩者傷寒以大為病進緩為邪 退邪退病除則氣脈和緩故為欲愈 之脈雜病以緊為七表傷寒以緊為 少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛 損多汗等證然在陽經則浮而緊在 陰經則沈而緊也若時疫流行經所 謂天地之氣勝復之作不形於證診 當於運氣內求之	或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰 雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩 何止曰雜病以弦為陽者脈近乎浮 實也傷寒以弦為陰者強乃陽為陰 所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越 故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也 若緩者傷寒以大為病進緩為邪 退邪退病除則氣脈和緩故為欲愈 之脈雜病以緊為七表傷寒以緊為 少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛 損多汗等證然在陽經則浮而緊在 陰經則沈而緊也若時疫流行經所 謂天地之氣勝復之作不形於證診 當於運氣內求之	或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰 雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩 何止曰雜病以弦為陽者脈近乎浮 實也傷寒以弦為陰者強乃陽為陰 所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越 故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也 若緩者傷寒以大為病進緩為邪 退邪退病除則氣脈和緩故為欲愈 之脈雜病以緊為七表傷寒以緊為 少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛 損多汗等證然在陽經則浮而緊在 陰經則沈而緊也若時疫流行經所 謂天地之氣勝復之作不形於證診 當於運氣內求之