

醫心方卷第十四

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治卒死方第一

治中惡方第二

治鬼擊病方第三

治客忤方第四

治魔不寤方第五

治尸厥方第六

治溺死方第七

治熱暈死方第八

治凍死方第九

治自經死方第十

治注病方第十一

治諸尸方第十二

治諸瘡方第十三

治鬼瘡方第十四



治温瘧方第十五

治寒瘧方第十六

治淡實瘧方第十七

治勞瘧方第十八

治嶂瘧方第十九

治間日瘧方第二十

治連年瘧方第二十一

治發作無時瘧方第二十二

傷寒證候第二十三

傷寒不治候第二十四

避傷寒方第二十五

治傷寒困篤方第二十六

治傷寒一二日方第二十七

治傷寒三日方第二十八

治傷寒四日方第二十九

治傷寒五日方第二十九

治傷寒六日方第三十

治傷寒七日方第三十

治傷寒八日九日方第三十一

治傷寒十日以上方第三十二

治傷寒陰毒方第三十五

治傷寒陽毒方第三十六

治傷寒汗出後不除方第三十七

治傷寒鼻衄方第三十八

治傷寒口干方第三十九

治傷寒唾血方第三十九

治傷寒吐方第四十

治傷寒噎方第四十

治傷寒嘔方第四十一

治傷寒下利方第四十二

治傷寒飲食勞復方第四十五

治傷寒洗梳勞復方第四十六

治傷寒交接勞復方第四十七

治傷寒後頭痛方第四十八

治傷寒後不得眠方第四十九

治傷寒後汗出方第四十九

病

二

音且黃病也

治傷寒後目痛方第五十一

治傷寒後黃疸方第五十二

治傷寒後虛腫方第五十三

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

治傷寒後下利方第五十五

治傷寒後下部痛方第五十六

治傷寒腕豆瘡方第五十七

治傷寒後食禁方第五十八

治傷寒百合病方第五十九

治傷寒後瘧方第六十

治卒死方第一

病源論云卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂乘年之衰一也逢月之空二也失時之和三也人有此三虛謂而為賊風所傷使

陰陽偏竭於內陽氣阻隔於外二氣擁閉故暴絕

而死也若府藏氣未竭者良久乃蘇然必有氣挾鬼神

之氣而卒死者皆有須邪退乃活也

葛氏方治卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕

皆是中惡治之方

命二人以衣塞口吹其兩耳極則易人久可以竹筒

吹之並側身遠之莫臨死人上

又方以葱葉刺其耳口中口中鼻中面出者莫恠

無血難治有血是治候也

又方以綿漬好苦酒中須臾出量死人鼻中手ヲモ案令汁入鼻中并持其手足莫令驚カクノコトカ

又方以人小便灌其面數迴即能語此扁鵲法也モライフ

又方末皂莢如大豆吹其兩鼻孔中透則氣通カハラチクキ

又方擣女青屑以重一錢上開口內喉中以水若酒カハネクセクククク

送之豆治トコロ又方灸膻中百壯

又方灸其頸下宛オトカヒ中名秉漿十壯又方灸心下寸トクキスル

集驗方治卒死方

取牛馬矢汁飲之無新者水和乾者取汁カシタル

承漿  
明堂經云  
在頭前下  
脈之下

又方取竈中墨如彈丸漿水和飲之須臾三四服之突

又方梁上塵如大豆粒著竹筒中吹鼻中與俱一カテラウテラウ丸

時吹之 又方灸面中穴 又方取竹筒吹其兩耳不過三トモ

新録方治卒死方

慈根鳩取汁服六七合慈根

又方桃白皮切一升水二升煮取八合一服之十里久不老トモ

更服之

僧深方治卒死中惡雷氏千金丸方

大黃五分 巴豆六十枚 桂心二分 朴消三分 干薑二分

凡五物治下篩シ和白蜜治三千杵セウ脹如大豆シ二九老小以

意量之

枕中方治卒忤セカ惡鬼カキ魘欲死者書額上作鬼字即愈

龍門方療卒死方

取繩圍死者辟ヒキ挽男左女右以繩當大椎申繩向

下セ當繩頭灸脊上五十壯又方薑汁灌鼻

又方以葱黃心刺鼻中入七八寸男左女右トコロ立驗

又方搗薑汁灌鼻即治又方桂屑著舌下即治

治中惡方第二

鬼氣也

病源論云中惡者是人精神衰弱為鬼邪之氣卒中之也其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死也

廣濟方云卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香一分研 生犀角二分 青木香二分

為散空腹以熱水服方寸匕立愈

范汪方治卒死及心痛腹滿魔忤中惡三物備急丸方

巴豆一分去皮 大黃二分 干薑二分

凡三物異搗巴豆治合丸セウ以蜜丸如大豆有急取三丸

以水和服之口噤者絞開令藥得入口中

又方取坏水以刀三七刺中飲之良

集畧方備急散治平中惡痛腹滿欲吐短氣方

大黃二兩金色者 桂心四分 巴豆一百枚

凡三物治令下篩取一錢以水七合服之

千金方治卒死中惡方

取牛馬屎汁飲之无新者水和于者亦得

又方葱心黃刺鼻孔中血出愈

又方灸兩脇下 又方灸胃管十五壯

集驗方治中惡方

大豆二十七枚以鷄子中黃白酒半升合和頓服之

又方用釜底黑塩三指撮和水服之 醫門方同之

又方以度其兩乳中央屈之從乳頭向後肋間灸度

頭隨年壯 又方灸胃管五十壯

廣利方療中惡容忤垂死方

麝香錢重 和醋二合服之即差

葑根一朶 烏梅十枚 茱萸半升 以勞水一斗

煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死

煮得三升飲之 又方灸足兩母指上甲後叢

葛氏方古華他治平中惡短氣欲死者方

ホシメ

カラハシカア

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

ホシメ

毛中各十四壯即愈

新錄方治卒中惡方

豉一升塩七合水四升毛煮取一升二合分再服之

又方桃白皮切一升水二升煮取八合一服之

又方生昌蒲根切三升搗絞取汁服四五合

又方酒服桃人末方寸匕七末李人末毛佳

又方伏龍肝末水服二方寸匕カク半

又方取竹木中虫屎水服方寸匕毛

又方塩一升水二升煮臨消二服取吐之

治鬼擊病方第三

病源論云鬼擊者諸鬼厲之氣擊著於人也得

患於新發也

之无漸卒著如人以刃旁刺狀背脇腹内絞急切

痛不可柝按或即吐面或鼻口出面或下血一

名為鬼排排言鬼排觸於人也人有氣面虛弱精

魂衰緩忽与鬼神遇相觸突致為其所排擊輕者

困而獲免重者多死也

葛氏方治鬼擊病方

以淳苦酒以次内兩鼻孔中以

又方灸鼻下人中一拉五愈不愈可加壯數也

灸方灸鼻

又云治諸飛尸鬼擊走馬湯方

巴豆二枚 カマモトノ子 杏仁二枚合綿裹椎合碎投熱湯二合

中拍捻令汁出上ホリ心白便与飲之如食頃下便若老

小量之

僧深方治鬼擊方

塩一升水二升和之攪令釋作汁飲之令得吐則

愈良

新録方治鬼擊病方

搗薤汁灌鼻中如杏仁許須臾若好

千金方治鬼擊病方

艾如鴨子大三枚木五升煮取二升頓服之

又方灸膺上一寸壯又灸膺下一寸三壯

治容忤方第四

病源論云卒忤者三名容忤謂邪容之氣卒犯忤

人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂

魂魄衰弱者則為鬼氣所犯喜於道間門外得之



葛氏方容忤死者中惡之類也喜於道間門外得之  
令人心腹絞痛脹滿氣衝心脅不即治必致人治之方  
以水漬粳米取汁三升飲之口已禁者以物強葢  
內之 又方銅器若凡器盛熱湯先以衣三重  
藉腹上乃舉湯器著衣上湯轉冷者去衣  
器親完大冷者易以熱湯取愈也

又方搏書墨水和服一錢上

又方繩橫度其人口以度之齊去四面各一處灸  
各三壯令四火俱起

又方灸鼻下人中卅壯令切鼻柱下

又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯

又云已死者搏生昌蒲根絞取汁含之立愈

千金方治容忤方

塩八合水三升煮取一升半分二服得吐即愈

若小便不通筆頭七枚燒末水和服之即通

又方灸巨關百壯

范汪方治容忤方

取牛子矢半杯以酒三升煮服之

新録方治客忤方

搗生艾心取汁灌口中五合

又方水洩アラク飆ユシホラ帶服之

治魔モウラフ不寤ヒキ方第五

枕球久睡中魔也病源論云人睡眠則魂魄外遊為鬼所魔モ屈其精神

弱者魔則久不得忤乃至氣暴絕所以須傍人助

變并以方術治之乃ハ獲也

集驗方治卒魔欲死方

搗生韭汁灌鼻孔中ハ刺者并灌兩耳

徐伯方治魔トモ變不寤方

取葱菜刺鼻中慎勿火照之ヒトモ

葛氏方云卧魔不寤勿以火照之セ致人但痛齧其  
腫及足母指甲際而多唾其面治之方

未良英カウラチ以管吹內兩鼻孔中即起已三四日猶

可吹之 又方末カク竈中黃カク去吹兩鼻孔中

又方取韭菜搗以汁吹其鼻孔冬月掘根可ハ絞

又方以筆毛刺鼻孔男左女右可展轉進之ハ

又方以牛若馬臨魔人上二百息青牛尤佳セ

又方末昌蒲吹鼻中末桂内舌下

又方令一人坐頭首一人於戶外呼病者姓名坐人應

曰人諾在便即得禳也今案救急單驗方并中呼之云云本疏也

又云喜魔及惡夢者方 枕真射香一于於頭邊

又方帶雄黃男左女右

又方作犀角枕佳 又方以席頭為枕

又方以青木香内枕中帶之

千金方治魔不寤方

雄黃如棗大條左腋カクシ下令人終身不肯魔集

驗方同之

又方伏龍肝末吹鼻中

養性志云人魔勿トラ燃トモシ火變之魔死不疑トモシ聞クラクシ變之吉但

得遠變之不得近而急變喜失魂トモシ魄

救急單驗方療魔死方

引牛臨鼻少時シタクラフ即活又方クハ鷲其足オモヒ楯オモヒ甲際活

范汪方治魔死符法魔死未久故可活方

書此符燒令黑以少水和之置死人口懸鏡

死者耳前擊鏡呼死人不過半日即

生廳トモシ魄丹書之

新錄方若魔不悟者方

酒脹發灰一撮許 又方搗菟藿根莖取汁煎之

治尸厥方第六

病源論云尸厥者陰氣逆也由陽脉卒下墜陰脉  
卒上外陰陽雜居營衛不通真氣厥亂容邪  
乘之其狀如死猶微有息而不恒脉尚動而形无  
知也聽其耳內循々有如嘯之聲而股間臍者  
是也

葛氏方云尸厥之病卒死而脉猶動是也

以管吹其左耳自極三過復吹右耳三過即起

又方搗菟藿以如棗核大著耳舌下

又方灸鼻下人中七炷 又方灸膻中穴二七炷

又方灸陰囊下去大孔一寸百炷若婦人者灸兩乳

中間

又方以昌蒲屑著鼻兩孔中吹之令入以桂屑

著舌下云扁鵲治楚王法也 已上二方集驗方  
龍門方同之

集驗方治厥死如尸不知人心下餘氣扁鵲灸法  
以繩圍病人臂腕男左女右申繩從大椎上度下

之灸繩頭脊上五十炷

范汪方治尸厥方以梁上塵如豆者イシツ著箆中吹鼻中トメカク与耳同時吹之 又方生薑汁灌口中

新録方治尸厥方

取葱白一升水二升モ煮取一升頓服之

又方酒服桃人セネ末方寸匕

救急單驗方尸厥死方

灸兩足大指甲後叢毛內七壯華他云三七壯

治溺死方第七

病源論云人為水所浸溺水從孔竅入灌注府藏其權肉

故死若已已致樣救得出即泄瀉モラシシク其水令氣血得通便活

又云經半日及一日猶可活氣已絕心上膈アタカキル亦可治之

小品方治溺水死已經二宿者可活方

搏皂莢カハラフキ作末以綿裹內死入下部中須臾牽出

即活也

又云治溺水死方

以窰灰布キキ著地令厚五寸以甑コシ倒覆灰上以溺人

覆カフセ伏甑上口中水當出也オホキ覺水出復更別熬灰

令暖アツク量之溺人口中水已出極多便去甑即

以暖灰壅溺人通身但出口鼻耳小時便蘇醒則活也

又方令二健人抱溺人倒卧瀝溺人水出盡便活也

葛氏方溺死一宿者尚可活治之方

倒懸死人以好酒灌其鼻立活龍門方同之

又云身尚温者取竈中灰二石餘埋人從頭至足即活

又方便脫暖奎覆之取溺人伏其上腹中水出

便活

千金方治落水死方

酢灌鼻 又方裹石灰内下部中水盡出即活

又方但埋死人暖灰中頭足俱没准用七孔

錄驗方治溺死方 灸膻中

集驗方治溺水死方

焚沙以覆死人使上下有沙但出鼻口中沙温

濕須易之音濕傷物聲也

治熱暈死方第八

病源論去夏月炎熱人冒涉途路熱毒入内与五藏

相并客邪熾盛鬱痰不宣散卒絕陽氣暴奪經

絡不通故奄然悶絕謂之暈也然此乃外邪所擊  
真藏未壞若便遇治救氣宣則蘇也夫熱暈不可  
得冷之便死

葛氏方凡中熱暈死不可使卒得冷之便仍死矣治之方  
以泥作正統暈人齋使三四人更溺其中

又方亦可屈草帶之可扣凡碗底若脫車缸  
以著暈人齋上取令溺不得流去而已此道路窮

急元湯當令人溺若有湯便可以与之  
又方干薑橘皮甘草末少之內熱湯中令稍之咽

勿頻多之可煮之

小品方治中熱暈方

取路上熱塵土以壅其心上小冷復易之氣通乃心

又方偏卧暈人以草帶圍齋上令人溺齋中

即愈 又方濃煮藜飲之至三升良効

千金方治熱暈方

張死人口令通七十九以暖湯徐徐灌口中小舉死人  
頭身令湯入腸須臾即蘇

又方灌地將水一盃即愈

又方把椅子若鷄着心前熨之

又方地黄汁一盃服之

又方但以熨去及熨灰去壅其心上佳

治凍死方第九

多頁反

凍音凍寒也詩去凍其以風

病源論云人有在於途路逢凄風苦雨繁霜大雪衣

服留滯冷氣入藏致令陰氣閉於內陽絕於外榮

衛結滯復不流通故致噤絕而死者早得救療而

溫氣通則生

又云凍死一日猶可治過此則不可治也

葛氏方治冬天墮水凍四肢直口噤截有微氣方

以大器多墊灰使煖囊盛以薄其心上冷復

易心暖氣通目則轉口乃得開溫酒及作

粥清稍含之即活若不先溫其心便持火

灸其身冷氣與火并則死勿為也

千金方救急單驗方皆謂之

治自縊死方第十

病源論云人有不得意至者多生忿恨注自縊以

繩物繫頸自懸柱致死呼為自縊

又云自縊死且至暮雅已冷必可治暮至且則難治



又方把椅子若鷄着心前熨之

又方地黄汁一盃服之

又方但以熨去及熨灰去壅其心上佳

治凍死方第九

多頁反

凍者寒也詩去凍其心風

病源論云人有在於途路逢凄風苦雨繁霜大雪衣

服而百濕冷氣入藏致令陰氣閉於內陽絕於外榮

衛結滯復不流通故致噤絕而死者早得救療而

溫氣通則生

又云凍死一日猶可治過此則不可治也

葛氏方治冬天墮水凍四肢直口噤截有微氣方

以大器多熨灰使煖囊盛以薄其心上冷復

易心暖氣通目則轉口乃得開溫酒及作

粥清稍含之即活若不先溫其心便持火

灸其身冷氣與火并則死勿為也

千金方救急  
單驗方皆謂之

治自縊死方第十

病源論云人有不得意至者多生忿恨注自縊以

繩物繫頸自懸柱致死呼為自縊

又云自縊死且至暮雅已冷必可治暮至且則難治

此謂其晝則陽盛至氣易通也夜則盛其氣難通也

又云夏則夜短又熱則易治

又云氣雅已斷而心後溫者一日已上猶可治

又方用罽衣覆其口鼻兩人吹其兩耳即生

小品方治自縊死方

傍人見自縊者未可輒割繩必可登物令及其頭即

懸牽頭後舉其身起令繩微得寬也別使一人堅塞

兩耳勿令耳氣通又別使一人以葱葉刺其鼻中吹

令通又別使一人齧死人兩踵根待其蘇活乃止也

又方治自縊死慎勿割繩也繩卒斷氣頃泄去便死

不可復救也徐之把死人漸之縲令繩漸寬也然後解

下之心下尚溫取鷄雌雄無在拔翅毛去勿令得飛

也置地逐之竟完走鷄令極久之者其冠當黑心急

以尺物撥死人口開便率鷄頭上割鷄冠斬取五

臨死人口中至唯咽氣便通

千金方治自縊死方

凡自縊死勿截繩徐之把解之心下尚溫者甦能覆

其復及山嵐瘴氣  
席也風俗  
通之織毛  
稱謂也

口鼻兩人吹其兩耳 故急單驗方同

又方藍青汁服之

字治在九ノ醫方本等自又方梁上塵如大豆各內簞中四人各捉一簞同

時兩耳兩鼻昂治

又云五絶方

一日自經二牆壁三日瀦水四日魔魅五日產乳

絶皆以半夏一友細下篩丸如大豆內鼻中愈

集驗方治自經死方

槁皂莢細率屑取如胡豆吹兩鼻孔中心カハラキチ アハラネクセ車

用皂莢三好

葛氏方云自經死雜已及心下尚微温猶可治也治之方

未皂莢以葱葉吹內其兩鼻孔中

又方以蘆管吹其兩耳極則易人取活乃心若

氣通者少以桂湯稍嘔徐乃以少粥清是

龍門方療自經死方

皂莢末如胡豆許吹兩鼻中躑即治

治注病方第十一

病源論云凡注之言住也謂邪氣俱住人身內故名為

任此由陰陽失守經絡空虛風寒暑濕飲食勞倦  
之所致也或卒死之氣或卒犯鬼物之精皆能成  
此病其變狀多端乃至卅六種九十九種而方不  
皆顯其名也

僧深方云西王母玉璽赤丸備急治尸注卒惡水陸  
毒整万病方 一名耆婆丸

武都雄黃一兩 赤如鷄冠 八角大附子一兩 炮稱

梨蘆一兩 ヤチウラ 上丹沙一兩 不使有石者 白礬石一兩 練之一旦夕

巴豆一兩 方皮整令紫色稱之一方有真朱一兩

凡六物悉令精好先治巴豆三千杵次內礬石三千杵次內梨  
蘆治三千杵次內雄黃治三千杵次內白蜜治  
三千杵之可從此更治方杵最佳有加真朱一兩者  
若不用丹沙而內真朱二兩無在也生礬石黑礬石皆  
可用不必白色者巴豆勿用兩人者又方別鳩梨蘆  
附子下後乃更稱之又一方每內藥輒治五百杵輒內  
少蜜忍藥飛鳩都畢乃更治万杵合藥得僮子治  
之大佳無僮子但凡人三日齋戒乃使之合藥用建  
除日天清无雲霧日向月建藥成密之勿令泄著

清紫處大人脹之皆如小豆但丸數三无常此藥  
 治万病无所不至方上雖不能具載故略說耳若本  
 病將脹者禁食生菓生菜猪突脹以下病者宿  
 勿食明且脹二九不知者飲暖米飲以發之令下不  
 心飲冷水飲心之病在葛上吐葛下者下或但噫氣  
 而愈或食不消腹堅脹或痛脹一九立愈風疝寒  
 疝心疝絃疝每諸疝發腹中急痛脹二九積寒  
 熱老宿地痞服二九腹脹不得食飲脹一九卒大苦  
 寒熱注來脹一九卒大開格不得大小便欲死脹二九

音候腹中病也

痲結脹

一九日三脹取愈若微者射背九甚良下利重

下脹一九便新或復天行下便新卒上氣但出入及

逆氣衝喉暴積聚者服二九日無瘡未發服一九已發

脹二九便新小兒百病痞寒中及有熱百日半歲者以一九

如棗米著乳頭與脹之下一歲以上服如麻子一九日三昏以飲

脹小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成堅積皆令將

脹一九立可以塗乳頭使小兒乳之傷寒勅色及時氣痛以

熅酒服一九厚覆取汗即差若不汗復酒服一九要

取汗欲行視病人脹一九以一九著頭土行无所畏

瘦  
所枯及  
又作瘦  
瘦上俗  
通下非  
也

至死喪家帶一九辟百鬼病苦淋路二疳瘦百葯  
酸疼服一九日三婦人產生餘疾及月水不通及來  
注不時服二九日二率霍亂心腹痛煩滿吐下  
足逆冷服二九注病百種病不可名將服二九  
日再若腹中如有虫欲鑽腸出狀急痛一心一作  
此是風氣服二九若惡瘡不可名癰疥疽以膏  
若好苦酒和藥先盥湯洗瘡去痂拭令燥以藥  
藥塗之即愈惡風遊心不得氣息服一九即  
愈耳出膿血汁及卒聾以穀裏裏二九塞耳

耳孔中即愈癰腫疔瘡瘰癧及欲作瘰以着

昨本及音節名

苦酒和藥塗之齒痛以小丸綿裏着齒孔中咋

辛アカネ

之若寒熱注來服二九苦虵蝮蜂蝎蠪所中

傷也

及狗犬狂馬所咋以苦酒和塗瘡中并服二九

即愈卒中惡欲死不知人以酒若湯水和二九

強開口灌喉中棒坐令下若獨宿山林澤之中若

冢墓間燒一九百鬼走去不敢近人辟飲田飲淡

飲服一九以臈和一九如彈丸著絳囊中以繫臂

男左女右山精鬼魅皆畏之中溪水毒服二九已

有瘡在身以苦酒和三四丸塗瘡上憂患之氣結  
 在胃中苦連噫及咳胃中刺痛服如麻子三九日  
 三愈婦人胃中苦滯氣息不利小腹堅急繞臍  
 絞痛漿脈如麻子一九稍增之如小豆心腹常苦痛  
 及中契脈一九如麻子曰三服五日愈男女耶氣鬼  
 交通歌哭無常或腹大經絕狀如任身皆將脈三  
 丸如胡豆大日三夜一又以苦酒和之粉且以塗  
 手間使心主暮又夕以塗足三陰交及鼻孔七日  
 愈又將脈如麻子一九日三廿日心腹中三虫宿勿食

明平且進牛羊糞冬三三膈須臾便服三丸如胡豆  
 日中當下重過日中不復服二丸必有爛垂下小兒  
 寒熱頭痛身熱及吐衄一脈一九如麻子小兒瘡瘦  
 丁矣不能食不化將脈二丸日三又苦酒和如粉塗  
 陰兒腹良風目赤或痒視漠濇出爛皆以蜜  
 解如粉以塗注目此目昔頭平風腫以苦酒若膏  
 和塗之即愈風頭腫以膏和塗之以絮裏之若  
 為姑毒所中吐血腹內如刺脈一九如麻子稍益  
 至胡豆亦以塗鼻孔中以膏和通塗腹背亦燒之

醫心抄卷廿四

之自董治鼠瘻以脂和塗瘡取駁舌狗子啗之即愈也

千金方治一切注無新久方

先作卧灸兩乳兩邊耶下三寸第二助間隨年壯可

至三百壯又心下三寸灸六十壯又兩手大指頭灸七壯

又去十注丸主十種注氣注勞注鬼注冷注生人注死人注

尸注水注食注土注等諸注方

注食注水注等諸注方

雄黃二兩巴豆二兩 人參一兩甘草一兩蒿本一兩

桔梗一兩附子一兩 皂莢一兩枳一兩 麥門冬一兩

十味空腹服一丸如小豆日二以知為度有驗

葛氏方去注病即是五尸中之尸注又狹諸鬼耶為害也

大略令人寒熱淋瀝沉不語不的知所苦而無處不

惡累年積月漸以至死後復注易傍人乃致滅門

覺似此疾者便宜急治之方

桃核人五十枚研之以水一斗煮取四升一服盡

當吐病不盡二三日更作若不吐者非注

集驗方治注病方

醫心抄卷廿四

三



取棗根白皮切二斗燒作灰湯淋取汁浸小豆斗如此取灰汁盡蒸豆或作羊脂煮散此豆

又云治鬼注病相染易盡門方

獺肝一具乾之下篩水服方寸匕日三神方千金方同

槎要方療惡症入心欲死無問遠近年月皆愈方

安息香半兩為末酒服即愈枕急單

又云療疰氣莖無恒象方

白芥子搗為丸服之一又酢和塗隨手為驗

龍門方療惡症入心欲死方

獨頭蒜一枝書如棗大並鴉以將醬汁一小合頓立差

又方取塩如鷄子布裹燒赤末酒服即驗

又方取楸布裹薄布庄上以熨斗熨之令汗出驗

新錄方云惡症方

塩五合寬突三合水三外煮塩消去津頓服吐差

又方桃枝切三升水四升煮取一升六合二服之

范汪方治尸注毒痛注來方

燒髮灰杏子中人焚令紫色

凡二物卜等膏和酒服梧子三九日三

救急單驗方療惡症方

阿魏藥服二升和酒五卷

又方桂三兩酒三升煮取一升分再服老

治諸尸方第十二

病源論云人身內自有三尸諸虫與人俱生而此虫忌惠能与鬼靈相通常接引外郎為人患害其發發作之狀或沉、默、不的丁字方知所苦或腹痛脹急或螺塊下踊起或牽引腰脊或精神雜錯變狀多端葛氏方云雜有五尸之名其例皆相似而小有異者

一飛尸

變作无常

二道尸

同義典便作

三風尸

得風便作

四沉尸

遇寒冷便作

五尸經

變轉致大惡

又云凡五尸即是身中尸鬼接引外邪共為病害經術其有消滅之方而非世徒能用今度撰諸經要以救其弊方

雄黃一兩大蒜一兩搏令相和如彈丸者內二合熱酒中

服之須臾老未老更一服便心イフ有尸疔者常宜蓄此

藥也

又方桂干薑人等末之塩三指撮熬令青末合水服

二方寸匕

新録方治飛尸方

灸脊中及兩旁相去三寸各五十主

又方桃白皮切二升水四升者取一升六合分三服

又云治道尸方

牛蹄下五三指撮酒一盞下治風尸

又方燹艾以青布裹更熨又方燹大豆裹更熨

又云治沉尸方

灸大倉七壯中管也 又灸乳下一寸七壯

千金方治道尸注方  
又方錢灰杏人蜜和丸如梧子一服七九日二

桂心一兩 干薑二兩 巴豆人二枚

三味下篩上酢和如泥塗病上干即易之

又云芥子薄主道尸飛尸方

芥子一升送 炙搗下篩以黃丹二兩攪之作疎

布依盛之更蒸使更 薄痛上當更送 蒸依恒

恒便契

治諸瘡方第十三

病源論云夏日傷暑秋必病癰其入形瘦皮栗

今案百有

以月一日菽當以十五日愈設不愈月盡解

有

通云云庖病多種各不同形有温庖有寒庖有癰

庖有勞庖有鬼庖此五庖內應於五藏温庖者先熱

而後寒寒庖者先寒而後熱癰庖者吐逆嘔宿汁

腹中生絃癰勞庖者不得用力鬼庖不可與飲食用

用藥不得同

集驗方音黃帝曰夫瘡瘡皆生於風夏傷於暑秋為瘡

病源論云瘡氣在腸助之同室巨而起飲嗜則引腸下懸痛所云謂之懸瘡

瘡問曰瘡先寒而後熱何也對曰夫寒者陰氣也風者

陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也問

曰先熱後寒者何對曰先傷於風而後傷於寒故先熱

而後寒也名曰温瘡其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣

獨菽名曰瘡瘡

治之方夫庖必從四末始先其菽時一食項用細左藥繩

緊

束其手足十指遇時乃解

又方取大蜘蛛一枚內蘆管中密塞管口繩

係以カクシ煇頸過ル發時乃解去葛氏方同之

又方杏核及櫻也桃菜二十七枚ツイ安心上艾艾菜上十四僧深方同之

千金方治癩方

未發前把雄雞一頭着懷中時驚動令雞作大聲無不老

又方故鞋底去兩頭燒灰并花水服之

又方未發前預灸項大椎尖頭漸灸過時心

葛氏方治癩病方

又方多煮改作湯飲數外合得大吐便斷

又方破一大豆去皮書一斤作日字一斤作月字左手持日右手持月吞之立愈向日脹勿令人

知之

又方灸鬚甲鳩末酒服方寸匕至發時令

三服兼用火灸无不斷

龍門方療一切癩方

取恒山甘草等分鳩末和水服方寸匕吐即老

又方取蓮鳩末三指撮以酒和欲發前服之驗

范汪方治癩方臨發時鳩大附子下篩以苦酒和之

塗背上

廣濟方療瘡方

恒山三兩 以漿水三升浸經一宿剪取一升欲發九

前煩脹之候吐差心无所禁忌

小品方斷瘡先大寒後大熱者方

小麦一升淡竹葉一席口恒山三兩

凡三物以水五升宿漬明且煮取二升半小

三服之

僧深方治一切諸瘡無不斫恒山丸方

大黃一兩一方附子一兩二兩恒山三兩炮龍骨一兩

凡四物治冷下篩蜜和平且服梧子七丸未

發中間復服七丸臨發服七丸若不斫至後

後日復發更服如此法甚神良

本草經云治瘡者葶草汁及生汁服之

本草替疑云治瘡燒猫屎為末酒服方寸匕

治鬼瘡方第十四

范汪方治鬼瘡方

丹書額言戴九天書臂言托九地書足言履九江

書背言南有高山上有大樹下有不流之水中  
有神虫三頭九尾不食五穀但食瘧鬼朝食三千暮  
食三百急如律令書背言上高山望海水天門  
亭長補瘧鬼得便斬勿問罪急如律令

產經  
同之

又云平且發者市死鬼恒山玉之服藥訖持刀

食時發者鎰死鬼蜀木玉之服藥訖持索

日中發者溺死鬼大黃玉之服藥訖持盃水

晡時發者舍長鬼麻黃玉之服藥訖持磨衡

黃昏發者婦人鬼細辛玉之服藥訖持明鏡

夜半發者厭死鬼黃芩玉之服藥訖持車軟

鷄鳴發者小兒鬼附子玉之服藥訖持小兒墓上析

草木

凡七物各一斗治下篋發時加所主病藥一斗當發  
日從且至發時温酒服方寸匕三服訖必持所主病  
物甚良有効

又云平且作者容民鬼也先作時令病者持衣如群  
去言欲遠出立愈

食時作者容死鬼也先作時令病者辭言欲歸之大道  
上橋梁下逃之示下

禺中作者市死鬼也先作時令病者因結棧北向吐  
營世夕夕年以埃世安救是坑也注坎也

日中作者溺死鬼也先作時令病者取血水中著連南向坐  
營以埃

日跌作者三死鬼也先作時令病者言吏捕汝庭中  
晡時作者自經死鬼也先作時令病人當棟下卧以繩索

病者頭目入作者人奴舍長死鬼也先作時令病者

磨碓問逃之

黃昏作者盜死鬼也先作時令病者踰去遠亡無令

人知其家人定作者小兒鬼也先作時病者取小兒墓

上折草木立愈夜過半作者囚死鬼也先作時取司

實械空坎笊令病者持之因從出可榜字ウツ笮汝者

夜半作者寒死鬼也先作時令病者温衣營以埃持

桃枝枝飲食匪内中無人知見紫此次上

鷄鳴作者乳死鬼也先作時令病者犯藁席之蔬

目應令持桃枝營以埃



如意方治鬼瘡方

發日早且取井花水丹書額作天獄字書背作  
會獄字書背作背獄字左手作左獄字右手  
作右獄字兩足心各作地獄字畢向東咒云日出  
東方隱似沒晝罵日夜罵月瘡鬼不死當復  
致清冷之鬼飲汝血北斗七星何不截急々如  
律令三過咒便愈

又方計發日今夕可食鷄鳴起著衣履屣屣  
隨意出戶脫之逢出勿願入幽閑隱室緊閉戶

勿令人知脫人來呼勿應過時勿飲食飢  
極但卧忍之至夕乃還必斫也

遁之及用飲食送遣如三日不心用

恒山三兩豉一升林米百粒 蘇七斤研清酒

二升漬之一宿早且服之得大吐則心

治温瘧方第十五

病源論云夫温瘧与寒瘧安舍温瘧者得之冬中  
於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪

吸義及短氣自

邪氣不能出目遇大暑腦髓消鑠肌肉消釋漆

理義泄故先契而後寒名曰温瘧

石膏半斤 研細 知母三兩 地骨皮三兩

治寒瘧方第十六

通云温瘧者吸之發熱而少寒心憫面赤發自於心方 玄參三兩 依竹葉一斤 猪苓三兩 水九升者取三升分三服相去如三里

病源論云寒瘧此由陰陽相并陽虛則陰勝

勝則寒發於內而并於外所以內外俱寒故病

發但戰慄而鼓頷

通云云寒瘧者清之而惡寒毛豎發則引温而少

契方

朱沙四升 研クダク 雄黃一升 研クダク 人參四升 恒山五升

牡蠣四升 熬ル 蜜丸如梧子一服七九日再空腹  
脹之用粥飲之

治淡實瘧方第十七

病源論云謂病人膏肓先有停淡結實目感瘧病

則令人心下支滿氣煩臨之

范汪方治瘧淡實不消恒山湯方

恒山六升 甘草四升 知母三升 麻黃三升 大黃四升

凡五物切以水五升煮取二升分三服至發時令盡

治勞瘧方第十八

病源論云凡瘧積久不差則表裏俱虛容邪未散真氣不復故疾難積除間小勞便化發

集驗方治勞瘧時不積斷衆治無効此方治之

生長大牛膝一大帛口切以水六升煮取二升

再服第一服取未發前一食頃第二服取臨發

今葉葛氏方云酒三升漬一宿分三服

葛氏方云老瘧久不積斷方

末龍骨方寸匕先發一時以酒一升半煮三沸及

契盡脹溫覆取汗五愈

又方灸蠶甲搗末酒服方寸匕至發時令三服兼用火灸無不積斷也

僧深方治勞瘧桃菜湯方

桃菜十四枚 恒山四兩

凡二物酒二升漬一宿露著中連刀著器上明且

發日モククカニシク凌晨シク源シク法シク津シク後シク温シク令シク煖シク一頓服之必シク必シク良シク

治嶂瘧方第十九

病源論云山嶂瘧此病生於嶺南帶山嶂之氣也其

狀寒熱伏作有時皆由挾溪源嶺嶂毒氣故也其病

重於傷暑之瘧シ

者自婆方治瘧瘧要方

蜀恒山三兩 甘草二兩 光明砂一兩

三種鴉節以蜜寒和丸如梧子未發前服三九發

時服二九發後服一九於後三日更服一服三日慎食

錄驗方治瘧及嶂氣方

恒山二兩 甘草二兩 切以白絹大一升浸一宿去滓分

二服未發前一服臨發又一服任吐慎生於酢滑酒

宗麵油膩房室

シ、マキコ アツクキ  
アツクキ ヲカカシモウ

ナモク多クナモク

治間日瘧方第廿

病源論云間日瘧此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時

相失不相得故邪氣內薄セム五藏則道遠氣深故其行

遲不能與衛氣偕出是以間日而作

集驗方治瘧或間日發或夜發者方

秫米百粒 石膏八兩 碎碎ク恒山三兩 竹葉三兩

凡四物切以水六升漬藥覆一宿明且煮取取二分

三服取未發前一食頃第一服取臨發第二服當一

日勿洗手足面及嗽口勿進食飲取過時不發乃潔

洗進食也并用餘藥汁塗五心及胸前頭面藥滓  
量頭邊此方從來下リ舊用神驗アリ

宇治本无

小品方新瘡恒山酒方治瘡瘻先寒戰動地寒解壯熱

日分菽間日菽並三ヤ九新方

驚甲一兩 淡竹葉切三升 恒山三兩 甘草三兩 酒三

升 凡五物以酒漬藥刀景上覆頭安露地明且以水

七升煮取三升分五服未菽前令盡當吐極傷

多不必盡トモ割但禁飲水粽

治連年瘡方第廿一

范汪方治連年瘡不差牛膝酒方

牛膝草一并多干把トヤ好酒三升トヤ凡二物牛膝内酒漬中一宿明且分

三服

錄驗方恒山湯治瘡十歲九廿歲方

恒山二兩 甘草一兩 大黃二升 桂心六銖

凡四物切以恒山酒漬一夜諸藥以酒三升水二升煮

取七合頓服下吐愈

宇治本无

僧深方治卅年瘡龍骨丸神方

龍骨四分 恒山八分 附子三分 大黃八分

凡四物各治後鷄子和菽前服七丸如大豆臨菽  
服七丸

効驗方治卅年癰恒山散方

恒山九五分 干漆九四分 牡蠣二 杏子二

凡四物下節酒服方寸匕日三

治菽作無時癰方第廿二

病源論云夫衛氣一日一夜大會於風府則湊理開

則邪入之則病作十五當其時陰陽相并隨其所勝負

則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪内外失

守耶氣妄行所以休作無時

葛氏方治癰菽作无常心下煩熱方

恒山二兩 甘草兩半 豉五合 以水六升煮取二

升外再服當快吐仍即斷即飲食

傷寒證候第廿三

病源論云經云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣水

寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒万類深藏君子

固密則不傷於寒夫觸冒者乃為傷於四時之氣

皆能為病而以傷寒為毒者以其最為致厲之氣

焉即病者為傷寒不即病者其寒毒藏肌骨中至  
 春變為溫病夏變為暑病者熱重於溫也是以  
 辛苦人春夏必有必有溫病者皆由其冬時觸冒之  
 所致非時行之氣也其時行者是春時應溫而返  
 寒夏時應熱而返冷秋時應涼而返熱冬時應寒  
 而返溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多  
 相似者此則時行之氣也

又云夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六  
 七日間其愈皆以十日以上

葛氏方云傷寒時行溫疫雅有三名同一種可而源  
 本小異其冬月傷於暴寒或疾行力作汗出得風  
 冷至春夏發名為傷寒其冬月不甚寒多暖氣及西  
 南風使人骨節緩墮受耶至春發名為時行其年歲  
 月中有厲氣兼挾鬼毒相注名為溫疫如此詎候並相  
 似又貴勝雅言總名傷寒世俗同号時行道術者初  
 言五溫之度以此致大歸終是共途也

醫門方云凡傷寒病五六日而渴欲飲水不能多未宜  
 也所以介者腹中熱尚少不能消之便作病矣至七八日

胡註

澱祖立及  
汗出也

大渴欲飲水然當与之常令不足勿極意云能一斗而  
与五升若飲而腹滿小便不利若喘若歲弥不可与之  
戢然大汗出是為已愈也凡得此病及能飲水此為欲  
愈之候若小渴而强与之目此成禍者其數甚衆オホシ  
傷寒不治候第廿四

葛氏方云陽毒病面目斑々如錦文喉咽痛下體膿五日  
不洩死

陰毒病面目青舉躄疼痛喉咽不利手足逆冷五日不  
治死毒病發赤斑一死一生

熱病未發汗而脈微細者死

內熱脈盛躁發汗求不肯出者死

汗雖出至足者猶死

已得汗而脈猶躁感熱不退者死

汗出而誠言煩躁不得卧目精乱者死

汗不出而臨面者死汗出大下利不止者死

汗出而寒不心鼻口冷者死發熱而症腰掣縱齒

齟者死不得汗而掣縱狂走不食腹滿背脊痛臨

面者死



喘滿誠言直視者死 熱不退目不明舌本爛者死

咳而衄者死 大衄不止腹中痛短氣者死

咳而衄者死 大衄不止腹中痛短氣者死

嘔咳下血身熱而大瘦削者死

手足逆冷而煩躁脈不至者死

大下利而脈疾及寒者死 下利而腹滿痛者死 下利

手足逆冷而煩躁不得眠者死

腹滿腸鳴下利而四肢冷者死 利心眩冒者死

腹脹嗜飲食而不得大小便者死

身面黃腫舌卷身糜臭者死

不知痛處身面青翳不欲語者死

目匡陷不見人口干謬語手脩衣縫不得眠者死

始得使一身不收口干舌焦者死

疾始一日腹便滿身熱不食者死 二日口身熱舌干者

死 三日耳聾陰縮手足冷者死

四日腰下至足熱而上冷腹滿者死 五六日木氣息高

者死

七八日脈微于而溺血口干者死

脉若不數三日中當有汗若无汗者死

大素經熱病死候九

第一汗不出レ不大レ灌發者死 第二泄モリ而腹滿フル甚者死

第三目不明熱ヤ不レ已者死 第四者者老人嬰兒熱而腹滿者死

第五汗不出分ツク而レ者死 第六舌本爛不レ已者死

第七歐而レ汗不出レ不レ已死 第八髓熱者死

第九熱而レ瘧者死

避傷寒病方第第壹

靈奇方避時氣疫病法

正月未日夜以蘆炬トモシ大照井及廁カヤ中百鬼ニ走不入

又法正月朔日寅時用黃土塗門トヒラ扉方二寸

又法用牛矢塗門戶方負二寸

又法正月且若十五日投麻子小豆各二十七枚入於井中

又法避一年温病正月且吞麻子小豆各二十七枚辟却温鬼

又法庚辰日取鷄犬毛於門外燒烟ケラセ之避温疫

又法五月十五日ニ中取井花水沐浴セ

避邪鬼

又法五月戊己日沐浴避病

又云使温病不相易法以繩度所  
任戶中屈繩燒斷

醫門方避温疫法

赤小豆アカアヅキ五合以新布五寸ナレ裏内井中不至底少許

三日漬之平晨東向男吞二七女吞一七病者同

床不相染

又云療温病轉相注易乃至威門傍至外人無有

看脈此藥必不相易方

鬼箭羽フトシナシ二兩 鬼目オウゴン二兩 赤小豆二兩 丹參二兩

衛矛 一名

用羽

雄黃二兩研 鷄冠色者 搏篩蜜丸如梧子脈一九日二

三与病人同床傳衣不相染神驗

千金方云温病時行令不相染方

立春後有庚子日温薰菁菹汁合家大小並服

不限多少 極要方同之

又方常以月望日細坐ユカキリ東行桃枝煮湯浴之

又方常以七月七日合家吞赤小豆向日吞三枚

又方桃樹蠹矢末水服方寸匕  
集驗方新温方二月且取東行系樞大如梅懸門戶上又人帶之

得富貴方云欲至病人家中作鬼字  
玉箱方云屠蕪酒治惡氣温疫方

白木桔梗 蜀林桂心 大黃 烏頭 枝樓 防風 各二

凡八物細切アケ緋成イシ盛以十二月晦日中懸沉井中勿令至泥

正月朔且出藥量三升温酒中屠蘇之向東戶飲之各

三合先後小兒起一人服之一家無病一家飲之一里无

恙飲藥三朝還量井中仍歲飲之累代無患 ヤヒ

葛氏方云老君神明白散辟毒本作醫本依避字避温疫方

白木二兩桔梗二兩半烏頭一兩附子一兩 細辛二兩

凡五物搗篩歲且以温酒服五升一家有藥則一里

無病帶是藥散以行所經過病氣皆消若他人有

得病者便温酒服一方寸匕

又云度嶂散辟嶂山惡氣若若有黑霧鬱勃及西南温風皆為疫癘之候方

麻黃五升 蜀林五升 烏頭二升 細辛一分 防風一分

桔梗一分 干薑一分 桂心一分 白木一分

凡九物搗篩平且以温酒服一錢上

又云新温病令不相染著法

新汲水クム綆長七寸盜著病人卧席下集驗方 同之

又方密以艾灸病人床四角各一九勿令病人知之

又方以鯽魚密置病人卧席下勿令知之

又方附子三枚小豆七枚令女人投井中

治傷寒困葛方第廿六

葛氏方治時行垂死者破棺千金湯方

吹咀見第卷

苦參一兩吹咀以酒二升煮令得一升半盡服

當吐毒 千金方同之

本草蘓敬注古人屎乾者燒之烟絕水漬飲汁名

破棺湯也主傷寒熱毒 今葉葛氏方世人謂之黃龍湯

者婆方治熱病困苦者方

生麥門冬小一升去心搗碎 煮內井花水絞取一升  
半及冷入三服熱甚者吐即老

集驗方云凡除熱解毒無過苦酢之物

崔禹錫食經云梨除傷寒時行為妙藥也

通玄經古梨雅為五藏刀斧足為傷寒妙藥云

治傷寒一二日方第廿七

病源論云傷寒一日大陽受病大陽者小腸之經也

故先受病其脉絡於腰脊至於頭項故得病一日而

頭項腰脊痛也以下次第如常

葛氏方云傷寒有數種庸人不能別今取一藥兼治  
治者若初舉頭痛突契脈洪起一二日便作此葱豉湯

葱白一庖口豉一升以水三升煮取一升頓服取汗

集驗方小兒尿三升

又方葛根四兩水一斗煮取三升內豉一升煮

取升半一服

又方鳩生葛根汁服一二升佳

治傷寒三日方第廿八

新錄方治傷寒溫疫三日內脈洪浮頭痛惡寒壯熱身

體痛者方

葱白一升豉一升艾子三七枚桂心二兩無用生

薑三兩以水七升煮取二升分三服之

治傷寒四日方第廿九

玉箱方傷寒四日方

荻蒂二十七枚以水一升煮取五合一服當得吐之

治傷寒五日方第卅

范汪方治傷寒五六日臨而利者黃芩湯方

黃芩三兩半夏半升人參二兩桂心二兩干薑

三累 大棗十二枚 凡六物水七升者得二升八再服

通玄去五日外肉凍內熱者溷之宜服升麻湯方

升麻二兩 黃芩三兩 艾子二兩 大青二兩 大黃二

兩 別浸 芒消三兩 水八升煮取二升半分三升

服如不利盡服之

治傷寒六日方第卅一

范汪方治傷寒六七日不大便有瘀血方

桃人廿枚 葵イ 大黃三兩 水蛭十枚 蠶虫廿枚

凡四物搗篩為四丸卒服當下血不下復服之

治傷寒七日方第卅二

千金方傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表俱熱時

惡風大溫舌上干而煩飲水數升白散湯方

安六兩 石膏一升 甘草二兩 粳米六合

四味水一斗二升煮米熟去滓分服一升日三

葛氏方若已六七日熱盛心下煩悶狂言見鬼欲起者

方 絞糞汁飲數合至一升世人謂之為黃龍湯陳

又者弥佳

治傷寒八日方第卅三

醫心方卷十四

錄驗方治傷寒八九日腹滿外內有熱心煩不安音紫並胡湯方

蜷母二兩 生薑三兩 蒼朮三兩 苳胡八兩 大黃三兩

黃芩二兩 甘草一兩炙 人參一兩 半夏三兩洗

來蝶蛸七枚炙

凡十物切以水一斗一者煮得三升溫飲一升日三

治傷寒十日以上方第卅四

千金方治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱

不除及下利不止皆治之方

大青四兩ハトクモ 甘草二兩 阿膠二兩ニクハ 豆豉一升クキ

四味以水八升煮取三升頓服一升日三

治傷寒陰毒方第卅五

集驗方云陰毒者或傷寒初病一二日便成陰毒或服藥湯

六七日以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛ヒクク

喉咽不利毒氣攻心心下強短氣不得息不區逆肩不

青面黑四肢厥冷其脈沉細緊數此陰毒候身ナリ

如被打五日可治七日不治方醫門方同之

甘草二升炙 外麻二升トリスラ 當歸一升オホヒ 蜀椒一升シカシカ

鱉甲四升



凡五物吐咀以水五升煮取二升半分服三行五里  
復服温覆セラ中毒當汗アハレ則愈若不汗病除  
重脹也

治傷寒陽毒方第廿六

集驗方古陽毒者或傷寒一二日便成陽毒或服藥  
吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安面  
赤狂言或走或見鬼或下利其脉深浮大數面斑  
々如錦唯咽痛下體膿五日可治七日不治方醫門方同之

甘草二升炙 當歸一升 蜀椒一升玄目 升麻二升

雄黃二升 桂心一升

凡六物吐咀以水五升煮取二升半分三服行五里  
須復服温覆アハレ手足中毒則汗アハレ則解不解重  
作セラ今世有此病此二方實未經用

治傷寒汗出後不除方第廿七

集驗方大汗出後脉猶洪大狀如瘧日一發汗出便解方

桂心一兩十六銖 夕藥一兩 生薑一兩 甘草一兩

大棗十四枚 麻黃一兩去節 杏仁廿三枚

凡七物切以水五升先煮麻黃再沸下諸藥煎

得一升八合服六合

治傷寒鼻衄方第卅八

千金方云傷寒鼻衄脇間有餘熱故也熱因衄自心忤

者方

牡蠣ツクシ十八左顧者石膏五斤右二味酒服方寸匕先食日

三四一丸衄亦可用一方以漿服之集驗方同之

僧深方治熱病鼻衄多者出血二三斛方

蒲黃カトラフナ五合以水和一飲盡即愈不差別依諸衄方

又方燒牛一鼻作灰服方寸匕又方以冷水洗佳

治傷寒口干方第卅九

集驗方治傷寒熱病口干喜唾方

干來棗ホトトギス廿枚碎烏梅ホトトギス十枚碎

二物合搗蜜和含杏核大咽其汁

治傷寒唾血方第卅

范汪方治熱病唾血方

白茅根茅一物搗下篩為散方寸匕日三至可絞取汁

飲之

治傷寒吐方卅一

醫心方卷之四

集驗方治傷寒吐虛羸欲死方

鷄子十四枚 以水五升煮取二升乃內豉四合復煮  
兩三沸去豉八再服之

治傷寒噦方第卅二

病源論云傷寒所以噦者胃中虛冷故也

葛氏方治傷寒呃不止方

甘草三兩 橘皮一升 水五升煮取一升頓服之日三四

小品方去春夏時行寒毒傷於胃冷呃方

白茅根切一升 橘皮二兩 桂心二兩 葛根二兩

凡四物以水六升煮取三升分三服之

救急方去天行後干嘔若歲手足冷方

橘皮四兩 生薑半斤 右以水七升煮取三升分四

五服立驗

治傷寒後區方第卅三

集驗方治傷寒後干嘔不下食蘆根飲方

生蘆根切一升 青竹茹一升 粳米三合 生薑二兩

以水七升煮取二升隨便飲不差重作

治傷寒下利方第卅四

葛氏方治熱病不解而下利困篤欲死方

大青四兩甘草二兩膠二兩 豉八合

以水一斗煮取三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方以水煮豉一升艾干十四枚葱白一把取三升

治復寒飲食勞復方第五

病源論云夫病新差血氣虛津液未復目即勞動使成

病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡洗則勞於力未堪

勞而強勞則生熱氣還入經絡復為病名曰勞復

門方云論曰凡溫病新差及重病差後百日內禁食猪肉及

腸五肥奠油膩必大下利藥所不能療也必至於死

若食餅餌染黍飴脯粘食炙肉膾菹生菜栗諸菓

子及堅實難消之物胃氣尚冷大利難禁不下之必

死下之後兇不可不慎也

病新差後但得食粥糜寧少食令飢慎勿飽食不得

輒有所食雜思之勿与引日轉久可漸食麩麻雞兔肉

等為佳

療熱病新差早起及多食葷復方

艾子十枚水二升煎取一升去滓頓服之温卧令

發汗佳通除諸度

又方燒龜甲末服方寸匕 葛氏方同之

葛氏方治葛病新起早勞及飲食多致度欲死方

以水服胡粉少許 又方燒飯籬末服方寸匕

小品方治食勞度方葛根五兩以水五升煮取二升分三服

千金方治食勞方

杏人五枚 酢二升煮取一升服之取汗

又方燒人矢灰水服方寸匕

治傷寒洗梳勞度方第卅六

千金方云洗手足復者飲手足汁合梳頭復者吞頭垢如棗大者一枚

取洗手足汁飲一合 又方取頭垢如棗大者吞枚

天者一枚

醫門方云温病老後當靜卧勿早起自梳頭澡洗但非

體勞亦不可多言語用心使患此皆令勞度

又云若欲令病不發度者燒頭垢如杏人大服之

治傷寒交接勞度方第卅七

醫門方云温病新差未滿百日氣力未平復而已房

室無不死者 尚可女勞多死

又療丈夫契病者而交接發或陰即腫縮入腹中絞痛ツナ欲死方イセ

取女人月經赤衣燒末服方寸匕イセ

又方取女人陰上毛燒飲之極救急イセ

僧深方云婦人時病毒未除大夫日率之婦感動氣イセ

泄毒即度著大夫名陰易病也丈夫病毒未除婦人イセ

納之其毒度著婦人者名為陽易病也イセ

陰易病者婦人陰毛十四枚燒服之陽易病者イセ

燒大夫陰毛十四枚服也イセ

葛氏方云男女温病後雖數十日血脉未和尚有契毒

与之交接即得病名曰陰易致人甚於時行宜急治之今イセ

人身體重小腹急契上衝胃頭重不能奉眼中生膜脉イセ

胫拘急欲死方イセ

取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸匕日三小イセ

便即利而陰微腫者為當愈得童女禪益良若イセ

女病取男禪如此為之千金方醫門方同之イセ

千金方治交接勞方イセ

取酥与交婦人衣覆男子上一食久イセ

葛氏方醫門方同之イセ

又方取罌女人手足瓜十枚女中衣帶一尺燒以酒炙米汁飲之

治傷寒病後頭痛方第卅八

千金方古傷寒差後更頭痛壯熱煩悶方

服黃龍湯五合日三 集驗方同之

治傷寒病後不得眠方第卅九

病源論云大病之後府藏尚虛營衛未生故成於冷熱陰氣虛衛氣獨行於陽不入於陰故不得眠若心煩而不得眠者心熱也若但虛煩而不得眠者瞻冷也

千金方温膽湯療大病後虛煩不得眠此膽冷故方 都效及

生薑四兩 半夏三兩 枳實二枚 橘皮三兩

甘草一兩 竹茹二兩 六味水八升煮取二升分三服之

玉箱要錄云大病差後虛煩不得眠眼瞤疼懊懣方 方云治虛煩不得眠

豉七合 烏梅十四枚 水四升先煮梅取二升半

內豉煮取一升半入再服無梅用艾子十四枚

治傷寒病後汗出方第五十

病源論云大病之後復為風所乘則陽氣發泄故令

虛汗

醫心方卷十四

葛氏方治大病後多虛汗及眠中汗流方

龍骨牡蠣シカキ麻黃根カンネクモ枳實カキ以粉身ツケシ

錄驗方治大病之後虛汗不可心方

干薑ツツ三升 枳ツツ三升 治合ツツ以枳大良

小品方治大病後虛汗不禁方

染粉シキリ豉クキ 凡二物ツツ升等火熬令集燒故竹扇ツツ

如掌大取灰合治以絹囊盛傳體立心最驗

當先熬豉末之与粉等也ヒトシク

又方云治大病之後虛汗不可心方

字治本无證自奉書有

玉在強及  
解謂之染  
或於字  
也稻餌也  
師說粟也

杜仲ヒトシ牡蠣シカキ 凡二物ツツ升等治之向暮卧以水服ヒトシク

錢ヒトシ午上汗心者不可復服令人乾ヒトシク

治傷寒後目病方第五十一

葛氏方治毒病後毒攻目方

煮蜂窠以洗之日六七今案廣利方云蜂窠半大雨水  
二升云々僧深方治翳

又方冷水漬青布以掩目集驗方治翳

又云若生翳者燒豉二十七枚末内管中以吹集驗方同之

耆耆婆方温病後目黃方

麥門冬ヒトシ菜三握ヒトシ以水一升煮取三升去滓少飲



之自老

槎要方療傷寒病溫毒熱病時行疫氣諸病之後毒  
无眼中生赤脉赤膜白翳者方悉主之有患赤  
痛不得見光病毒煩惱應心者洗之即心神効之方  
秦皮二兩升麻二兩 黃連二兩

右以水洗去塵屑然後以水四升煮取二升半小  
三合眼作以綿繞箸沾取湯以滴眼中如屋漏狀  
盡三合心須更復用如前法日五六過佳

治傷寒後黃疸方第五十二

葛氏方治時行病黃方

首陳蒿六兩 大黃二兩 支子十二枚以水一斗先煮大  
首陳取升去滓內二藥又煮取三升分四服之

千金方治傷寒熱出表黃疸方

麻黃三兩以清酒五升煮得一升半盡服之覆取汗

治傷寒後虛腫方第五十三

千金方治病後虛腫方

豉五升厚酒一升煮三沸及熱頓服不耐酒隨性覆汗

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

千金方毒熱病攻手足腫痛欲脫方

馬矢煮漬之。又方以栢棗灰汁漬之

又方常思草ナモク絞取汁以漬之

又方削黃蘗水今ワリト少煮漬之

又方煮猪蹄取汁以白葱塩少著中以漬手足冷則易

集驗方治毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

濃煮麻杖根以漬手足 又方酒煮苦參漬之

治傷寒後下利方第五十五

小品方治濕熱為毒及大陽傷寒外熱內虛熱攻腸胃

下黃赤汁及如爛肉汁及赤滯ナクシ熱腸痛者諸熱毒下良方

支子クキオシ十四枚 豉クキ一升 薤白オホアラウシ一席口

凡三物切以水四升煮支子薤白令熟內豉煎取

二升半分三服

經心方治熱病後赤白利痢痛不可忍方

香豉カウキキ一升 黃連カククク三兩 薤白オホアラウシ三兩

以統米泔汁ツルシネ五升煮取二升半分三服之

醫門方療傷寒後下利膿水不能食方

黃連三兩 烏梅肉二兩 未逆 蟻一兩 洋蠟和蜜合

為丸空腹如梧子服卅九日再加至四五丸

又方取龍骨末服方寸匕佳

治傷寒後下部癢痛方第五十六

葛氏方治大孔中卒癢痛如鳥啄方

赤小豆一升 大豆一升 合搗兩囊盛蒸之令

熱牙坐上

又云治毒病下部生瘡方

教大塩以深導之不過三

又方煮桃皮煎如粉以綿合導之

范汪方治大孔中癢方

取女萎治下節綿裹着大道中癢絕乃

出藥

治傷寒疏豆瘡方第五十七

病源論云夫表虛裏實熱毒內盛則多發瘡重者周逆

遍身其狀如火瘡若色赤頭白者則毒輕若色紫黑

則毒重其瘡形如疏豆之名疏豆瘡

今案千金方云小便澀有血者中壞瘡黑廔不

出膿死

千金方治豌豆瘡方

初發覺才未工欲作則煮大黃五兩服之愈

又方取好蜜トリスアシケ通身瘡磨上 又方以蜜煎トリスアシケ外麻トリスアシケ之

又方青木香二兩水三升煮取一升頓服同上様要方同之

又方小豆屑クダイ鷄子白和傅之 又方婦人月布モ杖之

又方青木香湯方 青木香二兩 丁香一兩

董陸香一兩 白礬石一兩 射香二升 石五味以水四

升煮取一升升分再服 熱毒盛者加一兩犀角無犀

角外麻代病輕去礬石大神驗

葛氏方治時行蛇瘡方

以水濃煮外麻綿シ沾洗シ杖之 又苦酒漬煮シ好

救急單驗方瘡時患遍身庖初覺出方

即服三黃湯令利庖即滅 又方飲鐵漿小升五卷

又方小豆末一合和水服驗

新錄方豌豆瘡滅瘰方

鷹矢粉シ上若瘡干和猪脂シ塗日三 又方胡粉付上

又方親自汁和鷄子白塗之 又方用蜜塗之

千金方古芒消和猪膽塗瘡上勿動痂落無痕都致及  
 今案天平九年六月廿六日下諸國官符古丸是疫病名赤  
 斑瘡初發之時既似瘰疾瘡出之間經三四日支體府  
 藏大契如燒當是之時欲飲冷水固忌莫飲以綿能  
 勒腹腰必令溫和勿使冷寒又鋪設既薄无卧地上唯  
 於床上敷箬席得卧息又粥饘并煎餅粟等汁温冷  
 任意可用又糯粳糲以湯饘食之又病愈之後雜經廿  
 日不得輒喫又請及阿達等與并菓菜并飲水及洗浴房室強行步  
 當風雨年莫不可食但乾鰾堅菓等煎否皆良

傷寒後食禁第五十八

養生要集古丸温病傷寒愈後但宜食糜粥唯少  
 勿食大飽引日轉久可轉合羊麻雉菹麋羹汁少  
 食之慎不慎病復致死

又古丸傷寒毒病愈百日之內禁食猪羊腸血肌魚臍  
 乾之難消之物不禁者則令泄利不可復救也

養性志古諸病愈後勿食五辛食之令人目失明

七卷食經古時行病愈食禁葫蘆蝦蟇子葷子不子禁病復

養則難治後年輒發

時行病後禁餅餌七千并與膾諸生菓菜難消之物皆復發病

時行汗解愈後勿飲冷水損心肥常虛不能伏フカ

時行病人不可食鯉鮓シヒ小鯉及鮓令病不愈

又勿食生菜及羊宗隔上乃為契燔音響釋氏云先也


凡病人不得食熊肉令作長病終不除愈

時行後禁飲酒食生真宗令泄利難治

時病愈後未滿三月食鮓以周文復食諸菜三年肌膚

直田及陸云真子麻云或作鮓不充

又食梅油脂物令暴利難治。又食菘合鱠令病復



菘 又食蒜鱠令人損膈消 又未滿三月食鮓今并即復

病 時行病後未強食青花菜令人手足損重カニ云黄花

又飲酒合陰陽復病必死 又食生菜合陰陽復必死

治傷寒變成百合病方第五十九

千金方云百合病者是百脉 一宗悉致病也其状惡寒而

歛者病在上焦也廿三日 其腹滿後喘大便堅三四日一便

時復小溲者病在中焦六十三日 其状小便淋瀝難者病在

下焦也廿三日 各隨其證以治之耳云具在本方

百合之病令人欲食復不能食或有羨時或有不用聞

醫心方卷之...

飲及飯臭如有寒其實無如有契其後無他常默欲  
卧復不能眠至朝口苦小便赤欲行復不能行也諸藥  
不治治之即劇如有神靈所為也

本无同上百合病其脉微數其候滿時即頭覺痛者六十日乃愈

本无同上百合病惟之滿時頭不覺痛者如寒者卅日愈

本无同上百合病候之滿時覺快然但覺頭眩者十日當愈

復見其候者治之喜誤也依證治之治百合病已經發

之後者方

百合根取七枚ツセ之洗水二升漬之一宿當沫出水

中明且去水取百合以泉水二升煮百合取一升汁

復取知母三兩切以泉二升煮取一升汁合和百

治百合病已經下之後者方

滑石三兩代赭一兩以水三升煮取一升內百合汁如前

法一升合和復煎取一升半分再服之

治百合病始不經發汗不吐不下其病如初者方

生地黄汁三升和百合汁後煎取一升半分再服大

便當去汗為候也治百合病已經吐之後者方百合汁一升如前法取鷄子黃一枚內汁中攪令調勻而再服之

治百合病經一月不解變如渴者方

取百合根一升水一斛漬之一宿以汁洗病人身也洗  
身竟食白餅勿与塩豉也渴不差可用栝楼根并  
牡蠣屬分等為散飲服方寸匕日三

治百合病變發熱者方

滑石三兩 百合根一兩

右煖之飲服方寸匕日三當微利者心勿復服也

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根随多少契契令黄色飲服方寸匕日

三滿消痛心

治時行後變成瘧方第六十

時行後作瘧寒後復發

錄驗方云大五補湯治時行後變成瘧方

苟杞白皮一升 麦門冬一升去心 生薑一斤干地黃三兩

當歸三兩 黄耆三兩 人參三兩 甘草三兩

茯苓三兩 生竹葉五兩 遠志皮三兩 木三兩

芍药二兩 桂心五兩 大麥棗廿枚 桔梗二兩

夕藥三兩 半夏五兩洗

凡十八物切以水一斗五升煮取三升分四服一日令盡之





驅作暖外 上十四頁宣散 氣仁三和寺字病源外臺同 十六頁上

行七意至 仁志外臺同 自縊 外臺作 上九頁俱佳病源

作后 身內 仁作即病 行二卒死 仁感生三和寺字病源同

上九頁方杵 仁方作萬 六頁上大腹 仁作真千金作

覆 下八頁心主暮 仁昏字案暮恐寡訛 行廿日 仁寺和

日中 上四頁新錄方云惡症方 仁下有吳乳下邪三寸

餘二助間依 行八螺塊 外臺病源 上五頁尸經 仁

寺本外臺同 行三十主 仁字云字主之後草體致訛耳 仁

行四三服 仁頻服又方妙艾熨之十三字 下六頁

注 今案 仁無此注 上廿七頁遇時 外臺作 上廿八頁服

之驗 仁愈方恒山七八橋皮三分鬘甲七分炙甘草七分

灸柱心二再加至二七五十九字無范汪方治瘡方六字

下九頁蜀木 仁作蜀木 下二頁脉肉 外臺作 上三

八令盡 仁湯有桂心半兩恒山二兩烏頭半兩元花半兩

糞取二分凡五物以酒三升水四升合 下八頁水粽 仁

寺本無 糞字 上八頁僧深方 仁與舊校字治本合 上七頁

為傷 仁有耳其傷三字 上六頁荷初 仁作荷初 下九

死毒 仁下有陰字 上四頁通玄經 仁與舊校字治本合

七小腸病源作下七服一二升佳仁和尚本此下有干

頭痛壯熱脈盛如得一升頰脹之二日方真丹一兩以世五行

水二升煮得一升頰脹之覆取汗世九字上三行

分三服之仁和尚本此下有千金方治疫氣傷寒三日

三升煮取二升分再服六當得吐之有葛氏方三四

覆令汗神驗四十一字行

日旬中惡汁欲令吐方改三升強一升水七升煮取二

升半去滓內蜜一升又煮三沸頰脹安卧當吐之世五

字仁和尚本此

有半斤搗碎以水一斗煮取五升上七行如此為

便極冷飲其間或得汗則愈廿七字上七行

之仁和尚本此下有又方刺青竹茹一斗以水二升

五十四頁支子十四枚水一石揚之方過取二斗半夏

上六行支子十四枚水一石揚之方過取二斗半夏

二兩洗秫米一升淡荅四兩合上二十五頁令人乾燥

煮得五升分五服三十六字上二行

風小便難四支處急難以屈申此為胃乾也桂枝湯加

附子至之方大棗十四枚擘桂枝三兩附子一枚碎之

八片九三物以水七升煮取三升分三服七十一字

下九行濕熱作溫熱上八行稅米稅即統

仁和尚本分三服之後仁和尚本此下有千金方傷寒

作稅米仁和尚本分三服之後仁和尚本此下有千金方傷寒

四水五升煮取二升分三服仁和尚本此下有千金方傷寒

有又去傷寒藥戴白麤者其毒則輕有紫黑色作根隱在

肌肉裏其毒重則甚者五内七竅皆  
有瘡形如登豆故从名烏六十五字  
仁和寺本 六十二頁  
作浙 上六行 發汁仁 和寺本 下五行 頁  
上四行 頁

者三兩  
仁 和寺本  
三 作二

