

科技资料(五)

# 中草药“验方”选编

贵州省科技局情报室

# 毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

## 说 明

遵照伟大领袖毛主席“六·二六”光辉指示的精神，我室将各地推广常见病、多发病防治的经验加以选编。这材料的来源主要是“全国中草药展览会”交流的验方为主，并收集本地区各医疗单位的实践经验，加以分科整理而成。仅供广大的工农兵和赤脚医生作参考。

由于水平所限，本资料的选编难免有缺点错误，敬请读者提出指正。

國統新老中兩名缺，  
醫藥衛生師人員，則成  
鞏固統一戰線，為開展  
偉大的全民衛生工作  
而奮鬥

張澤東

# 目 录

## 一、内 科

上呼吸道感染	(1)	肝硬化	(15)
支气管炎	(2)	再生障碍性贫血	(15)
支气管哮喘	(3)	粒性白细胞缺乏症	(18)
肺炎	(4)	血小板减少性紫癜	(19)
肺脓肿	(6)	内出血	(20)
肺结核	(7)	肾炎	(23)
心脏病	(10)	糖尿病	(23)
高血压病	(11)	地方性甲状腺肿	(24)
急性胃肠炎	(13)	风湿性关节炎	(24)
胃炎	(13)	各种中毒	(24)
胃、十二指肠溃疡	(14)		

## 二、传 染 病

感冒	(26)	小儿麻痹症	(31)
白喉	(27)	疟疾	(31)
百日咳	(28)	布鲁氏菌病	(32)
流行性腮腺炎	(29)	钩端螺旋体病	(32)
流行性脑脊膜炎	(29)	狂犬病	(33)
流行性乙型脑炎	(30)	蛔虫病	(33)

钩虫病	(34)	囊虫病	(36)
丝虫病	(34)	血吸虫病	(37)
绦虫病	(36)	麻疯病	(38)

### 三、外 科

消毒	(39)	胆石症	(45)
麻醉	(40)	急性阑尾炎	(45)
止痛	(40)	脱肛	(46)
烧伤	(41)	泌尿系结石	(46)
感染	(41)	血栓闭塞性脉管炎	(47)
破伤风	(42)	断指再植	(48)
急性乳腺炎	(43)	骨折	(48)
淋巴结结核	(43)	骨髓炎	(49)
胆道感染	(44)	骨、关节结核	(50)

### 四、计划生育、妇产科疾病

计划生育	(51)	宫颈糜烂	(54)
引产	(52)	盆腔炎、附件炎	(54)
绝育	(52)	功能性子宫出血	(54)
妇产科疾病		子宫脱垂	(54)
白带	(53)	妊娠呕吐	(55)
外阴炎	(53)	产后宫缩痛	(55)
阴道炎	(53)		

## 五、肿瘤

血管瘤、脂肪瘤………	(56)	肝癌……………	(59)
甲状腺瘤……………	(56)	胰腺癌……………	(59)
脑瘤……………	(57)	皮肤癌……………	(59)
鼻咽癌、上颌窦癌…	(57)	乳腺癌……………	(60)
肺癌……………	(57)	宫颈癌……………	(60)
食道癌……………	(58)	慢性粒细性白血病…	(60)
胃癌……………	(58)		

## 六、皮肤、五官、口腔疾病

皮肤……………	(62)	耳鼻咽喉疾病……………	(64)
眼科疾病……………	(64)	口腔疾病……………	(65)

# 内 科

## 上 呼 吸 道 感 染

主治：上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎等。

方剂：胆木。

用法：做成注射剂（每毫升含生药1克），每天肌注一次，每次2毫升。

疗效：治疗上呼吸道感染等30种炎症2316例，有效率91.4%。其中上呼吸道感染995例，痊愈760例，好转147例，未愈78例，无副作用。

病例：林××，男，12岁。发热、咳嗽、咳痰、胸闷、气短三天，两肺有干湿性罗音，诊断为急性支气管炎。肌肉注射胆木1毫升，一天二次，二天退热，五天痊愈。

主治：上呼吸道感染，急性扁桃体炎，急性支气管炎，肺炎。

方剂：蒲公英0.75克，金银藤、板兰根各1克，野菊花0.5克（以上为一支注液含量）。

制法：上药做成“抗炎注射液”每支2毫升。

用法：肌肉注射每天1—2次，每次一支。

疗效：试用31例，痊愈29例，好转1例。

病例：王××，女，52岁。感冒并发支气管炎，体温38.9°C，用解热镇痛类西药未见效，后改用本药注射2次即

退烧，症状全部消失。

主治：上呼吸道感染，肺炎。

方剂：一支黄花三钱，一点红二钱。

用法：水煎服。

疗效：治疗上呼吸道感染200例，效果良好。

## 支 气 管 炎

主治：支气管炎，百日咳。

方剂：百眼藤。

用法：用上药一至二两（百日咳用一两，加糖少许）水煎服，一天一次。

疗效：治疗支气管炎500多例，效果很好。治疗百日咳6例，全部治愈。

病例：杨××，女，28岁。患支气管炎多年，反复发作，用上方治疗，每天一次，每次一两，连服5天，痊愈，至今一年未复发。

主治：气管炎，肺气肿。

方剂：老乌眼子二两。

制法：上药用开水一斤，浸泡24小时，过滤后用药液。

用法：每次服10毫升，每天二次。

疗效：治疗气管炎106例，痊愈34例，有效36例，好转30例，无效6例，治疗肺气肿98例，肺心病10例，均有一定疗效。

主治：慢性支气管炎。

方剂：通光散。

**用法：**水煎服，每次一两，每天二次。

**疗效：**观察12例，3例有显效，7例有效，2例较差。

**主治：**慢性支气管炎。

**方剂：**天天果（尤葵果实）半斤。

**用法：**用白酒一斤浸泡20—30天后，取酒服用。每日三次，每次一汤匙。

**病例：**陆××，女，成人。患气管炎20多年，卧床不起，服完药酒一斤半后，已能参加重体力劳动。

## 支 气 管 哮 喘

**主治：**支气管哮喘，慢性支气管炎。

**方剂及用法：**1. 棒棒木煎剂：棒棒木二两，白糖五钱。水煎棒棒木约40分钟成浓茶色，放入白糖连煎三次，每晚服一次。

2. 甘棒合剂：棒棒木三斤，甘草三两。将二药切碎，加水8000毫升，煎至3000毫升为度。每日三次，每次服10毫升。

**疗效：**治疗哮喘，慢性支气管炎1000余例，近期治愈率70%以上。经系统观察50例中，近期治愈35例，好转15例。服药后无副作用。

**主治：**支气管哮喘，支气管炎。

**方剂：**“喘咳舒”药酒：海风藤，追地风各二两，白酒一斤。

**用法：**二味浸酒制成药酒。服时不可加温，否则失效。日服二次，每次10毫升，早晚空腹服。

禁忌：心脏病人及孕妇忌服，感冒及月经期暂停服。

疗效：治疗哮喘及气管炎病人40例，经一个月的治疗，近期治愈率80%，其中3例丧失劳力，卧床不起的哮喘病人，已恢复劳力，本药酒对风湿性关节炎，也有效，6例服药2个月后，关节肿胀、疼痛全部消失。

主治：支气管哮喘。

方剂：岩豇豆、岩白菜各五钱。

用法：每日一剂，两次煎服，连服二剂；哮喘减轻后，上方加地蜂子三钱，连服二剂；如喘继续减轻后，上方去岩白菜加粉条菜三钱，再服二剂。

疗效：单纯用上方治疗30例，其中儿童较多（20例），病史多在1—9年（22例），结果近期痊愈9例，显效6例，好转12例，无效3例。

## 肺 炎

主治：大叶性肺炎。

方剂：虎杖（干根）一斤。

用法：切片，加水5000毫升，煎至1000毫升，确诊为本病后，即刻服50—100毫升，以后每日服二至三次，每次50—100毫升，当烧退，症状好转后酌情减量，肺内炎症完全消失时停药。

疗效：治疗19例，结果痊愈12例，好转4例，无效3例。有效病例中，病程在1—3天内者10例，多于服药24小时后明显退烧，少于3—4日后缓慢退烧。另1例金黄色葡萄球菌败血症患者，发烧30余天，曾用多种抗菌素治疗

两周无效，改用本药3天后退烧，一周痊愈。

**病例：**李××，男，52岁。寒战，高烧，咳嗽，胸痛1天入院，化验白细胞20900，胸透左侧大叶性肺炎。即服虎杖汤100毫升，2小时后又服100毫升，14小时后体温降至正常。6天后痊愈。

**主治：**支气管肺炎。

**方剂：**一见喜、十大功劳各五钱，桔皮二钱（以上为一日量）。

**用法：**水煎成100毫升，分二次服。

**疗效：**共治14例，全部治愈。其中4例曾用过抗菌素，单纯用本方治疗的10例多在三周内治愈出院。

**主治：**麻疹肺炎。

**方剂：**大青叶、地锦（或金银花）、野菊花、海金沙各五钱。

**用法：**每日一剂，水煎服。

**疗效：**如表

药 物	例 数	疗 效		退 热 情 况				肺部罗音消失情况			疗 效	
		日 数	平 均 日	3—5 日	6—7 日	7 日 以 上	治 愈	好 转	死 亡			
草 治 疗	173	1—8	3.05	78	52	43	161	8	4			

**病例：**万××，五个月，因发热五天，出疹咳嗽三天入院。检查：患儿烦躁，呼吸急促，咽红，扁桃体1度肿大，两颊粘膜可见麻疹斑，躯干有散在红疹，双肺湿罗音，肝在

肋下一指半，仅用草药两天退热，五天肺部罗音消失，痊愈出院。

主治：麻疹肺炎。

方剂：黑白丑五钱，明矾一两少许，醋适量。

用法：前两味药共研细末，醋，干面调膏敷两足涌泉穴。

疗效：治51例麻疹并发肺炎，痊愈46例。

病例：李××，7个月，男。发热五天，今日喘，体温39°C，疹色暗红，两肺有干湿音，诊断为麻疹并发肺炎，经用上药一科敷足心，24小时后体温正常，两肺罗音减少，继用一科而愈。

## 肺 脓 肿

主治：肺脓肿：

方剂：铁脚将军草。

制法：用其块根洗净晒干，剪去根须，切碎，以瓦罐盛干药半斤，加清水或黄酒1250毫升，罐口用竹箬密封，隔水文火蒸煮3小时，最后得取净汁约1000毫升，加防腐剂备用。有水剂和酒剂两种。

用法：根据年龄和病情，分别用20，30，40毫升三类，一日服三次。一般病例采用水剂，高热持续，臭痰排出不畅，经久不愈时，采用酒剂。

疗效：配合抗菌素治疗232例，痊愈率86.2%，好转率13.8%。住院最短者5天，最长者69天，平均22天。对排出脓痰，缩短疗程，有显著效果。

**主治：**肺脓肿。

**方药：**马鞭草三两，田埂芽子根、鱼腥草各二两，寻骨风根，白茅根各一两五钱。

**制法：**上药洗净晒干，用甜酒水二斤，淘米水一斤，酒一至四两，微火煎至1100毫升，备用。

**用法：**第一次服100毫升，以后每服80毫升，早晚饭前各服一次。禁食酸辣食物。

**疗法：**配合抗菌素治疗32例，均在一月内痊愈。

**主治：**肺脓肿。

**方剂：**狗舌草（铜盘一支香）、金锦香（金香炉）各五钱。

**用法：**用烧酒半斤，隔水燉服，每日一剂，痊愈为止。

**疗效：**已治疗几十例，未合用抗菌素，一般连服10剂左右痊愈。

## 肺 结 核

**主治：**肺结核

**方剂：**胎兔（即健康孕兔之胎儿）

**制法：**将胎兔搅碎，烘干，研磨，压片。每片重0.3克，内含胎兔粉0.25克，淀粉0.025克，苯甲酸钠0.00003克。

**用法：**内服。

**疗效：**共治疗100例肺结核患者，有改善体质，减轻症状的作用，与雷米封等抗痨药并用可以提高治疗效果，对早期病例可提高疗效，缩短疗程。经实验研究，胎兔对结核菌有一定程度的抑菌作用，可以延缓对抗痨药物产生耐药性的

时间。

主治：肺结核

方剂：夏枯草（全草）二斤

用法：加水五斤煮后，去渣取汁，再浓缩至斤许，加红糖适量收成膏。每日服三次，每次15毫升。

疗效：共治27例，效果良好。

病例：黄××，男，患六型肺结核，并有空洞形成，反复用抗痨药治疗无效，改服本方三个月，共用夏枯草11斤，胸片复查病灶明显吸收，空洞闭合。

主治：肺结核。

方剂：紫金牛二两，菝葜、白马骨各一两。

用法：水煎成150毫升，每日三次，每次服50毫升。小儿酌减。

疗效：治疗浸润型肺结核18例，一般2—3个月症状消失，X线复查病灶显著吸收好转。

主治：肺结核、骨结核、肠系膜淋巴结核。

方剂：炙鳖甲，百部、海藻，藕节各5.5斤，黄柏，紫菀，阿胶各2.75斤，胎盘220个，鸡蛋清660个，卤水2800毫升。

制法：先将前八味药打成粗末，另取卤水2800毫升加入适量生石灰浸24小时搅拌数次，再澄清，取上清液，再加入蛋清660个搅匀后，将粗末浸入，待药末将卤水蛋清混合液吸净，然后烘干磨细粉，用70%酒精作颗粒，压成片剂，每片0.5克。

用法：每日服三次，每次6片（小儿酌减），三个月为一疗程。

**疗效：**共治39例，其中肺结核32例，治后病灶吸收好转27例，无改变4例，恶化1例；骨结核6例有5例好转，1例无效，肠系膜淋巴结核1例症状消失，基本痊愈。

**病例：**苗××，女，32岁，1966年9月诊断右侧浸润型肺结核（三个球形灶及肺门淋巴结肿大），长期用抗痨药治疗22个月无效，改用本药治疗9个月，症状消失，复查肺部病灶吸收，仅遗下纤维硬结，肺门淋巴结缩小，已恢复全日工作。

**主治：**肺结核，淋巴腺结核，骨关节结核，结核性脑膜炎，结核性瘘孔（管）等。

**方剂：**红矾（三氧化二砷）

**器械：**1.熏壶一个，容量400毫升以上，壶盖用橡皮塞闭严，从橡皮盖上插入直径0.3—0.5厘米玻璃管与1米左右长的胶管相连，胶管远端连一个“T”型管。

2.加温用火炉或电炉一个。

**用法：**将二钱红矾研成细末，和水八两加入壶内，塞紧壶盖，开始加温，直至沸腾，见蒸气从“T”型管喷出，即可对准部位气熏治疗，可熏手心或局部。每日熏治20—90分钟，疗程一般为1.5—3个月。须注意防止烫伤和中毒，但治疗量安全，无中毒反应。

**疗效：**共治疗肺结核31例，病灶吸收者27例，显著吸收者4例，治疗骨关节结核50例，均有效，其中治愈48例，有效者41例，其中24例治愈。

**主治：**肺结核咯血。

**方剂：**儿茶一两，明矾八钱。

**用法：**共为细末，装于有色瓶内备用。每次0.1—0.2

克，每日3—4次。

疗效：治疗35例肺结核中，小量咯血患者，均收到明显效果。

主治：肺结核咯血。

方剂：黄精一斤，白芨、百部各半斤，玉竹四两。

用法：将上药切片晒干，研细末，炼蜜为丸，每日服三次，每次三钱。

疗效：治疗28例，有效率90%

病例：涂××，男，31岁。患六型肺结核，咯血，胸痛，体瘦，服丸药二科后胸腹病灶已钙化。

## 心 脏 病

主治：风湿性心脏炎。

方剂：银翘白虎汤：连翘四钱，银花，防己、宣木瓜、知母、梗米各五钱，生石膏二两，桑枝一两，甘草二钱。

用法：每日一剂，两次煎服。

1.湿重：加苍术五钱，苡仁八钱，厚朴四钱；

2.热重：加梔子，黄柏各三钱，黄连二钱；

3.心前区闷痛：加全瓜蒌、薤白各五钱，桃仁、丹参各三钱。

4.心跳：加茯神、枣仁、远志各三钱，柏子仁五钱。随症加减。

疗效：用银翘白虎汤加减治疗34例风湿性心脏炎患者，痊愈17例，基本控制风湿活动11例，明显好转2例，无效4例，对其中20例进行了三个月至七年的随访，初发病者无一

例有风湿性心脏病形成的体征。

主治：心力衰竭。

方剂：万年青。

用法：成人每日量六钱至一两二钱，一疗程7—10天，控制心力衰竭达饱和量；小儿每公斤体重五分至一钱为饱和量，按一日6小时服一次。每日维持量约为饱和量 $1/15$ ，如心衰未控制，则用4—7日维持量后，继续用第二疗程的饱和量，下类推。

1.速给法：将鲜草一至一两半熬成一煎20毫升，早晨保留灌肠，二煎液20毫升，晚上灌肠。

2.缓给法：按用量一煎加水150毫升，火煨煮，取50毫升；第二煎加水120毫升，煎成40毫升，混合两次煎液90毫升。每次30毫升，一日三次分服。

疗效：治疗43例，19例痊愈，10例显效，9例好转，3例无效，2例死亡，以肺原性心脏病合并全心衰竭疗效最好。

## 高 血 压 病

主治：高血压病。

方剂：降压膏方：夏枯草、茺蔚子各六钱，草决明一两，生石膏二两，黄芩、茶叶、槐角、钩藤各五钱。

用法：上药共熬，去渣取汁，加蜜收成膏。一天分三次服，开水送下。

疗效：临床观察67例，显效34例，有效23例，无效2例，未随访8例。武医二院临床观察11例原发性高血压，8

例有效（服药三天后收缩压下降10—20毫米汞柱，舒张压下降10毫米汞柱），三例无效。

病例：魏××，男，62岁。1964年经检查诊断为原发性高血压，血压经常在170/110毫米汞柱上下。有头昏、头痛等症状，曾用多种降压药物治疗，效果不稳定。1970年7月开始服降压膏，服药前血压170/110毫米汞柱，服药三天后，血压下降至150/80毫米汞柱，症状好转，两周后复查，血压仍为150/80毫米汞柱，疗效较为巩固。

主治：高血压病。

方剂：锦鸡儿（土黄芪）。

用法：取根洗净，去外皮，切片，鲜用或干用，每日八钱至一两，煎水取汁，加白糖适量，分三次服。

疗效：治疗30余例，均获良好效果。

病例：阮××，男，58岁，1960年6月起，自觉头痛、头昏，以后病情加剧，血压200/120毫米汞柱，曾住院治疗，1967年6月又发病，血压194/110毫米汞柱，用锦鸡儿六钱，水煎两次，分四次冲白糖服，血压降至150/90毫米汞柱。

主治：高血压病。

方药：臭梧桐。

制法：将上药制成药片，制作时不宜加温，以免影响疗效。

用法：每日三次，每次四片，内服。

疗效：共治疗95例Ⅰ、Ⅱ期高血压病患者，均系久服蛇根制剂无效，经用中医中药平肝潜阳等法作为过渡，然后服药片，服三个月后进行小结，有效率56.69%，其中有35例服药一年，有效率74.27%。疗效统计如下：（表）

疗 效	治疗三个月		治疗一年	
	病例数	百分率	病例数	百分率
总 例 数	95		35	
显 效	24	25.26	10	28.57
有 效	30	31.43	16	45.70
总 有 效 率	54	56.69	26	74.27

## 急性胃肠炎

主治：急性胃肠炎。

方剂：鲜吹风散三十公斤，辣蓼草五公斤。

制法：取上药加水至126公斤，煎熬浓缩至42公斤加2%尼泊金作防腐剂。

疗效：治疗成人急性胃肠炎及小儿消化不良共435例，除部分病例伴有不同程度的脱水，除补液、补钾外，未用其他抗菌药物，其中384例服药1—5天痊愈，治愈率88.2%。

## 胃 炎

主治：急性胃炎。

方剂：蛇参（马兜铃）根一至二两，白酒半斤。

用法：洗净，切片，用酒泡，每日服2—3次，每次5毫升。

疗效：治疗2450例，2330例痊愈。

主治：慢性胃炎。

方剂：蒲公英（全草）五钱，酒酿一汤匙。

用法：水煎二次混合，分早、中、晚三次饭后服。

疗效：治疗70多例疗效满意。

病例：刘××，成年，患慢性胃炎十多年，经常发作，近年逐渐增剧，各地医院治疗无效，经用此方治疗，服药7天后，胃病即愈，至今8个多月未复发。

## 胃、十二指肠溃疡

主治：胃、十二指肠溃疡病。

方剂：甘楞散：瓦楞子五两，甘草一两。

用法：将瓦楞子煅后研细末，甘草研细末，混匀。每服二钱，每日三次。

疗效：治疗124例，近期治愈59例，好转48例，无效17例。疗程最短20天，最长56天。长期服用有个别患者可引起浮肿和血压增高或尿血现象。

病例：葛××，男，39岁。上腹部疼痛一年之久，钡餐透视诊断为十二指肠球部溃疡，经服上药10天，疼痛消失，28天后钡餐复查基本痊愈。

主治：胃、十二指肠溃疡病。

方剂：槐木三至五钱，红木香、乌药、枳壳各三钱，甘草一钱。

用法：水煎服，每天一剂。

疗效：治疗100余例，有效率90%以上。

## 肝 硬 化

主治：肝硬化腹水。

方剂：九头狮子草（京大戟）。

制法：取其根洗净晒干，磨粉，用小火焙成咖啡色，装入胶囊，每粒0.3克。

用法：每3—7天服一次，每次13—16粒，儿童减半。早饭后2小时温开水送服，连服至腹水消失。腹水消失后可服人参养荣丸调理。

疗效：据536例信访统计，服药后病情有不同程度好转者485例，占90.29%。无效者53例，占9.71%。

注：服药后有轻度腹痛或呕吐，数小时即自行消失。服药期间禁食盐、鸡、鲤鱼、猪头肉。

主治：肝硬化腹水。

方剂：香白芷（全草）一两。

用法：水煎服或用干粉二钱和白糖冲服，每天二次。

疗效：治疗6例，5例近期痊愈，1例好转。

病例：何××，女，37岁。1965年患传染性肝炎，1969年起下肢浮肿，腹水，腹壁静脉曲张，经某医学院附院诊断为肝硬化腹水，即服本方三天后，尿量增加，食欲好转，服20天后，全身浮肿消退，体重增加，基本恢复劳动力，半年来未复发。

## 再生障碍性贫血

主治：再生障碍性贫血。

方剂：再生1号：生地一两，双花、公英、丹皮、龟板各五钱，当归、白芍各四钱，连翘三钱，阿胶二钱。

再生2号：黄芪一两，甘草六钱，龟板五钱，白术四钱，党参、陈皮各三钱，阿胶、肉桂各二钱。

再生3号：山药、生地各一两，龟板五钱，当归、白芍各四钱，熟地、首乌、枸杞、五味子各三钱，维生素B12翠丸素等。

用法：中药水服，每日一剂，三方交换使用。

疗效：治疗26例，治愈5例，好转20例，无效1例。

主治：再生障碍性贫血。

方剂：早期以补气养血为主，常用：黄芪、人参、党参、当归、白芍、阿胶、龙眼肉、酸枣仁、茯苓、白术、甘草等。

晚期着重重滋阴温阳，常用：生熟地黄、首乌、枸杞子、女真子、菟丝子、五味子、鹿角胶、紫河车、天麦冬、黄精、肉苁蓉、肉桂等。

用法：中药水煎服。部分病例短期配合西药和输血治疗。

疗效：共治疗11例，完全缓解6例，明显进步3例，进步1例，无效1例。

主治：再生障碍性贫血。

方剂：四物汤（去川芎）为主加丹参，四君子汤，归脾汤及人参养荣汤配合辨症加减（并配合西药治疗）。

用法：水煎服。

疗效：共治疗10例，7例有效。

病例：张××，男，成人。心慌无力，头晕一个月余，

皮肤粘膜苍白，有出血点，肝脾不大，血红蛋白4.5克，红细胞120万，血小板7200，骨髓增生减低。经以上方药合并西药治疗后，症状及体征消失，血红蛋白15克，红细胞465万，白细胞5200，血小板312000，骨髓增生活跃，三年后随访未复发。

主治：再生障碍性贫血。

方剂：1. 加减归脾汤：白术，台参，炙黄芪，白茯苓，远志，枣仁，广木香，黄连，炒山药，炙甘草，当归。

2. 加减钱氏白术散：台参（党参），白茯苓，炙甘草，藿香，广木香，葛根，枳实，白术。

用法：先割脂一次后即水煎服上述两方，一周后进行第二次割脂，继续服上述中药至病愈。

疗效：治疗10例病人，效果显著。

注：割脂部位及方法：1. 部位：第一次在两手的食指与中指的指蹼处，第二次在中指与无名指间指蹼处。

2. 方法：酒精棉球消毒后，以小刀在指蹼处顺纹切开0.5—1厘米，深达皮下脂肪处，即用三棱针徐徐挑出皮下脂肪约小豆粒一块，用消毒剪剪去，再用碘胺粉撒伤口上，包扎即可。

主治：再生障碍性贫血。

方剂：皂矾、红枣、核桃、飞麦面各四两，皂角树干叶一两，鲜桑叶三至五片或红糖适量。

制法：皂矾放锅内小炒，待溶化后加老醋适量，起泡后停火，冷后铲出研末。红枣开水煮后（去皮核）和核桃（去壳）共捣泥。皂角树干叶炒焦后研末。上述药品掺合均匀后，加飞麦面及适量水打成浆糊，做成豌豆大小之丸剂。

**用法：**每天服三次，每次服三粒。男患者每次以桑叶3—5片煎水冲服，女患者以红糖煎水冲服。服至产生恶心呕吐等反应而停药。

**疗效：**已有一例治愈，7例得到不同程度的缓解。

**主治：**再生障碍性贫血。

**方剂：**I方：白芨一两，百合六钱，仙桃草二钱，三七五分。

**I方：**芦荟，地黄，白芍，丹皮，大黄，寸冬，银花各适量。

**用法：**两方各研细末，每天服两次，每次一钱，交替使用，连服一个月。

**病例：**杨××，男，13岁。因故受伤，三天后大出鼻血，止血无效。检查：血红蛋白20%，红细胞93万，白细胞4250，血小板36000，在××地区医院诊断为再生障碍性贫血，用上方治疗一个月后，得到缓解，复查血红蛋白80%，白细胞9750，血小板62000。

**主治：**再生障碍性贫血，溶血性贫血。

**方剂：**黄根（狗骨木、黑子根）一两。

**用法：**燉猪骨（不加油盐）。每天内服二至三次。

**疗效：**治疗再生障碍性贫血两例，症状基本缓解，病人主动要求出院，随访一个多月情况良好。治疗溶血性贫血一例，服药18天痊愈出院，随访一个月情况良好。

## 粒性白细胞缺乏症

**主治：**放射线及化学药物引起的白细胞降低。

方剂：血苏：小枣一两半，黑豆、生侧柏叶各一两，枸杞果四钱，骨碎补、党参各三钱，当归、冬瓜子、天冬、生黄芪各二钱，甘草一钱半，乳香五分。

制法：1. 将小枣剪碎水煮3小时过滤，滤液放置。滤渣与黑豆共煮2小时过滤，将滤渣扔掉，将两次滤液合并，继续煮熬成膏状。

2. 其余十味共煮，第一次煎煮4小时，过滤，将滤液放置，药渣第二次再煮2小时，过滤，药渣扔掉，两次滤液合并，继续熬成稀稠状。

3. 将两者合并，微火共熬炼至滴水成珠，装瓶60毫升。

用法：每天60毫升，分两次服。

疗效：用于放射线和化学药物治疗肿瘤而产生的白细胞下降患者40余例，均有明显的疗效。

病例：梁××，女，47岁。因患肝癌入院，用环磷酰胺治疗，每天用量200毫克。6月16日开始注射第二天白细胞就由7250/立方毫米下降至2250/立方毫米，6月22日复查白细胞仍为2950/立方毫米，用“血苏”治疗后白细胞逐渐升高，6月25日白细胞8300/立方毫米。因此又继续用环磷酰胺治疗一直不间断，至7月8日环磷酰胺总量达3000毫克。查白细胞7700/立方毫米。在使用环磷酰胺期间一直服用“血苏”不间断。

## 血小板减少性紫癜

主治：血小板减少性紫癜。

方剂：水胶膏：水胶一两，朱砂（水飞）一分，香油适

量。

制法：将水胶打碎，加水适量，置于锅内，文火加热，频频搅拌至全部熔化，加入香油搅拌均匀即可。朱砂分成二等份。

用法：早晚各服一次，朱砂冲服。

疗效：共治疗原发性、继发性、过敏性紫癜共11例（单用水胶膏治疗5例，水胶膏与激素合用6例），10例症状全部消失，1例症状大部分消失。

注：水胶（牛皮胶）。

主治：血小板减少性紫癜。

方剂：雪见草五钱至一两。

用法：水煎服，每日一剂。

疗效：治疗4例均获满意效果。

病例：耿××，女，17岁。因诊断为急性黄疸型肝炎入院。由于口腔粘膜反复出血，右臂注射部位发现紫癜而查血小板为23000。次日再查，结果仍是22000，即用雪见草五钱煎服六天后，复查血小板上升到148000。10天后复查血小板143000，病人的出血症状及紫癜完全消失。

## 内 出 血

主治：各种出血性疾患。

方剂：牛西西（巴天酸模、土大黄）。

制剂及用法：1.片剂：每片含浸膏0.5克，每日服2—6次，每次1—2片。2.针剂：每支2毫升含生药4克，每日肌注2—6次，每次1—2支。3.煎剂：每次三钱，每日

两次煎服。4. 散剂：外用，用牛西西粉及乌贼骨粉各半制成。

疗效：治疗子宫出血、肺结核、支气管扩张咯血、溃疡病呕血便血、再生障碍性贫血、牙龈出血等十余种出血性疾病 110 例，结果显效 69 例（62.7%），有效 39 例（35.5%），无效 2 例，总有效率 98.2%。用药后均无副作用。有效病例多在药后 48 小时发生止血作用。通过实验证明：该药能降低毛细血管的脆性和通透性改善微循环，以达到止血的目的。

主治：各种出血。

方剂及制法：①“11号止血粉”：紫珠草、茜草、白芨各等量，分别研细后过 100 目筛，混匀，用 15 磅高压消毒 15 分钟后，装入消毒塑料袋或瓶内备用。②50% 紫珠草注射液：紫珠草一斤切碎，加水煎二次，每次半小时，冷却沉淀后过滤，将滤液浓缩至 700 毫升，加 95% 酒精 1200 毫升，冷置 12 小时后，过滤加热去酒精，加蒸馏水至 500 毫升。另取苯甲醇和“吐温 80”各 10 克，加蒸馏水 500 毫升使之溶解，将两液合并，搅匀过滤分装，用 0.7 公斤压力灭菌半小时即成。

用法：① 内服每日三次，每次二钱。外用按创面大小放药后轻轻压迫。

② 每日肌注 2—3 次，每次 3—5 毫升。

疗效：用上两药治疗上消化道及妇科各种出血疾患 6 例，多在 3—8 天止血。

病例：1. 秦 × ×，男，55 岁。入院诊断为肝硬化食道静脉曲张破裂出血，经服“11号止血粉”3 天，呕血停止，好转出院。

2. 黄 × ×，男，38 岁。十二指肠球部溃疡大吐血而入

院，经每日肌注50%紫珠草液3毫升，8天后大便潜血阴性，转外科手术。

主治：各种内出血。

方剂：吐血莲一、二颗（一钱半至三钱）。

用法：研末，开水冲服。

疗效：湖北中医学院附院治疗4例，其中属于肺结核咯血2例，支气管扩张、食道静脉曲张出血各1例，均在服药一次（三颗）后两小时内止血。

主治：内伤出血。

方剂：紫金龙粉（又名黑牛膝、串三七、串枝莲）。

用法：每日三次，每次服七分，开水送服。本药随症加味，尚可治头痛、牙痛、胃痛、关节痛、高血压、子宫脱垂、习惯性流产等。

病例：张××，男，25岁，工人。因翻车左胸受伤，呼吸困难，咯血不止，经服上药3日后，痰中仅带少量血丝，15天咯血停止。

主治：上消化道大出血。

方剂：白芨粉、三七粉各一钱半。

用法：二味混合，用30°C微温水搅拌成乳浊液，加水至10毫升内服。每日三次，服后用清水漱口。

疗效：治疗10例，其中胃、十二指肠溃疡病5例，肝硬化3例，肝癌，急性粒细胞性白血病各1例。有6例服药一次后呕血停止，4例服药2—3次后黑便减少，无一例因出血死亡。

## 肾 炎

主治：急性肾炎

方剂：小蓟炭四钱、生地三钱、梔子三钱、甘草一钱。

用法：水煎服，每日一剂，早晚服之。

疗效：临床治疗七例，服三至五付痊愈。

主治：慢性肾炎

方剂：生地二钱、茯苓三钱、泽泻二钱、丹皮二钱、山药三钱、寄生二钱、车前三钱、陈皮二钱、肉桂三分、甘草一钱。

用法：水煎服一日二次，早晚服之。

疗效：临床治疗观察，疗效80%。

主治：急、慢性肾炎，肾盂肾炎。

方剂：扁蓄、侧柏各二两，甘草一钱，大枣四枚，芥菜一两。

制法及用法：将药切碎，每剂加水1500毫升，煎成500毫升，分三次服，一天服完。

疗效：治急性肾炎46例，治愈27例，减轻11例，无效8例；肾盂肾炎59例，治愈32例，减轻9例，无效18例；慢性肾炎76例，治愈24例，减轻20例，无效32例。

## 糖 尿 病

主治：糖尿病

方剂及用法：熟地、怀山药各一两，党参、复盆子各五

钱，五味子一钱五分，五倍子一钱。水煎内服，每天一剂。

疗效：共治疗4例，痊愈3例。

## 地方性甲状腺肿

主治：地方性甲状腺肿。

方剂：海藻，昆布。

制法：上药各等分，水泛为丸。

用法：每次一钱，每天二次，每疗程40天，中间休息20天。

疗效：治疗167人，治愈141人。其余均有效。

## 风湿性关节炎

主治：风湿性关节炎。

方剂及用法：①银花、乌梅、草乌、川乌、甘草、大青盐各二钱，用60°白酒一斤泡21天。每天服三次，每次5毫升。用于男性病人。

②红花、乌梅、草乌、川乌、甘草各三钱，用白酒一斤泡7天，服法同上，用于女性病人。

禁忌：高血压、心脏病、风湿热、严重溃疡病患者忌服。

疗效：治疗2610例，治愈1986例，好转457例，有效率93.6%。

## 各种中毒

### 一、杏仁中毒

处方：杏树皮或杏树根皮四两。

用法：切碎，水煎服。

## 二、砒霜中毒

处方：①梧桐根四两，水煎服。

②白矾五钱、大黄一两，共研细粉，水调灌服。

(注)忌热水。

③鸡蛋七个，白矾一两，鸡蛋与白矾调匀服下。

④防风四两、甘草二两，水煎服。

## 三、农药中毒（1605和1059）

处方：金鸡尾，金银花，各四两，甘草二两。

用法：水煎服一次灌服二大碗。

## 四、卤水中毒

处方：①生豆子适量，加水捣汁灌服。

②醋二两灌服。

## 五、食物中毒

处方：①绿豆一两、甘草二两，水煎服。

②紫苏四钱，生姜（或干姜）四片。水煎一碗，分三次服完。

## 六、煤气中毒

处方：①茶叶适量，煎浓茶，连服二至三杯。

②鲜白萝卜适量，捣汁取二两一次服下。

# 传 染 病

## 感冒、流行性感冒

用途：预防流行性感冒。

方剂：野菊花秧子一把，鱼腥草、银花藤一两。

用法：加水500毫升，煎至200毫升，日服三次，每次20—40毫升。

效果：流行期服此方，使发病率由86%降至2%，三天控制了流行。

用途：防治流行性感冒。

方剂：阔叶十大功劳五钱，山泽兰、山葫芦各一两（均为干品）。

用法：日一剂，水煎，三次分服，连服五剂。流行期间，可隔3—5天服一疗程。

方剂：天将壳、紫苏梗（或茄子梗）、枇杷叶各一两，蒲公英、桑叶各五钱。

效果：某大队150例高烧、头痛、咳嗽患者服此方，1—2天痊愈。

方剂：铁柴树根、时田波根、臭桐根、金银花藤、紫苏叶各三至五钱，老姜三至五片。

用法：日一煎。

加减：高烧，加竹叶梔根；咳嗽甚者加叶下白。

效果：180例服此方，一至二天退烧者占60%，一周内恢复健康与劳动力者占93.3%。

用途：感冒、咳嗽、支气管哮喘。

方剂：净棉子仁五斤，麻黄一斤半，杏仁二斤。

加工及用法：棉子炒熟去壳炒香，杏仁去皮炒熟，同麻黄共研细末，炼蜜丸二钱大，日三次，每服一丸。干咳无痰，心脏性哮喘者禁用。

效果：867例，感冒咳嗽742例均治愈；慢性支气管哮喘125例，痊愈53例，40例愈后受凉复发，32例无效。

用途：病毒性上感，病毒性肺炎，流行性腮腺炎、带状疱疹、水痘。

方剂：大青叶、板兰根、紫草根、草河车各五钱，山豆根、百部、贯众、茵陈各三钱，桔梗、甘草各二钱。

用法：加水500毫升，煎至160毫升。4至6小时服一次，每服：一岁以下10毫升，一至五岁15毫升，五至十五岁20毫升，成人25毫升。

效果：病毒性上感45例，治愈40例，无效5例。病毒性肺炎10例，治愈4例，无效1例。流行性腮腺炎42例，治愈40例，无效2例。带状疱疹3例，水痘3例均治愈。

## 白 喉

用途：白喉。

方剂：土牛膝根三两，山火炭根二两，木患子根一两。

加工法：上药切片，加水2500毫升，煎至1000毫升，加糖适量。

**用法：**每天量：1—2岁服200毫升，3—6岁250毫升，7—12岁400—600毫升；成人1000毫升。每天分四、五次服。重症可加倍药量服。

**效果：**196例，全部治愈。退烧时间一般24小时，假膜多在12小时脱落，三天内全部剥离。扁桃体充血、颈淋巴结肿大和其它中毒症状逐渐消失，平均住院2—3天。无并发症可收到同样疗效。

**用途：**白喉。

**方剂：**火炭母鲜叶五两，蜂蜜5毫升。

**加工法：**取鲜叶捣烂，取汁30毫升，加蜜兑服。

**用法：**每天分六次服。重症可少量多次灌服。

**禁忌：**煎炒，火毒。

**效果：**63例全部治愈，疗程一般2—4天。

## 百 日 咳

**用途：**防治百日咳。

**方剂：**1. 预防：银花藤、黄花冬菊各三斤，钩藤一斤半，鱼腥草根半斤，鸡凉茶一斤。加水50斤，煎至30斤，为150人一次量。每日一次，五日为一疗程，隔一天服第二疗程。

2. 治疗：黄花冬菊六钱，钩藤、鱼腥草根、鸡凉茶各二钱，银花藤三钱（浮肿加茯苓皮二钱；发热加一枝黄花三钱；呕吐加竹茹一钱；气喘加葶苈子一钱半；鼻衄加山梔炭一钱、茅根二钱），水煎服连服3—5天。

**效果：**某大队136名儿童，发病的95人，服治疗方后全

部治愈，41名未发病儿童服预防方后未发病。

用途：百日咳。

方剂：兰香草。

用法：1—3岁，一两；3—5岁，一两半；5岁以上递增。水煎服，日一剂。

效果：330例均治愈。

## 流行性腮腺炎

用途：流行性腮腺炎。

方剂：4粒老鼠屎（肺经草）。

用法：鲜根五钱至一两，水煎分二次服。小儿用根煮鸡蛋，只吃鸡蛋即可。

效果：治500例，均二至三天痊愈。

用途：流行性腮腺炎

方剂：青木香根、青山虎根（去粗皮）各适量。

用法：用白酒六钱将上药磨成糊状。先内服一次，每日服二钱。后外涂患处，干后再涂，连续涂一小时。

效果：320例，均在一至三天内痊愈。

## 流行性脑脊膜炎

方剂：生石膏二两，银花、连翘、黄芩、梔子、龙胆草、板兰根、地丁各五钱，元参八钱，生地六钱，知母、麦冬各四钱。

加工法：提取制成“清热解毒注射液”及片剂。注射液

每支二毫升相当于三克原生药，作肌注。

用法：每次肌注：一至六岁二至四毫升，七至十二岁四至六毫升，十二岁以上四至八毫升。每六小时一次，首次量加倍。一至三天后改为口服片剂：每次七岁以下二至四片，八岁以上四至八片，每六小时一次，一般疗程三至四天。同时加强西医支持疗法，病重者给输液一般不用抗菌药物。

效果：治疗36例，平均2.2天体温正常、1.6天症状消失，3·6天痊愈。比用抗菌药物治疗组疗程缩短一半左右。

## 流行性乙型脑炎

用途：流行性乙型脑炎。

方剂：穿心莲、狗肝菜。

用法：二至四岁，穿心莲、狗肝菜各二钱。五至十岁，穿心莲四钱，狗肝菜五钱。水煎加白糖服，每天一剂，服至退热和诸症好转，一般为五天。个别病例酌情用止痉药、维生素等西药对症治疗。

效果：治疗普通型及轻型十六例，均治愈，无后遗症，平均住院5·5天。

用途：流行性乙型脑炎。

方剂：牛筋草（蟋蟀草、鼠尾粟）一两。

用法：水煎当茶饮，连服三天，隔十天再连服三天。

效果：流行期可控制发病。预先服用可明显降低发病率。某市四十三万人次服此方预防，仅五人发病。少数人服后有轻微腹痛。

## 小 儿 麻 痹 症

方剂：膏药：将当归、生地各一两，白芷五钱，乌头三钱，以桐油一斤，煎至滴水成珠时，查渣，入广丹三两，熬成黑膏药，离火至无烟时，放冷，加鹅不食草干粉一两，肉桂、血竭各五钱，田七三钱，摊成膏药贴穴位（上肢贴肩髃，天宗。下肢贴环跳），每贴用半月。

药酒：鹅不食草二两，白酒一斤，密封浸泡二小时即可用，用药搽患部十五至三十分钟，每日三至五次。

效果：治321例，治愈185例，好转122例，有效率96%。

## 疟 疾

用途：防治疟疾。

方剂：豨莶草（干品）一两。

用法：每天一剂，两次煎服，连服三天。

效果：共治3500例，治愈率95%以上。

方剂：川芎、白芷、桂枝、苍术各等分。

加工法：取上药研细末。

用法：取药末三分，用棉花或纱布卷成条状，于发前二个小时，纳入一侧鼻孔，四小时后取出。小儿则将药末撒于膏药上，于发前4小时贴肚脐处。

效果：治4000余例，有显效。兼有预防作用。

## 布 鲁 氏 菌 病

方剂：柳枝、大枣、桑枝、羊角秧、小麦、牛筋草、黑豆各一两，五加皮、地黄各三钱，丝瓜络、红花各二钱，枸杞子、槐枝各五钱。

用法：加水3000毫升，煎至1000毫升，早晚分服。

效果：治愈35例亚急性布鲁氏菌病，观察一年多均未复发。

用途：布鲁氏菌病后遗症。

方剂：雄黄一两，大蒜六十瓣。

加工法：将雄黄研成细末，大蒜捣烂，配制成立丸。

用法：每次一丸，日三次，连服二十天为一疗程。

效果：治五例，四例痊愈，一例无效。治慢性布鲁氏菌病后遗症十例，八例愈，好转二例。

## 钩 端 螺 旋 体 病

用途：预防。

方剂：金银花一两（或忍冬藤二两），连翘一两，白茅根二两，黄芩六钱，藿香四钱。

用法：在接触疫水期内，每日一剂，三次煎服。

效果：在流行区流行期间，调查500名与疫水接触的人，每日服药无一人发病。

用途：钩端螺旋体病。

方剂：田唇乌蝇翼、旱莲草、金银花各二至四两，塘葛

菜一至二两，细叶满天星四至八两。

用法：均用鲜草(全)。每天一剂，水煎分三、四次服，连服十多天。

发热肌痛较剧者，加猛鼓索一至二两；尿少，尿赤者加车前草一至二两；体虚，属寒者，加排钱树一两。

效果：流行期治100多例，全部治愈。观察23例，治愈期最快的平均五天，平均14.9天。

## 狂犬病

方剂：扫山狗、油子树根、九灵根、黑竹根各一两，生地榆、金银花藤、梨萝根各一两半。

用法：水煎服。疯狗咬伤后五十天内，每七天吃生黄豆一次，如自觉无生黄豆味，证明已中毒，服本方一剂可愈；如自觉有生黄豆味，证明未中毒。

效果：三人服此方一剂痊愈。

## 蛔虫病

用途：蛔虫性肠梗阻。

方剂：细辛、皂刺各四钱，蜂蜜四两。

加工法：将细辛、皂刺研末。将蜂蜜文火煎至滴水成珠，入药粉搅匀。趁热制成五厘米，直径一厘米的栓剂，用玻璃纸或聚乙烯薄膜包装备用。

用法：每次一二条塞入肛门。使用次数视病情而定，一般一次即可。

**禁忌症：**肠套迭，肠扭转。

**效果：**治疗55例，治愈54例。

**用途：**胆道蛔虫。

**方剂：**大黄0.3克，木香0.5克，阿斯匹林1.5克，苯巴比妥0.12克，敌百虫0.17克。

**用法：**于腹痛间歇口服。成人每次一包；儿童量：四至六岁1/3包，七至十一岁半包，十二至十四岁2/3包。一天可服二次，以二天为限。如有必要，七天后可重复治疗。

**禁忌：**忌与碱性药物同用。本药毒性一般不重，治疗中可出现嗜睡、头昏、多汗、上腹不适。偶有恶心、呕吐、肌肉颤动，注射阿托品可缓解。胃及十二指肠溃疡，严重肝肾疾患者慎用。

**效果：**治36例，有效32例。腹痛缓解，平均天数1.3天。  
服药后第二天开始排成形、蛔虫继续排出。

## 钩 虫 病

**方剂：**苦楝皮（内皮）一两，槟榔五钱。

**加工法：**制成糖浆。

**用法：**于睡前空腹一次口服，连服二天。儿童酌减。

**效果：**治疗206例，经二次检查，第一次检查（服药后七天）阴转率32.25%，第二次（服药40天）阴转率84.72%。  
该药还有驱蛔作用。

## 丝 虫 病

**方剂：**马鞭草六钱，苏叶五钱，青蒿四钱。

**用法：**取上药茎叶洗净切碎，加水150毫升，浓缩至80毫升。分早晚饭前服（一至十岁服成人量的1/3，十一至十五岁服成人量的2/3），七至十天为一疗程。少数服药后有轻度头昏、恶心或腹痛，不须另处理。

**效果：**治疗105例，镜检微丝蚴阳性，但无明显体征的患者。分两批治疗：第一批十七人，服药一疗程，其中八人作了服药前后对照检查，全部转阴；第二批78人镜检阳性，但无明显体征，其77人，经治疗中期、末期以及重点的追踪观察，有75人转阴。

**用途：**乳糜尿。

**方剂：**爵床草二至三两，地锦草、龙泉草各二两，车前草一两半，小号野花生、狗肝菜各一两。最后二味任选一味。

**用法：**日一剂，水煎，早晚分服，连服三个月，疗程越长，复发机会越少。在尿转正常后可隔日服一剂，维持三个月。

**效果：**治100例，治愈98例，2例无效。如有复发再服仍有效。

**用途：**象皮肿。

**方剂：**1.核桃树叶二两，石打穿一两，鸡蛋三个。2.白果树叶适量（外用）。

**用法：**前二味药煮鸡蛋，蛋熟后去皮，煮蛋发黑。每晨吃鸡蛋三个，十四天为一疗程。未愈可继续服。白果树叶每天煮水熏洗二次。

**效果：**疗效70%。

## 绦 虫 病

方剂：狼牙草根。

用法：洗净去皮，晒干，粉碎制成丸或片，成人每日一副，空腹顿服50克（小儿每公斤体重一克），不用泻药。

效果：治16例，9例驱出带头节的全虫，7例驱出虫体最前端颈节，经访未复发。一般服药后有轻微恶心，无其他副作用。

## 囊 虫 病

方剂：干漆五钱（切细炒成米黄色），黄连、瓜蒌仁、羌活各三钱，大腹皮（槟榔也可）、大黄各一两，水蛭（捣烂炒成黑褐色）、雷丸、牛膝各三两，白僵蚕、白芥子、茯苓各四两，化桔仁二两，五灵脂十六两（另包）。

加工法：除五灵脂外，共研细末，取醋三斤半，将五灵脂入内，煮沸10分钟，取醋加适量蜂蜜，制成丸，每丸三钱。

用法：日三次，每次一丸。连服六至九个月，或以囊虫消失为准。有副作用时停服。

禁忌：人参。

效果：21例（包括癫痫型、脑瘤型、脑膜脑炎型、脑室型、精神障碍型等），治愈10例，1例无效，10例正在治疗中。

## 血吸虫病

用途：灭钉螺。

方剂：1. 石蒜、醉鱼草（或加闹羊花，或加烟梗）均各等分。2. 闹羊花三斤，辣蓼一斤半，烟梗、苦楝树皮各半斤。以上均煎水取汁，喷杀，每亩用200—300斤。

用途：血吸虫中、早期。

方剂：花椒（市售的）。

加工及用法：去椒目杂质，温火炒去汗，研细粉入胶囊，每粒为0.4克。成人每日5克（儿童酌减），分三次服。20—25天一疗程。

效果：132例服后症状明显改善，食欲增加，肝脾缩小，粪检有一定阴转率。

用途：血吸虫病。

方剂：千斤重（千斤坠）一至二钱（按体质强弱增减），威灵仙、槟榔、百部、火草根各三钱。

用法：水煎半小时，每次80毫升，每日三次。15天—20天一疗程。

适应症：哺乳期、年老体弱、心脏病不能作锑剂治疗的患者。

效果：治5例，其中哺乳期3例，年老体弱1例，心脏病1例。服药12天后，粪检阴性，又服五天后，再粪检为阴性。疗程结束后50天，又作粪检为阴性。

## 麻 疯 病

用途：麻疯。

方剂：蛤蟆，苍耳草（全株）。

加工及用法：哈蟆水煮取汁浓缩，去肌肉骨骼，留肝。  
苍耳草煎取汁加蜂蜜，酒精，大麦粉制丸。成人每日服哈蟆  
一只、苍耳草三两（拾两制），分二三次服，小儿酌减。服  
药二三周后可按体质及反应酌情增减。

禁忌：服药期忌食猪肉。

副作用：有恶心、呕吐、腹泻、头晕、心跳、心悸。

效果：治疗34例，自觉症状临床症及细菌改变有不同程  
度的疗效。

沁汗功能：31例中28例恢复；知觉：31例中27例恢复；  
皮损11例中3例改变；溃疡16例中4例愈合，9例缩小；末  
端循环功能：21例中19例改善；黑色素沉着：26例中16例减  
退；浅神经粗大变软：只有少数病例。细菌检查：15例中7  
例连续五次转阴。

# 外 科 疾 病

## 消 毒

用途：泡手消毒。

方剂：鲜大叶桉叶。

加工法：取叶一斤，洗净切碎，加水11升煮沸，浓缩至四升，成棕色溶液。

用法：按一般手术洗手常规，用肥皂水擦手3次，抹干后浸于上液中5分钟即可。更换时间：冬季手术，每周换1次；四月份手术，每3天换1次。

效果：外科手术217例（包括无菌、半无菌和有菌手术），除1例无菌手术感染、5例半无菌手术感染外，余未发生感染现象。妇产科及五官科手术73例，均未发现感染现象。在上液10升中加苯甲酸20克，四月间共培养3次，未发现任何细菌生长。

用途：皮肤消毒。

方剂：20%大叶桉叶溶液。

加工法：叶1公斤，水6升，煮沸半小时，约剩5升溶液即成（如有小叶桉则用1/4的小叶桉的叶同煮，效果更好）。

用法：用于针灸及皮下、肌肉和静脉注射前消毒。

效果：共3000余次，均未发现过化脓感染，故可代替酒精和新洁而灭。

## 麻 醉

用途：局部麻醉。

方剂及用法：25%九里香注射液，0.5%两面针注射液。单独或混合使用作局部浸润，也可作粘膜表面麻醉。

效果：用于阑尾切除、胃次全切除、甲状腺次全切除、脑脓肿开颅引流等手术173例，年龄最小9个月，最大72岁，均取得良好效果。一般不需术前用药，较大手术术前使用苯巴比妥钠100毫克或杜冷丁100毫克，肌肉注射0.5%两面针注射液用于鼻息肉、鼻甲手术表面麻醉，效果亦满意。优点是麻醉效高，镇痛时间长，无不良反应。缺点：1.腹部手术腹肌较紧张，故对深部手术较为困难。2.前者作用时间10—20分钟（比普鲁卡因长），后者作用时间3—6分钟，两种混合使用，可使开始作用时间缩短。

用途：表面麻醉。

方剂：生草乌、生南星、生半夏、土细辛各10克，蟾蜍、花椒各4克。

加工法：研粉，浸于70%酒精100毫升内2天即成。

用法：用时在少量浸液内加适量樟脑及薄荷脑，用小棉球蘸浸液贴于手术部位。

效果：拔牙69例，脓肿切开12例，囊肿切除2例，均在无痛下完成手术，无副作用。

## 止 痛

方剂及用法：鸭脚莲（全株）。煎剂：干品1—3钱，水

煎服；片剂：每片0.3克（相当于生药0.3钱），每次服3—4片；注射剂：每安瓿2毫升（相当于生药1.5克）。

效果：用于手术后止痛209例，181例有效，一般用药后20—30分钟见效。日口服三次，可维持24小时，肌注2毫升，可维持3—4小时。对晚期癌肿引起的疼痛效更好。

用途：止痛。

方剂：披麻草、一支蒿、洋金花各20克，麝香2克，制草乌、独定子（金铁锁）、广血竭、三七各100克，重楼150克，心不甘（万年青）、制川乌各50克，元胡索250克。

用法：研细末，成人每日2次，每次服0.5克。

效果：治外伤性疼痛、风湿性关节痛、腹痛等138例，36例止痛，102例好转。

## 烧 伤

方剂：1.虎杖根研粉，食油调涂，用于轻症。2.虎杖根浓汁调涂创面，用于重症。

效果：治1000例，效果良好。

方剂：秋葵（黄蜀葵）花，在油内浸泡两周即可应用，越久越好。外搽患处，1日多次。

效果：治1000余人，效果良好。

## 感 染

用途：疔疮、痈疽、丹毒、蜂窝组织炎等。

方剂：陈小麦（新的亦可），醋。

加工法：小麦2斤，加水3斤，浸泡3天，捣烂过滤，去渣，静止沉淀取上清液，沉淀物晒干，用小火炒，不断搅动至黄成块时，取出研成细末，过筛，装瓶备用。

用法：用适量醋将药末调成糊膏，外敷患处。敷药范围要大于病灶。未破敷肿痛处，已破敷四周，中间留一小孔排脓。

效果：治疗9516例，痊愈8230例，显效1123例，无效163例，有效率98.3%。

用途：多种感染。

方剂：枣树皮。切碎研成粉，装入胶囊。

用法：每日2—4克，分3—4次服。

效果：急性尿路感染26例，治愈14例；肠炎及细菌性痢疾150例，治愈90%；支气管炎、上感94例，治愈31例，明显好转48例；对感染疮面有收敛、消炎、止痛效果。

## 破 伤 风

方剂：红骨蓖麻根（鲜）4—8两。

用法：每日一剂，水煎分次口服。也可加用入地金牛5钱，或牛痘叶（鲜，全株）、假辣椒（鲜，全株）各2—3两。儿童剂量酌减。另推管内注射破伤风抗毒素5000—10000单位（儿童用3000—6000单位），或肌肉注射1—3万单位，一般只注射一次，轻症可以不用。为控制抽搐可使用少量冬眠药物。

效果：治161例，治愈150例。

注：蓖麻根不可久煎，加水1500毫升，煎3—4沸，整

日当茶饮。

用途：破伤风。

方剂：蝉蜕，去头足，焙干研细。

用法：成人每日3次，每次3—5钱，黄酒2两冲服。

小儿酌减。按病情需要配合西医措施，如加用镇静、抗菌素、气管切开等。

效果：32例，治愈22例，死亡1例。

用途：破伤风。

方剂：大麻皮4两。烧存性，研成细粉，分作4分。

用法：适量黄酒或白酒，加水送服。服后盖被出汗。每日2—3次。

效果：10例，治愈9例，1例正在治疗中。

## 急性乳腺炎

方剂：生半夏1—2钱，葱白2—3根。

用法：共捣烂，揉成团塞于患乳对侧鼻孔，每日2次，每次半小时。

效果：治早期患者72例，一般塞2—3次痊愈。

方剂：小草。

用法：取全草15—20株，煎水300毫升，以米酒一杯送服。

效果：30余例，均服药2—3天愈。

## 淋巴结核

方剂：狗骨常山（紫珠）根半斤。

用法：取鸡蛋3个同煮3—4小时，只服鸡蛋，一次吃光。

效果：200余例，效果良好。（适于颈淋巴结核）。

用途：淋巴结核。

方剂：痰药2—4两。

用法：鸡蛋3—5个，加红糖适量共煮，蛋熟后去皮再煮。去渣，蛋液同服，成人每日一剂，连服2天。以后每隔4日再连服2剂，一般一月可愈。

效果：治100余人，有效率98%。

## 胆道感染

方剂：柴胡1—2两，黄芩5钱至1两，大黄2—5钱。

用法：加水浓煎至400—500毫升，每日一剂，分3—4次服。重症每日2剂。

胆道梗阻、便秘和腹部胀满：重大黄，另加芒硝3钱至1两。

感染严重：加大柴胡、黄芩，还可加用蒲公英、胆草、紫草地丁。

大热大汗、大渴喜饮冷水者：加石膏、知母。

腹痛：选加广木香、青礞石（马兜铃根）、郁金、玄胡索1—2味。

恶心呕吐：选加姜半夏、陈皮、竹茹1—2味。

腹水：加泽泻、茯苓、车前草。

舌苔厚腻，食欲不振：选加苍朮、厚朴、藿香、佩兰1

—2味。

气血虚：加当归、黄芪、党参。

阴液伤者酌加北沙参、麦冬、石斛、花粉1—2味。

胆道蛔虫：加苦楝根白皮2两（约每公斤体重1克），连服2剂后宜停用。也可另加槟榔、使君子等。安蛔可加乌梅或醋。

效果：29例胆道蛔虫合并感染，效果良好。绝大多数体温均在2—4天复常，体征、症状及白细胞也相应消失或复常。

## 胆 石 症

方剂：金钱草、茵陈各1—2两，广木香3—6钱，枳壳、枳实、梔子、厚朴、大黄各3—4钱，芒硝4—6钱（后入）。

用法：水煎服，日一剂。可连服3—6剂，停3—4日再服。

合并感染，热症明显：减木香、枳、朴用量，加连翘、蒲公英、败酱草、苡仁等；疼痛显著：加川楝子、延胡索；久病体虚：加党参、黄芪。

效果：治72例，除2例自动出院外，其余临床症状均获减退，其中排出结石50例，消失者1例，排石有效率70.8%。

## 急 性 阑 尾 炎

方剂：银花、红藤、蒲公英、大青叶、败酱草各1两，

大黄、木香、冬瓜子各3钱，赤芍4钱，炒桃仁、川棟子各2钱。制成片剂，每片0.5克。

用法：日三，每次服10—15片，根据病情增减；或用上方水煎分三服，日一剂。

效果：52例，治愈49例。平均治愈时间6.8天。

方剂：春花胡枝子（鲜全草）2两。

用法：用冷开水洗净捣碎，入二次淘米水（冷开水洗米）250毫升和匀，绞汁服，每日2—3次。如有恶心加食盐2钱；大小便不通加鲜乌柏叶5钱。

效果：治12例，均痊愈。平均治愈时间3天。一般服药半小时后腹痛减轻，次日右下腹麦氏点及跳痛消失，体温及白细胞总数恢复正常。

## 脱 肛

方剂：钓鱼杆、铁马鞭（马鞭草）各1.5—3钱，刺黄连1—1.5钱。

用法：将上药洗净切片，用淘米水煮开放冷泡服，每天1剂，分3—5次服，每次30毫升。连服2—3日。

效果：治60例，小儿全部治愈，成人大多数治愈。

## 泌 尿 系 结 石

方剂：金钱草1—2两，鸡内金、木通、川牛膝、瞿麦、车前子各3钱，甘草梢3—5钱，滑石5钱，琥珀1钱半。

用法：水煎服，日一剂。如疼痛剧烈者可日服2剂。尿检红细胞增多：加生地5钱—1两。有脓球，加银花5钱。

效果：治71例，治愈69例。

方剂：鲜茅莓根4两，洗净切片，加米酒4两，水适量，煮1小时，取汁。

用法：日一剂，分2次服，服至排出结石或症状消失止。

效果：治10例，4例排出结石，6例服药4—8剂后症状完全解除。

## 血栓闭塞性脉管炎

方剂：金钱白花蛇一条，蟾蜍一个（红眼、腹部带花纹的），银花3两，牛膝2两，附子1两，65°白酒3斤。

加工法：将药、酒装入罐内，盖严，隔水炖1—1.5小时，凉后过滤，取液。

用法：第1、2天各服1次，大醉为止；第3天开始每天服2次，每次50—100毫升（依体质强弱及嗜酒量酌情增减），连服至痊愈。

效果：治53例（其中Ⅰ期4，Ⅱ期24，Ⅲ期25）结果近期治愈34例，显效14例，好转4例，无效1例。

方剂：内服：毛披树根3两，煨猪脚1只食，每日1次。

外用：毛披树根3两，煎水浸泡伤口，每日1—2次。泡后外敷生肌膏。

效果：治44例，愈29例，好转5例，另10例正在治疗中。

附注：生肌膏：硼酸粉625克，氧化锌1500克，黄丹217克，梅片250克，石炭酸300毫升，凡士林37500克。

## 断指再植

用途：断指。

方剂及制法：内撒药：轻粉、红粉、炉甘石、水银、煅龙骨、煅石膏各等分，冰片、枯矾减半。共研细。

外敷药：接骨丹（接骨木）根皮、懒泥巴树根皮、红刺老包（楤木）根皮、臭黄金条（陆英）全草、玄参全草、白三七（峨三七）、透骨消（连钱草）全草，除白三七外，均为等量（白三七为单位药量的1/6）。晒干，研细均匀，加凡士林调匀。

用法：断指不用酒精消毒，不沾盐水和油类。清创后撒内撒药于断面，复位，将外敷药膏摊在纱布上包扎伤处，小夹板固定。热天每1—2日、冷天3—5日一换药。

效果：13例均获成功。一般三周左右愈。

## 骨折

方剂：毛冬青5分，青棉花藤、香花崖豆藤、桑白皮各2两，糯米饭一两。

用法：骨折整复后，将药用烧拌匀外敷，1小时后下端有热感时去药。敷药后大部分病例有肿胀，无须处理，6—7天后自消。

效果：治愈400多例。

**方剂：**接骨方：大茶药（鲜叶）7钱至1两，爬篱蛤蚧2—3两（另捣碎），五味子、香附子、五爪金龙叶（干品5钱）各1两。捣烂加米酒和匀，蒸15—20分钟。骨折复位后，小夹板固定，在夹板外敷药。外敷药中间放爬篱蛤蚧，外敷1小时左右，除去外敷药。本药不可接触伤口，不能内服。

**止痛方：**用上药汁搽痛处上。禁忌同上。

**消肿方：**火炭母叶、崩大碗（积雪草）叶、（或加桃树叶）、犁头草各等量。以上鲜药捣烂加米酒少许调匀，锅内加温，置夹板外外敷，如1—2天仍肿不退，可换药再敷。

**骨痴形成方：**松树二层皮（内皮）4—5两，辣蓼、韭菜头（或石蒜1—1.5两）各2两。以上鲜药捣烂，加米酒少许调匀，夹板外敷患处，每日1次，共3—7次。用消肿方后再用此方。

**效果：**治37例，骨痴形成最快者2—3天，慢者7天。

## 骨 髓 炎

**用途：**化脓性骨髓炎。

**方剂：**韩信草、三桠虎、雾水葛、鸡骨香、犁头草、闹羊花、入地金牛根、无爷藤各等量。共研细末，用蜜加水煮沸，调成糊状。

**用法：**清洗伤，插引流，用上药敷伤口。小夹板固定，配合内服清热解毒，托里排脓等中药。

**效果：**治13例，愈11例，好转2例。

**用途：**慢性骨髓炎。

方剂：野葡萄根。去粗皮和心，取二层皮捣烂，一斤皮配鸡蛋清4个，麻油1两，95%酒精或白酒半两，调匀放瓶中。

用法：每日一次，外敷患处。

效果：治16例，愈10例，另6例在治疗中，一般敷药后4—5天后溃口逐渐缩小，月后创口愈合。

## 骨、关节结核

方剂：青小布（萝摩）干根1—1.5两，加水1000毫升，文火煎6—8小时，浓缩至300毫升，去渣，服时加酒适量，一次服（能饮酒者加1—2两）。药渣同上法再煎一次。3个月一疗程，可连服2—3疗程。小儿酌减。

效果：治15例：腰椎结核6例，胸椎结核2例，颈椎结核1例，髋关节结核5例，骶髂关节结核1例。均未用其它抗痨药物，经治有12例瘘管闭合，病灶稳定，体征消失，恢复劳动，1例显效，2例好转。一般服药，一周后由瘘管排出大量脓液及干骨样坏死组织，继续服浓液渐稀，饮食改善，体重增加，服药3—6个月后，瘘管多能愈合，最后症状消失。

# 计划生育、妇产科疾病

## 计 划 生 育

用途：避孕。

方剂：马蔺子，研末。

加工：药末50克加水500毫升，煎30分钟左右，加黄酒250毫升，再煎10分钟。分6份。

用法：分娩后1~3天或月经来后第1天起服用，每天早晚各服1次，汤渣一起服，3天服光。服药后15天不同房。以同法，每半年服1次。

效果：观察25例，有效24例，无效1例。观长观察时间6个月。

用途：避孕。

方剂：不孕子（黄麻子）8钱~1两，糯米酒6两~半斤。将成熟的种子和酒放碗内，燉1小时以上。

用法：月经来后五天晚上睡前顿服，第2个月在同时服1次（或在产后满月服1次，第2个月同时再服1次）。少數服药后呕吐者，可将一次量于次日分2次补服，即中午和晚上各服1次，以避免呕吐。服药期间，尚须用其它方法避孕1个月左右。

效果：观察7例，有效6例，另1例因服不成熟种子而失败。另400例，观察2~5个月，未发现怀孕的。

## 引 产

方剂：乌不企（楤木）。取鲜根洗净后，切成10厘米长（相当孕妇中指等长）一段，象筷子一样粗，轻轻刮去外皮，两端削成钝圆，经高压（15磅15分钟）或用75%酒精浸10~30分钟消毒，取出拭干，用时消毒宫颈管后，插入孕妇子宫腔内，宫外只留1厘米长，阴道口塞纱布，防止草滑出，一直放到胎儿及胎盘完整排出为止。

效果：24例，全部成功。放药后大多有发冷、发热，胎儿胎盘排出即消失。一般6~24时引产成功。妊娠12周以下者效果不满意。

## 绝 育

方剂：棕榈根2两。干根切碎，加水4碗煎至1碗。

用法：男服加猪小肠2~4两与药同煎，随时服用。女服加猪大肠2~4两与药同煎，在月经将净时服，1次即可，但多服二次效果更好。

效果：1310例，效果较好。能否达到永久绝育，尚待继续试验。

## 妇 产 科 疾 病

### 白 带

用途：白带多、腰痛。

方剂：鸡血藤 1 两，金樱根、千斤拔、藤杜仲、旱莲草各 5 钱。必要时加党参 5 钱。

用法：每天 1 剂，二次分服，连服 3 ~ 5 剂。

效果：治 50 例，治愈 40 例。

### 外 阴 炎

方剂：煅蛤粉 1 钱，漳丹 1 钱 4 分，冰片 4 分。研细末，用液体石蜡和成膏。

用法：用 1:1000 新洁尔灭清洗患部后，将药涂上，表面盖上纱布，每天涂 2 次。

效果：800 余例，效果满意。

### 阴 道 炎

方剂：樱桃树叶（或桃叶）1 斤。

用法：煎水坐浴，同时用棉球沾水塞入阴道内，每日 1 次，半月即愈。

效果：40例，效果显著，其中5例治前查有滴虫，治后滴虫消失。

## 宫 颈 糜 烂

方剂：没药、乳香、儿茶、铜绿各5钱，漳丹3钱，轻粉2钱，冰片1钱。研细末，用液体石蜡调成膏。

用法：用1:1000新洁尔灭棉球消毒后涂药(带线棉球)6小时取出，每天1次。

疗效：一般用药不超过5次治愈。

## 盆腔炎、附件炎

方剂：1.白花蛇舌草1两5钱，入地金牛2钱。2.白花蛇舌草1两5钱，穿破石5钱，入地金牛三钱。

用法：日一剂，每次一剂，水煎服。

效果：77例，治愈73例，无效4例。

## 功 能 性 子 宫 出 血

方剂：小柿子5钱，铁藤(豆草巴豆藤)、大和红(山皮条)、大树杨梅(毛杨梅)各4钱，炮姜3钱，红糖2钱。若倒经加白茅根5钱。

## 子 宫 脱 垂

方剂：黑鱼头(白前)、土牛膝、山药、毛木香、桔

梗、沙参、花粉各1两，铁菱角2两、山茄、土大黄各5钱。

用法：每日1剂，水煎服。连服2日。

效果：41例，治愈38例，有效率93%。

## 妊娠呕吐

方剂：葫芦茶（干）1两。

用法：水煎分三服。

效果：140例，均有较好疗效。

## 产后宫缩痛

方剂：青凡木（干）5钱。

用法：加水500毫升，煎至100~150毫升，去渣顿服。

效果：132例，除2例无效，3例用后疼痛减轻外，其余均于服药30分钟后显著见效，痛即止。

用途：宫缩无力产后流血。

方剂：卷柏（全草）洗净晒干。

用法：每次5钱，开水浸泡后一次服。

效果：9例均有效。

# 肿 瘤

## 良 性 肿 瘤

### 血管瘤、脂肪瘤

方剂：鲜山茨菇磨于三花酒中。

用法：外涂，每天3—4次。

效果：一外敷，半月后肿物消失。

### 甲 状 腺 瘤

方剂：疗子草适量。

用法：捣烂，加隔夜粥和匀。敷患处，每晚一次。

效果：一外敷7次，半月后痊愈，迄今未复发。

用途：乳房纤维瘤、多发性神经纤维瘤。

方剂：半枝莲、六耳棱、野菊花各1两。水煎服。

效果：一服此3剂疼痛减轻，肿物缩小。继服加兰花柴胡、细金不换各5钱，共20余剂，肿物消失。

## 恶性肿瘤

### 脑瘤

用途：颅内肿瘤。

方剂：鲜金剪刀根适量。洗净，放小量食盐捣烂。

用法：敷患处，24—36小时取下，局部皮肤起泡，用针挑破。一般敷一次。

效果：一敷后疼痛、抽搐即止，神志清醒，一月后恢复正常，4个月后上学。随访患儿，智力、言语、活动均正常。

### 鼻咽癌、上颌窦癌

用途：鼻咽癌。

方剂：石上柏（深绿卷柏）。

用法：干1—2两（鲜加倍），加瘦猪肉1—2两，清水6—8碗，煎至一碗半，分2次服。每天1剂。15—20天为一疗程。药量酌情增减。

效果：一用其它药无效，服此一斤多后，肿物消失。

### 肺癌

方剂：1.并头草（狭叶韩信草）1斤，槐木1斤。分60

包。2. 紫河车、熟地、生地、茯苓、泽兰、猪苓、紫贝齿、首乌、花龙骨各4钱，当归、白芍、女贞子、公丁香、白术、神曲、麦芽、山楂、鸡内金、阿胶、生玳瑁末、生芦荟各3钱，牡蛎1两，川贝、麦冬各5钱，余粮石1两，砂仁2钱，朱砂、琥珀、甘草各1钱，人参2钱。

用法：水煎服。上2方服7剂调换。

效果：一左周围性肺癌，服药62包，X光复查阴影消失，病人已参加工作。

## 食道癌

方剂：板兰根、猫眼草各1两，人工牛黄2钱，硇砂1钱，威灵仙2两，制南星3钱，制成浸膏干粉。

用法：每日4次，每次4分。

效果：近期治愈33例，好转53例，稳定180例，恶化及死亡34例。

## 胃癌

方剂：向日杆刮去外皮，取内白心。

用法：每日1—2钱，煎水当茶饮。

效果：一胃癌伴广泛转移，服方一年，自觉症状消失，饮食好转。钡餐检查，胃及十二指肠无器质性病变。

方剂：藤梨根4两，水杨梅根3两，蛇葡萄根、并头草各1两，白茅根、凤尾草、半边莲各5钱。水煎服。

忌：酸、辣、生冷、鱼腥。

效果：一服此3个月，肿物逐渐消失，后复查时已无肿物。

## 肝 癌

方剂：天性草根、野芥菜根各3—4两。

用法：分别水煎，去渣后加白糖适量。上午服天性草，下午服野芥菜。

效果：一服此方半年，病情明显好转，随访五年健在。

## 胰 腺 癌

方剂：佛甲草2—4两，芥菜3—6两（为鲜品量，干品减半），水煎服。早晚分服，或二药分上下午煎服。2—3周一疗程。若有效更长期服。

效果：一因病情恶化而出院后，以芥菜为主，配合佛甲草、银花、车前草、鱼腥草、淡竹叶煎服，疼痛完全消失。复查时见左上腹仍有一边缘不清的肿物，轻度触痛，胃外无压迫征，但有粘连痕迹。体重增加40斤，能做家务劳动。

## 皮 肤 癌

方剂：农吉莉。

用法：1. 外用：将全草制成粉剂，高压消毒后，用生理盐水调成糊状或将粉撒于创面（亦可用鲜草捣糊状外敷，每日换药2—3次）。

2. 流浸膏：涂入创口。
3. 片剂及栓剂：服或置于阴道内。
4. 注射剂：肌注。

效果：一左颧病灶 $4 \times 5$ 厘米，深3—4厘米，上颌窦暴露并穿通腮腺。经用药3个月，病灶渐小，只留下1.5厘米表浅创面。连续3次活体组织检查已找不到癌细胞。

## 乳 腺 癌

方剂：藤梨根、野葡萄根各1两，八角金盘、生南星各1钱。水煎服，日1剂。

效果：一右乳小肿物15年，服此方2个月，肿块消失，病情好转，能从事家务劳动。

## 宫 颈 癌

方剂：山豆根、脐带、贯众、黄柏各1两，白花蛇舌草2两。

用法：将上药制成浸膏，干后研粉，每服1钱，每天3次。

效果：一鳞状上皮癌，服此5个月，症状消失。经查，病灶消失。随访三年，无复发现象。

## 慢性粒细性白血病

方剂：洗碗叶根。

用法：成人3—6钱，每日3次，水煎服。

效果：服上药25天后，白细胞由44000/立方毫米降至9250/立方毫米，幼稚细胞由25%降至2%，脾大由肋下7厘米缩小至4.5厘米。

# 皮肤、五官、口腔疾病

## 皮 肤

用途：脓疮疮（黄水疮）。

方剂：星星草一把。

用法：将花炒黑存性，研细，用香油调成糊状，搽患处。每日一次，连搽三五次。

效果：52例，治愈32例，18例好转，2例无效。

用途：头癣。

方剂：及己3两，羊蹄根1两，百部1斤，研细末。

用法：麻油调涂患处。用前先将头发、头癣剃光，温开水洗净。每天1—2次，连续10天（为一疗程）。

疗效：5例均治愈。

用途：手、脚癣。

方剂：野生地叶（狗奶棵）适量。

用法：取鲜叶洗净，直接在患处揉搓，或捣烂取汁涂患处。每日2次，连用5天。

用途：湿疹。

方剂：大飞扬2斤，青凡木4斤，毛麝香半斤，水45000毫升，煎成15000毫升。按湿疹部位及范围用热水坐浴、湿敷或外涂。有感染者加穿心莲，每次2片，每日3次。

效果：治急性湿疹5例，慢性湿疹42例，阴囊湿疹12

例，皆治愈。

用途：荨麻疹。

方剂：狗仔花。

用法：取鲜叶捣烂，加适量水外搽。

效果：9例皆治愈。

用途：水田皮炎。

方剂：雄黄、大枫子各1两，梅片2分（或樟脑粉2分），熟石灰粉5钱。研为细末。

用法：用青凡木或苦楝树皮、或刺苋菜捣烂泡开水洗患处，后撒上药。

效果：1000多人次，轻者1天，重者3—4天愈。

用途：神经性皮炎。

方剂：黄蚂蚁适量。活去头。

用法：挤内脏浆汁涂患处，6—8天1次。涂4—6小时后，皮肤有刺激性疼痛，出红、热，形成片状血疹性皮炎，再敷碘胺软膏，2—3天结痂，瘙痒消失，4—5天脱痂，皮肤光滑痊愈。

用途：牛皮癣、顽癣。

方剂：鸡尾木500克。

用法：浸于95%酒精1000毫升中，24小时后过滤。滤液涂患处，每日一次。

效果：100例，对牛皮癣疗效显著，多在3—5天见效。对顽癣也有良好效果。

方剂：破胶鞋灰。

用法：先用茶叶水洗净创面，将胶鞋灰用棉子油或菜油适量调成糊状，涂患处。

效果：36例，治愈35例。一般15—30天可愈。

## 眼 科 疾 病

用途：急性结膜炎。

方剂：小田基黄（全草）1—2两。

用法：煎水熏洗，每日3次。

效果：58例，治愈57例。

用途：角膜白斑。

方剂：细叶鼠曲草1钱，加水100毫升浸泡，隔水蒸沸30分钟，过滤备用。

用法：新患：每小时2次，每次3滴；陈旧性：每小时4次，每次3滴。

效果：20例，愈8例，显效8例，3例未坚持，1例无效。

用途：夜盲症。

方剂：鸡眼草3—4钱。

用法：炒黄研末，拌猪肝炖服。

效果：394例，一般服用1—3剂愈。

## 耳 鼻 咽 喉 疾 病

用途：化脓性中耳炎。

方剂：精制枯凡粉1两，冰片1钱，麝香3分。研为细末。

用法：洗净耳道脓液，撒粉入耳内。脓多者，每日一

换，少者隔日一换。

用途：急性扁桃体炎。

方剂：鲜威灵仙全草（或单用茎叶）2两（干品1两）。

用法：洗净，煎汤内服，每日一剂，或煎作茶饮。

效果：247例，有效率90%。

用途：咽炎。

方剂：地苦胆2钱。

用法：泡入热开水中30分钟，每天服一剂，或制片剂含服。

效果：100例，有效率95%。

## 口腔疾病

用途：口腔炎（包括：走马牙疳、口疮、齿龈炎、小儿鹅口疮）。

方剂：雀不踏（松木）虫1—3个，冰片少许，瓦上焙干细，再同冰片研细。

用法：用盐水或淘米水漱口后，再将药粉吹入患处。每天2—3次。

效果：647例，效良好，一般用药1—3天，撒药4—6次愈。

用途：牙痛。

方剂：小关门（全草）。搓成小球形，置杯内滴茶油3—4滴，蒸熟，冷后包好。

用法：每日放鼻嗅几次，每次2分钟。

效果：龋齿116例，疗效较好。

用途：牙周炎、牙髓炎、牙槽脓肿。

方剂：马鞭草 1两，切碎晒干。

用法：水煎服，每日一剂。

效果：治14例，效果良好。

---

本资料印5,000份，请各专州、市、县科技局（组）转发。

有关单位和领导。