

本草綱目

下冊

圖像本草卷之四

新安陳嘉謨廷玉纂輯

門生

欽色葉禁

乾侍

校刊

潭陽後學劉孔敦

若樸增補

木部

「桂」味甘辛氣大熱浮也陽中之陽也有小毒採皮宜冬至同餌忌生葱收必陰乾勿見用旋咀片餘剝潤密紙重

天日用旋咀片餘剝潤密紙重勿見

裹犯風元辛氣泄揚種類多般地產各處「箇桂」正圓無骨形竹生交趾桂林「牡桂」匾廣薄皮產南海山

谷「官桂」品極高而堪克進貢却出觀賓州名屬廣東一說世人以觀字筆畫多懈書之「木桂」皮極厚而

向理値虛乃發往鑄「筒桂」因皮嫩如筒卷末「板桂」謂皮老若板坦平「柳桂」條至軟枝梢「肉桂」

指至厚脂肉「桂枝」枝梗小條非身幹龐厚之處「桂心」近木黃肉但去外甲錯殼皮品分既明欺罔難入

又名主治亦湏詳知箇桂筒桂相同一說箇字近似人誤書之習以成俗也養精神和顏色耐寒牡桂桂板一類堅骨節通血脉墮

胎四者性并辛溫難作風寒正治柳桂桂枝味淡能治上焦頭目兼橫行手臂調榮血和肌表止煩出汗疏邪散

風經云氣薄則發泄是也肉桂木桂性烈堪療下焦寒冷併秋冬腹疼泄黃豚利水道溫筋緩臟破血通經經云

氣厚則发热是也桂心美之之義性署守治多在中官桂貴之之醉味甚辛治宜解表如此之異蓋緣本乎天者
親上本乎地者親下理之自然性分所不可移也然柳桂桂枝入足太陽之腑桂心入心在乎少經之經本經註

云桂有小毒亦從類化與黃芩並連為使小毒何施與烏頭附子為使全得熱性與人參麥門冬甘草同用能調中益氣實衛護榮與柴胡紫石英乾地黃同用却主吐逆與巴豆硇砂乾漆穿山甲水蛭蟲如此有毒之類同用則小毒化為大毒矣春夏禁服秋冬宜用

誤按諸桂所治不同無非各因其材而致用也然本經謂桂止煩出汗仲景治傷寒乃云無汗不得服桂枝又云汗過多者桂枝甘草湯是又用其開汗何特反其經義耶抑一藥而二用耶噫此正所謂殊途而合轍也蓋桂善通血脉本經言桂止煩出汗者非桂能開腠理而發出汗也以之調其榮血則衛氣自和邪無客地遂自汗出而解矣仲景言汗多用桂枝者亦非桂枝能開腠理而止住汗也以之調和榮衛則邪從汗出邪去而汗自止矣昧者不解出汗止汗之意凡病傷寒便用桂枝湯幸遇太陽傷風自汗者固獲奇効倘係太陽傷寒無汗者而亦用之為害豈淺淺乎猶有謂仲景之治表虛而一概用斂滌汗者此又大失經旨矣

名〔桂〕味甘辛氣平無毒近道俱有乾州屬四獨佳屋邊者為宜塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以醇酒浸躁

日漬數日即成酒味濃濃亦可作藥酒

又多大樹根莖皆有桂葉三枚淡水常燒桂枝

牡

桂根莖亦可作藥酒

桂

又多大樹根莖皆有桂葉三枚淡水常燒桂枝

桂

又多大樹根莖皆有桂葉三枚淡水常燒桂枝

桂

又多大樹根莖皆有桂葉三枚淡水常燒桂枝

桂




(柏實)味甘辛氣平無毒近道俱有乾州屬四獨佳屋邊者為宜塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以醇酒浸躁
乾次取黃精汁和煮熟筋連搘盡汁纔休研細成霜入刮方効畏羊齒麵諸石

年根莖花神使牡犧瓜子桂皮膾耳目却風寒濕痺止渴益氣血去煥煥虛損歛汗治腎冷腰冷併膀胱冷膿宿水潤滑燥體燥及面頰燥澀


不光興陽道殺酒邪止驚悸安五臟頭風眩痛亦可煎調久服不饑增壽耐老○人側柏葉一若滋潤者根

收務向月令建方
春採東夏採
南秋冬做此緩得節候生氣即止吐衄崩潰重生髮鬢鬚眉為燥溼仙丹係補陰要藥若合黃連煎服小兒蟲癆立痊〔白皮〕燒灰敷火灼爛瘡長毛髮亦驗
〔枝節〕釀酒主歷節風痺癥瘍疥尤靈
凡患癩瘍及牛馬畜產有疥並燒敷二三次無不愈
齊瘡

乾州柏實



密州柏側



〔黃藥皮〕味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒樹高蜀產皮宜夏收擇內黃堅厚為優去外褐兼造纏繫先瀝蜜水

日際曝乾

大邊炎燥惡乾漆治三焦二製則治上焦單製則治中焦不製則治下焦也乃是少陰本草

即二

妙散

俾下焦

濕熱散

行腫脹易退佐澤潤

利小便赤澁配細辛擦舌頭紅瘡冰片少許擦之亦効安虛喘嗽蟲鴟伏龍火解消渴除骨蒸補腎強陰洗肝

明目腸風連下血者立効熱病先見血者殊功去臍腹內溼瘡逐膀胱中結熱女人帶漏亦可治之○〔根〕

名〔檀桓〕如冷結塊瘻心腹百病主長生神仙不渴不餓安魂安魄

謨內經云腎苦燥故肾傳濕也活人解毒湯用黃藥黃連黃芩梔子孟梔子黃連入肺黃連入心黃藥入腎

燥濕所歸各隨其類而然也上下内外並可治之積熱門中誠為要藥至令醫家氣虛用四君子血虛用四物

有疾用二陳有熱用解毒故備宗述而不易焉

黃藥



商州黃藥



「精實」味甘氣寒無毒近道雖有榮陽屬河獨多無產廢田又名穀實葉類蒲萄作辦實如彈子結蓬初生綠青漸熟紅赤待深秋採搗浸水以去皮瓢取中子曝乾投酒再浸晝夜務蒸後已至亥任用煎膏為九陰瘦能強水腫可退克肌膚助腰膝益氣力補虛勞悅顏色輕身壯筋骨明目「葉」主小兒身熱食下便生肌「皮」煎逐水利便浸爛又可作紙「莖」煮淨洗癰瘡立效「皮」剉白汁「薦」收塗癬更敷蛇咬○「紙」燒存性調酒汁亦止血暈血崩剪「有印紙」燒吞

衙門中有斷婦人產如神妙此藥奇效又曰本草綱目卷之八

读

按楮有二種名亦不同葉有瓣者曰楮葉無瓣曰構
皮一說皮斑者楮皮白者構多生久廢穀田結實味甘
又因名曰穀實也詩云夏有樹檀其下維穀是爾即今幽州猶云穀梁荆揚文廣咸謂之構每逢秋月剝取其
皮或織為履穿或搗作紙索色甚光澤媒利無涯所入醫方惟貴其實赤者頗服不耗不飢筋力倍增行及奔
馬並載經註決無欺人奈何沫補葉中用者稀少惜哉惜哉

穀實

穀實

穀實

穀實


穀實

穀實

穀實

穀實

楮實



「淡竹葉」味甘淡氣平寒陰中微陽無毒竹類頗多難拘何是惟嘗笋味淡者為然筀竹雷竹水竹味淡兼甜治病

第一筀竹筍竹味皆純淡採用亦宜苦竹紫竹苦辣而羶不堪入藥東坡蘓公云淡竹者對苦竹為文除苦竹之外皆淡竹也此觀之足可徵矣逐上氣欬喘促虛熱煩躁不眠專涼心經尤却風瘡一種草類如鐵線葦似竹葉俗多採剥小水一根止消渴散毒補虛一實一通神明輕身益氣一皮茹一削去青色惟取向裏黃皮主治喉痺等證並神効

胃熱飢延殊功療噎膈呴噦神効。○「敗船茹」原亦竹皮刮下大幅幅用程漏處極多取乾煮之亦止諸血
○燒取「竹瀝」與荆漆同搗搣藏天餘直劈作數塊兩磚架起緊火中烘瀝後兩頭流出少加薑汁調服一杯
加生薑白
然汁二匙却陰虛發熱理中氣噤牙小兒天吊驚癇入口便定婦人胎產回暉下咽即甦術義云胎前不損子產
後不得虛止驚悸却痰涎疾在手足四肢非此不達疾在皮裏膜外有此可破但世俗反以大寒置疑不用殊不知保大燬出又佐薑汁有何害乎。○「竹肉」狀如肉瘤無生苦竹枝上鳴彈般大生啖毒多戰人喉顫未紅且令爪甲變黑須及計清鍊三度然後依常菜食之殺三蟲破老血別有功效人未盡知。○「竹筍」惟盛夏間收類麻角色白係慈竹道兩沫潤無滴汁着地發生同薑背煮嘗湧赤白治驗。○節內黃粉即「天竺黃」
俗云天竺
國生非也旋飛塵沙結成走竹間或可得形類黃土一名竹膏治小兒急慢驚抽癇肥人卒暴風中鎮心明目解熱去邪。○「竹笋」發氣托瘡瘍更止消渴利小水。○「桃竹笋」苦有毒嫩竹不成竹者傳謂硬笋是也用搗成膏六畜皮肉生蛆納入盡出及汁煮纔可食不爾亦戰人喉。更有「仙人杖」味鹹是笋成竹時立死色黑如漆收宜夏初惟苦筀竹多生專主嘔氣嘔逆大人翻胃反食以水煮嘗小兒驚癇夜啼安身伴睡痔漏去血燒末湯吞。○「舊說齒」亦載醫方治活蟲入腹為病狀如癰癰煮服即除

○一 淡竹葉

宜取嫩者蒸熟食之。性平，味甘，無毒。



〔松脂〕味苦甘氣溫無毒。署天下植養州土不拘大水中流未漂清

松脂便易採取。媒利鑿多竅可逐食心鍊餌延年待自沉易奏捷妙。擇通明成顆分向背陰陽向南日月照者為陽脂；向北日月背者為陰脂。陽脂補陽，陰脂補陰。他經亦云：「不見日月者皆可取服。」以人多陰虛，欲其專補陰爾。製練有方，依式無錯。水盛釜內，敵安水

亨白茅藉甌底，兩層黃沙蓋茅上寸許。松脂任布桑柴，緊炊湯減少旋添脂沉盡，方出新瓦，萬掠投冷水，況釜底候凝結復壯。如前週果三迴色白如玉研和辟藥加白荻苓柏子仁甘草，共剉亦可單服。為丸酒吞逐諸風，安五臟除伏熱，胃脫解消渴，咽喉通神，延年耐老。敷膏貼瘡毒，長肉作散治瘻癰殺蟲。〔寶〕主少氣虛羸，兼敗風，脾火花一維，輕身益氣發熱上焦。〔蕘〕花底收晒乾研末，羅細鵝清、鳴彈丸或豆粒，暑痢止瀉如神。〔根白皮〕主辟穀不飢，補虛損，勞乏一節。性溫燥，血中之溫却脚痺軟，〔葉〕味苦溫，能生毛髮，搗爛敷風濕瘡，効驗。桂辟瘞，疫氣。

靈厯節諸風漬酒可服。〔松蘿〕一名女蘿。詩云葛蘿女蘿施于松上。陶云苦甘無毒而濃可作吐湯。湧客疾哉溫瘡利水道。敗頭風掃頂上瘡痕去。項間瘤癰塗汗堪止。嗔起皺消。

第一卷百病林妙齡目次

毒蘿中久鮮松蘿以散附身之

多大翳根連枝又曰松苔苔子


天外香松脂

脂

大風子木之酸多生故木同名

松脂松脂生水色黑不黑

如口鼻皆有



〔茯苓〕味甘淡氣平屬金降也。陽中陰也。無毒。近道俱有雲貴。

雲南獨佳產深山谷中在枯松根底由木被斧斤砍

伐或老遭風雷折摧枝葉不復生。津氣旋向下泄凝結成塊乃名茯苓。因其本体相離故取附之之義。小如鵝

卵大若瓠瓜猶類龜鼈人形並高沉重結實。

四五斤

塊者愈佳。久藏油有無柄蛀初微採須以陰咀片冰煎黑皮淨削

忌酸物恐白歛仍畏牡蠣地榆雄黃秦艽皂甲種赤白主治略異經上下行走自殊。〔赤茯苓〕入心脾小腸屬

己丙丁鴻利專主「茯苓」入膀胱腎肺屬辛壬癸補益兼能甘以助陽消而利竅通便不妄精氣功並卑前利血惟在腰膝効同白朮為除湿行水聖藥乃養神益智仙丹生津液緩脾除痰火通肺和魂鍊魄開胃厚腸却驚痼安胎孕久服耐老延年不飢渴汗多陰虛者誤煎傷元夭壽若小便不利者過服助燥損明暴病有餘相宜久病不足切禁凡須細察不可妄投。「茯神」附結本根因津泄少謂既不離其本故此為名体比苓略鬆皮與木潤去所忌畏患惡做於前專理心經善補心氣止恍惚驚悸除恚怒健忘心木名「黃松節」載經偏風致口渴僻治驗

謨按經註有曰松木既撫根尚能生物者何也蓋因精英未淪沾其土氣不能不為物爾正猶馬勃菌蕈五芝木耳石耳之類多生枯木潤石糞土之上則可知焉其上莖絲下有茯苓之說甚為輕信者矣又曰茯苓為在天之陽陽雷上行何謂利水而瀉下也經云氣薄者陽中之陰所以茯苓利水瀉下亦不離乎陽之本體故入手足太陽經馬丹溪又曰茯苓猪苓澤瀉各有行水之能久服損人八味丸用之亦不過接引諸藥歸就腎經去胞中久積陳垢以為搬運之功也

第一卷白朮款後 謨按宜參看

蘇子全集卷之三十一

生型竹枝苓



〔琥珀〕味甘氣平屬金陽也。與松脂所化入土千歲變成初如桃膠久漸堅硬而或多產色淡澈光澤亦
生色深重濁。嵌首飾澈光為奇手摩熱可拾草芥湯煮軟微若錫糖遇物即粘如是方妙今市家多煮雞彈及青
魚枕造成不可不細詳爾入藥研末用湯調吞利水道通五淋定魂魄安五臟破癥結除血瘕鬼魅精邪止血生
肌明目摩督治產後血暈及兒枕痛療延年金瘡併胃脘痛○又種〔瑩〕者名異產同狀似玄玉而輕質亦
松脂化出歷二千載方得成形安神補心益佳生肌破血尤善不堪造器見風即開小兒帶之謂能辟惡

誤按丹溪云古方琥珀利小便以燥脾土有功益脾能運化肺得下降故小便可通也若血少而小便不利者
用之及致燥急之患不可不謹別說又云茯苓琥珀皆自松公而所稟各異茯苓生成俱陰琥珀生於陽而成
於陰故皆治榮而安心利水其効同也

墨」味辛無毒擇係松煙造成摩入藥治煙細繞勿煙嚴不靈其桐油煙石油煙併粟草灰燒為者俱不可以治病也止血果捷因黑勝紅故天行熱毒鼻衄下血敷竹水摩滴入若產後血暈崩中卒暴來紅摩醋服之遊絲纏眼中摩雞血速點客忤中腹內摩地漿頓吞下死胎而逐胎衣合金瘡以生膚肉

槐實「味苦辛鹹氣寒無毒折枝插地即活人家多植門庭實生莢中十月收採粒大如豆色紫而堅一莢兩粒三粒者為良若係單粒五粒者勿用小銅鑄擊碎烏牛乳浸宵蒸過纔煎服天為使主五內邪熱去五痔腫疼七月取搗紋汁貯銅器內置高處曝二十日以上

煎稠硬圓如棗大納穀道內三易之乃愈止涎唾補絕傷涼大腸消乳癥除男子陰瘡湿瘡不歇却女人產戶

痛瘡難當仍理火瘡且墮胎孕酒吞七粒催生尤良「嫩房芙蓉」收煎代茶去頭風明目補腦「老芙蓉」疏導風

熱亦可取搗煎膏「白皮」煮酒治風虛嘔不仁服効消陰疝卵腫却壯熱驚痛「莖葉」功同忍治瘡毒熬膏


貼癰瘍潰爛煮汁漱口齒風疳「根」作神燭可燒仍主喉癰寒熱「枝」洗瘡住瘻蟬齒殺蟲「花」味甚

苦妙黃亦涼大腸去熱理腸風泻及皮膚風止瘡瘻未紅併赤白痢去胃脘卒痛殺腹臍蛔蟲「膠」主諸風

化涎任作湯散丸服却風脾肢難舉動散風毒身如蟲行噤口急風殊功破腦傷風立効「槐耳」係菌亦樹所

生堅如柔耳者良用作細末酒服去婦人陰中瘡瘻治疗瘻穀道水流

魏
寶



枳實味苦酸氣寒味薄氣厚陰也陰中微陽與薑同屬商州藥

兩屬

近道亦生一
種俗呼臭獨

寶一味苦酸氣寒味薄氣厚陰也陰中微陽興盡高州南所生似橘極小擇如鵝眼色黑陳者良近道亦生一種名呼臭橘其皮微綠不堪藥用今市家多株植為綠衣者欺世媒利無益有損故凡人藥剗必求黑色為真也剗淨內瓢剉片炒用本與枳殼一物因收遠近異名枳實秋收枳殼冬採令醫者不以此泥惟視瘦厚小者為實完大者為殼也殼大則性詳而緩治高滿者主氣治在胸膈實小則性酷而速治下下者主血治在心腹故胸中痞肺氣結也有桔梗枳殼湯之圓心下痞脾血積也有白朮枳實湯之用白朮補脾枳實去脾經積血脾無積血則不痞也此高下緩急之分易失詳定以為準的也除脹滿消宿食削堅積化調疾墻之棟「樹皮」治風中身直久不能屈伸「根皮」主痔瘡赤紅及腸風臘毒「樹莖」併「皮」收採水脹風痛癆破○其大枳殼亦貴陳年取翻肚如盤口唇製剉剉剉片炒鴻肺臘寬大腸結氣胸中兩脇脹脹者

急服發癥肌表遍身苦癢者宜加適水飲停齒閏節並利破癰癩積聚宿食亦推同甘草瘦胎散即枳殼丸能損至萬之氣不宜接連服多靈怯勞傷

第七卷青橘皮款後誤按宜參看



女貞實即冬青

樹子味苦甘氣平無毒鄉落幽居多植遮護能欺霜雪又名冬青黑寶遇冬至採收衣皮將布袋接淨酒浸一宿日曝待乾研末為丸用旱蓮草熬膏合妙搗碎漬酒同生地黃投罐煮良黑髮黑鬚強筋強力安五臟補中氣除百病養精神多服補血去風久服健身不老樹皮涼而無毒若漬酒每日飲亦益肌膚枝葉煎可染絲又燒灰面膏塗能治癰瘍木白紋細函板堪為蟲白蠟附樹枝結成保小蟲食樹汁化蟲類蠍蟲有白有黑每食冬青樹汁久而化為白脂燭則成蠍人謂蟲屎看樹而然非也亦有不變蠍者則者芑枝上初如黍黍漸圓大青紫宛若樹之結實土人呼為蠍種未年春深則芑折而蠍出延樹矣欲廣蓄者候

芑將折時連枝採繫他 逢秋刮取以水煮濾處置冷器之中 或濾冷水內夜可自然凝聚成塊文理莹澈不忝石
樹其蟲亦應候而出 連狀刮取以水煮濾處置冷器之中 但去渣滓淨為美 自然凝聚成塊文理莹澈不忝石
膏本經原脫漏未書丹溪始珍重續用膏與載原禮簡云白蠟者熏氣收斂堅凝誠為外料要藥生肌止血止痛
接骨續筋補虛與合歡皮同煎入長肉膏神効但未試可服否其合歡皮服之驗矣 蠟有二種蜜白蠟人可服餌
蠟白蠟本經未載後因丹溪此簡有未試可服 本經石蠟款內曾已載詳其
否一勺乃知言此蠟也故採之以補脫漏 一百蠟塵一取能治瘡蠱

女貞實



棟一
練一

音一
即金
鈴子

味苦氣寒有小毒蛟龍極畏不堪多栽在處有之川蜀獨勝木高丈餘梢大葉密如槐稍長花

紅紫甚香實青黃類彈待冬收採向日曝乾取肉堪煎去皮去核一說將核搗碎漿水煮一伏時濾晒收藏亦堪
入藥大概用核莫用肉用肉莫用核此常理也主中濕傷寒大熱煩狂理膀胱小腸疝氣通利小便水道殺三
蟲疥瘍一根一性微寒雌雄兩種雄根赤無子大者忌煎雌根白子多微毒宜採擇向東者繞入蘆蘆略刮外青

只消裏白單味煎酒大能追蟲宜月前忌月後月半後蟲頭向下先啖鳴婢餅引蟲口開頓飲濃藥湯過盡即利

多則成團追下少則逐條推來擴聚行疼痛止亦堪研細末敷作養蟲瘡○又「石茱萸」即花落子外科亦

用醫者當知青葉根莖及嫩葉日暮掉頭向東去以安火大能散熱除水氣一粒散細如米粒在患

處

〔宣〕

金本草

通串百川集

卷之三十一

目錄

卷之三十一

棟實



「旌核」味甘氣溫微寒無毒生山谷及巴西河東類烏豆但略圓而圓外有紋理六月採收碎核殼取仁去皮去核
搗輔佐良藥專治眼科消上下皰風腫爛除左右皆熱障胬肉退火止淚益水生光〔旌子〕啖之亦止鼻衄

香公堂本草卷之三十一

中華書局影印



「厚朴」味苦辛氣大溫屬土有火陰中之陽可升可降無毒樹甚高大樸乃別名陝西川蜀多生梓州屬山出者獨勝丸資治病秋盡採皮擇厚脂顏色紫莹佳去皮薑汁炒褐用寒水硝澤寒水石硝石澤鴻使炮熟乾薑諸豆忌之食則動氣主中風寒熱治霍亂轉筋止嘔逆吐酸禁鴻病淋露消瘀下氣與枳實大黃同用竇滿能泄溫中益氣與陳皮蒼朮同用濕滿能除脾利藥同用則治傷寒頭疼與洩病藥同用則厚腸胃大抵味苦氣溫故用苦則泄用溫則補行義云半胃散中用之最當既溫脾胃又走冷氣再隨證加減妙不可勝言潔古亦曰治腹痛脹滿散結之神藥也倘患者虛弱須斟酌少加對證不真誤服太過則反脫人元氣豈不慎哉若氣實人服多參耆致成喘悶者正此泄除不在葉也孕婦忌用女科當知○「子」入醫方又名「逐折」散結療風癆益氣明眼



厚朴

厚朴同用

厚朴

按丹溪云厚朴氣溫而能散故泄胃中實也平胃散用佐蒼朮正乃泄去上焦之溫不使胃土太過得復其平致於和而已非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補矣然治脹脹者因味辛能提其氣故爾

桑根白皮一味甘而辛甘厚辛薄氣寒可升可降陽中陰也無毒山谷生少家園植多山桑質堅木堪作擔家桑氣厚葉可飼蠶凡入剗中須覓家者近冬收採如式製精根出土外者殺人根向東行者得氣得生皮取近木洗淨通白去青片用銅刀咀或憑鉛忌鐵稀蜜拌透文火炒乾為使續斷桂心入牙太陰肺臟甘助元氣補勞怯虛羸辛潤火邪羅謙甫曰桑白皮潤肺是潤肺中火止喘嗽唾血利消腫解渴破瘀刀刃傷作繻縫熱鳴血金即合「皮中白汁」取依四時春夏取向上者徑升枝幹皮秋冬取向下者因降根皮刻白皮墨之令敷蛇咬毒消點唇裂易差染褐色不落釜中煎如糖赤老疾宿血並推「葉」採經霜者煮湯洗眼去風濁珠勝益

根敷蛇蟲蜈蚣咬毒蒸搘置模搘乘血滯凝煎代茶消水腫脚浮下氣令閩節利研作散湯調止霍亂吐瀉出汗
除風癆瘀冬和桑衣煎濃治痢瘖傷止血「枝」煎常飲耳目聰明去手足拘寧腳氣兼散潤皮毛枯槁風瘡且
疏陰管通便眼眶退暉利喘軟逐氣消癥睡瘡癩「椹」收曝乾蜜和丸服開閩利竅安魂鎮神久服不飢聰耳
明目「黑椹」絞汁係桑精英入鍋熬稀膏加蜜櫻稠濁退火毒勝琳瓶夜卧將臨沸湯調下每服一錢石燥
熱止渴染鬚髮皓白成烏一方黑椹一升和料斗子一斤瓶盛封閉懸屋東向百日化為況染白「柴灰」辛寒
淋汗小毒合冬灰為燭藥醫外科者奇功燭惡肉死肌滅瘻疵黑瘡結船乘會益家○「桑耳」有毒味
甘古方入劄尾用一名桑菌又名桑黃老樹上多雨即生軟濕者作菹堪啖採收剗碎醇酒煎膏散血如神止血
甚捷黑者王女人癥瘕崩漏帶下及乳腫暴末薰者治男子癖飲積聚腹脹併金瘡初得若色黃熟陳白止洩補
益元陽○「桑花」非柏桑堪祀為云乃樹上白蘚其狀因與地錢花相類故假此立名刀刮取之火炒入藥
性緩無毒健脾溫腸寒崩中禁帶漏鼻紅吐血愈腸風下血安「桑上蠶蟲」主卒心痛金瘡潰瘍亦可生肌
却背強腰痛篤疾女科安胎孕下乳汁止崩中漏血沉疴健筋骨克肌膚愈金瘡益血脉長髮堅齒堅牙

〔實〕脈通神輕身明目

傳

三

卷之三

生寄上桑




按木部之中惟桑寄生最難得其真者必湏近海桑樹生意郁濃地煖不鑿葉無根將節間自然生出纏附
桑枝株得陰乾乃可入藥其諸桃梅榆柳擣槲松楓等上間或亦有寄生不似桑木氣厚假桑之氣以為佳爾
故凡風濕作痛之證古方每用獨滑寄生湯煎調百藥百中今人服之杳無奏其功者豈非藥不得真之故歟
况古明醫用藥三方必以主病者為君所用川獨滑桑寄生俱能去風勝濕以為主藥誠為合宜柰今賣藥之
家因難得真往往收採雜木寄生指為桑寄生媒利種雖同類氣味大殊且川獨滑亦未辦認分明每用土當
帰假伐而俱燥性耗衛敗榮無益有虧寧不增剝近寺芟山吳氏辨認獨滑原本羌滑一種以節密輕靈者為
羌節疎重實者為獨川續斷與桑寄生氣味略異主治頗同不得寄生即加續斷便立名曰羌活續斷湯使醫
者不泥於專名病家勿誤其假藥仁恩溥濟何其淵哉

「椿根白皮」味苦溫氣寒有小毒南北俱各有生其木最為無用本多壅腫難生墨縛枝乃曲拳不中規矩與椿木相類須辨認分明興花不審木身大其幹端直者為椿有光而美木身小幹多迺短者為樗又曰椿木實而葉香樗木疎而氣臭今人不識樗名故多呼為臭椿樹也入剖挖東引細根刮外取白皮蜜炙止女人月信過度久病帶渴崩中葉男子夜夢遺精滑洩陽風壽疫宿小水咬蛔蟲其「美」收株曝乾大便去血尤効○「椿白皮」

主疳瘡亦惟白者為良止血功同女科任用

椿樹



誤按汪石山曰椿樗二木各有兩種一種皮赤一種皮白白者先花後葉其樹身皮膚糙如棗核赤仁先葉後花其樹身皮細膩而不著葉皆相同香臭與別醫之所取皆在白皮故入藥無尚椿樗但擇皮白者採收不必

以香臭為辨也

〔榆皮〕味甘氣平性滑利降也。無毒多生山谷處處有之。取向裏白皮旋晒乾人藥勿令中濕。湿則傷人。通水道除五淋。壓丹石利關節。搗和釀酒。凡赤腫薄敷煎成膏飴。但寒熱連服。老人服久多睡。孕婦服即滑胎。新創搗爛如糊用拈及石甚固。〔皮涎〕敷癬殺蟲立差。〔葉〕壓石丹尤靈。生服一兩頓効為羹。日飲水腫即消。〔花〕主小兒驚病。亦利尿管。肉澆。〔實〕生有苦。作醬甚香。因味微辛。肺氣能助殺諸蟲。消心腹惡氣。併卒心疼。療小兒瘡瘍。丸頭瘡及諸癰疥。〔英〕作羹少和牛肉。婦人食即止帶崩。

榆皮



〔秦皮〕味苦氣寒沉也。陰也。無毒。產陝西郡州及廬江川谷木類。檜木根同。槐根葉如匙頭少。老皮多白點。不糙也。糙俗因呼為白櫟木。又呼石櫟樹。苦樹。咸取像焉。竹末株皮陰乾待用。清水水色浸碧。書紙紙面略青。此驗纔直。凡求勿誤。使大戟患吳茱萸葵。苦瓠專眼科去肝中久熱。煎汁澄淨。點洗。無時白膜遮明視物。不見者。旋効。赤腫作痛流淚。無休者殊功。益男子精氣。止婦人帶下。小兒發熱。痛極亦可作湯浴身。風寒濕痺。兼治熱病後重且。

經云以苦堅之故用白頭翁黃芩秦皮之苦劑也久服髮黑亦使身輕〇「擣木皮」多出產江南作湯本可洗敷蛇咬

秦皮



木皮

〔海桐皮〕味苦氣平無毒出雷州屬廣東及近海州郡似桐皮而堅革白黃收採無時任煎湯液主霍亂赤白久痢除瘧瘈癬牙蟲潰酒治風瘡殊功潰水洗赤眼神効堪作繩索入水帶存燭也

海桐皮



〔山藥根〕根狀莖粗大分枝有節葉子細長圓形根肉白黃味甘性平無毒生山谷中根中斷之處有白粉根皮可食根皮可入藥


「山梔子」味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降陰中陽也無毒一名越桃霜後收採家園栽者肥大且長此號伏以供染
色之需五稜六稜咅計山杏產者圓小又薄堪為入藥之用七稜九稜方良折梗及殼研碎纔妙止血用須炒黑
兩
已淘皮除熱於肌表去皮却熱於心胸一說去皮淘心其所入之經乎太陰一臟因輕浮象肺色赤象火故治至
高之分而鴻肺中之火也本不緣作吐仲景用為吐藥者為邪氣在上拒而不納食令上吐邪因得出經曰在高
者因而越之此之謂也易不能利小便易走用利小便者實非利小便乃清肺也肺氣清而化則小便從此氣化
而出經曰膀胱為津液之府氣化則能出者此之謂也本經又謂治大小腸熱及胃中熱者此因其與庚合又與
丙合又能泄戊其先于中州故烏加生薑橘皮治嘔瀉不止加厚朴枳實除腹滿而煩加茵陳治濕熱發黃加甘
草治少氣虛滿倘除煩燥者心內須加香豉而建功益煥者氣也燥者眠之謂血也氣主肺血主腎故用梔子治
肺煩用香豉治腎燥也若加生薑紋汁尤治心腹久疼上焦客熱善攻五種黃病竟解去赤目作障止霍亂轉筋
赤白癰瘍酒胞皺鼻五內邪氣悉能除之丹溪又曰解熱鬱行結氣其性屈曲下行大能降火緩小便泄去人所
不知也

少而外皮於上能禦風寒而氣也恐麻煩酒皆良藥
靈人水火之精子爲宜水內多有草木之

山楂子

此春酒大半熟既醉此入多食本草內入

令附承



〔枸杞子〕味甘苦氣微寒無毒近道田側俱有甘肅州並屬陝西者獨佳春生嫩苗作茹或口秋結赤實入藥益人依時

採收曝乾選用紫熟味甜粗小嚼潤者有力赤黯味淡顆大枯燥者無能今市家多以蜜拌欺人不可不細認爾

去淨梗蒂任作散丸明耳目安神耐寒暑延壽添精固髓健骨強筋滋陰不致陽衰興陽味使陽舉傷云離家千

里勿服枸杞亦以其能助陽也更止消渴尤補勞傷〔葉〕搗汁注目中能除風瘡去膜若作茶啜喉內亦解消

渴強陰諸毒煩悶善除頭面毒發熱立却〔葉上毒窠子〕收曝可同乾地黃作丸不厭酒吞甚益陽事〔莖〕名

〔仙人杖〕湧識皮霄骨節風能追熱毒兼消瘡腫可散○〔地骨皮〕者性甚寒涼即此根名惟取皮用經入

少陰腎臟併年少陽三焦解傳尸有汗肌熱骨蒸瘡在表無寒風濕周瘡去五內邪熱利大小二便強陰強筋涼

血涼骨寒者中止其病又令人外感發熱則散○一粒米能大名存人女同

謨按本草款中竹筍立死者既名仙人杖此枸杞苗莖又名仙人杖藏器拾遺篇內一種菜類亦名仙人杖何併此三物而同立一名古今方書奏瘞或有用之但僉其名而未細註其物者當考究精詳必得證治相合庶不失於毫浪也



枸杞子

年第一味辛氣溫無毒原產漢中川谷今則處處有之人家庭園亦多種植水渴數丈花開兩瓣臘結色似看玉小桃春開花於未葉初樹北人呼為木筆商人喚作迎春花謝後生葉纏枝葉盛復開花作朵有紅紫二種多香氣熏人凡收採入藥同煎宜末同花紫芷蘿刷去毛先射入肺摘去心不致人煩畏惟菖蒲蒲黃連石膏四藥恩石脂使苦蘗止頭腦風癆面腫引齒痛眩冒除身體寒熱鼻塞有香臭不聞生髮髮殺蟲葉清肺通竅久服明目

下氣輕身

酸棗仁

味酸氣平無毒生河東川澤秋採實陰乾因肉味酸故名酸棗

凡使人藥碎挾取仁粒黑色丹亦不易得市

家往往以棗實充賣不可不細認焉能治多眠不眠必分生用炒用多眠胆實有熱生研末取茶葉薑汁調吞不

眠胆虛有寒作散採竹葉煎湯送下倘和諸藥共剝却惡防已須知寧心志益肝補中斂虛汗止煩止渴去心

腹寒熱五臟益安療牙足痠疼筋骨堪健久服長壽一核棗一燒末水調刺入肉中數粒

酸棗仁

味酸氣平無毒生河東川澤秋採實陰乾因肉味酸故名酸棗

凡使人藥碎挾取仁粒黑色丹亦不易得市

酸棗



「杜仲」味辛甘氣平溫氣味俱薄降也陽也無毒漢中屬川產者第一脂厚潤者為良刮淨去皮咀成薄片薑汁潤透連炒去絲凡為丸散煎湯最良玄參蛇蛻補中強志益腎添精腰痛不能屈者神功足疾不能殘者立効除陰

囊濕瘡止小水夢遺



杜仲

山茱萸一味酸澁氣平微溫無毒多出漢中遍生山谷因名蜀棗生青熟紅近指降橘取陰乾惡桔梗防風防己宜蓼實為使入肝腎二經合散為丸惟取皮肉溫肝補腎興陽道以長陰莖益髓固精緩腰膝而助水臟女人可匀經候老者能節小便除一切風邪却諸般氣證通九竅去三蟲強力延年輕身明目其一枝勿用滑精難收
謨按經云滑則氣脫山茱萸之溫以收其滑入味丸用之無非取其益腎而固精也本經謂其九竅堪通是又盡信書則不如無書矣

國朝文獻



〔合歡〕 即交枝草味甘氣平無毒生產雍治並屬河南每植庭除葉如槐繁花似梧桐但枝軟其枝互相交合風來輒

自解解故因名曰合浦俗又呼海荔枝也核皮及葉不拘月時利心志補陰安五臟明目令人革面返色時常安樂無憂（皮）核肉潤滑散腫癰癧斷筋骨（葉）搗紋濃汁浣衣服去黑垢微



合
歡

「接骨木」味甘苦氣平有小毒本經云無木高一二丈許輕靈無心砍枝插土即生近京多植瓦葉並賴陸英水芹故又名木蘿蔔也專續筋接骨易起死回生折傷頻瀆吞風瘡堪作湯浴任煮三次功力一般產後諸疾亦改善方藥中屢用葉主癰生搗汁飲大人七葉小兒三葉惟得吐寒熱竟除根皮採收亦堪煎服瘡瘍飲吐去水腫水脹利消見効即停勿終劑○又種「折傷木」多產資州山屬保藤繞大樹引長其葉如苟草圓厚八九月內採莖日乾主折傷筋骨殊功敵產傷血病立効酒水煮飲並與前同




「木槿」味苦氣平無毒株幹不高在處俱有花淺紅朝開暮斂葉淡綠秋霜春生沿武則離陣可為入藥頭花枝各用一枚主病後熱渴令人得眠絞汁度絲軟滑易絡「花」主鴻癆腸風濕腸止血作湯代茗風瘡漸敗二者用之並宜炒過

首章以陰爻為體而以太陽為用者也

其體一黑其用一白

木槿

「伏牛花」味苦甘氣平無毒一名陽虎刺花性生蜀孟近郡川澤中纔有莖深赤刺多葉青細似葵葉而不光毛淺黃如杏花而作穗三月半後收採陰乾主大風遍身猝癰瘍濕痒四肢掣急五痔下血堪止風眩頭痛能除



伏牛花



「南藤」即丁公藤味辛氣溫無毒生泉州崇州福建生南山山谷常依楠木故名南藤葉如杏葉略尖苗似馬鞭與節皮色紫褐收採無時專治風寒用濱酒服排風邪強腰膝除癆主風血補藥者起陽性烈不可摩否令人皓髮變黑
○「石南藤」生於石上株高大凌冬不凋如此把葉但背無毛似椿樹花細碎成簇秋結紅實收採隨時湖浙甚多名鬼目思大小種使五加皮治腎寒腳弱最宜瘦風濕濕痹五物女人不可久服犯則切切惡焉〔寶〕
殺蟲毒尤靈亦逐風寒積聚

卷之三十一

泉州南藤



荆實味苦辛甘氣微寒陽中之陰無毒不拘州土惟盛水濱實綠蔓生名因直述大如梧子色黑輕靈依時收採陰乾炒研去油纔用乃太陽經藥患烏頭石膏主筋骨寒熱濕痹拘攣理本經痛頭沉昏胸利關節長髮鬚通

九發去蟲後不虛門子腦虛乃語惡動堅火服酒大輕身令人光澤暗緻者胃靈者禁服恐作生疾

荊實

護荊實

少鍾因之楚人謂荊實自

荆實根莖細長小莖有白粉



荊實一粒甘苦氣平無毒
杜荊實一味苦氣溫無毒高岸田野保名叢生種有青黃兩般惟取青者為上因莖堅勁故以杜稱鄉人只呼黃荊
法司常作籙枝入月採實向日曝乾凡入藥中必濶炒研防風為使草惡石膏下肺氣上欬逆咽喉通胃氣除寒
熱骨節通神見鬼又載仙方得柏實青箱瘡頭風甚驗一莖一主脚氣腫滿濕瘡仍治霍亂轉筋血淋血痢
一根一解肌發汗利脈宜頭肢体諸風敗逆惡効○又有荊憑一多載莖條碑架火上炙熏憑取兩頭流滴
加薑汁傳送每憑一杯加薑汁二茶匙消瘡沫如神治老人中風失音昏危療小兒發熱驚癇抽搐氣竇能食者宜服氣靈少
食者忌之故丹溪云虛疾用竹瀝實疾用荊憑二味俱開絡行血氣要藥也

一卦 牡荆實

太醫有言曰：「牡荆實，味甘苦，性平，無毒，多產衡山。八月收採作塊，類猪苓，故此名。」

猪苓一味，甘苦淡氣平降也。陽也，無毒。多產衡山。八月收採作塊，類猪苓，故此名。猪苓用酒去淨黑皮，經入膀胱，與

腎通淋，消腫滿除濕，利小便。蓋苦泄滯，甘助陽，淡利竅，故爾。衍義又云：行水之功居多，大能燥亡津液，倘無湿證勿輕用之。若久煎，嘗損腎脾目。

猪
苓



〔紫葳〕 即凌霄 味酸氣微寒無毒多生山谷處有之初作蔓藤後木旋長歲久延引直至杪梢夏月黃赤色花因以凌霄為譽適時採擗惟裏齒碱取其有守能獨得故用女科調月信治血病要藥稍陰裏接方崩牛喘下立安穩

瘀血消加連法產乳餘疾散潤鼓熱風火

〔莖葉〕 味苦同莖亦主瘡瘍益氣

始創山廬學師王勝育之金匱小敗腫

林空館 白居易詩 春風落葉滿地

直不勝可見此

〔草莖〕 李本仁草本圖說 茎如竹子

紫葳



〔南燭枝葉〕 味苦氣平無毒江左吳越最多江東州郡亦有初生甚矮越四五載僅與榕葉相伴久春漸長歷三十

年方成木株而大葉類茶茗圓厚實若茱萸綴多謂本木株而似草類故名南燭草木又名草木之王取汁漬末甚烏炊飲食最甘美古人又曰烏飯樹葉是也治大人一切風疾多採煎湯療小兒誤吞銅錢單用燒末悅顏色耐老堅筋骨健行久服身輕不飢多服髮白變黑上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復

頃此之謂也

南燭枝葉



〔烏藥〕一名味辛氣溫氣厚於味陽也。無毒。此藥甚賤。各處俱生。雖稱天台者。香白固優不及海南者。功力尤大。根直根不堪用。有二種。天台者。狀取連珠。如獨珠。連者佳。入足少陰腎經及足陽明胃腑。因多寒泄。不甚剛強。諸冷能除。凡氣滯順止。翻胃消食積。作張縮小便逐氣。衝致疼痺疫癥。時行解毒。卒中攻女人。滯凝血氣去。小兒積聚蛔蟲。猶大病生磨水灌。効一葉。採入剉下。氣亦靈。但力緩遲湏。醋浸炙。

原初外本草○〔蔓博〕中至煥周易春宜服
上豆而通水氣者多於陰太陽少財
財故大也雲又言三蒸者蒸臘黃亦長主
聚屍體熱食聚食煥疾其平否○又錄

參附湯服益于黏古通宜扶半陽本斷根十



〔茶茗〕味甘苦氣微寒無毒江治閩浙俱有蒙山中頂獨佳茶譜云雅州蒙山有五頂頂上各有茶園其四頂茶園罕到春分前後多擣人力俟雷發聲快步採摘三日而止若復一雨以本處水煎飲即驅宿疾三兩輕身三兩換骨四兩成地仙予聞此言初未全信近見土人帶有真者欲售其價極貴採摘不廢惟中頂草木繁密雲霧遮蔽鷺獸時出人跡製造殊異故爾少取煎飲氣味果奇早採細者曰〔茶〕芽如雀舌麥頭雖甚細嫩猶未稱善又種新芽一發便始知前語不诬無怪頭名而傳遠也晚採者曰〔茗〕茶之粗者多雜木葉不可不擇故經云粗者損人細入二經絡手足厥陰專清頭目利小便善逐瘀逆解煩渴下氣消宿食除熱治瘻瘍並連生薑黃連同煎止赤白下痢香油調敷湯火炮燬眼目疼嚼貼兩皆暑天渴少加醋吞熱胀宜冷服忌冷則聚疾多服少睡久服消脂瘦唐玄景云釋滯消壅一日之利暫佳濟氣慢精終身之累斯大損多益少觀此足徵

標按茶茗所治本經以清頭目為上後醫堅枯素向苦以泄之之說乃云其體下行如何頭目得清也殊不知

頭目不清多由熱氣上熏用苦泄之則熱降而上清矣其茶体輕浮採摘之時芽孽初萌正得春生之氣是以味雖苦而氣則薄乃陰中之陽可升可降者也故云清利頭目有何博乎

一、**蜀牀**一味辛氣溫大熱屬火有金與水浮也陽中之陽有毒產自蜀川八月收採顯紅者為貴口聞者殺人製酒炒出汗來去目去黃穀凡用先擇去目及皮有微炒汗出則有功力炒畢竟投石臼宜杏仁為使畏欵冬雄黃却心腹冷疼及寒湿痺疼並効殺鬼疰蟲毒併蠱魚蛇毒尤靈除骨節皮膚丸肌癰瘍寒濕瘡不汗上退兩目翳膜下敗六腑沉寒通氣脉開鬼門仍調關節堅齒髮煥腰膝尤縮小便理風邪禁攻逆之邪治噫氣養中合之氣消水腫黃疸止腸澼利紅多食乏氣失明久服黑髮耐老十月勿食傷心健忘一椒目一味苦兼辛行水而水盡定痰喘刲藥飲盜汗捷方並宜炒之研末調服一葉一和艾葱搗爛少加釀醋拌勻署內外腎吊痛殊功效竢疾伏梁氣極驗亦堪煮飲氣甚辛香○又種一秦牀乃出秦嶺氣味俱苦生溫熟寒製法與蜀牀相同顆粒較蜀牀略大所患又有三藥防葵雌黃稻姜主遍身惡風散四肢瘡痍減癥生髮悅色通神治口齒浮腫動搖併喉痺吐逆調產後腹痛餘疾及經閉不通世相傳此牀可制水銀凡誤餌成毒者服即愈也○一崖牀施州出上氣喘嗽者須求○一蔓牀一雲中生賊風寧急者宜服



〔吳茱萸〕味辛苦氣溫大熱氣味俱厚可升可降陽中陰也有小毒所產吳地獨妙故加吳字為名重陽採收依法

精製湯泡苦汁七次燃乾杵碎繞煎畏紫白石英惡丹參硝石用蓼實為使入肺脾腎經主咽嗌寒氣噎塞不通
散胸膈冷氣窒塞不利驅脾胃停寒臍腹成陣绞痛逐膀胱浸湿陰囊作痛劄痛開腠理解風邪止呕逆除霍亂
仍順折肝水之性治吞吐酸水如神厥陰頭疼引經必用氣猛不宜多食令人目瞪口閉若久服之亦損元氣腸
霍洩者尤忌沾唇為速下氣故爾一根一粒寸白三蟲煎服即出一枝療二便閏格啞口立通並宜向在東南
取之方獲効驗

吳茱萸



乾漆一味辛鹹氣溫屬金有水與火降也陰中陽也無毒漢蜀多生敍州屬商直隸亦產待季夏方取得陰濕纔乾在燥日反難乾得陰湿雨天却易乾亦物之音也 凡欲買求須驗好歹湿者以物蘸起細而不斷斷而急收至諸乾竹簷地連乾者纔佳乾者看日視之如堅醫塗黑若鐵堅剛狀類蜂房孔孔相隔者方美濕堪飾添血乾漆入醫方搗作碎砂炒以文火畏鴉彈忌油脂又畏蟹黃見則化水漆瘡塗即愈 資半夏為使合湯散隨宜追續殺三蟲補中安五臟療男子風寒湿痺時作癢疼治女人癥瘕瘕堅不通經脉續筋骨及填髓腦消癰血專主絕陽疼結腰痛可驅血氣心痛能止丹溪云性急而能飛補近用為去積滯之藥若用之中節積去後補性內行人不知也。 「生漆」向樹吸之小筒插樹皮內口立下長蟲住痛〔葉〕合青黏作散華佗曾載方中利五臟殺蟲黑絛髮益氣精汁塗癬瘡漸含吸之溫酒下收葉折斷汁自滴出也

岐州乾漆

載之於平陽地生山中

時人以爲奇樹

至今未有能

以作漆者

其根皮可作漆

「钩藤」味甘苦氣微寒無毒

湖南北俱有山上下盡

「生」葉細長節間有刺因類鈎故名

藤三月採收取

皮曰曝專醫瘧幼不理別科

寒熱驚癲牙足疾瘻者急

覓胎風瘧忤口眼抽搐者宜求

因莖長中空可鑽陳酒


小人無取置甕中口含略吸引之酒出治治不斷

鈎藤




檳榔一味辛苦氣溫味厚氣薄降也陰中陽也無毒嶺南州俱各有生形類鳴心尖長性如鐵石沉重存坐正穩中實不虛破有錦紋此品方妙逐水穀除痰澼止心痛殺三蟲治後重如神墜諸氣極下專破滯氣下行若服過多又濁胸中至鬲氣也

檳榔




按捺榔服之苦以破滯氣辛以散邪氣久服則損真氣多服則濁至鬲之氣較諸枳殼青皮此尤甚也夫何嶺南一瘴之地平居無病之人朝夕如噏猛噬云可辟除山嵐瘴氣之疾習以成俗至今為然吾儒有仕於彼者亦隨其而噬之使一身冲和胃氣竟喪彼其耗折矣正所謂非徒無益而反害之因習之弊死而無悔者焉羅謙甫曰無病服藥如壁竈安鼠誠哉是言也帝聞用藥如用兵朝廷不得已而行之以禦寇爾若無寇可平而無故發兵不惟一費餉抑且害及無辜戒之戒之

「大腹」一味苦辛氣微溫降也無毒樹與楨榔小殊同生南海諸國傳曰向陰生者曰楨榔向陽生者曰楨榔楨榔去
長大腹圓矮一說楨榔難得真者今市所貨並此代之以薑盐同煎入硫氣藥妙主冷熱諸氣通大小二腸止霍
亂瘧陽暗心攻心腹大腸擁毒○墨外粗殼名「大腹皮」此樹鳩鳥多棲食毒蟲為害先浸醇酒微洗豆
湯下隔氣亦佳消浮腫尤捷



蜜蒙花味甘氣平微寒無毒產自川蜀木高丈餘葉青冬不凋零花紫瓣多細碎十房一朵故多蜜蒙採花酒浸一
宵候乾蜜拌蒸過再向日曝專治眼科去青盲翳止眵淚赤澁消赤腺貫睛內掩除疳毒侵皆外適

蜜蒙花



桐子一味苦澀氣平無毒木高一丈二丈多植嶺南江浙葉圓大如車輪莖子木杪皮一匝為一節重疊色已子黑作房九月收採陰乾入劑血證宜求溫陽禁涼病腸風養血治崩中帶下其「皮」二向一剝轉復上生堪作睡薦兩衣以克家用藥求陳者燒研湯調止鼻洪吐衄殊功塞腸風崩帶三効

櫟 榴



（大縣）志苦辛能消鬱解郁寒

（大縣）志苦辛能消鬱解郁寒

「五倍子」文蛤味苦酸氣平屬金與水無毒在處生春秋採形類黍大色兼青黃內外小蟲皆又名百蟲倉也療齒宣瘡瘍及小兒面鼻瘡瘍治風癬瘡瘍併大人五痔下血煎湯洗眼目消赤腫止疼研末染鬚髮變皓白成黑專為收斂之劑又葉湯煎腸靈解消渴生津却頑疾去熱○「百藥煎」者以此造成新鮮五倍子十斤者搗爛夜取出後搗加桔梗甘草末各二兩又薑一七仍搗 畜務細研缸盛七畫

遇七次成餅錠晒乾任用如無新鮮用乾倍子水漬謁之肺脹喘欬不休噙化散餅即止

五倍子



「巴豆」味辛氣溫生溫熟寒性烈浮也陽中之陽氣諱味厚体重而降有大毒生自巴郡一名巴椒反牽牛惡藜草忌蘆筍醬致冷水畏大黃藜蘆黃連得火為良芫花為使八月收採連殼陰乾有蕩滌攻擊之能誠斬廄奪門之將凡資治病緩急宜分急攻為通利水穀之方法淨收心臟油生用緩治為消摩堅積之劑炒令煙盡黃黑熟加

一說炒令黃黑似為太過不如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳雖可通腸亦堪止渴世所不知也丹溪云能去胃中寒積與寒積者忌之本經又云人吞一枚便欲致死服食三載重三十斤物性相附有如此夫

戎州巴豆



蘇方木」味甘鹹氣平可升可降陽中之陰與毒多生海外堪用染紅入藥惟取中心煎酒專行積血女科資通月水產後敗血立除外科仗散腫癰瘍跌撲死血即逐同防風散表裏風氣調乳香治口噤風邪

蘇方木



「阿黎勒」一味苦酸氣溫苦重酸性急喜降陰也無毒發癥俱生廣州獨勝六稜黑色為美大煨去核燒煎消宿食去腹脹且通津液破結氣止久病重逐陽風開胃溫陽散疾佳妙又因其味酸苦有收斂降火之功故能治肺金傷極鬱遏脹滿喘急欬嗽無休也

廣州阿黎勒



全風經本草卷之三十一水康大葉林蔭脂立處
無香胡一白蘿蔔一木根甘草半枝半枝半枝半枝
半枝半枝半枝半枝半枝半枝半枝半枝半枝半枝

「皂莢」一味辛鹹氣溫有小毒所在各處有生懷孟州

並屬

河南者獨勝忠參門

一味畏空青

二參人參入足厥陰引經宣

以桔梗為使種因有二用亦名分理氣疏風（長板莢）湧瀉治齒取積（猪牙莢）當求去弦去子煨熟俱宜

蜜炙酥炙燒灰略異製度憑證活法在人堪作散敷膏勿為丸散液搗鼻噴嚏立至敷腫疼痛即除和生礬吐風

痰（即稀）拌煉蜜為導箭（即蜜）導箭殺蟲精物主風癆坑肌利癥通閉破癰墮胎○（皂角刺）乃載外科聖藥治

潰瘍直達潰處成功

猪牙皂

臭艾一名臭草。味苦性寒，主风癩瘧疾，止痒，除湿，利小便。

楓香脂一名白膠香。味辛苦氣平無毒性甚疎通水多蟲穴山谷俱產江南獨多此烈日灼流白脂為外科敷貼要藥。

主風癩瘡癰最捷退靈浮水氣尤靈搽齒齦止齒痛近世不知誤為松脂明莹者甚失本經意矣

〔樹皮〕

性溫

久痢堪攻○〔大楓子〕取仁殺蟲瘡疥癬○〔楓菌〕誤食令矣不休惟飲地漿其毒即解

楓樹脂

〔白膠脂〕本名蠟樹脂。其性如蠟，故名白膠。



读

按楓木連根大者甚多並結也而不結子本經以大楓子內附但載主治餘無一言誠可怪也今詢市家所
得咸云海舶貿來疑必外番楓木別有一種生者不然何獨指此為名而不言他木也姑述之以俟識者再
教


麒麟竭

一老

血竭味辛鹹氣平有小毒出自南番諸國麒麟樹脂結成其樹高長婆娑可愛脂從中滴狀如膠飄久久

凝塊成形紅赤與血同色故今番賣收採貨賣特名曰血竭又名曰麒麟竭也敲斷而有鏡臉光彩似鈍射人取
摩指甲弦間紅透甲者方妙但與紫銅礪相類勿誤認假成真書載叮嚀用湏仔細治跌撲傷損瘡瘍毒瘡癰專
破瘀血引腰竝破邪氣止痛憑作膏貼任調酒吞

廣州駢驛竭



沉香一味辛氣微溫陽也無毒山南國諸國及交廣崖州木類椿櫟節多擗走者砍
漬以雨水歲久方得水木得水使皮木朽殘心節獨存堅黑沉水燔極清烈故名沉香但種精者凡質須當選擇「黃沈」結鵝鳩斑者方是「角沈」
精美得者罕稀應病如神入藥甚捷堪為丸散忌曝火烘補相火抑陰助陽養諸氣通天徹地轉筋吐瀉能止
噤口痢痛可除○又浮而不沉水者名「棧香」此品最劣半浮半沉與水面平者名「煎香」此品略次而
無損餘藥不可方也

中形如鸡骨者名「鸡骨香」凡入藥剖惟沉而不宜心者為上若雖沉水而有空心則是鸡骨謂中空而有孔若鸡骨中血眼而軟嫩也形如馬蹄者名「馬蹄香」

形如牛頭者名「牛頭香」並與沉香種同亦皆品之廉者難咽入劑惟焚熏衣

模棱衍義云沉香保和衛氣為上品藥今人多與烏藥摩腹走散滯氣獨行則勢弱與他相佐當緩取効有益

沉香

沉香



「檀香」味辛氣溫陽中微陰與毒產南涼崑崙及江淮河朔專入肺上臟通行陽明經體摩敷恐毒止疼水煎升胃氣進食腹痛霍亂却中惡鬼氣能除。又「紫真檀香」主惡毒風。」「降真香」葵煙直上天召鶴成辟盤旋天上主天行時疫狂熱破毫舍怪異響声小兒佩之辟惡邪氣

謨
棲東垣云檀能調氣而清香引芳香之物止行此於極高之處若併橙橘之屬佐以薑蜜併葛根荳蔻縮砂

益智通行陽明之經在脚陽之上處咽嗌之中同為理氣之剎也

檀香



降真香

安息香一味辛苦氣平無毒惟生海外大樹木脂因香辟邪土人呼為辟邪樹也七月七日裂其樹皮膠脂如飴隨即湧出堅凝成塊其色黃黑燒烟鬼懼神散研服邪疫鬼胎下鹽毒可消

安息香

安息香



安息香一味甘氣溫無毒來從西城賣自廣東氣極芬香色乃紫赤或云係諸香汁薰合成就一說獅子屎故飾其名諸論紛紜難指孰是今市賣者多如膏油辟諸邪殺鬼物精邪去三蟲除鹽瘤症仍禁夢魘尤通神明

冰腦香即冰片

味辛苦氣溫微寒無毒來從海舶出自波斯木直長類杉皮有甲錯枝傍生發葉皆白正圓八香一

即木脂結成狀若松花細瓣片片潔淨氣甚熏人市家多用麝硝混攪不可不細擗也

麝硝

色蒼如細碎

細認確確藏於燈草務加不致觸目熱赤疼潤膏點上即止喉痺腫塞瘡末吹入之消疳毒生管中連服漸效

致

自別確確藏於燈草務加不致觸目熱赤疼潤膏點上即止喉痺腫塞瘡末吹入之消疳毒生管中連服漸效

舌脹出口外多瘡者取藥敷和眼


重者用五線方

愈仍治小兒痘瘡心煩紅燥妄語取搗細末細心並丸濃煎紫草青湯送下

炎

寶大粒竟能發透更宜心神。○「龍腦油」出佛菩國中鑽樹取摩一切風氣。○根下清液又名「膏香」堪逐風涎可通閨竅。

誤按丹溪云龍腦屬火世知其寒而通利然未達其熱而輕浮飛越局方但喜香而貴細動輒與麝同為桂附之助然人身之陽易動陰易虧半思之節齋又云龍腦大辛善走故能散熱通利結氣醫方目病喉癰下疳多用之者取辛散也人欲死者舌之氣散盡也世人誤以為寒不知辛散性甚似乎涼耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒乎



乳香一味辛苦氣溫陽也無毒亦出波斯國土赤松木脂所成漬滴成珠綴木末落者名「珠香」滴下如乳塔搗地面者名「搗香」珠香圓小光明搗香大塊枯黑珠香効速搗香効遲凡欲用之不可不擇若盛烘燥燈草同搗若合散九羅細和入佛前湯液臨敷加調療諸般惡瘡及風水腫毒定諸經卒痛併心腹急疼亦入敷膏止痛

長肉便催生產且理風邪

丁香一粒

乳香



「丁香」味辛氣溫屬火有金純陽無毒生交趾廣州收春前秋後形有大小名列雌雄「雄丁香」如釘子長

「雌丁香」似棗核大凡資主治母者用多專入腎胃二經又走太陰肺臟諸香能發凡氣善破口舌氣積泄氣殊功且止噫感氣逆翻胃嘔霍亂呕之効兼除心腹冷疼緩腰膝壯陽殺疳蟲堅齒治頭癩製消蟲毒脹膨細末研成粉有兩治婦人陰戶常冷紗囊盛納陰內旋使轉溫老人拔去白蘞薑汁和塗孔中重生即黑「丁皮」止齒痛驗根據敷風腫良

雄丁香



雌丁香



費大連真言錄卷之三

〔萬國〕

〔萬國〕

〔萬國〕


〔萬國〕

〔萬國〕

「胡桐液」一為味鹹苦氣大寒無毒出甘肅州以西作硷音鹵地之上樹甚高大皮似白楊津液入地中乃與土石相着冬月收採收如黃蠶重實而堅多夾木又若硝石得水便消融壘貯封勿令燙化口齒門聖藥瘧癥仙丹毒熱腹滿心煩水和服之取吐牛馬急黃黑汗水研灌之即差火毒蟲毒並破金錠銀錠可用切勿多服令吐無休




「阿魏」味辛氣平熱無毒出波斯國中生阿魏木內其木長八九尺皮色青黃四季花實俱無葉如鹿耳斷其枝梗汁滴如鴨久乃堅凝遂名阿魏唐本註云体性極臭而能止臭亦為奇物也色黑者力微黃散者為上但今市家多煎黑白微克不可不細辨爾凡浸研作粉霜熱酒器上裏遇置待冷入藥隨宜去臭氣殺諸小蟲下惡氣破癰癩積辟瘧瘧瘧却鬼疰邪邊毒蛇消傳尸可滅



「蘆薈」味苦氣寒無毒波斯國土所出木滴暗液結成狀類黑錫俗呼象胆味苦故云誤服巴豆毒能解除殺蟲去疳鎮心明目治小兒癩癇驚搐瘧大人瘡瘍痔瘻發同甘草研細敷効墨生齒縫以鹽湯漱淨點瘡

如皋 廣州 蘆薈




「鮑陳葛」本草言其根大寒性甘微甘而氣烈亦有金根者與人共食地上
重寶而型多失脚太又名根子根水粉根和散根也今欲外口齒門望然春
子陰深之民必粒此叶黃幾

〔沒藥〕味苦辛氣平無毒莖黑類安急香出產自波斯國亦木脂液逐日結凝成塊大小不侔斷碎光瑩可蜜燭細入藥製同乳香主墜墮跌打損傷癰癥疽瘡瘻瘍破血立効止痛如神

通鑑

本草綱目 沒藥



〔蠶子〕味甘氣溫無毒朗州屬
所生藤莖甚大黃花綠葉子若搘姜生青熟紅肉上有刺其核類蠶故此得名
消腫安惡瘡除黴粉刺兩膀蚌毒立効雙乳癰赤珠功止腰疼主折損匪專追毒亦可生肌
誤
按烏頭毗穗亦名木蠶子兩物一名不可不識但此專入外科而有追毒之効彼此徒載其名全無治病之能非比古人三物同名而各有同也

續本草 卷之三



薯蕷山藥地榆木通白芍芍藥

水蘆子

蓼子

〔蕷〕味辛氣平無毒產河東河西有種大種小「大蕷」比榆蕷大甚氣臭如訊音信難聞「小蕷」較榆蕷小差一說此即味辛醞醬堪用凡資治療取大宜陳但市收藏多以鹽漬殊失氣味入藥無功效求質者為良倘修合務經火煅過纔用主五內邪氣殺寸白三蟲化食除腸風逆冷止心痛散皮膚皮節風濕療瘡瘍疥癬瘡瘍

蕷



「雷丸」味苦鹹氣寒有小毒係竹之苓菌蔓鮮有建平

禹南直隸公眾累相連狀而丸而名此入藥炮用甘草煎湯浸一宿尤殺毒

者殺人白者惡偏蓄葛根便厚朴芫蕘芫花蕘實胃熱可解蟲毒能破穀三白仍殺白蟲利丈夫不利女人利利益

也

主癩瘍狂走瘧生出患風又作摩積之膏專却小兒百病久服陰痿尤宜慎之

雷丸




拔黑肉白

「杉材」味辛氣溫屬金有火陽也無毒江南深山多有栽植株類松大而勁直葉附枝生若刺針凌冬不凋隨時收


採煎服主心腹脹痛及卒暴心痛殊功淋洗療風癰瘡瘍併延片擦瘡立効「節」煮慢捋脚氣腫痛「菌」煎

吞治心肺卒疼生杉木上者


杉材



菌杭州宜



「沒食子」即無味苦氣溫無毒出自西戎樹極高大葉似桃長綠花瓣心紅實結圓類彈丸初青熟漸黃白蟲蝕成孔眼者入藥紋細無秋米者尤佳漿水浸砂盆研石上研盡切忌犯銅鐵濕湯火上焙乾益血生精安神和氣燒黑灰治陰毒合他藥染鬚髮治瘡潰肌肉不生主腹冷滑利不禁




沒食子

花一味苦氣寒無毒岸側道旁在處偶植木高丈許秋華春榮初生黃蕊是「花」漸乾為「絮」能治濕痒等急及貼灸瘡多積擗作膏取柔軟清涼尤妙「葉」煎水洗驟馬疥癩立愈及療心腹內血止疼「枝」煮湯治嬰兒寒熱疾即差更治風毒癰癧去瘡「根」理齒痛而漱出柏漬「實」主潰瘍而逐去膿血「柳膠」結

砂子「寸計」除渴消「木中蟲屑」治風濕疥瘡發熱寒熱人藥外用「草頭水」

柳葉



「使君子」味甘氣溫無毒交趾多生嶺南亦有新採者潤陳久乾枯用酒慢火微煖去殼便可嚼食或和諸藥濕作散丸去白濁除五疳蛔蟲止鴻病因郭使君原用以治小兒後人竟名之曰使君子也

使君子



大士也。此是因緣成道體。因緣者。是緣起。故名。大士。破道中司。

〔金剛經〕般若波羅蜜多經。說法者。佛。聽法者。菩薩。說法處。南天竺國。大嶺山。說法時。有大士。破道中司。



圖像本草蒙筌卷之五

歙邑葉斐鮑侍

小學

門生

增胡一貫

校刊

新安陳嘉謨廷采纂輯

潭陽後學劉孔敦

若樸增補

穀部

粳米

即晚
大米

味甘苦。

氣平微寒無毒。水田堪蒔。霜降纔收。穀大多也。米粘曰粳。有赤白兩種。

赤者江
在多蒔

入心肺二經。極病

煎湯。惟白最勝。充飴為飯。遇熱則佳。益氣填補中焦。止洩平和五臟。合熟鷄頭芡實煮粥。明目強志。益精。傷寒方中。亦多加入。各有取義。未嘗一拘。少陰證。桃花湯每加。取甘以補正氣也。竹葉石膏湯類用。取甘以益不足焉。白虎湯。入于太陰。亦同甘草用者。取甘以緩之。使不速於下爾。○又

陳廩米

味兼鹹酸。即粳米貯倉廩年深致性。

緩調脾胃。効捷易消化。頻止洩痢。多滋潤。竟解渴煩。下氣延年。開胃進食。若蒸作飯。和醋能封腫毒。立差。研汁下咽。去卒心痛。惟忌馬肉同食。恐發痼疾。難瘳。○

寒食飯

敷滅瘀痕。搗泥爛。妙。煮

炊米湯

飲潤喉燥去火毒。

良方。

米炒熟鋪冷地面一時辰使火
云盡燒不爾則反助燥渴

○私米

秧蒔高田。早秋便可收刈。穀長無刺。米小不粘。色赤白。亦有兩般。

憑炊煮任。克正用。溫中健脾。益衛養榮。仍長肌膚。尤調臟腑。○

稻米

亦小味甘氣溫。收近重陽。春甚潔白。若粘滯者曰糯。不粘滯者曰粳。音商買錢竟謂粘米。煮飴誠妙。釀酒彌佳。充飴不宜戀膈。難化。昏五臟。令人貪睡動。

正氣致人發風。但霍亂吐道不休。用清水研服即止。

稻穡

即稻治虛毒作脹。

稻穡

療黃疸如金並用煎濃莫

惜時啜。

稻穡灰

治跌損淋汁沃痛漸甦。

稈頭、納糠

堪治卒噎。

蜜丸彈大無時含之能送食過喉斯亦春搗

義爾。

糠粃

勿用築枕枕則令人損明因火力倍常切不可憚犯。

粳米



籼米



謨按東坡云。稻者穧穀通名。羅氏亦曰。在穀通謂之稻。故今人號籼為早稻。號粳為晚稻。論語曰。食乎稻是亦指粳而謂何。獨本經欵中直指稻為糯米。與前諸說大相戾焉。或者云。糯與秔有粘不粘之異。故書通名以標之。未必得其意也。

小麥米味甘。帶皮氣寒。去皮氣熱。諸處皆種。四氣俱全。蓋秋種冬長。春秀夏實。故也。北地霜雪多。而毒少。南方霜雪少。而毒多。北麥麪可以常餐。南麥麪只堪暫用。一說北地高燥麥不受濕。故作麪可常食。造饌者不可不知。入藥前湯務宜完用。養心氣肝氣。止漏紅唾。紅通淋利小便。除熱解煩渴。

浮水麥

先枯未實。斂虛汗。獲効如神。磨

成
麥

實大腸止渴。水瀆為糲。消宿食除脹。作麵。

誠佳。克餐不厭。助五臟增益氣力。厚腸胃。滑白肌膚。性飴。

善解藥毒。和山梔子。醋搗。裹傷折處甚良。

寒食麵。滅瘢痕飛羅麵。消延沫。駁皮。醋炒。署

未免動風。蘿蔔汁服可解。善解藥毒。即熟錢頭打糊。調上焦藥為丸下咽。即化。

即熟錢頭打糊。調上焦藥為丸下咽。即化。

葉去酒疸目黃並用煎濃濾湯類服。

○大麥米

粒長又厚。因此得名。味甘鹹氣平微寒。故堪久食。仗蜜為使。

入藥極濟。能益氣調中。主消渴除熱。實腸胃。補虛勞。壯血脉。悅顏容。食後食子針砂。染皓鬚髮變黑。

大麥糲無

燥熱。較小麥尤勝。平胃解渴殊功。

大麥糲

味鹹溫化食消痰尤効。

今醫多用此。孕婦勿食。恐墮胎。元虛者少煎防消胃水。

小麥米



謙按麥者接絕續荒之穀也。方夏之初舊穀已絕。新穀未登。民於斯時正乃乏食。二麥先熟。接續無憂。故春秋
於他穀不書。至無麥無禾則書之。可見聖人於五穀中亦惟重麥與禾也。非因民命所繫安足以動筆耶。

蕎麥米

味甘氣平寒無毒。一名烏麥。秋種冬收。曝烈日。預令口開。春熟米。堪蒸飯食。亦可磨粉。任意充餐。益氣力。

續精神。鍊滓穢。一年沉滯積在胃。食此乃消。實腸胃。與丹石人食。解除燥毒。和鵝羊肉食。脫落鬚眉。久食尤當忌之。動風令人。

眩暉

葉

作茹壓飯。利耳目。下氣亦良。

梗

燒灰淋湯。洗牛馬。除瘡最効。丹家多採用。煮粉霜。

蕎麥米



新粟米

春熟米。堪蒸飯食。亦可磨粉。任意充餐。益氣力。

不米 新則味鹹。陳則味苦。氣平微寒。無毒。在處俱種。北地尤多。日春為糧呼曰小米。丹溪云。屬水與土。因而用養。

腎調脾。須分新陳纔可效驗。

新粟米

養腎氣。不虧去脾熱。常益中。晚

陳粟米 止淺痢。分滲。卻胃熱。大解渴消。

卷為粉 理氣。少食停。仍止嘔逆。蒸作糗。

除寒中。

熱渴更實大腸。

泔

主霍亂。轉筋。頓飲數升立愈。

臭泔 除

煩渴酸熱 酸泔 洗瘡疥殺蟲。

○ 穀粟

收摘略遲。經載

秫米

即此。解寒熱。利腸胃。殺疥毒瘻。潰瘍者。粥炊

飯最粘。楊鶴造酒極妙。但動風壅氣切不宜食多。

○ 又種 糜米

甘溫蘆苗似粟非粟。由大暑佈種。故以黍命名。

廿四

丹黍米

稻子生於水田中者。亦名丹黍。其穀可食。其葉可作爲席。其根可作爲繩。其皮可作爲繩。其皮可作爲繩。

釀酒搗餠。亦同糯粟。肺病宜食。
孫思邈云
肺家穀也

益氣補中。食多昏。五臟貪眠。食久緩筋。骨絕脉。小兒食足難健步。猶大食脚忽偏斜。儻資克餐。務所忌。○相類又有三米

青粱

白粱

黃粱

味俱甘。微溫。粒比粟頗大。夏食清爽。因

粱米




名曰粱。古稱膏粱之家。亦緣食美而養厚也。但損地力。收少。以致種者罕稀。謂胃和脾力倍諸穀。青白略次。惟黃獨優。蓋得上中和之氣多爾。○

稷米

亦甚香美。苗蘆與黍相同。北人名烏。南人名穄。但農家不甚珍此。惟略種。

以備荒年。為飯不粘。亦益脾胃。

穀
稷米



謨 按天生五穀。俱能養人。其甚益胃補脾。無過粳與粟也。日資食用。誠寄死生。蓋因得天地中和之氣最多。與造化生育之功相等。非比他物。可以名言。故今南人食粳為常。北人食粟不缺。雖云地方種蒔相宜。實亦本諸此也。

黍米

粟米 味甘氣平無毒。一名御米。處處有之。人家園亭多栽。飭花開紅白色二種。子結千百粒一穗。又名米穠。

細如毫髮。凡入藥劑亦有奇功。妨動氣膀胱。切不宜多用。主胸膈稠痰凝滯。噎塞致食反回。治丹石藥服過多。發揚令食不下。並和竹瀝煮粥。月旋調理自安。**穀** 泡去淨膜筋蜜隨宜拌炊。其性多澀。甚固大腸。久渴捷方。虛嗽要藥。米穀一兩。烏梅肉三錢研末。以桑白皮煎湯調服。功效濕熱渴瀉。須禁服。莫加誤用。却除殺人如刃。

鶴粟米



雜穀米

並性寒無毒。各出產不同。但遇兌年可充糧食。

○**蕎米**

水田稭子產。久食不饑。

○**茭米**

湖泊茭草生。

古稱美饌

○**狼尾子米**

似麥粒略小

○**荳草子米**

如杭米甚粘。

○**稗子米**

味脆氣辛。

○**東稻米**

輕身健

雜穀米



步河西人語曰。貸我東鹽。償爾田糧。正此是也。

生大豆

味甘氣平無毒。原產泰山平澤。今則處處有之。黑白種殊。惟取黑者入藥。大小顆異。須求小粒煎湯。

累小
者為

推豆人惡龍膽五參藥方功

草龍膽大參沙參宜前烏杏牡草仁壯蟲

者為

甘草片煎。解飲饌中毒。丹石藥毒立効。合飯搗羅繩疽消腫。婦人陰戶腫亦可納之。煎水飲。殺鬼疰止癰。脚筋

痙疼。勿吝服也。炒研

豆屑

湯調下咽。消食免膨脹。熱除痺。又炒黑煙未斷。乘熱投

淋酒

中

即古方豆淋
一名紫酒

主癰

癥。風癰㾓干理。產後風中抽搐。以水瀆生芽菜。

大豆

黃卷立名去濕。揮骨攀疼。散五臟胃氣結積。

豆豉

條蒸熟。食鹽江石每製賣極乏味。淡無鹽入藥方驗。雖理癰氣專治傷寒。佐葱白散寒熱。頭疼助施子除虛煩懊

憊。足冷痛甚。浸醉酒可嘗。血瘀疼多。同薤白煮服仍安。胎孕文科當知。

豆腐

性寒亦動正氣食多積聚蘿蔔能

消癰

善理三物

可代米糧。乃豆炒和大棗肉同搗。

豆黃

亦治濕癰

製黃末合煉猪膏為丸。

豆醬

拌白麪會餅

曬成。入藥塗風癰。拔蟲最驗。

炒熟豆

嬰兒勿食。多食恐壅氣。咽喉塞難醫。

生大豆

日發醫藥白文

卷之四

中華書局影印

上海圖書出版社

1996年1月

印

次

三

印

次

三

謨

按豆性和平。炒食則熱。煮食則寒。牛食之溫。馬食之涼。一體之中。而有數等之効。且為食藥尤著。各用治病邪。亦極要劑。又燂牛肉同煮。能試瘟毒有無。無毒豆煮鮮黃。有毒豆變黯黑。免致中害。誠益世人。但據補脾

養胃之功。概未有。一言爾。古嘗以菽名之。是亦伯叔之義。謂較諸穀亞之之辭。

赤小豆

味辛甘酸氣溫而平。陰中之陽無毒。地土各處俱種。臍脂赤者為良。驢食腳輕。人食腳重。外科稱要劑。脚氣為捷方。散癰腫。未調鷄子清籩。下水氣。來入通草湯服。小兒急黃爛瘡。取汁洗之。不過三度。大人酒醉燥熱。煎汁飲下。只消一甌。和桑白皮煎。治濕癰延手足。脹大。同活鱗魚煮。療腳氣入臍腹突高。但專利水逐津。久服令人

枯燥

赤豆粉

赤豆葉

止小便數頻

腐婢

花名。因氣腐臭。雖稱卑賤。解酒誠良。共葛花煎。嘗任

酒多不醉。

○又種

赤豆

卷小圓珠。甘皮寒肉平。能行十二經絡。煎湯解酒煩熱。兼除作

粉

敷腫癰丹毒。且

壓益氣力。潤皮肉。厚腸胃。養精神。五臟能和。常食不患。筆枕夜卧。明目疏風。

花

採曝收藏。解醒湯亦用。

○白豆

色白。氣味平鹹。因走腎經。故云腎殼。孫思邈曰。此腎殼。家教腎病宜食。殺鬼氣。益腎。緩腸胃。調中。

葉

下氣。

和五臟。尤堅嫩。作蔬生啖之。益妙。

○豌豆

即蠶豆別號。益中而榮衛。兼謂作醬。猶佳。發氣須記。

○刀豆

長有尺許。亦堪入醬用之。

仍有

筋豆

蛾眉豆

虎瓜豆


羊眼豆

只可供茶。別無他用。

赤小豆



腐婢



山蘿豆 味甘氣微溫無毒。園圃俱種苗蔓引長開花紫白兩般。結實黑白二種寶藏莢內。秋老採收。白者蘿豆名。黑者鵲豆喚。惟白入藥下氣和中。霍亂吐逆能除。河豚酒毒並解。加十味香薷飲內治暑殊功。佐參苓白朮散中止渴立効。

花

主赤白帶干

暴乾研末
米泔服

葉

敷蛇蟲咬傷。

如諸搘附

赤小豆

白蘿豆



白油麻

味甘生則氣寒。炒則氣熱無毒。在處俱有夏種秋收。行風氣。併頭面浮風。治虛勞及身體客熱。滑腸胃通。

便閉結。利血脉潤髮枯焦。勿久食之。抽入肌肉生者嚼爛。堪敷頭瘡。葉搗和漿水沐頭。亦能去頭風潤髮。麻油

性冷。食物資調經宿必致熱為佳。生食恐動氣反害。入藥極病。惟益外科治一切惡瘍。下三焦熱毒。推子胞催產。搽疥癬殺蟲煎滾沸。醉酒攪嘗。取微汗。散除背癰外。腫合鴉彈丸。服油一合。鴉彈二枚。大渴攻下熱毒。內疽蛇入耳中。枕煎餅自出。髮成癥痛。飲滿碗吐安。大便枯燥難通。吹入穀道即潤。用人參汗湯口以根管枯穀。小兒閼脹。此法極佳。陳者教嘗。生肌長肉。煎炒少食。與火無殊。脾病及齒病人全忌。切勿沾口。

白油麻



胡麻

一名味甘氣平無毒。原出胡地大宛。張騫始得種歸。粒大而肥與麻相類。因在胡產。故名胡麻。八穀之中。惟

此大勝。又名巨勝。美之之辭。此說所傳。本於陶註。世謂夫婦同種。生而茂熟倍收。上黨。襄陽。郊園並多種蒼葉

嫩。可為菜。麻乃作英中藏。黑者良。白者劣。詩云。松下飯胡麻。即此是也。仙經甚重。茯苓相宜。蒸熟堪補虛羸。且耐

饑渴。寒暑填胸。體堅筋骨。益氣力。長肌膚。明目輕身。近年不老。生者嚼塗瘡腫。髡髮亦重生。小兒頭瘡。及浸淫

惡瘍立効。婦人陰腫。併金瘡。疔腫。功火灼爛延。亦堪敷愈。根油可食。滑腸下胎。甚良。採花陰乾。清汁搜麴。

極軟苗葉收採又名青囊曾載方書亦資極治生五臟邪氣而風寒濕痺兼顧益元陽其肌肉髓腦補

泡水洗頭髮常潤煎湯灌病中即甦。

嫩葉可食。根可入藥。子可炒熟研末。酒浸服。

嫩葉可食。根可入藥。子可炒熟研末。酒浸服。

胡麻



談按胡麻一名巨勝本經只此附載陶註亦已釋明後因仙方有服餌胡麻巨勝二法小有差殊以茲諸家辨

辯論不一有曰莖圓者為胡麻莖方者名巨勝有曰作角八棱而色紫黑者名胡麻兩頭尖銳作角七稜而色純赤者名巨勝味兼澀酸有曰胡麻別名藤葛巨勝別名狗葛雖然一物而種之有二者固亦有之如天雄附小草之類形狀異主治差載諸本經之亦各列著採入藥不得不分是則雖附二名且同一治形色不等亦物之常種類訛真便可行採用何必細辯孰為巨勝孰為胡麻帝鑒本圖有何益爾。

火麻子

味甘氣平無毒鄉落俱有平地汋我根實花莖依時收採各有用處並無棄遺。

麻骨

可作炬心

麻皮

堪績布疋

麻子

入藥修製宜精始用帛包浸沸湯待冷檢出次以繩吊懸井內隔水勿沾務過一宵方取曝日

候乾燥置平地西壓重板揩淨殼皮擣起細仁隨宜索効或攪粳米煮粥或佐血藥為丸經入陽明大腸及足太

陰脾臟。惡疾芩一味。牡蠣白薇益氣補中。催生下乳去中風出汗皮膚頑痺。潤大腸風熱結滯便難。止消渴而小水能行。破積血而血脉可復。胎逆橫生易順。產後餘疾總除。和菖蒲鬼臼為丸吞服即見鬼魅。

要見鬼者用各等分作丸。彈大每朝向日服一丸。滿百日即見鬼也。合豆子頭髮着井。祝効能辟痘瘍。

降夜四更取麻子豆子各二七粒。家人頭髮少許。仍作沐湯。頭髮滋潤。久服肥健不老。神仙重壓取油亦能油物。

麻花

味苦性熱。堪調經水不通。颶惡風黑色遍身。散諸風癰瘍難治。


麻根煮服。更通石淋。除難產帶下崩中。逐蹠折過打瘀血。

麻葉

搗汁。又殺蛇蟲。或被蠍傷。敷之即

効。麻沸湯專主虛熱。潰麻汁善解渴消。

火麻子



神農

味甘、氣平無毒。六月六日製造方宜曝乾。仍續月深入藥須炒黃色。助人之真氣。走陽明胃經。下氣調中。止渴開胃。化水穀。消宿食。破癰結。逐積痰。療婦人胎動不安。治小兒腹脹堅滿。

○酒糊

係諸藥合造。味辛而性氣

太溫落胎兼下鬼胎下氣并驅冷氣酒疾尤効。宿食竟消。六畜悞食米多脹滿欲死急研煎嚥下即解回生。

夢藥

謨按六月六日造神麪者謂諸神集會此日故也所用藥料各肖神名當此日之造成纔可以名神麪儻或過此雖但無靈抑不得以神名也其方用白麵一斤以象白虎薑甘草自然汁三升以象勾陳野蓼自然汁四升以象騰蛇青蒿自然汁三升以象青龍杏仁去皮尖四升以象玄武赤小豆煮軟熟去皮三升以象朱雀一如坐剗法式造備灑乾收貯待用今之賣家只蓼麵為之既不依方又不按日何得以取効乎醫者見其不真每以酒麪代用亦失原造之意矣。

酒

味苦甘辛氣大熱有毒釀非一等。

糖水栗米林火
黍水立可釀生名亦多般
蒸三酒主兒酒如此多之不能盡之惟糯米麵麴

為良能引經行藥勢最捷因走諸經不止稱與附子同功味辛甘苦相殊治上中下分用辛者能散通行一身之表直至極高頂頭甘者能緩居中苦者能下淡則竟利小便而速下也少飲有節養脾扶肝駐顏色榮肌膚通血脉厚腸胃除霧露瘴氣敵風雪寒威諸惡立敵百邪竟辟消愁遣興揚意宣言雖然佳釀常稱猶有狂藥別號若恣飲助火則亂性損身爛胃腐腸熬筋潰髓傷神減壽為害匪輕儻入藥共釀凡主治又異薑酒日飲大補元

紫酒

即三
淋酒

理癩癰偏風

葱豉酒

解煩熱而散風寒

桑椹酒

益五臟以明耳目

狗肉汁釀酒

日飲大補元

陽。

葡萄肉浸酒

時嘗甚消瘀癥

牛膝乾地黃酒

更妙漸滋陰衰

枸杞仙靈脾酒

尤佳專扶陽痿又等

社酒

亦有小能指納嬰兒口中可令速語口含噴屋四壁堪逐蚊蠅。

晉跌傷行瘀止痛亦駁蛇毒仍會凍瘡。

夢藥

晉跌傷行瘀止痛亦駁蛇毒仍會凍瘡。

謨按大寒凝海。惟酒不水。因性熱多。獨異群物。丹溪亦曰酒乃濕中發熱。近於相火。醉後顫慄即此可知。正所謂惡寒非寒。明是熱證然也。性卻喜升。氣必隨轉。瘀壅上膈。溺澁下焦。肺受賊邪。金體大燥。寒涼恣飲。熱鬱于中。肺氣得之。尤大傷耗。其始也病淺。或嘔吐。或自汗。或瘡疥。或鼻皺。或渴澁。或心脾痛。尚可散而出也。其久也病深。或為消渴。為內疽。為肺痿。為痔漏。為鼓脹。為黃疸。為失明。為孝喘。為勞嗽。為吐衄。為癲癇。為難治之病。儻非具眼。未易處治。可不慎乎。

醋

一、味酸甘。氣溫無毒。造有數種。因著諸名。

米醋、麥醋、麴醋、桃醋、葡萄醋、大棗葉蜜醋。

革醋及櫟櫟等醋。令煮者。俱極烈。

入藥沽米醋佳。餘者不取。

入藥。不可取。

効得年久妙。散水氣殺邪毒。消癰腫。斂咽瘡。散胃脘氣疼。併聖積癥塊氣疼。槐劑吞服。治產後血暈。及傷濕金瘡血暈。淬氣熏蒸。阿司匹林。瀉黃藥皮含之。口瘡堪愈。煮香附子丸服。鬱痛能除。煎大黃。刲痃癖如神。摩南星。敷瘤腫立効。又調雄黃細末。蜂蠭蛇虺可塗。牛馬瘦侵噬之即愈。切忌蛤肉同食。造飲餌者須知。惟入肝經。宜為引使。不利男子。專益女人。

謨

桂母溪曰。醋味酸甘。調和魚肉蔬菜。儘可適口。但致疾以漸。人所不知。蓋酸收也。甘滯也。苟遠而不用。亦卻疾一端。然食多齒軟者。因水生木。水氣弱木氣盛。故如是爾。齒屬腎水。酸助肝木。安得不然。

醬

味鹹酸氣冷利無毒。所造弗一。其用亦殊。魚肉造者呼為醢。充庖厨妙。豆麵造者名曰醬。入藥劑靈。勿取新鮮。惟尚陳久。殺諸蟲蛇蠍蜂毒立効。解白藥蔬菜蕈毒殊功。疥癬略塗。瘻癰如刲。聖人謂不得其醬不食。意欲五味調和。五臟悅受。斯亦安樂之一端也。○榆仁醬

味甚辛。食下通便。除心腹惡氣。○蕪荑醬

氣略臭。食多落髮。

發小兒無事

飴糖

味甘苦。氣微溫。無毒。稠粘如粥。故名曰飴糖。係糯米或粟熬成。入脾能補虛乏。因色紫類琥珀。方中又謂膠飴。乾枯名錫。不入湯藥。和脾潤肺。止渴消痰。建中湯內用之。蓋亦取其甘緩。治喉酸魚骨。療悶呑錢環。中滿莫加區吐切忌。小兒多食損齒生蟲。丹溪書內曾云大發濕中之熱。

水水

味甘酸。氣微溫。無毒。所造之法。臘仙江西王備云。節擇清明。熟炊粟飯。乘熱投硃缸內。冷水浸五六朝。味漸酸而生白花。色類漿故名漿水。或點熟當茶飲下。或薄暮作粥啜之。醒睡除煩。消食止渴。調和臟腑。滑白肌膚。霍亂立建神功。瀉痢即臻速効。

水醬

名咸水者。至冷孕婦忌嘗。

卷終

水通甘草湯。治心脾虛寒。口渴口干。舌苔白滑。脉象虛大。黃芩去皮。研細。甘草。去根皮。研細。大黃。去皮。研細。白芍。去頭尾。研細。甘草。去根皮。研細。水通甘草湯。治心脾虛寒。口渴口干。舌苔白滑。脉象虛大。黃芩去皮。研細。甘草。去根皮。研細。白芍。去頭尾。研細。水通甘草湯。治心脾虛寒。口渴口干。舌苔白滑。脉象虛大。黃芩去皮。研細。甘草。去根皮。研細。白芍。去頭尾。研細。

圖像本草蒙筌卷之六

黑山野人廣目所著本草蒙筌

門生

婿胡一貫

校刊

歙邑葉禁

鮑倚

新安陳嘉謨廷采纂輯

潭陽後學劉孔敦

若樸增補

中醫

菜部

冬葵子

臣

葵菜子也。味甘氣寒。性滑利無毒。主五臟六腑寒熱。羸瘦五癰利小便。療婦人乳難。內閉久服。堅骨長

肌肉。輕身延年。生少室山。今處處有之。十二月採黃岑為之使。陶隱居云。其子是秋種葵覆養經云。冬至春作子者。謂

之冬葵子。古方入藥用最多。苗葉作菜茹更甚美。大抵性滑利。能宣通積壅。服丹石人尤宜煮汁單飲亦佳。仍利

小腸。孕婦臨產煮葉食之。則胎滑易生。曝乾葉及燒灰。同作末。治金瘡。或煮汁飲。主治時行黃病。生葵菜葉絞汁

少服治小兒發癩。散惡毒氣根

治消渴及口吻瘡。

燒灰傳之。療瘡惡瘡俱効。小兒吞錢煮汁飲之立出。凡患一

切癰腫無頭。以葵子一粒。新汲水吞之。須臾立破。如要破處多逐粒加服之。凡婦人倒生手足冷。口噤。以葵子炒。

分黃搗末二錢酒調服則順。妊娠患淋。葵子一升水三升。煮取二升。分為二服。無葵子用葵根一把。亦効。凡卒關

格。大小便不通。支滿欲死。用葵子二升水四升。煮取一升。頓服。小兒死腹中。葵子末酒調服。若口噤不開。格開灌

之。藥下即活。

冬葵子



薑

通陽神明，宜啖。春初辟風，且助生發。勿食秋後，減氣猶復無元。夜氣欲收，尤全禁。忘論語雖曰：不微薑食，然必

食之以時，又不可過於多爾。

薑屑

比乾薑不熟，和酒服，能治偏風。薑皮作散，調

五味

堪消浮腫。○去皮日曝，又名

乾薑


漢書乾薑法以水煎，三日去其水，逐流，千錢中二日乃止。乾薑味辛，炮則味苦，氣溫大熱，氣味厚，半浮半沉，陽中陰也。使惡併制並與前同。乾辛專竄而不收，堪治表，解散風寒濕痺，鼻塞頭痛，發熱狂邪，犯苦能止而不移，可溫

中，調理痼冷沉寒，霍亂腹痛，吐瀉之疾，表證肺寒，欬嗽，仗五味子相助建功。裏證脉絕無陽，資黑附子為引，取効。

若療血虛寒熱，加入補陰藥煎，能引血藥上升，入於氣分，生血。故產血去多，熱發，躁盛者，信用治之而弗疑也。炒黑止唾血，良。煨研，塞水渴，渴渴妙。遇陰陽易證，用取汁二差。一云渴脾，非渴正氣，蓋脾中寒濕，須乾薑辛熱，

以燥之，故曰瀉耳。


生薑



涪州生薑



乾薑



白芥

味辛氣濕無毒原種來從西戎。白脆作茹甚美冷氣堪卻五臟能安。

子 生北他芥略麌色白與梁米相類

歐症氣最辟鬼邪研醋敷射工煎液消痰癬。久瘡蒸成癬塊須此敷除皮裏膜外發涎必用引達故三子養親湯方中加蘿蔔子消食蘇子定喘此卻消痰是皆切中老人病也。○

青芥

極辣似菘有毛細葉者殺人大葉者為

美生食發丹石發毒煮食動膈氣動風合兔肉同餐成惡瘡尤驗亦堪主療嘗載本經利竅明耳目溫中歸鼻除邪氣止效子細青色作醬甚香撲損瘀血冷疼生薑研貼癩癬風毒腫痛藥和敷酒調末下咽心脾痛竟止。

○又紫芥

花芥

石芥

種卻多般惟採取作茹作葷不復分別。

白芥

白

芥



芥根

味辛甘氣溫屬土有金與水無毒南北郡州處處俱種。一名蘿蔔。逢冬後收根啖可生葉微須煮制白熟。

豆腐二毒忌何首烏地黃同餐倘誤犯之鬚髮易白消穀食去瘀癖止咳嗽解消渴搗生汁磨墨下咽止吐血去血甚捷。衍義云散氣用生薑下氣用茱萸但煮食多者亦停膈間以成溢飲之證蓋味甘性辛少故爾。

子

謂帶

欬下氣。功誠倒壁衝牆。水研服。即吐風痰。醋研敷。立消惡毒。○

蕪青

西地生葉。又名蔓青。

兩呼與菜菔全差。

毋以真認假。多種河朔可備饑年。昔諸葛亮出征駐營。每令兵士栽種。謂有六利。詳載史書。至今三蜀江陵。呼為諸葛菜也。宜常啖食。易至健肥。益氣通中。下氣消穀子。主黃疸利水。又治霍亂除膨。去目睛青盲。消癥瘕積聚。九蒸九曝。為粉服之。斷穀長生。研細入面脂中。搗皺轉潤。壓油搗面膏內。黑點回明。蜘蛛咬傷。搗末酒服。故蔓青園中無蜘蛛。是其相畏也。根治熱毒風腫。消渴亦可解除。但食之多令人脹滿。

菜菔根



忠

味辛氣溫。味薄氣厚。升也。陽也。無毒。四時常有。各處俱栽。每用食品中調和五味。同蜜菘菜啖。易致殺人。若服常山亦須戒忌。凡資治療。務取白根。入足陽明胃經。及手太陰肺臟。出汗疎通骨節。歸目竅逐肝邪。理霍亂筋轉。

難當。治傷寒頭痛如破。殺魚肉毒。通大小腸。散面目腫浮。止心腹急痛。去喉痺愈。金瘡安。妊娠塞血。腳氣。貴肫氣。速鬚煎可除。蛇傷蚯蚓傷。和鹽晝即解。功專發散。食多神昏。病屬氣虛。尤勿沾口。**葉**煎湯入乾薑黃芩共劑。洗瘡疥去風水腫如神。**花**同吳茱萸水煎。亦治心脾間痛甚。**實**補不足。溫中益精。**蔥汁**平溫。又主漏血。

洗瘡疥去風水腫如神。

同吳茱萸水煎。亦治心脾間痛甚。

補不足。溫中益精。**蔥汁**

平溫。又主漏血。

。

蔥實



一味辛微酸。氣溫性急。屬金。有水與土。無毒。各處鄉村俱種園圃。久刈不乏。故以韭菜名。字盡因之。亦合九敷。雖克菜品。最利病人。春食則香。夏食則臭。溫中下氣。歸心益陽。燭膀胱。和臟腑。除胸腹痃癖癪冷。止莖管白濁精遺。又搗如泥加鹽少許。蛇犬傷毒。作厚塗類楨立安。刑杖打血凝薄敷。拍即散。同鯽魚鮓煮食。斷卒下痢。同牛肉煮食。生寸白蟲食同蜜糖殺人。誠驗。病後食發困。酒後食昏神。久食過多。兩目易暗。**根汁**絞出。湯劑可加清胃脫瘀血。殊功下胸膈結氣。捷効。開中風。音失。消中惡。腹脹仍有一堆黃。未出糞土。研末作菹。悅口。每為祭品所珍食。

不益人。甚能滯氣。**子**止精滑。遺漏較渠根葉尤靈。

韭



薤

味辛苦。氣溫無毒。赤白殊種。家園交栽。白者雖辛不葷。赤者兼苦無味。其葉類韭。稍潤而光。故古云。薤露之言。以光滑難辨之義。千金言治肺喘急。亦取滑泄而然。為歸骨菜。芝入陽明。手脈頗利病者。但少煮嘗。除寒熱。調中去水氣。散結而寒止冷。濕肥健壯。生女婦帶下。久來治老幼減痢。後重諸瘡。中風寒水腫。生搗熱塗上立差。又療。



薤

湯火金瘡。和蜜搗敷即愈。新正宜食。辟屬駁邪。牛肉同餐。作癩成瘻。生噉引涕唾。多食防熱侵。骨鯁在喉。煮食即下。

蒜 即大味辛氣大溫屬火有毒大者曰葫。又種園內小者名蒜。自產山中端午採收性最熏臭為菜歸五臟入藥。

揮獨頭同黃連丸治腸風加平胃散治噎氣納兩鼻提魚骨梗即出置臭肉掩熏臭氣不聞散癰瘡瘻瘡除勞瘧。瘡瘻。辟痘瘡疫癟制蛇犬咬傷中脘卒得冷疼嚼之即解。旅途忽中暑毒用此可敵。癰疽初生急切橫片若痛灸至不痛不痛灸至痛來艾炷連燒以多為善。鼻衄不止快搗成膏左出塗左足心右出塗右足心兩鼻齊出雙足俱塗仍解蠱毒殺蟲更化肉積消殼生蠍傷肝氣損目久食傷肺脾引痰○**蒜**亦辛溫善治鷄瘕去溪毒惡載沙蟲。卻霍亂吐瀉轉筋。

謨 按丹溪云葫蒜屬火性熱善散快膈故人喜食之多用于暑月其傷脾傷氣之禍積久自熱化肉之功不足信也有志養生者宜自知警

蒜



甜瓜

味苦氣寒有小毒。村鄉園圃處處種栽。兩蒂兩鼻及沉水者殺人過食作膨即入水瀆便解。食鹽少許化水。

去跌打凝血。

子壓油為腸胃內壅要藥。水煎破結聚積膿。

莖

主鼻癰。

花

治心痛。

其

蒂

落任莖蔓者為美。

柳葉裏懸有風處吹乾俗呼苦丁香。

味是

堪為湧吐劑。

消身面浮腫水氣逐咽喉塞風痰身暴急黃。

同丁赤豆

研成末。

瓜蒂十四枚。桑米四十九粒。丁香一枚。為末含水搗一字取下。

石久不聞香臭尤驗。

但性急多損胃氣。

毒鬼疰止飽逆氣衝。又同黍米丁香研成末。和羊脂油搗敷患處。日三次久旋消熔逐胸中寒。除頭偏痛。殺蟲。

凡胃弱切忌煎嘗。雖有當吐之疴。必以人參蘆代。

○西瓜熟者性溫不寒。解夏中暑熱最靈。有天暑白虎湯之號。

仍療喉痺更止渴消。

號。仍療喉痺更止渴消。



甜

瓜

白冬瓜

味甘氣微寒無毒。園圃所栽處處俱有。實生蔓苗之下。長皮厚有毛。初則嫩青經霜老白。切片日曝乾。

軟可留。欲瘦輕健者多餐。望肥胖大者少啖。陰虛久病須全禁之。蓋入腸胃之中性走而急故也。壓丹石毒利大

小便。除臍下水脹成淋。止胸前煩悶作渴。薄置灑腫上頰易切薄塊置灌大散熱毒氣旋平。夏月生沸可摩。食魚

中毒即解。九月勿食。反胃免憂。和桐葉飼猪一冬勝糟糖長肉三倍。

藤燒灰洗黑點

葉搗汁殺蜂叮

皮入

面脂作丸。勸漱白繚用濕。子收剝殼仁研成霜亦作面脂。悅顏潤色。任為丸散。益壽輕身。越瓜即梢瓜另

名。色白味甘寒無異。頭尾相似。大者尺餘。越人當菜食之。善解酒毒。去熱煩渴止易小便來長。但發冷利冷中小兒夏月勿食。○黃瓜益火不宜食多。積瘀熱成瘡。動寒熱作瘡。發腳氣生瘡蟲忌醋和之。慎勿犯也。○絲瓜

性冷解毒。亦治痘瘡脚癰。多取燒灰敷上即効。瓠堪滌器枯者為宜。

只宜熟吃。以風晝晚同煮卷丁。香而妙。

毒蟲起坐。並用嫩黃瓜同煮卷丁。香而妙。

白

冬

瓜

走馬行血丹。因由帶根單內服。或研末。

水銀火毒土。墨條小炒圓三點。甚之麻多數粒。水銀火毒土。墨條小炒圓三點。

瓠

音味苦者氣寒毒有味甜者性冷毒無。我園圃俱有發苗葉不異。因大小結實故彼此僉名。長大類冬瓜者瓠。

稱圓矮似西瓜者匏。喚葫蘆。

腰細頭銳。

瓠子柄直底圓為菜惟甜者獨佳。治病分甜苦兩用。苦能下水令

吐。消面目四肢腫浮。甜可利水通淋。除心肺煩熱消渴。滴汁鼻內尤退急黃。

水煎清八即不黃水

皮煮熟解開熨小兒閃

澼瓠煮瀆陰處療小便閉難。

瓠子

根莖葉子皆入血分。

根

根及根莖皆入血分。

瓠子

根莖葉子皆入血分。

根及根莖皆入血分。

根

根及根莖皆入血分。

茄子

味甘氣寒無毒。一名落蘇。處處俱種。有紫黃白數種。惟黃茄子極潤。主寒熱去五種癆。若食多發痼疾易生。

小芥動大便。自裂茄

用之燒灰。堪敷乳成癰綻裂。

苦茄

摩醋癰腫亦敷。

根

及枯莖葉煎湯。冬月凍脚

瘡可潰。亦追風濕。曾載方書。煮醇酒蚤晚頻吞。俾脚膝屈伸復舊。

蒂

用燒灰存性。口吻瘡亦敷。差丹溪云。茄屬

土故甘。用治瘡毒。悉獲奇効者。甘以緩火愈也。



土爰白草。味甘性平。主寒熱。利小便。除風濕。止渴。解酒毒。

小根。味甘。性平。

茄。子。味甘。性平。

茄。子。

名也。白味甘。性平。頭毛相似。天名精。



蕨 味甘氣寒性滑利無毒。深谷多生在處俱有。如足之蕨故以蕨名。三月採收作茹可食。寒能去暴熱。甘以利小便。

氣壅經絡者旋除。毒延筋骨者易去。但衰陽事落髮仍癩脚膝昏眸切勿過餐甚非良物。

根 挖造粉堪以代糧。

蕨。味甘。性平。

土爰白。味甘。性平。

小根。味甘。性平。

茄。子。味甘。性平。



雖免啼饑不能生肉。

花 留年久能治脫肛。研細敷之。即時收澁。

薇 較蕨差大。味略苦有芒。亦潤大腸調中。

尤消浮腫利水。夷齊日採久食不饑。武王憇之。不食而死。

讀按搜神記曰。郗鑒鎮丹徒。二月出獵。甲士折一枚食之。

覺心中淡淡成疾。後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨。遂

明此物不可以食。今山間人多用作茹。或以醋澆食之。亦不可不鑒此也。

兒實

味甘氣寒無毒。園圃多種。夏月纔生入割極毒。惟取其實除邪利大便小水明目退白翳青盲殺蠶蟲去寒。

熟葉忌與薑同食。又入血分通經逐瘀。殊功下胎孕最捷。孕婦臨產煮食易來勿多食之。冷中損腹。

○一種馬

齒莧

性滑野地最多。主治與莧實頗同。瘡科尤善。杖瘡敷散血疔瘡敷出根。

和桃核封瘡處一方用燒灰陳醋淬先炙後封根即出


癰瘡

痘瘡風結瘡。用敷愈。馬咬馬汗射工毒並取塗。種有兩般。惟小葉節間有水銀者妙。葉大者不可用。感多陰氣。傷生

食鴉蒜先拌製過佳。

兒實齒莧

實



齒 莧



兒 實

荽 味辛氣溫微毒。此係薰菜，帶種冬時，釀酒點茶，生啖最妙。善通氣小腹，能拔熱四肢，開心竅。上止頭疼，散沙
疹。內消穀食，利五臟，順二腸，豌痘瘡出不齊，用之煎酒可噴。多食發腳氣，腋臭。久食損精神，健忘，食同邪蒿，令人

汗臭根 食之發痼疾。**子** 煎油敷疮瘡。

蘿蔔 味甘氣平，無毒。多生池澤，一名水英。葉似芻蕘，甚香。花開白色無實。其葉下帶有蟲子，視之儻悞，取不免為
殃。凡採之時勿厭洗淨，作羹，甘味爽口。置酒醬，香氣漂人，能益氣養精，令肥健。嗜食止煩渴，殺諸石藥毒，保血
脉。退五腫急黃，利小大二腸，亦利口齒赤沃帶下。仍止崩中。小兒身暑熱可歟。大人酒後熱能解。勿和醋食，損齒。
須防八月食之，患蛇龍瘻，其時龍帶精入牙中故也。



卷終

水英根，味辛氣溫，無毒。多生池澤，一名水英。葉似芻蕘，甚香。花開白色無實。其葉下帶有蟲子，視之儻悞，取不免為
殃。凡採之時勿厭洗淨，作羹，甘味爽口。置酒醬，香氣漂人，能益氣養精，令肥健。嗜食止煩渴，殺諸石藥毒，保血
脉。退五腫急黃，利小大二腸，亦利口齒赤沃帶下。仍止崩中。小兒身暑熱可歟。大人酒後熱能解。勿和醋食，損齒。
須防八月食之，患蛇龍瘻，其時龍帶精入牙中故也。

水英根，味辛氣溫，無毒。多生池澤，一名水英。葉似芻蕘，甚香。花開白色無實。其葉下帶有蟲子，視之儻悞，取不免為
殃。凡採之時勿厭洗淨，作羹，甘味爽口。置酒醬，香氣漂人，能益氣養精，令肥健。嗜食止煩渴，殺諸石藥毒，保血
脉。退五腫急黃，利小大二腸，亦利口齒赤沃帶下。仍止崩中。小兒身暑熱可歟。大人酒後熱能解。勿和醋食，損齒。
須防八月食之，患蛇龍瘻，其時龍帶精入牙中故也。

圖像本草蒙筌卷之七

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生
壻胡一貫
姪晨
欽色葉裴
鮑倚
陽後學劉孔敦
若樸
增補

菓部

青橘皮

味辛苦氣寒味厚沉也陰也陰中之陽無毒浙郡俱生廣州獨勝本與橘紅同種此未成熟落之皮繁厚

色則純青頭破裂狀如蓮瓣去穰咀薄潤醋炒乾湯液云陳皮治高青皮治低亦以功力大小不同故爾入火陽三焦膽腑又厥陰肝臟引經削堅癖小腹中溫瘡熱盛者莫缺患瘡熱取經久不愈必結癖塊俗云瘡母宜清脾湯多服內有青皮疏利肝脾則癖自不結也破

滯氣左脇下鬱怒痛甚者湧投劫疝疏肝消食寬胃病已切勿過服恐損真氣先防老弱虛羸尤當全戒○近冬

赤熟薄皮細紋新採者名橘紅氣味稍緩胃虛氣弱用宜久藏者名陳皮

氣味辛烈痰實氣壅服妙東垣又

曰留白則補胃和中去白則消痰利滯治雖分二用不宜單君白不則益脾單則損脾佐甘草則補肺否則渴肺同竹茹治飢逆因熱同乾薑治飢逆因寒止脚氣衝心除膀胱留熱利小水通五淋解酒毒去寸白核研仁調

醇酒飲酸腰痛疝痛神丹葉引經以肝氣行散乳癰肠聖藥橘裏上筋膜微炒醉嘔吐發渴急煎肉

多食

生玻○

乳柏子

味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止渴利小便多食令人脾冷發痼癖大腸淺又有

沙柏青

相山相

體性相類惟山相皮療咽喉痛効。餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未

經霜時猶酸霜後甚甜故名柑子。生嶺南江南冷無毒皮及肉作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗。乳柑子令人多作橘皮售於人不可不擇也。相皮不苦橘皮極苦至熟亦苦。

橘



柚



核桃仁

使味苦甘氣平苦重於甘陰中陽也無毒入手足厥陰經以他水接成者形雖肥美味失本性此等藥中不可用當以一生者為佳七月採核破之取仁陰乾湯浸去皮尖研如泥用主瘀血血閉血結血燥癥瘕瘕邪氣殺

小蟲通潤大便除卒暴擊血通月水止痛苦以破滯血甘以生新血花味苦三月三日採陰乾殺痘惡鬼令人好顏色除水腫石淋利大小便下三蟲酒瀆服之除百病葉味苦辛生戶蟲出瘡中蟲取汁飲之又諸蟲入耳取桃葉熟炒塞兩耳即出女人陰中生瘡如蟲咬疼痛者可生搗葉綿裹納陰中三四易瘡枝味苦治卒心

取桃葉熟炒塞兩耳即出女人陰中生瘡如蟲咬疼痛者可生搗葉綿裹納陰中三四易瘡

枝味苦治卒心

痛取東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大效。以五月五日取東向桃枝曰未出時。作三寸木人著衣帶。

中令人不忘。凡天行疫癘者。常以東向桃枝細剉煮浴佳。又方補心虛健忘。令耳目聰明。用戊子日。取東引桃枝。或着衣帶中亦効。

實 息啖作熟。發丹石於心胸。肺病宜食生者。損人食熟入水浴床。樹不落者是春初採取辟惡殺邪。吐血用之燒灰。米湯調服立止。

下淋破血。中惡鍊之日服。誠能保中不飢。

桃蠹

食皮長蟲亦殺鬼惡。

桃毛

桃上毛羽更破癩瘻。

樹白皮

治

醫生齒間 桃寄生 療蟲中腹內。

謨 桃者五木之精。故能辟惡。凡患屍疰鬼疰一切染祟之病。採枝擊體。亦能殺邪。正猶新春家家門上用作符板無非厭驅邪氣使鬼畏也。

桃核仁



杏核仁 味甘苦氣溫可升可降陰中陽也有小毒樹種山傍園側家園種者實結生青熟黃五月摘收堪為藥品。

凡資極治。惟取核仁所惡藥有三般。黃耆黃芩乾葛。解錫毒得火良。單仁者。泡去皮尖。炒入藥雙仁者。惟堪毒狗。憒服殺人。專入太陰肺經。乃為利下之劑。除胸中氣逆喘促。止咳嗽墜痰。潤大腸氣閉便難。逐貢豚散結。研納女人陰戶。又治發癢蟲疽。根主墮胎。花治厥逆。實咬多目聾。傷筋骨。傷神。葉逢端午採收。煎湯洗眼。止淚。

謙按東垣云。杏仁下喘。用治氣也。桃仁癲狂。用治血也。俱治大便閉燥。但有氣血之分。晝則便難。行陽氣也。夜則便難行陰血也。年高人便閉。不可泄者。脉浮在氣。宜杏仁。陳皮治之。脉沉在血。宜桃仁。陳皮治之。所以俱用陳皮者。以其手陽明病與手太陰相為表裏。故用之。

杏核仁



木瓜寶

味酸。氣溫無毒。各處俱產宣州獨良。經入手足太陰。用之勿犯鐵器。氣脫能固。氣滯能和平胃以滋脾。益肺而去濕。助殼氣調榮衛。除霍亂。止轉筋。凡轉筋時。但呼其名。及書不脚氣能敵。水痢可禁。衍義云。木瓜得木之

正故入肝益筋與血腰背脚膝無力不可缺也。以鉛霜蜜之則失酸味受金之制故爾。

枝大者可作策杖本

乾者堪造桶盆取根葉煎湯淋足腰已癢

木瓜實



實味酸氣平可升可降陽也無毒處處栽植夏月摘收火熏乾者色烏日曝者色白因製有二故名不同凡欲之俱宜去核
烏梅收斂肺氣解渴除煩固澁大腸禁痢止渴卻傷寒溫瘡逐虛勞骨蒸同建茶乾薑為丸治



朴思人康大類黑桑子酒

四時

張氏本草

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

休息久痢尤驗。黑瘻可脫。蟲痛能安。

白梅

杵爛成膏。敷攻惡毒。治婦人乳癰最効。拔肉中箭鏃如神。中風緊閉

牙關急。宜將肉摩擦葉煮汁服。久痢亦除。

一味甘微酸。氣寒無毒。遠近俱生種類殊別。

鵝梨

出京郡。皮薄漿多。香最佳而味差短。

乳梨

今呼出宣

城屬南皮厚肉實。香不及而味極長。醫家相承二者為勝。並解酒病除渴。咸止欬嗽。消痰去客熱。心經鬱煩熱肺

臟。

消梨

蕭縣

屬山東

產搗汁主中風失音。

鹿梨

信州屬山西

生取皮治瘡癬疥癩。

桑梨皮

蜜煮潤乾燥咽

紫花梨

啖生卻結熱胸膈。

其他青皮梨

香水梨

棠梨

茅梨

種雖多品未聞能入藥焉勿恣啖

之。令人寒中。產婦切忌。金瘡弗宜。並屬血虛。故莫悞犯。

葉

者可治霍亂。亦堪作餓療風。

嘴首二姑各不同。



木
梨
實

謨按梨性冷利。食不益人。酒病彌佳。故稱快藥。食少難卻病。食多則動脾。凡百用之。須當斟酌。丹溪曰。梨者利

地疏利不行之謂也。

大棗

味甘氣平溫。氣厚屬土。有太陽也降也。無毒。其郡俱生。青州。

山

獨勝。末秋摘取。微火烘乾。多膏甚甜。形大。

核細。近折入藥。不負所名。

諸藥只載其名。惟
棗獨加大字故云。

忌生薑。殺烏毒。

烏頭
者也。

剪除內核。服免人煩。通九竅。略亞葛蒲。和百藥。

不讓甘草。養脾胃。益氣潤心肺。生津液。助諸經補五臟。中滿及熱疾。忌食。齒疼併風疾。禁嘗。

苦棗大寒。條棗中味苦者便是。寒邪外感。致熱伏臟腑者能醫。通大小便。去狂。

蕩煩渴。煮研代蜜丸。藥物佳。

棗核以口常含。受氣自生津液。陳年。

核中仁燔之味苦。

三歲良中惡腹內痛。服即

動臻葉。覆麻黃能令出汗。餘產因州土不一。各名且形狀亦殊。

○牙棗

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○羊矢棗

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

棗極甘美。

出安邑○東海棗

頭圓而形大類盞。

此棗五年結實形甚大者立克食用。不入藥煎。

一名邊眼
一名江棗

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

○

皮薄而皺。

出江南州蒸熟火烘。

○

實小而圓。

各處俱出波斯棗。

略尖長。

出廣州○鹿蠟棗

邊大而腰細似匏。

柿 味甘氣寒。屬金有土陰也。無毒。各處俱產。青州並前獨佳。雖多種類之名。並有收飲之義。屬金故也 潤心肺止嗽。開胃。

腕消痰腹內宿血旋除。口中吐血易止。解渴補虛勞不足。澁腸禁熱痢頻來。耳鼻氣可通。但忌蟹同食。誤犯痛渴。

為害睡輕○**紅柿** 忌醇酒共嘗。易醉人。且患心痛至死○

黃柿

和米粉蒸糗小兒啖。堪塞腸澼便紅○

鹿

氣平。久服有益。澁中厚腸胃。殺蟲潤

咽喉。火乾烏不佳。日乾白最美○**酥柿** 亦消宿血。健脾仍澁下焦○

柿蒂

療飢逆鹽○**柿霜** 治勞嗽効枯

枯

滑澤。古取臨書。水皮下血能醫。研細米飲調服。俗傳柿有七絕一壽。二多陰。三無鳥窠。四無蟲飾。五霜葉

可玩。六嘉實。七落葉肥大也。

葉 滑澤。古取臨書。水皮下血能醫。研細米飲調服。俗傳柿有七絕一壽。二多陰。三無鳥窠。四無蟲飾。五霜葉

可玩。六嘉實。七落葉肥大也。

柿 味鹹氣溫。屬水與土。無毒。濮陽范陽者最奇。兗州宣州者尤勝。他處雖產。總味不佳。秋採收藏。乾生任意。欲乾

大棗和甘。最平。惡瘧。分根。生者。味甘。熟者。味酸。

不更七日。著汗者。此是陽分病。生者。味甘。熟者。味酸。

熟者。味酸。人不可食。多。誤食。大寒。燒之。或煮水。入鹽。去火。或以水。洗。去火。或以百草。



收日露水氣全消。接風涼欲生收沙藏。新鮮常在蒸熟食滯氣懸膈。生者食發氣生蟲。曝乾食之下氣補益。小兒多食令齒不生。專走腎經。堪治腎病。健腰足助力。厚陽胃耐饑。生嚼塗筋骨碎疼。折傷消腫去瘀血。神妙逸風。

水氣切忌沾唇。**栗鈿**絲內三顆者為然。劈開取中一粒子纔是。製癩癰散血理筋骨風止疼。

火耳燒灰敷。**赤穀**止反胃消渴。煮汁研近肉薄皮和蜜塗面冷急縮亦奇。

樹白皮煮濃主沙蠶溪毒數種。

小者亦附其名。**真栗**江湖多子圓似豌豆粒。**○革栗**桂陽出實大如杏子仁。詩云樹之革栗是也**○茅栗**遍生江南似栗圓細。**○旋栗**惟產江北頂圓末尖。**○鈎栗**俗以甜櫧呼。又名巢厚陽胃肥體。**○櫟栗**人每苦櫧喚止渴病健行。造粉亦佳。涼心益胃。皮葉入水煎汁。產血不止可嘗。



栗

要石榴

味甘酸無毒。原種本生西域。張騫為使得來在處園林。裁為翫飾。花開紅者結實味甘可為藥。露酒花開

者實結酸味。堪入藥。根治瘧疾。子啖生津大能解渴。過食損齒變黑。柳又損肺當防。

殼亦單方能禁精漏治筋骨。

風往痛及脚膝不能行步宜煎。療赤白痢。澆湯。併眼目時流冷淚。堪洗。尤染皓髮。仍理蟲牙。花瓣研吹鼻中即

止血神効。礦金瘡未愈。和石灰搗敷。又東行根取皮煎濃液。寸白蟲蛇蟲極妙。

謨按丹溪云。燭者留也。味酸性滯。汁能戀膈成痰。病人固宜戒也。然觀損齒損肺之說。雖尋常人食多亦受其害。况病者乎。

安石榴



柳子

味甘苦。氣平無毒。雖出嶺南。尤盛交趾。木高若桄榔。無枝幹。旁生實。大類匏瓜。有籠皮外裹。葉在木杪。又似

東蒲。秋月採收。各有取用。殼鋸開作器。任酌酒啜茶。有毒則沸起。知勿服。無靈性不失。全人多涼而不失。失其本意也。

時啖益中氣虛弱。且卻癰疽偏風。皮煮湯止吐衄。來紅。兼理霍亂吐逆。燭如乳汁。氣亦醺人。塗鬚髮轉烏潤。口

喉不渴。交趾記曰。柳子中有酒飲之得醉是也。

荔枝肉以核爲核。核有兩瓣。外黑而內白。核中多肉。味甘酸。

性大熱。取核去肉。以水煮熟。可食。

或

水

火

水

火

水

火

水

火

水

火

赤茶木 柳子 金珠桂子 半夏白附

荔枝

荔枝肉

味甘微酸。氣溫升也。陽也。無毒。水大連抱。葉茂不凋。結實綴枝。多滿百斛。五月盡間盛熟。百鳥食之皆肥。

因其枝弱蒂牢。人難摘取。必以鋒刀利斧剗其枝。故以荔枝名也。巴蜀嶺南俱有。閩地產者獨佳。殼若新羅紋。狀類鷄卵。肉如白肪。玉勝蜜糖。核小與鷄舌同。曝乾留一年久。咸稱珍果。甘美益人。悅顏容。敵煩止渴。益智慧。

荔枝



健氣通神。丹溪又言此屬陽，主散無形質滯氣，癟贅赤腫，多啖能消。過度虛熱亦生。飲下蜜漿即解。

花併根

煎嚥。喉脾痛神方。核。煅存性酒調治卒心痛疝痛。

殼。燒解穢種痘宜求。

木。鋸作梳色赤堅勁。

龍眼肉

味甘氣平無毒。樹頗大葉微小。凌冬常青。實極圓。殼淡黃紋作鱗甲。肉甚薄。名亞荔枝。亦產蜀閨嶺南。荔枝過後纔熟。土人鄙之。又呼荔枝奴也。取肉入藥。因甘歸脾。古方歸脾湯中。功與人參並奏。本經一名益智。裨益脾之所藏。解毒去蟲。安志厭食。養肌肉。美顏色。除健忘。卻怔忡。多服強魄聰明。久服輕身不老。

交州荔枝肉。味甘氣平無毒。葉圓。殼淡黃。肉甚薄。名亞荔枝。亦產蜀閨嶺南。

荔枝肉

味甘氣平無毒。



一
赤葉味甘屬土與金無毒。多生永昌。

廣南

亦產各處。樹大連抱。葉密類杉。實生與橄欖同形。秋熟色紫褐而脆。

摘以文火烘燥。嚼甚甘美馨香。丹溪云。此肺家藥也。非火不可啖。經火則熟。生食不宜多。引火入肺。大腸受損。滑


渴難當。主五痔。能使去根。殺三蟲。旋化為水。助筋骨健。調榮衛行。忌同鵝肉食之。生瘦節風上壅。

木

紋細軟器。

四堪為

榧子



批杷葉

味苦氣平無毒。襄漢閩廣皆有近道。各處亦生。木高丈餘。四時不瘁。葉如鱸耳。背有黃毛。凡入劑中。惟採



枇杷

葉味苦氣平無毒。

襄漢之多生於山間。其葉大而圓。其花白。其果黃熟則甘。可食。其核可煎水服。治癰癧。

葉用以籠布拭去毛淨，搗薑汁浸後微黃，剉碎煎湯，偏理肺臟下氣，除嘔噦不已，解渴治熱嗽無休。

滋潤五臟，少食止吐止渴。多食發熱發瘧。不白皮亦入醫方。主吐逆不能下。

郁李仁

唐橘味酸苦，氣平降也。陰中陽也，無毒。山谷丘陵，每多種植。六月採實，碎核取仁，湯泡去皮，研爛方用。消浮腫，利小便，宜結氣腸中，立通關格。破血潤燥，亦易成功。若患齒斷腫痛，根煎濃汁可漱。風蟲牙痛，含口亦除。

實

小味甘紅熟堪噉。

郁李



蓮子

味甘遯，氣平寒，無毒。池塘栽，秋月採。生食能動氣，蒸食能養神。食不去心，恐成卒暴霍亂。取心，生研，亦

止產後渴消。產後瘀血去多，而渴研汁服，助氣。凡用極病，不可不識。利益十二經脉，血氣安靖，上下君相火刑，禁精濶清心，去腰痛止痢。槐煮粥，槐梗慢米煮漸開，耳目聰明，磨作飯，頤令肢體強健。蠟蜜丸服，耐老不饑。日服如常，退怒生喜，本經註云：鴈

食農田野。農中未
宣化者。猿含藏于石巖。經年未壞者得來處。常有之。

不逢陰雨。食之延壽無量。且悅顏色。堪作神像。又遇末秋。

就蓮中乾黑者。名

石蓮子

入水內竟沉之。

惟煎鹽鹵能浮。服更清心黑髮。

清心蓮子
惟用此

荷葉

味苦。安胎甚良。

瘡血逐。好血留。兼駁血痢。

蓮房

也燒灰。止血甚捷。胎孕稚胎衣下。並宜酒煎。

生者煎服

荷葉

破血止渴。曾載婦人

瘡血逐。好血留。兼駁血痢。

蓮房

也燒灰。止血甚捷。胎孕稚胎衣下。並宜酒煎。

生者煎服

荷葉

破血止渴。曾載婦人

良方。原易老枳。木丸用之。取引生火陽。經清氣雷頭風劑亦用。

因形類處。仰孟寰為雷。屬木化風。故假此引經索

効。

花瓣

忌地黃蒜。鎮心輕身駐顏。

花心

名佛座鬚。

佛座蓮花故云

益腎澁精。固體。藕甘寒。主血多驗。治療血遂散不

凝。止吐衄。血溢妄行。破產後血積。煩悶。

產中忌諸生冷。惟藕不忌。解酒毒。卻熱暑。金瘡生肌。和蜜嘗肥。腹臟不生諸蟲。煮熟啖

實下焦。大開胃脫。

節

同地黃搗汁。亦治口鼻來紅。入熱酒童便。取効驗更易。

中國。如多服。如久服。俱黑髮。悅澤顏容。

碧蓮花

出禁中。只可卜其祥瑞。不堪服餌。亦使知之。

紅蓮花

白蓮花

係胡人貢來

蓮 荷



鷄頭實

一名甘實。味甘氣平。屬土有水。無毒。處處池塘俱種。逢秋採實。乾形類鷄頭。故此為譽。須先春殼。纔可取仁。

煮熟食堪以代糧。生嚼食。動風冷氣。嬰兒食。形體矮小。能長大。故駐年耳。孟說云。與嬰兒食不老人食。壽歲延長。入藥可為散。為丸。


尋常任煮粥作餅。主濕痺。止腰痛。益精氣。令耳目聰明。強志。療頸癱瘓。補中除卒暴疾。久服不厭。漸作仙僊。

古方和金櫻子丸吞。故名曰水陸二僕舟也。嫩根乃名**筍菜**。小腹氣痛宜嘗。○又種水菱名曰**菱實**。

小腹氣痛宜嘗。○又種水菱名曰**菱實**。氣味相若。亦產池塘。有四角兩角不同。任生啖煮食隨用。不能治病。及有損人。令臟冷。損陽氣。壅莖。飲熱酒及薑湯可解。

啖多腹脹。亦用此消。

鷄頭實



實 芭




甘蔗

味甘氣平。無毒。多生閩蜀。種有二般。一種似竹箋長。名曰**竹蔗**。一種類菰細短。名**菰蔗**。為云。凡入藥中。搗

碎絞汁。丹溪醫案。每每用之。助脾氣和中。解酒毒。止渴。利大小腸。益氣。歐天行。熱定狂。臘月。窖諸糞坑。夏取汁服。尤妙。勿共酒食。令人發癩。○又有**砂糖**。糸汁熬出。殺疳蟲。潤肺。除寒熱。涼心。其筍食。則成血癥。同蒸食。則生沉。

瓣。小兒多食。損齒消肌。

甘 蕃



覆盆子

味甘氣平。微熱無毒。道傍田側處處有生苗長七八寸餘實結四五顆止。大若半彈而有蒂。

承之如微生
柿蒂狀

黑毛而中虛。去蒂中赤熟夏初。小兒競採。江南咸謂莓子。本經易名覆盆。因益腎易收小便人服之。當覆溺器由

此為譽。大能極病。益氣溫中。補虛續絕。安和五臟。悅澤肌膚。療中風發熱成驚。治腎傷精竭流滑。明目黑髮耐老。

輕身。男子久服強陰。女人多服結孕。接葉絞汁。堪滴目中。止冷淚浸淫。去赤花盲暗。○又種蛇莓。附地而生。

苗莖僅長寸餘。莖端只結一實。小而光潔。略異覆盆下有蛇藏切勿採食。殿蛇蟲咬毒最効。療射工溪毒亦良。○

仍有
蓬蘽

甘酸鹹味。莖葉疏疎類樹。枝枝有利軟柔。結實盈枝赤熟而攀蒂中實。俗呼樹莓。採食與覆盆同時。

安五臟益精氣長陰。悅顏色。強志力者有子。

謨

按覆盆蓬蘽本係兩種。本經不考。妄註蓬蘽即是覆盆一種二名。則甚誤也。殊不知蓬蘽枝莖類樹而葉長。

結實有百千顆。覆盆枝莖是草而短小。結實僅四五枝。蓬蘽赤熟攀蒂中實。而味酸。覆盆赤熟蒂脫中虛而味

甜大相差殊。何得混指。故特別白。以釋其疑。


覆

盆


子

金櫻子


味甘。微澀。氣平。溫無毒。叢生籬落山野。似小榴稍長。芒刺遍身。霜從紅熟。採收去淨刺核。任憑煎滾為丸。



蓬 萬



金 櫻 子



澁精滑自流。夢中精泄止。小便數去睡後尿遺。殺寸白蟲。寒休息痢。搗爛絞汁。用有兩般。熬稠糖。入酒鮮黃。調鐵。

粉染鬚潤黑。花收染皓髮亦驗。根煮殺蛇蟲尤靈。皮治帶下崩中。過煎服即止。

山查子 味甘辛。氣平。無毒。一名糖桂子。俗呼山裏紅。深谷沿生。立秋摘取。蒸熟去核。曝乾收藏。益小兒麻宿食積。

扶產婦除小兒枕疼。消帶血。理瘡瘍。行結氣。癩癩症。脾胃可健。膨脹立歟。煮肉火加須臾即爛。

山查子

新草中

本草

山查子

新草中

本草

櫟櫟

味酸甘。氣溫無毒。樹生開廣。似木穂子樹。端直而高。實成晚秋。如荳子狀。辦稜絕少。採之咀嚼。滿口生香。

開胃消酒食甚佳。止瀉解魚毒益妙。喉中魚梗。汁嚥亦除。若煮飲之。並解諸毒。丹溪曰。味溢而生甘。醉飽後宜之。


然性熱多食上壅。不可不知也。其木作櫟撥着魚。魚悉從水面浮出。物性相畏。又如是焉。凡中河虺魚毒者。用

此煎湯飲下即解



欒

欒



蜀荀

味甘酸氣平屬土有木與水火無毒張騫使西域得種始到中華由是州郡盡各栽養葉似蘿蔓而大苗成藤蔓極長實結類馬乳且圓秋熟色紫黑或白取汁釀酒留久愈香逐水氣利小便不來者殊功治時氣發瘡癆不出者立効倍力強志肥體耐饑多食卒煩悶眼昏因性專下走瀝道根煮濃汁細細飲之除妊娠子上衝心止霍亂熱甚作嘔。○

藤莖

中空相貫俗每呼為木通

凡暮溉其根至晨則水浸于中矣故通便甚驗與通草無殊。

○ 蘿蔓 即山荀葛釀酒尤極香美飲之久久亦能益人。

第二卷通草歌後 按宜參看。

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

白菓

白果

白果



白菓

一名銀杏

在處俱產

樹大而高。三更開花，三更結實。秋熟擊落，殼白肉青。生食載入喉，炒食味甘苦。少食堪點茶，屢酒多食則動風作痰。食消一千令人少死。陰毒之藥，不可不防。古方取其所能，僅治白濁瘦弱，小兒勿食。

極易發驚。

治中風癲癇。

一粒令人久安。

其根頭有白粉，味甘苦，性平。

可食。

根皮可作染料。

可作染料。

可作染料。

可作染料。

可作染料。

可作染料。

白藥

一名幾否。

五歲貯

童齒大而高，更開口。

舌實，根莖青紫，葉青黃，根白，味甘苦，性平。

可食。

根皮可作染料。

可作染料。

可作染料。

可作染料。

可作染料。

白藥



桃肉味甘氣溫無毒。地土俱生陝洛尤盛。株大葉厚結實有房。近冬採收碎殼取肉。煩食健生髮兼補下元。多食動風生痰且助腎火。燒擂細末合松脂敷癰瘍易癰人拔白鬚同胡粉納孔中即黑。傷損和醉酒熱服石淋。攪碎米煮嘗經脈堪通。血脉能潤。食齒細嚼立除。外包青皮壓油染鬚塗髮如漆。樹皮亦止水痢又染褐色尤奇。

不出者立効。

力強之用。

而效多者。

枝葉桃。

胡

桃

第二卷通草卷

像本草蒙筌卷之七終

圖像本草卷之八

新安陳嘉謨延采纂輯

門生

欽色葉斐

姪晨

校刊

潭陽後學劉孔毅

培樸

增補

石部

〔玉屑〕味甘氣平一云味鹹氣寒無毒為世珍寶多產藍田在長安顏色五般書傳詳載者如純漆赤者如鷄冠白頰截肪黃若蒸粟惟青玉其質溫潤而澤其音清越而長叩之即鳴自異群石玉工雕琢若如麻凡入劑中

色貴純白他色不用研絕細免致淋壅一況食玉當以消作水者如研粉末終使人牀壅惡麻角毋相和燒解渴咽喉除熱胃脘潤心神明目

沫毛髮減瘢助音聲定喘息久服勿已耐老輕身○又有「玉泉」乃玉泉液仙室池中者為上此最以法消

成者亦佳王可以烏米酒或苦酒地榆酒消之為粘一法玉屑一升地榆草稻米各一升取白露二升同置銅器中煮米熟玉屑化為水絞取汁名曰玉液是玉精華色甚明

微療百病尤妙愚款冬煖知骨強柔筋安魂定魄長肌肉益氣耐寒暑延年人臨死灌下五斤屍三年不致朽爛

○「玉井水」出有玉處所帶服者亦獲壽長生

謨

按先哲云玉之所以異于群石者以其堅而有理大刃不可傷為別耳匪但質潤而音清也苟弗精細則近似者甚多如硃砂亦可以雜也書曰燕石入筭下氏長號其以此夫又云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有光明如初出日者便知有玉不知足以不鑒也其色五般今惟青白者常有里者時有黃赤者絕無雖禮



之六藥亦不能得其真況其他平服餌之人必須屏居山林桃桑嗜慾方獲効驗倘或酒色煥戒反致發熱自投於死蓋玉稟純陽之精而酒色助火甚速以火濟火安得不然故本經註曰若未潔解節度勿輕服之內不

熟其水

○一玉竹水

○玉泉

○珊瑚



(珊瑚)味辛氣寒無毒出日本國生玉石間種有三般紅黑而白佈紋如織絲者咸妙研水不見熱者纔真非真也
石木熱

土人得之碾為玩器雖稱重寶亦入醫方辟惡精邪慰目赤爛○(珊瑚)乃火成之物赤目以水漫熨之

○(玻璃)即水精珠似玉極光瑩者安心明目每著奇功夜向太陰可取真水大精取火向太陽用異名同取之

○又種(珊瑚)惟生海底海舶沉鐵網掛取紅潤多枝柯參差長大丈餘短小尺許中多細孔刺則汁流以

金汞之為金漿以玉投之為玉髓得飲之者可致長生斷枝研成粉霜點目拂去翳翳吹鼻塞竅鎮心止驚仍治

風痛更主消渴○(琅玕)亦海底生長枝柯與珊瑚略同舶者欲求鐵網必用塗水紅潤久旋變青枝擊有



金石醫用堪煮汁服殺蟲畏惟鸡骨號青珠古人以石之美者多謂之廣宣得水銀主皮膚浸淫火肌去身體濕毒者亦除石淋且破惡血起陰氣可化為丹○仍有「碑螺」形如蛤蛤外多紋理亦出海中得者珍雅謂琉璃珊瑚為是也

藏不棄玉安神鎮宅解毒殺蟲西域記曰重堂殿梁楹皆以七寶飾之此其一也

瑪瑙



青琅玕



珊瑚

是壞燒裂失火不滅

水金木銀

丹砂水銀朱砂水銀

水銀朱砂水銀

水金木銀

丹砂一味甘氣微寒生餌無毒鍊服殺人出辰州廣

屬湖

巒洞井中

本境所出

硃砂多在

在井圍青石壁內土人砍寬

多聚乾柴縱火滿井焚之致壁迸裂始見有石床如玉潔白生砂塊似血鮮紅火類芙蓉頭有四五兩至

一塊者小若羽

箭簇俗呼箭其甚小者豆砂米砂作牆壁明徹為優成顆粒麻棘略次米砂下品鐵屑常多硃石引除染畫克用頭砂

一云火井者不如水井力勝水井有砂者其水盡赤新井者難及舊井色深凡治病邪惟取優等硃鉢細清水淘勻服餌無憂効驗自應惡硃石畏鹹水經云丹砂象火色赤主心故能鎮養心神通調血脉殺鬼祟精魅掃疥

瘻瘍瘻止渴除煩安魂定魄方士甚重常多買求謂能點化飛昇每每燒鍊不絕○依法煅以硃罐取八承

又名「水銀」用硃罐二箇掘地成坎深

珠砂半滿上加敲碎瓦粒剪鐵線繫如月圓樣一塊用土築穩實內盛水滿仍一罐入量可容二罐先埋一罐于坎四圍用土築穩實內盛水滿仍一罐入

縫鹽泥封固以熟炭火先文后武煅煉一炷香久其砂盡出水銀流入下罐水內復起盛以葫蘆免其走失煅五

下堆檢出皮殼入新朱砂固臘再煅每好砂一兩常煅出七八錢低者僅五六錢而已盛以葫蘆免其走失煅五

金大毒惡硃石同前得鉛則凝得硫則結得紫河車則伏置金銀銅鐵于上則浮併棗核研則散揚併津唾則覽

蟲屍體准之不朽銅錫錫之則明和大楓子研末則殺瘡蟲佐黃芩為丸則絕胎孕

方名斷孕丸

匪專醫藥亦入丹鑪

皮殼名曰「天硫」仙方謂之巴土倘修鍊得法可點銅成銀○「輕粉」係汞再昇加鹽皂礬二物質輕色

白故此為名

烏盆周爐

及羅過水

調封盛

底離火三寸

許用熟炭

火煅之

火慢則漸加至半斤

為度以點線

香三炷為度

提坐候冷

用力輕輕挑起

烏盆仰放

撥去鏹灰勿令

香落鳴翅輕

輕掃下盆底


粉脚任意掃淨另放

又加皂礬水銀白鹽同研復鍊鐵盆內餅上或有升不起者掃上面好者亦和前再鍊以乾濕得所為宜乾則入


少水潤之又不可太濕其盆底盛者去之或涵擦疮瘻疥癬亦可

今市賣者有燒凝水石或石膏為粉以亂真汎燒火上走者真也其功惟治外科所忌一切生血○「銀珠」亦永燒就時俗又喚心紅染畫色最奇殺蟲蟲亦驗庸醫不曉研為藥水違誤太深傷害寧免

卷之三
砂




丹州宜




謨按汪石山曰經云朱砂微寒生餌無毒伏火者大毒殺人水銀乃火煅朱砂而成何謂無毒其性滑動支而不守氣味傷陽從可知矣陽屬熱火經云水銀辛寒似難憑據又云有毒得非謂以朱砂伏火而成之耶故毒比朱砂尤甚宜其蝕腦至盡入肉百節拘攣也又水銀和入皂礬再加火煅飛看釜蓋者謂之水銀粉又名輕粉此經煅而又煅陽中之陽更資皂礬燥烈比之朱砂水銀尤為大毒燥烈之劑也經云粉寒無毒豈理也哉近見世之淫夫淫婦多生惡瘡始起陰股不數日間延及遍體狀似楊梅因名曰楊梅瘡甚者傳染俗醫以輕粉為君佐以雄朱腦麝等劑或散或丸服之雖効愈而發發則又服久久致手足痙攣遂成痼疾俗又名曰楊梅風或由藥之燥烈耗其血液筋失所養以致是也俗人不知由死于藥良可哀悼

靈砂一味甘氣溫無毒係水銀硫黃二藥用火煅煉成形水火罐之如束針線者成就也又名二仙丹畏鹹水勿加愚磁石須避止煩滿通血脉安魂魄養精神殺鬼辟邪益氣明目久服不老輕身神仙令人心靈神明通暢若飼猿鸚鵡蠅作人語不差

朱砂取水



火 煅



雲母一味甘氣平撫毒鄉郊在彭城東北淮陰廬山屬南康府亦生色有五般白澤為貴作片或層可拆通透輕薄光明沙土

養之日月生長畏蛇甲及東流水忌弄血愚徐長卿以澤鴻使宣宗嘗公製妙

每雲母一斤用小地胆草紫貝天
葵生甘草地黃汁各一錠入硃鍋
中安雲母于內下天池水三錠煮七日夜勿令失度其雲母自然成碧玉張在鍋底却猛投天池水以
物攪之浮而竭涎者去之如此三度淘了取沉香一兩搗末以天池水煎湯三升分三夜再淘晒乾用
不鮮節瘦


勿輕餌之主身表死肌如車船上中風寒熱治赤白癆疾及女婦人帶下崩中身虛臟腎益母精陰卵氣能耐寒
暑遍身風瘡百計不差者煅粉調冰可眼諸類愚病一切作痛者研末和油可敷久服延年明目日陽起石
即雲母根惟畏菟絲亦忌羊血愚澤鴻蘭桂併蛇蠍雷丸佐使得真螺蛸蜜明瑩若狼牙者勝青雲頭雨脚及
鷺鷥毛者尤佳

試緊慢絕細研成鋪有祐盆中照當午日下盆面濕紙密掩盆底文火微熏升起粘紙者力洪仍復在盆者力大
治腎氣乏絕陰痿不舉殊功破血瘕積凝腹痛難抵立効去陰囊濕瘡驅子臟冷寒


謨

按本經註云雲母有五種當擗以向日詳占視之乃可分別若陰地視不見其雜色者若五色具者名雲華
五色具而多青者名雲英宜春服之五色具而多赤者名雲朱宜夏服之五色具而多白者名雲液宜秋服之
五色具而多黑者名雲母宜冬服之但有青黃二色者名雲砂宜季夏服之晶晶純白者名磷石四季可服也
醫方所用白澤者正磷石是爾又云他物埋土即朽着火即焦而五雲納猛火中經時不焦埋深穿內雖久不
腐故能令人長生服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子亦理當然也在古因此為言但今之望壽未
聞有人服此者蓋因金石性悍抑且修製節度恐非文字可詳弗輕銅之謨之至也

母雲州充




母雲州江



陽起石



齊州陽起石




餘糧一味甘氣寒無毒採從潞州屬山西形如鵝卵外殼重疊色墨內黃細末一團彷彿蒲黃噙甚移齒得之火煅醋淬復用硃鉢重擂水澄汁清勿涵砂土入藥佐使宜牡丹皮療血閉瘕癥赤白漏下除寒熱煩滿欬逆邪傷久餌之輕身延壽經曰重可去怯禹餘糧之重乃為鎮固劑也○又「石中黃子」乃餘糧未成藏諸殼中搖則水響本經注云水已凝者為餘糧水未凝者為石中黃子也亦堪久服耐老輕身○仍有「太乙餘糧」古方之中亦載偏考諸說俱未真知或指水穀為然亦可疑臆度所云治病與前小同

禹餘糧



石黃




〔紫白石英〕味甘辛氣溫無毒泰山山中每出產色有五品種有兩般但青赤黃治療少見惟紫白清服餌多求


鉢貯橘或水瓶而送資長石在使人心肝肺經掌者入心肝二裏附子禹青惡黃連麥句薑也〔紫石英〕一顆水

精明澈似楊柳達頭治婦人戶風寒經十年不孕療男子寒熱邪氣致欬逆異常定驚悸且補心虛墮下焦尤安魂魄又散癰腫腫蘿醋調煎〔白石英〕二三寸長手指般大六面七剖白潔有光治欬逆胸膈久寒理消渴陰瘻不足益氣除風寒下氣利小便療肺痿肺癰止吐膿吐血

英石紫石英



澤州白石英



本草綱目

圖象本草綱目

卷八

本草綱目

本草綱目

石膏一味辛甘氣微寒氣味俱薄體重而沉降也陰中陽也無毒青州併徐州多生黑鐵惡莽草巴豆細理白澤為上猛火煅粉方靈絕細研成湯液任便以鷄子為使入肺胃三焦辛能出肝解肌上行而理頭痛甘則緩脾益氣生津以止渴消故風邪傷陽寒邪傷陰總解肌表可愈任胃熱多食胃熱不食惟渴胃火能痊仲景加白虎名以前胃之經胸者肺之室邪在陽明肺受火易走云大寒剝胃弱食不下者忌服血塞身發熱者禁嘗比象白虎證誤服白虎湯者死不可輕忽

研末和醋為丸治食積痰火殊驗胃脘痛甚吞服立差


按丹溪云嘗觀藥之命名固有不可曉者中間亦多意義學者不可不察焉如以色而名者大黃紅花白前
青黛烏梅之類是也以氣而名者木香沉香檀香茴香麝香之類是也以質而名者厚朴乾薑苓生熟地黃
之類是也以形而名者人參狗脊烏啄貝母金鈴子之類是也以味而名者甘草苦參龍胆草淡竹葉苦酒之
類是也以能而名者百合當歸升麻防風硝石之類是也以時而名者半夏茵陳冬葵寅雞矢枯草之類是也
石膏火煅研細醋調封丹罐其固密甚於石脂苟非石膏不能為用此兼質與能而得名正與石脂同意同考
忠安以方解石為石膏况石膏味甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解
肌出汗上行至頭又入太陰入乎少陽彼方解石只體重質堅性寒而已求其所調有膏可為三經之主者安
在我醫欲責効不亦難乎

第一卷知山次後謨稿宜參看

汾州石青

青
脂

汾州石青



「宝青」味甘酸氣寒無毒出益州深山生有銅處所銅精重則生寶青腹中空破有漿水倘採得亦有中空取無漿
汁者將成箇全殼埋地三

五夜自生出大若鷄蛋裏惟莞絲融化銅鐵鉛錫作金濟貧助富專治赤腫青盲眼疾去暗回明「漿」為點眼仙丹

「般」亦摩醫要藥諺云不怕人間多眼瞎只愁世上無空青此可徵也益肝氣養子精利九竅通血脉○

「曾青」氣味頗似所畏莞絲又同但形若連珠纍纍相綴亦生子蜀益求真極難可立制砂汞成銀朱竟除目痛止癥其餘治體彷彿如前○「綠青」畫者多求有青白花紋吐風疾甚速○「白青」時不多見似魚

目青碧俗謂魚目青不入畫治眼目亦靈○「扁青」療折跌癰腫金瘡令人

「青」主蟲毒蛇蠍諸毒令人

丸

珍藏

空青

青


空青

曾青


心膽

即翠
胆礬

味酸苦辛氣寒無毒真者出蒲州虞卿屬山成塊如雞卵圓大顏色青碧不添琉璃擊之縱橫解
疊有銅坑內方有赤可煎練成雖可煎練不勝
自生者尤珍貴今市多以銅擗青礬假克不可不細認爾須研細末纔入醫方



青绿



青空



墨坚齒

畏辛白薇及芫花菌桂水英為使化鐵成銅亦成金銀治鼠惡瘡併喫鵝毒療崩中下血及陰蝕疼吐風瘻除瘡殺蟲




一、石硫黃一味酸氣溫大熱有毒乃礬石液出泰山中如鷄雛初出殼者為真以火燭傾水浸過可餌畏細辛飛廉鐵使曾青石亭脂体係至陽之精能化五金奇物壯興陽道若下焦虛冷元陽將絕者殊功禁止寒渴或脾胃衰弱垂命欲死者立効中病使已過剎不宜塞痔血殺疥蟲堅筋骨除頭禿去心腹痃癖却脚膝冷疼仍除格拒之寒亦有將軍之號蓋因功能破邪歸正返滯還清極出陽精化陰魄而生魂也

謨 按硫黃性熱每用治其格拒之寒倘或此證兼有伏陽在內須加陰藥為佐纔妙也古方太白丹各有硝石之類是皆至陽佐以至陰正合宜爾若無伏陽單患陰證此又不必例拘惟在用其陽藥也


第三卷 大黃 欽後 謨 按參看

石疏

外有金玉之光內有水火之精此皆天地之精英也



土疏





雄黃一味苦甘辛氣平寒無毒一云大溫有毒生武都焞煌山邊名曰雄也得大塊三五兩重價類金馬鈍之臭氣不聞亦如鳴冠明澈此為上品搗細水飛作散為丸任憑潤服人腦中年深日久輕身神仙出路佩之鬼神不近有孕帶者轉女成男又可點紅銅成金甚為丹竈家所重一說雄黃千年化為黃金又云雄黃以草藥伏住者鍊成汁胎色不移若將制藥成汁併添潤者上可服下可寢銀成金也堅頑作氣此名臭黃不宜服餌只治瘧癘辟精魅鬼邪殺蛇虺蟲毒去鼻中瘻肉破骨絕筋除鼠瘻痔瘡積聚瘀癥誤中毒者防已解之


雌黃
水白
朱砂
雄黃
雄黃
雌黃
水白
朱砂



階州水白



階州雌黃



「雌黃」一味辛甘氣平寒有毒產武都山陰故雌黃為譽色與金子彷彿因受金精薰蒸陰山出金故也甲錯層層又若雲母凡修製主療忌鳴犬婦人倘誤觸之則黑如鐵研成塵末治外功多入藥最稀服者宜審去身面白駁一切惡瘡散皮膚死肌諸般蟲毒辟邪去惡竝與雄同懷孕佩身轉男成女若以草藥伏住亦可點銅成銀服前法以草藥投謂燒成汁者點銀成金點銅成銀

赤石脂一味甘酸辛氣溫無毒多產泰山無時收採種有五色寶共一名雖各補臟不同總係收斂之劑可以偶反不必概言形赤粘舌為良大煅醋淬纔研裹羌花莫見恩大黃松脂凡百瘍瘍收口長肉但請來血止塞歸經春心氣滯精住渴除痛白者入大腸經止渴尤妙

驗處金銀除內熱
諸病氣血虛寒
潞州赤石脂

人初學正氣之學一聞之便知其味也此本草載此多人道之不詳也蓋其性平而能固本氣故能止人遺尿及久病面浮身熱一脉數舉



冰水石一即寒水石味辛甘氣寒無毒多生河間郡亦產邯鄲即趙有縱理橫理不同惟潤澤清明為上置水中與水一色雖夏月亦凝為冰故此得凝水之名必須研極細纔用服加薑汁性惡地榆却胃中熱及五臟伏熱齊哎解巴豆毒併丹石諸毒並壓傷寒勞復兼治積聚邪熱亦除止煩悶喉嚨渴消去水腫小腹頑痺

凝水石



八石鍾乳一味甘氣溫無毒始興江陵多生岩穴陰處纔有溜汁結就故以乳名形類鵝管中空又若蟬翼輕薄色白

浮光潤滑此勿向厚許並佳倘如枯
骨灰及黃赤二色不任用長六七寸餘收採無時入水不沉藥湯煮練湏宗雷公每乳八兩用甘草紫

煮一候

時瀉出拭乾緩大焙之搗


節度或達多生他變所惡藥有三品牡丹玄石牡蠣畏紫石英使蛇床子主效

達止氣療脚弱冷疼安五臟百節

通下乳汁九竅並利解舌癰渴數飲補下焦虛遺精益氣強陰通聲明目久

服育子不鍊病淋


石鍾乳



謨按丹溪云鍾乳乃標悍之劑經云石藥之氣悍仁我言也夫天生人以穀養及有病以藥治穀氣和可常食藥氣偏惟暫用不藥則又偏之甚也自來富貴之家多惑方士以石藥体重氣厚服餌可以延年習以成俗受此氣悍之禍莫較哀哉

代赭石一味苦甘氣寒一云味甘氣平無毒惟出代州屬山西多生山谷一说是代都城門下赤土色赤如鴻冠有澤佳者染爪甲不渝或難得真牡蠣可代火煅醋淬七次方研極細末飛惟作散調勿煎湯服畏雄附天雄使乾薑入少陽三焦及厥陰肝臟治女人赤沃崩漏帶下暨難產胎衣不來療小兒疳疾渴病驚癇併尿血遺溺不禁却賊風盜毒殺鬼疰魅精陰痿不起有扶營氣入腹可愈聖濟經曰怯者驚也怯則氣浮重劑以鎮之代赭之重以鎮虛逆也孕婦忌服恐墮胎元

代赭石




一井泉石一氣太寒無毒近道處處俱生
者勝 郡田野地內纔有穿地丈許方可得之形似土黃方圓長短大小不等
內則堅實外却作層重疊相交收極無時須研絕細倘或不爾令人病淋解心臟熱結最良止肺經熱嗽亦妙得
大黃施子治眼睑暴發腫浮得決明菊花療疳驟生醫膜總主諸熱別無所能

青 素

井水帶味西邊小兒多用之效
一致香井泉石

青州石

不嫁人本草本



花蕊石一極大堅重出自陝州顏色彷彿疏黃黃中間有白點因名花蕊最難求真得之煅研粉霜治諸血證神妙
男子以童便攬半酒和女人以童便攬半醋調多服體即疏通瘀血漸化黃水成為劫藥果乃捷方金瘡血流敷
即合口產後血暈脈下立安

中含口齒外血華然不立也

寒水石花蕊石陳氏女入以童髮數本

并研末一匙入童髮同研末

以童髮數本

以童髮數本

以童髮數本

以童髮數本

以童髮數本

以童髮數本

以童髮數本

青礞石一顏色微綠出自山東砍擣假真須依法製敲碎小顆粒貯懷銀罐中攪半烟硝硝二兩盐泥固濟武火煅

一炷香取出色若雌黃軟脆易搗方為不假成末以水飛細入藥作散為丸力能墜痰滾痰丸必用功亦消食積


食方需加匪醫小兒亦治男婦

青礞石



「滑石」味甘淡寒性涼重降也陰也無毒所在多有收採與時細潔白者為佳金顏青黑者勿用研細以水飛淨服下可得滑利恐增青宣甘草石韋為使入之太陽利九竅津液頻生行六腑積滯不阻逐凝血而解煩渴分冰道以實之陽消食毒補脾泄上氣降火因此滑利故加滑名墮胎如神妊娠忌服

滑石



誤接滑石治渴非實能止渴也資其利竅滲去濕熱則脾氣中和而渴自止爾假如天令濕淫太過人患小便不利而渴正宜用此以滲泄之渴自不生若或無濕小便自利而渴者則知內有燥熱燥宜涼潤苟誤用服是愈亡其津液而渴反盛矣寧不為犯禁乎


礬石一味酸氣寒無毒一云小毒種顏色五般地出產教處物皆石全憑鍊就其極精無越晉州屬北直隸畏麻黃惡牡蠣壳使甘草凡用俱同。一白礬一治病證多能生熾隨重輕應變茲研細末任作散丸去殼肉鼻竅中除痼熱骨髓內故喉痽止目痛瘡使鴻塞齒冷洗脫肛澁腸敷臍收水稀涎散同皂莢研服吐風痰通竅神方蠟礬

九和紫蠅丸吞平癰腫脹膜要割久服換心肺傷骨為醫亦不可不防。〔黃礬〕一名鷄理，潰癰生肌，鍛金家難缺。一說投苦酒中，金鐵皆作銅色，但外變而內質不變。○〔黑礬〕即皂土，塗皓髮變黑，染皮者要多。○〔綠礬〕亦主瘡科。

〔紫礬〕可制砂汞。○〔絳礬〕燒之赤色，本經但載靈名。○〔金線礬〕紋綾有金絲治瘡追毒。

〔柳絮礬〕輕重如綿絮，止渴消痰。

晉州礬石




礬石一味苦鹹無毒，一云半甘溫溫小毒，乃鐵之母。惟有鐵處則生，維多海南僅碌州湖。屬河者進貢，能吸鐵針，鐵物若母見子相連，凡用極病須依法製火煅，醋淬七次，羅細水飛，敷遺務如塵灰，纔可服餌。專殺鐵毒，惟浸柴胡、荊芥、牡丹石，脂為重而去怯之劑。除大熱煩滿，去周痺，瘦瘠，周痺為癥，隨血脉上下，不能左右去者是也。綿裹治耳聾，裹大塞耳中，內有風藥和點目聰音，強腎氣，益腎臟，通關節，消癰疽，逐驚癇，風邪，改頭核，喉痛，鍊水旋飲，令人有娠。若誤吞針入喉急取繫線，服下引上牽出，亦妙方。又〔礬石毛〕更功力勝生石，孔上輕紫研入醇酒內調吞。

純黑無孔者為然力劣不能吸針治
矯瘡瘻以長肌膚補絕傷而益腸道止小便頻數開光眼光明腎寧耳聾每取功。〔玄石〕亦礞石一種

制如生蠶之謂

礞石

玄石




石蟹一味鹹氣寒無毒似生蟹形狀小近海群州云是海蟹多年水渟相着化而為石也風潮飄出人纏得之多矣
礞石汚泥凡用去淨摩細清水飛丹佐藥取功點目中生翳腫疼解腹內中毒蟲脹平癰掃癰用醋摩敷催生落胎
○「石蛇」盤曲似蛇但無首尾內空紅紫着色又如車螺雖與石蟹類同不知何物所化以左盤者為毒解金
石毒极良「石蠻」氣凜亦興驚似水煮汁服治淋有功婦人產難兩手各把一枚立驗病者消渴同水牛鼻煮
飲即瘥○「石蠻」一類蠻用須刀仔細破石淋血結主金瘡生肌


石蠍



石蠍



石蛇



無名異一味甘氣平無毒出大食國内

今廣州宣州亦有


生山谷石中大者若彈丸小者如棋栗

又云小者如墨石子顏色黑褐嚼之


錫甜雞血滴之即為水專治金瘡折損用之以醋磨塗去瘀止疼生肌長肉

謨按海商人云有石無名異者難得有草無名異彼人不甚貴重豈本說者為石而今所有者為草乎

廣州無異名



宣州無異名



「金屑」味甘氣平無毒一云性多寒無毒隨處多有益州屬四川今改成都府獨多收採不同形色自異「麸片金」淘水砂
內色却淡黃「瓜子金」亦有塊者 取山石同色乃深赤又說兩比金色淺東商金色深此又各土所宜爾畏水銀
錫誤犯色變得餘甘守相感体柔古方紫雪用之蓋假自然氣也名愈加屑義在摩或洗淨金器水煎或擂碎
金箔湯服生多未練切忌妄投若毒中腹中鷄鳩肉可解除邪殺毒却熱改煩安魂魄養心神堅骨髓和血脉禁
癲疾狂走止驚悸風瘤幼科藥作綻丸必資此為衣飾○「金石」鍼健肥肢體駐顏壯陽○「金瘡」可
長生神仙延年益壽○「金芽」亦如金色燒淬去蕊汁浸宜專療瘡氣傳屍風毒及鬼疰等疾徐思邈治此
散○「金星石」有金星簇如皴片出潔州屬鳳治肺損欬嗽吐紅

金星石


上等

金星石
金星石
金星石
金星石
金星石
金星石




金星石

銀星石



金星石



八屑一味辛氣平無毒多出宣饒坑中宣州屬南直隸饒州屬江西唐御史崔萬紀奏宣饒二州有銀礦石之何暇取守是知彼處有銀也惟生銀礦石內氣未穀暢故言有毒所加屑字義與金同必
內文理鏽錯類錫甚堅此謂礦銀難竟入剝一說礦銀尚蘊鬱石內氣未穀暢故言有毒所加屑字義與金同必

用鍊熟摩成或取銀箔調碎為丸煎斗憑譜重輕裹硃石併石亭脂白錫及一切血除瘡瘍燒不睡止熱狂驚

恃發癥定志養神鎮心明目安五臟辟諸邪並用脈之功勝紫雪○「黃銀」謂辟惡瑞物蘇註云作器乃無稽謬言即堪作器則非瑞物可知○「烏銀」用硫黃煙熏故變為黑色○「銀膏」合鍊有法白錫金箔水如膏凝成專治心靈健忘補齒缺落○「銀星石」有銀星魅片其治體併土產同前

惡同金
銀石

蘇註云作器乃無稽謬言即堪作器則非瑞物也
銀三物合者如膏凝成

銻州銀屑



宜州生銀




一鉛一味甘無毒掌北方壬癸陰極之精生蜀郡平澤銀坑之所性濡而滑色黑而綏可點銅成銀須草伏成寶入割治療鎮心安神止鬼疰癆止反胃嘔逆蛇蠍傷多驗尤奇○燒出「鉛灰」能治療瘧○「鉛霜」性冷亦鉛鍊成其法以鉛雖水銀十五分之一合鍊作鉛白霜能塗木瓜失酸因体屬金剋水止驚悸敗寒解酒毒消疾瘻胸膈悶煩逐中痰竇○「鉛丹」製妙有法其法鉛一斤土硫黃一兩石一兩先燒鉛成汁下醋沸時下小硫黃一塊續硝石少許沸定再點醋依前下黃硝少許待硝盡

黃亦盡炒考其氣味辛寒一名黃丹外科多用先入水飛淨砂土後加大炒鹽炒黃通骨散金瘡生長肌肉止痛
為末成丹考其氣味辛寒一名黃丹外科多用先入水飛淨砂土後加大炒鹽炒黃通骨散金瘡生長肌肉止痛
入藥治癰疽收斂神氣鎮驚除毒熱驅掌止翻胃吐逆經云滋可去脫鉛丹固氣而處有銅丹形方圓不定色青
黃銅不復礦鍊而成故曰「自然銅」也製宜火煅醋淬研末細細水飛治跌損接骨續筋療折傷散血止痛
熱渴調服立建奇功若非煅成切勿誤服



謨按丹溪云世以自然銅為接骨炒藥殊不知跌損之方貴在補氣補血補胃俗工不明此理惟圖速効取錢
倘遇老弱之人若服此新出火者其火毒金毒相扇又扶着熱藥之毒雖有接傷之功然燥散之禍甚於刀劍

戒之戒之

鉛



自然銅



生鐵一味辛氣微寒無毒出閩廣畏礮石鑄溶皿堪用柏片段弗能丸入方劑極難作丸散正用須煅過僅赤汁
淘淨復燒紅酒或水任煎服肚及熊虎咬傷取湯日洗被打致血凝骨節用酒時嘗耳聾亦可服之必塞礮石燒

凡一聲以生鐵投酒因服仍
以生熟鐵作刀磨片及易成去胸膈病積食停主金瘡煩滿熱中○

「鐵落」乃燒赤砂上打落皮屑煎服

治諸瘡毒氣欬在喉脣○「鐵精」煅過半飛出如塵紫色輕虛者為妙可摩塗銅器而亦可染皂入割瘻驚悸心神不足

小兒風癧痘亦宜○「鐵漿」取鐵浸水中經夕自浮青沫飲下解諸毒入腹肉虎蛇犬噉傷主癰瘍發狂鎮

心氣退熱○「鐵綉」着濕即有生鐵上者纔佳蜘蛛等傷暗摩敷入患瘡疥癬油調塗瘥○「鐵華粉」氣味

鹹平保鋼鐵微共作葉乎面摩醋淨光鹽水洒投入醋甕埋陰處自然生衣刮研成霜能去百病安心神堅骨髓強志力



却風邪養血氣延年烏鬚髮耐老若為丸散湏和蜜膏○又有「針砂」乃針家摩礪細末堪治黃胖務釀醋

漫透煮干○「鑰匙」薑醋童便煮服治婦人血噤失音○「刀刃」主蛇虺咬毒入腹地漿水摩吞○


「鑷」瀆酒治誤吞竹木入喉○斧淬酒治婦人難產不下○「秤鑷拉鐵」竝去賊風用之燒紅

淬酒頓飲

柔 鐵



生鐵



(鐵) 鐵味酸而有小毒。

生鐵入人體則散入臟腑不外。「破瘀銷癰」既在燒烟田。

生鐵亦平。(鐵) 生鐵重於銀水移入地。

生鐵與水同煮則生氣水移入地。生鐵與水同煮則生氣水移入地。

生鐵與水同煮則生氣水移入地。生鐵與水同煮則生氣水移入地。

生鐵與水同煮則生氣水移入地。生鐵與水同煮則生氣水移入地。

生鐵與水同煮則生氣水移入地。生鐵與水同煮則生氣水移入地。


生鐵與水同煮則生氣水移入地。生鐵與水同煮則生氣水移入地。

(密佗僧) 味鹹辛氣平有小毒原產波斯胡國其名蓋本胡言今各處銅銀冶中畫識明煎鍊灰脚故凡賣者又謂

从坏近道俱多至賤易得体堅重如龍齒大如拳碎之如米粒其性甚寒能治五痔除白癩尤

療諸瘡

廣州密阿僧



「朴硝」味苦辛鹹氣寒無毒一云有毒丹溪云本經言無毒誤也能化七十二種石不盡而能之乎

生益州山谷有鹹水之陽初採其苗淋水取

汁一煎成澤乃名朴硝色青白者為佳兼黃赤者勿服黃者傷人諸石藥毒結化六腑積聚堪破燥薑推陳致

新消癰腫排膿散毒却矢行疫病破潰血肉藏傷寒發狂停疾作癥凡百竇熱悉可鴻除又善墮胎孕婦忌用○

「芒硝」因再煎鍊傾又盆內結芒上有廉後久故改喚甚消痰癖更通月經延發癰瘍可敷難產子胞可下洗心肝明目滌腸胃止疼經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦寒古方因之每用大黃芒硝相須而為使也又稱

「英硝」者因形如白石英相同又曰「馬牙硝」者因形如馬牙無異實即芒硝一種無遇因形異名本經各用此則併附○「硝石」在盆硝底結燒之有火焰上騰由質堅凝特稱石類所憑記三藥苦參苦菜曾青

終味辛能潤燥鹹能軟堅苦能澆火但力較前二硝略少緩爾○仍兩品尤妙亦朴硝製成冬天茅布袋滿

盛掛簷端質若變自此「風化硝」取輕而不降乃膏梁家易化頑疾捷方○臘月蘿蔔水同煮露天底味


竟去鹹號「玄明粉」因陰中有陽誠老弱人微吸靈根妙劑臨服之際惟忌苦參製玄明粉法用朴硝十斤水一桶同入鍋內溶化掠

去面上油腻其水将细布併好纸滤去渣滓仍用蘿蔔十斤冬瓜五斤豆腐三斤俱切厚片同硝水入锅内煮沸六七次捞去蘿蔔等物又掠去油腻将细布好纸再滤過移令渣滓去净然后放入瓦盆置诸星月之下自然生出硝芽片子取出放于棹面上任其风乾将原水又煎沸一次入瓦盆内令其再生如是者数次以水内無硝片為度将前风乾硝芽用泥墨罐子裝盛按寶碎炭周围不走火氣如法煎煉候水乾盡仍聽罐內硝汁不響復如法固封罐口再加猛頂火煅煉一晝夜玄明粉成矣待冷取出着淨地上以斂瓦盆一箇覆之以去火毒後研為末每斤加生熟草各一兩和與初服一錢漸加二錢四時服食各有飲引春用川芎黃耆芍藥湯下夏用葛芩湯下秋養肺桔苓桔梗湯下冬養腎肉蓯蓉湯下四季養脾人參白朮湯下朴硝鹹物也蘿蔔性溫與冬瓜豆腐俱能奪鹹味用之修製使去其鹹故曰陰中有陽之藥也


硝石



硝芒



峽州朴硝




硝

〔朴硝〕味苦寒性大寒能消癥瘕散熱止渴利小便
治一切熱病多作散末或水煎服之亦可作丸散服之
人有熱病惡渴者宜用之又可治癰瘍瘻瘍及癰癧
其效甚良○

模棱七硝氯味相同俱善消化敗逐但朴硝力緊芒硝英硝馬牙硝力緩硝石風化石玄明粉緩而又緩也以之治病致用病退即已本經載能燥服補益豈理也耶若孕婦有可下證用之必秉大黃引導使之直入大腸潤燥鴻熱守母均安經曰有故無殲此之謂歟

「砒霜」一名味苦辛氣溫無毒山西者色白味焦功遲出南番者色褐味和力速大塊妙先瑩良同菉豆收藏纔不此生砒者謂之砒黃置火上以泥覆之令砒煙上着凝結釀雲垂下如乳尖長幾名砒霜入藥方妙所畏釀醋冷水菉豆年血四般誤中毒腹中用一味即解醫方錯煮亦殺毒焉哉瘧除哮膈上風痰可吐燬堅腫積腹內宿食詎消

信州砒霜




信砂

一名味苦辛氣溫無毒山西者色白味焦功遲出南番者色褐味和力速大塊妙先瑩良同菉豆收藏纔


形色不伐治喉中腫痛要藥去腸上疾熱捷方合化痰津緩以取効又為解藥可柔金銀

蓬

砂



鵬



硇砂一味酸苦辛氣溫有毒近邊州郡俱有西戎出者尤奇形擇如牙硝光明水飛去土石重煮水飛後以忌羊血勿食農漿水須防因多爛肉之功每為外科要割腫毒資破口去血潰癰以別腐生肌除腫膜明雙睛柔金銀為錮藥本經又云生食之化人心為血倘誤中毒急研茱萸汁解之

諺
樓經註云硇砂質稟陰石氣性含陽毒精去穢益陽功用甚著故能消五金八石而為五金賊也飛練有法一飛為敵砂二飛為伏翼三飛為定精色如鵝兒黃若草伏住不碎可轉制得諸石藥亦能變鐵又能制銅為大青大綠修丹竈者當知

會鑒本草卷之四 中華書局影印

果部標本

石少

裹以布小鑿取其粉

縣本

門

口

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

〔食鹽〕味鹹氣寒無毒為調饌之需出近海之地有池有升汲水煎成論形色河東獨佳入藥剝漏蘆為使如欲單

用炒化湯中堪洗下卻墮瘡能吐中焦疾癬甦心腹卒痛塞齒縫未紅敗蚯蚓毒傷殺鬼鹽邪症少用接藥入胃

凡服補陰丸遇多喜欽傷金走血損筋黑膚失色司危厨者務用適宜水腫放嗽病人須全禁忌勿服秋石丹可代用

○「戎盐」類石出自西羌一名青盐煅白纔妙益氣去氣鬱明目却目疼止吐衄血可加堅筋骨節堪入

〔鹵鹹〕即鹽音亦產河東掘盐土淋水熬乾旋結塊形如磚樣用之研細能軟續堅主大熱消渴狂煩除多年

癰疽癰癧去濕熱消瘀癥下蟲毒柔肌膚洗滌垢膩有功藥機房中必用○「太陰玄精石」者亦出積盐倉

中古云太鹵之場則生陰精石是也惟解縣屬山者勝似龜背者良又名鬼精無時收採心腹積聚能逐風冷邪

氣可除男子陰證傷寒止婦人痼冷漏下

諸水一稟天一之氣居五行之先草木資以發生黎民藉以養育普天之下惟水最多大則為海為江為河小則為

潭為溪為澗鄉市有塘有井崖谷有澗有泉味甘辛鹹淡有殊性動靜緩急亦異用烹藥餌各有所宜苟弗詳知

安求効驗。○有曰「長流水」者與「千里水」同取歷科坎輿多未遠流長之義耳是四肢之疾非此莫攻。○有曰「順流水」者與「朝東水」一類謂向東流不悖直下無凝之名大小二便滯而用斯即利。○「逆流水」即迎瀾倒逆上流堪吐上焦胸膈風痰發易上湧。○「急流水」係峻灘急趨下水可去下體胞脛濕痛仗竟下行。○「井華水」汲在早晨捕陰室併清頭目蓋緣天下真氣浮結水面而未開。○「山骨水」寬於長夏退時疫且却瘟黃乃因夏至陰生起後地底而極冷。○「斗天河」積諸竹木官中即長桑君授扁鵲以上池之水是也質極清潔而不濁堪鍊丹藥砍成仙者須求。○「茹英水」出於菊花多處原陶清節好植菊而採英浸水是鳥氣甚清香而最甘可烹茗芽宜延者宜啜渴中有長壽源其源多菊花而流水四立春日以為迎接空中氣得春生而升發中氣不足清氣不升及年壯未嗣人煎服極妙。○「春雨水」時以物拂諸草上性稟秋降而青清房蟲傳屍疳蟲作脹併年深染篤者取飲最佳。○「臘雪水」甕貯掘地埋藏性酷寒治春夏時行疫毒。○「甘燭水」器盛以物揚躍氣柔浸調冬月陰證傷寒。○「新汲水」井泉汲出不經混雜為然不曾傾倒者養心神誠獲奇功。○「無根水」一名土凹音者竊涵不見流動者方是扶脾胃果有神功。○仍有「地漿」是人造者挖地坎以水沃中挽濁渾俄頃取服惡毒能解煩熱能敗楓上毒菌誤食矣不止者用之即安山中毒菌悞食命幾死者飲之立効。

謨諸水雖分精詳醫者未免忽略投煎藥餌多失還求殊不知用藥如用兵兵之赴敵也貴擇地而屯營壘

苟弗得其地利則兵練固精不能望克敵之捷報猶藥之治病也。貴擇水而煎湯液若非合其水性則藥製雖妙亦難收愈病之全功此理勢自然不待辯而可明也。水之為用寧不詳乎又况人養生固云穀食為本考諸先哲蓋亦與水对言有曰水去則榮散穀消則衛亡有曰水入于經其血乃成穀入于胃脈道乃行。不離其水者盈水之于人閑係甚大年歲之天壽形體之豐羸患由得夫水土之厚薄故爾觀今南北人物則可驗焉仍有迷行不服水土成疾者亦可概推矣。

「伏龍肝」味辛氣溫無毒即龜中對釜心黃土取年深色變褐者為良醋調或蒜搗泥塗消癰腫毒氣和水敷臍勤換辟除時疫安胎療中風不語心煩止崩中吐血欬逆並用搗細調水服之。○又有百草霜名「鍋底墨」血部要劑因黑勝紅慎勿塗瘡入肉如印仍有「龜案黑」者亦龜額上黑煤膏載方書總能止血。

「東壁土」氣溫無毒惟取東壁陳土因得晚日久烘或曰東壁土得晚日烘炙為侵南壁土亦午日帶烘炙者何東而不取乎答曰素問云少火之氣壯壯火之氣衰日者太陽真火也日初出是少火火少則壯故務擇多年百餘年研羅細末扶脾益腎以類相從上故云和白术炒成專止取之及當午壯火也壯則衰故不取務擇多年者妙研冰透他方不服水土者立効穿者良○「鑄銅黃土」研酒服辛心痛痘瘍惡氣者殊功○「鼠壤土」主中風筋骨痙攣曰曝乾用○「燕窠土」胡良治風瘡瘍瘻瘍冰調濕敷者良

「石灰」味辛氣溫性烈有毒在處近山俱得造燒燒石而成種有精盒須用選擇以水沃熱蒸解者力劣置風吹自裂解者力優能伏硫黃堪錫暉凡使醋浸一宿漬出待乾研成納牛黃胆陰乾敷刃斧傷止血和白朮末蒸遠點。

疣癩子去根同諸灰淋汁敷膏決癰腫破頭開口產婦陰不合煎水洗即收造酒味帶酸投少許便解墮胎甚捷
辟鹽尤靈○又種壠內一冬灰一條菘萬葵葵者因冬寒不斷其火取性氣烈過三時入剖用之得此為勝熬
膏蝕肉專理外科○「龜內熱灰一醋調作餅心腹冷痛頻熨彌佳○」百草灰端午多收此日乘露採
乾燒兩腋臭用治即止并用水調及成團曝乾重燒令白礬醋和為餅兩腋下緊緊
成夫之常抽一身痛向瘡出即愈以少水便洗之不過三兩度

「老屋上塵」一名烏氣斗微寒無毒湧達烟火處所務近堂殿中間第拂下旋收飾羅過方用中惡卒未鼻衄流滴不

已者殊功傷寒陽毒發斑煩渴信帝者立効仲景黑奴丸用主腹內痛噎消頭上軟瘡○又「老屋上塵煤」
治齒斷腫出血○「故茅屋上塵」取多年放歛可除和石黃數冬花婦人月經衣帶等以水和塗茅大則
待乾納竹筒中燒一頭以口吸入喫下無不瘥

「像本草蒙筌卷之八終」人問諸中醫「醫食譜」老屋上塵土置熟鹽古著以糊上

「外瘡」如草頭頭瘡小者以鹽中吹之勿著上火者以鹽水浸紙貼之勿著亦可
是也若以竹管水灌入火頭者亦可

「其水亦或大或小入頭者大則以大毒透水少者頭瘡而白頭大水上火者若頭瘡令火入頭則火熱
水冷逐水者亦可但水少者頭瘡令火入頭則火熱人手當剝頭火亡人體

「其水亦或大或小入頭者大則以大毒透水少者頭瘡而白頭大水上火者若頭瘡令火入頭則火熱
水冷逐水者亦可但水少者頭瘡令火入頭則火熱人手當剝頭火亡人體

圖像本草卷之九

新安陳嘉謨延采纂輯

門生

欽定四庫全書
媚胡一貫

姪晨若樸

鮑倚校刊

增補

「虎骨」一味辛氣微熱無毒各處山林俱有色黃雄者為佳務審非藥箭中傷

血肉射死者不可入藥恐藥毒浸漬骨

髓取塗酥油炙晚勿煎湯液惟製散丸所畏三藥須知蜀漆蜀椒礮石用治風癆乃因虎嘯風後用補膝痠只緣

虎之力健類邪症止上焦驚悸「頭骨」宜求堅筋骨更下體風痛「胫骨」堪覓「睛」收定魂「牙」刮敷

疽專主陰瘡痘瘻「鬚」去齒疼「爪」辟惡魅「膏」金犀犬咬噬瘡毒「膽」主小兒疳癆驚癇「威骨」在脇兩

傍虎威有骨如八字長一寸破肉取之尾端亦有不如脇者帶之日添威勢「眼光」形如白石凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而

射之弩箭纔及目光便墮墮地得之者形如白石得者夜可獨行憩卧「皮毛」却邪截疫瘡甚驗啖食「肌肉」益力止呕惡尤靈「鼻」懸戶上生男孕婦

鼻懸門戶癩疾仍治「屎」一封瘡口殺毒鬼魅亦除「屎中骨」研如灰火灼瘡敷効○「豹肉」酸平亦

美食之久則利人種類繁赤白匪同形體小猛捷尤甚獵者網捕亦或得之安五臟補絕陽強筋力壯膽志正月

勿食忌食虎豹尚犯則傷神「脂」塗髮即生「鼻」辟邪立遣「頭骨」燒灰淋汁沐白頭屑盡除「皮」用

作裘可禦寒冷

虎 按《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒湿氣，能治癰癧。

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。

虎骨

豹

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。

門至

虎骨《本草綱目》虎骨味甘性平，無毒，主風寒濕氣，能治癰癧。



〔象牙〕氣平無毒出諸畜國土孕五歲始生其粵者色青而炎者色白朝庭蓄養資守禁門惡聞大聲知人曲直觸人行立喫之理直者則過理曲者以鼻捲牙生在口兩邊下垂尖鋸初解難竟取用湏假易真白木作之擲室數尺以手接而刺之戴安南德牙生在口兩邊下垂尖鋸初解難竟取用湏假易真白木作之凡入劇中舊者尤勝齧牙梳及諸刮屑末研細和水治雜物鐵刺如神刺人喉中調飲刺入肉裏調敷生煎服之可通小便閉溫燒灰飲下又止小便過多〔膽汁〕不附于肝隨時而在四肢春左夏右前足纔見秋左冬右後足可尋撓乳點目皆住疼燒水篩瘡毒消腫〔肉〕配十二辰屬易象由此三名皆有分段惟鼻是其本肉煮熟恣冷令人體重少〔齒〕作屑湯下諸痼疾易痊〔胸前小橫骨〕燒灰酒服能浮水坐沒〔鼻〕端有爪繞可拈針〔蹄〕底類厚紋堪作帶耳後有〔穴〕薄如鼓皮一刺便癢不可不識

〔象〕且上取齒者深入鼻下承人入頤中也

地圖分存象鼻〔脣〕逐條入大口更細分不外於赤帶相連根〔鼻〕中微熱者此出鼻中者也



〔白馬齒〕味甘鹹氣平無毒者處俱有地中者良无色諸般純白為勝擇嫩駒力盛遇春季活收先去取懸壁陰乾務週百日用銅刀劈七片焯半血蒸三時晒以麻布淨搗去皮研細入蕤子桶分等蜜丸豆大酒下空

心藥性論常云房中術偏要增益陰氣堅擎陽莖續絕脈主中傷長骨肉令肥健肉味辛苦小毒堪強腰脊長筋但自此併毛色雖殊白身黑頭等類或臂漏及蹄無夜眼軟下等肉并棄勿食好肉食之宜醇酒送下無人食多心病須清酒解除酒多懷孕患病生瘡禁勿沾口生薑食未蒼耳忌餌同時謹慎勿憂誤犯則病「眼」去腹滿瘡疾取方宜又止小兒驚瘡水摩頓飲「鬃」燒灰敷瘡毒止血「牙」燒灰貼疔腫出膿「頭骨」治男子嗜眠能令睿醒宣作枕卧「蹄甲」理婦人下白立便不流赤馬蹄「懸蹄」亦可煎湯齒痛誠為要藥辟惡氣鬼疰兼

通乳難除癰瘍驚邪且止血竚骨刺人皮膚不治血入人肌肉即亡「心」主健忘「肺」主寒熱「肝」有毒湧泉「乳」解渴宜求「脂」柔五金不坚「膏」塗禿髮復出「毛」療驚瘡嘗驗「鬢」止崩帶常靈「屎」名馬通亦禁諸血「尿溺」盛入銅器可洗白禿頭瘡男伏梁積疝殊功女癥堅積聚極効况椎蠶瘡亦解渴消

「絆繩」碎斷濃頭小兒諸瘡并洗「火」燒熱熟食「肉」炒熟水火不燃
〔糾繩〕碎斷濃頭小兒諸瘡并洗

人體重合「肉」煮熟食「金」鹽酒不無骨「鐵」鐵鍬頭鑄金成金丸「頭」無骨頭下缺骨
膠經目骨立身無骨水絞金丹鍛「肉」頭十二處赤白肉也「頭」皮肉其本肉「頭」頭破之無令
出血大頭「頭」頭骨正中頭顱中空如破圓盤頭者其肉如也半頭如圓盤頭者其肉如也半頭如
白肉者其肉久不愈多骨肉以水潤之使水與肉同根入於肉中之野宜水頭並點而青如是數次即止其肉自止人頭中

人體重合「肉」煮熟食「金」鹽酒不無骨「鐵」鐵鍬頭鑄金成金丸「頭」無骨頭下缺骨
膠經目骨立身無骨水絞金丹鍛「肉」頭十二處赤白肉也「頭」皮肉其本肉「頭」頭破之無令
出血大頭「頭」頭骨正中頭顱中空如破圓盤頭者其肉如也半頭如圓盤頭者其肉如也半頭如
白肉者其肉久不愈多骨肉以水潤之使水與肉同根入於肉中之野宜水頭並點而青如是數次即止其肉自止人頭中

〔審〕一虎平過山中數日見其形如人而首有毛其面如人體而口鼻如虎口舌如人而有毛其面如人體而口鼻如虎



(牛黃)味苦氣平有小毒亦喜俱資耕種黃色者為美有黃凝結兩眼血紅因內熱氣熏蒸無時鳴吼飲水亦好急以益盛外引之欲飲不能自吐求同者喝迫健墮此「生黃」者

衍義云喝迫而得者乃名生黃價類黃金暗室陰

見日月光成於百日輕靈重疊一指體氣息微香又等翠中香堅而不香狀若鳴卵黃同摩指甲竟還凡遇賣者亦此辦真

○再有「角黃」「心黃」「肝膽黃」名後所得為名殺割間或亦有今人得者多係此黃初如漿汁取得便投功

力雖次亦可代克惡龍骨龍膽地黃畏蛩蠅牛膝乾漆忌常山勿用使人參相宜惟入肝經專除筋病療小兒諸

癩鷺吊客忤口噤不開治大人癲狂發瘡中風瘻壅不語除邪逐鬼定魄安魂更得牡丹菖蒲又能聰耳明目孕

婦忌服能墮胎元「牛角腮」係角抄尖用燒灰存性研末絶細調熱酒下咽治閉瘻血作疼血崩亦治

除赤帶白帶下漏冷痢兼除吐衄諸般用之總効「水牛角」味苦冷時疫頭痛惟宜「鼻」灸理口眼喝斜貼
好邊串正斜左貼右作羹調乳汁短少者天晚潤通「腎」補腎氣益精「肝」助肝血明目「肺」止欬逆

「心」主遺忘「膽」益睛眸兼涼唇口焦燥「肉」養肌肉能健中氣發生「小腸」「大腸」「廣腸」並厚各
腸除腸風痔漏「血脾」「百葉」「草肚」俱健脾胃免飲積食傷「牛茎」塞帶漏結胎「牛腦」却風瘤止渴
「髓」益氣以禁洩痢又和地黃白蜜名等分平三焦安五臟治瘦怯補中「乳」養血而補虛羸仍造「酪」
「酥」醍醐「乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白甘脆爽口本經云牛酥尤勝耳酥除肺痿止吐衄潤毛髮
「乳腐」即乳利十二經脉通大

小便難「懸喘」去一切熱風止赤白漏下「血」補身血枯涸「齒」療小兒牛痘「耳中垢」可敷蛇傷
「口中瘍」專主翻胃小兒不能行步「臍中毛」可煎膏「鼻中木卷」燒灰草卷鼻下生瘡敷妙「口中齶

急以益盛外引之欲飲不能自吐求同者喝迫健墮此「生黃」者

草」絞汁喉中噎逆服佳「溺」飲消水腫如神後尿管利小便「尿」燒塗鼠瘻最驗愈矣詹尤奇「黃犧臍屎」用鱗皮廣五寸長一尺蕕薇根五寸如足拇指大或云是良薑根剉以水一升酒三升全熬二升服之當下鹽蟲而愈

按丹溪云牛坤土也黃土之色也以順為性而效法乎乾以為功者壯之用也故凡暑發邪盛之病諸肉皆忌惟牛肉獨不忌者因其能補脾胃為勝爾蓋人身以脾胃為本脾胃屬土此能補之亦各從其類也又獨肝

者食之殺人不可不慎



驢屎處處有河南多似馬類耳長達五更嘶叫龐不駿故稱曰蹇色弗一取其烏背能負重趨程屎堪入藥拯
病不拘乾濕惟用合宜熨風腫瘡瘍主癰癩皮膚牙痛止水腫專醫牡驥屎治燥水殊功駁驥屎本治

濕水神功以守書體成守跡者加為內燥水不成字跡者加內為濕水也一服五合並記勿差「尿汁」理心腹卒疾併症忤當見「尿溺」浸蜘蛛咬毒及噎膈易求「頭」熬汁漸嘗解緩久消渴「骨」煮湯頻浴去歷節痛風「毛」炒黃多漬酒吞諸頭風悉逐「皮」熬膠亦和酒飲各風毒咸敗又治鼻洪吐血崩中帶下血痢疫瘧等證「脂」療多般只宜生用和生椒末搘綿裹塞耳俾積年聾證轉聰同烏梅肉丸水送下喫冬多年瘡疾竟截拌益敷瘡疥攬酒服退癲狂「肉」性微寒啖食宜少雖解心煩而安心氣防發痼疾以動風淫「乳」性冷利味甘誠療小兒諸恙除天吊客忤止赤刺驚癇挺岫入兩耳中用之灌入即化又「尾下軸垢」治瘧發無期水洗汁一杯麵和作兩餅如燒餅未熟者先食其一至發時再食餘完物雖甚微功亦屢奏

驢



驢味甘性平氣要取其膏腎陰虛者可服以降火氣
驢肉性平味甘氣厚能補虛火熱於山野中取其肉
者可服亦能壯筋骨而長筋肉亦可作羹食之

阿膠一味甘辛氣平微溫味薄氣厚升也陽也無毒汲東阿井水東阿縣屬山東兗州府井在城北用純黑驢皮諸膠多係牛皮熬成惟此用驢皮耳成惟此用驢皮耳
底角一片後加文火漸進熬成設官監禁最難得真凡寃極病不可不試真者質脆音易斷明澈如水假者質軟

難敵枯髓似墨製之易剉薄片蛤粉和炒成珠入劑不煎研末調化藥煎熟時傾淨渣滓使山藥裹大黃入太陰肺經及肝腎二臟風濕木旺遍疼延肢體能改火盛金匱久效噏膿血止吐衄崩涕益氣扶羸瘦勞傷利便用調

猪苓湯吞禁胎漏加四物湯服定喘促同款冬紫苑

和蜜臘黃連安胎養肝堅骨滋腎


謨按煎膠用皮取其發散皮膚外也匪特此膠為然諸膠牛皮熬者亦皆能之仍擇烏色如用烏鳴子烏蛇之類物雖治風熱更取其烏黑屬水孟以制其熱則生風之義東阿井水乃係濟水所注性急下趨清而且重用

之煎煮攪濁澄清服之者能去濁汗以及運上疾也

阿井



阿



〔猪膚〕味甘氣微寒無毒猪脊甚多擇健猪冲遍身純黑者綾妙膚論弗一條燶猪時附皮薄黑膚者為真先哲嘗言淺膚之義禮韻疏曰膚革外薄皮膚內厚皮亦指此也湯液云猪為水畜之流猪之性能水牧猪之所必其氣擇水草之交故曰水畜也必先入肾少陰客熱惟此解之仲景製猪膚湯深義蓋本諸此加白蜜潤燥除煩和白粉益氣斬効出一猪卵〕

即雙犀丸却小兒驚悸癲癇或大人鬼疰蟲毒瘡疽瘻縮治寒熱貢豚「四蹄」主傷健潰瘍更下乳汁「懸
「蹄」去懸瘤內蝕仍理瘻瘍「心」托心氣鎮驚「脾」主脾傷除熱「肺」食多損傷亦治肺脹喘急欲練續絹帛潔淨必用合膏「膽中汁」納數道
通便解傷寒熱渴「心內血」初剖猪腹取出時勿沾水切開得之丸諸藥養血安神九禁邪夢紛紜「舌」煮濃湯益元陽健脾
進食「肝」炎燥熱納陰戶止瘡引蟲不次納入則蟲俱引出而瘡自止矣「腎」止腰疼古方煨肾散可觀「膀」扶腎弱新刊
蓮脯丸湏知「肉」多食令人靈肥動風動疾亦速仍用血脉損筋骨勿謂無妨「乳」頻進使人潤澤生精生
血可知更禁猪瘦除天吊暗風撮誠為有益「乳頭」煮啖却鬼毒及寒熱五瘡「牙齒」燒灰鎮驚風併蛇蟲
傷噉「肪膏」利血脉解風熱潤肺「脂油」悅皮膚塗瘡疥殺蟲「腦髓」治頭疼腦鳴「麝膏」塗髮落鬢
秃「大腸臍」搘連殼丸內黃連酒煮十兩枳殼炒四兩以大腸臍能消內痔益腸「脊骨髓」入補陰丸中
可助真陰生髓「血」補中風眩暉貴豚暴氣海外瘴氣齊破「屎」消中濕腫黃天行疫毒腹脹盡毒並解
「耳中垢」亦有驗能殺蟲噉蛇傷「猪窠草」止小兒客忤夜啼安篋下勿令母見「擣猪湯」理產婦血刺
心痛飲腹內何懼證尤

誤
接猪飼養甚多蓋園生急繁食物寡容易長大人啖食弗厭乃嗜脂膏咸筋膜少不勝滑肥本經款中戒勿
多食是又有所據也丹溪云豬肉維補氣補氣即補陽人身中陽常有餘陰常不足凡患霍亂證者俱屬陰虛
謂多食肉能補是猶以火濟火反助有餘愈損不足安能保長壽哉何者肉性本熱入胃則熱便作熱作則疾

生疾生則氣不升降諸證之至豈有已耶予每見患外感者食之證愈增割患瘡者食之寒熱後未患金瘡食之血浓衰潤肥人多食動風發疚瘦人多食助火作熱是皆助其有餘之邪而犯不戒之體也孔子曰肉雖多不使勝食氣聖人以此戒人豈無意歟

小脉如火脉微弱

〔五加湯〕根皮根皮根皮根皮根皮根皮

〔歸心散〕歸心散歸心散歸心散歸心散歸心散

〔地黃丸〕地黃丸地黃丸地黃丸地黃丸地黃丸

〔歸心散〕歸心散歸心散歸心散歸心散歸心散

〔大熟地〕大熟地大熟地大熟地大熟地大熟地

〔歸心散〕歸心散歸心散歸心散歸心散歸心散

〔熟地〕熟地熟地熟地熟地熟地

〔歸心散〕歸心散歸心散歸心散歸心散歸心散

〔熟地〕熟地熟地熟地熟地熟地

〔歸心散〕歸心散歸心散歸心散歸心散歸心散

〔熟地〕熟地熟地熟地熟地熟地

〔歸心散〕歸心散歸心散歸心散歸心散歸心散



〔野猪黃〕味辛甘氣平無毒種雖山畜形類家猪但毛褐口露獠牙腹小足奔長步為黑爾凡及三歲膽內有黃狀

與棗核相侔得之摩水可服療小兒客忤天吊疳脹亦效主大人寒症癩瘍金瘡總愈

〔膏〕和酒立通乳汁服

十朝可供三四嬰孩

〔肉〕作羹向美峻補肌膚食半月令人一身霍辟

〔齒〕去蛇蟲咬毒立効燒研服之

〔膽〕除煩熱邪氣殊功取汁嚥下

〔脂油〕悅顏色併敷風腫疥癬通乳亦能者妙

血痢腸風潰瘍存性


研細調水飲下

〔毫猪〕號為剛鼠其種自孕而生故曰歇體並資自

頸上如筭大毫白而端為牝牡者是也

黑長七八寸入肉處僅二三分中間怒則激去射物特此為鱉人以出類奇之故借毫取名也「肉」多膏味甘美煮作餕食勿過飧能利大便仍發風氣「腊」誠要藥醫者易求烘燥燒灰和諸犀共研作末分勻調酒每空心頓服二錢能改酒痘目黃專消水腫腹脹熱脹易効冷脹難瘳蓋此猪日食苦參致屎性太冷故爾○[江猪]產於江內味酸性氣平溫補者得矣「肉」堪作餚入口略有腥氣慎勿多啖体重難當「腊」和五味煮濃取汁頓飲亦健脾胃進食仍補虛羸

野 猪



「熊腊」味甘氣微寒一云微溫無毒出雍洛河東及懷衛山谷形肥盛類豕狀貌亦與豕同性輕捷過猿猱日向高木攀援見人反轉倒投下寒冬入深穴藏蟄壳饑自掌為飧其性惡食之即死壽經五百歲結化狐狸避之不得之湧發驚箭但資治病宜製精詳「腊」如王在熊當心一名熊白或云腹中肪他金中煉去脂草津務如生排雷處脂通共為是金中煉去脂草津務如生排雷

云魚脂一片入生琳十四味雄雌收紙封待用。臘月得
桂葉去脂草淨並琳雄雌收紙封待用。頭瘡白堊及面妍兒主風癆不仁併筋掣急腸胃積聚
堪却肢體羸瘦能肥久服強志強心且令不飢不渴但有痼疾不宜食之食則終身不能除矣。瞻一味極苦不
附于肝者頭上更移腹中秋足左冬遷足右依四時搜檢懸風際陰乾塊凝明亮如膠性患地黃防已遇實者真
偽難別研試水侵劣便知取座先封水皮將末細投座上座竟而邊分裂末則一線迅行如線
細任為九散勿用煎湯治男婦時氣熱蒸變為黃疸療小兒風癆望塞發出驚癇五府殺蟲敷惡瘡散毒痔病
久發不愈塗之立見奇効。肉無毒味甘脆腊可食如常法調和作之主積聚寒熱痼疾却筋骨麻痺風邪。掌乃
珍餚膾之難熟得酒醋水三件同煮久則腹脹大如皮球主治之能風寒堪禁。血主小兒害忤。膏理愚
節風寒一腦體一作油搽頭亦去白堊風屑止頭旋髮著除耳聾耳鳴。

謨按然一身味之美者積聚于膏觀其冬蟄不食飢惟自舐則可見矣無恆世人貴重以為珍餚孟子亦曰舍
魚而取熊掌非美之極肯此云乎但所治病僅禦風寒餘別無一載者悅口之易却疾之難於此亦可徵也



人頭圖


「鹿茸」一味甘 又云苦辛氣溫無毒山林俱各有生捕獲亦堪馴養小者名鹿大者名麋茸欲取待角將生時尋先
繫致血不耗散陰乾多臭火乾燒宜小若紫苑名茄 恐血氣嫩未全吳堅如朽木是氣血反先衰殘二者俱不足
如琥珀紅潤者為佳仍擇似馬鞍岐矮者為善見勿熟氣茸中有小白製急燎毛烈焰中急燎破開塗真酥油矣
晚候黃褐色入劑研細任合散丸益氣滋陰扶肢體羸瘦立効強志堅齒止腰膝疫病殊功破血隱隱作疼逐
靈勞酒酒如瓊治女人崩中漏血癥小兒寒熱驚癇塞溺血洩精散石淋癰腫骨熱可退疽癰敗角乃味
鹹氣溫取之須按時令冬至一陽生而鹿角解夏至一陰生而鹿角除鹿補多而得陰氣錯肩以蜜淹宿火熬乾
後搘節逐鬼辟邪輕身益氣續絕傷強筋骨消癰腫愈瘡止婦人夢與鬼交令病者招寶鬼話 凡婦人被鬼昏
水潤末服 其角鋸斷堪熬白膠用新角或對者以鋸寸截流水內浸三日刷淨腥穢汲河水入砂罐中投角于內
即言言也每角一罐用堵寶子桑白皮黃蠟各一兩同煮以桑葉塞罐口勿令走氣炭火猛
煮二日如水耗漸添熟湯直待角爛如熟羊脂得酥軟則止將角取起其汁以綿濾淨再入砂罐中慢火熬稠碗盛風吹冷凝成膠入藥
畏大黃得火妙止痛主安胎孕益氣大補虛羸瘵跌撲損傷治吐衄崩帶熱過角晒復研又名「鹿角白霜」主治雌同功力略緩一體一壯陽而填骨髓同地黃白蜜熬膏一肾一補中以滋腎元任作酒煮粥兩用一肉強五臟益力貼口喝辟如神切生肉片右患貼左
煮時之依時按令五月後正月前可一骨一下腸氣安胎殺鬼精物主應服不厭耐老延年一頭肉一瓣消渴上焦一蹄肉一止風痛下踝一筋一續絕傷勞損一脂一主癰腫死肌一血一調血脉止腰疼酒調生脈一齒一理風癉攻瘡毒水腫湿塗○又種一鹿茸一係鹿大者功力尤勝醫者須知取分優劣同前製造丸散依式但性
熱與專補陽多本經亦云鹿茸補陽性熱鹿茸補陰性溫略此差耳骨軟可接莖瘦能扶一麋脂一性異大黃近

陰令陰不痿本經云 可近陰因多淫性故易舉興主風寒濕痹筋掣理腫雖毒肌死仍通腠理更消皮膚一角一熱猶勝白膠因力較麻更緊填精髓緩腰膝益血脉悅顏容漿水中研爛如泥敷面皮不皴醇酒內取末調飲入心腕止疼骨一煎汁飲除虛勞一肉一作鋪啖益中氣

讀蘇東坡云補陽以鹿角為勝補陰以麋角為勝蓋鹿角數多在山夏至鹿角解後陽退之象麋陰獸多在澤冬至麋角解後陰退之象陰陽相反如此故曰鹿茸利補陽麋茸利補陰今麋鹿不分但云麋勝鹿鹿勝麋殆疎失矣又有刺麋鹿血以代茸云茸亦血耳尤大誤也麋鹿角有生至堅無兩月久大者二十餘斤其堅如石凡骨角之類生長無速如此雖草木之易生者亦無能及之此骨之至強者所以能補骨血堅陽道強骨骼豈可與血為比哉據東坡此言似甚有高見但指兩角所補較前經意大違本經言鹿補陰麋補陽以二至日節氣所進者為云東坡言鹿補陽麋補陰以二至日節氣所退者為義故讀者不免啟兩端之疑猶必求歸一之說也愚嘗忖度陽剛而有餘陰柔而不足麋鹿無過同一類者鹿體大而剛強非有餘陽乎鹿體小而柔嫩非不足陰乎正猶男子氣体多剛大女之氣体多柔小是也陽能補陽陰能補陰此理自然不可易者今東坡引多在山多在澤而為陽數陰數之分執此為是則猶亦有水畜畜為陰獸丹溪何言其肉專補陽導導以為陰靈者戒耶凡攝生家欲資兩角分補者湏宗本經之文以為世準的也

又按淮南子曰孕婦見兔而子挾唇而麋而子四目物有自然而似不然者麋有四目其二夜目也古謂目下有竅夜半視物者是滅

鹿茸



「犀角」味甘酸鹹一云甘氣寒無毒點蜀雖生南為上首

頂僅一角或云犀有二角一在額上者為兜犀
一在鼻上者為胡帽犀枯犀亦有之

但一角者居多腹口牛足每歸其皮一孔三七色黑如食棘葉有水陸

水犀係各種類分貴賤悉以粟紋犀數種俱有
之精繁以爲貴賤也

通天犀角獨優紋現百川幾是其犀胎時見天上物命過並形于角故云通天欲驗于月下以水盆映上知通天矣此犀日飲濁水應照影

形海人設法捕求沿橋找木犀來往倚不少想木折損犀亦倒地足直前足直不能屈難竟起走捕者由是獲擒取角售

人為世至寶置米中鳴駭亦名駭

鳴犀掛於

隙鳥營縛足過涧水自聞簪髻晚行露不惹飲饌毒試投內白沫許起

毒居舍塵可除昔石保吉官陳州患毒瘡麻欲新之見風塵燬照莫測深潭盡見水底怪物見晉溫嶠傳造器者煮熟

弗効採新者性烈方佳錯屑鋟抄小紙裹懷中先挹沾人氣則易搗治病選黑色擇肌膚破潤光使松脂經入陽

明忠雷尤忌鹽醬諸角俱忌殺鈎吻蛇同蛇毒山谷溪毒百毒皆除辟疣痘兒痘思邪諸邪盡遣傷寒溫疫能解熱


煩瘡腫癰疽專破膿血鎮肝明目安心定神婦忌之因消胎氣「牡牛角」有小毒多作撒豆斑紋為帶繫腰

色深眩目化肺癰膿血成水退時熱煩悶發狂風毒竟敗心神亦鎮邪精鬼魅悉却難侵一特犀角乃甚良斑白分明細緻因紋不賴又謂斑犀造詣不堪克藥不及鼻「角」治病為上氣味無毒大寒攻心下肺氣熱煩除腸中赤白澀病中惡中毒俱治風癰風腫銀醫「肉」味甘溫功劣于角喉過多腹易煩脹麝香少許和水吞之即解入山林路不失迷療瘧蛇咬傷及血崩痔瘻及海外瘴氣俱蟲疳精邪

誤按丹溪云「牛角屬陽其性走散比諸角尤甚習俗痘瘡後多用以散餘毒若無餘毒或血虛或有燥熱發者用之禍不旋」誤庶取其犀取尖以力之精銳在是匪此為然諸角取尖相同也

第一卷升麻引後誤按宜參看

犀 牛



〔羖羊角一 殷音 味鹹苦氣溫微寒無毒近道名處俱生陝西河東獨盛種多白色惟克庵廚藥宜青瓶乃獲効驗其或獨生一角又等白身黑頭有毒中藏全葉勿啖鹵莽誤犯即生腸癰骨裸之家不可不慎一角一取勿先中濕

沾

味鹹苦氣溫微寒無毒近道名處俱生陝西河東獨盛種多白色惟克庵廚藥宜青瓶乃獲効驗其或獨生一角又等白身黑頭有毒中藏全葉勿啖鹵莽誤犯即生腸癰骨裸之家不可不慎一角一取勿先中濕

蟲治小兒發熱癆邪癆婦人產後餘痛取百節中結氣逐兩眼內青盲山瘴溪毒蛇法虎狼蛇虺齊碎一肉一甘大熱專補形骸主勞傷膩氣虛寒理風癆肌肉黃瘦閼胃且止吐食益腎不致痿陽孕婦及水腫暴乘葉勿入口。

骨蒸併瘧疾方愈忌莫沾唇倘煮入醬和之生癥仍發痼疾云年不又筋膜中珠子一食示令人癲癇一蹄肉一雖微補水甚據水腫啖者百不一瘳一頭一涼治癆熱骨蒸及風癆疫病發寒宜禁發熱宜飧一脂一润去

避風黑點併疰病傳屍入金可乘入銅可可軟一腎一益腎理精壯陽敗同乳粉極靈

年腎一箇煮熟和煉成乳粉五錢空腹食極効

〔心〕浦心主憂患氣疼有孔者勿食有毒殺人一肝一療肝風熱效眼淚凝眵一肺一治肺虛效痰及小便頻

敷〔胫骨〕固牙齒疏豁易動青盐略加即固牙散一脊骨一匡腰脊轉側不能寐竈微火一齒一燒及逐小兒年癆

寒熱一皮一作臚疎大人脚膝虛一膽一解鹽殊功開青盲明目一睛一塞汗速効補虛怯健脾一血一

取生飲下喉破毒硫黃毒竝解一毛一用炒裹脚踝痛轉筋痛濟除一骨髓一煮酒寄淋陰虛血脉可利一腦

髓一和酒服迷心竈中風使未擣一乳汁一潤心肺解消渴補寒冷虛乏造一醃酥一益五臟利腸胃療口舌瘡

瘡一屎一曝燒煙亦堪兩用熏瘡却痔瘻諸瘡熱毒薰鼻去中忍心腹刺疼



誤按十刺云補可以去弱人參羊肉之屬是也夫參補氣在中羊肉補形在表補之名雖一補之寶則殊凡患虛羸之人當分用之不可泥一等也

「羚羊角」味鹹苦氣寒無毒形類耳色青頤大角多節勁銳猶長甚堅勁長一二尺種生川蜀山林夜宿角掛樹上

獵犬追捕亦多獲之虜人常以貸錢州郡亦無充貢入藥拯病鋸角取尖認癰盛處有掛痕深入者纔真聽人耳邊似響聲微出者尤妙如節疎無掛痕者聽無聲者並山角

仲景上為味苦寒解傷寒寒熱在於肌膚散溫風注毒伏於骨肉安心氣除癰瘍驚夢狂

越擇邪氣辟盡惡鬼不祥退小兒卒熱發搐驚癇破產婦敗血衝心煩惱去惡血注下治食噎不通明日益氣輕身強陰健筋堅骨一肉一和五味子同炒投酒能逐中風證筋骨急痙商人食之免致蛇噉



牡狗陰莖」味鹹氣平無毒大者狗喚小者犬稱煮啖尚色黃入藥取毛白六月上伏將莖刮收文火烘乾方不臭腐專助房術又名狗精堅舉男子陽莖兩三時不痿禁止婦人帶漏十二疾咸瘳「膽汁」敷癰瘍惡瘡目疼可點兩眞「热血」治發狂癲疾鬼擊可塗遍身「腦」主頭風併瘻肉塞鼻「齒」療客忤及風瘻盈肌「心」主要恚氣除邪「腎」理產勞熱如瘧「肝」破瘀下利痛調稀粥任加醬與鹽「乳」點眼久青盲擇狗維末閉目即取狗維目而其疾即愈「項骨」止諸瘡血出「懸蹄」通兩乳直流「肉」味鹹酸性稍溫热安五臟益氣力壯陽道補絕傷同蒜食損人若炙食作渴孕婦入口生子扶脣九月下咽傷神煥氣陰虛火動尤甚禁之「骨」煮粥補虛令婦人結孕「領下骨」去鷺瘡抽搐「屎中骨」葉寒熱往来「屎」曝燒灰塗瘡疽止癩猪脂調末

敷疗腫拔根入

人陰子骨

大便血熱

氣中管

葉實然發末

「果」細熟及生熟的

立春節

本

本

誤投丹溪云人身之虛皆陰虛也陰虛則陽必亢不此為補寧不助火以添病耶毋俗言其大治虛損似指人

而虛議治殊不知患屬陰虛若陽果虛損死甚不難雖有敏者亦難措手豈此之能補乎今人每信之而啖之多者是皆泥乎習俗之說也

魏西醫「魅也」俗謂狐魅惑鬼更作鬼魅也

唐李叔同詩文名號皆取名於此

宋周密生「鬼」即謂鬼也

牡狗陰莖

小者

大麻壳白

黃人蔥頭子

白芷

桂枝

火炭草

火炭草



狐陰莖一味甘氣微寒有毒江南雖生京洛尤盛形類黃狗尾大鼻尖心多疑渡河水輒聰口善媚禮北斗而靈能為妖魅迷人由古淫婦所化其名阿紫至今自稱獵犬追尋亦可捕獲醫方所用雄者為佳刮取陰莖烘研酒下主婦人絕產陰癢治小兒卵腫陰癰「肉」無毒氣溫任煮炙日食愈癰疥瘡竈竈竈却驚癇破盡毒去五臟積冷邪氣除精神恍惚亂言「膽」王暴亡溫水微研灌入「肝」治風疾燒灰以酒調吞「五臟」及「腸」療蠱毒兼療牛疫「頭尾」併「糞」辟惡邪且辟春瘟「腋下皮毛」純白作冬裘輕柔難得狐白裘即此「口中涎液」合媚藥合接易成以小口噙咸肉置狐所常經處狐見肉欲咬爪不能入徘徊不捨涎皆入罐中故得取為媚藥○又種名「狸」是亦狐類但狐口銳尾大

其狸一 方身文此種甚多須細選擇如獵斑者劣似虎斑者侵入方剗取「骨」炙研水調治諸症毒氣在皮刺
痛去遊風惡毒止心氣之疼同雄麝雄黃丸治痔瘻効「頭骨」治鍼為散下咽「肌肉」療諸症亦宜「陰莖」

通月水誠驗「屎」主寒熱瘧瘧收宜五月端陽

麝香

雄黃

丸

治瘻

瘧瘧

頭骨

散

下咽

肌肉

藥

陰莖

丸

麝香
雄黃
丸
治瘻
瘧瘧
頭骨
散
下咽
肌肉
藥
陰莖
丸

麝香
雄黃
丸
治瘻
瘧瘧
頭骨
散
下咽
肌肉
藥
陰莖
丸

麝香
雄黃
丸
治瘻
瘧瘧
頭骨
散
下咽
肌肉
藥
陰莖
丸

麝香
雄黃
丸
治瘻
瘧瘧
頭骨
散
下咽
肌肉
藥
陰莖
丸



【麝香】味辛氣溫無毒陝西各山谷俱生文州諸蠻中尤盛形類獐略小者結臍近陰凡臍用之時自得蹄尖剔出所落之處草木焦黃一名遺香性甚辛烈人若檢得價同明珠蛇蛻色藏香彌不泄日常噉蛇為食是則又相使焉市家但得臍囊每研蕩拔攬賣當門子拉亦係造成砍的實求真必親目見割勿近火日碌碌細擣辟蛇虺珠蛇蟲盡瘡瘻總卻殺鬼精敗疫癰脹急瘡滿腮消腫生墮胎通乳利竈除恍惚驚怖鎮心安神療癱瘓瘡瘻
蝕膿血吐風痰不夢寤驚寐點目疾去翳膜沃眼「肉」似獐肉微腥食之不畏蛇毒惟忌葫蘆亦宜知之

羚羊

出上用以入藥取其角及肉煮熟食之

羚羊角 鄂州廢香如燕草根也

水苦甘寒能治上焦熱病

白毛者曰羊脂素味甘性平能散寒止熱在頭目皆可服

山羊角 羊本角者一名蠶角骨勝羊角人地有數種因狀而稱之

人地有數種因狀而稱之



猪肝一味甘有毒一云平鹹微热無毒一云惟肝性溫餘皆性寒一名水狗多產江湖常居深水食魚亦登大木想其故附獸列砍捕不難性偏嗜貓先畫板誘引待來聚玩魅用網誘擒一肝一與諸畜大殊逐月生出一葉十二葉漸落復生凡欲得真必須見剖或炙熟旋啖或燒末酒調痊病傳屍一門相染者患効產勞發熱三時虛汗者殊功上氣嗽嗽堪除鬼毒癰癧能遣崔氏方常療虛疫仲景制海治冷勞却魚鰓喉中消水脹腹內一肉一主時行瘟疫及牛馬病煮汁灌良一骨止嘔噦惡心併魚骨雙燒灰調下一腎一煨熟啖宜男子一髓一為膏敷減瘢痕一膽汁一點目睛即止痛別除目膜謂分盈中之酒誠係讹傳但塗盈唇可使高一分酒勢一皮毛一飾領袖北方人多用善辟邪避禦風寒云拭眼睫之霍未為異事惟穿身上不沾受半點及塵一足爪一颈下爬之亦去魚蝦甚驗手足破裂煎服更良

其解之今直文少新舊各不同此以據之者多是人也他用一毫又附本草一毫又附本草一毫又附本草

拾金（首）金少服素其然故燒多益中（附）絲桂蜜火發（附）

赤脉天王丹酒曲參味甘淡氣微甘而有氣味者不以寒

赤脉天王丹酒曲參味甘淡氣微甘而有氣味者不以寒

猶

赤脉天王丹酒曲參味甘淡氣微甘而有氣味者不以寒

絲桂蜜火發（附）絲桂蜜火發（附）絲桂蜜火發（附）

（內）知之也謂之知之也入



「臍肭脈」味鹹氣大熱無毒惟生東海傍俗疑海狗肾狀類腎囊乾者仍兩罩丸拈取或又指形体係獸係魚俱未據的見立言立說由此真偽莫別只憑試驗纔知投臍肭大過犬或鷺狂跳起置寒凍水內水因溫暖不冰得此真酒漬透炙乾氣馨香勿鰐燭成細末任合散丸療痃癖在臍併脾胃勞極破宿血結聚及腰膝寒痺辟鬼氣禁夢與鬼交逐魅邪止睡被魅魘除冷積益元陽堅添陽管不衰誠助房術取樂

「臍肭脈」味鹹氣大熱無毒惟生東海傍俗疑海狗肾狀類腎囊乾者仍兩罩丸拈取或又指形体係獸係魚俱未據的見立言立說由此真偽莫別只憑試驗纔知投臍肭大過犬或鷺狂跳起置寒凍水內水因溫暖不冰得此真酒漬透炙乾氣馨香勿鰐燭成細末任合散丸療痃癖在臍併脾胃勞極破宿血結聚及腰膝寒痺辟鬼氣禁夢與鬼交逐魅邪止睡被魅魘除冷積益元陽堅添陽管不衰誠助房術取樂

「臍肭脈」味鹹氣大熱無毒惟生東海傍俗疑海狗肾狀類腎囊乾者仍兩罩丸拈取或又指形体係獸係魚俱未據的見立言立說由此真偽莫別只憑試驗纔知投臍肭大過犬或鷺狂跳起置寒凍水內水因溫暖不冰得此真酒漬透炙乾氣馨香勿鰐燭成細末任合散丸療痃癖在臍併脾胃勞極破宿血結聚及腰膝寒痺辟鬼氣禁夢與鬼交逐魅邪止睡被魅魘除冷積益元陽堅添陽管不衰誠助房術取樂



鱗鰭甲一氣微寒有毒深山大石俱有身短尾大類鼈後陵為穴居於陵加鰭因鱗色若鰭俗醫不知守義竟以穿山甲稱水陸竝能食蠍有法在岸則廻之不動如死從蠍入洞緊閉投水中後開蠍自浮出而食之入藥用甲剝碎少和蛤粉炒黃去粉主五邪鬼魅驚啼悲傷療瘧瘧疾瘡疥癬痔漏或研細酒水調服或燒灰脂油拌敷同木通自然銅鹽末酒調治吹喉腫痛同蝦皮豆蔻仁為末湯下止氣痔未膿又解破暑結之瘧邪因穿經絡榮分




皮一味苦氣平無毒一云味甘有小毒形賦與瑞音獨者相類生養名山谷短足慢行人見則頭足侵藏國輶如粟房攢毛外刺捕者砍折溺之即開取一皮毛一燒灰調熱酒吞下所畏二藥桔梗麥門主五痔血汎大腸理諸疝痛引小腹治胃逆開胃氣殊功寒鼻衄消溼痔立効腹脹痛可止陰腫痛能祛一肉一啖之易肥仍理中令人能食一骨一食之則瘦更續筋致足難伸一睛一注耳竅久聾一膽一治鷹食成病

帽皮

「兔頭骨」味甘氣平無毒深林空谷處處有之孕視月光結成子從口內吐出性狡喜走目瞭極國毒歷千年毛變白色此得金氣全具用入藥劑最佳「頭骨」下妊娠癲疾頭眩痛可止「頭皮」敷瘡瘍鬼疰皮刺疼能祛「肉」味辛平為食上品春夏全忌秋冬啖宜主濕痺熱蒸壓丹石燥發補中益色止渴健脾孕婦戒勿下咽生子缺脣屢驗「肝」除目暗「膏」通耳聾「腦」塗皰裂凍瘡「毛」敷臭癩痘瘻「屎」曝亦堪煎汁「玩月砂」素傳名療痘生眼肉成瘡瘻發腸頭下血並可服之「皮」晒連毛燒灰擂細調均熱酒理產後胞衣不下餘血槍心幾危須急飲也

兔





不捨因緣心慈為解脫身

臘羊：臘取山野毛皮，其皮毛堅厚而有光澤也。〔臘〕音如馬。臘皮及臘毛皆長而
毛皮亦黑滑〔臘〕。臘白皮〔臘〕。生蠶蠶皮〔臘〕。蠶蠶即蠶蠶也。〔臘〕
〔臘〕五采者，合五色者，故名五采。長者，長直也。中者，中正也。青者，青青也。紅者，赤
色也。朱者，全也。具，固也。臘肉謂臘〔臘〕。臘者，養也。臘肉，言臘也。臘肉，臘也。
〔臘〕五采者，謂臘肉也。臘肉，臘也。臘肉，臘也。臘肉，臘也。



鹿角：鹿角，鹿角也。

鷦鷯：鷦鷯，鷦鷯也。

鷩鷩：

鷩鷩也。

鷩鷩也。

鷩鷩也。

鷩鷩也。

鷩鷩也。

鷩鷩也。

鷩鷩也。

圖像本草蒙筌卷之十

門生 敘呂葉斐 鮑倚
潭陽後學劉孔敦 姓晨

校刊

新安陳嘉謨廷采纂輯

潭陽後學劉孔敦

若樸 增補

禽部

丹雄鷄

味甘氣微溫。一云微寒無毒。各處雖多為饌堪用。

朝鮮國者妙。

入藥宜求性動風。患筋攣切忌味助火。

及助濕中之火。病骨熱須防。合水鷄食作道屍。和魚汁食成心癥。凡資食療不可不知。補虛溫中通神健脈。止血除血漏。

殺毒辟不祥。

頭

殺鬼疰魅精。

東門亡

肝

補腎虛肝損。

腦

刺血。點飛絲眼免害。

薑

淬酒淬之治白虎風止。

炒黑治白虎風止。

白雄鷄

味略辛酸。小差。飼三年能為鬼神役使。療狂邪下氣。止消渴調中。仍利小便。更壓丹毒。

距

主婦

人難產。

鷄

禁小兒驚癇。

烏雄鷄

微溫補中止痛療折傷癰腫殺鬼安胎。

冠血

滴自縊入口中。按胸中回緩。

即活。

熱血

浸馬咬人患處。及蹉折骨痛俱甦。

肪

去耳龜。

心

除邪夢。

腸

烘燥止溺。

肝左翅

起陰。

膽汁

敷月觸耳瘡。眼目昏暗。

脇

金白癩風癰癰瘍浸淫。剥取。

胫脛黃皮

即肚裏黃皮。性寒亦去煩熱。男子溺遺。

一各鷄內金

有云治以鷄矢。素問消鍼張載名禮矣與深同。主亡津液渴消解傷風寒寒熱破石淋。

精減赤白痢並調。女人漏下崩中。赤白滌者總禁。

尾

燒灰封皮肉出刺。

即

膀胱內金。有云治以鷄矢。素問消鍼張載名禮矣與深同。主亡津液渴消解傷風寒寒熱破石淋。

古多用仲景治轉筋。作散。

有鷄屎白散。

素問消鍼張載名禮矣與深同。

主亡津液渴消解傷風寒寒熱破石淋。

尿白

微寒。自

利小水。止遺溺滅瘢痕。○

黃雄鷄

益氣壯陽。主傷中消渴。安五臟。禁痢。止洩。療勞劣遺尿。續絕傷。健脾胃。子絕

哺者肉食殺人。蓄養之家。亦當謹記。

鷄卵

煮啖。鎮心止驚。益氣。漸開喉音。

生吹亦妙詎

唱者多用之。去風尤安胎孕。

黃白

混鴉。同鱗魚。琥珀堪為拾芥。不能媒利。則可。

卵生

未煮熟者清醋令壞。敷面。疵癧生光。

卵黃

和亂髮同煎。自消作

水。用服。主小兒驚熱。下痢。瘧疾。百病齊駁。用敷去小兒火熱瘡瘍。頭癩。來瘡並掃。

卵白

未煮熟者清醋令壞。敷面。疵癧生光。

卵黃

和亂髮同煎。自消作

錯者。通產後瘀血。閉脬。胎衣不下。更飲蜜者去身外熱毒。欲發目熱。亦睡須搽。

蕊內白衣

名鳳凰退得麻黃紫荳。內研點。醫障。侵睛。理傷寒勞復。

蕊散。久欬結氣如神。○黑雌鷄

養血安胎。治癰疽。排膿通瘀。主風寒濕痺。補產後虛羸。哺者勿嘗。殺人亦

速。○卵咬補真陰不足。止產血來勤。

衣

亦設內衣研點。醫障。侵睛。理傷寒勞復。

母知。

巢中草

禁小兒夜哭。安寐下。勿令

牛膝

水加鹽炙。一枚。煎取。灌之。效。只飲食鹽水。不啖。能除夜哭。在鼻孔中。止頭血。

金毛

丹 雄 鷄

木槿



譜

接鷄之種類最多。古今方書常用。並以毛色分其優劣。丹雄者取冠血併頭。黃雄者稱卵白及卵。其心肝膽血腸肺翻翅膀黃皮及屎等類悉取烏雄者為優焉。夫鳥與黑同。黑乃水色。丹漢曰。鷄屬土。有金與木火。則所寓者惟火水耳。今得毛色之鳥。是五行具全。不致偏勝。用之治病。寧不為優。古人取義實在於此。然常五更鳴者。蓋巽為鷄。巽位屬乎東方。五更陽升。必從此位。鷄感其氣。故亦聲鳴。又陽主動。鷄初鳴。兩翅先拍。則可知矣。

雞肉

味酸氣微寒。無毒。一云平溫微毒。南北山野俱有。雌雄毛色不同。聲作鷄鳴。實係鷄屬。呂后名雉。故高祖字以野鷄也。其飛不高。若矢。直往百步即墮。因以雉名。今船車中。取尾插其竿頭。亦欲快速之如矢爾。庖厨堪用。益少損多。九日間食之。有補五臟氣喘息而不止。及消渴。小便多者特功。腸胃氣虛。下痢無度。兼大孔痛者。立効。更主諸瘻。尤為要方。餘月食之。生瘡發痔。一說雉是離禽。明旺肝火。丙午日遇切忌沾唇。合胡桃肉食。發頭風心疼。合蕎麥麪食。生蛇蟲。腹痛。菌蕈木耳同食。發痔下血難休。自死者足爪不伸。若食之殺人頃刻。久食漸瘦。

痼疾復興

解 煮同葱食之方妙。

○ 錦鷄

與丹雄鷄垂尾長尺餘。毛羽具紅黃色。多有圓斑點。喙藏肉緩。睛則

外舒。見者不明。咸謂吐錦。煮食香美適口。且令聰明。養觀文彩動人。更禳火疫。

○ 鷄鷄

黃黑上黨。多生禽經篇

中。稱為毅鳥。

謂鷄毅鳥也。

因其猛氣健鬪。鬪死不離。

至今武人頭盔常着其尾。

多食勇健。且補虛羸。

○ 英鷄

體

熱無毛。吃碎石英所致。人食肥健。潤澤補足陽道而然。惟出澤州。得之亦易。

○ 竹鷄

形小尾短。

即山鷄今江東極多

山鷄

形小尾長。並可網羅為饌。饌酒食多中毒。急嚼生姜。蓋此二鳥常食半夏苦葉。故此可解也。


野

鷄



錦

鷄



鶴

竹



鷄

鷄屎

鷄屎

性寒無毒。乾者勿用。新者檢來。解結縛殊功。散宿熱立効。腹中五金燐毒。諸石藥毒。並絞濃汁飲之。身生

作腫惡瘡。作癩。熱瘡。悉調鷄清敷上。蚯蚓咬噬。亦堪搗消。

肉 性微寒。補虛最勝。昔可以治勞怯。白鳳膏。曾載

方。善利小便。消水腫。脹滿。和臟腑。退卒熱。驚癇。擇白毛黑嘴為佳。忌烏龜。鱉肉同食。頭綠者亦堪入藥。目白者有

毒殺人。

血 調酒類吞。解諸毒極驗。

頭 作丸。旋服。

古方有鷄頭丸治水腫亦靈。

卵 寒去熱於心胸。食多漸軟其脚膝。

愛嬰兒者不可不知。古今治毒者甚多。而其數者中取首尾者也。故少取。

野鵝肉

味甘氣涼無毒形類家鵝翅能遠飛江北多生冬月可食霜降後立春前食勝家鵝雖冷而不動氣去熱而能愈瘡瘍

久不愈者多食即差消食積和胃輕身退水腫補虛益力除惡瘡癰風熱毒風同食切忌三般胡桃豆蔻木耳○又甚小者


刀鵝

呼之味亦甘涼食之補益

謨按野鵝與家鵝有相似者有全別者尹子曰野鵝為鳬家鵝為鶩鶩音木質木故也鶩性木不能飛翔如庶

人守耕稼而已故周官庶人執鶩即此觀之則鶩為家鵝明矣寇氏衍義別王勃云落霞與孤鶩齊飛乃以鶩為野鵝殊不知詞人模寫景象託物啟興而已難以泥其形跡况下條鴟肪本經亦以鶩名此指鴈未可知若據此而以鶩為野鵝則鳬又當為何鵝耶

野鵝



巨遠食

白鵝

白鵝膏

味甘氣微寒無毒近水鄉村多養可辟溪毒依山屋舍但蓄即禁蛇蟲謂辟溪毒禁蛇蟲者未必能食之蓋以成相制耳夜能捉

更猶堪鎮宅。

鵝

多食蟲有毒。發諸瘡疥。除射工最靈。

白鵝

不食蟲性平。解五臟熱。止消渴極効。凡瘡食療。

惟白為宜。兩耳卒聾。**膏**喉下通竅。一身利澁。**脂**敷上潤肥**尾**與**毛**俱碎射工。仍燒灰治卒聾須記。**肉**和**卵**並補臟腑。但食多發痼疾尤防。誤吞稻刺塞喉求**涎**旋嚥。忽染溪毒着體。覓**血**遍塗蛇蟲噬傷。**糞**可敷愈。

白鵝



鵝味甘氣平無毒。多宿蘆洲亦居草渚。小曰鵝。大曰鴻。本經錄中又名鷺鵠差能長幼行序不紊。寒投南。熱投北。陰陽升。降預知。蓋得氣之中和。人故用為禮幣。一取其信。一則尚其和也。世人因之。不忍殺食。或謂天厭道家謬言。入藥。貞財。冬取纔妙。六月七月食之。傷神。合豆黃為丸。能補勞瘦。單煉濾調酒。酒一杯調防。專逐風癉。多服長手髮生鬚。久服壯筋骨助氣。**膏**亦長鬚。用和泔水洗頭。亦治耳聾。膏毛可駁瘍。取與小兒帶佩。自落者妙。一說喉下。又其小唇

後出。見表世尊以藥浴身。洗滅於憲。既而復乘此北度至冬日河會。齋戒於江邊。觀火而不燒舟。去曉而詣食藥。小

鶴

味辛氣平。有毒。種有兩般。用宜細認。胸紫赤而輕小者名

越鶴

入劑不宜。胸斑黑而聲大者名

胡鶴

白

鵠



白鵠肉

味鹹氣平。無毒。鵠條鵠類。翔集屋間。毛色品第最多。雌雄相配不混。人家蓄養。孳育極繁。

欲肉

烹庖以

水浸死。解諸般藥毒。除久患疥瘡。

屎

收曝乾炒。黃鵠末治驢馬患疥不已。和草料逐日飼之。

鶴

味辛氣平。有毒。種有兩般。用宜細認。胸紫赤而輕小者名

越鶴


入劑不宜。胸斑黑而聲大者名

胡鶴



治病方効。春夏則巢屋舍梁楣而孳育，秋冬乃入樹孔土穴以蟄藏。作窠喜長，堪容足絹。床積地上，依時採收。治久瘡最靈。臨發日攬酒一升，捧兩手取氣，漸熏鼻中。瘡即禁止，蟲盡毒尤驗。空心時炒香三合，九獨蒜搗，用之。用湯竟送腹內，盡立滅除。殺鬼疰而逐不祥。被五瘡以利小水。肉搗敷痔，亦能出衄。殺則不宜死者方可。○窠取哺雞處所，作湯可浴小兒。悉逐驚癇，盡除瘡疥。

雀卵
白丁香



雀卵 味酸，氣溫無毒。多生古屋樁內。依時可以取收。和蛇床子為丸。用房室中取藥。溫酒送下。專益丈夫。扶陰痿。易致堅強。補陰衰。常能固閉。腦髓治雙耳聾塞。仍敷凍瘡。頭血 黑兩目崔盲。使夜見物。肉 大溫熱。益氣壯陽。煖腰膝有功。損姪忌食。○其雄雀糞名 白丁香 兩頭尖者真。端午取之妙。甘草湯浸一宿。曝乾研細收藏。決肌表軟癆癰癧。塗之即潰。療目內努肉血膜。點上立差。去癥瘕伏梁。爛瘡癬積塊。齒痛通用。屢試有靈。

圖經本草卷之十

新安
雀
嘉謨
更采集

鳥部



倒悬能以足冬月不食形大一斤者為美色白如粟者更佳人服之可治癰瘍久服無病也此物生於蜀故稱伏翼雄雌成形圓頭重集則

圖像本草蒙筌卷之十終



治久瘧最速。驅發日燒酒一升，和所取藥末，置即乘止。國醫嘉之。空心時，炒香三合，加九個，許少許，以利水。內服，亦能出蟲。但以利水，則不宜死者方可。○第

圖像本草卷之十一



葉味酸氣溫，無子，生根內，依時可以取根，易錢至謂之金錢。能風寒，除熱，治頭目，耳鼻塞。根皮，有功。折其根，食之，無病。根皮，性平，味甘，氣溫，陽。根皮之外，甘草湯浸一夜，取乾研細，以水煎，服表，散肺毒。服之即瘥。每日內外用此膜裹，一月去寒痰，不渴，周身無病。此用墨試有靈。

圖像本草蒙筌卷之十一

增廣

本草蒙筌卷之十一

欽定四庫全書

欽定

欽定四庫全書

欽定

欽定四庫全書

欽定

欽定四庫全書

欽定

欽定四庫全書

欽定

欽定四庫全書

欽定

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生

增胡一貫

姓晨

校刊

潭陽後學劉孔敦

若樸

增補

蟲魚部

伏翼

味鹹氣平無毒一云微熱有毒原名蝙蝠古寺多生晝伏夜飛改稱伏翼雌雄交感胎孕成形因頭重集則倒懸能伏氣冬月不食形大一斤者為美色白如銀者更優人服之亦期壽之同也

因能伏氣做多壽而白

灰色甚多未可服食夏月張

獲製宗雷公主脇爪外毛留罷脚肉翅醇酒浸宿漉起陰乾絞黃精汁旋生架文火上烘燥任研丸散每服酒吞



伏翼

為使藥加覓寶營實逐五淋而利水點明雙目而撥翳雲久服延年無憂令人喜樂媚好目血點眼夜視有光○

又夜明砂

即所減糞燒灰酒服下胎孕已死腹中炒過酒調治癩癩延生頭上搗散少拌飯食又治小兒無辜

蛤蚧 味鹹氣平有小毒一云無毒嶺南山中有城牆樹底多首類蠍墓背如蠍子尾長身短顏色土黃一雌一雄

自以名喚行走無異蝘蜓時常護習尾稍見欲取之輒自齒斷採須全具入藥方靈製宗雷公去頭足鱗鬚雌雄并用以酥炙研成倘或鬻諸市家預須口含少許奔走百步不喘方真主肺虛聲嘶無休治肺痿血咯不已傳屍勞症悉逐着躰邪魅成祛乃通用經更利水道。

勞症悉逐着躰邪魅成祛乃通用經更利水道。

蛤蚧

毛魚

肉

牡鼠

氣微溫無毒種類至多晝匿夜出性善盜竊故稱點蟲取入醫方惟採雄者生搗署疎折傷能續筋骨煎嘗敷湯火爛善滅癩痕主小兒哺露成瘡敷酒旋飲補大人骨蒸勞瘦作羹時嘗以黃足尾隨胎易出產難宜求肝



杵塗針折肉中。及箭簇刀刃在諸隱處作痛。糞煎理小兒癩疾。併傷寒勞復。陰陽易證幾危。

牡 鼠



蟬

味鹹甘氣寒無毒。夏秋林內處處有鳴。收取蒸乾勿令蟲蝕。治產婦胎衣不下。通乳墮胎。主小兒驚癇夜啼。

蟬

逐熱○蟬蛻。係脫換薄殼。翅足須除去。醫膜侵睛。努肉滿背。服科內誠奇。○蟬花。乃狀類花冠生殼頂。

止天吊瘧癥。心悸怔忡。幼科中果効。

蟬



蜜蜂

味甘氣平。微溫無毒。大小成群居止。第一江南地濕多。

石間江北地燥悉入土穴內人家作桶收養亦

結房壘舍中日逐交飛採花釀汁。久和熟。

凡蜂作蜜必須人小便以釀諸花乃得和熟似飴一說以滻濁之水注之蠍房而後蜜成故謂蠍者蜜之漬也是謂蜜糖

蜜糖

三年一取者氣味濃。一年一取者氣味薄。故本經以石蜜優。

家蜜劣也。入藥煉熟滴水成珠。煉法詳載總論款中。

益氣補中。

潤燥解毒。養脾胃。卻癆瘍。止腸澼。除口瘡。心腹卒痛即敵。

五臟不足俱補。補陰九用。取甘緩難化可達下焦。

黑眼

膏蠍因百花釀成能生神氣。蜜導通大便久閉。蜜漿解虛熱。驟生食多亦生諸風。

七月忌食生蜜。○蜜蠍味淡。

天下之味莫甜于蜜。淡于蠍。厚于此者必薄于蠍。自然也。煎蜜得之陳則色黃。


新則色白。本經條中只言白蠍。不言黃蠍者。蓋用蜜宜陳用

蠍宜新也。精良致入藥勝本經所取亦或在此。一說蠍熔納水中十數過即白乃蠍之蓋氣止渴病。補中續絕傷。熔裹大黃丸。隔寒涼脾胃無損。

斷穀可度荒歉。腸胃不饑。

蜜

蜂



蜜

石



蜜蠍味淡。

露蜂房

味苦鹹。氣平。無毒。各處山中多營樹上。七月七日。收取陰乾。去外皮。用內房墨。炙燥。惡芩芍牡蠣。

及乾薑。大參。主癰疾。蠱毒。鬼精。治驚癇。瘻癥。寒熱。蜂毒乳毒並解。赤痢白痢總除。水煎汁服治。齒疼酒調灰服。主陰癰。瘰癧作孔。研和猪脂塗差。癰腫不消。磨以釀醋敷効。熱病後毒氣熏口。可煎水。頻頻洗之。

蜀州露蜂房



五靈脂

味甘。氣平。無毒。出河東郡州。係寒號蟲。狀類鐵。多夾砂石。淘以酒。專治女科。行血宜生。止血須炒。通經閉。及治經行不止。去心疾。併療血氣利疼。敵血痢。腸風。逐心腹冷氣。定產婦血量。除小兒疳。蛇。

開封府治之本草卷之三

潞州五靈脂



蠅姑

味鹹氣寒無毒。一云有毒。土穴居。立夏出。翅短不能飛遠。聲鳴只在夜間。月令謂蠅蟲鳴者即此是也。俗云土狗。因類狗形。得之文火炙黃。研成細末入藥。治十種水腫立効。分上下左右取功。左令左腫消。右使右腫退。上消上體下退下焦。又云從腰以後利通。為下二便要藥。從腰以前散滯。為止二便捷方。若拔刺肉中多取膿敷上。仍治口瘡乳毒。以酒搗服堪瘳。虛者慎勿用之。因其性急故也。

蠅姑



開封府治之本草卷之三

潞州五靈脂

開封府治之本草卷之三

潞州五靈脂

開封府治之本草卷之三

潞州五靈脂

開封府治之本草卷之三

潞州五靈脂

開封府治之本草卷之三

潞州五靈脂

開封府治之本草卷之三

斑猫

味辛。一云味鹹氣寒有大毒。遠近處俱有。七八月方生。夥集交飛。常在豌豆花上。鳥腹尖喙甲多黃黑斑紋。網張取納。瓶內陰乾。去翅足。同粳米炒熟。生者誤服。吐渴難當。惡曾青豆花。畏丹參巴豆治寒熱鬼疰鹽毒。療鼠瘻疥癬瘡。去疽蝕死肌。除石癰血積。墮胎潰肉。孕婦忌之。

斑猫



蝸牛

味鹹氣寒。有小毒。末春雨齊。多生池澤草間。盛夏日炎。自懸樹木葉下。蝸牛懸葉下往往升高爬沫既盡隨即枯死頭有四角。故以

牛名。背負殼而行。行則頭角並起。遇物驚使縮。縮乃首尾俱藏。殼中劑擇圓大者取功。製宜火煖過殺毒。主賊風

口眼喎僻。治驚癲筋脈拘攣。收脫肛止消渴。嬰兒方內。每每擅名。殼治疳最靈。涎止渴亦効。○


蛞蝓

亦係

蝸頸氣味並與前同。背殼無頭角。二謂即蝸之老者。老則殼蛻而然。據物理難明。但主治無異。○蠍如釵股大。色近正黃。足生若蜈蚣多。背無負殼。好油脂。延入人耳竅。故名此。乃使人繫防。本經註云。菖蒲去蚤蠍來蠍。亦其氣芬芳所召爾。


蜘蛛

氣微寒。有毒。品類極多。在處俱有。能牽絲網。巧不如蠶。凡入醫方須知選擇。網布簷角者妙。腹大黑色者佳。



蠶

蠶



苗

蠍

味甘辛。有毒。陝西江北俱多。青州出者獨勝。蠍前謂蟻。後謂蠍。


但塗蠍牛。毒即解散。

蠍常食
燐故也


手浸冷水痛亦消滅。今市家收取無時。先日曝逼甚熱渴。銅青泥滿腹。向烈火炙亡。

令色赤。容易售人。致體重。又多媒利。極病入劑。悉以土除。用全用梢。並復炒褐。憑煎湯液。任合散丸。療小兒風癇。手足抽掣。厥大人風中。口眼喎斜。卻風痰耳聾。解風毒癰癧。

牛



蠍



水濟

雄蠍

蟻人一處作痛。雌蠍諸處牽痛。

雌蠍諸處牽痛。

水濟

收取無時製服憑證。大人小孩偏痛。單丸或時上下者。宜研末調小兒大腹丁糞。行步三年踴躍者須煨熟啖。久瘡寒熱可斷。乾嘔霍亂能敵。蛇虺蟲蝎搗汁滌。蜈蚣咬用活吸疔腫作膏敷退。癰核潰酒飲消。纏瘻脫落。此用花蜘蛛絲尤妙。

蜘蛛

蜘蛛




絃網

療健忘又能

蠅 味苦氣平。微寒。有毒。見噉牛馬。腹有血者為良。收取陰乾去淨翅足妙用。逐瘀血血閉。寒熱酸懨。能止兩目赤疼。皆傷淚出。**蜜蜂** 亦能飛者。其形大似蜜蜂。氣味不殊。麻黃單惡。通血脉九竅喉逕。破積血癥瘻瘍。寒熱亦可。散血更勝。

蔡州木蠅



殼蟲

味鹹辛氣平升也陰中陽也屬火有土與木得金氣逼而不化無毒一說性溫有小毒在人家蠶箔中取

殼直自死者勿令中濕犯則有毒

濕中有毒故勿用

務擇白色成條炒去絲綿及子

惡茯苓草薢鹽桔梗桑螵蛸桑螵蛸逐風

濕殊功口噤失音者必用拔疔毒極効腫突幾危者急敷

為末敷之主

小兒驚癇夜啼治婦人崩中赤白止陰癰去三

蟲滅黑點及諸瘡癰痕面白令好散風癆併結涕癰塊喉痺使開

丹溪云治喉痺取其火中清化之氣

竅分婉罷

除疼解產寒後陰易○繭內變化名

原蠶蛾

氣溫味鹹略有小毒蓋原

再字乃重養晚蠶入藥務擇雄蛾以

虫敏於生育折去翅足微火炒黃合散為丸隨宜使用強陰道

陰病必用交接不倦益精氣禁固難來敷諸瘡滅癰止

水血緩腎○

即屎其性亦溫治濕癰癰癰癰風主腸鳴熱中消渴

○又有蠶退用宜燒灰多治血風甚

血女婦止帶漏崩中赤白痢疾除腸風下血吐衄鼻洪疔腫取灰敷牙疳加麝貼牙宣灰擦齦上口瘡灰敷患間

蜀

蠶

桑

螵

蛸



又治邪崇風癲。灰調酒下立愈。本經又曰。近世醫家多用蠶退紙。是初出蠶殼在紙上者。東方諸醫惟用蠶脫皮。此蠶欲老眠起所蛻。

皮也二用較之。東人為正。須微炒過。堪入散丸○

蠶繭

燒研酒調。立使腫癰透孔。一繭一孔。功用同茅針。若煎湯液。

服之。殺蟲止血立効。○

繢絲湯

甕貯埋土內年深。消渴病來。急宜取飲。引清氣上朝口舌。降相火下泄膀胱。因

屬火有金之用。故(以下缺)


蜈蚣

味辛。氣溫。有毒。牆壁多藏。各處俱有。端午收者美。赤頭足者良。入藥慢火炙黃。去淨頭足研末。噉蛇虺蟲魚。

惡毒殺鬼物。鹽痊精邪。去瘀血。墮胎。逐積聚。除瘻。鷄性好食人。若中其毒者。以烏鵲糞水調塗之。又畏蛤蝓蠍蚰。

觸之即死。亦可取敷其毒也。

蜈蚣



白頸蚯蚓

味鹹氣寒。屬土與水。無毒。一云大寒。小毒。頭白係老者。應候常鳴。穴居在泉壤。各處俱有。取須鹽水洗。

淨用或生炙隨宜治溫病大熱狂言。療傷寒伏熱譫語。並用搗爛絞汁。井水調下正差。小水不通。亦搗汁飲。鹽毒。

辛中須浸酒吞。主蛇瘕。殺蟲。理腎風。消脚氣。又療黃疸。行濕如神。人或被其咬傷。鹽水浸之即解。○

封瘧大

咬毒仍出大毛殊功。

白頭蛇

白頭蛇引



蟾蜍

俗稱癩
蟻

味辛氣涼屬土與水。微毒。狀同蛤蟆。形獨胖大。又叫石蚌。背多斑磊。黑癩。腹有八字丹書。不解聲鳴。不能

跳躍。行極遲緩。得此纔真。卑濕處生。陰雨時出。五月五日收取。陰乾。東行者良。炮製。用治小兒洞漏下痢。久研。

水調吞之。療大人跌撲損傷。活搗泥爛署上。風淫生癬。燒灰和猪脂敷。瘡疫發斑。取汁搗井水服。煨熟咬殺。疳蝕

成癬。小兒疳瘦成癬。幾危者取蟾蜍去頭皮臍腑以桑葉色裹外加厚。作膾食。敵犬咬發狂。一切鼠瘻惡瘻。末敷

紙。再裹火內煨熟口咬。二支十餘日全愈。若口渴。喫梨汁解之。作膾食。敵犬咬發狂。一切鼠瘻惡瘻。末敷

亦自消釋。肪塗玉軟滑易截。如肪得不多。取肥者剉煎膏塗之。刻有如蠶丸玉器。奇巧者固雕琢。土多非此肪。及昆蟲刀不能刻也。○眉間白汁乃名蟾酥。

蟾酥

刺取之時。先防射目沾。即瞎針穿桑葉。避隔連射。

腦

點眼明澈勝常藥。取

葉間拌豆粉曬乾為外科要藥。攏青和散去毒如神。○一種

蝦蟆 腹大身小背有黑點。呷呷聲鳴跳接百蟲舉

動極急與蟾蜍自別。故名立亦殊。本經云。蝦蟆一名蟾蜍。誤矣。主邪氣破寒血可用。解結熱貼癰腫當求。○仍有

數名。亦各品類。形隨青嘴尖者名

青蠶

蕷瘡服此極動曾活數人並搗汁水調須空腹頓飲長肱背綠者名

石鴟

大腹脊青者名

水鷄

二者烹之味最爽口。浙東

閩蜀俱為珍鍤。疳瘦能調。虛損亦補。尤宜產婦。女科當知。○又

蝴蝶子


係蝦蟆子。初生腸水除草上。如索繖纏。

漸見點日逐黑深似豆磊粒。春來水暖鳴以聒之。乃謂聒其子也。書云。藍影抱蝦蟆聲抱者是焉。始出色黑頭圓。有尾無足。稍大足生尾脫聚夥成群。俗呼蝦蟆黏。亦入方藥。用子正黑。多取合桑椹染鬚永不皓白。詳載桑根白皮保中形

已成爛揭為火瘡敷藥。絕無瘢痕。其

卵 得之亦主明目。

賓客 **蝦蟆** **墓**



聞一聞頭也不擡的直跳

花蛇 味甘鹹氣溫有毒。雖有黑土。惟取蘄州頭長小角鋒。尾生佛指甲。項連真珠白點。背纏方勝花紋。因而得

名觀之猶異諸蛇鼻生向下。此獨鼻向上生。

一卷
鼻蛇

諸蛇死閉眼睛是則眼開如活。舒斷連界上殺獲兩眼則一

閉一開驗此可辨偽真據理誠難解悟。性毒善螫人足中者輒自斷之。補養已痊木接代步又帶入人屋壁腥臭氣如爛瓜。人忽聞之即忙辟逐得者火上頓曝務令透乾去淨頭尾骨皮瀆酒旋飲止風痛甚速性竄而然去風毒彌佳力倍故耳。功力倍於諸蛇癩麻風白癩風鬚眉脫落。鼻柱瘡壞者急求鶴膝風鷄距風筋爪拘攣。肌肉消蝕者速覓諸藥力莫及者悉能引達成功。○ **烏蛇**

百錢


氣味甘平性善而不嗜物色黑如漆背有三稜

如劍脊者尤良


尾細尖長能穿

者妙眼光不陷主治功力略緩種生各處甚多依前製勿差任為丸浸酒若熬膏藥頭尾多加治諸風皮膚不仁。

蛇 蝎 蛇 花 蛇 白



蛇 金 蛇 烏



散癰瘍身體瘡瘍○金蛇 身作金色。照日有光。多產賓州中僅長尺許。久黃者汁可服。中金無毒能敵。○又

種銀蛇

亦解銀毒。○

蛇蛇

畏酒磁石。擇端午日纔收。去鬚膜。明激雙睛。止嘔逆辟除諸惡。療大人腸痔蟲毒。

治小兒瘻瘍驚癇。又火熱之。亦敷瘻瘍。

龜甲

味鹹甘。氣平。有毒。一云屬金有水。陰中陽也。無毒。深澤陰山處處俱有。得神龜甲版為上。

神龜產水中底甲
當心前有一道

方透明如琥珀。分陰陽。取用靈。頭方殼圓。脚短者為陽。龜形長。頭尖脚長者殺死者。脫者力微。自死肉敗者力猛。只取底版。悉去傍弦。精製樟真酥油。或用猪脂醇酒。旋塗旋乾。直待脆黃。杵細末。作丸。十二月忌食。犯則畏狗膽。

惡沙參專神陰衰。借性氣引達詩藥。善滋腎損。仗功力復足。真元漏下崩帶並敵。癰瘍瘻瘍咸卻。傷寒勞復。或肌體寒熱欲死者殊功。腰背痠疼。及手足重弱難舉者易効。治小兒額門不合理。女子濕瘡陰瘡。逐瘀血積凝。續筋骨斷絕。因其性靈於物。方家多用補心。久服輕身。益氣養智。肉煮啖除風寒。身腫瘡氣。及蹉折並竒。又釀酒主

風痛拘攣。急併癲癇。時效。作成羹臘。尤補虛羸。

血

瀉脫肛縮腸。

酒

止久咳斷瘻。

滴耳中治耳聾。亦驗溺最

中以雞肝之血。燒熟。研末。以酒發而吹。急以物吹。又法以紺炷。大上。增熱以點其尾。亦致少。尚然不及。勝服快也。

頭骨

可帶入水。

身骨

堪帶入山。並令不迷。未為無

益。餘多種類。亦各有能。○千歲靈龜

五色全具。頭端晝起似日。剔甲食。最近年。○秦龜

產秦地山中。大小無定。甲張主濕。裨體重四肢。攀援。○鳥龜

一名叫。腥臭食蛇。陸地常有。身狹尾長。色黑大木能登。取肉搗糜。惟敷定。甲張主濕。裨體重四肢。攀援。○

蛇蛇。○蠶。鷄。鷄。乃山龜極大。人立背上可負而行。其甲係黃色。透明。俗謂龜筒。堪為器皿。毒箭傷悶。絕刺。

血飲立癒。○龍龜。一名叫。高山石下生。嘴如鸕鷀。能治老瘞。無時發。燒灰湯調服下一錢。微利而止。綠毛龜。蘄。

州出產浮水面，綠色鮮明，色縛額端，能禁邪疫。收藏書笥，堪辟蟲蟲。

詳格方藥用敗龜版者乃龜死深山之中，形肉爛滲甲內，人或檢拾，固有此名。奈何本經缺下，註係小師鑽灼

者為是。取名漏天機，則甚誤矣。大龜稟此方陰氣而生，為陰中至陰之物，人能補陰而治陰血不足，是以焦滋補丸藥多用焉。惟此敗者，肉多盡，氣具全，能培補足真元，抑且引達諸藥，空腹吞服，反掌成功，故諸

名醫方中，但用此味，不書曰龜版，而特曰敗龜版者，蓋亦真知功力健捷，使人必求得之而弗略也。若以鑽灼過者為然，不過裹核作炷燒炙焦燥而已，較生者何殊？用治病何益？又何取義，特加敗字，諄諄以示人耶。

言既已終，其後更無他說，故不復錄。

卷之三

龜



龜



龜甲味鹹氣平，無毒，深潭生。岳州屬湖勝池塘亦蓄，守魚不飛。色綠七兩為佳。大者有龜多九肋，益妙。者脫効火。生別性全，製成膏，去褐并助治勞熱，漬童便，摩聖積，漬臘，週畫夜文，火灸脆入石臼杵細成霜，所惡須知理。

毒殺人

石礬石散瘡癰癩瘻。及息肉、陰蝕痔瘻。除勞瘦骨蒸。併溫瘡往來寒熱。愈腸癰。消腫下瘀血。隨陷肉味頗甘。其

性極冷。居水底故也。項下有軟骨如鼈頭。預檢除食雖涼。血熱補陰不可過度。

因性冷宜火食。患癰瘻勿食。防證反增。

肉主累甲主散。

故食肉反增。懷姪食之生子。項短合鷄肉食成瘕。合鷄子食殺人。合莧菜食。鼈瘻即生。合芥子食。惡疾驟發。形狀異者尤毒。得之深牢急埋。

三足者亦足者。腋下有十字王字五字形者。頭足不縮者。燭目者。目凹陷者。俱有毒。不可食。腹下紅有蛇紋者。是蛇蠻。尤太毒。急埋深牢。免又害于後人也。

慎食。

過喉薰汁可解。

頭

燒灰存性。收臍肛如神。

頭

鹽淹煮吞。補陰虛亦驗。

頭

塗拔髮孔內。永使絕根。

眼瞼倒毛。簽人可資除害。

○又有

龜甲

係鼈極大者。別名。

本經註云鼈。大者為龜。其常在長江。每至兩岸上。

曝腹。漁夫伺便接竹掣之。難竟反身。為人所制。

主治功力與鼈甲同。

膏

塗鐵火燒便明。摩風瘡惡瘡易愈。

肉

微溫煮食亦補。殺蟲毒藥更佳。

卵

如鷄子正圓。一產二三百箇。鹽淹可食。任煮不凝。



螃蟹

味鹹氣寒。

一云有毒。

生陂澤中穴于沮洳。遇八九月出食稻芒。

秋深稻熟之時。畫出于田。內各持一穗以朝其躬。然後從其所之至長江而奔目江。搏海。

其形益大。或謂特行旁橫。有八距二螯八足。殼黃褐。現十二星點微紅。

如蟹之三十六。腹虛實。應月盛衰。種雌雄。以輸海神也。

在臍大小。雌者臍圓而大。雄者臍尖而小。漁人捕取，霜後益佳。未經霜取者，酒醕醉死藏留，饌品亦為珍味。凡取食忘見燈火散血解結。蓋氣養筋除胸熱悶煩，去面腫渴僻愈，癥瘡化漆成水。仙方以化漆水服之，長生續筋骨。使筋即連，腦碎即斷。足中髓鼓中黃，即連風疾人食之，其病復發。懷孕婦人食下，令子橫生。鱸內燒煙可集群鼠形狀異者有毒，中藏其足，班目赤，獨相向。腹下有毛，腹中有骨六足四足者並有大毒，不可食。讐誤入喉，未免被害。敲蒜、冬瓜、黑豆煎汁並可解除。爪主破胞墮胎，亦通產後血閉。

餘種主治各有所長○**蠍** 蛤蜊多黃，兩螯最銳，行大人風氣亦宜。

小兒痘氣堪用○**蠍** 略小，食多吐利損人。

蠍 音 **蝴蝶**

至微膏塗濕癬殺毒

食不宣

蠍

者大小兩

螯大，螯待鬪，常伸小螯俱食，每縮亦有毒，並不宜食之。

蝦

味甘氣平。

小毒。

河潤俱生。

善游。

好躍。

其字從假，蓋

以水母假之而動也。活則色綠，煮熟鮮紅為饅，不宜多食。發瘡動風甚驗。

小兒及鷄犬勿食。

誤犯則腳屈難行。

搗

生者如泥敷赤白遊腫。

口疳。

瘻。

宿盡消。

又種無鬚。

腹下通黑。

煮之色白。

並有毒。

藏急葉溝渠。

庶免害及。

蠍魚。

迺熱飯拌造同食。

忌鷄肉。

須知。

大紅蝦 出自海中，身肥大，鬚長丈許。史說晉勝脩不信其說，有至東土人取蝦長四尺四寸封而寄之。 捕獲烈日曬乾。

殼 厚用作酒盃。鬚勁，截為策杖，非得善價，不輕買。入主治忌，宜同前弗異。

海馬 種亦蝦屬。

二三寸長，雌雄相對不離，色則黃褐，首類馬。仍係蝦身，背有紋，彷彿竹節布網水面，每每得之下胎易來，果難產。

聖藥

臨產時帶于身傍，或燒末酒服，並動興陽不瘥。

誠取藥春方。

蛤

音槎，又作蛇。

一形如白沫，濛濛。

東海多生。

大小不等。

無腹。

而頭眼藏閉，倚蝦為目。

遊水如飛。

蝦見人忽驚，蛇隨則沉沒。


故曰蝦動蛇沉。

又曰水母目蝦是也。


調和作饌，著醋。

務加主婦生產勞損，血凝治小兒風疾，火燄丹毒。

蟹



蝦



真珠

集寒無毒。老蚌生者

蚌即珠母。惟老者出。廉州海島大池屬廣東海中。有洲島島上有池謂之珠池。人疑刺生多小者。火有其底與海通。池水乃淡。此不可測也。

刺

史掌之督珠戶歲採充貢。圓大寸圍為上。光莹不暗極優得此。售人價值難估。欲穿孔眼非金剛鑽不能求入。醫方惟新完者可用。磁鉢極研薄絹重飾為九鎮心神。敷面潤顏色。作散點目去膜。綿裹塞耳除聾。小兒驚熱風癘和藥作銚摩服尤堪止渴。亦能墮痰。

蚌肉

味甘作脯可食。不惟醒酒去熱。酸煩○又

石决明

出南海內。單片不


生對合。光耀似真珠。由此得名。眼科專用或疑珠母此大差違氣味寒鹹。擇七孔九孔方取。

又名九孔螺。十四孔以上者不佳。


裹煨熟。將皮外纏黑盡摩。搗細末務如粉霜。開青盲兼除翳障。漬水洗肉。採供饌乾可久留。遠行饋人並為真味。

珍珠牡


蛤蜊



明决石



蛤蜊



性冷無毒。川澤俱生。似蚌略小。殼圓而薄。白腹紫唇。月令云雉入大水為蜃。乃後車螯。雀入大水為蛤。即此是也。肉煮食潤五臟。止消渴。解酒毒。開胃殊功。殼研末。主老癬。化癩瘻。消血塊。去熱立効。並與丹石相反。凡服丹石人誤食。令腹結痛。切宜戒之。○車螯以螯名。係蛤至大者。春夏吐氣。微若樓臺。變態頃刻多端。土人稱為

海市青肉可薦。有珠可穿。殼可嵌飾屏風。可燃燒灰可埋墳牆壁亦可為用。殼入藥治瘡癆腫毒癩佳。火燭兩

燭以醋淬。搗末絕細。甘草對和酒送下咽。又以醋調敷於毒處。

○覲

音

顯

小色黑。多在泥沙。每候風雨作時。以殼

為翅飛起。肉取洗淨糟煮服良。解酒毒濕毒面黃去熱氣。目赤開胃脫壓丹石。下乳汁利小便。生浸取汁盆

盛。煑洗疔瘡尤効。消渴飲下亦能解除。多食勿宜。發嗽消腎。

○殼

燒白灰水飲主反胃吐食除塞膈積痰。

陳殼

杵細末湯吞止邪夢失精治陰瘡下痢。

又蛤

味苦鹹氣平寒無毒。係新蛤殼未燜。臨東海岸可收。斑紫形尖表多文彩。僉名文蛤。貴之之辭。仲景傷寒方

中。曾用研為散末。蛤散有文利水為鹹走腎。墮胎因鹹軟堅。壓脇急腰疼除喉欬腸痙攣。收避崩中帶下。稍平鼠瘻痔瘡。

走馬疳。蝕目鼻將危。和臘豬脂為膏敷貼癰疝氣引小腸吊痛。同杏附木薑汁調吞。

○海蛤

乃燜殼混雜泥沙。

被風濤打磨礪。廉棱都盡。磧塊不勻。小者如細麻。大者若碁子。宜火煅作漢勿和劑煎湯利膀胱大小二腸。消水腫脹滿。降胸脇逆壅邪氣定喘息效。瘀陰瘡可堅喉渴堪止。

○海石

即海蛤異名同類。

○海粉

又海石火

煅研成總因鹹軟堅之名。但治頑瘻塊必用。

謨

按丹溪曰。海粉即海石。熟療能降。濕涼能燥。結痰能軟。頑瘻能消。宜為散丸。勿煎湯液。又治帶下云。無海石

以蛤粉亦可。可見海石蛤粉明是二物。恩氏衍義又以海石功用。盡註海粉條下。則海石蛤粉雖是二物。亦可相通為治也。又云蛤粉乃燒蛤蜊殼為之。今考本經海蛤條下諸註並指海蛤即海石。夫海蛤而謂之海石者。

蓋海蛤非有肉之蛤。乃蛤殼也。殼在海中。久經風濤礪。廉棱皆盡。其所存者。無復形質光潔。磧塊集于泥沙。

有似碎石。故曰海石。煉冶為粉。故曰蛤粉。其蛤粉乃燒蛤蜊殼而成。蓋蛤蜊人所常食。其殼多而易取。海石必須
臨海淘沙收之。其功稍難。舍難就易。比比皆然。是以蛤粉多海石少。不可必得。故思其次。乃云如無海石。以蛤粉
亦可。然蛤粉之新。終不及海石之陳。正如爛蜆蚌殼。亦有所主與生者不同爾。

水銀胡粉。則胡粉也。水銀。又名汞。性溫。味鹹。氣平。無毒。係鹹水結成。居海旁不動。天生萬物。皆有牡牡。惟蠣是鹹水結成。塊然不動。陰陽
一義。小乃硯。大則巖。始生不如拳石。四面漸也。長二三丈者。如山嶮巖。口向上如房相連。肉藏中。隨房漸長。每一房有蠣肉一塊。海潮
輒至房口。悉開湧入。小蟲合以充腹。海人欲取其肉。鑿房火迫得之。開方得挑取其肉。以鑿房用烈火迫。入藥極利。除甲冑口採
膚膩如粉之處。得左顧大者尤良。左顧之說。諸註不同。一云取蠣向南視之。口斜向外。火煅微紅。杵羅細末。宜蛇床
牛膝甘遠。甘草。遠志。惡吳茱萸。麻黃。辛夷。入少陰腎經。以貝母為使。能軟積癥。總因味鹹。茶清引。消結核疽。柴胡引去腸



蠣

一名味鹹氣平。微寒無毒。係鹹水結成。居海旁不動。天生萬物。皆有牡牡。惟蠣是鹹水結成。塊然不動。陰陽
之道。何從而生。經言牡者。非指為雄。正猶牡丹之牡同也。小乃硯。大則巖。始生不如拳石。四面漸也。長二三丈者。如山嶮巖。口向上如房相連。肉藏中。隨房漸長。每一房有蠣肉一塊。海潮
輒至房口。悉開湧入。小蟲合以充腹。海人欲取其肉。鑿房火迫得之。開方得挑取其肉。以鑿房用烈火迫。入藥極利。除甲冑口採
膚膩如粉之處。得左顧大者尤良。左顧之說。諸註不同。一云取蠣向南視之。口斜向外。火煅微紅。杵羅細末。宜蛇床

牛膝甘遠。甘草。遠志。惡吳茱萸。麻黃。辛夷。

甘草。遠志。

惡吳茱萸。麻黃。辛夷。


入少陰腎經。以貝母為使。能軟積癥。總因味鹹。茶清引。消結核疽。柴胡引去腸

牛膝甘遠。甘草。遠志。惡吳茱萸。麻黃。辛夷。

入少陰腎經。以貝母為使。能軟積癥。總因味鹹。茶清引。消結核疽。柴胡引去腸

下硬同大黃瀉熱。嫩腫即平。同熟菜益精。尿遺可禁。麻黃根共作散。微汗如神。川杜仲共煎湯。固盜汗立効。散疽日深嗜卧。澤瀉和劑頗調。又單木蜜丸水吞。令面光時氣不染。摩宿血。消老痰。閉塞鬼交精。遣收溢氣。虛帶下。肉多令沸。去殼食佳。海族之中。亦為上品。美顏色。細肌膚。補虛勞。調血氣。若和薑醋生啖。酒後煩渴亦歟。


泉州牡蠣



九盤子

味鹹氣溫無毒。生海水中。即蚶子殼。狀類瓦屋。故名瓦盤。大如人掌者力優。小若栗子力少。火煅淬鹽醋

口角左盤子



白參

本草綱目卷之三十九

蟲類內熱好食者宜散寒用生川貝母散。散寒止嗽。清心安神。利小便。止渴。止咳。止喘。止驚。止癲。止癲。止癲。

三度研細篩密絳兩遭務賽粉霜。總入藥劑消婦人血塊立効。雖癰瘕並消逐男子痃癖殊功。凡積聚悉逐肉藏殼內為世所珍。醒酒固宜卻病亦用主心腹冷氣治腰冷風益血駐顏健胃消食。凡啖湏飯壓下不爾令人

口乾。

貝子

味鹹氣平有毒。一名貝齒亦產海涯皆紫黑蠍殼略同腹潔白魚齒近似畫者每用研紙嬰兒常常壓驚

呼壓上古珍之以為寶貨故賄賂貢賦賞賜凡屬於貨者字皆從貝意有在矣至今雲南猶作錢用蓋亦不違

也。醫家入藥製法須知醋蜜等分和蒸清酒淘淨研末解肌散結熱利水消腫浮去男婦赤目生翳無休點上即愈除孩子疳瘈吐乳不止服下立安鬼疰善噉蟲毒並解。

河南貝子



田螺

性冷無毒生水田中及湖瀆岸側如桃李大類蝸牛長色則青黃採于夏秋濁酒煮熟挑肉食之利

小便消浮腫甚捷去臟腑熱壓丹石尤良仍治脚氣上衝小服急硬更敵肝熱上擁兩目赤疼醒酒殊功消渴


小便多取燒末湯吞主反胃胃寒泄遺精精滑卒暴心痛服下立除○又大

海螺

汁亦明目

大

田螺



水蛭

即馬

皇蝶

味鹹苦氣平微寒有毒入藥取水中小者其性畏石灰與鹽烈日曝極乾剝細炒黃色儻若製非精細入

腹生子為殃故凡用之極宜謹慎活者堪吮腫毒惡血取名螺針

載外
科書

炒者能去積瘀堅癥立方概當

仲景傷寒
方有此當

湯丸治折傷利水道通月信。通經脈加麝香酒調下。芎血神功。蓋苦走血鹹勝血故爾。

水蛭

至



龍骨

味甘氣微寒陽也無毒。河東多崖穴有指脫者當時臆度語云死者本經的實辭

經云死龍處殊無時

雄龍骨

狹而

紋龜

雌龍骨

廣而紋細五色具全上品。白中黃乃次之黑者極低檢除勿用。舐竟粘舌不假燒脆研細方精。

仍冰飛淘免着腸胃畏椒漆蜀椒理石宜牛黃人參開滯滑鴻大腸收斂浮越正氣止陽風來血及婦人帶下崩

中塞夢寐泄精併小兒驚癇風熱辟鬼疰精物除腸廬內疽固虛汗縮小便散堅結消癥瘕經云澁可去脫此之

謂歟。

龍齒

形小強有齒狀定心安魄。男婦邪夢紛紛者急服。

龍角

形強而寶世所稀自

卻驚退熱小兒痰盛發搐者宜求

龍涎

吐出涎深澤多可製香。

龍腦

形肥能斷病。

龍還瀝

粘水傍木枝類蒲萄狀而灰色。

紫花梢

又別號為陰冷無孕。

仙丹。

龍胞胎

出蜀中山洞似乾魚鱗而腥臊景天瓦松同煎條經閉不通要藥。

謨

龍春

分登天秋分潛淵物之至靈者也。世俗畫龍有三停九似之說。三停者自首至膊膊至腰腰

至尾相停也。九似者謂角似鹿頭似馬眼似鬼頸似蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎耳似牛也。頭上有物如

博山名尺木龍無尺木不能升天其性龐猛。

畏鐵愛珠玉空青而嗜燒鷺肉故嘗食燕者不可度測。又言畏棟

音練葉五色線故漢以五色線同棟葉縛之古有豢龍氏徒能知其欲惡而節制之爾虛氣成雲以蔽身體人不

可見其聲如憂銅盤液能發衆香龍火與人火相反得濕而焰遇水乃燄以火逐之則焰息而焰滅矣。

衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄此各言其類也。

東方蒼龍木也屬肝藏魂西方白虎金也屬肺藏魄龍能變化故魂遊不定虎能專靜故魄止能守是以魄不寧者宜治以虎睛魂飛揚者宜治以龍齒萬物有成理而不

說亦在夫人達之而已矣。

龍

骨



鯉魚

味甘氣平無毒。一云有小毒係至陰物。生深澤中種類有三黃白及赤。

袁州謂赤鯉為玄駒白鯉為白驥黃鯉為黃駒皆取馬名以仙人所乘也。

形質雖大小不等首尾並三十六鱗陰極陽復之徵故能神變飛越

江湖漁者嘗云每獲此魚雖只三十六鱗即無三十六斤只緣飛化之藥不及諸魚之長

大修治須去黑血及脊背上兩筋有青色故也或砍碎和米粉煮羹或切片同蒜薑作膾或燒灰末糜湯隨病所宜依方

應用消水腫脚滿下氣大腹腫滿亦佳治懷孕身

胎黃疽消渴尤妙。酸冷氣痃癖氣塊橫闊伏梁止下痢腸

澼來紅熱並喘嗽天行病後忌食再發即死腹有紋者禁嘗若服天門冬切勿過口穎因其性相犯故也

服令人体浮腫氣並魚

子食忌同猪肝。魚鱗食忌同豆蔻膽

性寒苦又治眼科去赤腫令風熱不侵退青盲使神水漸復耳聾可

治瘡瘍堪塗久服不厭其多强悍且益志氣

骨燒灰主陰蝕

膚煮粥除暴癰

齒療石淋

皮主癰癧

血

塗身表丹毒

陽治腹內瘡瘍

脂理小兒驚癇

鱗止產婦腹痛

○ 鮚魚狀似鯉鰓但背正青其種多出南

方可取作鮓。治脚氣驗去濕毒靈。忌葵藿葫蘆切不宜同啖。若服二味亦戒沾唇。

膽 取汁滴眼中。眼痛即愈。

乾 臘月收乾 噴津喉內。喉痺立甦。**頭中枕** 蒸令氣通日成乾可克琥珀心腹痛亦治。酒器皿堪為。

夜視 ○ **鱸魚** 香美張翰嘗思。和腸胃益腎膏肝筋。


鱣魚

甘肥進貢每用補虛勞。發瘧疾癰瘍鱣魚發諸藥毒。


造鮓 尤不益大人食。致心腹卒疼。小兒食結癰瘍發癰。服丹石人食血熱瘡作。同乾筍煮食癰瘍風生。

殺腹內小蟲且令肢體肥澤。

魚 鮚



魚 鯉



魚 鱈



魚 魚



魚 魚

鯽魚

味甘氣溫無毒池澤多生在處俱有色黑體促肚大由稷米化成故肚尚有米色名因此得小而耐

寒過半斤者方祀天門冬須記同芥菜食成水腫同砂糖食成疳蟲雉肉猪肝尤勿共食春二三月切忌食頭煎用猪脂大腸癬治効燒以醬汁諸惡瘡瘍合專為羹理胃弱食飲不下和中補虛拌麵作餾主腸澼水穀不

調禁痢止渴納食鹽燒末塞牙齒痛齶白礬燒灰澁陽風血痢夏則宜用
冬則不宜

頭


末服除欬逆。

骨

灰敷去瘻瘍。

子 益肝調中食忌同豬肉。

鯽魚



譜

按丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽明而有調胃實腸之功若食多者亦未嘗不起火也又云諸

魚無一息之停故動風及動痰火。


鯽魚

味甘氣寒有毒清水河生為美五色紋具尤佳二斤以上忌沾唇一斤以下宜饜口猶甚毒者水行昂頭

僵僵食之為害亦速務審精細纔剖烹調殺諸蟲壓諸草石藥毒謂五臟除五痔瘻瘍湯去皮膚風癰瘡瘍如蟲

行逐腰背風濕浸淫若水洗男子骨蒸癆癬及脚氣久患者常食有功婦人產戶蟲瘡併崩漏不斷者多食最効
骨收箱籠可辟衣魚夏月燒煙又除諸害熏房中蚊蠭化水熏床席風蟻絕踪魑魅熏之蛀蟲自死竹水熏過
蛀蟲不生○鱗魚味甘大溫五月端午日方取功專補中益氣婦人產前疾善調散濕風去狐臭凡中其毒食
鱗解之蓋鱗畏鱗故也頭主咽喉消渴血塗口眼喎斜左患塗右患塗左用穿魚繩煎湯治竹木屑沃洗未
已屑即外流。

鰻 鱷 魚



十一 直理中醫同脉內
鰻魚味辛性平無毒可食

烏賊魚

味酸氣平無毒性惡羣飲附子

白芨白欽

出惟近海郡州皆秦王東遊棄橐所化今種類生育猶彷彿


同形口生腹下似囊鬚長口傍若帶

口傍兩鬚若帶而長風波稍急腹中血併膽汁又如墨黑甚多每見大魚及

人吐黑混水自衛人反認熟得以網張肉啖亦佳益氣強志且通經閉兼療黑枯骨名海螵蛸醫科切要

藥輕脆而白。堪鑄作鉢。擇上紋直順者。燒地坎藏。務過晝夜研羅。依散
調膏。極病任使主。女子漏下赤白。經汁閉陰。餽腫疼。治婦人寒熱癥瘕。驚氣入臍。環腹疼痛。去目睛浮翳。收瘡
口腐膿。腹中黑。蟲蠅摩濃。蟲心痛頓服即愈。寫契略淡過歲全無。土人借貸騙錢。每每用此書契為客商者不可不矢。

雷州烏賊魚




河豚魚

味甘氣溫有大毒。江淮河海俱生。率以冬至後出。中孚卦象此魚應之。故解內信及豚魚是也。狀類蝌蚪。

體短尾尖。背黑而上有黃紋。腹白而目能開閉。內無膽外無腮。觸物輒噴。脹腹越大一浮水面。又名噴魚。肉味雖珍。肝子極毒。大魚及獵並無敢吞得之。須如法烹調。去肝及子水洗淨。移釜潔淨處。蓋密煮之。忌沾灰塵。殺人尤驗。宜於橄欖水。荻草煮佳。勿用焰煤。不爾則中毒卒發。謠云捨命吃河豚。善於養生。寧謹慎勿入口也。毒中初覺。急嚼蘆根。或以橄欖水煎滿飲一湯可解。亦治

小恙。曾載本經理腰脚去疳瘞。殺蟲補虛。亦去濕氣消腫。○江猶。如猶形狀。出沒鼻中。為一舟人候之。知大風雨漁網得獲。取脂燃燈照疫病及禮博即明。照讀書及紡績即暗。俗言嬪婦所化。是亦然。

河豚魚



「像本草家筌卷之十一終」

四六六

圖像本草蒙筌卷之十二

新安祁門月明陳嘉謨廷采

纂輯

歙邑葉禁鮑倚

校刊

建武盱江沛泉吳文炳光甫

正訛

人部

紫河車

味甘氣大溫無毒。產初者良，勿嫌婦瘦。產多者次，務擇婦肥。男病見女胎有功。女病求男胎獲効。一說不必拘泥。隨得俱可補人。入急水中洗淨筋膜。或新瓦烘破成塊。

新瓦二片仰覆，蓋過鐵線孔，牢壓固密，然後燒成塊也。

或密瓶蒸爛杵膏。小瓶密蒸一晝夜，燒得糜爛，杵膏。塊者可久留研末入劑。膏者須即用。燒蜜為丸。餘藥所宜憑證加減。

療諸虛百損，勞瘵傳尸。治五勞七傷，骨蒸潮熱，喉欬音啞，體瘦髮枯。吐衄來紅，並堪製服。得多効之。

煮熟食與猪肝味同滋

補尤佳。又益婦人，俾育胎孕。罐貯埋于地內，年深自化清泉。此名

河車水

也。竢天行時疫狂言去小兒丹疹。

熱毒。

譜

按紫河車即胞衣也。兒孕胞內，臍繫于胞。胞繫母腰，受母之蔭。父精母血相合生成，真元氣之所鍾也。然各河車者，蓋以天地之先陰陽之祖。乾坤之橐籥，鉛汞之匡廓，胚胎將兆。九九數足，兒則載而來之。故取象而立名也。紫者紅黑相雜色也。紅屬火為陽。黑屬水為陰。謂其陰陽兩氣並具而不離爾。稽諸古方。又曰混沌皮。又

曰混元丹。所加混字。抑非與紫同一意乎。是則河車雖成後天之形。寶稟先天之氣。入藥拯濟。誠奪化工。不惟病者可得甦生。弱婦服之。亦易結孕。此又本所自出。以類相從。正如哺鷄而用卵也。即今醫方。竟名大造丸。明以生育擬天。玄妙無可及矣。

人乳汁 味甘。氣平寒。無毒。擇婦體盛。及初產者。汁濃。取蒸飯間。竟結塊者力勝。如常口吮。易圖近功。多得驪乾。堪備遠用。欲使流行經絡。務加醇酒調吞。四物湯。櫻桃共補精血。四君子。入同益元陽。肌瘦皮黃。毛髮焦槁者。速覓筋掌骨透腸胃。秘澁者當求。健四肢。榮五臟。明眼目。悅顏容。安養神魄。滑利關格。

謨 按婦人之血下降為月經。上升成乳汁。乳汁與月經通。乳汁行。月經閉。異名同類。人所共知。經云。目得血則視。耳得血能聽。手得血能攝。掌得血能握。足得血能步。臍得血能液。腑得血能氣。是則人身所養。無不資血流。運動作過多。不免哀涸。補血之藥。世用地黃當歸。殊不知草木之流。乃得天地偏氣。用治血病。力固有餘。用補血。衰力猶未及。何如人乳類服。以類相從。如燈添油。立見光亮。匪但血補無虧。且病因血成者。亦由之調養滋達而自愈也。然血屬陰。其性極冷。凡臟寒者。又宜慎之。

髮髮

味苦氣溫。小寒無毒。髮乃髮根。用宜陳久。燒灰存性。入劑湯調。一名血餘。補陰甚捷。口吐血。鼻流血。血悶。

血暈。血痢。血淋。服之即止。癰口瘡。豌豆瘡。傷風風瘡。驚熱驚癇。得此易痊。通關格五癃。利小便水道。○初剃胎髮

血之嫩苗。老景得之。甚補哀涸。○亂髮 常人落者色黑潤澤為良。燒製同前。血證亦用。止赤白痢。通大小便。或誤吞髮繞喉。取自己髮灰調送下。憲破傷風入腦。加何首烏。酒沃灌甦。又和諸藥敷膏。可貼癰疽消腫。○篦下

頭瘡名百齒霜。為丸治淋閉不通及傷寒勞復。調膏療吞嚥酸水。併百魅鬼邪。竹木刺在肉中。津和塗即出。

眼黑。睛之故。辛中酒毒。莖毒。酒化服漸安。乳癰初起。常服亦妙。

○剪鬚鬚燒灰敷癰瘡亦愈。○男陰毛若含口嚥汁。蛇咬毒不入眼中。

牙齒求小兒落者燒研末用熱酒調吞能托腮膈瘡提風毒邪氣。○人齒塗和黑蟲共研出箭頭破癰腫

可塗。○口津沫取明之時塗癰瘡消癰腫亦驗。又能明目退翳消腫解毒辟邪。

手爪甲味甘鹹無毒。孕婦爪甲取細末點目中去翳障。衆人爪甲可催生下胞衣利小便兼治尿血及理陰陽易病且止鼻衄細刮噏之立愈。

糞味苦氣寒。疗腫口開。新糞敷一日根爛傷寒熱毒。○乾糞火燒存水清餘患除。○古傳糞清常宜備

用製造如式効驗速臻。擇廁不雜汚濁者為佳。按時湏在寒冬月方妙。竹籜閣盆上櫻皮鋪籜中加厚紙數層。八

周土五寸。糞澆于土。汁淋在盆。新鴉貯盛碗。覆蓋鹽泥重固。埋地年深。取出自如清泉。聞鶯則無穢氣。治天行

時熱癰善療陰虛燥熱尤良。凡百瘡可敵。一切毒並解。一法截淡竹削去青皮浸糞中取湯汁服。○又地清一時造者。擇陰地淨黃土

中作五六寸小坑。入二三匙糞末。研細沒新水。攪濁如造地皮。待頃刻澄清。飲勿極意過多。亦解大熱狂渴。○人中

黃性冷丹溪方每加截竹削青兩頭留節。上開竅。入甘草片填滿。復塞竅。加桐油灰固封。立冬日投廁。交春前

取起。堅有風處。過十朝半月破開。取甘草曬乾。治療毒任用。一法冬月以竹一段刮去青苗底一節。餘節打通納

取出曬乾曾入甘草子中以木塞上竅。將留節一頭插糞內。一月

久者愈佳。○新生小兒糞若得患瘡蝕瘍肉能除。亦能除面印字。○撲起糞蛆迎急流水漂淨。貯以穢桶剖癩蝦

薯餵肥洗淨穢桶二隻將漂過蛆傾在一隻內役以稻草作把引蛆升上移烈日曝蒸蓋密即死文火烘燥研細
任留和白本作散湯調治小兒疳服神効。○**蛇蟲**亦從糞出其性太寒大者洗淨斷之取汁流滴多年赤眼點入即差經云鹽能消蛇功同蚯蚓。

人溺氣涼無毒童男者用微清者良頭尾剪除降火最速或換盡同服或異味竟吞勞熱欲散能敵鼻洪吐衄堪止治損瘍血瘀痛和酒立可消除瘍產後敗血攻心溫飲則壓下難產胎衣不出煎同薑葱毒蛇狗咬傷熱淋患處○又**輪迴酒**乃自己尿若蠲諸積倒倉全仗蕩滌腸胃暴發赤眼亦可洗明○積垢在璇桶中入藥稱人

中白澄底白者瓦上燒灰須置于風塵下三年者始可用之去傳屍勞熱殊功止肺癰吐血立効。○**秋丹石**煉務在秋時聚童溺多着此盛用秋露漬以布取清晨露水盛降之時用布二三尺鋪禾草梢上一宿即時潔透攬入盒內收之石膏水飛細末桑枝刀削直條四者辨齊如法煉就每溺一缸投石膏末七錢桑條搘混二次過半刻許其精華漸沉于底清液白浮于上候其溼定將液亦以桑條搘之水靜再傾如此數度淨穢洗滌污味咸除製畢畫紙封底取其英華之輕清者自浮結而上質匀○原石膏末併餘滓之重濁者並沉聚底下實繩而繩面者留用底者利遺製度如火煅煉半刻色雖白甚性却變溫終不及晒者優也謂之秋丹名實相符然陰陽分煉略殊由男女所屬不一陰

煉者為男屬陽孤陽不生必取童女真陰易病取女病求女溺煉即採陰補陽之法陽煉者謂女屬陰獨陰不成務求童男純陽男溺煉亦陽配陰之方採彼有餘補我不足兩無偏勝終得生成內經云一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾竊此意爾或作散服或為丸古方以東門湯酒送下滋腎水返本還元養丹田歸根復命安和五臟潤澤三焦消咳逆稠痰退骨蒸邪熱積塊軟堅堪用鼓服代鹽可嘗明目清心延年益壽

謨 挑秋石膏，務求童溺煉之，取無滯慾外侵，真元內守故也。投石膏欲易澄清，而精英即結，攬秋露資兼肅
稷，而耶穀不容。古人立名，實本此義。然製煉分陰陽為二，採補使男女俱同，此又妙合內經，玄通周易，所加丹
字，示乃僊成，故人部中每稱乳汁、河車併斯三者，均為接命之至寶也。奈何世醫未得真妄，為溺雖求
諸男人，無問年之老幼，陰陽採補，續然罔知。秋露石膏，纖毫蔑有，但加皂莢入水攬澄，或向日乾指為陰煉，或
用火煅，陽煉為云，幽葬雖成，玄妙盡失於道，何合於名？何符只可媒利欺人，安能應病獲効？語曰：名不正則言
不順，言不順則事不成，理勢必然，不待忖料而後識也。

天靈蓋

俗呼靈

味鹹氣平，無毒。此死人頂骨十字解者，乃天生蓋壓一身之骨，成名曰天靈蓋也。皂莢湯洗淨，酥

油塗炙黃，少加麝香研細，入藥，久發溫瘡寒熱，治傳屍癆，瘀骨蒸托，黑陷痘瘡，辟昏迷鬼疰。○又燒死屍灰

燼

亦主癰癧，多取置枕中，是夜即止。

謨

按別說云：神農本經人部惟有髮髮一條，餘皆出後世醫家或禁術之流，增補奇怪之論列，非仁人之用
禁語也。世利孫思邈有大功于世，謂以殺命治命，尚有陰責，况于是焉？近見用治傳屍病證，未有一効者，信本
經不用，未為害也。殘忍傷神，又不急於取効，苟有可易，仁者宜當盡心，語云：非此不可，是不得已，須擇年深
瘞泥所漬朽者為良，以其絕屍氣也。

浣根汁

亦為醫藥解毒箭，併治傷寒，女勞復當求陰陽易取効。○

婦人楃檣

剪下惟對陰處，纔靈得童男女者。

力強治陰陽易證，効速燒灰存性研末，湯調女患陰易求男，男患陽易覓女，其候小便赤澁，服之更詳。

月經布燒灰解藥箭毒神驗、中傷幾死服即回生、霍亂因篤童女月經布帶血燒灰酒服方寸七 月經水 治女

勞復、并解箭毒。

八精 滷金瘡血出和鷄屎減癰

陰毛 婦人陰毛主五淋及陰陽易病、男子陰毛主蛇咬令毒不入

以口含二十條嚼汁吞下

嶺生逆產用毛燒研

猪脂 大呑之

故屁枕 取自屎中、用水煮服能除三病俱獲全功、治屁痔沉滯身間頓服則魄氣飛越療石竈堅癥腹內必須以鬼

物遣馳、仍理邪氣入肝經、故致眼疼見魍魎無他藥可卻亦仗此鉤除

誤 桂枝三病不同、皆用死人枕而差、何也、夫屁症者鬼氣也、伏而未起、令人沉滯得此治之使魄氣飛越不復附

體而自瘥矣、石竈者醫癢既癒、竈蟲轉堅、世間藥俱不能遣、所以須鬼物驅之然後乃散、又邪氣入肝故使眼
眶見鬼、須即鬼物以鉤之乃可除也

圖像本草蒙筌卷之十二終

本草蒙筌一書、採本推標條分縷析誠藥性、大衛生之捷徑也、公諸海內躋斯民於仁壽眉萬方於春臺夫
豈小補云乎哉美茲善本堪垂萬頃

像本草蒙筌卷之十二終