

景岳全書卷之六十宙集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 趙 謙菴訂

因陣

以下眼目方

原機 當歸補血湯

治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視

物羞明酸澀眼光無力眉骨太陽酸痛

當歸

熟地黃

各二錢

白芍藥

牛膝

白朮

生地黄

天門冬 各一錢

川芎

防風

炙甘草 各五分

水二鍾煎八分稍熱服○如惡心不進食者加生薑煎

益氣聰明湯二

治目中內障初起視覺昏花神水淡綠色或

淡白色久則不睹漸變純白或視物成二等症并治耳聾耳

鳴

人參

黃芪 各五錢

升麻

葛根

炙甘草

各三錢

芍藥

黃柏 各二錢

蔓荊子 錢半

右每服四五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

東垣蔓荊子湯 三

治勞倦飲食不節內障眼病此方如神

蔓荊子 二錢  
人參 各一兩  
黃芪 各一兩  
炙甘草 八錢

黃柏 酒拌炒 各三錢  
白芍藥 各三錢

右改咀每服四五錢水二盞煎一盞去粗臨臥溫服

益陰腎氣丸 四  
治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物

不的或昏花緊澁作痛羞明或卒見非常等證其功與六味

還少丹同類

熟地 二兩 酒洗  
生地  
歸尾 酒洗  
丹皮

五珠  
山藥  
山茱萸  
柴胡

茯苓

澤瀉 各二錢半

煉蜜丸桐子大水飛硃砂為衣每服五七十九丸空心淡鹽湯

下

濟陰地黃丸 五

治證同上

熟地 倍用

山藥

山茱萸

當歸

枸杞

巴戟肉

麥冬

肉蓯蓉

五味子

甘菊花 各等分

煉蜜丸桐子大每服七八十九丸空心白湯下

神效黃芪湯 六

方在補陣四九

治目緊縮小及羞明畏日視物不明

局方明目地黄丸七

治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻翳

障目澁多淚

熟地黄

生地黄

各一斤 牛膝 三兩

石斛

枳殼

杏仁

去皮尖炒

防風

各四兩

煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前鹽湯下

簡易加減駐景丸八

治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地

當歸

各五兩

兔絲子

酒煮八兩

枸杞

車前子 炒

五味子

各二兩

楮實子

川椒

炒各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七木十九食前温酒下

東垣滋陰地黃丸九

治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視

物不的或昏花緊澁作痛羞明兼眵多燥熱赤爛者〇一名

乾熟地黃丸

熟地 一兩

歸身 酒制

黃岑 各半兩

天冬 焙

甘草 炙

枳壳

柴胡

五味子 各三錢

人參

地骨 各二錢

黃連 三錢

生地 酒洗一兩半

煉蜜丸桐子大每服百丸食前茶湯下日三服

謙 還睛散 十

治翳膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎

龍胆草

草决明

石决明

荆芥穗

甘菊花

羌蔚子

楮實子

白茯苓

各一兩

白蒺藜

炒

木賊

甘草

各七錢

川椒

炒出汗一錢

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三服忌一切雞魚厚

味及蕎麥麩熱物

八味還睛散

十一

治肝肺停留風熱翳膜遮睛痛澁哆淚

白蒺藜

刺炒去

防風

甘草

木賊

山梔仁

各七錢

草决明

一兩

青箱子

二錢

蟬脫

二錢

右爲細末每服二錢食後麥門冬湯調服

還睛丸 十二

治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱

澁難開臉皆紅爛瘀肉攀睛或暴赤痛甚又治偏正頭風頭

痛皆有奇效

白朮

兔絲子

制

青箱子

防風

羌活

白蒺藜

炒去刺

蜜蒙花

木賊

炙甘草

等分

煉蜜丸彈子大每服一九細嚼白湯送下空心食前日二服

正傳

祖傳固本還睛丸

十三

治遠年一切目疾內外翳膜遮睛



風弦爛眼及老弱人目眩多糊迎風冷淚視物昏花等症悉皆治之

天門冬

酒浸一宿  
另研如泥

麥門冬

生地黃

酒浸焙

熟地黃

酒洗各三兩

人參

白茯苓

乾山藥

枸杞

各兩半

川牛膝

酒洗

石斛

酒洗

草決明

微炒

杏仁

去皮另研

枳殼

麩炒黃

兔絲子

酒浸煮

甘菊花

用小金錢  
各一兩

羊角

細剉取淨末

烏犀角

剉用

青箱子

微炒

防風

去蘆各八錢

五味子

焙乾

炙甘草

黃連 去鬚

白蒺藜 取仁

川芎 各七錢

右為末蜜丸梧子大每服五七十九丸鹽湯下

定志丸 十四

方在補陣百十七

治陽氣不足眼目不能近視

地芝丸 十五

治目不能遠視但可近視或并不能乃陰氣不

足也宜用此方

生地黃 四兩

天冬

枳殼 麩炒

甘菊花 各二兩

煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

東助陽和血湯 十六

治眼發之後猶有上熱白睛赤色癰澁

難開而多眵淚等證

黃芪

當歸

酒洗

柴胡

炙甘草

防風

各五分

升麻

七分

白芷

三分

蔓荊子

二分

水煎熱服

東垣

芎辛散

十七

治兩眼風熱晝夜隱澁難開羞明惡日視物

昏暗赤腫而痛

細辛

二分

芎藭

蔓荊子

各五

甘葶

白芷

各一錢

防風

一錢半

右咬咀水二盞煎一盞臨臥溫服

東垣明目細辛湯 十八  
治兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡燈

火多眵癢澁鼻塞流涕津唾稠粘大便微硬

細辛

麻黃

羌活

蔓荊子

防風

藁本

川芎

荆芥穗

白茯苓

各四分

生地黄

歸尾

各八分

花椒

七粒

水二鍾煎八分食後臨臥稍熱服

决明夜光散 十九

治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石决明

夜明砂

各二錢

猪肝

一兩

右以藥爲末乃將竹刀切肝爲二片鋪藥於內合定用麻皮

縛之以米泔水一椀用砂鍋煮至半椀臨臥連服連汁俱服之

石斛夜光丸 二寸 治神水散大昏如霧露眼前黑花視物成

二以而光不收歛及內障瞳人淡白綠色

石斛 酒洗五錢 人參 生地 熟地 酒洗

麥門冬 天門冬 白茯苓 防風

葦朮明 黃連 酒炒各一兩 羚羊角 鎊 犀角 鎊

川芎 炙甘草 枳殼 麩炒 青箱子 微炒

五味子 炒 肉蓯蓉 酒洗去鱗炙各五錢 牛膝 酒洗

白蒺藜 炒去刺 鬼絲子 制 家菊花 山藥

杏仁 枸杞 各七錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三五十九溫酒鹽湯任下

東垣 瀉熱黃連湯 二錢 亦名黃連飲子 ○ 治眼暴發赤痛

黃連 酒炒 黃芩 酒炒 龍膽草 生地

柴胡 各一錢 升麻 五分

水煎於午前或飯後熱服

東垣 黃芩黃連湯 二二 治兩眼血熱赤痛

黃芩 黃連 草龍膽 俱各酒洗炒 生地 酒洗

右等分咬咀每用五錢水二盞煎一盞去粗熱服

東垣當歸龍膽湯 二三

治眼中白翳

歸身

龍膽草

酒洗

黃芩

酒炒

黃柏

酒炒

芍藥

各八分

黃芪

黃連

甘草

各五分

防風

羌活

升麻

柴胡

五味子

石膏

各五分

水二盞煎一盞去粗入酒少許臨臥熱服忌言語

芍藥清肝散 二四

方在寒陣六一

治赤脉貫睛眵多眵燥緊澁羞明臆腑秘結

蟬花散 二五  
治肝經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切內外

翳障

木蟬蛻  
甘菊花  
穀精草  
羌活

甘草 炒  
白蒺藜 炒  
草決明  
梔子 炒

防風  
蜜蒙花  
荆芥穗  
木賊

川芎  
蔓荊子  
黃芩 各等分

右爲末每服二錢食後茶清調下

五味瀉白散 二六  
治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸  
生地  
芍藥  
梔子



黃芩 各等分

每服三五錢為散為湯任服

明日羊肝丸 二七

治肝虛風熱冷淚赤澀內外障眼

黃連 三兩

家菊花

龍膽草

石決明 煨

人參

當歸

熟地

柏杞

麥冬

牛膝

青鹽

黃柏

柴胡

防風

羌活

各八錢 肉桂 四錢

羯羊肝

一具 烙乾為末

右為末煉蜜丸桐子大每服三四十九溫湯下

黃連羊肝丸 二八

治前證

單用黃連一味同羊肝俱為末煉蜜丸服○濟生方用生羊肝去筋膜同黃連搗丸桐子大每服五六十九溫水下

黃連天花粉丸 二九

治兩眼赤痛眵多眊燥緊澁羞明赤脉

貫睛藏府秘結

黃連 酒炒

天花粉

家菊花

川芎

薄荷葉

連翹

各一兩

黃芩

梔子

各四兩

黃柏 酒炒六兩

右為細末滴水丸梧子大或用蜜丸每服五七十九或百丸

食後臨睡茶湯下

局  
蜜蒙花散 三十

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤

腫翳障

蜜蒙花

羌活

白蒺藜

炒

木賊

石決明

各一兩

甘菊

三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

春雪膏

三一

點赤眼

朴硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

立明春雪膏

三二

治時氣熱眼

玄明粉 半兩  
月石 三錢  
冰片 三分

右乳無聲磁罐密收用時點二大背內

龍腦黃連膏 三三  
點赤熱眼

龍腦 一錢  
黃連 去毛淨酒炒八兩

先到黃連令碎以水四碗貯砂鍋內入連煮云土一大碗搥去  
滓入薄磁碗內重湯煮成膏半盞許以龍腦引或用時旋  
入尤妙

立清膏 三四  
治浮翳宿障霧膜遮精

雪白鹽 淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許脛手指定浮翳點上凡三次即沒亦  
不疼痛

黃連甘石散 三五 治眼眵破爛畏日羞明

蘆甘石 制一 黃連 四兩 龍腦 量加

先以黃連研極細同甘石再研俱用細縑紗篩過收貯用時  
取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處  
不破爛者點眼內皆勿使入眼珠內為妙

黃連人參膏 三六 治目赤痒痛

宣黃連 人參 各五分或一錢

右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定頻點眼角  
自愈或於臨用時研入冰片少許更妙○一方但用人乳浸

黃連頻點皆中抱朴子云治目中百病○一方用黃連少加

生白礬以人乳浸蒸點抹眼角大效

丹砂散 三七

點治諸眼皆妙此李時珍方也

礪砂

海螵蛸

去壳

蘆甘石

上好者煨碎童便七次  
飛各一兩

硃砂 五錢用此則不粘

右為極細末磁瓶收貯臨用少加冰片研點極妙

清涼膏 三八

治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星

腦苛葉

各半兩

荆芥

百藥煎

外無節用

右各三錢為末井水調成膏貼眼角上自然清涼

正傳 光明丹 三九

治一切風熱上壅兩目赤腫疼痛爛弦風眼

及內外翳障

製甘石 一兩 朱砂 一錢

硼砂 二錢

輕粉 五分

冰片 三分 麝香 一分

以上用乳鉢研極細收貯為君○如眼赤腫痛加乳香沒藥

各五分○內外皆障加珍珠五分胆礬二分○爛弦風眼加

銅綠五分黃丹五分○或以諸藥合一以治諸般眼疾右各

研爲細末并一處再研二日用磁器密收勿令泄氣點眼絕妙

青火金鍼 四十

治頭風牙痛赤眼

火硝 一兩

青黛 一錢

腦荷

川芎 各五分

右爲細末口噙冷水勿嚥用此藥吹鼻

赤火金鍼 四一

治赤眼頭風冷淚鼻塞耳鳴牙疼

火硝 一兩

川芎

雄黃

乳香

沒藥

石膏 各一錢

右爲細末每用一二分如前吹鼻三次愈



吹鼻六神散 四二

治眼目暴發赤腫熱淚昏澁及頭腦疼痛

焰硝

提淨五錢

白芷

雄黃

乳香

制

沒藥

制

腦荷葉

各一錢

右為細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之其氣上行須與覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患

眼疾者不可吹

東垣

點鹽法

四三

明目去昏翳大利老眼得補法之良

用海鹽

二斤揀淨

以百沸湯泡濾取清汁於銀石器內熬取

雪花白鹽磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手

指互以口內鹽津細洗兩眼大小皆內閉目良久却用水洗面能洞視千里明月堅齒極妙之法蘇東坡手錄目赤不明昏花老眼惟宜此法大效

洗爛弦風赤眼方

四四

一名萬金膏○此藥之效如神人家

所不可少無目病則以施人價廉功倍濟人甚大

文蛤

黃連

去毛淨

防風

荊芥穗

各五錢

苦參

四錢

銅絲

五分

右為極細末外以薄荷煎湯丸彈子大臨用時以熱水化開

乘熱洗眼日三次立愈神效○一方南當歸川芎各四錢

傅爛弦歌 四三

爛弦百藥煎為膏

研細湯澄相去之

熬作稀膏入鹽粉

鹽湯洗了傅之宜

搜風散 四六

箍風熱眼及腫痛

黃連

大黃

朴硝

青丹 等分

右為末以苦參煎湯少加煉過白蜜同調敷眼四弦甚妙

拜堂散 四七

傷風赤熱眼倒睫爛弦

五倍子不拘多少為末蜜水調敷患處

湯泡散 四八

治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁

防風

黃連

去鬚

赤芍藥

歸尾

各半兩

銅青

二錢

薄荷葉

三錢

右剉散每用三四錢沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再爇又洗

每日三兩次○一方加白鹽少許閉目沃洗尤能散血

收淚散

四九

治風淚不止

海蝶峭

五分

冰片

少許

綠蘆甘石

一錢

右乳極細末點大眥角淚卽收上二藥以燥濕片腦以辛散

去星

五十

凡胡椒韭菜根橘葉菊葉之類皆可杵爛爲丸用綿裹塞鼻

中觸之過夜則星自下

眼目打傷青腫 五一

以生半夏為末水調塗之即愈

明目第一方 五二

此方始於上陽子以授魯東門左丘明杜

子夏左太冲凡此諸賢皆有目疾得此皆愈

夜省看書一

減思慮二

專內視三

簡外視四

晨興遲五

夜眠早六

凡此六事熬以神火下以氣飲蘊於胸中納諸方寸修之一  
時長服不已非但明目亦可延年

以下耳病方

桂星散 五三

治風閉耳聾

官桂

川芎

當歸

石菖蒲

細辛

木通

味香

白蒺藜

炒去刺

麻黃

去節

甘草

炙各一錢

白芷稍

天南星

煨裂各錢半

水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎八分食後服○一方

加全蝎去毒一錢

類方復元通氣散 五四

治諸氣閉澀耳聾及腹癰便癰瘡疽無

頭者能止痛消腫

青皮

橘紅

冬四兩

甘草

炙三寸

連翹

一兩

右為末熱酒調服一二錢

補腎丸 五五

治腎虛耳聾

巴戟 去心

乾薑 炮

白芍藥

山茱萸

人參

黃芪

當歸

熟地黃

遠志 制

肉蓯蓉

酒洗

兔絲子 制

蛇牀子

牡丹皮

附子 炮

石斛

細辛

澤瀉

桂心

甘草

各二兩

石菖蒲

一兩

茯苓 半兩

防風 一兩

今

羊腎 二枚

右為末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麩糊丸桐子大每服

五七十九丸空心鹽酒送下

聰明益氣湯 五六 治腎虛耳聾

黃芪 一錢 人參 炙甘草 當歸 酒洗

白木 各五分 橘紅 菖蒲 防風

荊芥 各三分 升麻 柴胡 各二分

右水煎服

肉蓯蓉丸 五七 方在補陣一五五

治腎虛耳聾



聾耳明礬散 五八

治膿耳

枯礬

龍骨 研各二錢

黃丹

飛錢半

乾胭脂

七分

射香 少許

右為細末先須以綿杖纏拭去膿別用綿杖蘸藥引入耳中

如無乾胭脂即以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之○又

紅玉散止枯礬乾胭脂射香三味等分用○一方單用枯礬

吹入即愈

聾耳流膿方 五九

用菖蒲根水洗淨搗取汁先以綿旋將耳中膿水攪淨然

後將蒲汁灌入盪洗數次全愈最妙者

白龍散 六十

治小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水

入耳中亦令作膿謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬

黃丹

龍骨 各五分 射香 一分

右爲極細末先以綿杖子展盡耳內膿水用藥一字分摻兩  
耳日二次勿令風入

百虫入耳 六一

用香油滴入耳中卽出○本事方用白膠香燒烟薰耳中  
煖卽出○一方用葱涕灌入活者卽出○一法用生薑擦

猫鼻其尿自出取尿滴入虫卽出或以麻油滴耳則虫死  
或以炒芝蔴枕頭則虫亦出但不若猫尿之捷也

蜈蚣入耳 六二

用薑汁滴入或韭汁雞冠血滴入俱好

暴聾灸法 六三

用小蒼朮一塊長七分一頭削尖一頭截平將尖頭插入  
耳內平頭上用筋頭大艾炷灸之輕者七壯重者十四壯  
覺耳內有熱氣則效

又方 用雞心栳榔一個將臍內剗一窩如錢眼大實以射

香坐於患耳內上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾 六四

用大蒜一瓣一頭剉一坑子以好巴頭一粒去皮慢火炮

令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中

龍腦膏 六五

龍腦 一分

椒目 五分

杏仁 去皮二分

右件搗研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

杏仁膏 六六

治耳中汗出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹內耳中日三四度易之或

亂髮裹塞之亦妙

一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和為丸以  
綿裹塞耳又治耳聾兼有膿

通聖散 六七

穿山甲 炙

螻蛄 各五分  
射香 一分

右為細末以葱涎和劑塞耳或用少綿裹塞之或用葱管盛

藥末塞耳中

通耳散 六八

磁石 用活者如豆一塊

穿山甲 燒存性為末

因陣

右二味用新綿裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內如風  
兩聲即愈

以下面鼻方

醫林川芎散 六九

治風寒鼻塞

川芎

藁本

細辛

白芷

羌活

炙甘草

各一兩

蒼朮

米泔浸五兩

右咀每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

生癢

辛荑散 七十

治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或

氣不通不聞香臭

辛夷

川芎

細辛

白芷

升麻

防風

羌活

藁本

炙甘草

木通

各等分

一方有蒼耳子

減半

右為末每服二錢食後茶清調下

溫肺散 七一

治閉塞陽明鼻塞

升麻 一

黃芪

丁香

各一錢

羌活

葛根

炙甘草

防風

各五分

麻黃

不去節二錢

水二鍾葱白二莖煎八分食遠熱服

金 千 細辛膏 七二

治鼻塞腦冷清涕常流

因陣

細辛

川芎

川椒

黑附子

炮去皮臍

乾薑

吳茱萸

各二錢半

桂心

三錢

皂角屑

錢半

右將諸藥用米醋浸過宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎附

子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

三蒼耳散 七三

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子

炒二錢半

辛夷仁

薄荷葉

各五錢

白芷

一兩

右為細末每服二錢葱湯或茶清食後調下

神愈散 七四

治風熱在肺鼻流濁涕壅塞不通

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏芎



桔梗陳皮茯苓輩

十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服

氣息調勻鼻貫通

醍醐散 七五

治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩

川芎 一兩

薄荷 一兩半

川烏 炮去皮臍

白芷

甘草 各二兩

右爲細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下

方 防風湯 七六

治鼻塞不聞香臭

防風

麻黃

官桂

各半兩

升麻

木通

各一兩

梔子

七枚

石膏

三兩

因摩

三

右咬咀每服水一盞煎七分空心溫服

宣明防風湯 七七

治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已成

衄血之證

防風 一兩半

人參

麥冬

炙甘草

川芎

黃芩 各一兩

右為細末每服二錢沸湯調服食後日三服

荆芥散 七八

治肺風酒皰鼻赤疱

荆芥穗 四兩

防風

杏仁 去皮尖

白蒺藜 炒去刺

僵蚕 炒

炙甘草 各一兩

右為末每服二錢食後茶清調下

正傳 腦漏秘方 七九

祖傳經驗治鼻中時時流臭黃水甚者腦

亦時痛俗名控腦砂有虫食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調服之即愈

簡易 黃白散 八十

治鼻鼈瘰肉鼻痔等症

白礬

雄黃

細辛

瓜蒂

炒各等分

右為細末以雄犬膽汁為劑如棗核塞鼻中

細辛散 八一

八一

治鼻鼈有瘰肉不聞香臭

北細辛

瓜蒂

等分

右為末綿裹如豆大塞鼻中

御藥 菖蒲散 八二

治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角 等分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

輕黃散 八三 治鼻中瘰肉

輕粉

杏仁 去皮尖 各一錢

雄黃 五錢 射香 少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄射輕粉同研極細磁

盒收蓋每有患者不拘遠近於臥時用筋頭蘸米粒許點瘰

肉上隔一日臥點一次半月見效

雄黃散 八分

治鼻鼈

雄黃 五分

瓜蒂 二個

絲礬 一錢

射香 少許

右為末吹入鼻中

千金瘰肉方

八五

一名瓜丁散

瓜蒂

華陰細辛

等分

為末綿包少許塞鼻中

簡易瘰肉方

八六

用枯白礬為末以綿胭脂裹塞鼻中數日肉墮落

白礬散

八七

治肺風酒皸鼻等疾

白礬

硫黃

乳香 各等分

為末綿裹擦之○或用茄汁調敷患處更妙

二神散 八八

治赤鼻久不瘥

大黃

朴硝 等分

為末津調塗鼻上

酒瘡鼻粉痣 八九

亦名硫黃散

硫黃

輕粉 各一錢  
杏仁 五分

右為末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效○或用津唾調擦

更妙○又方只以銅綠為末晚時切生薑蘸擦之

點痣去斑 九十一

用石灰水調一碗如稠糊揀好糯米粒全者半置灰中半  
露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面或手有黑痣  
黑靨及紋刺者先須鍼頭微微撥破置少許水晶者於其  
上經半日許靨痣之汗自出乃可去藥且勿着水二三日  
則愈

一面鼻雀斑 九十一

此連子衡術方

白芷

甘菊花 各三錢

白果 二十個

紅棗 十五個

珠兒粉

五錢

猪胰 一個

右將珠粉研細餘俱搗爛拌勻外以蜜拌酒釀頓化入前藥  
蒸過每晚擦面早洗去

面瘡二方九二

面上暴生瘡 用生杏仁搗爛以雞子清調如煎餅至夜洗  
面敷之旦洗去數十次愈

指甲抓破面 用生薑自然汁調輕粉傅破處無痕

止鼻衄血 九三

龍骨爲細末吹入鼻中少許卽止凡九竅出血者用此皆  
能治之



止鼻衄歌 九四

石榴花瓣可以塞

蘿蔔藕汁可以滴

火煨龍骨可以吹

冰煎茅花可以喫

又墻頭苔蘚可以塞

車前草汁可以滴

火燒蓮房可以吹

水調鍋煤可以喫

鼻衄蒸法 九五

治衄如湧泉不止者

用草紙摺十餘層并花水濕透分髮貼頂心中以熱熨斗

熨之微熱不妨久之即止

鼻塞不通葱熨法 九六

但用葱頭以繩束成一把去根頭實處切成寸長一餅先以熨斗烙葱一面令熱置頂心顙會穴處乃以熨斗或火從上熨之俟鼻內作葱氣方住未通再作餅熨之○其有嬰兒傷氣鼻塞不能吮乳者但用大南星爲末以生薑自然汁和作薄餅用兩掌合煖置顙上片時卽通

硝石散 九七 治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石 等分 入中白 少許 冰片

右爲末用一字吹入鼻中

長 通關散 九八 治卒然牙關緊急腰背反張藥不能嚥或時

毒癰腫鼻塞氣閉等證

細辛

如無真者不用亦可

薄荷葉

牙皂角

等分

右為細末以紙撚少許入鼻內候得噴嚏口開隨進湯藥○  
聖惠搐鼻法止用二味無薄荷

陳氏

通關散

九九

方在痘疹八五

通心經降心火利小便良方

擦牙通關散

一百

方在小兒八四

治風搐關竅不通痰塞中脘留滯百節

以下口舌方

長方 玄參散 百一

治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

黃芩

黃柏

梔子仁

大黃

前胡

獨活

犀角屑

麥冬

升麻

炙甘草

各等分

右為咀每服五錢水一鍾煎七分不拘時溫服

玄參升麻湯 百二

方在外科四八

治口舌生瘡重舌木舌腮頰咽喉腫痛斑疹瘡瘍

清涼飲子 百三

治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩

黃連

各二錢

薄荷

玄參

當歸

芍藥

各錢半

甘草

一錢

水二鍾煎八分不拘時服○大便秘結加大黃二錢

清熱化痰湯

百四

治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母

天花

枳實

桔梗

各一錢

黃芩

黃連

各錢二分

玄參

升麻

各七分

甘草

五分

水煎服

甘露飲

百五

方在寒陣十

治口舌生瘡咽喉腫痛牙齦潰爛

龍胆瀉肝湯 百六

方在寒陣六三

治肝火內灸上為喉口熱瘡下為小便澀痛等症

五福化毒丹 百七

方在外科七六

治咽喉牙口瘡毒癰腫

良方冰蘖丸 百八

治舌瘡口瘡

薄荷葉 蘇州者

黃栢 等分

礪砂 半之

冰片 三分

右為末生蜜丸彈子大每服一九噙化

上清丸 百九

治口舌生瘡咽喉腫痛止嗽清音寬膈化痰極

效

砂仁

桔梗

各一錢

月石

二錢

冰片

一分

甘草

玄明粉

訶子

各一錢

百藥煎

八錢

蘇州薄荷葉

一兩六錢

為極細末煉蜜丸芡實大臨睡含化一九〇或為小丸茶清

送下

硼砂丸

百十

治口瘡舌瘡

寒水石

一兩

牙硝

四錢

硼砂

二錢

冰片

射香

各一分

甘草膏和丸麻子大不時含化一九津燕

良方聖金散 百十一  
治舌上出血不止

黃藥子 一兩  
青黛 一錢

右為細末每服一錢食後新汲水調下日二服

金花煎 百十二  
治舌上出血如簪孔

黃礬 三兩  
黃連 五錢  
梔子 二十枚

右咀以水二升浸一宿煮三沸去滓頓服○一方用酒浸煮

飛礬散 百十三  
治木舌漸腫大滿口若不急治即殺人

白礬 飛  
百草霜 等分

右為細末捻糲茄自然汁調服若口噤灌之妙



寸金散 百十四

治心經煩熱動血妄行舌上出血不止

新蒲黃 三錢

新白麩 三錢

牛黃 五分

研

腦荷

五分研

右研勻每服一錢生藕汁調服食後亦可搽舌上

黃蘗散

百十五

治血出血不止名曰舌衄

黃蘗

不拘多少塗蜜慢火炙焦為末

右每服二錢溫米飲調下

舌上出血

百十六

重出

升麻黃連丸

百十七

治多食肥甘口臭穢惡

升麻

半兩

黃連

黃芩

酒炒

生薑

檀香

甘草 各二錢  
青皮 半兩

右爲細末湯泡蒸餅丸彈子大每服一丸不拘時細嚼白湯

下

丁香丸 百十八

治口臭穢

丁香 二錢

川芎 二錢

白芷 五分

炙甘草 一錢

右爲末煉蜜丸彈子大綿裹一丸噙化

應手散 百十九

治傷寒舌出寸餘連日

梅花冰片

爲末搽舌上應手而收重者須用一錢方止

陰陽散 百一  
亦名赴筵散 ○治口瘡

黃連 一兩  
乾薑 炒黑三錢

為細末乾摻口瘡上涎出即愈

外科陰陽散 一二一  
方在外科一三三

治瘡屬半陰半陽者

綠雲散 一二二  
治口瘡爛臭久不愈

黃黛 蜜炙  
青黛 等分

右為細末臨臥用少許摻舌嚥津妙

細辛黃黛散 一二三  
治口舌瘡

黃檗

細辛 等分

右爲末傳之或摻舌上吐涎水再傳須旋合之

白蚕黃檗散 一二四

治口糜

黃檗 蜜炙

白殭蚕 直者新瓦土焙乾斷絲

右爲細末用少許敷瘡上吐涎

蓬砂散 一二五

治口瘡

蓬砂

青黛

龍腦薄荷

石膏

煨各等分

右爲極細末每用少許臨臥傳口中

黃連朴硝散 一二六

治口瘡絕妙

黃連

朴硝

白礬

各五錢

薄荷葉

一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風前掛兩月取下如遇口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

柳華散 一二七

治熱毒口瘡

黃柏 炒

蒲黃

青黛 真者

人中白 煨

右等分為末敷之

摻口瘡 一二八

天竺黃

月石 等分

冰片 少許

為末摻之

碧雪 一二九

治一切熱壅口舌生瘡舌強腮腫咽喉腫痛等

症

蒲黃

青黛

硼砂

焰硝

甘草 等分

右爲細末每用少許摻舌上細細嚥下或飲涼水送下頻用之效或用砂糖丸芡實大每服一丸嚥化下咽妙

絳雪 百三十

治口瘡舌瘡咽喉腫痛

硼砂 一錢

硃砂 三錢

馬牙硝

寒水石 飛各二錢

冰片 半字

右為細末每用一字摻舌上嚥亦不妨喉痛者吹入咽中

孫真人口瘡方 一三一

單用朴硝含之甚良

皂角散 一三二

治重舌喉痺

皂角

不蛀者四五挺  
去皮核炙焦

荆芥穗 二錢

右為細末以米醋調塗腫處

千金口臭方 一三三

亦治舌上出血如簪孔

用香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含漱嚥之

聖惠

口齒方 一三四

治口臭穢及齒懸腫痛

用北細辛一兩煮取濃汁熱嗽冷即吐之立效

以下齒牙方

東垣神功丸 一三五

治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙斷

肉脫血出并治血崩血痢腸風下血及逆氣上行等證

黃連 酒洗

砂仁 各五錢

生地

甘草 各三錢

當歸

木香

藿香葉

升麻

蘭葉 各一錢無亦可

右為末以湯浸蒸餅和丸綠豆大每服百丸或二百丸白湯

食遠服



東垣清胃散 一三六

方在寒陣五四

治齒齲潰爛喜冷惡熱

秘驗清胃飲 一三七

方在寒陣五六

治一切風熱牙床腫痛出血動搖

三因安腎丸 一三八

治腎虛牙齒腫痛

此與局方安腎丸同但少肉桂茯苓二味方在熱陣一六七

直搗立效散 一三九

治牙痛不可忍痛連頭腦頂背微惡寒飲

大惡熱飲

防風 一錢

升麻 七分

炙甘草

細辛葉 各三分

草龍胆 酒洗 四分

右用水一鍾煎五分去滓以匙抄在口中嚼痛處少時立止  
如多惡熱飲更加草龍胆一錢此法不定宜隨寒熱多少臨  
時加減○若惡風作痛須去草龍胆加草豆蔻黃連各五分  
累用得效

細辛煎 百四十

治牙齒腫痛不可忍及口氣臭

用北細辛一味煎濃汁乘熱噙嗽良久吐之極妙

驅毒散 一四一

治熱毒上攻宣露出血牙齦腫痛不可忍

屋遊 此卽瓦上青苔不拘多少洗淨

右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻漱之

御藥

院丁香散 一四二

治牙齒痛

丁香

萹撥

蝎稍

大椒

右等分爲末每用小許擦於患處

選要 芫花散 一四三

治風重諸牙痛

芫花

細辛

川椒

蘄艾

小麥

細茶

等分

右咀水一鍾煎七分溫漱之日三四次吐涎出即愈

如神散 一四四

治風牙重牙攻蛀疼痛牙齒動搖連頰浮腫

川椒 炒出汗

蜂房 炙

右等分爲細末 每用二錢水煎數沸熱漱卽止

赴筵散 一四五

治風虫牙痛

良薑

草烏

細辛

荆芥穗

右等分爲末擦 牙有涎吐之

蟾酥膏 一四六

治風蛀諸牙疼痛

蟾酥 少許

巴豆 去油研  
如泥 杏仁 燒焦

右共研如泥以 綿裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙

縫中吐涎盡愈

虫牙痛 一四七

蒼耳

艾

小麥

花椒

芫花 黑豆

煎熬屢效之即愈

韭子湯 一四八 治虫牙

用韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下  
截劈為四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒○如下牙  
蛀者以韭子煎濃湯漱之虫自出

端竹堂方 一四九 治虫牙疼痛不已

全書卷六十一 古方 固陣 卷

用天仙子不拘多少燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其虫即死

巴豆丸 百五十

治虫牙疼痛蝕孔空虛

巴豆 一枚

化椒 五十粒細研

右為極細末飯丸黍米大綿包塞蛀孔

藜蘆散 一五一

治虫牙疼痛

用藜蘆為末塞牙孔中勿令嚙汁有涎吐之大有神效

北棗丹 一五二

治走馬牙疳

用北棗去核每個內入信一厘燒存性研細每以些小傅

患處

青金散 一五三

治走馬牙疳蝕損唇舌腐臭牙落其效如神

銅綠

砒霜 等分

右為細末每用些少傅患處

三仙散 一五四

治走馬牙疳一時腐爛即死

銅綠 三分

射香 一分

婦人溺桶中垢 白者火煨一錢

右為極細末傅齒上不可太多

射礬散 一五五

治走馬牙疳危惡證候

射香 少許

胆礬 一錢

銅綠 半兩

白礬 生用五分

右爲細末傅牙患處

神授丹 一五六

治牙疳

枯礬 七分

白礬灰 三分  
射香 一分

爲末以竹管吹瘡上

黃連散 一五七

治齒斷間出血喫食不得

黃連

白龍骨

馬牙硝 各一錢  
枯礬 五分

冰片 半分

右爲細末每用少許傅牙根下

雄黃射香散 一五八

治牙斷腫爛出血



雄黃 一錢半 銅綠

輕粉

黃連

黃丹

炒各一錢

血竭

枯礬

各五分

射香

一分

右為細末研勻每用些少傅患處

齒縫出血

一五九

右用紙紮子蘸乾蟬酥少許于血出處按之立止

固齒雄鼠骨散

百六十

治腎水不足牙齒浮動脫落或縫中

痛而出血或但動不痛者

雄鼠骨

當歸

沒石子

熟地

榆皮

青鹽

細辛

等分

右爲細末用綿紙裹條按牙床上縫中則永固不落矣

秘方 雄鼠骨散 一六一

治牙落可以重生

雄鼠骨 一具

生打活雄鼠一個剝去皮雜用鹽水浸一

時炭火上炙肉自脫落取骨炙燥入衆藥內同研爲末

香附

白芷

川芎

桑葉 曬乾

地骨皮

川椒

蒲公英

青鹽

川槿皮

旱蓮草

右爲末擦牙百日復出固齒無不效

良方 荆槐散 一六二

治牙宜出血疼痛不止

荆芥穗

槐花

右等分爲末擦牙患處

石膏升麻散 一六三

治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化爲

膿汁等證

石膏

羊脛骨灰

地骨皮

升麻

右等分爲末每用少許擦牙齒根上○或加射香少許更妙

薑黃散 一六四

治牙疼不可忍

薑黃

白芷

細辛

等分

右爲粗末擦患處須臾吐涎以鹽湯漱口面赤腫者去薑黃

加川芎其腫立消

生濟香鹽散 一六五

牢牙去風

大香附 炒焦黑三兩 青鹽 一兩半

右為末如常擦牙乃鐵瓮先生良方

和子牙宣散 一六六

良薑

胡椒

萆撥

細辛

乳香

射香

雄黃

青鹽

下四味各另研

右等分為細末先以溫水漱淨牙後以藥末擦患處追出涎

沫吐之漱十餘次痛立止忌油鹽二日

槐鹽散 一六七 治食甘甜過多牙痛

食鹽

青鹽

槐枝

一斤切斷用水五碗煎一  
碗聽用

右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起為末用鉛盒盛擦  
牙固齒最妙

椒鹽散 一六八

治牙痛用清涼藥不效或反甚者宜從此以

治

川椒

青鹽

萹撥

薄荷

荊芥穗

細辛

朝腦

右為末擦痛牙處或煎湯漱之亦可

宣風牢牙散 一六九 駐顏補腎牢牙固齒

細辛

青鹽

各七錢

當歸

酒洗

川芎

各一兩

右為末每用少許清晨擦牙滿口漱良久連藥嚥下或先以  
溫水漱口淨然後擦而嚥之亦可

萬氏青白散 百七十

治一切牙疼固齒

青鹽 二兩

食鹽

川椒

煎汁各四兩

右以椒汁拌鹽炒乾為末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦  
無疾此藥極妙

御前白牙散 一七一

石膏四兩另研 大香附一兩 白芷七錢半 甘松

三奈 藿香 沉香 川芎

零陵香各三錢半 細辛 防風各半兩

右為細末先以溫水漱口次擦之妙

東垣白牙散 一七二

升麻一錢 羊脛骨灰二錢 軟石膏三錢 白芷七分

射香少許

右為細末先以溫水漱口次擦之妙

道藏經方 一七三 治牙齒動搖血出不止

用白蔹藜不拘多少搗爲細末每日擦牙及患處最妙

取牙不犯手 一七四

草烏

葶撥 各錢半

川椒

細辛 各三錢

右爲細末每用少許點在患牙內外一時其牙自落

以下咽喉方

局方甘桔湯 一七五

治一切風熱上壅咽喉腫痛○錢氏方用

甘草二錢 苦梗一錢

甘草 二錢

桔梗 四錢

水二鍾煎八分食後服○此方加荆芥穗二三錢三因方即



各荆芥湯尤效

拔甘桔湯 一七六

治熱腫喉疔

甘草

桔梗

薄荷

連翹

黃芩 各等分

水二鍾加竹葉煎服○一方有山梔子

加味甘桔湯 一七七

方在痘疹九十

治咽喉腫痛

林醫 訶子甘桔湯 一七八

治火盛失音

訶子 四個半  
生半煨 桔梗 一兩五錢  
半生半炒 甘草 二寸半生半炙

右咀分二服每服水一鍾童便一鍾煎八分食後溫服

清咽利膈散 一七九 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 金銀花 荊芥 薄荷

桔梗 黃芩 黃連 山梔

各一錢半

連翹 玄參 大黃 朴硝

牛旁子 炒研 甘草 各七分

水二鍾煎一鍾食遠服

消梨飲 百八十 治喉痺

單用消梨汁頻頻飲之或將梨削浸涼水中頻頻飲之尤

妙此物大解熱毒○或南方少梨之處但擇好蘿蔔杵汁

加玄明粉徐飲大效

<sup>醫</sup>透天一塊冰 一八一 治一切風熱喉痺口舌生瘡頭目不

清痰涎壅盛

黃連 二錢

腦荷

月石

檳榔

蒲黃

甘草 各一錢

荆芥穗

黃柏 各五分

冰片 半分或一分

白砂糖 半兩

右為細末煉蜜為丸芡實大每服一丸噙化

錠花丸 一八二

治纏喉風聲不出

靛花

薄荷葉 蘇州者

右等分爲細末煉蜜丸彈子大每服一九臨睡噙化

林醫 杏仁煎 一八三

治欬嗽暴重聲音不出

杏仁 泡去皮尖  
研如泥

冬蜜

薑汁

砂糖 各一小盞

木通

桑白皮 去赤皮炒 貝母

紫苑茸

北五味 各一兩

石菖蒲

欬冬薑 各半兩

右將後七味爲咀用水五升煎半去滓入杏蜜薑糖四味合

和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

三 蜜剛子 一八四

治隔陽咽閉吞吐不通及臍寒閉塞等證

用大附子一枚去皮臍切作大片用蜜塗炙令黃含口中  
嚥津甘味盡再塗蜜炙用或易之○或用炮附子以唾津  
調塗脚心○一方用肉桂含之

牛黃益金散 一八五

治虛火炎上傷肺咽喉生瘡破爛

黃柏 爲末用蜜丸炙數次以熟爲度另研爲極細末

白礪砂

白殭蚕

淨各錢半 牛黃 三分

右用蜜調如稀糊塗敷患處或丸如龍眼大含化嚥之○按  
此方必加冰片半分方妙

秘方三黃丸 一八六

治喉痺極佳

大黃

黃連

黃芩

各一兩

黃藥子

白藥子

各七錢半

黃栢

山豆根

苦參

各三錢

月石

京墨

各錢半

射香

少許

冰片

五分

右為末猪胆調餹內蒸三次臨後入片射礪砂為丸豆大噲

化一丸津嚥日夜常噲勿脫藥味方妙

人參不補湯

一八七

治腎虛聲啞不出

人參

川芎

當歸

熟地黃

白芍藥

白茯苓

兔絲子

制

杜仲

制

北五味子

白朮

巴戟

去心

半夏麩

橘紅 各半兩 牛膝 酒洗

破故紙 炒

益智仁

葫蘆巴 炒

炙甘草 各二

錢半

石菖蒲 一錢半

錢半

右咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分吞山藥丸百餘粒○

凡五鼓後腎氣開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常

百合丸 一八八

治肺燥失聲不語

百合

百藥煎

杏仁 去皮尖

訶子

薏苡仁 等分

右爲末雞子清和丸彈子大臨臥噙化或用蜜丸亦妙

秘方 竹衣麥門冬湯 一八九

治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治

者服之神效

竹衣

取金竹內衣膜鮮者一錢

竹茹

彈子大一丸即金竹青皮也括取之

竹瀝

即取金竹者

麥冬

三錢

甘草

橘紅

各五分

白茯苓

桔梗

各一錢

杏仁

七粒去皮尖研

右咀水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盃和勻服

射干丸

百九十

治懸癰腫痛咽喉不利

射干

炙甘草

各半兩

川升麻

川大黃

木別仁

各二錢半

杏仁

去皮尖雙仁麩炒微黃半兩

右為細末煉蜜丸小彈子大常含一丸津燕



醫林鐵笛丸 一九一

治謳歌動火失音不語者神效

薄荷葉

四兩

連翹

桔梗

甘草

各二兩半

訶子

煨

大黃

酒蒸

砂仁

各一兩

川芎

一兩半

百藥煎

二兩

右為細末雞子清和丸彈子大臨臥噙化一丸或煉蜜丸亦

可

雄黃解毒丸 一九二

治急喉風雙蛾腫痛湯藥不下

雄黃

飛

鬱金

各一兩

巴霜

十四枚

右為末醋糊丸綠豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦吐

因陣

星

再服大效如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者○如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九量大小與之○一法以此丸

三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙

三玉鑰匙 一九三

治風熱喉痺及纏喉風

月石 五錢

牙硝 一兩半

白殭蚕 一錢

冰片 一字

右為細末每用五分以竹管吹入喉中立愈○此方加雄黃

二錢即名金鑰匙

濟生 二聖散 一九四

治纏喉風急喉痺

膽礬 二錢半

白殭蚕 炒半兩

爲紙末用少許吹入喉中

秘方奪命散 一九五

治急喉風

白礬 枯

殭蚕 炒

月石

皂角 炙烟盡 各等分

爲細末每用少許吹喉中痰出即愈

馬牙硝散 一九六

治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣

上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含嚥津以通爲度

燒鹽散 一九七

治喉中懸癰垂長咽中妨碍

燒鹽

枯礬 各等分

石和勻研細以筋頭蘸點卽消

寶鑑開關散 一九八

治喉風氣息不通

白僵蚕 炒去絲嘴 枯白礬 等分

右爲細末每服二三錢生薑蜜水調下細細飲之

七寶散 一九九

治喉閉及纏喉風

僵蚕 直者十個

硼砂

雄黃

全蝎

十個全者去毒

明礬

牙皂

挺去皮 茲各一錢 胆礬五分

右爲細末每用一字吹入喉中卽愈

破關丹 二百

治乳蛾喉閉纏喉風等證

礪砂末

五錢

霜梅肉

一兩搗爛

右二味和勻丸芡實大每服一丸噙化嚥下內服荊防敗毒

散

通氣散

二百一

方在外科八十

治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

以下諸毒方

紫金錠

二百二

一名神仙太乙丹○一名玉樞丹○一名萬

病解毒丹○解除一切中毒積毒虫毒蠱毒菌蕈砒石死牛

死馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴氣喉閉喉風顛邪鬼氣

古方 因陣 卷

狂亂逃死牙關緊急小兒急驚等證凡行兵興役之處尤不可無

文蛤 搗破 洗焙淨末三兩

山茨菰 去皮淨末二兩

千金子 去油取霜一兩

紅芽大戟 去蘆焙乾為末二兩五錢

射香 另研三錢

右用糯米煮濃飲為丸分作四十錠每服半錠用井花水或薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰疽惡毒湯火蛇蟲

犬獸所傷以東流水磨服并敷患處○如治癩邪鬼氣鬼胎  
攣急疼痛須煖酒磨服○凡修合時日須用端午七夕重陽  
或天德月德日於淨室焚香修制凡奇怪之病屢用如神效  
驗不可盡述醫家大家皆不可一日無之

三  
因 解毒丸 二百三

治誤食毒草或中蠱毒并百物毒救人於

必死

板藍根

洗淨晒乾四兩

貫衆

去毛

青黛

研

生甘草

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大另以青黛為衣如稍覺精神恍惚即  
是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下即解或用水

浸蒸餅丸尤佳

藍根散 二百四

解毒藥熱藥諸毒

藍根 剉一握

蘆根 剉一握

綠豆 三錢研

澱脚 一合研

右先將二根以水一碗煎至七分去滓次入後藥和勻分三服或一二服利下惡物不用再服

白扁豆飲 二百五

解諸毒入腹及砒毒

用白扁豆不拘多少為細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆一枚去殼不去油別研為細末取一半入藥內外以砂糖一大塊用末化開和藥共成一大盞飲之毒



隨利去後却服五苓散之類

八毒赤丸 二百六 方在攻陣百四

治一切邪祟鬼疰等毒

飲食中毒 二百七

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦酒一升

半煮半沸陸續飲之吐食出即瘥○或以水煮亦得○或

用犀角湯亦可解

中酒毒 二百八

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒其

黑豆一升煮汁溫服一盞不過三盞即愈

解麪毒 二百九

只以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麪大熱蘿蔔能解其性  
或用大蒜嚼食之亦善解麪毒

解一切食毒 二百十

解一切飲食之毒及飲酒不知中何毒

卒急無藥可解者

薺芫

生甘草 各二兩

右剉細以水五盞同煎取二盞停冷去滓分三服○一方加

蜜少許同煎服之解一切毒

食魚中毒 三十一

凡食魚後中毒物煩亂者用陳皮濃煎汁服之即解

河豚毒 二二二

五倍子

白礬 等分

右爲細末水調服之○一方凡中河豚魚毒一時困殆倉卒無藥急以清油多灌之使毒盡吐出即愈

解河豚魚膾及食狗肉不消脹滿毒 二一三

蘆柴根鮮者搗汁飲之乾者煎汁溫飲之

解食鱧魚龜鼈蝦蟆自死禽獸等毒 二一四

豆豉一合新汲水煎濃頓溫服之可解

中蟹毒 二一五

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煮汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或搗藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒 二一六

粉草搗無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死○  
一方淡豆豉搗人乳服之即解

食雞子毒 二一七

好醋飲之即愈未愈再服

食斑鳩毒 二一八

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒 二一九 有服川椒氣閉欲絕者

冷水飲之解地漿水更妙

解諸菜毒 二百二十

食後多腹脹者是毒也以醋解之

解蓴毒 二二一

忍冬葉生啖之愈或煎濃汁飲之○崇寧間蘇州天平山白雲寺僧五行山間得蓴一叢甚大摘而食之發吐二

人急採鴛鴦草生啖之即愈二人不甚吐至死此即忍冬藤亦名金銀花亦名鴛鴦藤也

解巴豆毒 二二三

其證口乾兩臉赤五心熱下利不止

乾薑 炮

黃連 微炒各等分

右爲細末每服二錢水調下如人行五里許再服○又方煮綠豆湯冷服之即愈○一方黃連甘車煎汁涼飲之○一方芭蕉根葉搗汁飲之利止而安

解砒毒 二二三

凡中砒毒者其人煩燥如狂心腹絞痛頭眩嘔吐面色青黑四肢逆冷六脈洪數飲食中得者爲易愈若

空心酒醋服者難救

以地漿水頓服若吐出又服所謂洗淨腹中毒全憑地上漿是也○其法掘地成坑以水灌注攪成混水飲之謂之

### 地漿

又方 解砒毒最良此爲第一  
用生綠豆半升搗粉入新汲水攪和去粗取汁飲之

又方 用新鮮羊血鴨血飲之皆可解○一方用甘草汁同  
藍汁飲之卽愈

### 鈎吻毒

二二四

全書卷六十一  
鈎吻生池傍與芹菜相似無他異惟莖有毛以此別之誤食

殺人解之之法用薺芫八兩水六升煮取二升分溫二服此即

甜桔梗也一方用桂湯效

解附子等藥毒二二五

凡服附子酒多而覺頭腫唇裂血流或見內熱諸證急用綠

豆黑豆嚼服或搗汁飲之或濃煎二豆湯常飲食之○凡服

散風藥過多以致悶亂不省以醋灌之或濃煎甘草同生薑

自然汁頓飲之○一方大豆汁錫糖棗湯並能解附子毒○

一方用田螺搗碎調水飲之



解烏頭草烏毒 二二六

甘草煎濃湯服之○或米醋調沙糖俱可解

解半夏毒 二二七

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者速用薑汁灌之須臾自甦

解斑蝥芫青毒 二二八

猪脂油和大豆汁飲之

解藜蘆毒 二二九

雄黃爲末温酒調服一錢○一方煮葱汁服

解雄黃毒 二百三十

漢防已煎湯飲之○有用雄黃搽瘡或薰陰囊瘡受毒者  
防已煎湯洗數次愈

解杏仁毒 二三一

藍子研水服則解

解服丹毒 二三二

地漿服之爲上○一方用蚌肉食之良

解中藥箭毒 二三三

交廣黎人以焦銅作箭中人破皮即死

糞清飲之立解患處以糞塗洗之

解鹽鹵毒

二三四

凡婦女有服鹽鹵垂危者急取活鴨或雞斬去頭將頸塞口中以熱血灌之可解若鹵多者必數隻方足盡收其鹹毒

解漆毒

二三五

一州牧以生漆塗囚眼囚卽盲適一村叟見而憐之語之曰汝急尋蠟搗碎取汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言覓得一小蠟用之目睛果愈畧無損○或成紅斑爛瘡取生蠟黃塗之不數次卽愈○一方用杉木煎汁洗之

以下虫毒方

解虎傷毒 二二六

麻油一碗飲之卽無妨仍用葛根湯洗傷處綿拭乾香油塗之再以青布作條燃火入竹筒中放烟薰傷處口渴者沙糖調水飲之

蛇毒 二二七

凡被蛇傷卽用鍼刺傷處出血用雄黃等藥敷之仍須中留一孔使毒氣得泄乃內服解毒等藥○凡傷處兩頭俱用繩扎縛庶不致毒氣內攻流布經絡

一方治毒蛇咬傷急取三七搗爛菴之毒卽消散神妙無比

一方治蛇虫傷毒用五靈脂雄黃等分爲末每服二錢酒調服仍敷瘡留口如乾燥須以油潤之

凡居山野陰濕之處每用雄黃如桐子大二丸燒烟以薰衣袍被褥之類則毒不敢侵百邪皆遠避矣

一凡蛇入七竅急以艾灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入川椒數粒以紙封之蛇自出卽用雄黃硃砂末煎人參湯調灌之或食蒜飲酒內毒卽解

一山居人被蛇傷急用溺洗咬處拭乾以艾灸之立效又方用獨頭大蒜切片置患處以艾於蒜上灸之每三壯換蒜

多灸爲妙凡被毒蛇所傷皆效

肘後方 用小蒜搗汁服渣敷傷處

雄黃辟蛇毒 二三八

南海地多蛇而廣府尤甚某侍郎爲帥聞雄黃能禁制此毒乃買數百兩分貯絹囊掛於寢室四隅經月餘一日臥榻外常有黑汁從上滴下臭甚使人穿承塵窺之則巨蟒橫其上死腐矣於是盡令撒去障蔽蛇死者長丈許大如柱傍又得十數條皆蟠蚪成窠并他屋內所驅放者合數百自是官舍

清寧

風犬傷人 二二九

急於無風處吮出瘡口惡血如或無血則以針刺出血用小  
便洗淨外用香油調雄黃少加麝香敷之○一凡遇惡犬咬  
傷如倉卒無藥卽以百草霜麻油調敷或用葱搗爛貼之牛  
糞敷之或蚯蚓糞付之或口嚼杏仁爛付之皆能救急如少  
延緩恐毒氣入經爲害○一方拔去頂上紅髮急令人吮去  
惡血以艾灸傷處五七壯甚者灸百壯神效○一方用米泔  
水洗淨沙糖敷之○一方用杏仁炒黑搗成膏貼之

避犬法 二百四十一

瑣碎錄云凡行道遇惡犬即以左手大拇指掐寅上吹氣一口輪至戌上掐之犬即退伏

糯米散 二四一

治風犬傷毒

大班螫 二十一個去頭足翅

右用糯米一撮先將班螫七個入米內慢火炒勿令焦去螫又入七個炒令焦色變又去之再入七個炒米出赤烟為度去螫不用只將米研為末分三分冷水入香油少許空心調下一服須臾又進一服以二便利下惡物為度若腹痛急以

青靛調涼水解之或先用黃連甘草煎湯待冷服之不可食



熱物或用凉水調益元散解之甚妙甚者終身禁食犬肉每  
見食犬肉而復作者不救又見單服斑蝥而死者亦有之蓋  
斑蝥毒之尤者雖曰以毒攻毒惟少用之茲用糯米以奪其  
氣尤宜預備青靛黃連以解其毒而况單服斑蝥者豈有不  
死

寶鑑 定風散 二四二

治諸犬傷毒

南星 生用 防風 等分

右爲末凡被犬咬先以口含漿水吮洗傷處或小便鹽湯俱  
可洗淨用綿拭乾方上藥末卽不發○或用制過南星一二

錢爲末以童便調下亦可治破傷風

諸犬咬虫傷灸法 二四三

凡狼犬蛇蝎蜈蚣諸傷痛極危急或因傷受風而牙關緊急  
腰背反張不省人事者速切蒜片或搗爛菴傷處隔蒜灸之  
或二三十壯或四五十壯無不應手而愈取效多矣故本草  
謂蒜療瘡毒有回生之功夫積在腸胃尚爲難療况四肢受  
患則經絡遠絕藥不易及故古人有淋洗灸刺等法正爲通  
經逐邪導引氣血而設也

解毒散 二四四

一名國老飲○治蠱毒及一切蛇虫惡獸所

傷重者毒氣入腹則眼黑口噤手足強直此藥平易不傷元氣大有神效不可以易而忽之也

明礬

甘草 各一兩

右為末每服二錢不拘時冷水調下亦可敷患處

治馬咬傷 二四五

毒氣入心則危

馬齒莧搗爛煎湯服外以栗子嚼敷患處

蜈蚣毒 二四六

以鹽擦咬處或鹽湯洗傷處痛即止○用後蝎螯方最妙

已試○一方用吳茱萸嚼爛擦之或取井底泥傅之

解誤吞蜈蚣方 二四七

昔有婢用火筒吹火不知內有蜈蚣向火一吹蜈蚣驚竄入口不覺下喉求救人無措手適有人云取小雞一隻斷喉以血頓飲之復灌以香油取吐蜈蚣隨出

蝎螫毒 二四八

用生半夏白礬等分為末以醋和敷傷處

亦治蜈蚣傷  
無白礬亦可 ○

又蝎怕胆礬蛇怕雄黃徐春甫云親見蝎螫腫痛用胆礬擦之立消可見南方人家不可無雄黃北方人家不可無

胆礬此制蝎第一藥也

解蜂螫毒 二四九

以小便洗擦拭乾以香油塗之○或以雄黃末擦之○或以蝎螫方治之

治鼠咬毒 二百五十

猫毛燒存性入麝香少許香油調敷傷處則不害

治誤吞水蛭 二五一

昔一人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停日久復生水蛭食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食不治必死方用田中泥一塊小死魚三枚同猪膏溶搗勻再用巴豆十粒去油同

魚膏四味搗勻丸如綠豆大用田中冷水吞下大人五七丸  
小兒三九須臾瀉下水蛭盡却用八珍湯調理

中蚯蚓毒 二五二

石灰泡熱水涼洗患處久浸之則愈○小兒多受蚯蚓毒  
則陰莖及囊俱腫如水泡用鴨血塗之或以鴨口含少時  
則消○一方用鹽湯溫洗之即效

治蚕咬毒 二五三

蚕咬人毒入肉中令人發寒熱

苧葉搗敷之汁塗之今治蚕家以苧近蚕則蚕不生發也

解蜘蛛咬毒 二五四

薑汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之內飲羊乳

本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳飲之可解貞元十

年崔員外從質云日擊有人被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之

乞食於道一僧遇之教飲羊乳未幾日而平

去青  
神授散 二五五

治傳屍勞瘵血氣未甚虛損者不必多方

只以此藥早服則虫自不能為患無有不愈者此方得之河

南郡王府濟世之功不可盡述

川椒 二升去合口者略炒出汗

右為細末空心米飲調服二錢或酒煮米粉糊為丸桐子大

每服三十九以漸增至五十九或用酒送服

射工溪毒二五六葱白散○治溪澗中射工虫專射行人

形影人中其毒則病如瘧狀或若傷寒俗云沙發中之深者

死急用後方治之

葱白一握切 豉半升 葛根二兩 升麻七錢半

右剉如豆大每服四錢匕水二盞煎一盞去滓不拘時溫服

移時再服

雄黃一分 散二五七 治時氣病蟻下部生虫

雄黃半兩 桃仁二兩 青箱子 黃連



苦參 各三兩

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可用棗汁服方寸七

日三

千金 治大孔虫癢方 二五八

用大棗蒸爛為膏以水銀和捻長二三寸許綿裹內大孔  
中過宿明且虫皆出但水銀損腸宜慎之○愚按此方水  
銀不必生用但如治頭虱法燒烟以棗肉拌之用必更妙  
○頭髮生虱方在新因五三

雄麝散 二五九

治五種蠱毒

明雄黃

麝香 各一字另研

用生羊肺一指大以刀切開安藥在內吞下

醫林 丹砂丸 二百六十

治蠱毒

雄黃

朱砂

各另研

藜蘆 略炒

鬼白

巴豆霜 各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服二九空心薑湯下當利惡物並

蠱毒如煩悶以鴨血為羹食之

良方 七寶丸 二六一

治蠱毒

賊鼓皮

蚕退紙

刺蝟皮

各燒

五倍子

炒

續隨子

朱砂 另研

雄黃 另研等分

右為細末糯米粥丸小豆大每服七丸空心白水下

蜜髓煎 二六二

治中蠱令人腹內堅痛面目青黃病變無常

真蜜 一碗

猪骨髓 五兩研

右同煎熟分作十服日三服即瘥

歸魂散 二六三

凡初中蠱毒在膈上者當用此藥吐之

白礬

建茶 各一兩

右二味為細末每服五錢新汲水調下頓服之一時久當吐

毒出若此藥入口其味甘甜並不覺苦味者即其證也

麥麩散 二六四

治中蠱毒吐血

用小麥麩二合分為三服以冷水調下半日服盡當下蠱

卽瘥

挑生蠱毒簡易方 二六五

一方明礬芽茶等分為末凉水調三錢

一方青藍汁頻頻服半合則解

一方石榴皮煎汁飲之當吐出活蟲而愈

以下雜方

嗽烟筒 二六六

治一切犯寒欬嗽遇冬便作

欵冬蔬

鵝管石

雄黃

艾葉

各等分

右爲末鋪艾上用紙捲筒燒烟吸入口內吞下卽燕茶水一

口壓之自效○一方有佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一

節約長三五分許焚爐中吸烟嚙之

靈寶烟筒 二六七

治一切寒喘欵嗽

黃蠟

雄黃 各三錢

佛耳草

欵冬蔬 各一錢

艾葉 三分

先將蠟溶化塗紙上次以艾鋪之將三味細研勻摻捲成筒

用火點一頭吸烟吞之清茶送下

七寶美髯丹 二六八

補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏 赤白各一斤

川牛膝 半斤

將何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作

大片用黑豆鋪甑中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一

層却鋪牛膝一層又豆一層重重相間面上鋪豆蓋之

蒸以豆熟為度取起晒乾次日如前換豆再蒸如此七

次去豆用

破故紙 半斤洗淨用黑芝麻同炒無聲為度

去芝麻

白茯苓

半斤用入乳浸透晒乾蒸熟

赤茯苓

半斤用黑牛乳浸透晒乾蒸熟

當歸身 半斤酒洗

枸杞子 半斤去枯蒂者

右共爲末煉蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒米湯鹽湯俱可送下○製藥勿犯鐵器○按此卽七珍至寶丹少兎絲子一味

北京烏鬚方 二六九

而京各處烏鬚者惟此方頗好用之雖

未至簡妙然不壞鬚傷肉制用得法者可黑一月

五梧子 擇川中之大者打作碎粒分粗細爲二先將粗

者於鍋內用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑烟起取出不住手炒將冷又上火炒則黃烟起又取出炒

將冷再上火炒則青黃白烟間出即可住火先以真青  
布一大片浸濕將梔子傾在布上包成一團用脚踏成  
餅上用濕泥一担會一夜色如烏羽為妙磁器收貯聽

用

紅銅花 用細紅銅絲炭火煨醋中淬之不拘遍數以化  
盡為度去醋取銅花曬乾

皂礬

明礬 各三分

沒石子

食鹽 各二分

砂 淨一分

右每次染時旋配旋用以制梔子二錢為則加銅花四分餘



皆一二分和勻作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾調如  
稀糊坐湯中煮之看鍾內綠氣生面爲佳先用皂角湯洗鬚  
淨拭乾以抵柄塗上用皮紙搭濕包之或以青布囊之過  
夜次早溫水洗之如不潤用胡桃油擦指潤之一連染二夜  
其黑如漆亦妙

擦牙烏鬚方 二百七十

先期而擦者永久不白

青鹽 一斤

嫩槐枝葉

五斤切

黑鉛 四兩

沒石子

尖者  
七錢

右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝攪炒俱成灰炭取起將沒石子  
研細末和入用磁確盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上

擦鬚鬢久久自然潤黑

便易擦牙方 二七二

用五倍子大者一百個裝食鹽一斤鋪在鍋內大火燒過

存性為末每日擦之久則鬚髯皆黑

丹  
疝氣神方 二七二

其病甚至氣上衝如有物築塞心臟欲

死手足冷者二三服除根

陳皮

荔枝核

為末炒  
焦黃

硫黃

火中溶化即投水中  
去毒研細各等分

右為末飯丸桐子大每服十四五丸酒下其疼立止若疼甚

不能支持略加五六丸再不可多也

神仙六子丸 二七三

男子三十歲後服此藥一歲二單製服

不息永不白鬚髮四十以上或見微白及少年髮黃不潤者服此百日自然漆黑其效如神

兔絲子 制

金鈴子

覆盆子

五味子

枸杞子

蛇床子

炒各一兩

何首烏

酒浸蒸極熟焙

牛膝

酒浸蒸

熟地

酒蒸搗

地骨皮

各三兩

舶上茴香

鹽炒

川木瓜

各二兩

右十二味爲細末用浸兔絲酒作糊爲丸梧子大每服五七

十九食前温酒或白湯送下○一方加人參白朮白茯苓各

一兩尤有神效服此大忌三白

疝氣 二七四

方重

四製川棟子丸

二七五

治疝氣一切下部之病悉皆治之凡

腫痛縮小雖多年亦可除根

川棟子

淨肉一斤分四分內一分用鹽一兩茴香一合

同炒黃色去鹽香不用外三分一分用巴豆四十九個

一分用斑蝥四十九個一分用巴戟一兩仍各加麥麩

一合同炒黃色俱去麩藥不用

木香 一兩

破故紙 一兩炒

右為末酒糊丸梧子大每服五七十九鹽湯送下甚者日進

二三服或空心或食前

木香導氣丸 二七六

治男子小腸氣肚疼一切氣積下元虛

冷脾胃不和並宜服之有效

木香

丁香

乳香

香附

川棟子肉 大茴香

破故紙

葫蘆巴 炒

甘草 多

三稜 各一兩

杜仲 炒半兩

右為細末酒糊丸梧子大每服三五十九加至七八十九用

溫酒或鹽湯食前送下日進二三服

去鈴丸 二七七

治疝消鈴

用大茴香一升以老生薑二斤取自然汁浸茴香一宿以薑汁滲盡爲度入好青鹽二兩同炒赤取出焙乾爲末用無灰酒浸蒸餅爲丸梧子大空心食前酒下二三十丸或米飲亦可○此方實脾疏肝所以治疝多效非如常法之尅伐故爲妙也

事後中寒腹痛方二七八

凡房事後中寒厥冷嘔惡腹痛用葱薑搗爛衝熱酒服之睡少頃出汗卽愈○如腹痛甚者以葱白頭搗爛攤臍上以艾灸之或熨之亦可得鼻尖有汗其痛卽止

濕疔陰丸作痛 二七九

蘄艾

紫蘇葉

烘乾 川椒 炒熱各三兩

右三味拌勻乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷即易之

薰熨脫肛方 二百八十

治氣痔脫肛

枳殼 麩炒

防風

去叉各一兩

桔礬

二錢半

右四用水三碗煎至二碗乘熱薰之仍以軟帛蘸湯熨之通

手節淋洗

薰洗脫肛法 二八一

用赤皮葱薑菜二味各帶根煮煎湯入大楓子防風末各

數錢乘熱薰洗立收上○一方用五楮子煎湯洗以赤石

脂末摻上托入或脫長者以兩牀相並中空尺許以磁瓶

盛湯令病人仰臥浸瓶中逐日易之收盡為度○又泄腸

散方在小兒五匹

參朮芎歸湯二八二 治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

人參

白朮

川芎

當歸

黃芪 酒炒

山藥 炒

白芍藥

白茯苓

升麻

炙甘草

右生薑水煎服○按此方若治泄痢虛滑脫肛仍須加製附



子肉豆蔻方效

涼血清腸散 二八三

治大腸血熱脫肛

生地黄

當歸

芍藥

各錢半

黃芩

黃連

防風

荆芥

升麻

各一錢

香附

川芎

甘草

各五分

水一鍾半煎服

縮砂散 二八四

治大腸伏熱脫肛紅腫

縮砂仁

黃連

木賊

等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

訶子人參湯 二八五 治證同前

訶子 煨去核 人參

白茯苓

白朮

炙甘草

蓮肉

升麻

柴胡

等分

水一鍾半加生薑煎服

澁腸散 二八六

治久痢大腸滑脫

訶子

赤石脂

龍骨 等分

右為末以臘茶少許和藥摻腸頭上用絹帛揉入○又方用

鼈頭煨存性入枯礬少許如上揉入

蟠龍散 二八七

治陽證脫肛腫痛

地龍

晒乾

風化硝

二兩

右為末每用一二錢肛門濕則乾摻燥則清油調搽先以見

腫消荆芥生葱煮水候溫洗輕輕拭乾然後敷藥

伏龍肝散 二八八

治陰症脫肛

伏龍肝 一兩

鼈頭骨 五錢

百藥煎 二錢半

右為末每用一二錢濃煎紫蘇湯候溫洗過以清麻油調藥

傳如前法

獨蒜通便方 二八九

治小便不通

獨蒜 一枚

梔子 三七枚

鹽花

少許

右搗爛攤紙上貼臍良久卽通未通塗陰囊上立通

小便不通經驗方 二百九十

以朴硝爲末每服二錢空心煎茴香湯下○又方用蚯蚓

杵以涼水攄過濃服半碗立通大解熱疾不知人事欲死

服之甚效

小水不通葱熨法 二九一

用葱三斤慢火炒香熟以絹帕裹更替熨臍下卽通或用

鹽炒熱熨之冷則再易須臾卽通

雞內金散 二九二

治氣虛弱尿

用雄雞雌脰并腸燒為末溫酒調服

狐腋氣五方 二九三 治陰汗鴟臭 兩腋下臭不可與人同行

枯白礬

蜜陀僧

黃丹

各二錢

麝香

五分

右於乳鉢內研細以醋於手心內調藥搽腋下經兩時許即  
以香白芷煎湯洗之一日用一次

又治腋氣神效方

蜜陀僧

四兩

枯白礬

二兩

輕粉

三錢

右為細末頻擦兩掖擦至半月見效半年全愈

又腋氣方

用熱蒸餅一枚擘作兩片摻密陀僧細末一錢許急挾在腋下畧睡少時候冷棄之如一腋有病只用一半葉元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絕根本

### 又腋氣方

單用枯礬爲極細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過十度卽愈一方以唾調塗之

### 又腋氣方

先剃去腋毛令淨用白定粉水調搽傳患處至六七日後

清晨看腋下有一黑點如針孔大者以筆點定卽用小艾

炷灸七壯灸過或有濁氣攻心作痛者當用後藥下之

丁香

青木香

檳榔

檀香

射香

大黃

右煎服以下為度

腳汗牡蠣散

二九四

治腳汗除穢氣

牡蠣

煨

枯白礬

蜜陀僧

黃丹

等分

右為細末每用少許乾摻腳指縫中即收

燥囊牡蠣散

二九五

治陰囊濕痒搔之則汁水流珠用此極

效

牡蠣醋煨

雄黃一錢

枯礬

硫黃

苦參

蛇牀子各二錢

右為細末先用蒼朮椒鹽煎湯洗濕處後用此藥搽之

蒸洗陰囊法二九六

白治一切陰囊濕痒

黃丹

陳茶一撮

蒼朮一錢

花椒

蛇床子

白礬各一錢

蒼耳草量入  
炒鹽半兩

朴硝三錢

右用水四碗先將前五味煎湯去粗乃入後三味泡化先薰

後洗三四次絕痒

梅蘇丸二九七



龍腦薄荷 粉草 冰糖 各四兩 烏梅肉

白檀香 紫蘇葉 各二兩

右為極細末以熟棗肉搗丸芡實大勿用鐵器

冰梅丸 二九八

龍腦薄荷 白糖 柿霜 各四兩 烏梅肉

桔梗 各五錢 兒茶 二錢 甘草 一錢 冰片 一分

右為極細末煉蜜丸龍眼核大

龍腦上清丸 二九九

烏梅肉 腦荷 各四兩 白檀香 蘇葉

兒茶

硼砂

沙糖 各二兩

冰糖

柿霜 各八兩

乾葛

粉草 各一兩

水片 三分

右為極細末蜜九櫻桃大

上清丸 三兩

佳方

腦荷 二兩

雨茶

白硼砂 七錢

烏梅肉

毘母

訶子 各三錢

冰片 二分

煉蜜九

辟邪丹 三百一

方在痘疹百三十

辟一切穢寒邪氣

福建香茶餅

三百二

能辟一切瘴氣時疫傷寒穢氣不時噏

口中邪氣不入

沉香

白檀

各一百

兒茶

二兩

粉草

五錢

麝香

五分

冰片

三分

右為極細末糯米調飲湯為丸黍米大噏化

香髮木樨油

採桂花半開者去莖蒂令淨每花二升用真麻油一斤輕

正容手拌勻納磁瓶中用油紙緊封器口坐釜中湯煮一餉持

起頓燥處十日後掀出用麻布濾絞清油封閉緊密收之

愈久愈香○或用菜子油亦可

玉容散 三百四

治面生黑黻雀斑

甘松

三奈

茅香 各半兩

白芷

白芨

白欵

白僵蚕

白附子

天花粉

綠豆粉

各一兩

防風

零陵香

藁本

各二錢

肥皂

二錢去皮

右為細末每早晚蘸末洗面

硫黃膏

三百五

治面部生瘡或鼻赤風刺粉刺

硫黃

白芷

天花粉

水粉

各五分

全蝎 一枚

蟬蛻 五個

羌青 七個去頭足

右為細末用麻油黃蠟約多寡如合面油熬勻離火方入前末藥和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面勿近眼數日間腫處自平赤鼻亦消如退風刺一夕見效

治妊娠五七個月用數版可保全產

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草炙

全書卷六十

終

灸黃

錢

如車

三

全書卷六十一 癸用米子油亦可

玉容散 三百四 市面生黑野雀

寸松 三奈 丁香 各半兩 白芷

白芨 白欬 白蠟 白附子

天花粉 蘇豆粉 各 山風 零陵香

甄與自平赤鼻水散收 裝風陳一又良效

末藥研戶食飲調和執 我面軟以小指塗面底後肌嫩日間

守為懸末用瀉水黃麴 除冬裏吸合面漸然自嫩火衣人前

全融 一妹 融勉 正 附 芙蓉 小附 志西 良

小岳全書卷之六十一長集

婦人規古方

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

# 婦人

安胎飲一

治妊娠五七個月用數服可保全產

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草 炙

紫蘇

炙黃芩

香一錢

古用薑水煎服○一古有砂仁

安胎散二 治妊娠卒然腰痛下血

熟地

艾葉

白芍炒

川芎

黃芪炒

阿膠炒

當歸

甘草炙

地榆各一錢

右加薑棗水煎服

泰山盤石散三

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱

或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃

氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加



黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐  
東臯曰婦人凡懷胎二三個月慣要墮落名曰小產此由體  
弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎  
多用艾附砂仁熱補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清  
和無火煎爍則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行  
欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快  
脾氣多用亦耗真氣况香燥之性氣血兩傷求以安胎適又  
損胎而又墮也今惟太山磐石散千金保孕丸二方能奪化  
工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以爲好生君子

共知也

人參

黃芪

當歸

川續斷

黃芩 各一錢

川芎

白芍藥

熟地 各八分

白朮 二錢

炙甘草

砂仁 各五分  
糯米 一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月  
之後方無慮也

地黃當歸湯 一名內補丸 ○治妊娠衝任脈虛補血安胎

熟地 二兩

當歸 一兩

右每服五錢水煎服 ○為丸法以當歸炒為末熟地蒸搗膏

和丸桐子大每服百餘丸溫酒或滾湯下○許學士曰大率  
妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟  
枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒  
若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致強陰不  
致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方

當歸湯五

治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參各二三錢阿膠炒

甘草炒各一錢

連根葱白

一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散 六 或頓仆或因毒藥胎動不安或脇痛腹痛上搶

短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃芪

炙甘草

等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯 七

治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或

去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠

炒一兩

艾葉

數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散

治胎動腹痛

阿膠炒

白茯苓

白朮炒

川芎

當歸

陳皮

各一錢

甘草

炒三分

右薑棗水煎服

良方黃芪湯

治氣虛胎動腹痛下水

糯米一合

黃芪炒

川芎各一兩

右水煎分三服

良方釣藤湯 治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

釣藤鈎

當歸

茯神

桑寄生

人參 各一錢 苦梗 一錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方 白朮散 十二 治妊娠傷寒內熱等證

白朮

黃芩

炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方 三味白朮湯 十二

治妊娠內熱心痛

白朮 四錢

赤芍藥 三錢

黃芩 炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方 四味白朮湯 十三

治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

粥不入

白朮 炒一錢

人參 五分

甘草 炒

丁香 各二分

右薑水煎服

全生白朮散 十四

治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎

腫

白朮 一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓 各半兩

右為末每服二錢米飲下○如末應佐以人參甘草

探胎飲 十五

婦人經水不來三月疑似用此驗之

婦人

五

川芎 不拘多少為末不見火

空心煎艾湯調下方寸七覺腹中動則有胎也臍之下動者乃血癥也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯 十六 治妊娠心腹急痛或去血過多而眩運

當歸

白芍藥 炒

白朮 炒

茯苓

澤瀉 各一錢 川芎 二錢

右水煎服

益母地黃湯 十七

治妊娠跌墜腹痛下血

生地

益母草 各二錢

當歸

黃芪 炒各一錢



右薑水煎服

良方 獨聖散 十八

治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁

不拘多少帶皮同炒  
勿令焦黑取仁為末

右用熱酒調服四五分或一錢○此物有安胎導滯易產之

功實妊婦之要藥也

良方 安胎寄生湯 十九

治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生

白朮

茯苓

各五分 甘草 一錢

右水煎服

二黃散 二十

治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁

作渴或脇肋脹痛等證

生地

熟地

右為末每服三錢煎白木枳殼湯下

四聖散 二一

治漏胎下血

條芩

白朮

砂仁

阿膠 各等分

右為細末每服二錢艾湯調下○一方有芍藥無阿膠○按

此方若改為湯砂仁用當減半

良方續斷湯 二二

治妊娠下血尿血

當歸

生地黃 各一兩 續斷

赤芍藥 各半兩

右爲末每服一錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯

治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治惡

阻

枳殼炒

黃芩炙各半兩

白朮炒一兩

右爲末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用

補中益氣湯加五味○若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻

柴胡○若因肺熱內熱宜用逍遙散

滑胎枳殼散二四

此方能令胎瘦產易○湖陽公主每產累

日不下南山道人進此方

粉草

炒一兩

商州枳殼

是也二兩

右為末每服二錢空心沸湯調日三服凡孕六七月宜服之

○溫隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散

二五

方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

金鯉魚湯

二六

治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不

利或胎死腹中皆效

當歸

芍藥

各一錢

白木

一錢

茯苓

一錢半

橘紅

五分

鯉魚

一尾不稱大小

右作一服將鯉魚去鱗臟白水煮熟去魚用汁鍾半入葯加  
生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中  
脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯 二七

治妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩○一方

有當歸防風梔子仁

白茯苓

麥門冬

黃芩

各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四  
物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘓飲

治妊娠失調胎氣不安上疝作痛名曰子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘓葉

當歸

各一兩

人參

甘草

各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾

氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜

用四君芎歸

安樂散二九

治妊娠小便澀少遂成淋瀝名日子淋甚妙

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛

等分

右水煎服○一方人參細辛加倍爲末每服二錢麥冬湯調服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因膏梁厚味宜用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散

天仙藤散 三十

治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食

不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣

天仙藤 洗畧炒

香附 炒

陳皮

甘草

烏藥 等分

右每服三五錢加生薑木瓜各二片紫蘇三葉水煎食前日進三服○若因脾胃虛弱宜賺六君子○中氣下陷須用補

中益氣湯

羚羊角散 三一

治妊娠虛風頭項強直筋脈掣急語言蹇澁

痰涎不利不省人事名曰子癇

羚羊角 鎊

川獨活

棗仁

五加皮

薏苡仁 炒

防風

當歸

川芎

茯苓

杏仁

去皮尖  
各五分

炙甘草

木香

各一分

右加薑五片水煎服○若因肝經風熱或怒火所致須用加

味逍遙散

人參槲皮湯 三二

治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲



食少進益胃和中○一名參橘散

人參

陳皮

麥門冬

白朮各一錢

厚朴制

白茯苓各五分

炙甘草三分

右加淡竹茹一塊薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳

枳殼○若因飲食停滯宜用六君加枳殼○若因脾胃虛宜

用異功散

竹茹湯三三

治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰

竹茹彈子大

陳皮

半夏

茯苓各錢半

生薑一錢

水鍾半粳米一撮煎七分溫服忌羊肉雞魚麵食

良方 半夏茯苓湯 三四 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 泡炒黃 陳皮 砂仁 炒各一錢 白茯苓 二錢

甘草 炒五分

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸在二九

烏附湯 三五 治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥 香附 制 白朮 土炒 陳皮 各一錢

人參 炙甘草 各八分

水鍾半薑三片煎七分服○吐甚者加丁香砂仁各七粒

千金保孕丸 二六

治妊婦腰背痛善於小產服此可免墮胎

之患○此卽良方杜仲丸但彼等分用

杜仲 四兩同糯米炒去絲 川續斷 二兩酒洗

右爲末山藥糊丸桐子大每服八九十丸空心米飲下忌酒

醋惱怒

一母丸 三七 一名知母丸 ○治妊娠血熱頓仆胎動不安或

欲墮產

知母 炒爲末

右搗棗肉爲丸彈子大每服一九人參湯嚙送或丸桐子大

每服三四十九白湯下或嚙之

東胎丸 三八

懷胎七八個月恐胎氣展大難產用此扶母氣

東兒胎易產然必胎氣強盛者乃可服

條黃芩

酒炒勿太熟冬月一兩夏月半兩

白朮 三兩

陳皮 二兩

白茯苓

七錢半

右為末粥糊丸子大每服五十九白湯下

茯苓丸 三九

治妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓

人參

桂心

乾薑 炮

半夏

泡洗炒

橘紅

各一兩

白朮

炒

甘草

炒

枳殼 麩炒各二兩

右為末蜜丸桐子大每服五十九丸米飲下日三服○右原方  
仍有葛根二兩似非所宜也用者當酌之

這生散 四十 妊娠臨月服十餘劑則易產或加砂仁枳殼如

兼別證以意增減○詩云誕彌厥月先生如達註曰先生首  
生也達小羊也羊子易生故以此名之

人參 白朮 當歸 白芍

陳皮 紫蘇 各一錢 炙甘草 二錢 大腹皮 酒洗晒 乾三錢

水一鍾半煎服○一方無當歸白芍白朮

婦人

三

佛手散 四一 一名芎歸湯亦名當歸湯○治產後去血過多

煩暈不省并一切胎氣不安亦下死胎

川芎 二錢 當歸 三五錢

右咀每用半兩水煎服○若腹疼加桂○若腹痛自汗頭眩

少氣加羊肉若不應用八珍湯○若用下胎當為末以酒調

服

生化湯 四二 此錢氏世傳治婦人者

當歸 五錢 川芎 一錢 甘草 炙五分 焦薑 三分

桃仁 十粒去皮尖雙仁 熟地 三錢

右咬咀水二鍾棗二枚煎八分酒服○一方無熟地附加

減法○凡胎衣不下或血冷氣弱血枯氣弱等證連服生化

湯二三劑卽下或用此送益母丸卽下蓋益母草行血

養血性善走而不傷人者也○一凡婦人無論胎前產後皆

宜此藥○一凡血暈虛暈加荆芥穗六七分○一凡產婦氣

虛氣脫倦怠無力加人參黃芪一凡陽虛厥逆加附子肉

桂○一脈虛煩渴加麥冬五味一氣藥有痰加陳皮竹瀝

○一血虛血燥便結加麻仁杏仁茯苓○一多汗不眠加茯

神棗仁黃芪上體多汗加麻黃根下體多汗加漢防己○一

煩熱加丹皮地骨皮○一口噤如風反張瘳癢者加荆芥防

風各三四分○一惡露未盡身發寒熱頭痛脇脹其小腹必

然脹滿加紅花丹皮肉桂各三四分玄胡一錢○一內傷飲

食加山杏陳皮砂仁或神曲麥芽○一外傷寒濕或加蒼朮

白朮○一血積食積胃有燥糞○一腹脹痛加大黃二錢○一

產後下血不止或如屋漏水沉黑不紅或斷或來或如水或

有塊淋瀝不休此氣血大虛之候不可誤用寒涼其脈浮脫

者可加附子輩諸陽分藥否則無救矣○佛手散單用當歸

三錢川芎二錢此卽其變方也



會稽錢氏世傳曰嘗論產證本屬血虛陰亡陽孤氣亦俱病  
如大補則氣血陡生倘失調則諸邪易襲四物避芍藥之寒  
四物得薑桃之妙氣毋耗散法兼補虛食必扶脾勿專消導  
熱不可用芩連恐致宿穢凝滯寒不宜用桂附反招新血流  
崩三陽見表證之多似可汗也用麻黃則重竭其陽三陰見  
裏證之劇似可下也用承氣則大涸其血耳聾脇病乃腎虛  
惡露之停休用柴胡謔語汗多乃元弱似邪之證毋同胃實  
厥由陽氣之衰難分寒熱非大補不能開陽瘕因陰血之虧  
豈論剛柔非滋營胡以潤絡潮熱似瘕以瘕治則遷延神亂

如邪以邪論則立困總屬大虛酒從峻補去血多而大便燥  
菘蓉加於生化非潤腸和氣之能通患汗出而小便難六君  
倍用參芪必生津助液之可利加參生化類服救產後之危  
活命長生調攝須產前加意

當歸川芎湯 四三

治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸

熟地黃

白芍藥 炒

玄胡索 炒

川芎

桃仁

紅花

香附

青皮 炒

澤蘭

牡丹皮

右水煎入童便酒各小半○若以手按腰愈痛此是瘀血爲

患宜用此藥或失笑散消之○若按之反不痛此是血虛宜用四物參苓白朮○若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子○若或作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

加味芎歸湯

四四

治分媿交骨不開或五七日不下垂死者

生男女婦人髮

一握燒存性

自死龜殼

一個或占過者亦可酥炙

川芎

當歸 各一兩

右咀每用一兩水煎服良久不問生死胎自下

當歸黃芪湯

四五

方在補陣九八

治妊娠下痢腹痛

芎歸補中湯 四六

治氣血虛牛產

川芎

當歸

黃芪 炙

白朮 炒

人參

芍藥 炒

杜仲 炒

艾葉

阿膠 炒

五味子

拌炒各一錢

甘草 炙五分

右每服五錢水煎服○若脾氣虛弱須用補中益氣湯○若

氣虛有火宜用安胎飲

保生無憂散 四七

臨產服之補其血順其氣或胞胎肥厚根

蒂堅牢者皆可使之易產又治小產瘀血腹痛

當歸

川芎

白芍

乳香

枳殼

南木香

血餘

右等分每服二三錢水煎日二服○

胞衣既破其血已涸

或元氣困憊急用八珍湯斤許水數

既煎熟時飲救之飲盡

再制亦有得生

人參黃芪湯四八

治小產氣虛血下不止

人參

黃芪炒

當歸

白朮炒

白芍炒

艾葉各一錢

阿膠炒二錢

右作一劑水煎服

長方牛膝散四九

治胎衣不下腹中脹病急服此藥腐化而下

緩則不久

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃

各三兩

當歸

一兩半

桂心

半兩

右每服五錢薑三片加生地黃一錢

水煎服

局方

黑神散

五十

一名烏金散

靈苑

方名肉桂散○治產後

惡露不盡胎衣不下血氣攻心腹痛不止及治脾腎陰虛血

不守舍吐衄等證

黑豆

二兩炒

當歸

去蘆酒洗

熟地

蒲黃

白芍

甘草

炙

乾薑

炮

肉桂

各一兩

右為末每服二錢童

便酒各半調服○良方黑神散有炮附

子半兩無蒲黃

簡易黑神散 五一

方在

和陣二一一

治一切失血

經驗滑石散 五二

治產難凡水下胎乾胎滯不生用此最效

滑石 飛過一兩

白蜜

香油 各半盞

右將油蜜慢火熬熟三四沸掠去沫調滑石末頓服外以油

調於產婦臍腹上下摩之立效

難產方 五三

令產婦以自已髮稍含於口中惡心即下亦治胎衣不下

良方桂心散五四

治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心

瓜蒌

牛膝

藜麥

各五分  
或一錢

當歸

一錢或二三錢

右水煎

桂香散

五五

治胎死腹中不下

桂心三錢

射香

五分

右為末作一服酒調下

下胎小品方

五六



用麥蘖一升搗碎水二升煮一升服之即下神效○按麥蘖能損氣破血如此故凡脾胃虛弱及飲食不化者不宜用明矣○又方用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服即下

廣濟 下胎方 五七

并下死胎俱效

天花粉 四兩

肉桂

牛膝

豆豉 各三兩

右咀用水七碗煎二碗半分三服每服後一時許又進一服扶羸小品方 五八 虛弱久欲下胎宜用此

人參

粉草

川芎

肉桂

乾薑

桃仁

黃芩

蟹瓜

右等分每服一兩水二鍾煎八分空心服未動再服

下死胎 五九

凡胎死腹中其舌多見青黑口中甚穢而嘔腹

中不動祇覺陰冷重墜者是

用平胃散一兩以黃酒河水各一鍾煎至一鍾入朴硝三

五錢再煎三五沸溫服其死胎即化水而出萬不失一○

又方單用朴硝末三錢以熱酒和熱童便調服立出或用

佛手散以酒調服亦妙

千金去胎方 六一

大麩麩 五升

漬酒一斗煮二三沸去滓分五服隔宿勿食且再服其胎如

糜母無所苦千金不傳太公及四代益神華錄有人遠公

良方 硫黃散 六二 治產後陽氣虛寒玉門不閉

硫黃 烏賊骨 五味子

右為末摻患處日三易

硫黃湯 六三 治產後玉門不斂陰戶突出

硫黃 三錢 兔絲子 吳茱萸 各二錢 蛇床子 一錢半

右研勻用水二鍾煎湯頻洗自收

良方 益母丸 六四 治婦人赤白帶惡露時下不

止及治婦人胎前產後經中諸般奇痛無所不療本草云此  
草胎前無滯產後無虛故名益母

益母草 一味

一名克蔚子 一名野天麻 方梗對節生葉

葉顛火麻四五月間開紫花是白花者非

右於五月採取晒乾連根莖葉勿犯鐵器磨爲細末煉蜜丸  
如彈子大每服一九用熱酒和童便化下或隨證用湯引送  
下○一方以此爲末每服二錢或酒或童便或隨證用引服  
之○一方凡產時倉卒未合只用生益母草搗汁入蜜少許  
服之其效甚大○一益母膏方依前採取搗爛以布濾取濃

汁用砂鍋文武火熬成膏如黑砂糖色為度入磁罐收貯每

服二三匙酒便調下或於治血湯葯中加一匙服之尤妙

良方 奪命丹 六五

治瘀血入胞脹滿難下急服此葯血即消衣

自下○按此方頗有廻生丹之功用下死胎必效須用當歸

方

附子 炮半兩 乾漆 碎之炒 牡丹皮 各一兩

右為細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成膏和前葯

丸桐子大溫酒吞五七丸○一方有當歸一兩

廻生丹 六六

治婦人產後諸疾汚穢未淨及一切實邪疼痛

婦人

死胎瘀血衝送等證

大黃膏法 用蘓木三兩河水五碗煎至三碗去粗聽用

紅花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘滾去粗聽用

黑豆三升煮熟存汁三碗去豆去皮晒乾為末俱聽用

大黃一斤為末用好醋八碗熬成膏次下紅花酒蘓木湯

黑豆汁攪勻又熬成膏盆內收盛候用將鍋焦焙乾為末

同豆皮末俱入之

人參 白朮

青皮

木瓜

各三錢

當歸

川芎

元胡

蒼朮

香附 童便炒

蒲黃

赤茯苓

桃仁泥

熟地 各一兩

牛膝

三稜

山茱萸

五靈脂

地榆

甘草

薑活

陳皮

白芍

各五錢

良薑 四錢

烏藥 二兩半

木香

乳香

沒藥 各一錢

右為末用前大黃膏為丸彈子大金薄為衣不拘時隨證服

用湯引送下一丸

斷產灸法 六七

一傳方欲絕產者灸臍下一二寸三分陰動脈

中三壯此當自臍中至骨際拆作五寸約之

千金斷產方 又六七

四物湯 一劑

芸臺子 一撮即  
油菜子 紅花

水鍾半煎八分經後空心服則不受胎

斷產小品方 六八

斷產墮胎有驗

改蠶退紙 方一尺

右燒為末空心酒調服終身不受孕

丹溪斷子法 六九

用白麩麩一升無灰酒五升作糊煮至三升半濾去滓分作

三服候經至前一日晚五更及天明各吃一服經即不一無不字



行終身無子矣

仲景 羊肉湯 七十

治產婦腹中疝痛寒痛血氣不足虛弱甚者

及寒月生產寒氣入於子門手不可犯臍下脹滿此產後之寒證也并治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

精羯牛肉 一斤

當歸 二兩

生薑 五兩

右用水八升煮取三升加葱椒鹽温服七合日三服○若寒多者加生薑一斤○痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩

良方 羊肉湯 七十一

治產婦脾虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩臍

脇急痛

精羊肉 四兩

當歸

川芎 各半兩  
生薑 一兩

右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方 黃雌鷄湯 七二

治產後虛羸腹痛

當歸

白木 炒

熟地黃

黃芪 炒

桂心 各半兩

小黃雌雞 一隻去頭足腸翅細切

右先用水七碗煮鷄至三碗每用汁一碗葯四錢煎日三服

母鷄湯 七三

治產後禱勞虛汗不止

人參

黃芪

白木

白茯苓

麻黃根

牡蠣 煨各三錢

右用母鷄一隻去毛雜淨水六七碗同葯煮至三碗任意服

之

豬腰湯

七四

治產後褥勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛腹痛

俱效

豬腰一對

當歸

白芍葯

酒炒各一兩

右以葯二味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如骰子塊

同晚米一合香豉一錢如葱椒鹽煮稀粥空心日服一次神

效○或加人參更妙

四神散

七五

治產後血虛或瘀血腹痛

當歸 二錢

川芎 芍藥 炒各一錢  
炮薑 五分

右水煎服

太巖蜜湯 七六

治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地

當歸

芍藥 炒

乾薑

吳茱萸

桂心

獨活

甘草 炒

小草 各一兩

細辛 半兩

右每服半兩水煎服

良人參湯 七七

治產後諸虛不足發熱盜汗內熱哺熱等證

○此部 歸湯亦名團參散

人參

當歸 等分

右為末先以豬腰子一枚切片糯米半合葱白二莖入水二  
鍾煎汁八分再入葯三錢煎服

白茯苓散 七八

治產後蓐勞頭目肢體疼痛寒熱如瘧

白茯苓 一兩

人參 等分 當歸

黃芪

川芎

白芍葯 炒

熟地

桂心 各半兩

豬腰 一對

右以水三盞入豬腰并薑棗各二事煎一盞去粗入前藥半

兩煎一盞服

良方七珍散 七九

治產後不語

人參

石薑蒲

生地

川芎 各一兩

細辛 七錢

防風

朱砂 另研各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調服

良方趁痛散 八十

治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝 酒炒

甘草 炒

薤白 各一兩

當歸

白朮 炒

黃芪 炒

桂心

獨活 加薑各半兩

右每服半兩水煎

補腎飲 八一

治產後傷動痔破不能小便而淋瀝

生黃絲絹 一尺剪碎

白牡丹皮根

白芨 各一錢俱為末

用水一碗同煮至絹爛如傷空心頓服服時不得作聲作聲

則不效

良方 止汗散 八一

牡蠣 煨粉半兩

小麥麩

入兩炒黃為細末

右每服三五錢用猪肉汁調服

良方 麻黃根湯 入二 治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根

人參

黃芪 炒

當歸

牡蠣 煨粉

甘草

右每服四五錢水煎服

三味參蘓飲 入四

治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參 一兩

蘓木 二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口

鼻黑氣起宜急用此藥加附子五錢亦有得生者

良方 黃龍湯 八五

治妊婦寒熱頭疼嘔嘔不食脇痛嘔痰及產



後經後外感風寒熱入胞宮寒熱如瘧等證○按此郎小柴

胡湯之去半夏也

柴胡 二錢

黃芩 炒

人參

甘草

各一錢

右用水煎服

陳氏二母散 八六

治產後熱血上攻留於肺經欬喘促

知母

貝母

人參

桃仁

杏仁 俱去皮尖

白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

猪蹄湯 八七

治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃芪漏蘆陳皮木通先以猪蹄煮汁二碗煎葯服之○或加天花粉

又方 用猪蹄一副通草二兩川芎一兩甘草一錢川山甲十四片炒將猪蹄洗切入水六碗同葯煎煮約至三碗加蔥薑鹽料取汁飲之忌冷物要喫羹湯助其氣血乳汁自下夏月不可失蓋時用葱湯洗乳爲佳

良方 湧泉散 八八

下乳忌食薑椒辛辣飲食

王不留行

蘆麥

麥門冬

龍骨

各二錢

右用猪蹄汁一椀酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

玉露散 八九  
治產後乳脉不行身體壯熱頭目昏痛大便澀

滯

人參

白茯苓

當歸

炙甘草 各五分

桔梗

川芎

白芷 各一錢  
芍藥 七分

右水煎食後服○如熱甚大便秘結加大黃三五分炒用

良方  
漏蘆湯

治婦人肥盛脉氣壅結乳少

漏蘆 二兩

蛇退 一條

土瓜根

右共為末酒調下二錢

括萋散 九一

治吹乳腫痛

括萋 一個

乳香 二錢

右用酒煎服○外用南星為末以溫湯調塗

滑氏補肝散 九二

治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭

暈寒熱發熱或徧身作痛經候不調

熟地

白朮

炒各一兩

棗仁

炒

獨活

各四兩

當歸

川芎

黃芪

炒

山藥

五味子

炒杵

山茱萸肉

木瓜

各半兩

右咬咀每服五錢棗水煎服

金匱膠艾湯九三

治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠炒

川芎

炙甘草

各一兩

艾葉

當歸 各兩半

白芍

熟地

各二兩

右咬咀每服五錢水煎服○一方加地榆黃芪即名安胎散

集驗

加味八珍湯

九四

治婦人思慮過傷飲食日減氣血兩虛

月經不調夜夢交感或出盜汗寢成勞損

人參

白朮

茯苓

當歸

生地 各一錢

炙甘草

川芎

芍藥

軟柴胡

黃芪 各五分

香附 制

丹皮 各八分

婦人

水鍾半大棗一枚煎七分食前服

集驗

調衛養榮湯

九五

治婦人室女一切月經不調或先或後

或絕閉不通憎寒壯熱口苦無味欬嗽躁煩頭眩漸成勞證者

當歸

生地

麥冬

沙參

陳皮

白朮

牡丹皮

地骨皮

各一錢

柴胡稍

桔梗

穀芽

甘草

各五分

右加蓮子薑棗水煎服○痰中見血加側柏葉○煩躁口乾

加炒山梔倍麥門冬○脇下脹疼加青皮用芎○胸膈滿悶

加黃連薑炒枳實去麥冬地骨皮○夜出盜汗加黃連黃芪  
去柴胡桔梗○大便秘結加桃仁倍當歸○欬嗽不已加瓜  
蒞仁阿膠○小水不利加木通茯苓

良方 當歸散 九六 治經水妄行不止及產後氣血虛弱惡露內

停憎寒發熱宜服此去之

當歸 酒洗 川芎 炒 白芍 炒 白朮 炒

黃苓 炒各半 山茱萸肉 一兩半

右為末每服一錢酒調日二服○一方無山茱萸○氣虛者

去苓加桂心一兩

良方丹參散九七良方云丹參一味其治頗顛四物湯能破宿血

補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經下產後惡血兼治  
冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參酒洗去土晾乾切

右為細末每服二錢溫酒調下○經脉不調食前服○冷熱  
勞不拘時服

玄胡當歸散九八亦名延胡索散○治血積小腹痛或凶氣

逆月經不行肚腹作痛

當歸

赤芍藥

劉寄奴

沒藥



枳殼 楚炒

玄胡索 炒等分

右爲末每服一錢熱酒調下

牛膝散 九九

治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸臍

當歸 酒浸

牛膝 酒炒

赤芍藥

桂心

桃仁 去皮尖

玄胡索 炒

牡丹皮 各一兩

木香 三錢

右爲末每服一錢溫酒調下或每服五七錢水煎服

良方 交加散 百

治經脉不調腹中撮痛或結聚癥瘕產後中風

○又交加散方在和陣二五二

生地 一斤

生薑 十二兩

取汁

取汁

右以地黃汁炒薑祖薑汁炒地黃祖乾為末每服三錢溫酒調服○加芍藥玄胡當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各五錢尤效

薑黃散

百一

治瘀血凝滯肚腹刺痛或腹脹發熱等證

薑黃

當歸

酒拌各二錢

蓬朮

醋炒

紅花

桂心

川芎

玄胡索

炒

丹皮

各五分

右水酒各半煎服

琥珀散

百二

治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾

烏藥

二兩

當歸

酒洗

蓬朮

醋制各一兩

右為末每服二錢溫酒調服

溫經湯

百三

治寒氣客於血室以致血氣凝滯臍腹作痛其脈

沉紫

人參

牛膝

酒炒

甘草

炒各一錢

當歸

川芎

芍藥

牡丹皮

蓬朮

醋炒

桂心

各五分

右水煎服

經

失笑散

百四

治婦人心痛氣刺不可忍及產後兒枕畜血惡

血上攻疼痛并治小腸氣痛

五靈脂 淨者 蒲黃 等分具炒

右為末每服二三錢用酒煎熱服○一方用好醋一杓熬成膏再入水一鍾煎至七分熱服○一方用醋糊和丸龍眼大每服一丸以童便和水各半鍾煎七分溫服○按此方若用以止痛蒲黃宜減半若用止血則宜等分或靈脂減半亦可

澤蘭湯 百五 治勞怯經閉

澤蘭葉 一錢 當歸

芍藥 炒各一錢 甘草 炙五分

用水煎服

當歸沒藥丸 百六

治血瘀作痛及血風筋攣骨痺手足麻木

疼痛

當歸

五靈脂

炒各一兩

沒藥

五錢

右為末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

醋附丸 百七

治元臟虛冷月候不調腹中急痛赤白帶下渾

身寒熱胎氣墮滯不固

香附米 半斤醋煮焙干為末

右以醋糊為丸桐子大每服三四十九米飲下

栢子仁丸 百八

治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦

而生潮熱慎勿以壽藥通之宜栢子仁丸或前澤蘭湯主之

栝子仁炒研 牛膝酒拌 卷栝各半兩 澤蘭葉

續斷各二兩 熟地黃三兩酒伴蒸爛杵膏

右為末入地黃膏加煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心米飲

下

烏賊魚骨丸百丸

此即內經治血枯方

烏賊魚骨去甲四兩

蘆茹一兩即薤根

右為末以雀卵搗丸小豆大每服五丸或十丸鮑魚煎湯下

以飯壓之○鮑魚即今之淡乾魚也

增員四物湯百十

治脾虛不攝血去不止

人參

當歸

芍藥炒

川芎

乾薑

炒各一兩

甘草

炙四錢

右每服四錢水煎服

奇效四物湯百寸一

治肝經虛熱血沸騰而崩久不止

當歸

酒拌

熟地

白芍

川芎

阿膠

炒

艾葉

炒

黃芩

右每服四錢水煎

良方加減四物湯百十二

治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地

蓬木

三稜

肉桂

乾漆

炒烟盡  
等分

右咬咀每服五七錢水鍾半煎七分食遠服

四物二連湯

百十三

治婦人血虛發熱或口舌生瘡或晝安

夜熱

當歸

川芎

芍藥

熟地

胡黃連

宣黃連

各一錢

右作一劑水煎服

人參當歸湯

百十四

治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節

作痛或虛煩咽噪



人參

當歸

生地

桂心

麥冬

白芍藥

各等分

右用粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去米入藥五錢棗

二枚煎服或總煎之亦可虛甚者用熟地黃

夏方

一味防風散百十五

治肝經有風以致血得風而流不歸

經者

用防風去蘆為末每服一錢白湯調服○一名獨聖散每服

一二錢空心食前用酒煮白麴清飲調下極效

龍骨散

百十六

治血崩不止

龍骨 煨

當歸

香附 炒各二兩

棕毛灰 五錢

右為細末每服四錢空心米湯調下忌酒膩鷄魚炙煨物

如聖散

百十七

治血崩三服全愈

棕櫚子

烏梅肉

乾薑

俱燒存性為末各等分

右每服二錢空心烏梅湯調服○一方單用棕皮半燒半生

為末每空心服二錢亦妙

槐榆散

百十八

治血崩及腸風下血

槐花

地榆

等分炒焦

右二味用酒煎飲之

七灰散 百十九

治血崩神效

蓮蓬殼

鑿粟殼

醃蟹殼

益母草

旱蓮草

棕毛葉

藕節

各分俱燒存性為末

空心醋點湯調下三錢○一秘方用綿花子以銅鍋炒黑為

末黃酒調下二三錢三兩次即止并治崩漏小產血不止

棕灰散

百二十

方在和陣二一五

治大腸血及崩漏失血

栢葉散

一一二

治元氣虛弱崩中漏血年久不愈亦治白帶

栢葉

炒

當歸

生地

續斷

川芎

龜甲 炙

禹餘糧 各一兩半 阿膠 炒五錢

鱉甲 炙 兩半

赤石脂 煨

牡蠣 煨

地榆

艾葉 炒

鹿茸 炙各五錢

右為末每服二錢粥飲調下

子苓散 一一二二

一名黃苓散 ○治壯熱崩中下血是陽乘陰

分故經血泛溢宜清其北方

條黃苓 不拘多少為細末

右燒秤鑊 燂酒食前調下三四錢 ○一方有乾薑白芷 ○一

方以木耳黃苓等分為丸俱效

良方 防風黃芩丸 一二三

治肝經風熱以致血崩便血尿血等

證

條芩 炒黑 防風 等分

右為末酒糊丸桐子大每服三五十九食遠或食前米飲或

溫酒送下

劫勞湯 一二四

治勞嗽發熱盜汗體瘦唾中有血或成肺痿

○此救本也非劫勞也能用此者庶可望生此外恐非佳劑

矣

白芍藥 炒一錢

人參

黃芩 炒

當歸

婦人

熟地

甘草

白茯苓

五味子

件炒

阿膠

炒

半夏

制各五分 此上乃其原方 似有不見用者仍宜加倍

右薑棗水煎日三服○癯人楊元鼎女及筭病此甚危百藥

無效偶遇名醫得此方服三十餘劑遂愈不發

集驗

歸神湯

二五

治婦人夢交盜汗心神恍惚四肢乏力飲

食少進

人參

白朮

白茯苓

歸身

各一錢

棗仁

陳皮

各八分 圓眼肉 七枚

甘草

羚羊角

琥珀

末各五分

右羚羊琥珀二味不前餘藥煎熟去粗入二末和勻食前服

白芷散 一 二 六  
治下元虛弱赤白帶下或經行不止等證

白芷 一兩  
海螵蛸 一枚燒  
胎髮 一團煨

右為末每服一錢溫酒調下

藏海 白芍藥散 一 二 七  
治婦人赤白帶下臍腹疼痛如神

白芍 二兩炒  
乾薑 半兩炒

右為細末每服三錢空心溫米湯調下晚又進一服十日見

效

克應丸 一 二 八  
治婦人赤白帶下

熟地

赤芍

各二兩

當歸

二兩

赤石脂

煨醋

龍骨

牡蠣

煨酒燉

茯苓

丹皮

艾葉

製

川芎

各一兩

右為末醋糊丸桐子大每服五十九空心白湯送下

良方滑石散 一二九

治熱淋

滑石

五分研

通草

車前子

葵子

各四分

右為末以漿水調服

芍藥散

百三十

治婦人血滯腰脇痛

白芍藥

玄胡

炒

肉桂

各一兩

香附米

二兩醋一升鹽半兩



同煮

乾

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

良方 通氣散 一三一

治腎虛腰痛神效

破故紙

酒炒為末

右每服二錢先嚼胡桃肉半箇空心以溫酒送下

四製香附丸 一三二

調經養血順氣受孕

香附米

一斤分四制酒醋童便米泔各浸一宿曬乾用

當歸

酒洗

熟地

酒洗

白芍藥

四兩

川芎

各四兩

澤蘭葉

白朮

陳皮

各三兩

黃蘗

酒炒

甘草

酒炒各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸空心白湯送下

大  
典  
女金丹 一三三

此韓飛霞方也一各不換金丹○內加熟

地黃一兩卽名勝金丹○治婦人久虛無子及產前產後一切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦人子宮寒冷無孕如服月餘男女自至又治半身不遂帶濁血崩及產後腹痛可逆子死腹中氣滿煩悶臍腹作痛月水不通中風口噤痢疾消渴敗血上衝頭疼寒熱血運血泄見鬼迷悶產後傷寒虛煩勞瘦儿婦人諸疾不問久近並宜服之兼治男子下虛無力等證

人參

白朮 炒

茯苓

炙甘草

當歸

川芎

白芍

白薇 酒洗

丹皮

白芷

藁本

肉桂

玄胡

沒藥 另研

赤石脂 另研上  
各一兩

香附 醋浸三日炒  
香十五兩

右共十六味為末煉蜜丸彈子大以磁瓶收貯封固每服一  
丸空心溫酒化下食乾物壓之服至四十九丸為一劑以癸  
水調平受妊為度妊中三五日服一丸產後二三日服一丸

醋湯下亦妙

古方 婦人

三

琥珀丸 一三四

治婦人或老或少或產前產後百病及療三

十六種諸病七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風

十二痺手足瘦疼乳中結核結毒懷胎驚動傷犯不安死胎

不下並治

琥珀

硃砂

各另研

沉香

阿膠

炒珠

附子

制

川芎

肉桂

五味子

石斛

各五錢

牛膝

酒浸

當歸

肉蓯蓉

酒洗晒

人參

熟地

續斷

木香

沒藥

各一兩

一方有牛黃 珍珠 乳香 玄胡 各一兩共二十一

右煉蜜為丸彈子大每服一丸空心食前午後溫酒化開服

○凡服法或薑湯或米湯或酒或燈草湯或隨證用引皆可

下○若傷寒中風角弓反張用麻黃湯隨證改湯引送下○

孕婦臨月宜一日一服至產順利不覺疼痛○凡婦人服至

五服十服之後日倍飲食其功言不盡述服者當自覺也

延年益嗣丹 一三五 滋補元氣益精黑髮○按此方即還元

丹也但製法分兩不同宜參酌用之方在補陣一三九

人參 天門冬 酒浸 去心 麥門冬 同上各 熟地黃 酒蒸 搗

婦人

生地黄 各二兩 白茯苓 酒浸 晒乾 地骨皮 酒浸 各五兩 何首烏 鮮者 半斤

右將何首烏去皮切片如乾者用米泔水浸軟拈切外用砂

鍋入黑羊肉一斤黑豆三合量着水上用甑算算上放首烏

煮而蒸之以肉爛為度鍋蓋須蜜勿令洩氣取起晒乾為末

煉蜜丸梧子大每服七八十丸空心溫酒送下

續嗣降生丹 一三六 治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕

○并治男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄婦人帶下寒熱

諸虛百損盜汗短氣無不感應○此方乃溫隱居求嗣保生

篇所載云東京焦員外三世無嫡嗣後遇一神僧問其故曰

無嗣者有三一祖宗無德自身無行二夫妻年命恐犯禁忌  
三精神不守妻妾血寒焦公曰治之有道乎僧曰先修德後  
修身三年之後到臺山令行童賜以方葯名續嗣降生丹依  
方服之後不及二十年子孫數人皆貴顯○此方無怪誕尅  
伐之品且溫且固凡血海虛寒者服之必佳但溫力有餘補  
力不足倘益以人參白朮熟地川芎炙甘草各一兩則八珍  
全而溫補養育之功當非淺也因命名曰加味續嗣降生丹

當歸 酒洗

杜仲 酒炒

茯神

益智仁

龍骨 煨

桂心

吳茱萸 制

乾薑 半生半熟

川椒 去目

台烏藥 各一兩

白芍藥 酒炒

川牛膝 酒浸

半夏 制

防風

秦艽

石菖蒲 去毛

北細辛

桔梗 各五錢

附子 一枚重一兩者臍下作一竅入朱砂一錢麩裹煨熟

取出朱砂留為衣

牡蠣 大片者以童便浸四十九日每五日一換取出用硫黃一兩為末酒和塗徧用皮紙糊實米醋浸濕外以鹽泥厚固之候乾用炭五斤煨過為末每料止用二兩餘可收貯再用

右為末以酒煮糯米糊為丸梧子大以前朱砂為衣每服三

五十九漸至七八十九空心滾白湯或鹽湯溫酒下

河車種玉丸

紫河車 一具

只要母氣壯盛厚大新鮮者但去胞內瘀



血不必挑去鮮紅血脉以米泔水洗淨用布絞乾石臼  
內生杵如糊用山藥末四五兩收乾捻為薄餅八九個  
於砂鍋內焙乾以香如肉脯為妙

大熟地 酒洗烘 枸杞 烘乾

白茯苓 人乳拌 歸身 酒洗

人參

兔絲子 制

阿膠 炒珠各 丹皮 酒洗

白薇 酒洗各

沉香 一兩

桂心

山茱萸

香附米 用酒醋水三件各半碗浸

大川芎 酒浸切片

右煉蜜和九桐子大每服百餘丸空心或酒或白湯鹽湯任

下○如帶濁多者加赤白石脂各二兩須以清米泔飛過用

○服藥後忌生蘿卜生藕葱蒜綠豆粉之類

八珍益母丸 一三八

治血氣兩虛脾胃並弱飲食少思四肢

無力月經不調或腰痠腹脹或斷或續赤白帶下身作寒熱  
罔不獲效服一月之後即可受胎虛甚者用藥一觔必能受

子

人參

白朮

土炒

茯苓

川芎

各一兩

當歸

酒洗

熟地

酒洗各二兩

炙甘草

五錢

芍藥

醋炒一兩

益母草

四兩五六月採取止用上半截帶葉者不見鐵器晒碎為末

右為末煉蜜丸彈子大空心蜜湯或酒下一丸或為小丸亦

可○脾胃虛寒多滯者加砂仁一兩薑汁炒○腹中脹悶者  
加山查肉一兩飯上蒸熟○多鬱者加香附一兩酒製○此  
徐思鶴醫統方又一方名八珍益母十全丸於前方內用益  
母草八兩外加沉香四錢○思鶴曰資益坤元補養氣血除  
淋帶壯形體胎前和氣產後補虛真婦人之聖劑超古今之  
神方有室家者不可不知也予嘔斯世之醫惟集古方香附  
勝金丹爲女人開鬱調經之要藥殊不審古今虛實之異古  
人氣實故可用香附開導香附味辛性燥但能開破而已多  
用之大耗氣血虛者愈虛病者愈甚而於滋補何有哉今世

十婦九虛非補不可再用香附以耗之寢成怯弱之證是辨  
之不早則危殆而難痊矣○婦人經脈不調或氣血兩虛而  
身體素弱者宜服此以調養之○經不通者服一料卽通不  
調者一月卽調○素不孕者服一月卽孕○胎前間用一服  
則胎固而安○產後用一服以童便酒化開調下則無壅滯  
血運之候○多服之補虛活血凡治產後諸病極穩○若急  
欲取效以酒調化服

烏雞丸 一三九

治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下

骨蒸不能成胎等疾

烏骨白毛公雞一隻重二斤半許者閉殺之去毛襟外用

艾葉四兩青蒿四兩切碎納一半在雞肚內以小酒壩

一個入雞井所剩蒿艾用童便和水灌令沒雞二寸許

煮絕乾取出去骨餘俱同搗如薄餅焙乾為細末聽用

南香附去毛淨一斤分四分用米泔童便酒醋各浸一分春秋

一二日夏一日冬四日取出晒乾畧炒

人參未似淨熟地當歸酒浸洗生地

川芎各二兩白芍黃芪白朮

川牛膝柴胡知母丹皮各二兩

婦人

鱉甲 醋浸炙 白茯苓 三兩 秦艽 一兩半 黃連 炒

地骨皮 貝母 玄胡索 乾薑 炮焦各一兩

右俱為末用酒醋各半煮糊為丸桐子大每服五六十丸漸加至百丸溫酒米飲任下急煎炒辛辣等物及莧菜

又烏雞丸 百四十

熟地 當歸 白朮 山藥

山茱萸 棗肉 柿餅 蓮肉 各四兩

黃芪 蜜炙三兩 鹿角膠 狗脊 杞子

枸杞 蓮鬚 香附 阿膠

川芎 各二兩  
烏藥 一兩半

右藥製淨用烏骨雞一隻悶殺之乾去毛去雜連骨椎碎用酒醋各半同藥煮熟去骨烘乾共為末即將餘汗少入麩打糊為丸任意用引送下

唐氏 烏雞丸 一四一

人參

懷生

懷熟

青蒿子

去梗

香附

四制

鱉甲

各三兩

白木

棗仁肉

枸杞

麥冬

雲苓

地骨皮

去骨

丹皮

去骨

白芍

各二兩

歸身

二兩半

川芎

甘草 各一兩

右先將諸藥備完聽用乃取絲毛烏骨白公雞一隻約重一斤許者撲倒去毛穢頭足腸雜不用將雞切作四塊先以鷺甲鋪銅鍋底次入雜葯以免焦腐漸漸加童便約至斗許煮至極爛撈起晒乾為末將鷺甲去裙并雞骨俱以原汁醮炙至乾為末同前藥煉蜜為丸桐子大每空心用清湯送下百

餘丸

秘方 烏雞煎丸 一四二

治婦人百病血氣虛勞赤白帶下

人參

官桂

地骨皮

各二兩

茯苓

二兩



黃芪 蜜炙

當歸 各六兩

生地

熟地

香附 各四兩

右將烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃芪末和炒麩

丸如芡實喂雞二七日將雞縛死乾擗去毛并腸雜令淨槌

碎其骨入前葯於腹內縫密用酒醋各一瓶煮一宿取去骨

焙乾為末用前汁打麩糊丸桐子大每服五六十丸空心鹽

湯下

萬病丸 一四三

治月經瘀閉臍腹作痛及產後癥瘕等病

乾漆 炒烟出青

白為度 牛膝 酒洗焙各一兩

右爲末生地黃汁一升用砂鍋慢火熬膏九桐子大每服二

十九空心米飲下

以下通用方

四君子湯 一四四

方在補陣 一七六

治脾肺氣虛諸證

六君子湯 一四五

方在補陣 五

治脾胃虛弱嘔吐吞酸等證

五味異功散 一四六

方在補陣 四

治脾胃虛寒飲食少 四 證

補中益氣湯 一四七

方在補陣三一

治勞倦傷脾外感不解寒熱瘧痢氣虛不能補血等證

四物湯 一四八

方在補陣八

治一切血虛勞弱之病

八珍湯 一四九

方在補陣十九

治氣血兩虛調和陰陽

十全大補湯 百五十

方在補陣二十

治氣血俱虛補救元陽

歸脾湯 一五一

方在補陣三三

治心脾虛損

人參理中湯 一五二

溫中補脾胃虛寒諸證

逍遙散 一五三 方在補陣九三

治肝脾血虛鬱怒傷肝等證

加味逍遙散 一五四 方在補陣九四

治肝脾血虛發熱等證

七味白朮散 一五五 方在小兒七

治虛熱作渴

六味地黃丸 一五六

方在補陣一二二

壯水制火之劑

八味地黃丸 一五七

方在補陣一三三

治命門火衰之劑

薛氏四神丸 一五八

方在熱陣一五二

治脾腎虛寒泄痢

五積散 一五九

方在散陣三九

治感冒寒邪

參蘇飲 百六十

方在散陣三四

婦人

異

治四時傷寒感冒

人參敗毒散 一六一

方在散陣三六

治四時傷寒瘟疫

當歸六黃湯 一六二

方在寒陣六五

治血熱陰虛盜汗

柴胡清肝散 一六三

方在寒陣五九

治肝膽風熱瘡瘍怒火寒熱

梔子清肝散 一六四

方在寒陣六十

治肝膽三焦風熱

八平散 一六五

方在寒陣百十五

治藏府秘結小便赤澀

五苓散 一六六

方在和陣一八二

治小便利

犀角地黄湯 一六七

方在寒陣七九

治心火動血及斑黃瘡疹

導赤散 一六八

方在寒陣一二三

治心火及小腸熱秘淋瀝

桃仁承氣湯 一六九

方在攻陣五

治瘀血小腹痛其人如狂

玉燭散 百七十

方在攻陣一四

治血虛有滯經閉不通

腎著湯 一七一

方在熱陣百三十一

治腎虛身重腰冷

舒筋湯 一七二

方在和陣七七

治產後血滯作痛

交加散 一七三

方在和陣二五二

治產後口吐涎沫不省人事



加味小柴胡湯 一七四

方在散陣二十

治乳母肝火發熱

良方 蜜酥煎 一七五

方在補陣六六

補虛潤肺止咳嗽

柴胡名膏湯 方在散陣二三

治小陽陽明外感挾火發熱頭痛

都梁丸 一七七

方在散陣七七

治胎前產後傷風頭痛

瓜子仁湯 一七八

方在外科一六四

治產後瘀血腸癰腹中疔痛

子和通經散 一七九

方在攻陣四六

治氣逆經閉

二神散 百八十

方在寒陣八七

治吐血血崩下血

小薊飲子

方在寒陣百一

治下焦結熱溲血崩淋

海愈風湯

方在和陣二七

治一切失血及產後搐搦

鎖精丸 一八三

方在固陣二六

治白濁白帶

青娥丸 一八四

方在補陣一四五

治腎虛腰痛

獨參湯 一八五

方在補陣三六

治諸氣虛脫

奪命散 一八六

方在補陣三七

治陽邪傷氣暴脫煩燥發渴

全書卷六十一終