

醫門秘旨

庫文閣内			
函	三六五		漢
架	六六五		書
	冊	號	類


内閣文庫	
番號	漢 12655
冊數	6 ( 4 )
函號	301 38







醫門秘旨目錄 七卷



虛門

自汗

盜汗 當歸六黃湯


諸虛

艾葉散

戴方

四物湯

十全大補湯



填膈散


戴先生論

脈法

補中益氣湯

四君子湯

地仙散



止汗散

東垣論

卻續

丹溪論

四君子湯

地仙散



清熱湯

補肺丸

六味地黃丸

人參固本丸

八寶至靈丹

鹿角霜丸

大造丸

坎離丸

夢迂

水陸二仙丹

固精丸

清心蓮子飲

神芩湯

鄙續

肺癰

脈法

又方

鄙續

痿肺

內經辯

原病式論

惡心

惡心辯別論

加味二陳湯

嘔吐

脈法

丹溪論

廣考論

霍亂

脈法

丹溪論并方

六和湯

加減藿香正氣散

鄙續

閉格

雜經說

祖傳經驗秘方

鄙續

小便不通

治法

淋閉

草薢分清飲

固本丸

鄙續

閉結

蜜道法

潤腸丸

鄙續



氣門

鬱

開鬱湯

諸鬱論

越鞠丸

呢

止呢方

清痰降氣湯

加減蘇子降氣湯

木香檳榔丸

膈

脈法

治膈方

自論

治膈腫方

治梅核膈腫

砂粉丸

治膈食方

又秘方

五膈十腫方

又方

鄙續

翻胃

脈去

翻胃大約論

丹溪辯

自論

種花散

霞天膏用法

嘈雜

丹溪論方

八寶安胃湯

越鞠二陳湯

清胃化痰丸

積塊

脈法

原病式說

大七氣湯

阿魏丸

治痞方

神力独蒜飲

鄙續

卷之八

諸頭疼

脈法

丹溪辯

清空膏

川芎茶調散

選奇方



清止芳芷飲

眼目

蕤仁散

神仙八宝丹

眼藥方

流氣飲

三花五子丸

眼膏方

洗眼明目方

耳病

鄙續

東垣說

洗肝散

婦龍湯

桑葉湯

五胆羊肝丸

千金膏

菊花散

王節齋論

四宝膏

爛眩風眼方

洗眼方

四物龙胆湯

还睛丸

冬青膏

膏子藥

開竅飲

鄙續

鼻病

丹溪辯

鄙續

王節齋論

憨仙治法

飛霞方

辛荑散



整門秘旨卷之七

虛門

自汗

脉經云汗脉浮虛或濡或濡軟散洪大渴飲無餘

止汗散 治自汗之聖藥

知母忌鉄石膏去毛人參去芦地骨皮洗

甘草 葶藶 茯苓去皮 麻黄根

赤芍各月半 杏仁去皮尖炒 五苓

右為末每服壹尔浮麥煎湯調服

當歸六黄湯 治盜汗自汗如神



黃連抄六分黃芩抄七分黃柏抄八分黃芪二分

生地酒洗熟地

右吹咀用水一鐘半煎八分食近熟服

盜汗

戴曰盜汗者謂睡而汗出也不眠則不能汗出方睡  
熟也腠腠然出焉竟則止而不復出也非若自汗而  
自出也雜病盜汗責其陽虛與傷寒盜汗非比之亦  
是心虛所致且斂心氣益腎水使休伏調和水火并  
降其汗自止也○盜汗屬血虛○陰虛小兒不須治  
必須忌生姜

東垣方用當歸六黃湯甚効但藥性寒人虛者只有  
黃芪六一湯抄○盜汗發熱休虛用四物湯加黃柏  
兼氣加入參黃芪白朮

艾葉散 專治心孔一片有汗思慮多則汗亦多

病在心宜養心血

艾葉煎湯調茯苓末壹錢服之極効

填睛散

用五倍子為末以唾調填睛上絹帛縛定極効

卸續

氣虛自汗 睽理疎瀉瀆上然出之無時有脈軟弱



或濡而無力○濕甚生汗者肥白多濕上熱病者有  
此也脉沉而濡○痰病生汗者內有痰涎脉下沉滑  
阳明胃熱則多汗火氣上蒸胃中之濕亦汗也  
盜汗屬陰血不足故睡中出汗醒時即止脉數而  
無力○脉虛出汗有相火病症者是也○當心部一  
塊出者為心液尤甚乃思慮過度而成者也○自汗  
者黃芪人參之類○盜汗者知母黃柏玄參之屬○  
小兒久汗頸上如兩者不治

諸虛

脉經云平人脉大為虛浮大裡虛虛弱細微者盜汗

大而無力陽虛數而無力陰虛寸弱而軟上虛尺弱  
滑而濡下虛尺滑瀉疾血虛兩關沉細為虛脉弱骨  
肉相失声散嘔血臥事不禁晝涼夜燒者死

丹溪云脉虛發熱難治戴日脉數而無力為脉虛也  
四物湯加炒梔子黃柏黃芩敗龜板蒸氣虛加入參  
黃芪白朮○四物加黃柏是降火補阴之藥甚者必  
加龜板喫酒發熱堆治不飲酒入因酒發熱亦堆治  
酒發熱用青黛瓜蒌仁每日同養汁數匙入口中三  
日而愈○陽虛發熱者補中益氣湯○手足心熱鬱  
火火鬱傷寒寒熱常用表散○發熱柴胡惡寒蒼朮



若虛人用蒼朮忍燥若發熱惡風人壯氣實者宜先  
表散發熱惡風寒亦宜解表

補中益氣湯 治陽虛發熱久患虛癆

黃芪 蜜炙二斤 升麻 五分 人參 去芦一斤 白朮 七斤半

當歸 酒浸一斤 甘草 五分 柴胡 去芦五分 陳皮 七分半

每服一兩水鍾半煎八分食遠溫服

四君子湯

人參 去芦半斤 白朮 土炒 茯苓 去皮各一斤 甘草 五分

水煎服如有汗小水利者去茯苓加黃芪二斤

若無汗小便不利者依本方補氣藥也

四物湯 治血虛之症

當歸 酒洗 川芎 白芍 各一斤 熟地 酒洗 二斤

水鍾半煎八分食遠服 如春倍加川芎

夏倍加芍藥 秋倍加地黃 冬倍加當歸

十全大補湯 治氣血俱虛而夾寒暑者

人參 去芦 當歸 酒洗 甘草 白芍 煨 川芎

白朮 去皮 熟地 酒洗 白朮 黃芪 等分 肉桂 少許

水鍾半姜三片棗二枚煎八分食遠溫服

地仙散 薄荷 防風 去芦 地骨皮 各二斤半

耳草 稍炙一斤 烏梅肉 七分半



右五味用水煎三次午後頓服凡年四十以下患  
勞怯不宜補藥只先退潮熱調理可愈此方退熱  
如神方外有接天梯之術先用此藥

清熱湯 治癆病骨蒸潮熱

北柴胡 前胡 各去芦三斤

用水一鍾半煎八分瀝去滓仍入礮內加童便三

小杯酒一盃猪胆一箇猪脊髓一條入礮內非

菜根洗去土連鬚七根再煎一二沸

補陰丸

黃柏半斤洗去粗皮 熟地酒洗 知母酒浸去毛皮 白芍煨

知母酒浸毛煨

陳皮

當歸酒浸各三斤

敗龜板酒炙

鎖陽

虎胫骨酒洗各七斤

右為末羊肉為丸如梧子大每服五十九粒湯

送下冬加姜半兩

六味地黃丸

山藥去粗皮

山茱萸各四斤 澤瀉二斤

熟地酒洗八斤

牡丹皮去骨

白茯苓去皮各三斤

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九粒湯下

人參固本丸

天麥門各五斤

生熟地各酒洗 人參去芦等分



右為末煉蜜丸如梧子大每服五六十九空心  
淡鹽湯送下

八寶至靈丹

何首烏赤白二斤酒浸竹月切去皮同牛膝蒸

川牛膝半斤去芦用黑豆三升同何首烏蒸取出共搗成泥

赤茯苓 去粗皮乙斤用牛乳五升煮乾乳為度為末

白茯苓 去皮乙斤用人乳五升煮乾銀器煮切作菓子塊

兔絲子 半斤用酒浸洗搗成泥晒乾為極細末听用

川當歸 全用去土泥四日用無灰酒浸洗晒乾為末

破故紙 半斤炒香為度 枸杞子 酒洗焙乾為末俱忌鐵器

右為末煉蜜丸如芡實大每服壹丸日進三服空  
心溫酒午後姜湯臨睡淡鹽湯送下服至三五月  
後必有異効也

鹿角霜丸

黃柏 半斤去粗皮用人乳拌勻晒乾如此三次炒褐色或六日七日隨時加減

人參 去芦 天麥門 去心 生熟地 酒洗各二日 鹿角霜 八月

右為末煉蜜丸如梧子大每服六七十丸加至百

丸空心淡鹽湯送下或酒亦可

大造丸

紫河車一具川黃柏 酒炒月半 杜仲酥炒斷系日半



敗龜板 酒炙二日 牡蛎 煨 人參 去芦 各二升

當歸身 酒洗二兩 牛膝 去芦 酒洗 天麥門 去心 各一升 二升

生地黄 二兩五升用砂仁六分茯苓二升无灰酒煮至地黄心黑為度

右為末 煉蜜丸如梧子大 每服七八十丸 空心

淡鹽湯送下 夏月加五味子七升

坎離丸 治上盛下虛 休虛火動 此藥早間晚間

服之最能滋陰降火

肥知母 去皮毛二日 酒鹽各炒一日 褐色忌鐵器 川黃柏 去粗皮二日 蜜炙火

右為末 用山藥細末打糊丸如梧子大 辰砂水

飛過細末五錢為衣 每服五六十丸 臨卧蓮子

湯送下 若阴虛火動 加地黄二兩 用茯苓二兩

砂仁六分 酒煮去苓 砂將黃和為丸

夢行

水陸二仙丹 治行精白濁

金櫻子 去毛去子 槌成膏 煮如蜜 芡實 去壳晒乾 等分 研成末

將金櫻膏和芡實末 丸如梧子大 每空心流白

湯送下 七八十丸 加秋石為引 佳若加蓮莢

石蓮肉 等分 名思仙丹 尤効

固精丸 治心神不定 神虛包行

知母 忌鉄 黃柏 炒各二兩 茯苓 去皮 遠志 各去心



牡蛎煨 龙骨煨 芡實 蓮莢各七斤

一方有茱萸肉三斤共為末山藥糊丸如梧子火  
硃砂為衣每服五六十丸空心淡鹽湯送下

清心蓮子飲 治心熱夢遺赤白虛熱淋症

人參去芦 黃芪 石蓮子去殼 麥門冬去心 地骨皮

甘草 白茯苓去皮 車前子 黃芩炒各等分

水鍾半姜三片煎八分入遠熱服

神芎湯 治久迂腎氣下陷玉門不與不時漏精

此藥并提腎水歸源

升麻 川芎 人參去芦 枸杞 甘草

遠志 黃芪 杜仲酥炒斷 白朮 當歸身

地骨皮 破故紙時分

用水二鍾家蓮子七個煎服如無家蓮子入蓮

花鬚亦可

鄙續

夢迂者夜夢與入交而泄精是也 精滑者自迂不  
知皆相火所為也熱則流通虛則下溜又有濕熱濕  
痰為病當審詳之

肺癰

脉經云寸數而實肺癰已成寸緩虛瀉肺痿之形肺



癰色白脉巨短濇死者浮大不白而赤  
又方

蓮翹 去心

梔子 炒各

茅根 洗去土

片苓 炒八分

金銀花

苦參

紅棗 各一

先以此洗之後用

白芨 石

生地

忌鐵器

川歸 各酒洗

桔梗

甘草 為佐使

以補之

### 鄙續

先以茅根洗肺之葉繼以白芨補肺之劑調之安矣

### 肺痿

內經曰肺熱葉焦五臟因而得之蒸為痿乃心氣熱  
生肺痿骨痿手足不任身然治痿獨取陽明者五臟

六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也云故

陽明虛則宗筋緩滯不引故足痿不用也

原病式云痿屬肺經其肺主氣氣病其氣曠鬱於手

是痿弱不收特由肺經本燥則血滯衰少不能榮養

百骸故也

### 惡心

惡心有痰有熱皆用生薑隨症佐藥 惡心者無声

無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經

之病皆在胃口上宜用生姜開胃豁痰也

加味二陳湯



半夏 揚泥 陳皮 去白茯苓 去皮 芩連炒各壹分 羊  
藿香 一分 甘草 三分 山梔仁 炒七分

用水一鍾 羊姜三片 煎八分 煎服

嘔吐

脉經云浮而洪為氣浮而匿為積沉而遲為寒大阳  
脉浮胃虛匿而不食恐怖者難治寬緩者生

諸嘔吐酸皆屬於肝火

又云滑數為嘔代者霍亂微滑者生濡數凶斷

丹溪曰有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦胃中

有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子黃連生姜有久病

嘔者胃虛不納谷也用人參生薑黃芪白朮香附類

嘔吐殊奉議以半夏陳皮生姜為主

河澗謂嘔火氣火炎上此特一端耳○有痰隔中焦

食不得下者有痰逆者有寒氣鬱於胃中者也有濕

滯心肺之分而新食不得下而反出者有胃中有火

與痰而嘔者○嘔吐之症用藥忌瓜薑杏仁菀仁蔓

藟子梔子皆惡吐丸葉帶香行散不妨諸般大吐渴

飲水者即死童便飲之最妙

廣考云三因方言嘔吐症忌用利藥此言其常然大

小腸膀胱熱結而不通上作嘔吐隔食若不用利藥



開通發泄則嘔吐何由而止或只嘔吐大小便不閉  
瀉者此利藥又當所忌也

### 鄙續

得食即嘔胃火也食久則吐脉通胃寒也不能納食  
脉微而吐胃虛也宿食不化新穀不消食鬱也痰氣  
壅滯食不下作嘔痰氣也○血病者有物無声謂之  
吐氣病者無物有声謂之噦血氣俱病者有物有声  
謂之嘔吐胃中有熱而作惡心嘔酸內有熱脉浮大  
而滑數煩渴是也胃中有寒氣作惡心清水不渴脉  
遲或知受寒或食寒物而作者是也

### 霍亂

脉經云滑數為嘔代者霍亂微滑者生瀉數凶斷又  
曰滑而不勻必是吐泄霍亂之候脉代勿訝  
丹溪云內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯  
加枳作吐以提起氣此非鬼神皆屬飲食前人確論  
乃陽不升陰不降乖隔而成切莫與穀食雖米飲一  
呷入口即死必待吐瀉過三二時直至飢甚方可與  
粥食之脉多伏欲絕見成吐瀉不徹还用吐提其氣  
或用樟木煎湯吐之亦可大法生姜理中湯最好不  
渴者可用如渴者用五苓散有吐者用二陳湯探吐



亦可下者轉劔不住男子以手挽其陰女子以手撐其乳近兩邊千金妙法也轉筋皆屬於肝熱四物湯加黃芩紅花蒼朮南星煎服○乾霍亂者最難治死在須臾升降不通當宜吐提其氣極是良法吐者則鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所過有用吐者則兼發散之意有用溫藥解散不可用涼藥宜用二陳湯加解散藥最妙

六和湯 治霍亂極効

杏仁去皮尖半夏湯洗砂仁 茯苓去皮霍香

扁豆 人參去芦木瓜各不甘草三分 香薷

厚朴 姜棗

水鍾半煎八分食遠溫服

加減藿香正氣散

治霍亂轉筋泄瀉及時令不正之疾

藿香君 半夏臣 陳皮君 紫蘇臣 大腹皮

茯苓臣 香附臣 桔梗佐 蒼朮佐 厚朴佐

白芷使 甘草使

水鍾半姜三片棗二枚煎八分食遠熱服

如飲食所傷而致加神麩山查麥芽各君

如因於暑加黃連臣 香薷君



如因於寒倍加紫蘇乾葛

鄙續

霍亂之疾切不可米飲服之惟藿香正氣散斟酌加減有勁轉筋之疾唐按院公云挽阴樟乳之法不效惟忽然立起即止此百發百中也

閉格

雜經曰閉則不得小便格則吐逆素問云謂人迎大四倍於氣口名曰格氣口大四倍於人迎名曰閉乃二症也蓋有格而不閉者亦有閉而不格者又或有人迎氣口俱盛而吐逆不便者曰閉格丹溪則總結

祖傳經驗秘方

治閉格吐逆小便不通用藿香平胃散合五苓散加姜枣煎服効

鄙續

閉則無出之由格則無入之理每忌下予昔用霹靂壑尊法屢醫教人皆効蓋閉甚者當通耳亘詳審之小便不通

治法小便不通諸藥無効或轉脛至死者用猪尿胞一個傾出尿用鷲毛筒去頸尾插入竅內將線縛定以口吹氣令滿胞仍將管口放在小便上竅手搓其



氣透裡小便即出  
又法以猪胆連汗籠住小便少頃汗入自通  
孕婦小便閉是胎壓膀胱用有力之人將婦倒提以  
足朝天一二次即愈或溫水浴之亦通  
又方將鹽填臍上用艾灸內熱即通

草薺分清飲

治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度旋  
面如油光彩不定漩脚渣下凝結如膏糊狀者  
石菖蒲 益智仁 川草薺 白花 烏藥 各二斤

耳草稍五分 水鍾羊八盞一錢煎八分空心服

固水丸 治淋濁

蓮蕊 黃連 茯苓 益智  
半夏 制 黃柏 甘草 猪苓

右末米糊為丸每服五十空心溫酒送下

翻續

小便不禁白者為氣虛之症氣虛不禁右尺脉大是  
尺脉洪大小便黃赤無痰此多實熱不禁不痛為溺  
血痛者血淋也熱淋者痛甚乃熱之故也砂石淋者  
乃砂石形狀也勞淋謂虛故也○氣血不能施化以



致小便不通痰氣閉塞於下焦亦令小便閉結也

閉結

蜜導法凡諸閉結不通或煎他症又或老弱虛急不可用藥用蜜入皂角末少許同煎至蜜老棄熱捻如枣子大以紙筒為骨納入谷道中良久即通

又法猪胆一大個入醋少許用竹管插入胆竅內扎定以筒入谷道半寸用手擠汁入透即通

潤腸丸

能潤血燥大便不通

當歸

酒洗

桃仁

去皮尖

枳壳

去穰

生地

酒洗 火麻仁

厚朴

六分

条芩

炒一月

大黃

煨一

右未煉蜜丸如梧子大每服五六十丸空心滾

白湯送下

鄙續

血虛者脉數而無力以致大腸枯燥而閉胃強脾弱者亦無血虛老年之人多有之有火者面赤脉數其閉結者當下脉數而無力虛勞逆痛不堪此乃氣虛作閉有風有溫有寒者便宜詳審分而治之其候多面黃也

氣門

鬱



氣血平和百病不生一有拂鬱諸病生焉經云木鬱  
達之謂吐之令條達也火鬱發之謂汗之令疎散也  
土鬱奪之謂下之令無壅滯也金鬱泄之謂滲泄解  
表利小便也水鬱折之謂抑之制其冲逆也此治鬱  
大法惟諸火所屬不同故曰當看何經矣

越鞠丸

解諸鬱神効

香附制

蒼水制

神麩炒

川芎

梔子

炒

右末水丸如菜豆大每服五十九滾白湯下

開鬱湯

蒼朮

米泔浸洗

蘇葉

陳皮

白

枳殼

麩炒各八分

枳朮

六分

甘草

三分

厚朴

姜汁拌炒

半夏

麩炒各七分

香附制

桔梗

去芦五分

水鍾半姜三片煎八分食遠熱服

節續

氣鬱者脇痛脉沉濇者是也濕鬱者周身走痛或閉  
節痛遇冰寒則發脉多沉細也火熱鬱目瞽小便赤  
骨髓中熱肌膚熱捫之烙手沉數是也痰鬱動則喘  
脉沉滑是也血鬱四肢無力有便紅脉沉是也食鬱  
噯氣暖飽惡食不能食氣口脉甚是也諸鬱藥春加  
防風夏加苦參秋冬加吳茱萸蒼朮撫芎總解諸鬱



開鬱順氣之藥不可少也

呢

止呢方屢驗

香附君

陳皮君

茯苓君

甘草使

枳實君

桔梗臣

黃連臣

紫蘇君

梔子君

半夏臣

水鍾半柿蒂九枚姜汁二匙煎八分食遠熱服

清痰降氣湯

治胃脘疼不止俗名心痛神効

陳皮君

藿香君

梔子君

甘草使

茯苓臣

厚朴臣

半夏臣

枳壳臣

蘓梗臣

香附臣

蒼朮臣

撫芎使

桔梗臣

水一鍾半姜汁二匙煎八分食遠熱服

加減蘇子降氣湯

蘇子臣

厚朴臣

前胡臣

甘草使

當歸臣

肉桂臣

陳皮君

半夏臣

香附君

米臣

水鍾半姜三片棗一枚煎八分食遠溫服

木香枳榔丸

降氣寬胸

木香臣

黃柏炒

大黃煨

青皮炒

陳皮臣

枳榔

黃連炒

葶木煨

枳壳炒

牽牛末

香附制共為末以水為丸量虛實服之



疝疔

脉经云沉按而無力或大弱為氣虛數而無力或濡  
小為血虛數而有力為熱寸關沉或伏或大而滑數  
是痰寸關脉沉而濡或尺微濡翻胃若緊濡者難治

治疝方

卓用藍靛白湯化下數次効用藥之時必要入藍靛  
或青黛亦効絳州一僧病噎不下食臨危囑徒吾胞  
中有何物當視之歿後徒知其言遂開視胞中得一  
物形如魚而兩頭遍体有鱗置器中跳躍不止戲以  
味皆隨化尽時值夏中藍靛作靛有一僧以靛置器

中垂遂遠盤中走須臾化為水上方本此出東坡海  
歲五行記

按疝疔病本難治矧古方悉用香燥之劑不知香能  
散氣燥能耗血非徒無益適以害之然則方何貴於  
存乎苟謂丹溪補血益氣潤燥和胃等藥雖無成方  
而立論已至得心應手有不易之妙法在矣識者詳  
治疝疔方 此方昔大尹公三世得此疾一方士傳

此服之果痊刊施天下

用白雄雞一隻東流水喂三日又用若菜煨三日  
畢又用山中四足蛇三條與雞食尽以後又用倉



米食三日取雞拋下屎臥乾折為細末童人肥壯者一錢瘦弱者七分酒花散湯下如腹有毒虫遇藥滿腹滾痛若服兩以其虫必死後大便而出蛇用山中野地取者但人家屋內者不用蛇名蛇

治梅核膈腫

茅硝三斤 孩茶一斤 為極細末姜汁調服

砂粉丸 治膈腫

砂粉一斤 輕粉一斤 青黛一斤 木香少許 大黃量

右末煉蜜丸如梧子大每服二丸白湯送下

又方 治毒核喉中有痰

用四七湯加 枳實 枳殼炒 桔梗去芦

水鍾羊羔三片煎八分食遠熱服

治膈食方

天靈蓋燒存性再用午腰子尾焙乾俱為末等分

以米醋打糊丸如菜菔大每服二三十丸好酒

送下愈後忌醋如食又發

又秘方 治膈腫氣

水香三斤 礞砂一斤 威靈仙五斤 黑點 水良三斤

乳香一斤 礞砂一斤 五靈脂一斤 沒藥壹斤五分

天靈蓋即人腦項燒五斤



將鉛化開入水銀炒乾共前藥為末煉蜜凡如菜  
豈大每服三十丸燒酒送下

五膈十腫方

男用斗駝尿女用草駝尿一碗將独蒜一个搗爛  
以醋調服早服一次午服一次晚服三次服時必  
須塞住患者鼻孔恐惡心

又方

治膈腫有痰凝結不拘新久

駝尿不拘多少熬成膏子每服一匙蜜二匙姜汁  
四匙和勻急服良久或吐或泄痰片或帶痰血安

郵續

氣虛者右脉必緩而無力血虛者左脉必數而無力  
痰者寸關沉滑而大者是也氣滯結者寸關脉沉而  
濡是也胃中有火不能停食脉必數而有力也鬱傷  
脾胃而生痰痰與氣轉升而不降飲食不下氣滯於  
咽噎者也稿於上則噎水飲可行食物難入或可少  
食名之曰噎其稿在下而與胃相近食雖可入難進  
入胃良久則出名之曰膈又名反胃名雖不同病出  
血耗所致若大便如羊糞者大腸無血故也不治年  
高者不治氣血俱虛則口中多出沫沫大出者必死

翻胃



脉經云沉滑者吐逆小弱而滿者胃反又云寸緊赤  
滿者其人胞滿不能食而吐止為下之故不能食設  
言未止者此為胃反故尺微滿者是也

翻胃大約有四○血虛○氣虛○有熱○有痰為病  
必用童便韭汁竹瀝牛羊乳汁薑汁如氣虛入四君  
子湯右手脉無力血虛入四物湯左手脉無力切不  
可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味

治反胃用黃連三錢生姜汁浸炒山查肉二錢保和  
丸二錢同為末糊丸如麻子大胭脂為衣用人參湯  
竹瀝再煎一沸一服六十九有痰二陳湯為主寸關

脉沉或伏而大如有氣結宜開滯導氣之藥寸關沉  
而滿也有內虛脾火上炎而反胃者作附火治之  
年少者四物湯清胃腕血燥不潤便故滿格治餘論  
甚詳老年不能正治亦用參朮開防氣虛胃虛四君  
子加芦根童便或參苓白朮散或韭汁牛羊乳或入  
駝尿又有積血停於內而致者當消息逐之大便滿  
者治常食光肉則便利也翻胃即噦噎噦乃翻胃  
之漸年高者不治  
論曰噦噎翻胃之症因火成來有漸病源不一有因  
思慮過度而動脾火者有因忿怒而動肝火者有因



久食煎炒而生胃火者有因淫慾妄作而起腎火者皆火氣炎上薰蒸精液成痰初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得流利為膈為噎久則痰火已結胃脘不開飲食雖進停滯膈間頑史便出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良久方出名翻胃丹漢曰年高者不治蓋少年氣血未虛用藥劫去痰火病不復生老年氣血已虛不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也又云其苟方尤用香燥之藥豈合宜乎夫症屬熱燥故不宜用香燥之藥蓋香燥散氣耗血而滋味助火生痰也

余嘗聞霞天膏加於補虛藥中以治此症一人則吐瀉以出積血一人則吐瀉以去積痰俱獲病安反思食而後人俱不能節戒肥甘遂致病復殊不知此症挾虛雖然病去脾胃尚弱肥甘難化故其噫噎得是症者可不知所謹哉可不知所慎哉若以斯膏吐瀉宜周人參煉膏補之

橙花散

治翻胃

苡子葉

韭菜汁

白橙花 冰乾為末

右用老米湯調服三五口不轉再服

霞天膏

備見雜方



余先君慙仙翁用此倒倉治丁縣丞之疾隨吐隨瀉  
吐出辣痰如此狀其病即安按去病根活八十餘歲  
是其驗矣

嘈雜

丹溪曰痰因火動介鬱有熱 大法芩連梔子南星  
半夏陳皮熟加青黛梔子生姜炒黃連乃必用之藥  
有人用二陳湯加枳芩蒼朮白朮梔子濕痰氣滯惡  
心三補丸加蒼朮倍加香附眩運嘈雜乃火動其痰  
二陳加梔子芩連芎一入心饋索食以白朮黃連陳  
皮作丸滾白湯下數服愈

嘈雜是痰因火動治痰為先姜汁黃連痰藥用梔子  
黃芩為君南星半夏陳皮為佐熟芩加青黛若治痰  
氣鬱不喜食三補丸加蒼朮木香香附按蔣氏子餘  
云眩運嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子黃芩之類  
八寶安胃湯 治饋雜有火有痰之症

梔子炒不 黃連炒七分 餘芩炒不 半夏湯 陳皮五分  
甘草三分 香附八分制 川芎七分

水鍾羊姜三片煎八分食遠熱服

越鞠二陳湯 治肥人饋雜多痰

陳皮八分去白 甘草三分 茯苓七分去皮 半夏湯 桔梗五分



香附七分制 枳芎六分 蒼朮八分米 白朮八分 南星制  
枳子炒 黃連炒六分

水鍾羊姜三片煎八分食遠熱服

清胃化痰丸

石膏二匙 甘草二分 桔梗三分去 枳子炒 香附制七分

黃連姜炒八分 枳實炒八分 陳皮去八分 半夏麩一分

水鍾羊煎八分食還熱服

積塊

脉經云脉來細而伏者積也脉見寸口積在胞中微  
出寸口積在喉中閉上積在暗傍上閉下積在心下

微下閉積在少腹尺積在氣衝脉右積在右脉左積  
在左脉而出橫在中央各以其部分之也

論曰積者五臟所生聚者六腑所成也積者血凝也  
其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右  
有所窳變聚陽氣也其始發無根本上下無所晉止

其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也

原病式曰癥者腹中堅硬按之應手水沫柔順而下  
反堅硬如地者亢則害承乃制也癥者中能硬而聚  
散無其常故其病未及癥也經曰血不流而滯血聚  
內凝而為癥也小腸後熱於大腸乃為虛癥大腸後



熱於小腸為兩熱相搏則血溢而為伏瘕血溢不利  
月事沉滯而行故云為瘕虛與伏同  
大七氣湯

治積聚伏於瘕瘕隨氣上下發作有時心腹疼  
痛上氣窒塞小腹脹滿

益智 陳皮去白 三稜醋炒 莪木各酒洗 香附各各半

桔梗去芦 肉桂 甘草 青皮去核 藟香葉各三分

右咬咀每服九錢用水煎服

阿魏丸 治病積氣塊等症屢驗

阿魏一匙磨水 山查肉一兩 青皮一兩 莪木醋炒 鱉甲一付醋炙

右除魏另磨水俱研細末神麩糊丸如梧子大  
每服五六十丸空心流白湯下

治瘕方

消痞為血水雖屢用未為血水其大小不為恙  
用猪澁皮七个新針七个每一針刺一腓濫為度  
用皮硝七錢每一錢擦一腓磁器盛七日鉄器焙  
乾又用水紅花七錢將罈為末無灰酒空心調下  
一年以下者一料可愈五年以下者二料十年以

下者三料即安

神力独蒜餅 治瘕疾如神



用蒼葉牡荊川山甲同好醋研成餅量人大小痞  
貼之兩炷香為度其痞化膿血從大便出

鄙續

五臟為積六腑為聚積在本位聚无定處在左血凝  
在右氣滯有痰成塊在中痰血氣三者所結也  
五臟之積其心為伏梁肺積息賁肝積肥氣脾積  
氣痞腎積奔豚各在所部分經之治積塊之症何觀  
之藥主之多効予見一方士以霸葉下一尹价腹中  
數驚且活此事實可異也故記之以廣其傳焉

醫門秘旨卷之七終

醫門秘旨卷之八

諸頭疼

脉法 頭疼陽弦浮風緊寒風熱脉數濕細而堅氣  
虛頭痛雖弦必濡痰厥則滑腎厥兼實云寸口脉中  
短者曰頭痛

丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多有可吐可下者  
清空膏 治諸頭痛惟血虛頭痛難治

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛用川芎當歸湯古方  
有追涎藥及偏正頭痛年深不愈者風濕熱頭上  
壅及腦痛並皆治之



川芎 五斤 柴胡 七斤 黃連 炒 防風 去芦

羌活 各二斤 耳草 灸月半 細挺 黃芩 三月去皮 酒制 月半

為末每服二錢於盞內入茶少許湯調如膏抹

在口內少用白湯送下臨卧如若頭痛每服加

細辛二分如痰敵頭痛脉緩減羌活防風川芎

甘草加半夏一兩五錢如偏正頭疼服之不愈

去羌活防風川芎一半柴胡一倍如發熱惡寒

而渴此乃阳明頭痛只宜白虎湯加吳茱萸白

芷 白虎湯方見暑門

### 川芎茶調散

治諸風上攻頭目昏運疼痛鼻塞声重

荆芥 川芎 白芷 各二兩 薄荷 四兩

羌活 甘草 各二兩 細辛 五斤 防風 二斤半

右為末每服三錢食後茶清送下

選奇方 治肩背痛不可忍大有奇効

羌活 防風 耳草 炙 半夏 各二斤 姜制 七次

酒芩 一斤 冬月不用有熱用之

右咀每服五錢水一鐘煎六分食後熱服因入

酒三五匙引藥上行

清上芎芷飲 治六經頭疼昔范友一龍頭疼將



先如此二三年諸藥不効服此而安

川芎臣

白芷臣

知母

臣去毛皮

黃柏

臣炒

柴胡

佐

桔梗

佐去芦

薄荷

臣

耳草

使

梔子

君炒

連翹

君

生地

臣酒洗

石膏

二匙

條芩

炒君

細茶

一撮

香附

使

水一鍾半煎八分食後用小盃作五六次熱服

翻續

氣虛頭痛者耳鳴九竅不利也濕熱頭痛者頭重如石屬濕也風寒頭痛者身重惡寒此邪從外入且汗之也偏頭疼者手少陽陽明經受症左手邊屬火屬風屬血虛右手邊屬痰屬熱也真頭疼者腦盡而疼

手足冷至肘者不治也少陽頭痛者往來寒熱也陽明頭痛者自汗發熱惡寒也太陽頭痛者有痰重或腰痛為之痰癰也少陰經頭痛者三陽三陰經不流行而足寒氣逆為寒也厥陰頭痛者或痰多厥冷也血虛頭痛者夜作苦者是也○肩輪骨痛亡痰火之徵也又云風熱與痰也有疔虛羞明眉眶痛者亦痰火之徵也

眼目

東垣曰能近視不能遠視陽氣之不足陰氣之有餘也氣虛而血盛亡乃冰火有餘虛者氣弱也此无



人桑榆之相也。能遠視不能近視，陽氣有餘陰氣不足，血虛氣盛，血虛氣盛，火有餘元氣不足，火也。元氣義氣真氣之賊也。元氣柔者則氣和，細細如綿，邪氣柔也，緊而強如川之水，不可遏也。

四寶膏

治暴風有翳膜熱壅者

麩仁去心膜

二分

白礬沙三分

片腦三分

硃砂二分

二分

共為末用蜜調成膏點眼効

麩仁散

專治翳障妙不可言

淨麩仁一兩用紙色筆管碾去油加白礬砂一分

麝香三分同搗極細收入磁器貯之听用

洗肝散

治風毒攻上暴作赤目腫痛癢瀼多淚

大黃煨

薄荷

當歸

酒洗

羌活各一分

防風二分

川芎

甘草各二分

為末每服三錢食遠熱水調服

爛眩風眼方

銅錄末不拘多少粗碗將天茄子取汁一二碗先將汁少許入碗用錄末一順搗一二時澄清畢去淨水又添茄汁如前搗五七次為妙後羊乾覆碗以艾火煙金黃色枯凡如黃豆大每用一丸入酒



鍾內用乳一半水一半合手極於甑上蒸待飯熟取  
起揉眼眩一日六七次天氣熱露一宿洗時溫洗效  
神仙八寶丹 治諸眼疾及翳障神效

芦甘石 一斤 童使浸七次煨七 黃丹 一月飛七次

珍珠 五斤 蚌蛤盛之鉄線縛 硃砂 五斤 二斤 羊為衣飛過

麝香 片腦各三斤

用福蜜一兩五錢以銅鍋熬去膜系綿濾過先  
下砂射珠丹反下腦石俱完隨熱丸如菜豆大  
少冷即成塊不就倍葉須用天色晴明成收開  
吉日或晴明端午中秋重陽四節切忌生人女

子雞大穢汚之地必須靜處兩人方能成就以  
次尾礦盛貯多年愈空愈好將丹花水濃磨點之  
點法照常故不登錄

歸龍湯 治天小翳瞬怕日羞明立刻

當歸酒洗 生地酒洗 菊花 知母 忘鉄 黃柏各八

防風 五茅 黃連 炒 白芍 煨 荊芥 川芎

黃芩 炒 梔子 炒 羌活 薄荷各六分 甘草三分

龍胆草 水鍾半煎八分食遠熱服

洗眼方 洗爛眩風眼一二次愈

海桐皮 君 防風 君 五茅 煨尾 酒洗 黃柏 臣 炒



五味子 君 銅青 臣 胆 凡 輕粉 各少許

先將七味煎之待熟入輕粉一滾棄熟洗効

眼藥方 治眼翳障攀睛神効

芦耳石 臣 硼砂 琥珀 血竭 各一各

光明砂 臣 射香 明凡 枯凡 銅青 各三分

雄胆 珍珠 腐制珠砂 皮硝 乳香

胆凡 輕粉 炒褐色 各五分 為末紙節過点眼

桑葉湯 專洗凡人眼目昏花神効

立冬之日收採桑葉懸起自乾洗時忌葷腥物謹

守清淨齋戒不忌者此方不効 洗眼日斯閉后

正月初五日 二月初一日 三月初五日

四月初八日 五月初五日 六月初七日

七月初七日 八月初八日 九月三十日 十月九日

十月初十日 十一月初十日 十二月初一日

四物龍胆湯 治日赤暴發作雲翳痛

川芎 當歸 洗無灰滷 芍藥 地黃 各二分

羌活 防風 各一分 龍胆 防己 各一分

分二服前痛甚加生地黄當歸如大便閉加大黃

煩躁不得眠加山梔熱痛赤腫小柴胡湯加大

黃生黑豆常煇不泄加朴硝



流氣飲

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏花  
視物不明當風多淚怕日羞明推眵赤腫癢澀  
難開或生翳障倒睫眼眩赤爛及婦人血風皆  
行暴赤眼暴睛紫黑應作翳眼并皆治之

大黃炮

川芎

菊花

牛蒡子炒

細辛洗去土

防風去芦

山梔炒

白蒺藜

黃芩炒

甘草炒

玄參去芦

蔓荊子

荆芥

木賊

蒼朮各二日

草决明日半

為末每服二錢温卧用冷酒調下

巨胆羊肝丸

治內障

用羊羊猪兔青魚胆各一枚羊肝一具搗爛入

川芎

川椒炒去

當歸酒洗

木賊各二日

童便浸三宿

栝實

黃連炒

蝉退去翅足

草决明各五錢

薄荷五斤

菊花

荆芥

蜜蒙花各三斤

蛇退一条

白蒺藜炒

蔓荊子炒

天花粉二斤

地骨皮二日

夜明沙淘三日

為末煉蜜丸如梧子大每服五六十丸食後流

白湯下

還睛丸

治眼生瘰膜怕日羞明

川芎

白朮

羌活

白蒺藜炒



防風 五片 生地 忌飲 當歸 各酒 木賊 去節

天麻 羊角 青箱子 蜜蒙花 兔系子 各一月酒洗

熟地 洗三月酒 蟬退 起足 車前子 菊花 各一月

為末煉蜜凡如梧子大每服七十凡空心淡鹽湯或食後白湯下

三花 丘子凡

治上庭風熱風毒上攻肝虛頭痛時見飛蛇或翳障并効

審蒙花 旋覆花 甘菊花 石決明

草決明 枸杞子 牛蒡子 地膚子

兔系子 酒浸蒸過等分 甘草少許

為末煉蜜凡如梧子大每服三十九麥門湯下

紫金膏 點一切諸患眼疾神効

人參 八分半 赤芍 三片 黃芩 二片九分 大黃 四片半

黃連 炒一月八分 黃柏 二片七分 牙皂 一片二分 珍珠 五分

荆芥 三片三分 血竭 五分二厘 硃砂 四分三厘 沒藥 七分

國丹 飛過六分 射香 分半 甘石 一月一分 礞砂 五分元

冰片 分半 輕粉 三分半 乳香 七分 雄黃 五分元

胆凡 五分三七 硼砂 乙片 熊胆 三分 青瑤 一分三

用水三碗將人參等藥入砂鍋內却將丹及細



藥篩過方下煎至半乾以入輕粉及濾過蜜七  
錢流二三次待冷入熊胆片腦芽收起入磁罈  
內埋在土中七日放冰處任用忌鉄器

冬青膏

治一切眼疾

黃連炒

當歸酒洗

甘草

黃芩炒

防風去芦

黃柏炒

薄荷冬四月

草烏

川烏各一分

聖水二斤

冬青葉二斤皮米醋一斤

浸七日熬如金色樣点眼去川草烏尤効

眼膏方

雲南石氏眼科章

貧道雲遊遇此方

羊腦芦耳稱四兩

童兒小便淨松黃

三兩撫丹鍋內煉

水飛七灰莫心慌

更加乳香并沒藥

礪烟石胆白丁香

射粉血砂及焰是

烏鈴片腦與雄黃

金石葉分十八味

一錢一味細推詳

防風去芦

黃連炒

當歸酒洗 麩仁

菊花

黃柏炒

柯子各四斤

荆芥

薄荷各半斤

水羊桶浸一七或十日放鍋熬至一半  
再熬至一二椀放銅鍋內又好蜜一斤化開濾



過與藥水同熬如稀糖樣却下黃丹耳石再熬  
後下餘藥慢火畧熬離火待溫方下片磁礮  
盛貯黃蠟封口埋土中如用取出忌雲翳諸眼  
疾神效

菊花散

治眼目赤腫痛難開麻豆後或溫熱加  
飛李

黃芩炒

大黃煨

菊花

耳草

防風去芦

當歸各等分

為末每用三四匙食後茶清調下

膏子藥 治內障神效

龍胆草

蟬退去翅

夏枯草

玉簪子

草决明

木賊

蔓荊子

蒺藜各四

谷精草

珍珠制

夜明沙

羚羊角鎊

蛤粉各二 生地三斤

石决明六月 鹽水煮

右珍珠用水洗淨紙包過外用黃泥固服紅冷  
定取出為末用時每膏半酒杯入珠末二三  
分攪勻服前粗藥煎水二遍去渣不用將水放鍋  
內文武火煎成膏入蜜半斤入罐埋地下三日  
出火毒服一二七有効  
羚羊角不煎与珍珠同入膏服



洗眼方

胆凡二分 銅青三分 射香二分 水粉少許

用水一鐘煎半鐘溫洗一日三次

耳病

王節之曰耳鳴症或鳴甚如蟬聲或左或右或皆閉塞世人多作腎虛治之不知殊不知痰火上奔鬱於耳中而為陽鬱是則壅閉若愈此疾但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多曰先有痰火在上又或恼怒而得怒氣上升少陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是勝光目穴

上升故也其鳴不甚其人必多欲勞怯之症耳

開竅飲 治聾耳重聽等疾

耳草三分 麥門冬一分 木通一分 升麻五分

前胡一分 赤茯苓二分 桑白皮一分 甘菊一分

生地一分 蔓荊子七分

水鍾半姜三片棗一枚煎八分食後溫服

卸續

氣閉者少陽厥臥耳不鳴是熱與氣滯也腎虛耳閉者間或有之或老年或相火動者是水不能勝真火難治



白晁病

王節齋曰白晁塞不聞香臭或但遇寒多塞暑或多寒便不時奔發者世俗皆以肺而用解表通竅辛溫之藥不効殊不知此是肺經素有火邪火鬱甚則若得熱而見寒故遇寒便塞遇感則發也法當清肺降火為主而佐以通氣之藥若如常白晁塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥不化或末藥乾調緩服無效此予所親見而治驗其平素原無白晁塞曰症一時感寒風而致窒塞寒聲重流清涕自作風寒治也

飛霞方 治貴人鼻中肉贅用白礬末加硃砂少許吹其上頃刻花水而消與清肺湯酒白散服愈此厚味壅濕熱蒸於肺門如雨霽之地突生芝菌也丹溪曰酒滓晁是血熱入肺治用四物加陳皮又曰桑白皮紅花酒炒黃芩煎好酒數酒調五靈脂末同眼格至論中於上藥有茯苓生姜氣弱者加黃芪○允君慙仙翁見一人面如橘皮者如此肺中必有虫也五臟之虫上行惟肺虫下行最難當用獺爪為末調藥於初四大日治之每月此二日肺虫上行也辛夷散 治肺為四氣所干晁內壅塞涕流不已



或氣息不通不聞香臭鼻淵之症

川芎 甘草 藁本 升麻 細辛 防風 去芦

白芷 木通 去皮 辛夷花 各等分

○ 為末每服三錢清茶調下 ○ 鄙續


而鼻皆黑酒毒之病乃血熱入肺經之症若鼻塞不利乃肺主皮毛寒邪傷肺宜汗散之若鼻生息因膏梁過多肺氣壅盛之故也若鼻淵胆移熱於腦故鼻流清涕如水是也用辛夷散有効若鼻不聞香臭肺經有痰滯於竅中宜清肺化痰也暫時者乃風寒所鬱不在此論耳

卷之八終

醫門秘旨目錄

卷之九

口症



既濟丹 石錄散 紅褐散 連磐散

龍石散 口瘡方 二黃膏 如神散

地蚕方 一粒丹 兜茶散

牙齒

白辯 固齒白玉膏

搜風湯 清胃湯

牙葉方 擦牙散



治牙疼回症

血餘散

又方

愈痛方

乌牙酒

神水方

固齒湯

神仙散

乌鬚擦牙方

鄒續

咽喉

十八症

愈咽方

犀角湯

芩連飲

吹藥方

甘梗湯

冰雪散

詩方

驚礬散

雞子膏

吹藥

竹參湯

朴連散

一字散

硼梅丸

如神散

邵風散

又方

硼砂丸

毗脛散

治喉神効方

又方

愈痛方

六辨散

三因玉鑰匙

乳鷲方

龍胆散

奪命散

肩背痛

脉法

豁痰湯

肩背痛辨

通氣散

防風湯

雷歸拈痛湯

胃脘痛 附心病

脉法

丹溪說

積痰痛方



萬靈散

安胆湯

安神丸

諸疼痛

脈法

腹疼

脈法

脇痛

脈法

卸續

木香散

養心丹

卸續

王節齋論

手拈散

天王補心丹

白龍丸

抑青丸

卸續

加味推氣湯

腰痛

脈法

煨腎散

痿症

論

清燥湯

脚氣

脈

南北論

防已飲

姜膠膏

卸續

茴香散

補陰丸

五倍湯

論

東垣說

清燥湯

脚氣說

不治症

強筋丸



椒藁方

除濕飲

脚氣冲心法

疝氣

脉

秘方

丸藥方

卷之十

婦人科

○產前

行氣湯

遠行健步散

郵續

丹溪辯

附子湯

玉環笑來丸

脉

四制二妙丸

治濕氣方

守効丸

愈痛方

郵續

論

子和說

益世飲

崩漏

論

蚕砂散

活血湯

愈崩散

川芎湯

催生

定風膏

丹溪辯

女聖丸

辯

通經丸

通經飲

通滯湯

歸髮散

愈紅散

有驗方

豆酒湯

香附丸

煨腎散

當歸飲

平肝湯

管仲湯



催生丹

灸法

產後

脉

止運方

破血湯

通神散

併手散

順生湯

辯

逐汚湯

益母丸

附膏法

脫癩方

澤蘭散

紅雪湯

醫門秘旨卷之九

○口症

既濟丹

治口舌生瘡

黃連

五分

乾姜

二分

為末搽上流涎即愈

龍石散

治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽嗑

腫塞之病每用少許搽點患處嚥津小兒瘡疹

毒氣上攻口齒先用五福化毒丹掃後仍用此

藥搽點立効

硃砂

七分

生腦子

二分

寒水石

一分

煨通赤

三分

二分

為末每服一錢粗以搽點



地蚕方

即蝻草虫

蟻蝻虫

治大人小兒口瘡用諸藥不効搽此而安

用糞土內地蚕一條切去一頭將筋番轉裡而先將口嗽淨以地蚕搽患處涎出為度少頃又取番轉又搽不過三五次即愈芽屋者効

石錄散

治走馬口疳神効

銅錄

消石飛過

杏仁去皮尖各等分枯凡少許

為末先將口漱淨患處搽上待涎出吐三次即愈不許吞入腹內恐毒氣入內耳

口瘡方

人中白

煨过

銅錄三分枯凡少許

為末先將患處洗淨搽極効

一粒丹

治風虫客寒三般牙不能飲食呻吟無

已者

胡椒凡粒

菘豆十二粒

用布裹擊碎以系綿色裹於痛牙上咬定良久

吐去涎沫立愈

紅繩散

治口疳神効

紅裙

燒灰二分

雞盹皮

二分

下地骨皮

枯凡各二分

為末搽之吐涎愈

二黃膏

治走馬疳瘡



用黃柏一塊去皮蜜炙數次听用黃連或二兩或  
四兩熬成膏將芦耳石二兩如法煨俟松花色入  
連膏待乾用後如瘡惡用流水淨過半熟入口噙  
數次吐出將製黃柏五分又入製過芦耳石一分  
射香三厘入二次待吹入前葉入片腦一厘枯凡  
或胆凡一二分吹上極効

兒茶散 治走馬疳瘡

孩兒茶

硼砂各一分

片腦一分

芦耳石五分

為末每用五七分搽上即安

連凡散

黃連君

枯凡

銅錄

乾姜俱少

為末先用象牙梳裝鹽燒過入滾水洗口後用  
末葉搽上有効

如神散

治口喉俱生瘡熱

甘草

枯凡各等分

為末吹入口中噙漱吐再吹有吞之亦可  
牙齒

余見今之凡病齒者或曰胃火而不知齒屬陽明經  
合手足而言之也原大腸傳送氣化行焉壅土則齒  
浮虛則宣露夾風則上攻頭面乾惡則變齧脫是独



可輕乎哉况胃脉行乎上齒中而大腸之脉行於下  
蓋逢中且善惡寒熱其性則反又有大相反者通而  
治之獨名於胃焉何哉

搜風湯 治風牙疼痛

蒼耳根 金銀花 小麥 花椒 荊芥穗各等分

共一處煎水漱口即愈

牙葉方 漱口止痛湯

艾葉正不 川椒四不 黑豆一撮 葱白二根

煎水漱之立時即止

固齒白玉膏

擦牙散 治牙疼極驗

槐枝多用 白芷五不 防風五不 川芎三不

先將此四味煎水十數沸去渣後好鹽三五斤

桑柴燒火煎乾磁器盛之每日清晨擦牙溫水

漱漱風虫牙皆可治之

治牙疼四症

畏冷水廼熱症宜用牙硝姜黃雄黃荊芥并風葉

怕熱者乃冷症宜用乾姜草撥細辛

不惧冷熱者風牙也宜用牙皂姜蚕蜂房草烏

有孔者蛀虫牙也宜用雄黃石灰砂糖



此用藥必須溫水漱之再審寒熱虛實方可用  
血餘散 治風牙虫牙神効

枯化 槐子 花椒 牙皂 頭髮灰 各等分為末

每擦牙痛處流去清涎然後用水漱淨不可吞

又方 治風虫牙痛

信飛 細辛 草烏 川烏各七分為末

每用二三厘燒酒調漱後用川椒湯解如有虫

則隨酒內出

愈痛方 胡椒 花椒 牙皂各七分為末

用米泔漱口將藥搽上閉口一時取痰涎出佳

馬牙酒 忌鉄器

白馬牙燒紅淬好燒酒七次以酒漱齒數次効

神水方

防風 羌活 獨活 細辛 甘草 花椒 丁香 各等分

煎水漱口常漱之有安矣

固齒湯 治風牙

藁本 槐花 各七分 升麻 防風 白芷 各分

耳草 川芎 各三分 細辛 獨活 各七分 當歸

水鍾羊姜三片煎八分食後熱服

神仙散 治牙根腫爛臭水立愈



芥菜籽不拘多少燒灰存性為末敷之即愈  
治口瘡方

諸藥不效者及小兒蒲口生白胎瘡

苦參末 硼砂過 玄明粉一

用好京墨磨薄荷自然汁調和鴨毛刷在口瘡上  
一夜即愈神效

又方治口瘡

用江南竹刮青一塊蜂窠一盞入竹青在內放飯甑  
中蒸過去竹青用蜜汁調兒茶末一 片腦二  
烏鬚擦牙方

槐角半斤 青鹽四 化水浸槐角下 餘日入砂鍋  
內煮待焙乾取起加生熟地各二 白芷破故紙各  
乙丹為末每日早晨擦牙嚥下效

鄙續

火熱牙疼虛腫上屬陽明胃經下屬手陽明大腸經  
虫牙者其病在齒或一乍兩乍作痛者是也風牙者  
或連腮腫痛或過風寒尤痛者是也當以散風之藥  
治之○齒雖骨之余床乃二陽明經所過之地也不  
可執之於腎但老年齒落乃腎虛血虛之病也難拘  
於治法耳



喉

喉十八症

十八咽喉君要道

雙響乳鴛生喉竅

牙涎風毒牙根腫

重舌之風舌必腫

魚口風如魚吸水

舌黃舌腫色黃濃

牙根作痛咬牙禁

木舌腫如猪舌同

積毒塞喉風熱症

纏喉風熱繞喉攻

連珠五七相連起

更有蛰蟻蠱毒風

搶十口中多痰泡

崩砂耳口盡根崩

毒名蜂子腮洋爛

松子風令滿口紅

走注癰癤或氣閉

連腮連齒獵頰風

喉病者一陟君火心主之脉氣也一陟相火三焦

之脉氣也二脉格於外喉熱氣熱於內結是則腫脹

是則痺也纏喉風屬痰熱喉瘡屬火熱

陟虛火上冲亦令喉内生瘡難治

愈咽方 治咽喉神効

升麻日半 防風去芦 桔梗去芦 連翹去心

羌活 黃芩各一月 大黃煨 荆芥去梗

朴硝 甘草 紫蘇 川芎各五分

水鍾半姜三片灯心十根煎八分食後熱服



又方 犀角湯

玄參

升麻

桔梗

去芦

犀角鎊

木通

去皮

耳草

黃芩

炒

黃連

炒

枳壳

薄荷

陳皮

大黃煨

各等分

水引同煎

琴連飲

治咽喉腫痛

黃芩

炒

黃連

炒

玄參

去芦

前胡

防風

柴胡

各去

桔梗

竹青

山藥

各五

半夏湯泡

陳皮

去白

大黃煨

甘草

朴硝

薄荷

各五分

荆芥

七分

同煎水引煎服

咽喉吹藥方

訶子

炒

胆凡

明礬

各三分

磁砂

盆硝

薄荷

甘草

各七分

午勝子

二分

為末

每用五分吹入喉內先擦舌上後用清茶下

柑桔湯

專治咽喉

甘草

桔梗

去芦

薄荷

防風

各等分

水鍾半煎八分十遠服

冰雪散

專治咽喉痰甚壅塞

灯心灰

存性

二分

硼砂

二分

片腦

少許

去力末



每服少許吹入喉中有涎吐出為妙  
治咽喉詩方  
典第一葉三分參用

細辛不拘多少  
巴豆只用手也

不問咽喉急閉  
莫管乳鴛及單

將末新田塞鼻  
腫毒當時消安

此藥妙物價非廉  
万兩黃金何算

鴛鴦散  
連鴛鴦一介燒存性入枯凡一分為末

吹毒處痰出取効

雞子膏  
治喉閉熱腫疼痛

輕粉  
鉛粉 百草霜 用皂角搥碎將雞子

清調敷腫處神効  
余用雞子清搽敷有効諸  
毒可用

吹藥方  
治喉腫痛

片腦二分 胆凡 血竭 輕粉各五分

為末以瓷器收貯用時少取吹在患處先用皂  
角煎湯次下石灰澆四五沸待溫漱口吐出涎  
沫方可吹前末藥

竹參湯  
治咽喉疼痛立効

玄參 木通 去皮 天黃 生用 竹葉葉 灯心 等分

水鍾羊前八分食後服



扑連散 治纏喉風閉塞

用臘月初一日大小不等猪胆五六個

姜蚕炒薄荷 扑硝 黃連炒青黛 白乳各五不

裝在胆內上縛定外用青紙色了將地掘一孔

方一尺上用竹竿橫吊此胆懸定在內後立春

日取出春風吹去胆皮青紙研為末壅收吹入

喉神効

一字散 治喉疼痛不止

片腦一字 姜蚕炒分 硼砂二分半 明凡二分 牙皂七分半

為末每用一字吹喉即安 方加黃連末一分

硼梅丸 治喉閉

用鹽霜梅肉 硼砂各一升 搗為泥凡如圓眼化

如神雄硼散 治喉閉腫毒單雙鶯

雄黃各半 硼砂七分 硃砂 蟾酒各三分

胆凡二分 片腦 蜈蚣 射香各少許

為末入礮收之勿令泄氣每用半厘吹効

却風散 治咽喉生瘡腫痛纏喉風閉單雙乳鶯

急喉痺木舌重舌之症

胆凡 片腦各二分 姜蚕炒 苦丁香即白瓜 灯草灰各五分

若病不退加雄黃 牙皂 崩硝 芦耳各三分



為末每用少許吹入喉中如痰急解用生艾尾  
葉末醋同搗取汁噲漱去痰立愈

又方用鵬月猪胆以日凡入內風中吹乾研末吹愈  
硼砂丸 治口臭口舌生瘡

寒水石 十日 典白硼砂 片腦 五分 射香 五分 皂角 四錢

甘草 二兩 浸汁熬膏用 和成丸 葉可堪誇

為末甘草汁丸如麻子大噲化

毗脰散 治喉閉乳驚

用雞毗脰用黃不犯水陳乾為末以竹筒灌吹患  
處即安

治喉痺神效方

山豆根 一兩 熊胆 一分 硼砂 五分 胡黃連 五分

姜蚕 五分 炒片腦 三分 射香 三分 黃芩 一兩 炒

黃柏 二兩

右為細末吹入喉內神效

又方

用鴨嘴胆礮破為細末醋調灌下即安

愈痛湯 治咽喉腫痛不可忍

梔子 炒 君 片苓 炒 君 玄參 五兩 連翹 君 桔梗 君

防風 臣 荊芥 臣 薄荷 臣 黃連 炒 石 膏 起



耳草佐

右吹咀水鍾羊煎八分食後小杯作五六次熱服

六辨散

治喉痺水不進

白礬三不末又火化汁入巴豆 三个作六塊銚上

熱枯去豆仁研末如牙門緊急不去張口吹藥仍令病者用鼻孔下進亦愈

三因玉鑰匙

治風熱喉痺及纏喉風

煇硝一月

朋砂一月

陀腦一不

白姜蚕一不

右為末以竹管吹羊不許入鼻中立愈

又加雄黃二錢名金鑰匙

每用五分吹入喉中即愈

乳鴛方

治急喉風乳鴛閉塞

用新干藤根一撮艾葉七皮搗碎入乳和勻取汁

令病人仰卧將汁灌入鼻內須臾痰涎即從口鼻

出而愈

余此過喉中腫痛單用川牛膝根研爛取汁和涼

水服之有效土牛膝亦可

青龍胆散

治咽喉閉塞腫痛并双單鴛神効

用好鵬翮胆礬末盛干青魚胆內陰乾為末吹入

喉中極効 一方加川椒七粒



奪命散 治急喉風

五倍子 燒存性 密陀僧 各三不 片腦 五分為末

青龍散 每吹入喉中即安

○肩背痛

脉經云洪而大脉從上緊者肩背痛沉而滑者痰痛  
豁痰湯 治肩背疼痛

陳皮 八分 耳草 二分 茯苓 六分 海桐皮 八分

半夏 一分 枳殼 八分 桔梗 七分 赤芍藥 七分

香附 七分 蒼朮 七分 姜黃 五分 梔子 炒一分

川芎 五分 條芩 炒一分

水鍾 羊姜三片煎八分食遠熱服如痛甚加

朴硝二錢頭煎

肩背痛 有因風熱乘肺手大脉經肺氣鬱甚不行  
病則頰頰腫頭肩顫肘臂外後腫痛汗出小便數  
而欠者皆風熱乘肺也小便遺失者皆肺經虛也

通氣散 治風熱乘肺背肩疼

防風 藜蘆 獨活 羌活 已上通

黃芩 黃連 二味降火各等分

右為末每服錢神効

通氣防風湯 治肩背痛汗小便數而火風熱乘肺



肺氣鬱甚宜瀉風熱

換柳

甘遂

芍藥

威靈仙

澤池

亭歷各二

乳香

沒藥各二

大戟炒之

陳皮四日

牽牛頭末一月

右末米糊為丸每服六七十丸湯下

當歸拈痛湯

治濕熱諸痛肩背沉重胸膈不利足經

羌活

甘草

黃芩炒

茵陳各一

人參

去芦

升麻

苦參

去芦乾葛

防風去芦

蒼朮各三分

知母

茯苓

澤池

猪苓各五

白朮各半

當歸身酒浸洗五分

水二鍾煎一鍾隨病上下溫服

胃脘痛 附心病

脉法 右手實者疾積也大是久病緊實不大便者下之痛甚者脉必伏陽微阴弦脉短而數者心病若細而遲沉者可治堅大而實浮大而長滑而利數而緊皆難治

丹溪云 心痛即胃脘○有熱厥寒厥大實死血食

積痰虫

按机要云熱厥心痛身熱足寒甚則燥煩而吐額自汗出脉實可汗利太溪昆崙微熱弱心

痛手足厥

通身冷汗便弱清利不渴也良姜芎藭辛

可溫木附

厥心冷汗便弱清利不渴也良姜芎藭辛

熱者至之

大實心疼痛卒然飲食可服煮推凡虫痛者

心腹高起

按之則痛不能飲食可服煮推凡虫痛者

痛則心腹

色紫則腫聚往來上下行痛有体作暖熱無

常心出面

色紫則腫聚往來上下行痛有体作暖熱無

常心出面

色紫則腫聚往來上下行痛有体作暖熱無

常心出面

色紫則腫聚往來上下行痛有体作暖熱無



然得辛熱湯暫上戴氏曰死血痛者痛有常然不動  
移者是若痛甚欲大便去後痛減者食積也李若頭  
微之際使一奪而之全起不美哉  
積疼痛方

滑石 蒼朮 山柰 香附子 童便浸各

南星 湯泡 枳殼 青皮 櫟 木香

砂仁 各五 半夏 湯炮 螺螄殼 用 墻上年久者研碎

春加川芎夏加黃連秋冬加茱萸各五 姜汁浸炒  
餅為丸如菜豆大每用五六十丸姜湯送下

萬靈散 專治虫痛如神

檳榔末三錢於十六日待虫頭向上米湯下立効

木香散 治心氣痛并虫疼

木香 莪朮 甘漆 炒 燭 各等分

右為末醋湯調下 一服即安

天王補心丹

寧心保神益血助精壯力強志令人不忘除怔  
忡定驚悸清三焦化痰涎祛煩熱療咽乾舌養

心神

五味子 柏子仁 天門冬 麥門冬 各五心

酸枣仁 各一月 生地黄 四日 當歸身 酒洗帶用一月

黃連 炒二日 人參 玄參 各 丹參



桔梗 遠志 去心 白茯苓 去皮 各五分

為末煉蜜丸如梧子大硃砂衣為每服二三十丸臨卧時灯心竹葉湯送下

安胆湯 治心胆驚怯健忘

半夏 湯泡 竹茹 枳實 茯苓 各一分

陳皮 各半 遠志 七分 甘草 二分 石菖蒲 五分

水鐘半姜三片煎八分食遠服

養心丹 勤政勞心疼多少睡心神不足

黃連 炒六分 白茯苓 去皮 八分 茯神 去心 八分 麥門冬 去心 一分

當歸 酒洗 七分 芍藥 七分 甘草 三分 柏子仁 一分

遠志 六分 陳皮 七分 人參 去芦 八分 酸枣仁 炒 一分

水鐘半蓮肉四不去心煎八分食前服

白龍丸 治急心痛

陳倉麥麵二斤寒水石末二斤滴水為丸如彈子

大雲母石為衣陳乾每服二丸用炭火燒紅入燒

酒內研細服之即止

硃砂安神丸 治心神恍惚

黃連 炒 一分 硃砂 飛 一分 生地 酒 當歸 身 各酒洗 七分

甘草 五分 共為末米糊丸如菜豆大每服三十丸

食遠白湯送下



鄙續

真心痛手足青至節者不治胃脘痛亦在心之分故  
倍名心痛日久不食亦無害也虫動痛者必面上白  
斑唇紅痛後便能食時作時止是也因怒而飲食卒  
痛便閉悶心胞高起手不可按者實痛也可行痛可  
按者虛痛也不可下傷寒有動氣不可下此也

諸疼痛

脉經云沉弦細動皆是痛症心痛在寸腹痛在關下  
部在尺脉象顯然

九節齋曰此治心腹痛但是新病須問曾服何飲食

因何傷感有無精滯便與中消導之藥或日數已  
妻魯多服辛溫燥熱之藥嘔吐不納胞滿口舌乾燥  
大小便瀕則內有鬱熱矣或原有旧病因感而發綿  
延日久見症於前者俱用開鬱行氣降火潤燥之藥  
川芎香附山梔子黃連姜汁之類甚者再加朴硝心  
腹久痛須于溫藥內加苦寒之藥溫治其標寒治其  
本也

手拈散

方見溫門

治心脾氣痛諸痛俱治

腹痛



脉經云脉細小弦急為濕滑為痰脉弦緊或實或伏者可下若細小遲者生堅大而疾浮大而死痛而喘滑而利數而緊者難治暗下或大痛不治若細小急中腹痛脉弦則腹痛弦急小腹痛尺緊暗下痛尺伏小腹痛微疝尺實小腹痛小水當利心腹痛、不得息細小遲者生疾者死腹痛脉大長者亦死

部續

食痛脉弦右關大甚欲大便去後則痛減是也痰痛者痰因氣滯脉滑痛則小便不利是也熱痛者時痛時止者是也寒痛者綿綿而痛是也死血痛者痛有常處而不移夜間甚者是也虛痛者可按實痛手不可按是也臍下忽大痛人中黑者必死

腹痛

脉經云大者腎虛濡為痰血緩為濕或伏為痰尺沉腰痛右尺浮沉而弦沉為滯弦為虛沉弦而緊為寒沉弦而浮為風沉弦細而濡為濕弦而濡閉細

抑青丸 治肝氣痛

黃連姜汁拌炒 為末米糊丸如粟米大每服四五

十丸姜湯送下流白湯亦可

加味推氣湯 治右臍疼痛脹滿不食



姜黃一分 枳殼一分 甘草二分 半夏七分

陳皮八分 桂 少許

水鍾羊姜三片煎八分食遠服

鄙續

右眼一条扛起作痛者食積也悠一痛不止者虛痛也  
也兩眼痛屬肝氣久則有死血為患也左眼痛所有  
餘有氣滯也右眼痛乃脾氣痛當用理氣豁痰之藥  
須分左右用藥方効左眼有塊作痛者瘀血也右眼  
眼沉瀼主右眼痛屬脾經氣滯病也右眼痛有塊乃  
氣滯痰之病也

腰痛

脉經云尺浮沉腰背痛若腰痛時時失精飲食減少  
其脉沉滑而遲可治

姜膠膏

用生姜自然汁四兩水膠一兩同煎成膏用厚紙  
攤貼腰眼及治諸痛并脚氣痛神效

茴香散 治腰痛

杜仲一斤炒去絲 破故紙一斤 小茴香四斤 木香一斤

為末每服二錢好酒調下

煨腎酒 治胃婦小兒腰痛



捷循腰子三個內去筋膜杜仲去粗皮咀炒斷糸  
為末川椒去目炒燥為度各等分火燒鹽三斤和  
勻放二錢入腰子內紙包慢火燒熟空心酒送下

鄧續

腎虛者血虛而痛之不已或悠、痛多在腎腑者真  
腎虛也瘀血痛者日輕夜重者是也濕痛者或遇天  
陰久坐而癢者是也濕疼流注者脉滑或伏者是也  
腎虛者腰重如帶五千錢身腰冷如水飲食如常小  
便自利宜流溫化痰之藥治之腰乃腎之府腰痛則  
腎虛憊矣

痿症門

痿症論 五痿之症古方特立篇名所論甚詳後  
代槩多缺畧考其所由皆因混入中風條內故也  
痿症不可作風治之肺痿者專主養肺氣養血與  
治金亦有食積死血妨礙不得下降者陳無擇謂  
痿因內藏不足所致誠得之矣然痿之所不足者  
乃血脉之不足也而醫方多用補血驅風之劑豈  
克實心虛心之故耳可當慎哉

補陰丸

黃柏半斤 益知母 酒炒 熟地各三日 白芍 煨



陳反 牛膝 二月 項陽 當歸 各兩 羊

虎骨 酥炙 一 敗龜板 酥炙 加川芎 一兩 蒼朮 一

左為末 酒煮 羊因為凡 如梧桐子 大每六七十丸

白湯送下

五痺湯 治諸風寒濕痺手足緩弱損麻不仁

羌活 姜黃 白朮 防己 各等分

甘草 減半

用水二鐘 姜三片 煎服

清燥湯 方是脚氣門

脚氣門

脈法 浮為風 濡細為溫 洪數為熱 澀瀉為寒 微滑

為虛 牢堅為實 浮為表 沉為裏 沉弦為風 沉緊為寒

沉細為濕 沉數為熱 結曰氣 散曰憂 緊因怒 細曰悲

左寸大 右寸小 無與左尺絕者皆不治

丹溪論 有溫熱有食積 流注有風 溫寒濕 按三因

走注為風 勝無汗 卒急掣痛為寒 勝腫滿重者為溫

勝煩渴熱 勝為暑 勝曰氣 兼中者但推其氣者為勝

文瀕分表裏 以施治也 蓋古無脚氣之名 蓋其內之明厥

二漢間名緩風 宋齊之後 謂之脚氣 名蓋不曰其實

一也 初得不竟 因他病乃作 始發或奄然 大問或三

二日 方亮先從脚起 或緩弱 或痿痺 或行起 或倒或日

三 瘳此其候之不吐逆惡聞食氣或胸滿氣急或遍體三

十壯其隨愈此乃下妙元窮之良法也



脚氣說 脚氣從溫從下煩提起溫在下之藥隨氣血用

南北論 南方之人自外而感北方之疾自內而致蓋南方之人當風取涼醉房久坐濕地或履風濕毒氣血氣虛弱邪氣併行膚腠和氣盛正氣少故血氣凌七則痺虛則弱病發熱四肢痠疼煩悶者因暑月冷溼得之四肢結轉筋者寒月冷溼得之北方之疾因澆醜醉酒之溫熱下注積久而成腫滿疼痛也治宜下藥泄越其邪

東垣說 濕淫所勝治以苦溫以苦辛散之透關節勝濕為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣宜當歸和痛湯服之立愈

不治症 入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眼不赤脉左乍大乍小乍無者不治大者屬心入腎則腰脚痛小便不通呻吟目額黑冲胸而喘左尺絕者不治心屬腎也絕故也防已飲

黃柏 炒 蒼朮 浸 白朮 防已  
生地 酒洗 檳榔 川芎 犀角 炒  
甘草 木通 去皮 黃連 炒去頭



如热加黄芩时令热加石膏痰加竹瀝姜汁南  
星大便閉加桃仁小便澀加牛膝 用水一鍾  
羊煎捌分空心服

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕之邪是絕寒

水生化之源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿

軟癱癱難行 生地酒洗 麥門冬去心

黃芪蜜炙 蒼木洗 白木 陳皮

澤瀉 人參去芦 升麻 五味子

神麴炒 猪苓 黃柏酒炒 白茯苓去皮

川蓮 柴胡 耳草 當歸身洗 等分 酒

用水一鍾羊姜一片煎八分服

強筋丸

治兩足痿弱軟痛或如火焙後踝下上冲腿膝

等症因濕熱所成者

蒼木四又 黃柏炒四又 牛膝二又 敗龜板酥炙二又

防己一又 歸尾二又 虎胫骨酥炙一又 一分加附子二

為末糊丸如梧子大每服七十九空心姜湯下

椒囊方 治脚氣奇効

用川椒二斤寒於踈囊中寘大踏上 跣足踏椒囊

上蓋椒性熱辟去寒濕甚有理一人用之月余効



真奇也此椒末添入檳榔末熱艾三味九効  
行氣湯 治風濕脚氣

熟地黄忌飲 黃芪密 杜仲炒 牛膝去芦

五味子 白朮 陳皮 當歸酒洗

五加皮 斷續 草薺 人參去芦

柴胡去芦 升麻去芦各等分 耳草少許

水鍾羊姜三片煎八分空心服

四制二妙丸 滋陰降火開胃進飲食吞除迴身之

溫股休痿弱并皆治之

黃柏四斤成片一斤酥炙一十三次一斤乳浸  
一十三次一斤至便漫一十三次一斤米泔

浸一十次 無油蒼朮一斤四日川椒炒四日破故  
三炒 紙炒四日五味子炒四日川

炒去炒藥四味用蒼朮同黃柏為煉蜜為丸如

梧桐子大每服三十九早酒下午茶下晚白湯

下黃柏得五斤刮去皮淨四斤蒼朮得斤羊粗

米泔浸過去皮淨一斤

除濕飲 治風寒暑濕足常履之所致

木瓜 檳榔 白芷各 羊夏曲

厚朴 蒼朮各二 藿香 陳皮

白朮 茯苓各一 甘草六

右咀用水鍾羊姜三片零二枚不俱時服



遠行健步散

防風

細辛

草烏

石為末按鞋底或草鞋底內遠行脚不疲疼神效

治濕氣湯

紫蘇

黃柏炒

芍藥

煨

木瓜

羌活

澤瀉

木通

去反防己

檳榔

蒼朮炒

枳殼

去穰

甘草

香附

童便浸

痛加木香腫加大腹皮熱加黃連大黃水煎服

脚氣心

四物湯加炒黃柏又以附子末津調貼

湧泉穴外用艾灸以引其熱也

節續

濕氣者腫痛或脛強夾濕熱者走痛濕積流注於下  
則為脚氣脚氣之症有因浮弦起於風濡弱起於濕  
洪滑起於痰弦濇起於少血澁沉起於寒濕初起者  
類傷寒惟脚有恙者異耳婦人病此者多因血海虛  
而得之男子得此多因腎水虛耳男女固宜分別用  
藥則無異也大率以濕熱之藥為主兼以補腎補血  
劑方得取效

疝症

脈經云寸口脈緊為寒疝弦則胃氣不行氣不行則



寸口遲緩遲為寒緩為氣  
寒而搏轉緩而痛沉緊豁大為虛弦緊搏  
皆病視在何部而分之其藏心脈微滑為心病肝脈  
滑為癩疝腎脈滑之痿癘大急沉為腎疝肝脈大急  
沉為疝疝心脈搏急為心病肺脈沉搏為肺疝脾脈  
緊為脾疝寸弦而緊弦緊相搏為寒疝跌阳虛遲為  
寒疝

丹溪曰疝氣率九連小腹而痛也有痛在臑九者痛  
巨樞穴也者皆足厥陰之經也或無形無聲或在形  
如瓜有聲如蛙自素問而下皆以為寒蓋寒收引經  
絡得寒則引而不行所以作痛然亦有踢冰激收經

身不病此者無熱在內故也大抵此病始於濕熱在  
經過而至久得寒氣外束不得疎散所以作痛若只  
作寒論恐為未恰或曰厥陰經溫熱何由而致余曰  
大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於  
腎大怒則火起於肝積之已久子能令母虛溫氣便  
盛濁滯凝聚併入血絡流於厥陰厥陰屬肝為將軍  
之官其性急速火性又暴為寒所速宜其痛之大暴  
也嘗以烏頭梔子作湯服之其効亦敏後因此方隨  
形症加減無不驗但熱又分多少而治溫則腫多癩  
病是也其痛亦輕但重墜牽引耳



守効丸 治癩之要藥不痛而鎮墜

蒼朮 一斤 南星 八分 半夏 八分 白芷 五分

川芎 五分 枳實 五分 山查 三分

為末糊丸如菜豆每服五六十丸空心下

秘方 治諸疝

枳實 五分 梔子 一分 萊菔 五分 檣子 一分

山查 五分 桃仁 五分 青皮 一分 荔枝 八分

桂枝 三分 有瘀血加川烏 二分 水煎服

止痛附子湯 治疝氣作痛

蒼朮 香附 俱鹽炒 黃柏 各為 青皮

益智 桃仁 玄胡索 已上為臣 茴香 炒

附子 鹽炒 甘草 已上為使

為末作湯服後一痛過更不再矣

手疔愈痛方 治疝氣疼痛不止

柴胡 君 黃芩 炒 臣 香皮 君 小茴香 炒 君

甘草 使 梔子 炒 君 香附 臣 玄胡索 臣

山查 臣 黃柏 炒 臣 枳核 臣 荔枝 臣 川練肉 佐

水鐘羊煎八分空心服後丸藥除根

丸藥方

生地 熟地 當歸 白芍 煨 知母 五味子



黃柏炒 香附制 山查 玄胡索 各等分

為末 糊丸如梧子大 每服三四丸 空心茴

香湯下

玉環笑來散 治小腸疝氣其効如神

荔枝四十九粒 陳皮連白九分 硫黃四月共為末

用鹽水煮糊丸如菘豆大 過痛時空心酒服丸

丸良久再服不過三服見効 痛則仍服之又能

治心氣痛

鄙續

寒疝者囊冷結硬如石 尿莖不牽或控舉凡而痛者

是也 水腎者腎囊腫痛 尿汗時出囊或腫如水晶或  
痒而瘞出黃水或小腹按之作水声者是也 筋疝者  
尿腎莖腫脹或膿或痛 裡筋縮或莖中痛外痒或挺  
後不收或白物如水晶出者是也 血疝者其狀如黃  
瓜在小腹而傍橫骨兩端 約中俗云便癰也 氣疝者  
上連背軀下及尿囊或因號哭忿怒氣鬱而脹以針  
出氣而愈也 狐疝者其狀如卵卧則入腹行出囊中  
狐則昼出穴而溺夜則入穴而溺 此症如狐相類也  
癰疝者尿囊腫絕如弁如斗不痒不痛得之地氣早  
濕故江淮人多有之也



醫門秘旨卷之十

婦人科

產前

脉經云男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉實左左浮大在右右女左男可以預剖離經已至沉細而滑陣痛連腰胎即時脫血瘀眩急而大者生虛小弱者即是死形羊產漏下革脉主之弱即血耗立見傾危又曰左手沉實為男右手浮大為女左右俱沉實生二男左右俱浮大生二女脉左偏大為女左右俱大產二女脉俱浮生二女若俱沉生二男大抵



以尺脈為主

論

經脈不行多有脾胃損傷而致者不可便認經閉血  
死輕用通經之藥有此症須審其脾胃少食惡食泄  
瀉疼痛或因誤服汗下致尅傷於中氣以致血而不  
行者只宜補養用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃  
芪陳皮麥芽耳草撫芎當歸柴胡等藥土甚則生血  
而經血自行矣又飲食積滯而損脾胃亦宜消積補  
脾若脾胃無病果有血塊凝結方以行血通經之劑  
張子和云大凡婦人難產者皆因燥瀆紫欬故產戶

不得閉通宜先於降誕月自月之日用長流水調  
元散日進三服生必易產后亦無虛熱之症血不和  
之疾未入月不宜服以滑石滑胎故也

丹溪曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然  
調不通之中有無疼痛有無熱此分為四也然四  
者之中者細推之不調之中前者不及有過月者為  
虛不及者為熱也不通之中有血滯有血枯血滯宜  
破血血枯宜補血疼痛之中有常時作痛有經前經  
後作痛者則常時經前作痛為血積經後為血虛也  
熱之中有常時熱者則常時血虛有積經行在



血虛為熱也此謂而有八焉大抵經病內因憂思怒怒外因飲食停滯何則人之氣血週流忽因憂思怒怒所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經後不調不通作痛皆此之所由也調氣而破血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱治之有道也收抑嘗知氣行血行氣止血止余故治血病以行氣為先香附之類是也

有驗方

治蕭秀才乃正行經未及二日有鬱受寒腹并背痛將死一服即安故著之

桃仁君 去 皮 尖

赤芍君

牛膝君 去 芦

婦尾君 洗

紅花君

陳皮臣 去 白

青皮臣 去 穢

紫蘇臣

木通臣 去 皮

藿香臣 去 穢

香附臣 制

川芎臣

白朮臣 去 皮 土

五苓臣 去 皮

桔梗臣 去 穢

水鍾羊煎八分八炒炙脂空心溫服

益母飲

治王友乃正月內四肢拘牽語言蹇滯一服安

防風君 去 皮

荆芥君

益母草君

當歸君 洗 身 尾

酒

薄荷臣 去 皮

陳皮臣 去 白

半夏君 湯 泡

赤芍臣 去 皮

藥

茯苓臣 去 皮

白芷臣 去 皮

香附臣 制

枳殼臣 去 穢

麩

甘草使

川芎使

童便一 盞



水鍾羊姜三片煎八分入童便批服

女聖凡 治女子婦人諸症屢効

香附米 一斤分作四製

一分鹽 水姜汁浸透煮熟罌炒  
主降火清痰誠下部血

一分水 醋浸透煮熟罌炒  
主欬氣補血

一分童 便浸七日洗過不燥隔乾  
主降陰火退虛煩

一分山 梔 仁四刀同炒去梔仁不用  
主降火清肺熱

石為末各重四刀淨拌勻酒糊丸如梧子大每  
服六七十丸隨症換引下

古云女中之聖藥以其氣香則窺無滿氣也味苦

則降無邪火也其性勇毅發暢可解婦女鬱結多

怒偏本草只言益母世俗都言耗氣男子不敢服

經水過期酒下 血滯紅花煎湯下

頭暈薄荷湯下 胎前諸病艾湯下

產後諸病當歸川芎各一錢煎湯送下

晚滿脹姜湯送下或荆芥加姜汁亦可

白帶小茴香或不香煎湯送下此症非冷乃自

庚辛金來主忿怒氣所致也其餘病

症與男子同隨意用引不能者只用

流白湯送下



豆酒湯 治婦人女子反張

大豆 五升 清酒 一斗 將豆為末用錫猛火炒豆煙

以酒搽之去渣熟服

崩漏

論

婦人赤白帶下之症多是怒氣傷肝夫肝屬木脾屬土肝邪乘脾木氣尅土則脾受傷而有濕濕而生熱熱則流通所以滑濁之物滲入膀胱從小便而出古人作濕寒而以辛溫之藥治之者非也而丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者是也雖古人曾用辛溫之

劑而愈殊不知用苦寒之藥是正治之法也用辛溫之藥是後治之法也蓋濕熱拂鬱於內肚腹疼痛赤白帶下非辛溫之藥後治而能開燥乎然濕熱未嘗拂鬱但止赤白帶下而無腹痛之症不若用苦寒之藥并治之為當也

丹溪辯 帶下 赤屬血 白屬氣 主治燥濕為

先漏與帶俱是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜并提甚者上必用吐以提起氣下用二陳湯加蒼朮白朮仍用瓦疋子又曰赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分肥人濕痰海石半夏南星黃柏用芳



蒼朮椿皮一方無椿皮用青黛瘦人白帶少如有者  
 是熱用黃柏滑石川芎海石椿皮若無海石蛤粉亦  
 可又一方青黛作丸子服  
 赤白帶下炒黃荊子為末酒調下二錢米湯亦可又  
 治心痛羅先生法或十棗湯或神祐丸或玉炷散皆  
 可服實者可行虛者不可峻攻若血虛者加四物湯  
 氣虛者參朮陳皮間與之溫盛者用潤腸光相火動  
 於諸藥中少加黃柏滑加龍骨石脂帶下者加葵花  
 花白者治白帶性燥者加黃連若痰氣滯下蒼朮香  
 附滑石蛤粉半夏茯苓為末丸服寒月少加乾姜煨

稅應便服藥必須斷厚味

香附丸

屢驗

治女人怒氣傷肝諸症及經不調之疾

香附半斤四月重便制四月米醋制 貝母去心一月  
 半夏巨冬或一宿晒乾為末忌食 枳實去穢炒乙日 桑葉炒日半  
 甘草去粗皮五冬 枳壳去穢炒乙日 白朮土炒日半

平肝調經加 柴胡去芦 黃連炒六冬

青皮去穢二月 各為末瓦米糊丸如梧子大每服

五六十丸食後滾白湯下如飲食少進麥牙煎  
 湯送下



蚕沙散 治月信不通

用蚕沙不拘多少搗水服即通

通經丸 治婦女經事不通脘腹疼痛或成血瘕

義水炮 婦尾酒洗 青皮 桃仁去尖 乾漆炒去烟

乾姜炮 桂心等分 大黃 川烏 川椒炒出汗

右為末將一羊用酒熬成膏和餘末一半盛石

白中杆為丸如梧子大每服五十丸醋湯或酒

空心送下

煨腎散 治白帶屢効

用猪腰子一對切開去筋膜分為兩片內用竹刀

碎剉開一副入天麻三分麻孔位於尾銚內香油

煎訖空心用無灰酒下

當歸活血湯 治經血氣滯逾期

白茯苓去皮 赤芍 天門去 麥門各二不去心

香附酒浸 歸尾酒洗 生地酒洗 熟地各七不酒洗

蒲黃系 川芎 白芷各五分

水鐘半煎八分空心服

活血通經飲

治經水不通年久身體蒸熱將成乾血癆之疾

桃仁去尖 柴胡去芦 黃芩炒 赤芍 三稜



菽木醋炒 玄胡 各二分  
厚朴姜製 牛膝 去芦  
歸尾酒 蘇木 各二分  
牡丹皮 各一分  
紅花 五分

同煎服

當歸飲 專治經水不通

歸尾酒洗 玄胡 牛膝 去芦  
赤芍 桃仁 去尖

紅花 蘇木 各一分  
甘草 桔梗 各二分  
澤瀉 三分

生地 无灰酒 川芎 條芩 各五分  
香附制 白朮

柴胡 去芦 乾漆 炒 各七分  
三稜 煨 莪朮 煨 蒲黃 生

五灵 各八分 牡丹 陳皮 各六分

同煎服

愈崩散 治血山崩又治心胃痛

用羊糞燒灰存性每服三錢空心流白湯調下

通滯飲 治婦人經水不通

蘇木 紅花 桃仁 去尖 赤芍 牛膝 洗

三稜 醋炒 莪朮 各七分 玄胡 大黃 各八分

水鍾手煎八分空心服

活血平肝湯 治赤白帶下及血山崩

當歸 酒洗 條芩 炒 各一分 川芎 少許 地榆 炒 一大撮

白芍 煨 黃連 炒 香附 制 各八分 柴胡 去芦 青皮 各七分

生地 各半酒 同煎服



川歸湯

治血少氣滯經閉不行

當歸

酒洗

午滕各二斤

熟地

酒洗

香附

各八分

青皮

陳皮

去白

蘇木

紅花

川芎

各七分

甘草

二分

白茯苓

六分

白朮

五分

同煎服

歸髮散

治血山崩

用婦人油頭髮

千年石灰

歸身 各一斤 酒洗

石為末用無灰酒調服

管仲湯

治血山崩漏之疾

烏梅

去核

三斤

上

不

羊生

干熟

管仲

制過去毛

用酒水各一鍾煎湯露一宿溫服

定風膏

治赤白帶下

定風草為末猪腰子一對用竹刀畫開搽上藥末

香油煎熟好酒服下如不知定風草以天麻代之

愈紅散

治血崩

用棉花子不拘多少燒存性每服三錢空心無灰

酒送下二三服即安

又方用水耳焙焦為末每服三錢空心白酒調下

二三服即安桑樹上耳尤効

催生

催生丹

療產婦生產不順產育甚難或逆或大



十二月兔腦去膜碾如泥通明乳香研碎母丁香  
各乙麝香二分半各末拌勻入兔腦髓和丸如芡  
實大阴乾細紙密封臨產服一丸溫水送下男  
左女右手甲握藥出神驗  
砂午散 催生神驗

治婦人五七月孕因事槩磕着胎或子死腹中  
惡露下疼痛不已口禁欲絕用此藥探之若不  
損則痛止子母俱安胎損便隨下

常歸酒洗川芎四不水鍾半煎令泣欲乾入酒一  
大盞止煎一沸去渣溫服口禁灌之如人行五

里再服不過二三服便生

催生方

鴿糞二把皮硝一匕百草霜二把童便一大鍾

用白酒二鍾煎至一鍾胎死用此方活者減半  
服即生

又方 白芷三不燒存性 滑石一不 百草霜相干不

右為末童便調下

又方 用黃葵子一合炒細酒下

昔方序及竈胎死腹中余以此與服即下

催生灸法



急於產母右腳小指尖頭以艾灸如麥粒大三壯  
三產并胎衣下下者用此法屢効

順生湯

當歸酒洗厚朴五分枳殼六分甘草三分  
蘇葉五分貝母一分荆芥一分川芎一分  
黃芪八分羌活五分芍藥二分兜糸子一分

右因女人難產甚有七八日生不下者而製此  
方以調飲食順生育又不催生又不妄胎臨產  
之月二三服听其自然不拘橫生倒產血運明  
晚無乳血塊疼痛等症并皆治之每服用水二

鍾姜三片煎八分食遠熱服

產後

產後三〇發熱〇惡寒〇血運

脉經云黑氣起及衄者危發喘者不治

丹溪曰產後當大補氣血雖有他症以未治之

者死又曰產後發熱惡寒皆是氣血虛甚左手脉不

是尋用補血藥右手脉不足尋用補氣藥切不可表

如腹痛當去惡血若腹滿者非惡血也

紅棗湯 治產後笑不止即血燥上冲

用小紅棗不拘多寡甘草煎湯任意服



止運方 治產後血虛自汗反張

用荆芥穗瓦焙乾碾細末或酒煎炒豆汁下或童便亦可

逐汚湯 治小產後胞痞血氣痛不上作嘔作渴

當歸 酒洗 赤芍 藿香 各七分 人參 五分 玄胡 六分

熟地 生地 各酒 枳壳 各六分 川芎 七分 耳草 二分

麥門 四分 加桂 少許 水鍾半煎八分食遠溫服

澤蘭散 治產後咳嗽

川澤蘭為末每服二三錢酒調下切

當歸破血湯

赤芍 白朮 土炒 蘇 紅花 桃仁 各七

川芎 陳皮 香附 童便 牛膝 各八分 乾姜 炮

肉桂 枳壳 各五分 歸尾 各半 無灰酒洗

水鍾半煎八分空心熱服加無灰酒一杯為引

益母丸

用益母草不拘多少即荒蔚子其葉類火麻對節而生方梗四面四五月有節節間開花紫色處必有之此草生二種白花者不是於端午小暑或六月六日花正開時連根採採陰乾用時忌鐵器用石臼搗為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸各



照後開湯引送下若量加全當歸赤芍尤妙其藥  
不限九數以病愈為度日服三五次如梧子大者  
每服七十九若熬膏尤佳治法於後

煮熬膏法

益母草不拘多少依前法採洗淨入石臼內搗爛  
漚取汁入砂鍋內文武火熬成膏如黑沙糖色為  
度入磁礮內收貯每服用一匙妙

胎前腹痛刺痛胎動不安下血不止者水煎秦  
芫米湯送下或當歸湯亦可

胎前產後腹痛作聲或寒熱往來狀如瘧

疾者溫米湯送下

胎產并產後各先用一丸重便酒下安魂定魄  
氣血自然調順諸病不生又能破血痛養脈  
息調經絡功效如神

產後胎衣不下落在胞中及產前一切產難橫  
生死胎經日不下脹滿腹中心悶疼痛者炒  
鹽湯送下即順

產後中風牙關緊急半身不遂失音不語者童  
便無灰酒各半調下

產後氣喘咳嗽胃膈不利惡心吐酸水面浮



暈兩脇疼舉動失力者溫酒送下  
產後兩太陽穴痛呵尺心忪氣短肌體羸瘦不  
思飯食血風身熱手足頑麻百節疼痛者溫  
米湯送下

產後眼前黑暗血運血熱口渴煩悶如見鬼神  
狂言不省人事者薄荷自然湯下如無生汁  
濃煎乾薄荷湯及童便酒各半送下

產後面垢顏赤丘心煩熱或結成血塊腹痛奔  
痛時發寒熱有冷汗者童便酒各半送下溫  
薄荷湯亦可

產後餘血惡露不尽結滯腹痛刺病惡物上吐  
心胸滿悶者童便酒各半送下

產後未經滿月血氣不通咳嗽不止四肢無力  
臨臥自行月水不調久而不治則為骨蒸之  
病者童便好酒各半送下

產後大小便不通煩躁口苦薄荷自然汁下如  
無解者乾薄荷煎湯亦可

勒妳痛或成癰為未水調塗乳上一宿自愈或  
生搗爛敷上亦可  
血山崩漏者糯米湯送下



產後鼻衄口乾舌黑者童便酒各半送下

產後痢疾湯下或木香湯亦可

產後瀉血者水煎紅蓮湯送下

產後赤白帶下者阿膠煎湯下

婦人久無子息者每服溫酒下一丸服至一月

大有効驗

產切雖多有胎者不宜多用尤恐動胎余故書

之於此後學當照古方斟酌用之勿泥可也

治脫胎方自製屢驗

黃芪蜜炙 白朮

白芍煨

生地各一各

人參去芦 陳皮

桑苓炒

青皮各七分

川芎 升麻各六分 香附八分

當歸一各 酒洗

柴胡去芦 黃柏各七分 炒

水鍾半煎八分空心熱服四劑見効

### 通神散

馬鳴肝即晚蚕 香附子半斤 先將香附入砂鍋

內炒令青煙起將濕手巾蓋覆又炒取一箇大

者折斷輕虛中存一星方入馬鳴肝同炒存性

為度以紙鋪於地下傾藥於紙上以磁盆蓋一

時去火毒為細末所用

炒時春夏存烟候  
秋冬尽烟候




如婦人小腹痛加炒過蒲黃三錢黃隔紙二層  
炒為末入前藥內每服一匙隨症用引下  
常服用生地黄四兩取汁生薑四兩取汁合酒  
調服神妙不可尽述

產後潮熱惡露不下童便調服血氣痛單調婦  
尾湯下血氣坤心艾醋湯下

潮熱煩讖語惡露不散不省人事坐地湯加重  
便下 互心煩熱灯心蘇葉煎湯下 惡心不

止藿香生薑湯下 小便疼痛不通滑石末个煎湯下

醫門秘旨卷之十終



東都岡本椿年寫



