產難門
產後門

婦人大全良方

十七之十九

新編婦人大全良方卷之十七

㊀產難門 半月既明須知產難故以次之

產難論第一 夫產難之曲有六所受各異故治療之方不同今具言之以閑世惑

凡婦人以血為主惟氣順則血順胎氣安而後生理和今富貴之家往往保惜產母惟恐運動故羞出入專坐臥會不思氣閉而不舒快則血凝而不流暢胎不轉動以致生理失宜臨產必難甚至悶絕一也且如貧者生育日夕勞苦血氣舒暢生理甚易何俟手藥則孕婦常貴於運動者明矣 次則婦人姙娠已經六七箇月胎形已具而世人不知禁忌恣情交合嗜慾不節使敗精瘀血聚於胞

申致令子大母小臨産必難二也何以知之生下
孩子頭上有白膜一片滯膩如膠俗強名曰戴曰
生兒身有青有黑俗強名曰宿痣此皆是入月交
合所致也如此則不特母病其子亦生浸淫赤爛
瘡瘍俗謂之胎蛆動逾歲月不差可不戒乎　三
則臨覺太早太小揮霍或信卜筮或說鬼祟多方
誤恐致令産母心驚神恐憂惱怖懼又被閑雜婦
人喪孝穢濁之人衝觸若不預為杜絶臨産必難
一也何以知之如偷生之女不正之屬既無産厄
子母均安其理可如　凡臨産初然腹痛或作或
正合日并痛坐婆踈率不候時至便令試水試水
頻併胞漿先破風颯産門産道乾澁及其兒轉便

彥恐産誤

令坐草坐草太早兒轉亦難致令産難四也直候
痛極眼中如火此是兒逼産門方可坐草即令易
産如坐草稍久用力太過産母困睡抱腰之人又
不穩當致令坐立傾側胎死腹中其為産難五也
時當盛暑宜居深幽房室日色遠處閉啓窻戶多
貯清水以防血運血悶血溢妄行血虛發熱之證
如冬末春初天色凝寒宜密閉房室窒塞罅隙內
外生火常令暖氣如春仍下部衣服不可去綿方
免胎寒血結母致産難六也　凡孕婦入月斷不
可洗頭方免産難及横生逆産　自明證論

楊子建十産論第二

凡人生産先知此十産證候則生産之婦未無傷

損性命生産之間性命最重幸而孩子易生人不知福萬一有少艱難則復史之間子母之命懸於絲髮但世人所患者惟看生産收生之人少有精良妙手緣此而多有傾性命于因傷痛其事不為無補（外有盤腸産僕添方法在後）

一曰正産

正産者蓋婦人懷胎十月滿足陰陽氣足忽然腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹疼痛極甚乃至腰間重痛穀道挺進絶之漿破血下兒子遂生此名正産

二曰傷産

傷産者蓋婦人懷胎忽有七月八月而産忽至九月十月而産忽有經一年二年乃至四年五年而後産者今獨以十月滿足為正産蓋一人之生陰注陽定各有時日不可改移今有未産一月已前忽然臍腹疼痛有如欲産仍却無事是名試月非正産也但一切産母未有前面正産證候即不可令人抱腰産母亦不可妄亂用力蓋欲産之婦臍腹疼痛兒身未順收生之人却教産母虛乱用力兒身纔方轉動却被産母用力一逼遂使兒子錯路忽横忽倒不能正少皆緣産母未當用力之所致也凡産母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是産母之用力當也若未有正産之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下

生譬如搥茵而助之長非徒無益而又害之此名
傷產

三曰催產

催產者言婦人欲產漿破血下腸腹作陣疼痛其
痛極甚腰重墜道挺逆已見是正產之候但兒却
未生即可服藥以催之忽有經久數日產母困苦
已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥
以助產母之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產

凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血得冷
則凝結而不散因其血之不散以至兒子不能生
下此之一弊為害最深悠悠世人不知覺若冬月產
婦下部不可脫去綿衣并不坐臥寒冷之處當滿
房著火令暖房常有暖氣常令產母背身向火令
腹下腰膝間常有暖氣若背上心前少聞寒冷須
是暖多綿衣以包之晝夜血得熱則流散使兒子
易生此名凍產若產後之間天地少有陰濕寒冷
之氣亦可就房中以微火暖之為妙

五曰熱產

熱產者蓋言盛暑之月欲產之婦當要其溫涼得
所不可因熱恣意取涼而有傷損胎氣又生產之
處不可多著人數功恐人多熱氣逼襲產母蓋人
之血氣得熱則散熱過則損今當夏暑炎熱之盛
而產母氣虛人氣一逼則其血沸溢而血得熱則

上蓋能令產母發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈者緣此而成也此名熱產若值夏月少有清涼之氣陰雨之變產母亦不可任意取涼恐生大病

六曰橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手忽先露其臀此因未當用力而產母用力之過也臍腹疼痛兒身未順則是產母用力一逼遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰卧令看生之人推而入去凡推兒之法先推其兒身令直上漸漸通手以中指摩其肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之復是產母仰卧然後推兒直上徐徐正之候其身正門路皆順煎催生藥一盞令產母喫了方可令產母用力令兒下生此名橫產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

七曰倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉順生便只直下先露其足也治之之法當令產母於床上仰卧令看生之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經久不生却令看生之人輕輕用手內人門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸漸順下直待兒子身轉門路正當然後煎催生藥令

產母胞一蓋後方始用力一送令兒生下此名倒
產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣
其愚以傷人命

八曰偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正却被
產母用力一逼致令兒頭偏柱左胞忽偏柱右胞
致令兒雖近人門而不能生下但云兒已露頂然
不知兒之所露即非頂也忽左額角忽右額角而
已謂兒頭偏柱一畔以此不能生狀之法當令
產母於床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上以
手正其頭令兒頭項端正向人門然後令產母用
力一送即便兒子生下若是小兒頭之後骨偏柱
艱道即令兒却只露額當令看生之人以一件綿
衣多令温暖用裹手急於艱道外旁輕輕推兒頭
令正即便令產母用力送兒生也此名偏產凡於
艱道外旁推兒頭正須推其上而正之仍是小用
輕力推些上兒而正之也若看生之人非精良妙
手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

九曰礙產

礙產者蓋言兒身已順門路俱正兒子已露正頂
而不能生下蓋因兒身回轉肚帶牽其肩以此露
正頂而不能生此名礙產狀之法當令產母於
床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手
以中指按兒眉下其肚帶也仍須候兒身正順方

令產母用力一送便兒子下生此名礙產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

十曰坐產

坐產者蓋言兒子之欲生當從高處牢繫一條手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非令產母臨生兒時坐著一物此名坐產若是產母兒特欲生却令坐著一物即抵著兒路不能生也

十一曰盤腸產 續添

趙都運未人每臨產則子腸先出然後產子產子之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在建昌得一坐姿施之一法而收之其法遇產復子腸不收之時以醋半盞新汲冷水七分碗調停噀產婦面每噀一縮三噀收盡此良法也後学不可不知

治推腸生方又名盤腸產

右以半夏為末搐鼻中則腸上矣

又方 以大紙撚以麻油潤了點燈吹滅以烟熏產婦鼻中腸即上矣

又方 以單麻子十四粒去殼研如膏貼產婦頭頂中心腸即上即拭去

催生方論第三

五行論命以年月日時支干所遇五行所屬相生相值以推人之貴賤其間最切要者時也若林開

命書以年為父母為己身月為兄弟僚友日為妻
妾上官時為子孫帝座蓋人之生也得其時則終
身富貴失其時則終身貧賤信乎人生之時不可
忽也然則人生之時其可催乎殊不知娠有諸生
產之難若臨產起坐既久勞力困乏須妙藥催趁
以救其危當此之時又何暇論其時耶又聖惠方
有推娠婦行年法若行年有與本命相值所產歲
月者即鋪驢馬皮於灰草上令娠婦臨產時踐之
手攀鞍轡頭則易產今之醫者便以此等物為產
臥所需之物誠謬論也其所以然者謂姙婦行年
偶與本命相值於所產歲月慮有諸般艱難之厄
故以此厭禳之取其快速之意耳如或不值則無

用矣今錄催生數方皆名醫士夫歷用良驗者以
幸有緣產室方論曰夫產難者內宜用藥外宜用
法蓋多門救療以取其安也療產難坐草數日困
乏不能生此為世先有病絃絡俱閉所然

催生柞木飲子 治產難或橫或倒死胎爛脹於腹
中此方屢用神妙

生大柞木枝一大握長一尺淨洗寸剉 甘草大者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新沙瓶內以紙五重
緊封之文武火煎至一升半令香覺腹痛便準
備候產婦腰重痛欲坐草時溫溫飲一小盞便
覺心下開豁如覺再渴又飲一盞至三四盞覺
下重便生更無諸苦切不可坐草早及坐婆乱

下手如催生藥只消一服此方至驗乃上葵張
不愚方也

催生如神散 瘴逆產攪生瘦胎兼治產前產後虛
損月脉不調崩漏一名催生黑散一名為金散一
名二神散

百草霜　香白芷（不見火為細末）

右二味等分研停每服二大錢於臨產蓐時以
童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗用
酒童子小便各半盞同煎纔沸即調停熱服甚
者不過再服（血得黑則止此藥大能固血免得乾生其妙在此）

催生如聖散

黃蜀葵花不以多少焙乾為細末熟湯調下
二錢神妙　或有漏血胎臟乾澁難產痛劇
者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下
如無花時只用葵子爛研小半合以酒調濾
去滓溫過頓服尤妙　亦治打撲傷損如胎
死不下煎紅花溫酒調下

用子歌曰（經驗用子四十九粒）

黃金內子三十粒　細研酒調能備急
命若懸絲在須臾　即令眷屬不悲泣

曹秀才方　用葵子一味研墨或研朱砂為衣每
服四十粒溫酒吞下

催生丹 瘴產婦生理不順產盲艱難並宜服之（出聖惠方局方同宣天醫日合）

十二月兔腦髓去皮膜研如泥　母丁香末一錢

麝香一字研細　通明乳香一分研細

右四味拌停以兔腦髓和圓如鷄頭穰大陰乾用油紙密封貼每服一圓温水下即時產隨男左女右手中握出是驗

又方　通明乳香一塊如皂子大

右為末覺腰痛時用新汲水一小盞入醋少許同調扶立令產婦兩手捉兩石燕坐婆飼藥飲之先令妊婦忘醫靈藥聖三遍然後服之仍略扶行數步復更坐草便生更無痛楚神良

經驗方如神開骨膏　乳香不以多少五月五日午時令二人在壁背捧乳鉢在撥上令一童兒以筆管透辭縫內逐粒從筆管中過入乳鉢內研令極細以童兒面北滴水圓如雞頭大每服一粒無灰酒吞下海上方用乳香朱砂等分為細末麝香酒調下

治難產或倒橫不順方

蛇蛻一條全者　蠶蛻紙一張方無

右入新瓦瓶中塩泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯調下一錢三服覺痛便生○一方云臨產腰痛用藥三字麝香一字温酒調下各二妙散

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子十四箇去殼　朱砂　雄黃各一錢半

蛇蛻一尺燒

右為細末漿水飯和圓如彈子大臨產時先用
椒湯淋渫臍下次安藥一圓於臍中用蠟紙數
重覆藥上以闊帛繫之須臾生下急取去藥一
圓可用三次

如聖膏 治難產兼治胞衣不下兼治死胎

用萆麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣
即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸
自縮入如聖之妙一方男用七粒女用十四
粒一方用萆麻子百粒雄黃末一錢同研並
用如前法

寸金散 治產難

用敗兔毫筆燒為灰細研為末生藕汁一盞
調服之產若產婦虛弱及素有冷病恐藕汁
動氣當於銀石器內重湯調溫服

陸氏方云此難產第一方

金箔 三片 兔毫筆頭 三箇燒為灰

右二味和停用蠟為圓如梧子大作一服溫酒
下

又方

大朱砂 應多少端午日曬至百日不得著兩如滿百日取研如粉

右用臘月兔腦髓和圓如菉豆大欲覺產粥飲
下一圓良久使生其藥男左女右手中把出

又方

臘月兔頭 一枚燒為灰

右為細末葱白煎湯調二錢立生

催生兔血散指迷方

臈月兔血蒸餅切作片子蘸之以紙袋盛掛當風處陰乾為末煎乳香湯調下二錢

又方

臈月兔腦髓塗於一張薄紙上更用一張合下褐以秤碓搥三五十下每遇難生看大小書天生兩字作符以醋湯調下極妙

又方

兔皮和毛燒為灰末之以酒調方寸匕服之即產衣不下者服之即下

治橫倒生者或先手足者

明阿膠炒一方用酥滑石末各一兩葵子二合

右水一盞半煎至一盞去滓分二服

治難產五六日不得分挽疲困虛乏者

光明水膠

右用好酒一升半微火溶膠入新雞子一箇塩一錢匕攪溫令產婦坐椅物上伸腰大口作二次服之覺小腹重便生緣坐尊早驚動故也

救產難經日不生

雲母粉半兩溫酒調服入口當產不順者即產萬不失一陸氏方云是何德揚方云已救三五千人却用雲母粉澄遇研細取一團如雞子大臨時以無灰酒調下

治橫逆產理不順子死腹中
伏龍肝細研每服一錢酒調服之以土著兒
頭上戴出妙

廣濟療難產三日不下方
吞鷄子黃三枚并少苦酒服

集驗療橫產及胎死腹中以三姓雞卵各一枚三
姓塩各一錢三姓水共一盞相和煮五七沸分溫
二服令產母東首服之立出

療難產日久氣力乏盡不能生此是宿疾
赤小豆二升以水九升煮熟取汁入炙了明
黃膠一兩同煎少時一服五合未效再服不
過三四服即產

備急方療難產三日不出
吞槐子十四枚即下廣濟方有蒲黃一合千
金集驗崔氏同

又方
當歸為末酒調方寸匕服

催生如意散 臨產腰疼方可服之
人參 為末 乳香 各一錢 辰砂 半錢
右三味一處研臨產之時急用雞子清一箇調
藥末再用生薑自然汁調開冷服如橫生倒生
即時端順子母平善 傳於鄂倅施漢卿屢見
功効

陳氏催生神效七散臨產腰疼不可服之

延胡索　沒藥　白礬
白芷　薑黃　當歸
桂心等分

右為細末臨產陣痛持燒鏵刃鐵（犂頭是也）令通赤淬酒調藥三錢服一二杯立產（此方鳳州四池懸喬醫家貨每服引一道遇一士友楊濟伯密得之屢試屢驗）

催生神妙乳珠丹

乳香研細以猪心血為圓如梧桐子大以朱砂為衣日乾每服一粒如催生冷酒化下良久未下再服一粒如大段難產時以蓮葉心蒂七箇水二錢煎至一盞放溫化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神無有不下者如胞漿先破惡水未多胎乾不得臥時須先與四物湯及通真圓補養其血氣次更濃煎葱湯放冷如體令坐盞洗產户須是款曲洗令氣上下通暢仍更用酥調滑石末塗產户裏次服前催生藥則萬全矣如胎死不下者用黑豆三合好醋半升煮令豆爛取汁一盞放溫化下藥一粒須臾便下矣萬一未下亦可再服如胎下胞衣未下者服此亦便下也若胎橫逆不順即先服如神散方見前再服此藥復以此藥催之合藥時要五月五日午時極妙或七月七日或三月三日及月初上辰日合亦得

小品瘴逆產方　鹽塗兒足底又可急搔爪之并

以塩摩產婦腹上即產

又方　以塩和粉塗兒兩足下即順矣

集驗方療逆產　燒錢令赤納酒中飲之

又方　取夫陰毛二七莖燒以猪膏和圓如豆大水吞下兒手即握出神驗○刪繁療產難方取車軒中膏書脇下及掌心崔氏文仲小品千金集驗備急同

療逆逆胞衣不出方　取竈屋黑塵研為細末酒調方寸匕　一方用梁上塵

張文仲療橫生逆產脹諸筲藥不捷者灸右脚小指尖頭三壯艾炷如小麥大

小品療橫生倒產手足先出方　並出外臺

用粗針刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回順　文仲備急千金崔氏集驗同

橫產逆產二條其理雖別療法蓋同可以意量逐善參用也

郭稽中產難方論第四

論曰產難者何胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難產但服勝金散逐其敗血即自生若逆生橫生並皆治之

勝金散方

麝香一錢研　塩豉一兩以舊青布裹了令赤急以乳鉢研細

右為末取秤錘燒紅以酒淬之調下一大錢

陳無擇評曰產難不只胎側有兒枕破與敗血裹

凝傷其胎息因緣自有難易其如橫逆多因坐草太早勞力過多兒轉未逮或已破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫法當以針刺之使自縮入即服神應黑散以固其血必自轉生　養生方云倉皇之間兩命所係不可不廣傳蓋贊黑散之功也或以塩塗兒脚底抓搔之

神應黑散方　見前即催生如神散

產難子死腹中方論第五

夫產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難皆因穢汚先下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死腹中其候產母舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐卧須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多招災禍也

治姙娠三五箇月胎死在腹內不出

大腹子　赤芍藥　榆白皮各三兩

當歸一兩炒　滑石末三分　瞿麥

葵子炒　茯苓　粉草

子芩各半兩

右為粗末每服四錢水一盞並至七分去滓不拘時溫服

療死胎腹內不出母已危殆不得已者立效方

水銀半兩　桂末一錢

右只作一服溫酒調下粥飲亦可

又方

以利斧煅赤置酒中待温飲之其子便下

治姙娠胎死下腹中候其母面赤舌青者是宜

錫粉圓 出迷指

錫粉 水銀各一錢

右同研不見水銀為度以棗内和圓如豌豆大

煎瞿麥湯吞下

十全博救療胎死腹中

以好辰砂一兩水煮數沸研令極細酒調二

錢服

又方

以雞子黄一枚用薑汁一合調雞子黄令均

頓服分挽後喫芸薹粥良

趙和叔傳下死胎方

桂心末二錢 麝香當門子一箇

右同研温酒調服須臾如手推下比之用水銀

等藥不損血氣

何氏方無麝香每用桂末二錢痛陣密特用温童

子小便調下名觀音救生散兼治産難及横倒生

療胎死腹中不出母欲絶

水銀二兩頓吞之兒立出

又方

用水銀如彈子大以棗肉均研和如大豆許

水吞下立出

救急治子死腹中

取夫尿二升煑令沸飲之

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不產血氣上盪心毋面無顏色氣欲絶方

猪脂煎　白蜜各一升　淳酒二升

右三味合煎取二升分溫兩服不能飲隨所能服之

又療子死腹中不出　以牛屎塗毋腹上立出

崔氏療胎死

甘草一尺　蒲黃二合　筒桂四寸

香豉二升　鷄子枚

右細切以水六升煑取三升頓服胎胞穢惡盡去大良

產經數日不出或子死腹中毋氣欲絶

瞿麥六兩　通草　桂心各三兩

牛膝四兩　榆白皮一升

右㕮咀以水九升煎取三升去滓分溫三服

一字神散　治子死胎不胞破不生此方累有効救人幾萬數

鬼臼不拘多少黃色者去毛碾為末以手指撚之如粉極細為度每服二錢用魚灰酒一琖同煎至八分通口服立生如神此藥不用羅只碾令極細

鄧知縣傳方療死胎不出

扑消為末每用二盞溫童子小便調下知洪

州進覽曽通仕定求云昔為豊城尉時有猫
孕五子一子已生四子死腹中啼喚欲死試
問醫者今用此藥灌之死子即下猫得再生
後有一牛亦如此用此法亦治醫云本治人
方用以治畜也後因以救人無不驗僕為兒時嘗有
一親戚胎死腹中不下數日百計已窮記憶我先人用朴消半兩研細以童子小便調下
胎即落矣

治死胎不下其證指甲青舌青脹悶甚者口中作
屎臭先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞
同煎至一盞却投朴消半兩研細再煎三五沸傾
出候微溫服盡其胎即化血水而下
緣宅厥息孺人杜氏生產數日不下坐婆魂童救
療皆無効召僕診之僕曰產前脉不可考但當察
色而知之遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青
見此色者知胎已死母却無憂矣或問曰何以知
之子答曰面赤舌青者子死母活明矣併自合至
寶丹二粒服之胎即落矣以此見古人屢方神速

至寶丹 方見和劑方

產難生死訣第六

欲產之婦脉離經難經云一呼三至曰離經此是陽加於陰二倍一呼一至亦曰
離經此是陰加於陽四倍也註曰經者常也謂脉離常經之處細而言之一呼脉再至一吸脉再至
曰平和之脉一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸一日一夜一萬三千五百息脉
行八百一十丈乃為一周復從始之經再行今一呼脉三至一吸脉三至呼吸定息脉行九寸一日
一夜脉行通計一千一百一十五丈過次平脉之數不在所起之經再起故曰離經若一呼一至脉

行寸半一吸一至脉行寸半呼吸定息脉行三寸一日一夜通計脉行得四百單五丈乃為一周是不及平脉之數周而復始亦不在行起之經再起亦曰離經也沉細而滑也同名臨產之婦脉見沉細而滑者乃胃藏本脉之形然胃繫胞胎見此脉者亦與離經之脉同名也夜半覺痛應分誕來日日午定知生若姙婦夜半時覺得腹痛定知來日午時當分挽也聖惠方云夜半子時覺腹痛來日午時必定生產謂子午相對正半日時數也身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥凡姙婦身體沉重者胃氣絕也又體熱寒慄頻併者陽氣衰陰氣盛也若舌根下脉見青黑色及舌反卷上氷冷不溫者子母俱死之候面赤舌青細尋看母活子死定應難凡姙婦而色赤是栄氣流通母活之候舌上青色是姙脉絡絕胎死之候唇口俱青沫又出子母俱死總高判若姙婦唇口俱青色者栄衛氣絕也又口中吐出痰沫者是脾胃之氣俱絕此見子母俱死之候也面青舌青沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳凡姙婦面與舌皆青色又頻吐痰沫者是產母栄衛俱絕胎氣衛上之候此是子活母死之候產下子母必死也此古賢哲應驗之文不虛妄其說也新產之脉緩滑吉實大弦急死未親凡婦人新產之後其脉來緩滑者為氣血通和是生活安者之脉也若見實大弦急之脉則凶必死之脉若得沉重小者吉忽若堅牢命不停若產婦診得沉重微小者此是形虛脉虛相應故云吉兆之脉忽然診得堅硬牢實之脉是脉盛形衰相反性命不可停留必死也寸口澁疾不調死若產後診得寸口脉澁疾大小不調勻者此是血氣衰絕之脉故云死也沉細附骨不絕生若重手按之乃得其脉沉細附著於骨不斷絕有力者此生活之兆也審看此候分明記長須怎此向心絃凡為醫者宜詳審脉證分明記於心胸也

王子亨云凡產後諸疾最忌脉大

新編婦人大全良方卷之十七

新編婦人大全良方卷之十八

產後門 產難既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一 周遵論併在其中

論曰凡婦人生產畢日令飲童子小便一盞不得便卧且宜閉目而坐須臾方可扶上床仰卧不得側母宜立膝未可伸足高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔障免被賊風無時時令人以物從心擠至臍下使惡露不滯如此三日可止仍不可令多卧如卧多看承之人宜頻喚醒舊說產婦分娩了三日方可上床若三日上床則必就地睡卧又豈可令產婦近地氣乎 纔生產畢不得問是男是女且先研醋墨三分服之一法云不可服醋墨有傷肺絰

成欬嗽之戒誠過慮也然醋墨本破凝結之血然不可用大釅之醋仍不可太多即不至傷肺然所在皆同亦有不喫者更產後三日內令產婦嘗聞醋炭氣或燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之以防血逆血迷血運不省之患夏月宜於房門外燒磚以醋沃之置於房中（夏月房中不須著大火及煮粥並藥之類）分晚之後須臾旦食白粥一味不可令太飽頻少與之為妙逐日漸增之煮粥時須是煮得如法不用經宿者又不可令溫冷不調恐留滯成疾仍時與童子小便一盞飲之（亦須先備小便若遇夏月以薄荀養之）新產後不問腹痛不痛有病無病以童子小便以酒和半盞溫服五七服妙一瞗（七日也）之後方可少進醇酒并些小鹽味一法總產不得與酒緣酒引血逆入四肢兼產母臟腑方虛不禁（平聲）酒力熱酒入腹必致昏悶七日後少進些酒不可多飲如未出月間欲酒喫或服藥者可用淨黑豆一升炒令烟出以無灰酒五升浣淋之仍入好羌活一兩（洗淨栢破）同浸尤妙當用此酒下藥或時時飲少許可以辟風邪養氣血下惡露行乳脉也如產婦素不善飲酒或夏月之間亦不須強飲一瞗之後恐喫物無味可爛煮羊肉或雌鷄汁略用滋味作粥飲之或喫爛煮猪蹄肉（忌母猪及白脚猪肉）不可過多（今江浙間產婦多喫熟雞子亦補益亦風俗也）三月之後方可少食溫麵（食麵早成膧疾）凡喫物過多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚恐憂

惶哭泣思慮恚怒強起離床行動久坐或作針線
用力工巧恣食生冷粘硬菓菜肥膩炙肉之物及
不避風寒脫衣洗浴或冷水洗濯當時雖未覺大
損滿月之後即成蓐勞手脚及腰腿疼重今痛骨
髓間颼颼如冷風吹繼有名醫亦不能瘴大都產
婦將息須是滿百日方可平復大慎觸犯此多致
身體強直如角弓久張名曰蓐風遂致不救又不
得夜間獨處緣去血心虛恐有驚悸切宜謹之所
有血衣洗濯不得於日中曬曝免致邪祟侵傷又
不得濯足恐血氣攻下又不得刮舌傷心刷齒及就
下低頭皆成血逆血運此產家謹護之常法也滿
月之後尤忌任意飲食觸冒風寒恣意喜怒梳頭用

力高聲作勞工巧房慾詳見產後通用方第一及上高廁便
溺之類如此節養攝至百
平復自然安帖設不依此即致
虛羸失於將補便成大患終身
疾不論巨細後並有方
人非止臨
不得恃身體和平取次為之乃
山岳知命者可不

恐因藥致疾不可不戒（如四物湯四煩理中圓內補當歸圓當歸建中湯）或產婦血盛初經生產覺氣悶不安者調七寶散（在十九卷第二論中）服之若寧帖不須服若三日後覺壯熱頭痛胸腑氣刺者不可便作傷寒傷風治之此是乳脉將行宜服玉露散一二服（如無此證不須服）若因床帳大暖或產婦氣盛或素多喜怒覺目眩暈如在舟車精神鬱冒者此是血暈即須服血暈藥一二服止（方見本卷第五論）仍須看承之人照管問當也或覺粥食不美虛困即服四煩理中圓一二服（若不知此不須服）若於兩三日間覺腹中時時撮痛者此為兒枕作痛必須服治兒枕藥一二服（方見第二十卷）若大便秘或小便滋切不可服通利藥以其無津液故也若投通利之藥則滑泄不禁不可治也切須戒之若秘甚必欲通利方可服和暖藥即通（方見第二十三卷第二論）

產後通用方論第三

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百病滋長慎之○凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也○凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩三日消息可服澤蘭圓比至滿月丸藥盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭圓補之服法必七日外不得早服也○凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病竟起迄至於死百方瘴不能差桃仁

並主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一二劑以至年內常將服之佳

黑神散 治婦人產後惡露不盡胞衣不下坎衝心胸痞滿或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

麩乾地黃　蒲黃炒　當歸

乾薑炮　桂心　芍藥

甘草各四兩　黑豆炒去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同並調服

烏金散 治產後十八疾方論方與局方黑神散同有人選集為詞訣十八首言語俚故不錄

一曰產後因熱病胎死腹中者何但服烏金散

二曰產難者何但服烏金散　三曰產後胞衣不下者何但服烏金散　四曰產後血暈者何但服烏金散　五曰產後口乾心悶者何但服烏金散　六曰產後乍寒乍熱者何但服烏金散　七曰產後腫者何但服烏金散兼朱砂圓　八曰乍見鬼神者何但服烏金散　九曰產後月內不語者何但服烏金散　十曰產後腹內疼痛兼瀉者何但服烏金散兼用止瀉調氣藥　十一曰產後遍身疼痛者何但服烏金散　十二曰產後血崩者何但服烏金散　十三曰產後血氣不通咳嗽者何但服烏金散

十四日產後乍寒乍熱心痛月候不來者何但服烏金散○十五日產後腹脹滿嘔逆不定者何宜服烏金散次服朱砂圓三二日炒生薑醋湯下七圓○十六日產後口鼻黑氣及鼻衄者何論同此證不可治○十七日產後喉中氣喘急者何論同十死不治○十八日產後中風者何但服烏金散

已上論與郭稽中二十一論問答同故不詳錄

桃仁煎 療暑病婦人產後百病諸氣方

桃仁一千二百枚去皮尖及雙仁熬令黃色

右一味擣令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍如作麦粥法以極細為佳納小長項瓷餅中密塞以麵封之納湯中煑一伏時不停火亦勿令火猛使餅口常出在湯上勿令沒之熟訖出溫酒服一合日再服丈夫亦可服

千金增損澤蘭圓療產後百病理血氣補虛勞

澤蘭　甘草　當歸
川芎各七分　附子炮　乾薑
白朮　白芷　桂心
北細辛各四分　北防風　人參
牛膝各五分　栢子仁　熟地黃
石斛各六分　厚朴　藁本
蕪荑各分　麦門冬去心八分

右二十味為末煉蜜圓如梧桐子大溫酒下二

十圓

產後醋墨

松煙墨不拘多少用炭火煆通紅以米醋淬之再煆再淬如此七度研令極細用絹羅過纔產了喫醋墨二錢用童子小便調下

四味湯 療產後一切諸疾纔分挽喫一服尤妙

當歸 心扁煩加半錢　延胡索 氣悶喘急加半錢

血竭 惡露不快加半錢　沒藥 心腹撮痛加半錢　各等分

右為細末每服各炒半錢用童子小便一盞煎至六分通口服

玉露散 治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目伏痛大便澁滯悉能治之涼膈壓熱下乳

人參　白茯苓　甘草各半兩

苦梗炒　川芎　白芷各一兩

當歸一分　芍藥三分

右為細末每服二平錢水一琖煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半

地黃煎 治產後諸疾

生地黃汁　生薑汁各一升　藕汁半升

大麻仁三兩去殼為末

右和停以銀器內慢火熬成膏溫酒調半匙服更以北朮煎膏半盞入之尤佳　產寶方無麻仁用白蜜治產後虛憊盜汗嘔吐

理中圓 治新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦乏

気多汙纔産直至百時日常服壯氣補虛和養臟
氣齲除餘疾消穀嗜食

甘草二両一方三両　白朮　人參
乾薑各一両

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大温米飲下三十圓空心服纔産了以童子小便打開點服七日内日三服　産乳方云此乃大理中圓加甘草両倍耳然其功比之四味等分大故不同盖取甘味以緩其中而通行經絡之功最勝者也此産婦月内不可闕者出月不復服矣○古方中有婦人補益之藥如大聖澤蘭圓小白薇圓熟乾地黄圓大聖散之類其藥味稍裹而中下之家村落之地卒何以致且藥肆中少有真者不若以四順理中圓易之較其功比澤蘭圓之類主治頗多也

黒龍丹　治産後一切血疾産難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸　五靈脂　川芎
良薑　熟地黄各一両

右細剉以沙合盛赤石脂泥維紙筋塩泥固濟炭火十斤煅令通赤去火候冷取開看成黒糟色取草細研却入後藥

百草霜五両　硫黄　乳香各一錢半
花蘂石　琥珀各一錢重

右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊圓如彈子大每服一圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與童子小便入酒漉出控乾研細只用此酒調下　茂恂熙寧初從事濮上幕府郡之蓐醫胡者為子言數政之前有朱汴水部施黑龍丹凡產後諸病危甚垂死者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行尚有一二粒未之施也先人目三牽謫官淮陽家嫂馬氏蓐中大病醫者康從變投丹立愈訪之乃得於汴也且言每鬻一粒輒受千錢必其獲厚利不欲求之後起守汝海從變餞別一驛臨行出此方為獻每以救人無不驗者盧道原侍郎再帥涇原時姨母姙娠至臨潼就蓐後數日有盜夜入其室驚怖成疾衆醫不能治乃以忱弟嘗遺此藥服之遂安家人金華君在奉生文度數日苦頭痛未止又心痛痛發兩脇上下走注疾勢甚惡昏躁煩憒目視燈如金色勺飲不下服藥甚衆無效忱弟曰黑龍丹可服初以半粒投之即能飲粥而他藥入輒吐出不受覺痛稍緩又投半粒又得安眠自中夜服藥至五鼓下惡物數升頭痛頓減不至食時復下數升渙然醒愈蓋敗血所致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂恂記仲氏嫂金華君在奉產七日而不

食始言頭痛頭痛而心痛作既而目睛痛如割如是者更作更止相去纔瞬息間每頭痛甚欲取大石壓食久漸定心痛作則以十指顧辟血流掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是者十日不已國醫二三輩郡官中有善醫者亦數人相抓無以為計且言其藥犯芎可以愈頭痛犯薑黃可以治心痛率皆悠悠不根之言竟不知病本所起張益因頓醫益術殫于度疾勢危矣非神丹不可愈方治藥而張召予夫婦付以諸于樂仲氏別慘怛不復言予瞋目戒張曰弟安心養疾亟出召伯氏曰事急矣進此丹可予仲氏尚遲遲以兩旬不食恐不勝任黃昏進半粒疾少間中夜再服藥下瞑目寢如平昔平旦一行三升許如蝗虫于三疾減半已刻又行如前則頓愈矣遣荊釵輩視之奄殆無氣午後體方凉氣方屬乃微言索飲自此遂平復大抵產者以去敗惡為先血滯不快乃至是爾後生夫婦不習此理老媼庸醫不能中病所以疾苦之人十死八九大數雖定豈得無夭不遇良醫終抱遺恨今以施人俾終天年非祈于報者所冀救疾苦養生命爾崇寧元年五月五日郭忱序

當歸散 治療產後氣血俱虛慎無大補恐增客熱別致他病常令惡露快利為佳

當歸　芍藥　川芎

黃芩各一兩　白朮半兩

右為細末溫童干小便或酒調下二錢出指迷方又出傷寒括要

周遵傳授濟急方四道

遵嘗見人傳經効諸方自會修合實有大功遂編於卷末普用傳授以濟急難治產後血暈血氣及滯血不散便成癥瘕兼瀉面色黃腫嘔吐惡心頭痛目眩口吐清水四肢萎弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸覺羸瘦年久壹為勞疾如此所患偏宜服勝金圓

澤蘭葉四兩　芍藥　蕪荑仁

甘草　當歸　芎藭各六分

乾薑　桂心各三分半　石膏

桔梗　細辛　厚朴

吳茱萸　栢子仁　防風

烏頭炮　白薇　枳殼

南椒　石頷　蒲黃

石斛　茯苓各三分　白朮

白芷　人參　青木香

藁本各一分

右揀擇上等州土如法修製為末煉蜜圓如彈干大有所患熱酒研一圓入口便愈大忌腥臟熱麪豉汁生葱冷水菓子等若死胎不下胎衣在腹並以炒塩酒研服未効再服

聖散子 治產後諸疾○方與局方 大聖澤蘭散 同但無地黃阿膠桔梗故不錄

黑散子 治產後一切疾神效

鯉魚皮 三兩燒灰　芍藥　蒲黃 各二兩

當歸　沒藥　桂心

好墨　卷柏　青木香

麝香 各一兩　丈夫髮灰　鐺墨 各半兩

右為細末以新瓷器盛密封勿令走氣每產後以好酒調下一錢匕如血暈衝心下血不盡臍下攪刺疼痛不可忍塊血癥疾甚者月加兩服不拘時候忌冷物菓子粘食

保生圓 ○方與局方同却無麻仁有川椒故不復錄

朱砂圓 治產後虛中有積結成諸疾

黑附子　桂心　白薑 各半兩

巴豆 一錢醋浸煮去皮研

右為細末入巴豆研停醋煮麵糊圓如麻子大每服三圓至五圓冷茶下服之取瀉為度

薑粉散 纔產服此蕩盡兒枕除百病

當歸　人參　木香

黃耆　川芎　甘草

茯苓　芍藥　桂心

知母　大黃　草豆蔻

白朮　訶子　良薑

青皮　熟地黃少許　附子重半兩一箇

右降地黃附子外各等分焙乾生薑一斤研取自然汁於椀中停留食久傾去清汁取下面粉脚攤在蒻葉上入焙籠焙乾擣羅為木纔產後用藥三錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分熱服服後產母自然睡著半日以來睡覺再服全降腹痛每日只三服至九日不可服肚中冷也

地黃酒 治產後百病未產一月先釀產訖可服

地黃汁　好麴　好淨秫米各二升

右先以地黃汁漬麴令發準家法釀之至熟封七日取清者服常令酒氣相接勿令絕忌蒜生冷鮓滑雞猪肉一切毒物婦人皆可服之但夏三箇月不可合春秋宜合以地黃汁并滓內米中炊合用之若作一碩十碩準此一升為率先服

當歸湯 後服此妙

地黃圓 治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語心胸脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口內生瘡咽喉腫痛心中忪悸夜不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹疠痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑一方地黃減半當歸一兩延胡索琥珀各一兩各琥珀地黃圓治狀同

生地黃研取汁留滓　生薑各二斤研取汁留滓

蒲黃　當歸各四兩

右於銀石器內用幔火取地薑汁炒生薑滓以生薑汁炒地薑滓各令乾四味同焙乾為細末醋煮麪糊圓如彈子大每服一圓食前用當歸酒化下神妙

琥珀散 治產後一切危困之疾

琥珀　朱砂　麝香

香墨醋炙　白殭蠶　當歸各一分

鯉魚鱗炒焦　桂心　百草霜

白附子　梁上塵炒令煙出篩過秤各半兩

右為細末炒生薑熱酒調下二錢產後一切病服之奇效

黑神散 治產後諸疾如產卧畢切須用童子小便調數服除百病如無小便用白湯亦可或產勞力過度或下血頗多或微熱惡露未遲

馬尾大當歸洗一兩半

右在未產前修製為末如遇產有疾無疾若產了但用童子小便調服令產婦月後並無他證果有神効

療產後雖甚通利唯覺心腹滿悶脇脹咳嗽不能食大便不通眼澁行坐心腹時痛許仁則秘方三道

白朮　當歸　桑白皮

大黃各三兩　細辛　桂心各二兩

生薑四兩

右㕮咀用水二升煎取一升分為三服如人行

七八里久再服此湯當得利利又不宜過多所利者為不獲已而微利之其不然未合今利既初產後覺身皆虛尚藉藥食補之豈宜取利此緣病熱既要不利苟以當塗服湯得通氣息安帖利既未止即便須急取三匙醋飯喫即止止後但復適寒溫將息後取痊復飯食之節量其所宜如利不減宜依後方服之產後不宜輕易便投大黃如不得已後人更斟酌強弱而用之方得穩當

當歸十分　白朮八分　甘草七分
細辛四分　桂心　人參
生薑各三分　桑白皮六分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓

產後血氣不通當時不甚覺如在產出血少皆成癥結心便疼硬乍寒乍熱飲食不進不生肌肉心腹有時刺痛口乾粘手足沉重有此狀者宜此藥

當歸　芍藥　甘草
牛膝　鬼箭羽　人參各五分
牡丹皮　鹿茸　白朮各六分
大黃八分　乾地黃七分　朴消十分
烏梅肉炒　白薇　桂心各四分
水蛭炒　蒲黃各三分　䗪虫十四枚製

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓日兩服外臺有赤石脂十分許公在西京為女秘妙不傳此方於

人後仁則女婿尋得依狀相傳萬不失一餘歆歸本門

產科序論

陳無擇

世傳產書甚多千金外臺會王產寶馬氏王氏崔氏皆有產書巢安世有衛生寶集子母秘錄等備則備矣但倉卒之間未易歷試惟李師聖序郭稽中產科經驗寶慶集二十一篇凡十八方用之頗効但其間序論未為至當始用料理簡辨於諸方之下以備識之者非敢好辨也愚詳產後要病無出於郭稽中二十一論一十八方有益於世多矣子家三世用之未有不效雖陳無擇所評或是或否亦不可不詳而究也且如產後眩暈以牡丹散然其中有大黃芒消沉新產後氣血大虛豈宜輕服又云去血過多而暈者或有之若言痰暈者十無一二又如產後熱悶氣上轉為脚氣不應用小續命湯僕以百問中方加減而用之此活法也故孟子云盡信書則不如無書此之謂也

胞衣不出方論第四

夫有產兒出胞衣不落者世謂之息胞由產初時用力此產兒出而體已癱憊不能更用力產胞絓停之間而外冷氣乘之則血道澁故胞衣不出須急以方藥救治不妨害於兒所奈者胞係連兒臍胞不出即不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊法胞衣不出恐損兒者依法截臍而已產處須順四時方面并避五行禁忌者若有觸犯多令產婦難產雖腹痛者未產也欲腹痛連腰痛甚者即產也所以然者腎候於腰胞係腎故也診其脉轉急如切繩無殊者即產也郭稽中論曰胎衣不下者何答曰母生子訖流血入衣中衣為血所脹

是故不得下治之梢緩脹滿腹中以次上衝心胷疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下而無所患更有牛膝湯等用之甚效錄以附之

奪命丹

附子半兩炮　牡丹皮一兩　乾漆一分碎之炒令烟尽

右為細末以釅醋一升大薑末一兩同熬成膏和藥圓如梧桐子大溫酒吞五七圓不拘時必效方

牛膝湯治胎衣不出腑腹堅脹急痛即殺人脹此藥胞即爛下死胎

牛膝　瞿麦各四兩　當歸一兩

通草六兩　滑石八兩　葵子五兩

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下腹滿即殺人推其源皆是胞衣有血奔心是以不出也或坐婆生疎斷帶收兒其衣失於繫住則帶縮入腹中便不得出宜服此藥衣即爛出也廣濟集驗千金崔氏同

苍藥石散治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭腹急以童子小便調一錢取下惡物如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化為黃水即吐出或小便中出也若先下胎衣則泛泛之藥不能達若先治血悶則尋常之藥無此功無如此藥有兩全之效也

花藥石一斤　上色硫黃四兩

右二味相拌令均先用紙和膠泥固瓦罐子一箇內可容藥候泥乾入藥在內密泥封口了焙籠內焙令透熱便安在四方塼上（塼上書八卦五行字）用炭一秤籠疊周匝自己手時從下生火令漸漸上徹有墜下火放夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹羅至細甆合內盛依法用之（此藥便是療金瘡花藥石散尋常人自宜時時收蓄以防急難至妙）

有一親戚婦人產後胞衣不下血脹迷悶不記人事告之曰死矣僕曰某收得趙大觀文局中真花藥石散在筒中謾以一貼贈之以童便調灌藥下即甦衣與惡物旋即隨下乘興無恙

牛膝散　治姙娠五六月墮胎胞衣不出

牛膝　川芎　朴消

蒲黃（合三分）　桂心（半兩）　當歸（一兩半）

右為粗末每服四錢水一盞薑三片生地黃一分並至六分去滓溫溫頻服

胞衣不出若腹脹則殺人

黑豆（一合炒令熟）

右入醋一盞並三五沸去豆分為三服酒煮亦可

必効方療胞衣不出方　服蒲黃如棗大集驗千金崔氏同

又方以生地黄汁一升苦酒三合煖服之
救急一方 見子死腹中論中
又方 以水噀産婦面神驗
延年方 以洗兒水令産母飲半錢其衣便下勿
令産婦知
又方 牛膝一兩 葵子一合
右擣碎以水一錢子並至一盞去滓分二服
廣濟療胞衣不出方
右以未竈突中土三指撮以水服之集驗千金
備急文仲同
又方 竈下土一大寸研碎用好醋調令相合納臍中
續煎生甘草湯三四合服

又方 以醋湯飲之出
又方 雞子一枚苦酒一合和飲之立出
一方 用草麻子名如聖膏 見産難門
延年方療胞衣不出腹脹則殺人
吞雞子黄三箇仍解髮刺喉中令嘔即出若困
極以水煮螻蛄一枚二十沸灌入口中汁下即
出崔氏同
救急方 用赤小豆男用七粒女用十四粒東流順水吞下
産乳療産後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等
疾備急同
若大黄一兩為末以好醋半升熬成膏以藥末
搜膏為圓如梧桐子大温醋湯吞五圓良久取

下惡物不可多服

療胞衣不下

括樓實 一箇取子研令細

右酒與童子小便各半盞煎至七分去滓溫服

如無實根亦得

又方 紅花 一兩 酒煮濃汁服

又方 以鹿角鑄屑三分為末煮葱白湯調下

凡欲產時必先脫常所著衣以籠竈胞衣自下仍

易產神驗

廣濟方云取夫單衣蓋井上立出千金集驗救急

崔氏小品同

治胞衣不下訣

婦人百病莫甚於生產產科之難臨產莫重於催生既產莫甚於胞衣不下惟有花藥石散一件最為緊要如黑神散琥珀散諸方之類雖皆有驗然鄉居或遠於藥局倉卒之間無法可施今採得胡氏寶慶方一妙法云若產訖胞衣不下停待稍久非特產母疲倦又且血流入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫墜以物繫墜之時切宜用心老繫然後截斷不爾則胞上掩心而死使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自下矣累試有驗不可輕信坐婆妄用手法多有因此而亡深可浩嘆所以胡氏重引親見其說為拠

產後血暈方論第五

論曰產後血暈者由敗血流入肝絰眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調黑神散最佳庸醫或作暗風中風治之凡暈血熱乘虛逆上湊心故昏迷不省氣閉欲絕是也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治時異當詳審之下血多而暈者但昏悶煩乱而已當以補血清心藥治之下血少而暈者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥治之古法有云產婦纔分挽了預燒秤鎚或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋泛之得醋氣可除血暈產後一臈不妨時作為妙崔氏云凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致欲分挽者第一須先取釅醋以塗口鼻仍置醋於傍便聞其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噀面甦來即飲醋仍少與解之（一云仍少與水鮮之）一法燒乾漆令烟濃熏產母面即醒（如無乾漆以舊破漆器以猛火燒黑之亦妙）

郭稽中論曰產後血暈者何答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷乱心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散即省清魂散方

澤蘭葉　人參各一分　荊芥一兩

川芎半兩

右為末用溫酒熱湯各半琖調一錢急灌之下咽即閉眼氣定即醒　一方有丑草二錢

若去血過多而暈者當服芎藭湯方見第二卷通用方當歸芍藥散方見十二卷第十二論

廣濟治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕

芍藥　丑草各一兩　丹參四分並吹咀

生地黃汁一升　生薑　白蜜各一合

右水二升先煎前三味取八合下地黃生薑汁蜜分為兩服

又方

荷葉二枚炙　真蒲黃一兩　丑草二兩

生地黃汁半升　白蜜一匙

右切細以水三升煮取一升去滓入蒲黃蜜地黃汁暖服立愈

瘴產後血暈心悶

蒲黃四分　紫葛　芍藥八分

紅花十二分

右吹咀以水二升煎至七合入生地黃汁二合更煎三五沸每服三合

產後血暈心悶亂恍惚如見鬼

生益母草汁三合根亦可　生地黃汁二合

童子小便一合 雞子清三枚

右煎三四沸後入雞子清攪停作一服

產後血暈狂語不識人狂亂

童子小便五合 生地黃汁一合

赤馬通七枚 紅雪八分

右以上二味浸赤馬通絞去滓下紅雪溫為兩服

猶得敢 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕衛生方谷立應

五靈脂半生半炒二兩

右為末溫酒調下二盞口噤者拗開口灌之入喉即愈一方加荊芥等分為末童便調下

又方治產後血暈

右神麯為末熟水調二錢

摩產後血暈狂言煩渴不止

生香附子去毛

右為末每服二錢水一琖薑三片棗一箇煎至七分溫服

治產後血暈危困國醫以此方獻禁中用之大效厚獲賞賚時庚寅歲也

生地黃汁一大琖 當歸剉 赤芍藥各一分剉

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便半盞炒

張氏方治產後血暈全不省人事極危殆者

用韮菜切入在一有觜甆瓶內並熱醋汁之
便密縛瓶口以瓶觜向產婦鼻孔令醋氣透
入復先扶病人起惡血衝心故有此證韮能
去心之帶血加以醋氣運達之用無不效
近効方療血暈絕不識人煩問言語錯乱惡血不
盡腹中絞痛胎死腹中紅藍花酒

紅花

右為末分二服每服酒二盞童子小便二盞煮
取盞半候冷分為二服留滓再併並一方無
童便

崔氏療產乳暈絕方

以洗兒水飲三合良或以惡血服少許

良

又方半夏洗不以多少

右為末圓如大豆內鼻中即省亦療五絕指迷
文仲同

又方生赤小豆擣為末取東流水和服方寸匕
不瘥再服救急同

奪命散治產後血暈血入心絕語言顛倒健忘失
志及產後百病

沒藥　血竭等分

右細研為末纔產下便用童子小便與細酒各
半盞並一二沸調下二錢良久再服其惡血自
循下行更不衝上免生百疾專治婦人方只用

白湯調五羊洪運便上天下錫子舍孺人產後語
言顛倒譫語不已如有神靈服諸藥無効召予
診之六脉和平僕以此藥兩服而愈

產後顛狂方論第六

瘴產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用
局方大聖澤蘭散（除是自合者方有効）加好辰砂研令極細
每服加一字許並酸棗仁湯調下一服可安
何氏方瘴產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛
狂方
用大辰砂一二錢重研令極細用飲兒乳汁三
四茶脚許調仍掘紫項活地龍一條入藥候地
龍衰三衰取出地龍不用不令帶藥出但欲得
地龍身上涎耳却入無灰酒與前乳汁相合七
八分盞重湯溫過疾作分三二服
余家刑布方產一日忽見鬼物言語顛倒遂
取自合蘇合香圓一錢重以童子小便調服
即醒神思如故

產後狂言譫語如有神靈方論第七

夫產後言語顛倒或狂言譫語如見鬼神者其原
不一須于細辨證用藥治瘴產後驚風言語乱道
如見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹
（見局方）三圓作一服兼琥珀地黃圓服之○一則因
產後心虛敗血停積上于於心而狂言獨語者當
在第十九卷第一論求之○二則產後臟虛心中

驚悸志意不安言語錯亂不自覺知神思不安者當在十九卷第二論求之○三則宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嗔笑言語乱道當作風痙治療當在十九卷第三論求之○四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在十九卷第四論求之○五則產後多因敗血迷亂心絰而顛狂言語錯亂無常或暈問者當於本卷第五六論求之○六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼狀當作熱入血室治之宜 琥珀地黃圓 及 四物湯 只用生乾地黃加北柴胡等分煎服如不退者以 小柴胡湯 加生乾地黃如黃芩分兩煎服愈雖然已上諸證大抵胎前產後之疾自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐敗生新然後子細詳辨疾證不可妄立各色自立新意妄自加減方藥大宜對證依古法施治未有不安者也

琥珀地黃圓 方見十九卷第二論

四物湯 方見二卷第王通用方

小柴胡湯 方見六卷第十論

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者 男六德續

添

乾荷葉

生地黃 乾

牡丹皮 等分不以多少

右三味濃煎湯調生蒲黃二錢匕一服即定

產後不語方論第八

論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後

虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故言不詑如此但服七珍散

人參 川芎各一兩 石菖蒲 生乾地黃 細辛一錢 防風 辰砂別研各半兩 白礬研細

右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時

胡氏孤鳳散 治產後閉目不詑

右為細末每服一錢以熟水調下

新編婦人大全良方卷之十九

新編婦人大全良方卷之十九

產後門 鬼神方論第一

論曰產後乍見鬼神者何若曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言詑顛錯醫人不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡即安

沒藥 琥珀並細研 桂心各一錢 當歸各一分 麝香研

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服

柏子仁散 治産後狂言亂語皆由肉虛肢血挾邪氣攻心

柏子仁 遠志 去心 人參
桑寄生 防風 琥珀 別研
當歸 炒 生地黃 焙 甘草 等分

右為粗末先用白羊心一箇切片以水一大盞半先煮至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去滓無時服

茯神散 治産後血邪心神悅惚言語失度睡卧不安

茯神 一兩去皮 人參 龍齒 研
琥珀 研 赤芍藥 黃耆

右為末每服三錢水一盞煎至七分不拘時去滓温服

牛膝 各三分 生地黃 一兩半 桂心 半兩

産後臟虛心神驚悸方論第二

夫産後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫合心氣受於風邪風邪搏於心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能哼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣

産氣七寶散 療初産後服之調和血氣補虛安神壓驚悸

辰砂 桂心 當歸

川芎　人參　白茯苓

羚羊角（燒存性已上各二錢）　乾薑（一錢產科各等分）

右為末每服一錢用羌活豆淋酒調下（將護產婦用之）如不飲酒用清米飲調下　如覺心煩熱悶以麥門冬去心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下若覺心胸煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人參虛顫加茯苓以意斟酌日二夜一服

治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知

茯神　遠志　人參

麥門冬　甘草　生地黃

當歸　龍齒　桂心

白芍藥　羚羊角（等分）

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一箇煎至六分去滓溫服無時候

治產後心虛驚悸神思不安

龍齒　黃耆　白薇

生地黃（各一兩）　人參　茯神

遠志　羌活（各三分）　甘草

桂心　防風（各半兩○一方無黃耆有荊芥與銀）

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一箇煎至六分去滓無時服

治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂

麥門冬去心　人參各八錢　牛黃研

白薇各二錢　茯神　獨活

遠志　生地黃　朱砂飛

防風　天竺黃　甘草

龍齒研各四錢　龍腦　麝香並細研各一錢

右為末用薄荷酒調下二錢

瘴血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂　琥珀　沒藥並細研

當歸為末等分

右為細末每服二錢空心日午臨卧白湯調服

產後驚風乱道言語如見鬼狀精神不定者研好

朱砂酒調下局方龍虎丹三圓作一服兼琥珀地

黃圓服之

琥珀地黃圓方

南番琥珀別研　延胡索糯米同炒赤去米

當歸各一兩　蒲黃四兩炒香　生地黃研裂汁留滓

生薑各二斤洗研裂汁留滓以生薑汁於銀石器內炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓

右為末煉蜜圓如彈子大食前當歸湯化一圓

服

產後心驚中風方論第三

論曰產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反

偃狀如癇疾心忪驚悸言語錯乱皆是宿有風毒

因產心氣虛弱發成風痙
療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不
定

上等銀一斤　桂心　甘草各六分
細辛四分　人參　生薑
遠志　茯神各八分　生地黃二十分
龍骨三分　棗子一箇

右㕮咀以水八升煮銀至一升半入藥煎至一
升分作三服溫進

療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死此重虛故
也若患中風語謬昏悶不知人者

人參　茯苓　羌活
桂心　大棗　遠志各十分
竹瀝一升

右用水六升煮取三升下竹瀝更煎取二升溫
分三服

療產後心驚中風

防風　當歸　茯苓
防己　麻黃各八分　秦艽
人參　川芎　獨活
白鮮皮　甘草　白薇各六分
石膏十二分　竹瀝二升

右水七升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎
取二升半去滓溫分三服忌菘菜猪肉生冷

茯苓散 療産後狂語志意不定精神昏亂心気虚風邪所致

茯苓 一方使茯神　生地黄 十二分　遠志

白薇　龍齒 各三分　防風

人参　獨活 各八分同為末

右以銀一大斤水一斗五升煎取七升下諸藥

煎取三升温分三服忌如前　一方治産後風

邪所于心神悦惚志意不定加荊芥八分甘草

五分

療産後心虚忪悸不定乱語錯語精神悦惚不主

當由心虚所致

人参　芍藥

當歸　生薑 各八分　遠志

茯苓 各十分　桂心 六分　麦門冬

大棗 各十二枚

右為散以水八升煮取三升去滓温分三服

産後中風悦惚方論第四

夫産後中風悦惚者由心主血血氣通於榮衛臓

腑遍循經絡産則血氣俱傷腑臓皆虚心不能統

於諸臓榮衛不足即為風邪所乘則令心神悦惚

不定也

千金療産後暴苦心悸不定言語錯乱悦惚皆因

心虚所致

茯苓 三両　芍藥 二両　甘草

桂心　當歸各一兩　生薑六分
麥門冬一升　大棗三十枚
右為散水三升並取一升去滓分作兩服食後
經効瘴產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚
茯神　當歸　黃芩
麥門冬去心　甘草　人參
芍藥　酸棗仁　白鮮皮各三兩
大棗七箇
右為粗末水二升煮取七合去滓溫服

天麻圓　瘴產後中風恍惚語澁四肢不利
天麻　朱砂　防風
羌活各一兩　殭蠶三分炒　乾蝎炒
白附子炮裂　五靈脂各半兩　雄雀糞炒
牛黃各一分
右為末糯米軟飯為圓如梧桐子大以薄荷酒
研十五圓服之
產後所下過多虛極生風方論第五
論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以
榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗
出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也如此則
危服濟危上丹若以風藥治之則誤矣

濟危上丹方
乳香研　五靈脂　硫黃
玄精石同研極細　阿膠　卷柏生

桑寄生　陳皮各等分

右將上四味同研停於銀石器內微火炒勿焦了再研極細復入餘藥為末用生地黃汁和圓如梧桐子大每服二十圓食前溫酒或當歸酒送下

產後虛汗不止方論第六

夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗也因之遇風則變為痙縱不成痙則虛乏短氣身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也亦可就第三卷第六論中求之

麻黃根散　治產後虛汗不止

當歸　黃耆　麻黃根

牡蠣　人參　粉草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

又方

當歸　黃耆各一兩　麻黃根二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

千金瘴產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸

甘草炙一兩　附子半箇炮去皮臍　桂心

芍藥各一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞生薑四片棗一枚煎至七分去滓空心温服忌猪肉冷水生葱等物

經効療産後汗出不止

黄耆十二分　白朮　牡蠣

茯苓　防風　麥門冬去心

生地黄各八分　大棗七箇

右㕮咀水二升煎取七合去滓空心分温兩服

又療産後血氣暴虚汗出

淡竹葉煎湯三合微温服之須臾再服

又方

馬齒莧研取汁三大合如無乾者亦可

右煑一沸投蜜一匙令停頓服

止汗散治産後盜汗不止應多汗者皆可服

牡蠣煅研細　小麥麩炒令黄色碾為細末

右等分研細煑生猪肉汁調下二錢無時候

人參湯治産後諸虚不足發熱盜汗二方出胡氏

人參　當歸等分

右為末以猪腰子一隻去脂膜切小片子以水三升糯米半合葱白兩條煑米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分温服不拘時候

産後冒悶汗出不識人方論第七

凡産後忽冒悶汗出不識人者暴虚故也

破雞子二枚吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者

又若久不識人或時復發者此為有風因產血
氣暴虛風行脉中故也若產後去血多者又增
此疾與雞子不醒者可急作竹瀝汁一服五合
復更不定再與五合頻與三五服差

產後汗出多而變痓方論第八 中風口噤角弓反張附

論曰產後汗出多而變痓者何答曰產後血虛肉
理不密故多汗因遇風邪搏之則變痓痓者口噤
不開背強而直如發癇狀搖頭鳥鳴身反折須臾
十發氣息如絕宜速幹口灌小續命湯稍緩即汗
出如雨半拭不及者不可治也

小續命湯 治中風及剛柔二痓及脚氣痺弱不能
轉側兼治小兒驚風

麻黃 製可去加葛根 桂心 甘草 各半兩
防風 三錢三字 芍藥 白朮
人參 川芎 附子
防己 黃芩 各一分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓取
八分清汁入生薑汁再煎一二沸溫服日三服
夜二服若柔痓自汗者去麻黃夏間及病有熱
者去附子減桂一半冬及初春去黃芩 第三卷雖有然
其中有杏仁無白朮 雖然陳無擇許曰產後汗出多變痓
亦令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻
黃官桂防己黃芩葷不若大豆紫湯為佳太醫

局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔三痓小統命湯並可加減與之若柔痓自汗者有去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風癱瘓背強口噤直視煩熱脈緊大者不治○小品方主產後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身重痒劇嘔吐直視者指迷方名

獨活湯

川獨活兩半 大豆半升 酒三升

右先以酒浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦烟出急投酒中密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈日十服此藥能去風消血結如姙娠折傷胎死腹中服此得差凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰痓又名曰痓古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產寶諸書有中風口噤一門又有角弓反張一門其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之愚今取百問中方論已詳備前篇見三卷第二論庶幾覽者如指諸掌

中風口噤角弓反張方論附

凡產後中風口噤是其血氣虛而風入於頷頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷產則勞損府藏

傷於筋脉風若乘之其三陽之筋脉則偏搏之筋得風冷則急故令口噤也若角弓反張者是體虛受風風入於諸陽之經也人陰陽經絡周環於身風邪乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀也

療產後中風口噤牙開緊急手足瘈瘲如角弓狀

愈風散 亦治血暈四肢強直不省人事或築心眼倒吐瀉欲死 出華佗方 百問經驗產寶陳氏本事同

荊芥 略焙為末

右每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其效如神口噤者灌齒斷噤者吹鼻中皆効

一方用古老錢煎湯調服名一捻金散

一方云用舉卿古拜二味蓋切脚隱語以秘方也此藥委有奇効神聖之功大抵產室但無風為佳不可衣被帳褥太膃膃即汙出則膝理開易於中風便昏冒 指迷方但為粗末濃煎服○許学士云記有一婦人產後護密閤內更生火睡久及醒則昏昏如醉不省人事其家驚惶醫用此藥佐以交加散祝云服之即睡睡中必以左手搔頭覺必醒矣果如其言

交加散 方見第二卷第五論 又名交解散

專治婦人方治產後中風不省人事口吐涎手足瘈瘲

當歸 荊芥穗 等分

右為細末每服二盞水一琖酒少許煎至七分

灌之如牙關緊急用匙幹微灌下但下咽即
有生理不問多少便腹不可藥味尋常忽之
屢用救人有効
小品療產後中風虛人不可他藥者一物獨活
湯主之及一物白鮮主之亦可與獨活合煑之
川獨活三兩細切
右水三升煑取一升仍服奈酒者亦可酒水煑
一方用白鮮皮亦依此法
產後中風痙口噤面青手足急強者
以竹瀝二升分為五服溫溫頓服大効
治產後中風口噤四肢頑痺不仁身體如角弓反
張羌活酒

羌活　防風各三兩　黑豆一升炒令烟出
右細剉以好酒一斗於瓶中攪動密封經半日
許又於鍋中重湯煑瓶至半日候瓶冷取出無
服暖一中盞飲之日可三四服度之當汗出即
差
治產後中風身如角弓反張口噤不諸方
川烏五兩剉如豆大
右取黑豆半升同炒半黑以酒三升瀉於鐺內
急攪以絹濾取酒微溫服一小盞取汗若口不
開者柳開口灌之未効加烏鷄糞一合炒內酒
中服之以差為度
寶方療產後腹中堅硬兩脇膈脹手足冷心中煩

熱欲飲水乾嘔關節勞痓中風之疾

羚羊角二分　防風十二分　羌活

苦梗　敗醬各八分　桂心

柴胡　大黃浸過各六分

右水二升煎取八合空心兩服服了吐即良久更服了○喫地黃酒用地黃切一升炒令黑甕瓶中下熱酒三升密封口煮令減半任意服之

千金鷄屎醴療產後中風及男子諸風并產後百疾神効方又治產後中風口噤拘急困篤腰背強直時時反折

烏雞屎三升　大豆二升

右先炒豆令聲絕次炒鷄屎令黃以酒一升先淋鷄屎取汁淋大豆每服一升重者凡四五服之極妙

深師療產後中風口噤不任大小

獨活八分　乾葛六分　甘草二分

生薑二分

右㕮咀以水二升煮取一大升分為兩服

張文仲療產後中風風痓遍身冷直口噤不識人方

白朮四兩細切

右以酒三升煮取一升頓服効

經效療產後中風腰背強直時時反張名曰風痓

防風　葛根　川芎

地黄各四分　麻黄去節　甘草
桂心　川獨活　防己各六兩
杏仁五箇去皮尖炒
右細切以水八升煮麻黄去沫後下諸藥煎取
升分温三服有汗者不可服
治産後中風口噤潰悶不能言身體強直
羌活　防風　秦艽
桂心　粉草　葛根各三分
生薑八分　附子一箇炮　杏仁八十枚去皮尖
麻黄十分去節
右㕮咀水九升煮麻黄去沫後下諸藥煮取二
升分為三服有汗者不可服

産後中風方論第九

論曰産後中風由産傷動血気勞損藏府未平復
起早勞動氣虚而風邪氣乘虚傷之故中風風邪
冷氣客於皮膚絏絡但疼痺羸乏不任少氣若筋
脉挾寒則攣急喎僻挾温則緩弱若入諸臟恍惚
驚悸隨其所傷藏府絏絡而生病焉

郭稽中産後中風方論附

論曰産後中風者何答曰産後五七日内強力下
床或一月之内傷於房室或懷憂怒擾盪冲和或
因著艾傷動藏府得病之初眼澁口噤肌肉瞤搐
漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾
中風所得也

陳無擇評曰問產後中風風是外邪血虛則或有中之者直答以人作不可治問答不相顧解如何開示後人立論之難有如此者若是中風當以脉辨看在何藏依經調之產力下床月內房室憂恐著灸非中風類蓐勞性氣火邪治各有法非產後病不暇繁引学者識之

經効療產後風虛頭目痛語言時僻

防風　乾葛　茯苓

麦門冬去心各八分　芍藥　黃芩各六分

犀角四分　甘草二分

右㕮咀以水二升煎取七合分為兩服

療產後中風心忪悸志意不定恍惚語言錯亂方

人參六分　羚羊角屑　麥門冬

茯神各八分　黃芩　白鮮皮

甘草各四兩　石膏十二分　淡竹瀝兩大合

右㕮咀水二大升煎至七合下竹瀝分三服

療產後中風身背拘急如束并渴

川芎　羌活　羚羊角屑

酸棗仁　芍藥各四兩　桑白皮六分

防風五分

右㕮咀水四升煎取三升分溫三服

療產後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉側如角弓反張

麻黃八分去根節　生薑　桂心

白朮各四分　防風　芍藥各六分
川芎五分　竹瀝一合

右細剉以水三升先煮麻黃掠去沫下諸藥並取七合下竹瀝再並三沸分三服取微汗為度

治產後納涼太過中風者或成喘急唇青鼻黑男六德續添

以局方小續命湯連進三服即愈

瘴產後中風煩渴

紅花子五合炒後熱研碎

右以水一升並取七合每一匙頭徐徐呷

治產後中風半身手足不遂言語謇澁恍惚多忘精神不定

川獨活　當歸　芍藥
防風　川芎　玄參各二分
桂心分半

右細剉以水八升煮取二升半分為二服覺効又更作一劑漸差復適寒溫將息如不差即以此方作圓每服二十圓有熱加乾葛五兩有冷加白朮五兩有氣加生薑六分手足不穩加牛膝五分草薢三兩黃耆四兩腹痛加當歸芍藥各三分不食加人參二分玄參四分

產後中風筋脉四肢攣急方論第十

夫產後中風筋脉攣急者是氣血不足臟腑俱虛日月未滿而起早勞役動傷腑臟虛損未復為風

邪冷気初客於皮膚絃絡則令人頑痺不仁羸之
少氣風氣入於筋脉挾寒則攣急也
治産後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強直
防風一兩　赤芍藥　桂心各半兩
羚羊角屑　川芎　羌活
當歸　酸棗仁　牛蒡子炒各三分
右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓温服
獨治酒　療産後中風睡卧不安筋脉四肢攣急或
強直
獨治　天麻　防風各一兩
桂心　當歸　荊芥
川芎　蔓荊子各半兩　麻黄去節
附子炮　羚羊角　赤芍藥各三分
右㕮咀每服四錢水酒各半盞煎至六分去滓
温服有汗者莫服
療産後中風四肢筋脉攣急疼痛
羌活　天麻　酸棗仁
川牛膝　防風　當歸
薏苡仁　栢子仁　鹿角膠炒各一兩
蔓荊子　桂心各半兩　羚羊角屑
附子炮　川芎各三分　麝香一分研
右為細末無時以豆淋酒訓二錢服
治産後中風四肢筋攣急疼痛心神煩悶背項強
直

羌活　防風　附子炮去皮
羚羊角屑　麻黃去節各一兩　地黃
桂心各三分　酸棗仁　黃耆
當歸　川牛膝　川芎
萆薢各半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓溫酒吞下

產後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一

論曰產後熱悶氣上轉為脚氣者何答曰產卧血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以著為脚氣其狀熱悶掣癡驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯方見本卷第八論兩三劑必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣陳無擇許曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往往讀千金見產婦多有此疾之語便出是證文辭害意槩可見矣設是熱悶氣上如何便服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕論既非產後要病更不繁引　陳無擇雖有此評然小續命湯加減與之用無不效故百問云寒中三陽所患必冷小續命湯主之加生薑汁最快暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂心一半大煩躁者紫雪最良使取百問中加減法度使後人均得治瘴如無紫雪用真薄荷煎冷水嚼下

新編婦人大全良方卷之十九