

仁齋直指小兒方論

三之五





增修改新刊

增修仁齋直指小兒方論卷之三



疳

附

積

熱

諸疳方論

兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞疳與勞皆
 氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩
 飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調
 甘肥無節而作也或嬰幼關乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根
 生或三兩晷後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥
 粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食
 每常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不
 能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之
 後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中
 焦燥得之者有因傷寒裏證冷厥太過渴引水漿變而生熱熱

母患

疳

冷飲宜查
當是冷飲

氣未散復干他邪得之者又有病癰寒熱脇下痛硬或者不能
 漸與消磨遽以砒巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞
 病之過乎疰之為候頭皮光急毛髮焦稀頭縮鼻乾口噤唇白
 兩眼昏爛揉鼻擗眉脊聳體黃闔牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸
 肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土而飲水占飲者
 皆其候也疰曰五疰病關五臟以臟別之心疰即驚疰由乳食
 不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳舖有傷易生壅滯內
 有滯熱未得疏通故心神驚鬱而作驚疰之候外證身體壯熱
 臉赤唇紅口舌生瘡脅膈煩悶小便赤澁五心皆熱盜汗發渴
 嚙齒虛驚夫是之謂心疰肝疰即風疰由乳食不調肝臟受熱
 所致也若乳母寒暄不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒邪
 氣未撤遽爾乳兒多成風疰肝者眼之候上膈伏熱痰涎壅滯
 以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛眩痛癢揉昏暗雀盲甚至
 經月眼合亦名疰眼外證搖頭揉目白膜遮睛眼青淚多頭焦

暗

夫

髮立筋青腦熱甲瘡筋攣躁渴汗多下痢瘡癬夫是之謂肝疰
腎疰即急疰由乳食不調臟腑伏熱所致也凡甘味入於脾而
 動虫虫動則侵蝕臟腑遂使孩提心下擾悶若上蝕齒斷則口
 瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕癢生瘡療治不蚤
 精髓消耗難以有瘳虫者蠶也目為濕匿多因疰傷久痢腸胃
 受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎
 腎主虛纔受熱邪疰氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名
 曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血迸出名
 曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復
 生外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒
 斷生瘡爪黑面顰身多瘡疥失是之謂腎疰肺疰即氣疰由乳
 食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其氣不知
 則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癢瘡濕是為
 鼻疰其瘡不痛汁所流處隨即成瘡亦名疰蠶外證欬嗽喘逆

壯熱惡寒皮膚粟生鼻癢流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛焦
泄利頻併夫是之謂肺疳脾疳即食疳由乳食不節脾胃受傷
所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使
吐乳多眠久則變為乳癖腹脇結塊亦名疳疔外證面黃身黃
肚大脚細吐逆中滿乏力酷啼水穀不消泄下酸臭合面困睡
減食喫泥夫是之謂脾疳五臟疳傷大抵然爾折而論之曰五
疳出虫曰蛔疳曰脊疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢
曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚曰哺露證狀非一可不舉
宏撮要而條析之乎五疳出虫者疳傷之源雖起於乳舖不調
然臟腑停積已久莫不化而為虫其虫或如絲髮或如馬尾多
出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔疳者
失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔虫皺眉多啼嘔
吐清沫腹中乍痛肚脹青筋唇口紫黑腸頭齒癢是也蛔雖食
虫虫不可動從口鼻出者難治脊疳者虫蝕脊脊身熱羸黃積

中生熱煩温下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡煩嚙
爪甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳舖越常頭皮光急滿
頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗顛腫額高是也臨產多
慾亦然易損兒眼乾疳者瘦悴少血舌乾多啼其病在心目不
轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦
皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胃腕乾渴其病在脾總為
五乾疳是也疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五辛酒麪
炙煨使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是
爾疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下精粕是爾勿用
熱藥止之疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水
穀不聚頻下惡物是爾疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故
令腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是爾法當磨
積調氣疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胃前熱而發瘡
盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面

色如銀斷不可活無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾針刺破膏藥貼或澣濯兒衣露於簷下為雌鳥落羽所汚兒着此衣虫入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胃陷或生穀癥是為丁奚虛熱來往頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦是為哺露丁奚哺露皆因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患腎疳內虛不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏地黃圓加驅疳等劑仍與貼項強筋若不識證謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃

驟
氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療故併及之雖然疳之為說亦畧盡矣調治之法將何擇焉錢氏曰治疳當辨冷熱肥瘦初病為肥熱疳久病為瘦冷疳熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱疳病多在外鼻下赤爛頭瘡濕癢五心煩熱掀衣氣麓渴引冷水煩燥卧地肚熱脚冷潮熱往來皆熱疳也冷疳病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面鰲又壹證燥渴卧地似有熱狀惟飲食不進滑泄無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之綱領乎上醫處此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之茶衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者疳之母由積

而虛謂之疳極諸有積者無不肚熱脚冷須酌量虛實而取之若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後為之微利若積勝乎虛則先與利導繞得一泄急以和胃之劑為之扶虛然取積雖當疎利如白豆蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消積等輩亦不可無脇間癢痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘嗽錢氏有癢為潮熱之說治法解散寒熱即與下癢合是而觀發作不同療治不一又可無權度於此哉若夫諸疳惡證心疳飲水不已食則驚啼耳邊紋多舌上黯黑者不治肝疳左脇結硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎疳飲水好鹹小便如乳耳焦肩聳牙黑骨枯者不治肺疳欬逆氣促頻瀉白沫身上粟生其色斑黑者不治脾疳喫泥泄痢水穀不消唇白腹高人中平滿者不治其或滑泄不休脫肛吃逆抱起昏沉手足垂軟襯及脚心全不知覺項筋舒展身體變冷是則為五絕證候甚者曾陷喘噦乳食直瀉腫滿下痢腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉

光紫與夫疳勞渴瀉面槁色夭骨露齒張肚硬不食者皆危篤矣抑有聞焉石韞玉而山輝水懷珠而川媚人受父母之氣以生精血不榮胞胎有損如草木萌芽之受傷望其華實之不根編者難矣丁奚哺露腦疳瘡爛非胎中已受之病乎不特此爾兒方週時母復有孕乳汁成毒斂鬱小兒神氣亦致骨立疳羸是謂之尪病音奇凡此等類虛扁復生難施其巧余於終篇所以為之抽關啓鑰云

諸疳證治

集聖圓諸疳通用

蒼朮

北五靈脂

好夜明砂

焙縮砂

橘皮

青皮去白

蓬朮木

木香

史君子

各取肉

鷹爪黃連

淨蝦蟇日乾

右末雄猪膽貳枚取汁和藥入糕糊圓麻子大每拾伍圓米飲下疳勞瘦弱本方加當歸壹錢半川芎叁錢

噴疳散

蘆薈

黃連

各壹錢

瓜蒂

猪牙皂角

蝦蟇灰

各半

麝少許

右末吹入鼻噴則可療

黃連肥兒圓

治一切疳及疳眼赤腫痛癢昏暗雀盲或經月合眼

鷹爪黃連

淨壹兩

燕莢

焙

麥牙

炒

神麩

各半兩

青皮

去白

史君子肉

焙各貳錢半

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每柒圓米湯下疳熱眼

山梔

仁煎湯下

大蘆薈圓

治諸疳

蘆薈

燕莢

木香

青黛乾

檳榔

川黃連

淨各壹分

蟬殼

壹枚

胡黃連

半兩

麝少許

右末猪膽貳箇取汁浸糕圓麻子大每貳拾圓米飲下

脂連圓

治五疳潮熱肚脹髮焦

胡黃連

半兩

香潤五靈脂

壹兩

右末猪膽汁圓麻子大每服拾伍圓米飲下五疳潮熱謹

勿用

五疳良方

川黃連

去鬚

燕莢

取仁

神麩

炒

麥蘖

橘紅

木香

蝦蟇

燒存性

史君子

煨去殼

肉豆蔻

貳箇

雞心檳榔

齧麝

壹錢

史君子

煨去殼

右細末雄猪膽貳枚取汁入好酒打清麩為圓芥子大每服

拾伍圓米飲下

胡黃連圓

治熱疳

胡黃連

川黃連

略半

朱砂

壹錢半

右貳連為末和

朱砂

入猪膽內繫定虛懸於鈔中煮壹炊久

取出研

蘆薈

青黛乾

各貳錢半

去足

蝦蟇灰

貳錢

麝少許

米飯圓麻子大每每拾圓食後米飲下

至聖圓治冷疝疝瀉

丁香 丁皮 各壹錢 木香 紫厚朴製

史君子肉焙肉豆蔻濕紙煨橘紅各貳錢

右末神麩糊圓麻子大每柒圓食前米飲下

通神圓治冷熱疝

胡黃連 川黃連絡參木香 蕪荑炒各貳錢

丁香 肉豆蔻生史君子焙肉各壹錢

大蝦蟇乾壹枚剉研碎水

右末膏和圓麻子大每每拾圓米飲下

伏神圓治心疝驚疝

伏神 蘆薈 琥珀 川黃連淨

赤伏苓絡參釣藤皮 遠志肉燻製蝦蟇灰各貳錢

細節石昌蒲壹錢麝少許

右末粟米糊圓麻子大每每拾圓薄荷湯下

天麻圓治肝疝風疝疝眼

青黛乾 川黃連 天麻 北五靈脂

夜明砂微炒川芎 蘆薈各貳錢龍膽草

防風 蟬殼去足各 全蝎燻枚 麝少許

乾蟾頭炙焦參錢

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每每拾圓薄荷湯下

生熟地黃湯治疝眼閉合不開內有朦霧

生乾地黃 熟地黃各半川芎 半赤伏苓

枳殼製杏仁水浸川黃連淨半夏麩

天麻 地骨皮 甘草炙各貳錢半

右判每服貳錢薑參片黑豆拾伍粒水煎臨卧服

地黃圓治腎疝

大熟地黃淨肆錢半

赤伏苓

山茱萸燻椒

當歸

川芎

川練子肉焙 牡丹皮

山藥焙

史君子各取肉

右末煉蜜圓桐子大每參圓空心温湯化下

走馬疳方治口齒出血臭氣

銅綠半錢 生蜘蛛壹枚

右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即用殼貳箇

清肺飲治肺熱疳蝕為穿孔汁臭或生息肉

桑白皮兩半 紫蘇 北前胡 黃芩

當歸 天門冬去心 連翹 防風

赤伏苓 北梗 生乾地黄 甘草各壹分

右對每服貳錢井水煎食後服次用化蠶圓

化蠶圓

蕪荑 蘆薈 青黛乾 川芎

白芷梢 胡黃連 川黃連 蝦蟇灰等分

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓食後臨卧杏仁

煎湯下其鼻常用熊膽泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却

用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈等分雄黃少許細

末入鼻斂瘡

靈脂圓治脾疳食疳

北五靈脂 縮砂仁 白豆蔻仁 麥牙炒

蓬朮煨 青皮去白 橘紅 史君子肉焙

蝦蟇叁錢

右末米糊圓麻子大每拾圓米湯下

下虫圓治疳蛔諸虫

新白苦練根皮 酒浸焙 綠色貫衆 木香

桃仁浸去 蕪荑焙 雞心檳榔各貳錢

鶴虱壹錢 輕粉半錢 乾蝦蟇叁錢 史君子伍拾圓

右末飛麩糊圓麻子大每貳拾圓天明清肉汁下内加當歸

川黃連 各貳錢半 治脊疔兼疔勞方 可擇用

龍膽圓 治腦疔腦熱餅瘡

龍膽草 川升麻

赤伏神 蘆薈

苦練根皮 焙 防風
油髮灰 錢各貳 青黛 乾

黃連 淨 各參錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓薄荷紫蘇泡湯下
食後仍以蘆薈末入鼻

黃連圓 治疔渴

黃連 淨 壹兩 淨猪膽汁

瓜蒌根

烏梅肉 焙乾 杏仁 浸皮焙

石蓮肉 各貳錢

右末牛膽汁浸糕為糊圓麻子大每拾伍圓煎烏梅薑蜜湯
下又瘵虫後附消渴方論 內貳藥可治疔渴及五乾疔

香寇圓 治疔瀉

黃連 參錢炒肉豆寇 生

木香

訶子 煨

縮砂仁 伏苓 各壹錢

右末粳飯圓麻子大每拾伍圓食前米飲下

木香圓 治疔痢

黃連 淨 參錢 木香

紫厚朴 製 縮砂仁

夜明砂 隔紙炒各貳錢

訶子肉 炒壹錢

右末粳飯圓麻子大每拾伍圓乾艾葉生薑煎湯食前温下

褐圓子 治疔腫脹

蘿蔔子 微炒兩 陳皮

青皮 去白 好檳榔

黑牽牛 取仁壹半 炒壹半生

北五靈脂 赤伏苓

蓬莪木 煨各兩 木香 貳錢半

右末飛麩糊圓菜豆大每拾伍圓紫蘇桑白皮煎湯下又大

異香散 方見脹滿門 加五靈脂末煎紫蘇湯調下少吞紫霜

圓 治疔脹肚皮緊

黃耆湯 治疔勞

黃耆蜜炙

當歸

川芎

白芍藥

生乾地黄

蝦蟆去足

蟹甲醋炙

人參

白茯苓

橘皮

半夏麩

柴胡

史君子畧煨

甘草炙

錢

右麓末每貳錢薑棗煎食前服之

驚血煎治疳勞

人參半兩

川芎

蕪荑

柴胡各壹兩

史君子蠶齒胡黃連

川黃連各貳兩

右用驚血壹盞吳茱萸壹兩拌和貳黃連壹兩淹壹宿次早炒乾

透去茱萸并血只用貳連夾餘藥杵末粟米粉糊圓麻子大

每貳拾圓食前熟水下

蚶蜆圓治無辜疳諸疳壹服虛熱退貳服煩渴止叁服瀉痢住

蟾蜍壹枚夏月溝渠中取腹大

右取糞虫壹杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走即將

蟾蜍打殺頓在虫中俟與虫食壹日夜次以新布作袋盡包

繫定置之急流壹宿取出瓦上焙為末入麝香字粳飯搽圓

麻子大每貳叁拾圓米飲下

又方治無辜疳

夜明砂炒為末入諸飲食中與之

十全丹治丁癸哺露

青皮 陳皮各去白蓬朮

川芎

北五靈脂 白豆蔻仁 雞心檳榔

蘆薈各半兩

木香 史君子肉焙 蝦蟆灰

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓米飲下有熱則薄

荷湯下

五珍圓治疳傷肚大 挨疳圓治疳積方並見積類

和劑方小黃連阿膠圓最治小兒諸疳疳熱疳瀉每服貳拾圓

米飲下

疳啞不能發聲方前黃連肥兒圓每服拾伍圓用蘇合香圓壹粒入朱砂五靈脂末各少許以石昌蒲煎湯乘熱調開送下

龍膽湯治疳病

龍膽草微炒 鈞藤皮

柴胡

北梗

芍藥

川芎

伏苓

甘草炙

人參壹錢

大黃貳錢半濕紙裹煨

各貳錢

右剉散每貳錢井水煎服仍以紅紗袋夜明沙與兒帶

疳瘡方論

凡人自孩提以至弱冠潮熱發瘡只是疳氣使然蓋疳虫耗其精髓蝕其肌膚體虛膚空疳熱流注遂致遍身熱瘡發歇無已須用猪肚黃連圓主治仍以大腹皮苦參白芷煎湯浴之蘆薈圓肥兒圓二藥夾和佐之可也

疳瘡證治

猪肚黃連圓

雄猪肚壹具洗淨

鷹爪黃連去鬚淨柴兩

右剉作小截少水和濕納猪肚中用線縫密頓在伍升粳米上蒸十分爛取放臼中入些蒸飯搗千餘杵粘實得所衆手捏圓如小桐子每服貳拾圓米飲下童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黃伏苓伏神與之調血清心熱多者間服和劑生犀散貳拾歲以上潮熱發瘡是為虛勞皆一種病也用藥同前凡兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣



積

積滯方論

小兒有積面目黃腫肚熱脹痛復睡多因酷啼不食或大腸閉溢小便如油或便利無林審黃白而酸此等皆積證也然有乳積有食積有氣積要當明辨吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼叫未已

以乳與兒停滯不化得之是為乳積肚硬帶熱渴瀉或嘔此由飲食無度多餐過飽飽後即睡得之是為食積腹痛啼叫利如蠡渤此由觸忤其氣榮衛不和淹延日久得之是為氣積合用木香圓主之雖然積有虛有實虛積渾身微熱不思飲食昏昧神緩抱起如睡實積肚熱糞閉顯腫喉塞壅盛涎鳴熱毒發瘡推此可見木香圓虛者少與之實者倍用之亦有傷乳傷食而身體熱者惟腹肚之熱為甚人知傷積肚熱糞酸極臭而夜間有熱傷積之明驗人所未識也其或變證面黑瀉黑久瀉不止腹肚脹滿氣出麓大乎心生瘡瘦弱柔軟皆不可療○小兒消積多用青皮然青皮最能發汗有汗者勿與之

積滯證治

木香圓治乳積食積氣積

木香 蓬莪木 縮砂仁 青皮 去白
 朱砂 研細 代赭石 研各 大丁香 壹錢 川巴豆肉 研 壹錢 去

積心 二字接寫

右細末和勻飛白麩糊圓麻子大風乾每服貳叁圓乳傷乳汁下食傷米飲下後與大異香散方見脹滿門或和劑異香散亦得氣積橘皮煎湯下後與和劑流氣飲並見脹滿門

下積圓治乳食傷積腹脹滿氣麓壯熱或瀉或嘔

丁香 縮砂仁 各拾 史君子 焙 箇
 烏梅肉 焙 川巴豆肉 各叁箇 不去油

右末研細和勻爛飯圓麻子大每叁圓橘皮煎湯下

五珍圓治酒食積通用

青皮 炒焦 乾薑 燒帶生 北五靈脂 蓬莪木 各壹兩

右為末夾和秤藥末壹兩用肥巴豆肉以石壓准去半油秤壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每服叁伍圓米湯下不飢飽時服

揆癖圓治疳積方見癖類辰砂膏疎利驚積方見風噤門

青龍圓治驚積有熱方見驚積門朱銀圓治驚積方見胎驚門

痞結證治

痞者塞也結者實也熱氣蘊於胃膈之間留飲聚於腹脇之內於是榮衛不得流行腑臟不得宣通由脹滿而至痞結勢使然耳此熱實之證也時或發為壯熱聖惠甘遂散主之

聖惠甘遂散

甘遂分微黃青皮浸焙黃芩 川大黃剉碎微炒
右麤末每服壹錢水小盞煎去滓溫和服量大小增減用得通利則止後服利後以糜粥放冷補之

癖氣證治

癖者血膜包水僻側於脇傍時時而作痛也惟癖為能發潮熱惟癖為能生寒熱故瘡家中腕多蓄黃水日久而後結癖寒熱之不已者以此小兒臟腑和平榮衛調暢則津液自然流通縱使多飲水漿不能為病惟夫乳哺失調三焦關隔以致水漿停滯腸胃不能宣行冷氣搏之於是結聚而成癖輕者用積滯類

木香圓重者用取癖圓

取癖圓

甘遂 微炒 芫花 炒

辣桂 蓬朮

木香 桃仁浸炒

右細末入去油巴豆壹錢研和十分細飛麩糊圓麻子大風

乾每服壹貳圓薑蜜煎湯灌下泄後冷粥補仍和胃

揆癖圓治乳癖穀癥腹中塊痛

代赭石火煨研拾分五靈脂 青皮去白 木香

蓬朮 北大黃各錢 巴豆鹽去油

右末醋麩糊圓麻子大每服貳圓食後擦薑泡湯下

代赭圓治小兒腹中結癖塊痛

代赭石研細 川大黃各半 木香 五靈脂

朱砂 驚甲醋炙黃 桃仁浸去皮 辣桂各壹分

巴豆肉 去油半分

右細末糕糊圓麻子大風乾每服伍圓薑湯下



熱

諸熱方論

小兒有病惟熱居多夫熱有虛有實實則面赤濃黃氣麓口熱燥渴唇腫大小便難撤揭露衣煩啼暴叫虛則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣軟弱泄瀉多尿夜出虛汗其或乍清乍溫佛鬱悸惕上盛下泄水穀不分此則冷熱不調之證虛熱惺惺散方見癰疹門實熱四順清涼飲加柴胡方見積熱門冷熱不調則敗毒散方見寒類加木香當歸若夫升降陰陽則來復丹參圓薄荷湯研下○小兒表裏俱熱面黃頰赤唇燥口乾小便赤澁大便焦黃先以四順清涼飲為之疏利其熱即去既去而復熱者裏已消而表未解也當用惺惺散少加去節麻黃以取

微汗則表熱盡除其或表裏已解而熱又時來此則表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外不可再用涼藥再與解表當為和其胃氣使陽斂而歸內身體自涼參苓白朮散方見虛勞門薑棗略煎服

諸熱證治

加味清涼飲治小兒頭熱身熱口中熱氣大便黃赤清涼飲方見積熱門加川芎柴胡最妙

人參芎歸散治兒童虛勞熱潮熱或遍身瘡

北參 當歸 遠志浸取 北前胡

柴胡 地骨皮 防風 北梗

枳殼製 半夏麴錢 川芎 伏苓

赤芍藥 麥門冬去心各貳錢 甘草參錢焙

右劉細每服貳錢水小盞薑參片紫蘇參肆葉煎服發瘡者兼服猪肚黃連圓方見疳類別作小圓不惟治瘡治渴其發

潮熱而肚脹者米飲常服貳拾圓

猪膽圓治小兒每日早饑後發熱夜則身涼此血熱也

胡黃連貳錢宣黃連赤芍藥各半兩

右末猪膽汁和成劑入膽皮中虛掛以漿水煮熟取藥研圓麻子大每貳拾圓米飲常服

龍膽草圓治疳熱

龍膽草黃連史君子肉青皮等分

右末猪膽汁圓麻子大每拾圓食後熟水下

清解散治感風發熱頭疼鼻塞涕流及温壯悉主之

北參防風天麻北前胡

伏苓北梗枳殼剉甘草各貳錢

細辛柴胡各壹錢川芎各壹錢

右末每壹錢水小盞薄荷乾參葉略煎温和服

新刊仁齋直指小兒方論卷之三

新刊仁齋直指小兒方論卷之四



傷寒

傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分劑少異用藥少冷已略陳於前矣然而驚風瘡豆亦嘗贅布此尤不可闕請發明藥證而條析之惡風惡寒者必隈人藏身引衣密隱是為表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥糞掀衣氣麓是為裏證可略與疎利也至若頭額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當以温藥救其裏也舉是三者汗下温之法可以類推矣發汗用

桂枝麻黃各半湯加黃芩解肌用香蘇散加乾葛通利四順清

涼飲微利人參敗毒散温裏理中湯厥冷甘草乾薑湯尋常感

冒惺惺散或參蘇飲傷風發熱人參羌活散或天麻防風圓壯

熱者升麻葛根湯潮熱者生犀散小柴胡湯加大黃小便不通者導赤散五苓散甘露飲表裏俱熱如表裏俱見之證洗心散主之咳嗽則人參潤肺散加紫蘇夾食則異香散紫霜圓葷然亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺則以一指按其三關據左手人迎之緊盛者斷之所謂七十二證其證其方皆無越張朱格例持不過小小分劑而中病則止也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略舉巢源一二而終篇以活人書為法果何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云

傷寒證治

桂枝麻黃各半湯

桂枝字捌分壹芍藥半兩生薑半兩切甘草半兩
麻黃去半兩百沸湯湯包杏仁浸去皮尖
大棗貳枚

右剉如麻豆大每服伍錢水壹盞半煮至八分去滓温服

香蘇散治四時瘟疫傷寒

香附子炒去紫蘇葉各肆兩青橘皮貳兩不甘草壹兩

右為麤末每服參錢水壹盞煎柒分去滓熱服不拘時日參服解肌加乾葛煎若作細末只服貳錢入鹽點服

升麻葛根湯治小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼方見瀉類

小柴胡湯方見暑門理中湯方見瀉類甘露飲四順飲方見積

五苓散方見水飲門參蘇飲方見瘡疹門人參羌活散方見服

人參潤肺湯方見咳嗽門紫霜圓方見食癩類

人參敗毒散方見寒類

寒、瘧

寒瘧證治

常山散治小兒發瘧痰壅煩悶

川常山

川大黃

甘草各半兩

桂心

烏梅肉各壹

右剉細每服壹錢井水小盞煎半候冷未發前與之



虛寒

虛寒證治

惟腎主虛亦惟腎受寒小兒骨氣未就雖虛而不容補但以地黃圓與之方見腎疳門厥冷者以生乾薑炙甘草煎湯調下洞泄者却專用木香白木生乾薑各壹分辣桂炙甘草各半分剉細量大小作劑入陳米煎服



虛汗

虛汗證治

團參湯治小兒虛汗盜汗或心血液盛亦發為汗此藥收斂心氣

未傳
宜改不穩

新羅人參 川當歸 各叁錢

右剉細用雄猪心壹箇切參片每服貳錢猪心壹片井水壹盞半煎至壹盞食前兩次服

又撲汗方

黃連

母蠣粉

貝母各半兩 米粉壹升 未傳



痰涎

痰涎證治

痰涎方論直指講之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥白圓子方見身疼類研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香圓并天麻防風圓方見嗽門加朱砂末薑汁泡湯調下餘方見直指方痰飲類擇焉

風痰證治

朱砂圓 鎮心壓驚驅風墜痰

朱砂研十分 直僵蚕洗焙 大南星炮製 白附子濕紙煨紙乾

全蝎貳錢 半焙 麝壹字

右末飛白麩糊圓麻子大每服伍圓薄荷湯溫服

奪命散 控下風痰全活危急

青礞石壹兩 搗碎 淡消壹兩 和入銀窩內 煨紅 硃砂細

右末每服壹錢匕急風薄荷汁入蜜調下涎藥自大便出狀

如稠涕次服退熱截驚等劑慢風木香入少蜜煎湯調下涎

即墜入腹中次服花蛇川烏等劑

青州謝家白圓子

圓白大半夏湯浸柒次 真川烏畧炮去皮 白附子洗畧炮

圓白天南星洗畧炮 天麻各半兩 全蝎壹分

右細末生薑汁煮飛麩糊圓麻子大每拾圓熟水下諸瘡白

圓子研入朱砂雄黃雌黃少許薄荷湯入薑汁調下傷風咳

嗽白圓子末紫蘇烏梅煎湯入薑汁調下寒瘧白圓子金液

丹等分為末米飲調下大抵小兒諸病非熱則痰治痰惟半

夏為上上藥



咳嗽喘嗽證治

杏仁膏 治小兒久患咳嗽

杏仁壹兩 搗碎 伏苓壹兩 紫苑茸 皂角去殼 各半 糖蜜

右末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

紫苑湯 治小兒喘嗽

紫苑茸 貝母 真蘇子微炒 杏仁皮浸去黃

北梗 陳皮 麻黃去節 半夏麩

赤伏苓 桑白皮炒 甘草微炙

右剉細每服壹錢薑參片紫蘇參葉并嫩梗准水煎服

人參枳實湯治感冒咳嗽胃滿痰滯

人參壹分

枳實製

桑白皮炒

半夏製

赤茯苓

五味子

細辛淨

北梗

麻黃去節

阿膠炒酥

甘草炙各半兩

右劉散每壹錢薑參片紫蘇參葉水煎服凡治喘嗽不論肺實肺虛可汗可溫可下藥中須用阿膠便得安肺潤肺其性和平肺經要藥



脾胃

胃氣虛實證治

凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食之證實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣胃虛用木香丁香厚朴肉寇等劑胃實用北梗枳殼柴胡大黃等劑若夫胃中停寒則乾薑良薑官桂丁香又不可闕

貴在酌量但以小小分劑與之夫是之為平胃

驚惕不食證治

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智仁

石菖蒲

白茯苓

蓮子肉

陳皮

縮砂仁

半夏麩

木香

厚朴製

甘草炙壹錢壹字

右劉細每服壹錢薑參片棗壹枚水壹盞煎不飢飽服



吐瀉

嘔吐證治

消乳丹治乳哺不化停滯中脘或作嘔惡

丁香

木香

青皮

生肉寇

三稜

蓬朮等分

右細末稀麪糊圓麻子大每服伍圓米飲下日貳服
益胃散快膈益脾止嘔進食

木香 丁香 藿香 陳皮
縮砂仁 白豆蔻仁 各壹分 甘草 炙壹錢

右細末每服叁字煎薑棗湯乘熱調下或加伏苓

半夏散治小兒胃虛嘔吐水穀不能入

圓白半夏 湯浸柒次 焙乾壹兩 陳粳米 叁錢

右剉細每服壹錢水大盞薑伍片北棗壹枚煎半温服

吐瀉證治

雞舌香散治小兒吐瀉

良薑 香附 天台烏藥 辣桂 各貳錢

甘草 微炙 加陳皮 藿香 各壹錢

右細剉每服壹錢水煎灌下仍別煎與乳母服

交泰散治霍亂吐瀉

藿香葉

陳皮

肉豆蔻 生

半夏 製

青皮

酸木瓜

甘草 微炙

石昌蒲 貳錢

右細剉每壹錢薑叁片紫蘇叁葉水煎服暑月加香需

又方桂心 甘草 生等分 麓末水煎入法醋些少服

又方

藿香

肉蔻 壹分 甘草 生半分

右為麓末每服壹錢新水煎服

不換金正氣散 方見寒類 加木香 伏苓 治嘔瀉

泄瀉證治

鍾乳震靈丹 治小兒腎泄面鰲黑齒消脫骨力弱小腹痛泄多

白膿 震靈丹 方見瀉類 叁圓為末入 鍾乳粉 半錢 以炒破故紙

壹錢半 生肉豆蔻 壹錢 大棗 貳枚 煎取清汁乘熱調空心灌下

木香益黃散 治胃虛腹痛泄利

陳皮 壹兩

青皮

奇子肉 微炒 各半兩

丁香 貳錢 木香 甘草 各貳錢半
右細末每服壹錢陳米少許水煎服

肉寇散 治小兒腹痛大瀉

肉豆寇 壹枚 刺壹枚 麩壹塊 麩壹塊 熟為末米飲調下

和安散 治小兒冷熱不調上盛下泄

木香 當歸 川芎 北前胡 甘草 炙

柴胡 青皮 北梗 甘草 炙

半赤色伏苓 等分

右剉散每服壹錢薑棗煎不飢飽服

瀉痢證治

沒石子圓 治疳痢或大便瀉

白沒石子 壹枚 白豆寇 仁 訶子肉 貳个 木香 黃連 銕壹

右末粳米糊圓麻子大每服拾伍圓米飲下

赤痢肚熱方 藍青擣汁每服半盞與之

腹痛

腹痛證治

腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也挾熱作痛者以面赤或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷作痛者以面色或白或青見之冷甚而證變則面色黯黑唇口爪甲皆青矣熱證四順清涼飲加青皮積殼方見積熱門冷證指迷七氣湯方見氣門加辣桂調蘇合香圓方見嗽門若乃邪正交爭冷熱不調則桔梗積殼湯方見氣門加青皮陳皮木香當歸為妙

腫脹

腫脹證治

葶藶散 治小兒水氣腫滿

甘草 葶藶 炒 隔紙 紫牽牛 取 桑白皮 炒

微

雞心檳榔 川大黃 劉焅等分

右為末每半錢水半盞薑貳片蜜半匙煎湯調下或煎大流

氣飲研青木香圓灌下

分氣飲治小兒腫脹作喘氣短而急

北梗 赤伏苓 陳皮 桑白皮 炒

大腹皮 枳殼製 半夏麩 真蘇子 微炒

紫蘇 甘草 各貳錢 草果仁 壹錢

右對每壹錢半水小盞薑叁片棗壹枚煎半服

陰腫證治

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕氣傷之不為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉擊於下結聚不散加以水實不行亦能發為此疾治法用桃仁圓

桃仁 浸去皮麩微炒叁錢 辣桂 牽牛 微炒碾

傳藥

卵腫

白蒺藜 炒香搗去刺

牡丹皮

北大黃 各貳錢

右末煉蜜圓麻子大每服伍圓或柒圓青皮木通葱白入鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香圓灌下水 方見脹滿

傳藥

母蠣灰 貳分 乾地龍 壹分

右細末津唾調傳外腎熱者雞子清調傳

母蠣散治小兒外腎腫大莖物通明

母蠣粉研十分細先以津唾塗腫處次以母蠣粉摻傳

又方 卵腫研桃仁唾調傳

大小便諸證

遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出

謂之尿管此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用**雞腸散**

雞腸 燒

壯礪灰

白伏苓

真桑螺蛸 微炒 各半兩

又方 雞肫脰 壹具 雞腸 燒存性

右為末每壹錢酒調下男用雌雞女用雄雞

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分而色白也久則成疳亦心膈伏熱兼而得之用**伏苓散**

京三稜

蓬莪朮 煨

縮砂仁

赤伏苓 各半兩

右末每服壹錢麥門冬燈心煎湯調下

青皮

陳皮

滑石

甘草 微炙 各貳錢半

又方 大甘草頭煎湯服

諸淋證治

葵子散 治小兒諸淋

葵子

車前子

木通

蘧麥

桑白皮 炒

赤伏苓

山梔仁

甘草 微炙等分

右剉每壹錢井水小盞葱白貳寸煎柒分食前温服

導赤散 治小兒血淋

生乾地黄

木通 各貳錢

黃苓

甘草 生 各壹錢

右為末每服壹錢井水入燈心煎服仍以米飲調**油髮灰**空

心灌下

尿血方

生蒲黃

生地黄

赤伏苓

甘草 微炙等分

右剉每壹錢水小盞煎柒分調髮灰食前服

大便不通證治

沒藥散治小兒風與滯血留蓄上焦胃膈高起大便不通

沒藥 大黃 枳殼炒 北梗 各貳錢

木香 甘草 炙各壹錢

右剉每壹錢薑貳片水煎服

脫肛證治

龍骨散治小兒大腸虛肛門出

龍骨 訶子肉 炒各貳錢半

沒石子 大者 貳枚

嬰粟殼 醋炙 赤石脂 各貳錢

右末每服壹錢米飲調下

丹毒

丹毒證治

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而徧體也此由乳母酒麪煎多過度與夫烘衣與兒不候冷而即着多成此候或發

於手足或發於頭面曾背今兒燥悶腹脹其熱如火痛不可言纔有入腹入腎之證便不可救藥通用敗毒散方見寒類加緊

草茸外用青黛土朱井水入蜜研傳

又方

北梗 天花粉 乾葛 川升麻

川芎 赤芍藥 獨活 柴胡 甘草 等分

右剉散每壹錢薑貳片井水煎服餘見丹疹門

吐衄

吐衄證治

蒲黃散治小兒吐血咯血

生蒲黃 油髮灰 等分

右研細每壹錢煖生地黃汁調下或米飲亦得

地黃汁方治小兒吐血衄血

生地黄汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

鼻四方生蘿藦搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

顛陷證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑不得平滿狗頭骨炙黃為末雞子清調傳之

顛填證治

顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使腑臟不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物

鞞音印履也與

堅不相屬乃

鞞之訛

心髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢鞞熱氣上衝則柔心溫之熱者涼之劑量重輕兼與調氣小兒肝盛風熱交

未易退瘥解顛證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顛開而不能合凡腦髓欠少如木無根不過十日終成廢人姑與錢氏地黄圓

大熟地黄 洗焙肆錢

山茱萸 乾山藥 各貳錢

澤瀉壹錢 牡丹皮

白茯苓 各壹錢半

右末煉蜜圓桐子大每壹貳圓溫熟水空心調服仍用大南星微炮為末米醋調傳於緋帛烘熟貼之

又方

華陰細辛 去苗土

辣桂 去麤皮 乾薑生

右等分為末乳汁調傳

口舌證治

口角瘡爛方

髮灰細末猪脂和傳燕窠亦好

重舌證治

生地黄汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下
鼻衄方生羅首搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

雜證

顛陷證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充
腦髓故顛陷如坑不得平滿狗頭骨炙黃為末雞子清調傳之
顛填證治

顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱
乘於脾家致使腑臟不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物
堆塚毛髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢鞞熱氣上衝則柔
軟寒者溫之熱者涼之劑量重輕兼與調氣小兒肝盛風熱交
攻亦然未易退瘥

解顛證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦
髓不足所以頭顛開而不能合凡腦髓欠少如木無根不過千
日終成廢人姑與錢氏地黄圓

大熟地黄 洗焙肆錢

澤瀉壹錢

牡丹皮

山茱萸

乾山藥 各貳錢

右末煉蜜圓桐子大每壹貳圓溫熟水空心調服仍用大南
星微炮為末米醋調傳於緋帛烘熟貼之

又方

華陰細辛 去苗土

辣桂 去麁皮 乾薑 生

右等分為末乳汁調傳

口舌證治

口角瘡爛方

髮灰細末猪脂和傳燕窠亦好
重舌證治

重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之絡脈出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生壹物形如舌而短小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒斷者曰重斷皆當刺去其血也用真蒲黃傳之或髮灰傳之或馬牙硝傳之或竹瀝浸黃柏點之燄消亦好

木舌證治

舌者心之候脾之脈絡於舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至害人紫雪壹字研細竹瀝調下○又方黃蜀葵花研細黃丹半之同研點茶次○又方川朴消貳分紫雪壹分白鹽半分同研每半錢竹瀝并水調傳

滯頤證治

小兒滯頤涎流出而漬於頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏

木香

丁香 各半兩

川白薑 生

白朮

青皮

陳皮

各貳錢半

右細末糕糊圓麻子大壹歲拾圓貳歲貳拾圓米湯灌下

喉痺證治

喉痺腫痛方

蛇退 燒存性為末

右每半錢乳汁調下或用蜂房燒存性為末每半錢乳汁調下

語遲證治

言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也

菖蒲圓

人參

石菖蒲

麥門冬 去心

遠志 取肉薑製炒

川芎

當歸

各貳錢

滴乳香

朱砂

各壹錢別研

右末煉蜜圓麻子大每服拾圓粳米飲下

夜啼證治

夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發燥寒盛作疼所以夜啼而不歇也

鉤藤

伏神

伏苓

川芎

當歸

木香

甘草炙半錢

右末每服壹錢薑棗略煎服其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澁之證鉤藤散去當歸木香加朱砂末壹錢研和每服壹錢木通煎湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者醋炭熏服蘇合香圓急以方術驅之

又方燈心燒灰存性塗傳乳上與之

眼病證治

眼睛白膜方

明白礬

鑊粉水肆合用

右入

冬蜜

大匙以綿濾過點芥子許

耳病證治

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱上衝於耳遂使津液壅滯為稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停留博於血氣醞釀成熟亦令耳膿久不瘥變成聾耳

龍骨散

明礬

龍骨

研各參錢

黃丹

貳錢

胭脂

麝少許

右細末先以綿杖撚去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加海

月蝕耳瘡方

胡粉和東方壁土為末傳

又方

蝦蟇燒灰存性擣為末和猪膏傳

龜胃證治

胃高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候

川大黃

煨分

天門冬

煨心

杏仁

微炒

百合

木通

桑白皮

炒

甘萆薢

紙上炒

爛石膏

各半兩

右末煉蜜圓綠豆大每伍圓食後臨卧熟水化下

龜背證治

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致偃僂背高如龜背矣然此多成痼疾間有灼文收功肺俞穴第三椎骨下兩傍各壹寸半膈俞穴第柒椎骨下兩傍各壹寸半以小兒中指中節為壹寸文柱如小麥大但參伍壯而止

臍病證治

安臍散治臍中汁出或赤腫

白石脂末焙出火氣傳之日參度或油髮灰傳或當歸末傳

臍瘡當歸末傳蝦蟇灰傳亦好

鶴節證治

小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝抑亦腎虛得之腎虛則精髓內耗膚革不榮易為邪氣所襲日就

枯悴其殆鶴脚之節乎前項錢氏地黄圓本方加鹿茸酥炙川牛膝各貳錢修合服餌壹同參歲以下與拾圓參歲以上與拾伍圓

行遲證治

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行抑亦肝腎俱虛得得之肝主筋筋弱而不能束也

地黄圓方見腎府門加牛膝五加皮酒炙鹿茸

又方虎骨圓

虎脛骨

酒炙

生乾地黄

酸棗仁

酒浸去皮炒香

白伏苓

辣桂

防風

當歸

川芎

牛膝等分

右末煉蜜圓麻子大每伍圓酒調下或煎木瓜湯下

五加皮散治小兒參歲不能行

真五加皮

酸木瓜乾各半分

漏瘡方

鍊成松脂末并髮灰生虢丹填傳

諸瘡久不瘥方

白膠香半兩碾末輕粉貳錢研和猪脂調傳或

猪筒骨髓調

白膠亦治大風即是松脂鎔煉投冷水中為末

水調空心常服

瘰癧方

治卒得瘰癧赤爛牛糞燒灰研細傳

魚臍瘡方

瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

蛇退皮燒存性細研雞子清調傳

蠹螬瘡方

燕窠土研細猪脂調傳

癬方

水銀壹分胡粉貳分水研入雞冠血傳

前甲散

治小兒眉叢中生瘡名曰鍊銀癬

穿山甲前膊鱗灸焦為細末麻油輕粉調傳

新刊仁齋直指小兒方論卷之四

新刊仁齋直指小兒方論卷之五



瘡疹

瘡疹方論

煩躁
同下

小兒瘡疹大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為竄眼禁牙驚搐如風之證或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀瘡從口腹中出故痛或為煩燥狂悶昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨方論所載以耳冷骹冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與骹足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之間或中或不若不若視其耳後有紅脉赤縷為真於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中

安表而已如欲解肌乾葛紫蘇可也其或小兒氣實煩燥熱熾大便秘結則與犀角地黄湯人參敗毒散葶或紫草飲多服亦能利之小便赤少者分利小便則熱氣有所滲而出凡執不可驟過但輕解之若無熱則瘡又不能發也已發未發並與參蘇飲為當虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權度借喻而言亦如庖人籠蒸之法但欲其鬆耳如苟妄汗則榮衛既開轉增瘡爛如苟妄下則正氣內脫變而歸腎身體振寒耳既反熱眼合肚脹其瘡黑壞十無一生古黑者尤難療何者瘡隨五臟有證未發則五臟之證悉具已發則歸於一臟受毒多者見之故肝臟水疱淚出如水小而色青肺臟膿疱其涕稠濁色白而大心臟發斑血疱色赤而小脾臟發疹色黃微赤又小斑瘡惟歸腎則變而黑焉青紫乾陷瘡疹屬陽本無腎證腎在膈之下不受穢毒故無證陽取火也腎取水也以火用事為水所制豈不殆哉然則欲救黑瘡將何如曰先瀉膀胱而後急溫脾

是爾錢氏云黑陷青紫者百祥圓下之不黑者謹勿下余知其所下者瀉膀胱之邪也小兒腎主虛不可瀉但瀉膀胱以虛其府則腎邪去矣又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰者為逆余知其脾強者土可以制水也百祥圓太峻當以宣風散代之瀉後溫脾則人參伏苓白朮等分厚朴木香甘草各半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘旨也雖然瘡黑本為惡證治之有方猶有幸而生者至於調衛之際乳母不能謹口流毒於小兒或粥乳不時使之飢虛或衣被不週致傷風冷以至閨房有觸外邪有忤則亦冰硬變壞而歸於腎自我致寇又誰咎耶能調衛者以溫散湯劑釀乳蔭之謹護風寒使之氣體和適其於粥餌則勿令飽而氣實飢而內虛斯得矣此尤在瘡家垂意焉

瘡疹備論

瘡疹之論秦漢以來其詳可得聞也粵自扁鵲倉公作古以為
嬰孩湯散當先和節陰陽調治榮衛方利臟腑即熱氣漸解而
董汲張漢初虞世栖真子諸醫認贅為嫡每曰瘡疹證候初覺
即踈利之以宣其毒又曰已出者不可踈利瘡出已定却用利
之余竊惑焉蓋嘗深索古書之意見其諄復持重不直曰利臟
腑而必以和陰陽調榮衛先之則知古人所謂利者暢達流行
之謂而非勇決峻下者比也如曰已患之後俗多禁餌大小便
不通不能調湯藥以和臟腑遂傳敗熱於其間是古人之利大
小便不過調劑以和之而已如曰已出者可服平和湯藥療其
肝臟解其敗熱以防熱毒攻眼是其解熱又曷嘗不用和平之
劑乎然則破諸家似是之非開後世未明之惑惟錢氏直訣朱
氏活人書其說為甚正錢氏療瘡疹證候惟用溫涼藥治之不
可妄下及妄攻發朱氏曰瘡疹已發未發但不可踈轉此為大
戒又曰瘡疹首尾皆不可下輒用利藥即毒氣入裏殺人以此

觀之瘡疹證狀雖與傷寒相似而瘡疹治法實與傷寒不同傷
寒所傳從表入裏瘡疹所發從裏出表蓋毒根於裏若下之則
內氣一虛毒不能出而返入焉由是土不勝水黑陷者有之毒
發於表若汗之則榮衛一虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘
間變證者有之汗下二說古人所深戒也調解之法將何如曰
活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者得兼而已溫如
當歸黃耆木香葦涼如前胡乾葛升麻葦佐之以川芎芍藥枳
殼桔梗羌活木通紫草甘草之屬則可以調適矣繼自今小兒
凡覺身熱證似傷寒但未經瘡豆疑似未明且先與惺惺散參
蘇飲或人參羌活散葦熱甚則與升麻葛根湯人參敗毒散瘡
豆已出則少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子紫草
木香湯紫草木通湯或快斑散絲瓜湯出太盛者人參敗毒散
犀角地黃湯小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散大
便秘結內煩外熱者小柴胡加枳殼湯或小少四順清涼飲咽

喉痛者**大如聖湯****鼠粘子湯**喘滿氣雍者**麻黃黃芩湯**胃腹脹滿者**枳殼桔梗湯****二陳加枳殼湯**煩渴者**甘草散****烏梅湯**下利嘔逆者**木香理中湯****甘草乾薑湯**幼兒泄利稠糞米泔用匙送下未可與乳陷入者**加味四聖散**更以**葫荈酒**薄傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也**獨聖散**入**麝香****老酒**調劑或不用酒則**木香煎湯**若其瘡已黑乃可用**錢氏宣風散**加**青皮**主之然而瘡疹用藥固有權度大便小便不可不通其有大便自調所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用**化毒湯**可也大小二腑一或閉焉則腸胃壅塞脈絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉鰓然不旋踵而告變矣凡小兒先發搐而後發瘡者生瘡已瘥而後發風或吐或瀉者死先發熱自利而後瘡出者存瘡已發而後泄不止者亡瘡黑而忽瀉膿血痂皮者順腹中有瘡也瀉血而水穀不消者逆脾胃虛也或瀉血而瘡壞無膿者亦不可救胃爛也要之陽明主肌肉胃氣不

可一日而不強也世俗無知每見瘡疹不論男女稟受虛實既用**葫荈酒**以傳其身酒麵毒物以充其腹猥曰使瘡出快其間兒氣素怯或遇天時陰寒猶可扶之而無恙設若春夏之間陽氣發越或兒氣素強酒麪助虐則以火濟火胃中熱熾毒蓄血聚瘡出愈難亦或為之黑陷當此之時能用**紫草煎湯**入**生豬尾血**和**腦子**少許以解之猶可措手或者更與熱毒之物遂使咽喉結閉耳目口鼻腫滿悉平大便秘堅小便出血而死矣又或妄施**巴粉**取積之劑則臟氣暴脫熱又不除邪氣愈甚變為喘滿便血癰爛破裂而死矣吁自詒伊阻如是其可畏哉雖然瘡亦有再發者特間有之瘡皮厚而色頑濁者發於臟其候重瘡皮薄而色精明者發於腑其候輕臟熱則為豆瘡腑熱則為細疹熱重者瘡亦重熱輕者瘡亦輕乎復以還消解餘毒**甘露飲****參蘇飲****人參羌活散**輩常須與之否則敗熱留滯肌肉之間亦令凹者再發或癩黑而不變猶更飼之以毒必致發癩患痢

腮腫鼻衄眼翳之患瘡爛成片者黃牛糞乾傳膿多痛甚者乾淨黃土為末傳之瘡遍口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸漬黃柏取汁啖之為愈凡瘡欲成痂類以面油乳酥清蜜潤之可揭即揭血出無害若乾硬已久必成癥痕如茶如醋如猪肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必為之黯慘然而瘡痂已脫肌肉猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之也葫荻酒能辟惡氣左右所不可無或蒼朮降真用之亦可瘡曰聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平復如舊矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱則瘡出為甚易若實實虛虛損不足而益有餘則瘡出為甚難調解之法無以逾此故備論之以解世俗之惑云脉證于後

瘡疹證候

瘡疹證候面色燥臉唇赤眼睛黃目胞赤四肢亦赤手足冷耳尖冷骭冷臍冷身熱或乍涼乍熱頭痛腰痛咳嗽噴嚏呵欠

煩悶搖跳驚悸昏昏多睡小便赤少大便不通不惡寒惟惡熱方其身熱未即發瘡迨其身涼然後發出。三部脉洪數往來大小不應指而疾

壞瘡治法

一曰內虛泄瀉二曰外傷風冷三曰變黑歸腎蓋內虛泄瀉者或因臟腑虛怯其證已逆初發以來自然作瀉或未發之前誤服涼藥以致泄下凡此者其瘡不發每形見小點淡紅而白或白而微黃如水泡之狀治之當用參苓白朮散南木香煎湯調下先與止瀉然後以溫和之劑發之外傷風冷者或因煩燥惡熱出頭露面點點方萌遽為風冷所折或瘡出如珠妄與解脫取涼快而風冷襲之凡此者輕則其狀如蟹色紅而不發重陷如石巨脚色白而水麓治之當溫血散寒邪用不換金正氣散加川芎若惡寒限人更加官桂紫蘇然後與發瘡之劑或內虛泄瀉或外傷風冷在再經日胃氣虧損由是而變壞焉故

煩燥

石巨應作石白此則乃石凹之訛
水盆廉水硬皆言敗壞
後

腮腫鼻衄眼翳之患瘡爛成片者黃牛糞乾傳膿多痛甚者乾淨黃土為末傳之瘡遍口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸漬黃柏取汁啖之為愈凡瘡欲成痂類以面油乳酥清蜜潤之可揭即揭血出無害若乾硬已久必成癩痕如茶如醋如猪肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必為之黯慘然而瘡痂已脫肌肉猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之也葫荻酒能辟惡氣左右所不可無或蒼朮降真用之亦可瘡曰聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平復如舊矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱則瘡出為甚易若實實虛虛損不足而益有餘則瘡出為甚難調解之法無以逾此故備論之以解世俗之惑云脈證于後

瘡疹證候

瘡疹證候面色燥臉唇赤眼睛黃目胞赤四肢亦赤手足冷耳尖冷骭冷臍冷身熱或乍涼乍熱頭痛腰痛咳嗽噴嚏呵欠

煩悶搖跳驚悸昏昏多睡小便赤少大便不通不惡寒惟惡熱方其身熱未即發瘡迨其身涼然後發出。三部脈洪數往來大小不應指而疾

壞瘡治法

一曰內虛泄瀉二曰外傷風冷三曰變黑歸腎蓋內虛泄瀉者或因臟腑虛怯其證已逆初發以來自然作瀉或未發之前誤服涼藥以致泄下凡此者其瘡不發每形見小點淡紅而白或白而微黃如水泡之狀治之當用參苓白朮散南木香煎湯調下先與止瀉然後以溫和之劑發之外傷風冷者或因煩燥惡熱出頭露面點點方萌遽為風冷所折或瘡出如珠妄與解脫以取涼快而風冷襲之凡此者輕則其狀如蟹色紅而不發重則陷如石巨脚色白而水麓治之當溫血散寒邪用不換金正氣散加川芎若惡寒限人更加官桂紫蘇然後與發瘡之劑或內虛泄瀉或外傷風冷在再經日胃氣虧損由是而變壞焉故

令耳聾反熱其瘡青紫變黑此則腎證曉然矣蓋腎屬北方水
是以其色黑其證逆治法先瀉膀胱之府而後急與溫脾若其
瘡不黑則斷非腎證謹不可下請詳審之。瀉膀胱法先用桂
枝芍藥天戟等分為末每服一錢棗湯調下次用宣風散一錢
加青皮煎服若瀉下惡物急以溫脾湯劑繼之。瘡裏為陰邪
穢氣所傷亦令變壞可用醋炭蘇合香圓解之

論升麻葛根湯

升麻葛根湯按和劑方瘡豆已發未發者皆可服世俗習為常
談不問小兒虛實冷熱自首至尾率多用之甚者方發而不快
既發而復陷亦以升麻湯為常用之劑其為害可勝嘆哉何者
葛根解表升麻差寒小兒氣盛熱多服之猶可以消毒萬一內
虛胃弱則以水濟水寧不虧損胃氣冰凝血脈而瘡疹轉為之
逆陷乎夫古人所謂未發者方身熱尚疑似之時也所謂已發
者既透徹欲成痂之候也曷嘗以發而不快與發而復陷為可

用升麻哉若不辯明殆恐世俗相傳枉死者半矣又况人之齒
牙大熱大毒或者相習變陷不透者不問虛實一槩用之其害
又有甚於妄用升麻之不審也蓋瘡豆變陷有因外感風寒而
壓之者治法則當解散寒邪有內氣太實榮衛不得調暢而出
不快者治法則當流行氣脈安可槩曰冰冷直用人牙遂使小
兒服之鬱悶聲啞迨其發出稠疊異常往往泔此而不救矣曷
不用紫草苗著川芎甘草輩為愈哉

瘡疹惡證

瘡疹屬陽春夏為順秋冬為逆冬月寒盛腎水得時多歸於腎
或先如癰後發渴其瘡色如黯血此腎證也不治。春膿疱為
金尅木夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅金冬疹子為土尅水
並逆。舌黑或鼻有黑氣並不治。瘡已出而謔語者為惡證
。燥渴小便澁泄瀉不入食不治。瘡成餅搭黯慘不發其聲
焦啞不治。兩眼閉而黑暗濛昧無塊不治。面腫鼻陷目閉

頻嚙齒者不治。頭面腫大瘡盡瓜破或臭不可近或脚冷至膝並不治。瘡小黑而焦風攻頤頰唇項腫硬或胷高而突並不治。

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼之狀箇箇不治或神藏於內但外若昏困者無妨其有病篤而眼中神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神氣之所萃神氣已脫脉雖僅存亦未能保。

瘡疹證治附眼藥

參蘇飲

前胡去苗

人參去芦

紫蘇葉

乾葛

洗

半夏湯洗

次薑汁製炒

茯苓

去皮

枳殼

去穰

炒

陳皮去白

甘草炙

桔梗

去芦

右以咀每服肆錢水盞半薑菜片棗壹箇煎陸分去滓微熱服不拘時

惺惺散治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓去皮

細辛去葉

桔梗

瓜蒌根

人參去芦

甘草炙

白朮

川芎各等分

右為末每服壹錢水小盞薄荷參葉同煎肆分溫服如要和氣入生薑煎服不拘時

升麻葛根湯治大人小兒瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服

之方見瀉類

人參敗毒散

方見寒類

化毒湯瘡豆已發以此消毒

紫草茸半兩

川升麻

甘草

各二分

右劉散每服貳錢糯米伍拾粒同煎旋服

消風散

方見頭風門

加蟬殼

末治小兒疹豆或發透或未透忽

面青暴吼是為風邪所傷用此主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷驗之然須見心胷間細點如粟起則為真是加味四聖散治瘡豆出不快及變陷者

紫草茸

木通

南木香

黃耆微妙

川芎

甘草等分

右麤末煎壹錢不時服大便秘加枳殼少許大便如常加糯米百粒糯米解毒能釀而發之

紫草飲子

紫草壹兩

右剉細百沸湯大椀沃之蓋定勿令氣出逐旋溫服紫草能導大便發出亦輕

又方

紫草茸壹分

陳皮半分

右麤末新汲水煎服

紫草木香湯治瘡出不快大便泄利

紫草

木香

伏苓

白木等分

甘草炒少許

右入糯米煎蓋紫草能利大便木香白木所以佐之也

紫草木通湯治瘡疹出不快

紫草

人參

木通

伏苓

糯米等分

甘草減半

右剉散煎貳錢溫服內虛大便利者可入南木香去紫草

紫草

蟬殼

人參

白芍藥各壹分

木通壹錢

甘草炙半錢

右剉散煎貳錢溫服

丝瓜湯發瘡疹最妙

丝瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

犀角地黄湯治瘡出得大盛以此解之坊見聲音門出活人書

大連翹湯治瘡疹壯熱小便不通

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前子

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬殼

甘草炒壹錢

山梔仁

黃芩各半錢

右劉散每服壹錢加紫草煎溫服

人參羌活散

方見眼目門

治小兒疹豆因服熱藥多發而不透

身體頭面兩目皆腫連日風搐奮身硬直羌活散并天麻防風

圓煎紫草調服

甘露飲

方見積熱門

五苓散

方見水飲門

小柴胡湯

方見寒類

四順清涼飲

方見積熱門

大如聖湯

鼠枯子湯

麻黃黃芩湯

桔梗枳殼湯

即活人書方

二陳湯

方見痰飲

甘草散

瘡豆略出煩渴不止

粉草微炙

枯萋根等分

右為末煎服壹錢甘草通血脈發瘡豆

烏梅湯瘡豆執渴

小黑豆

菘豆各一合烏梅貳箇

右咬咀新汲水壹椀煎取清汁旋服

木香理中湯即和劑

理中加木香

甘草乾薑湯

方見活人書

加味四聖散

方在前葫荈酒或用酒煎或用熱酒澆亦得

獨聖散

穿山甲湯洗淨炒令焦黃

右末每服半錢入麝少許南木香煎湯調下或紫草煎湯入

紅酒少許調下

宣風散

檳榔一箇

陳皮

甘草炙一分

黑牽牛貳兩半生

右細末幼者半錢壯者壹錢蜜湯調食前服

甘露飲

五福化毒丹

方見和劑方

加味宣風散治腎證瘡豆變黑即宣風散加青皮壹分氣怯者

外加**南木香**壹錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐糞然後以和胃藥加**陳米**與之良久糞黃瘡自微出又以**竹園尿管**煎酒傳其身即得發起
調解散治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為宿食所傷內氣壅遏以致水硬並主之

青皮 陳皮 桔梗 枳殼製
半夏製 川芎 木通 乾葛
甘草炒 紫蘇等分 人參減半

右
大味 後如吳振中改

黃柏去麤皮 新菜豆 紅花各一分 甘草生
右為末麻油調為膏薄塗眼眶四圍頻用為妙或**臙脂**傳之亦可若用**葫荑酒**尤先護目

人參菴活散治瘡豆執毒攻眼赤腫用菜豆皮煎湯調下
豆皮飲治斑瘡入眼生翳

白菊花 新菜豆皮 真穀精草各壹分
右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔壹盞同煎候米泔盡只契柿乾日兩枚

蝶蛸散斑瘡翳眼

真桑蝶蛸壹分炙焦研
右細末入麝少許每服壹錢米泔溫調臨睡服
治諸眼昏翳風痒方

真杏仁叁伍柒粒水浸去皮尖
右細嚼和津液吞五更端坐常服**杏仁**潤肝去塵滓也

又斑翳方

生鱧魚以針刺其血磁器盛之點入翳上自愈
扁鵲油劑方小兒方一二歲發熱恐成瘡豆以此止之

外加**南木香**壹錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐糞然後以和胃藥加**陳米**與之良久糞黃瘡自微出又以**竹園尿管**煎酒傳其身即得發起
調解散治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為宿食所傷內氣壅遏以致水硬並主之

青皮 陳皮 桔梗 枳殼製
半夏製 川芎 木通 乾葛
甘草炒 紫蘇 等分 人參減半

右**劉散**每仁薑棗煎服

不換**金正氣散**方見寒類

黃柏膏瘡疹初萌急以此防眼

黃柏去麤皮 新菜豆

紅花各一分 甘草半生

右為末麻油調為膏薄塗眼眶四圍頻用為妙或**臘脂**傳之亦可若用**葫荑酒**尤先護目

人參羌活散治瘡豆執毒攻眼赤腫用**菜豆皮**煎湯調下

豆皮飲治斑瘡入眼生翳

白菊花 新菜豆皮 真穀精草 各壹分

右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔壹盞同煎候米泔盡只契柿乾日兩枚

蝶蛸散斑瘡翳眼

真桑蝶蛸壹分炙焦研

右細末入**麝**少許每服壹錢米泔溫調臨睡服

治諸眼昏翳風痒方

真杏仁叁伍柒粒水浸去皮尖

右細嚼和津液吞五更端坐常服**杏仁**潤肝去塵滓也

又**斑翳方**

生鱧魚以針刺其血磁器盛之點入翳上自愈

扁鵲油劑方小兒方一二歲發熱恐成瘡豆以此止之

生麻油

童子小便各半盞

右逐旋夾和以柳枝頻攪令如蜜每服貳規殼許服畢令弘少時但參肆服大小便利身體熱退即不成瘡豆之證若形跡已露則不可服也

又方以手蘸麻油摩其背脊中間亦驗

灌藥服藥法

小兒煎藥以銀盞約水半盞藥多又加多焉其或不能灌藥則以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼乳食後少頃服和平之劑隨意無拘

察小兒眼中神法

凡小兒病證雖可畏而太衝有脉神氣夫能顛門未陷顏色指甲未至黯黑者猶可着力雖然五臟六腑之精氣皆上注於目望而知之當先以目中神氣為驗

新刊仁齋直指小兒方論卷之五

