

世醫得效方卷第三

大方脉雜醫科

諸氣

調中快氣治心腹刺痛利三焦順臟腑

香附子拾去毛

烏藥去心

粉草炒真

縮砂去殼貳兩

右為末每服壹錢紫蘇葉三皮鹽少許沸湯調下不拘
時候大便氣秘橘皮湯下亦名寬氣湯

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿
喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治

胃痺留飲意 醋聞酸腸下支結常覺効悶及中寒效逆脾
濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患脚氣入毒氣上
衝心腹堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開胃消痰散雜
思食

香附子 炒去毛 壹拾兩

縮砂 去殼 貳兩

沉香 肆錢 陸分 不見火

粉草 參兩

右為末每服壹錢入鹽少許沸湯點服凌旦霧露空
服食去邪惡氣使無瘴疫

不香續命丸 疎導三焦寬胸膈破痰逐飲快氣消食

木香 不見火 檳榔

青皮 去白 各壹兩

半夏 麩

皂角 去白 貳兩

郁李仁 去皮 各三兩

枳殼 麩炒 杏仁 去皮 炒

右為末別以皂角肆兩用漿水壹椀搓揉熬膏更入熟
蜜少許和圓如梧桐子大每服伍拾圓食後生薑湯下
歸氣湯治氣不升降胸膈痞滿心腹刺痛不進飲食

沉香

木香

丁香 並火 不見

白薑 炮

川練子肉 炒肉桂 去皮 不 陳皮 去白

甘草 炙

附子 壹箇 拾貳錢 者 炮 去 皮 燂

當歸

蒼朮 炒

葫蘆 巴 炒

白朮

舶上茴香 炒

豆蔻 剉 棗 煨 各壹兩

右剉散每服參錢水壹盞煎蘇參葉木瓜肆片鹽少許

煎服

不香流氣飲 調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治

諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食有背走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澀文治憂思太過怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急不寧

陳皮去白

青皮去白

紫蘇去皮梗

甘草燻

厚朴

去蕊皮

香附炒去毛

木通去節

大腹皮

丁香

攢榔

肉桂去麩皮

藿香葉

蓬莪木煨切

草果仁

木香不見火

人參去芦

白朮去芦

乾木瓜

石菖蒲刮去毛

赤茯苓去黑皮

川白芷各取兩

半真壹兩湯洗

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑叁片紅棗貳枚煎至

七分去渣熱服如傷寒頭痛纔覺得疾入連根葱白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽閉隔遂使氣不升降

上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澀裏急後重臍腹冷疼若治

以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所主藥治

之氣壅耳龍耳泛熱咽疼亦効

五加皮半兩酒浸半日炒黃色

枳殼壹兩湯浸去穢炙炒

柴胡去毛芦洗壹兩骨碎補煉去毛剉炒半兩地骨皮半兩

桔梗炒半兩炒黃色乘白皮剉炒半兩陳皮壹兩訶子炮取肉半兩

甘草壹兩半夏半兩煎汁為餅再碎炒

草果去皮膜半兩淨洗炒黃

右剉散和勻以椀盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷

收之每服貳錢蘇參葉生薑叁片水壹盞同煎七分

食後通口服痰欬加半夏麴心肺虛每料加人參茯苓

壹兩上膈熱加北黃芬伍錢下部大段虛加少許炮附

子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸壹兩煎

蘇子降氣湯治中院不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降

胸膈噎塞喘促短氣乾噫煩滿欬嗽痰涎口中無味嗜臥

減食宿寒留飲停積不消脅下支結常覺妨悶專治脚氣

上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

蘇子淨炒半夏洗柒兩甘草炙

前胡去芦厚朴去麁皮薑汁製

川當歸去芦壹兩半肉桂去麁皮壹兩不見炙陳皮去白壹兩

右剉散每服貳錢至叁錢水壹大盞生薑叁片煎至七

分去渣溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食體虛

痰喘加人參壹錢北五味子柒粒鹽梅壹箇杏仁柒粒

去皮尖紅棗貳枚煎虛煩加知母人參每料各壹兩

分心氣散治男子婦人一切氣不和或因憂愁思慮或因

酒色過傷或臨食憂煩或事不遂意以此不足留滯不散

停於胸膈不能流暢，致使心胃痞悶，脇肋脹滿，噎塞不通，噫氣吞酸，嘔噦惡心，頭目昏眩，四肢倦怠，面色萎黃，口苦，舌乾，飲食減少，日漸羸瘦，或大腸虛秘，竝皆療之。常服升降陰陽調順三焦，消滯氣，進美飲食，此方獨清而疎快，常服大效。

紫蘇 並藥俱用肆兩 羌活

半夏 湯洗七次

肉桂 去皮

青皮 去白

陳皮 去白

大腹皮

萊白皮 炒

木通 去皮節 芍藥

甘草 炙

赤茯苓 各壹兩

右劉散每服參錢水壹觔，生薑叁片，棗貳枚，燈心拾莖，取七分去渣，溫服。氣秘每服加枳殼去穢，栗殼羅蔔子，皂角子各半錢，咳嗽不利加人參壹錢，五味子七粒，桔

梗壹錢，氣滯腰疼加木瓜貳片，枳殼壹錢，半水氣面黃，浮腫加車前子，麥門冬，去心，甜葶藶子，木瓜，澤瀉，瀉猪苓，去皮，每料各壹兩，各小流氣飲。

消氣散 治三焦痞塞，氣不升降，胸腹滿悶，大便澀，小便赤黃。

檳榔

枳實

陳皮

黃芩

大黃

黑牽牛 炒

各五分

右爲末，生薑自然汁，煮糊圓如梧子大，每服三四十圓，淡薑湯下。

消積散 治諸氣刺痛，流入背脊及脇下，諸藥不能治。

木香

胡椒 各壹錢 全蝎 柒枚

巴豆 拾箇去皮心

石為末湯釋蒸餅圓麻子大朱砂為衣每服伍粒心膈
 痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑醋湯
 下肺氣甚者白礬蛤粉各叁分黃丹壹分同研為末煎
 桑白皮糯米飲調叁錢下小喘萊白皮糯米飲下腎氣
 脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調攪柳末壹錢下氣
 噎不香湯下宿食不消茶酒漿飲隨意下諸氣為勝勝
 氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項筋痛諸醫
 皆以為風治之數月不愈乃流入背脊久之又注右脇
 下李痛甚苦乃合治之一服而愈後掌再發又服病除
 又方用胡椒壹兩 蝎尾半兩為末麩糊圓如粟米大每
 服五七圓至貳拾圓陳米飲下名塌氣圓又壹方於塌

氣圓中加木香壹味和順臟氣消腹脇堅脹小便不利
 并治息積各明椒圓

消氣散 治氣結不散心胃痞痛逆氣上攻分氣逐風
 功不可述

枳殼去穢炒 木通剉炒 青皮去白 陳皮去白

桑白皮炒 蘿蔔子微炒 白牽牛炒 莪茂煨

茴香炒 荆三棱煨各等分

右為末生薑汁打麩糊為圓如梧子大每服貳拾圓煎
 橘皮湯下不拘時候

三棱圓 順氣寬中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅
 脹脇下堅硬胃中痞塞喘滿短氣不通嘔吐痰逆飲食不

下大便不調或泄或秘

杏仁湯浸去皮尖

蘿蔔子微炒 神麩碎炒

京三稜生細切另持羅為末以酒

麥蘖炒

硃砂壹兩水飛

青皮去白

乾漆炒

右件為末以三稜膏勻搜和圓如梧桐子大每服拾伍

圓至貳拾圓溫米飲食后服加阿膠五錢重名勾蠟圓

三和散治五臟不調三焦不和腹痞悶脇肋脹風氣

雍滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難

雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣

上攻胃腹滿悶大便不通

羌活去芦 紫蘇壹兩

宣木瓜切焙 沉香壹兩

白朮叁分 檳榔

木香名叁分 芫花叁兩

甘草炒叁分 陳皮去白

大腹皮炙焦黃

右劉散每服貳錢水壹盞煎至六分去滓溫服不計時

候西磨湯亦可兼服方見秘結類

五寶湯治壯盛人胃腫痞塞氣不升降百藥不效服

之奏功必矣方見瘡腫雜證類

神效丸治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣

怒氣山嵐瘴氣積聚堅牽如盆心腹刺痛不能飲食時去

時來發則欲死

川薑黃

甘草

香附子

右為末每服壹大錢入鹽少許百沸湯點空心服立效

陳氣散 治心胃痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宜通又傷寒兩脇刺痛攻心

荆三稜

蓬莪茂環熟

白朮叁兩

木香半兩

枳殼去白 各伍兩

右劉散每服貳錢水壹盞生薑三片煎至六分食前溫服用砂糖少許壓下

參附散 治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺痛

嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脈沉耳乾焦黑面黃躄瘦怠惰多困小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病疔羸倦弱妊娠失調理產後虛損

並宜服之大能補虛正氣調理氣血固腎消痰

人參

木香

白豆蔻各肆兩

乾薑

甘草

藿香

茯苓

黃耆

當歸去尾

丁香

桂心

陳皮

白芷

縮砂仁

青皮各半兩

白朮

附子炮

半夏各柒分

右劉散每服半錢生薑五片棗二箇煎服此方屢有奇效

破癭圓 治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之立効

真撥壹兩

大黃壹兩各生用

右為末入生薑少許煉蜜為圓如梧子大每服叁拾圓空心冷酒下或溫冷湯下日叁服

灸法凡上氣冷發腹中雷鳴轉吐嘔逆不食灸大衝穴在足大指本節後貳寸陷中不限壯數從痛至不痛不痛至痛止心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣心痛吐下食不消灸太倉穴在心下肆寸胃脘下壹寸

臍下積痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴在臍下叁寸及灸膏肓二穴

短氣不語灸大推隨年壯又灸肺腧百壯臍孔中貳七壯之氣灸第五椎下隨年壯

○中氣

蘇合香圓治氣中雖不見方書所載然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁不意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎壅牙關緊

急若作中風用藥非惟不相當多能死人昔有一婦人因五交感中忽然氣厥牙呿涎潮里醫作中風用藥以大通利藥下之大泄數行一夕而卒可不戒之如遇此證急作蘇合香圓四五粒灌之便醒然後隨其調理無不痊愈

蘇合香油壹兩入安息香膏內

薰陸香壹兩研

青木香剉 白木去屑

丁香

白檀香

朱砂研 水飛

沉香

香附子炒 烏犀銹屑

真撥

安息香別為末用无灰

麝香研

訶梨勒煨

龍腦研

龍腦已上各壹兩

右為末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋圓如梧子大取井花水溫冷任意下四圓老人小兒可

服壹圓溫酒化服亦得並空心服之用蠟帛裹壹圓如
彈子大緋綸袋盛當心帶之一切邪神不敢近

獨香湯

治中氣閉目不語四肢不收昏沉等證

南木香 不以多少

石為末冬瓜子煎湯調下瘳盛加南星為散生姜煎

未附湯

治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙關緊急痰涎

壅盛如中風狀者

白朮

去滓兩

綿附子

炮去皮臍薄切片 壹兩半仲

甘草

炙兩

右剉散每服參錢水壹盞薑拾片煎取八分去滓後調

蘇合香圓貳粒併進貳服或氣短頭暈手足厥逆未退

者可進養正丹參拾粒至百粒奇効不拘時候

回陽湯

治中氣脈弱大段虛怯等證

川烏

生去皮臍

附子

生去皮臍 各半兩

乾薑

炮兩

青皮

去核兩

益智仁

去殼兩

右剉散每服參錢薑七片紅棗壹枚煎服或入少木香

不拘時候

珠順氣散

中風亦當間服此藥中氣者尤得其宜

白朮

白茯苓

去皮青皮去白

白芷

陳皮

天台烏藥

人參

去戶

甘草

炙兩

右剉散每服參錢水壹大盞煎至七分溫服不拘時候

諸症

風寒證

烏頭桂枝湯

治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁身

體疼痛灸刺諸藥不能瘳及賊風入腹攻刺五臟拘急不得轉側發作叫呼陰縮悉主之

大烏頭

壹枚實者去皮尖蜜壹大器煎減半出腸切洗

肉桂 去麁皮

芍藥

各叁錢叁字

甘草

貳分半

右劉散每服俾錢水壹盞半生薑伍片大棗叁箇入煎前烏頭蜜半合同煎至七分盞去渣食前服一法用附子壹个不使烏頭為蜜附湯

寒證

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝

脾腎氣攻擊急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子

俾兩又箇燒半過

附子

壹枚

右劉散每服瓦銚水壹盞酒半盞煎至七分入鹽一匙溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢 食鹽少許煎服

丁香

檀香

木香

各壹兩

甘草

俾兩

縮砂

去殼

白豆蔻仁

沉香

各壹兩

藿香

俾兩

右劉散每服貳錢水壹盞半生薑叁片紫蘇葉五皮食鹽少許煎服不拘時候或為未炒茴香鹽酒調亦可

七情 **聚香飲** 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛引腰脇連背不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

並不見火

藿香葉

各伍分

玄胡索

炒去

片子薑黃

洗

川烏炮去

桔梗去芦

桂心不見火

甘草炙

右劉散每服肆錢水壹觥半生薑七片紅棗壹枚煎至

七分去渣溫服不拘時候

執送加味通心散

治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗

木通夫皮斷

梔子去殼

黃芩

連翹

甘草

枳殼去穢

川練子去核

右劉散每服伍錢水壹觥半燈心貳十莖車前草五莖

同煎空心溫服

八正散

治腎氣實熱脈洪數小腹外腎肛門俱熱大小便

不利作癩每服肆錢燈心貳十至枳殼半片去核煎食前

溫服執盛加淡竹葉貳拾皮方見後秘結類

虛冷

五寶散

治躄虛膀胱小腸氣作痛不可忍每服五錢

生薑三片鹽炒茱萸伍粒茴香一撮葱白伍寸煎空心熱

服方見前傷寒陰證類

補腎散

治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連

胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治療

蒼朮洗浸一宿切焙

甘草炙

延胡索壹兩

官桂去皮

乾薑炮

縮砂去殼

丁香

檳榔各二兩

蓬朮根

三稜根

白茯苓去皮

青皮去白

右劉散每服伍錢水壹盞半入連根葱白壹莖煎至七

分空心熱服

通治痢散

治風疝陰腎腫大劑芥穗不以多少新瓦上

焙為末每服貳錢熱酒調下效

兩砂圓 治諸疔作痛大效

木香

沉香

巴豆肉

全者各壹兩

青皮不去皮貳兩

銅青半兩研

硃砂貳分半製如前研

右以二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色為度

去巴為末入青砂二味研勻蒸餅和圓如梧子大每服

七圓至十圓鹽湯吞下空心日進二三服

奪命散 治小腸疝氣

玄胡索不以多少鹽炒過入全蝎半錢為末每服乙錢

溫酒調下立效

五苓散 治撮聚疝氣連根為白二寸燈心十莖鹽炒茴香

一撮川練子叁箇去核煎湯調下大効傷暑濕作痛并效

就吞青木香圓亦可方見傷暑類

茵陳香圓 治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸中

水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛六兩炒香

搗末三兩

補骨脂炒香

葶藶炒

檳榔發粟米飯裹以濕布包

火中煨帛焦去殼各真兩

青木香一兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為圓如梧子大每

服五十圓溫熟水吞下

又法 用貳伯粒斑貓七箇去頭足翅為末同於文武火上

慢炒令圓子微香以磁碟蓋鉢上頓在公處少頃去斑

猫未取圓子每服伍拾圓茴香酒下

三菜圓治小腸氣痛外腎腫墜

山茱萸

去核

三菜萸

去更

石茱萸

去梗

各二兩

川練子

乙兩用

丸施十四個

去翅

破故紙

各二兩

不用

青皮

去白

各三兩

青皮

去白

青鹽

各三兩

黑牽牛

巨刃

茴香

各二兩

右為木醋菱麩糊圓如梧子大每服伍拾圓用桃仁十五箇炒酒送下或尚香酒亦可

失笑散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

川五靈脂

蒲黃

隔紙

炒

右劉散每服貳錢酒半盞水半盞前至七分食前服血痛臨墊入真米醋少許未效加玄胡索各等分

葫蘆圓治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜

陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍者

葫蘆

巴

炒

尚香

去土

吳茱萸

湯洗

七次

各二兩

川練子

九兩

大巴戟

去心

川烏

炮

去皮

尖

各三兩

右為末酒煮麥糊圓如梧子大每服十五圓空心溫酒送下小兒伍圓尚香湯吞下又方加牽牛

玄胡湯治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄

玄胡索

炮

附子

炮

去皮

各壹兩

木香

不見火

立効散治疝氣

川芎

川練子

青皮

去白

茴香

桃仁

黑牽牛

炒

各壹兩

右對散每服貳錢無灰酒壹盞煎至八分溫服

金鈴圓

治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

金鈴子肉 五兩

茴香 炒

馬蘭花 炒

海蛤

破故紙

兔絲子

海帶

木香

丁香 各壹兩

右為末麪糊圓如梧子大每服叁拾圓溫酒鹽湯任下

去餘圓 治疝氣

杜茴香壹斤以老生薑貳斤取自然汁浸茴香一夜約

薑汁入茴香內以好鹽壹兩同炒未取出焙燥碾

羅為末無灰酒煮糊圓如梧子大每日空心食前服叁

拾圓或伍拾圓溫酒米飲任下此藥專實脾胃以其有

鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之累有效尋常治疝

氣藥多是疎導久而未有不為害者此藥用薑汁專一

發散而無疎導之害所以為妙也

三增茴香圓

治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏

留卑不散臍腹濕痛陰核偏大膚囊擁腫重墜滋長有妨行

步痿痺不止時行黃水浸成瘡瘍或長椎肉累治不痊致

令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸醜大皆

由頻服葶藶內攻或因炮取以至如此此藥溫導陽氣漸

退寒邪補虛消疝暖養腎經能使復元應小腸氣寒疝之

疾久新不过三料第一料

茴香

船上者用薑半兩同炒焦黃和益枳

川練子

炮

沙參

洗到

木香 洗 各壹兩

右為末水煮米粉稠糊圓如梧子大每服貳拾圓溫酒
益湯空心食前日進三服小病此一料可安饑及

第二料

第二料 加下項藥

葶撥壹兩 檳榔半及

右入前藥共六味重五兩半依前法糊圓湯使圓數服
之若病久未愈便服第三料

第三料 又加下項藥

白茯苓 津刀緊小突 者去黑皮

黑附子 半兩炮去皮隔 秤或作壹兩

右通前藥共八味重拾兩並依前法糊圓數服之加至

參拾圓新久大病不過此三料可愈小腸氣頻發及三
十年者寒疝漸至拷拷大者皆可消散神効

消堅丸

牡丹皮 去骨 桂心 各壹兩 川烏 炮去皮尖

桃仁 變炒黃去皮尖 別研各五兩

右為末酒糊為圓如梧子大每服三十圓溫酒下

練子圓 治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖

多年服此藥永去根本

川練子 壹斤淨肉 津及用麩壹合班備津拾玖个 同炒發黃色去麩班不用 津及用麩一

合巴豆 津拾玖粒同炒發黃色去麩巴豆不用 津及用麩壹合巴豆同炒發黃色去麩巴豆不用 津及用麩壹兩同炒發黃色去麩巴豆不用 津及用麩壹兩同炒發黃色去麩巴豆不用

用 津及用麩壹兩同炒發黃色去麩巴豆不用 津及用麩壹兩同炒發黃色去麩巴豆不用 津及用麩壹兩同炒發黃色去麩巴豆不用

木香

壹兩
不見火

破故紙

壹兩
炒香為度

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯下甚者日進三兩服空心食前

海藻

治偏墜小腸氣效

海藻

各壹兩
班貓式拾捌箇
去足翅

巴豆

式拾捌个
去

右班貓巴豆二味一處生絹袋盛用好醋壹碗以瓦銚盛四味同煮將乾去班貓巴豆不用只將海帶二味細研為末以淡豆豉壹伯粒以煮藥餘醋畧浸蒸研為膏和末藥為圓如梧子大每服用麝香少許朱砂三錢乳鉢細研至無声却入麝香再研勻為衣日乾以新瓦甌

收之每物服柒粒二服拾粒三服拾伍粒若未愈再進三兩服皆用拾伍粒仍用鹽炒尚香細嚼酒吞下空心服忌鴉子并鹹醬動氣等物久病三五服效此藥責新合効速若合下稍久多服為佳

敷法

治腎囊偏墜

牡砺

壹兩
良薑一兩

右為末津唾調傅大偏處須臾如火熱著痛即安

灸法

治諸氣心腹痛小腸氣外腎疝痛疝氣小腹急痛不

可忍足大拇指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極妙又治疝氣偏墜

量患人口角兩角為壹拆斷如此則叁折成叁角如人

樣必壹角脐心兩角在脐之下兩傍尽处是穴左偏灸
右右偏灸左二七壯若灸兩边亦無害

治腎氣外腎腫小腸氣痛腹内虚鳴灸風市穴五七壯
灸氣海穴柒壯灸脐左右各去一寸半兩穴各七壯灸
之立效後求不發名外陵穴風市穴在膝上外廉五寸
氣海穴在脐下壹寸半

。腰痛

獨活寄生湯

治風傷腎經腰痛如掣久不治流入脚膝為
偏枯冷痺緩弱之患及新產腰脚挛疼除風活血

獨活二兩半

真桑寄生无則用川
續斷代

杜仲切炒
斷絲

北細辛

白芍藥

桂心

芎藭

防風去芦

甘草

人參

熟地黄黃

大當歸名二兩

右剉散每服肆升水貳盞煎空心服或小續命湯加桃
仁煎氣虛不和不食除地黃

五積散

治寒傷腎經腰痛不可俛仰每服可加桃仁柒粒
去皮尖煎疼甚或如黑牽牛少許熟炒研揅效方見傷寒
陰證類

腎着湯

治久臥卑濕傷腎經腰重冷痛如帶伍千錢冷
加水洗以熱物着痛处方少寬不渴小便自利食飲如故

虛弱人加附子或用白朮芍藥官桂附子各等分為末每
服貳錢酒調服方見傷
濕類

薑附湯

治體虛傷冷腰痛如官桂製杜仲各五升食前服
方見中寒類

散毒散

治風熱腰痛加續斷天麻薄荷木瓜各等分方見
傷寒陽證類

續斷亦効
治血滯腰痛亦治閃劉

玄胡索

當歸

官桂

各壹分

右為末每服貳錢溫酒調下食前服或加牛膝桃仁川續斷亦効

人參順氣散 治氣滯腰痛加五加皮煎服 方見風類 或用

木香添氣飲 立效 方見氣類

小七香圓 治鬱怒憂思氣滯腰疼

甘松 妙壹拾兩

甘草 妙拾五兩

香附子 妙去毛拾伍兩

丁香皮 拾伍兩

蓬莪朮 櫻栗熟碎式兩半

縮砂仁 式兩半

益智仁 妙七及半

右為圓每服五十圓橘子壹錢益少許煎湯空心服或

用沉香降氣湯打和勻氣散

神油酒 治閃挫腰痛

神麩壹塊約如拳大燒令通赤好酒貳大盞燂酒便飲

令盡仰臥少頃即安或用枳殼散 方見婦人類

或以縮砂烏沉湯木瓜鹽酒調熱服亦効 方見堵氣類

安腎圓 治腎虛腰痛橘皮塩煎湯吞加草薺尤佳 方見虛損類

青續圓 治腎虛勞力腰疼益精助陽烏髭健脚力神效

破故布 津兩妙香杜仲去麤皮切薑汁拌

右為末用胡桃肉伍拾箇大蒜貳拾箇研膏圓如梧子

大每服叁拾伍圓鹽湯服虛極人十補湯吞服 方見虛損類

一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入

八味圓加鹿茸當歸木瓜續斷治房勞傷敗腎腰痛益湯下
方見虛損類

一至圓治老人虛弱人腎氣虛損腰痛不可屈伸

鹿角鎊 麋角鎊 附子炮去皮臍

桂心不見火 補骨脂炒各 杜仲去皮剉

鹿茸酒蒸焙 青鹽別研半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服柒拾圓空心用胡桃肉

細嚼以鹽酒鹽湯任下惡熱藥去附子加肉菘菘一兩

酒浸微炙乾用

牽牛圓治冷氣流注腰疼不能悅仰

延胡索 破故紙炒各 黑牽牛炒

右為末研煨蒜為圓如梧子大每服叁拾圓葱酒鹽湯

任下

熟艾圓治腰痛極効亦治關節

附子炮 黑牽牛一兩

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯食前服

熟艾湯治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍

大黃 生薑並切如豆大

右同炒令焦黃以水一大盞浸一宿五更去渣頓服天

明所下如雞肝即惡物也

二效方治坐立或熟睡濕地濕入腎經外腎腫腰背曲痛

楚甚用五苓散每服二錢用坯子少許下青木香圓三

十粒數服臟腑微動腫消腰直其痛立止

又方治腰痛

五靈脂

赤芍藥各半兩

川烏一箇

沒藥四分

麝香一分

右為末酒糊圓空心溫酒送下

道引法理腰背痛正東坐收手抱心一人於前據躡其兩

膝一人後捧其頭徐牽令偃卧頭到地三起三卧便瘥

針灸法

腰背痛針決膝腰句畫中青赤路脉出血便瘥

腰痛不得悅仰者令患人正立以竹往地度至臍斷竹

乃度背灸竹上頭處隨年壯灸訖截竹勿令人知灸腎

論亦可

眩暈

風證

治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胸戰

搖如在舟船之上

川芎一兩

北細辛三分 白茯苓一兩 白朮一兩

粉草半兩

桂枝三分

右剉散每服肆錢水一饑半生薑三片前不拘時服有

痰兼服青州白圓子方見風科通治類

感寒

治陽虛眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聾耳

人參

附子

北細辛絡三 甘草

乾薑

山茱萸

防風

山藥各五分

右劉散每服錢生薑五片棗貳枚煎食前服中寒眩暈欲倒服薑附湯方見中寒類

傷暑有真圓治暑暈煩悶不甦用香薷散生薑煎六下每服七十圓方見中暑類

中濕有未散治冒雨中暑眩暈嘔吐涎沫頭重不食便不瘥者

川芎 半夏 白朮各一兩 甘草半兩

右劉散每服錢生薑五片木瓜貳片不拘時候溫服七情快神湯治喜怒哀憂思悲恐驚所感臟氣不行鬱而生涎結為飲隨氣上厥伏留陽經心中忪悸四肢緩弱翕然面熱頭目眩冒如欲搖動

人參 麥門冬 去心 山藥 各二兩 前胡

熟地黃 洗酒拌炒 枳殼 去穢炒

遠志 甘草水煮去心 白茯苓 茯神 各一

半夏 湯洗 黃耆 炙 甘草 半兩

右劉散每服錢流水盞半薑伍片秫米一撮煎食前服痰證有未陳湯治痰暈或因冷食所傷

陳皮 半夏 白茯苓 各一 甘草 五片

丁香 胡椒 各三片

右劉散每服錢薑三片烏梅一箇同煎不拘時熱服體虛甚者順元散方見痰癱類

失血有歸湯治去血過多頭重目昏眩暈不省舉頭欲倒

大弓窮

大當歸去尾各三兩

右劉散每服三錢水壹盞半前不拘時候

下虛增損黑錫丹治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈

至危篤或煖藥上僭愈甚者

黑錫丹頭二兩

川練子

陽起石

木香

沉香

青皮炒

肉豆蔻

茴香

官桂去麝皮綿附炮去

胡椒去

葫蘆巴

破故紙炒各

烏藥去木劉

磁石火煨醋淬七

煨細研水飛

右為末酒糊圓如梧子大每服伍拾圓加至柒拾圓濃

煎人參茯苓薑棗湯空吞下

○身疼

風證烏靈順氣散又名通氣風湯加大川芎

寒證省身湯發汗即效或用敗毒散方並見值安和

濕證除濕湯五苓散方見傷濕傷暑類

血滯當歸建中湯方見腹痛類

或用舒筋散於內有延胡索活血除風理氣方見腹痛類

冷痰作二便湯加辣桂生薑烏梅煎方見痰類

勞倦六方治男子婦人氣血虛傷四肢倦怠肌躄

羸瘦骨節煩疼頭昏頰赤肢躄枯槁面色萎黃唇焦口乾

心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍臥憂寐不寧神情恍

惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱

來並能治之

荆芥 去根

具母 去心

白芷 半斤

山藥

天仙藤

前胡 各二斤

羌活

肉桂 各半斤

陳皮 去白

秦艽 去芦洗

甘草 各一斤

右劉散每服貳錢水壹盞薑叁片同煎至八分稍熱服

不拘時酒調亦得常服養氣調血解倦怠

康損證 干補湯

加半夏秦艽肉桂每服各半錢 方見靈

臂痛

風證 息靈順氣散

方見風科虛證類

五靈脂散 治臂脾痛

獨活

荆芥穗

防風

羌活

甘草節

川山甲

骨碎補

草烏 各五分 麝射 少許

右為末用溫酒調下臨睡服如渾身損痛加沒藥木香

酒調空心服

寒證 五積散

和 散

加川牛膝木瓜葱白 方見傷寒類

濕證 獨活湯

治風濕臂痛諸藥不效

白木 薄切

當歸 淨洗薄切乾研

獨活 淨洗

羌活 淨洗切乾

甘草 炙

川芎 各半斤

右劉散每服叁大錢水壹盞薑叁片慢火煎至一盞

去渣溫服合滓不拘時候 二方用薑木切少川白芷各

七情 白朮子散

治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止

由榮衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏其痛發則

有似雞瘻

真白木子 木殼字去穢各

沒藥

桂心 木香各半及

右為末入研藥令勻每服壹錢溫酒調下

治同

紫蘇葉 青皮 苦梗 當歸

芍藥 烏藥 茯苓 川芎

黃耆 枳殼去穢 防風各半及 甘草

橘皮各三分 木香 連皮大腹子薑剉炒

右剉散每服水貳盞薑三片棗壹枚煎至壹盞去滓服

麥蘆 方見瘰癧類

治 治水飲得去當注於經絡發為臂痛皆因脾土有虧

平日多飲水漿不能傳化所致

川芎 半上夏湯洗 白茯苓 川獨活

陳皮 枳殼去穢炒 白木 甘草各一分

右為散每服三杯水一盞半生薑五片同煎去滓食後

停少時溫服

症 凡入忽患臂背手脚腰膝隱痛不可忍連筋骨牽

引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注便

用風藥及針灸皆無益又是風毒結聚欲為癰疽亂以藥

貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為此疾或令人

頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜

間喉中如鋸舌多流涎涎手腳重腿冷痺氣脈不通誤認
為癰癩亦非也凡有此疾但以是藥不過數服其疾如失

甘草 去心

紫大戟 去皮 白芥子 各等分

右寫末煮糊圓如梧子大曬乾食後臨睡薑湯或熟水
下五七圓至十圓如疾猛氣實加圓數不妨其效如神
加味控涎圓一方見喘急類

氣滯 治血氣滯留

血氣滯 治血氣滯留

片子薑黃

四刃如瓦用鐵錘末
代不可用陳物者

白木 炒訖

羌活

甘草 各一 當歸 二 分

海桐皮

去麈皮 二 分

赤芍藥 一 分

右為散每服茶錢水壹錢煎至七分空心服

執證 治風通

方見風科執證類

敷貼 治臂腿間忽忽一兩點痛者骨不可忍

芫花根 一味 研為末 米醋調隨大小傳之立止敷貼不

任須以紙花覆其上用絹帛扎定

針法 有隅一穴隨時而愈

脇痛

傷寒 小柴胡湯 加白牡蠣粉研碎枳殼去穢切片各半錢

煎 方見傷寒陽證類

氣滯 治膀胱氣脇下痛或項筋痛久不愈流涎

發背脾並背治之每服七粒用茴香酒下方見諸氣類

七情 枳殼煮散治悲哀煩惱傷肝氣至兩腋骨疼筋脉拘
急腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至背脊
攣急大治脇痛

防風 去芦 川芎 細辛 枳殼 去穢

桔梗 各四片 甘草 二片 乾葛 一升半

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎至七分去渣

空心温服

通治 去穢 枳殼治右脇疼痛脹滿不食

枳殼 去穢 桂心 去皮不見火 甘草 三片

片子薑黃 洗半升

右為末每服二錢薑棗湯調服酒亦可

川芎散治左脇刺痛不可忍者

枳實 川芎 各半兩 粉草 各半

右為末每服貳錢薑棗湯調服酒亦可

枳殼 去穢 枳殼治脇間痛如有物以挿然及氣疾也

枳殼 去穢 甘草 七片半

右為末每服貳錢濃煎葱白湯調下不拘時候

腹痛

風證 冒風 治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉下注

腹中虛滿日夕交痛或下瘀血或豆羹汁服熱藥效

者此風痛也加入濃磨木香水一合 方見泄瀉類

寒證 脾虛者 五積散生薑二片煨葱白二根木瓜二片薑

炒萊更七粒圓餅笑者霍香生薑三片枳殼半片
木香少許煎方並見傷寒陰證類

暑證香薷散 加生薑陳大蓼木瓜陳壁土煎五苓散以熱

蘇益湯 調香薷散為末服亦效湯引五苓散同方並見傷寒類

濕證香薷散 加炒蒼朮煨枳殼煎未效用不投立止氣喘

生薑木瓜紅棗車前子煎效方見傷寒雜類及時疫類

熱證四順清氣飲 治腹痛大便秘小便赤喜飲冷以手按

之轉甚不可近病者或兩手熱痛處亦熱方見積熱類

或用大柴胡湯方見傷寒陽證類

或用水三黃圓方見積熱類

老人大麻仁圓方見秘結類

冷證瀉積圓 治膝下極冷瘧熱常手足亦冷不任冷

冷食面黃肌瘦按之痛稍止者

綿附丸方見積熱類

右為未姜汁糊為圓如梧子大每服五十圓姜湯或益

湯空心吞下

香薷散 加萊更木香煎亦效方見諸病類

氣證虛者香薷散香薷散香薷散治瀉腹脹膨

痛流走不定傍衝兩脇及腰間突者心氣飲香薷散

熱或大便秘香薷散香薷散香薷散加大黃方並見諸病類

積滯香薷散用生薑烏梅縮砂煎吞應圓治食多噎膈

吞酸口出清水惡心腹中緊痛每服二七粒菜豆大服後

得通仍佐以三棱圓圓及紅圓子平胃散縮砂香湯等

藥方得全安方見脾胃諸氣痰癘類

神保圓治寒氣停積逾旬不愈大便虛澀小便赤急痛甚

用治中湯加縮砂仁二十粒搥碎水或盞生薑十片煎服

五粒未效再服七粒立愈方見諸氣及傷寒陰證類

蟲證治腹中有塊起以手按之不見作聚往來痛

無休止亦治心痛五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫或吐清

水及夢中驚歲面色青黃飲食雖多不作肌膚或寒或熱

沉之嘿之不知病之去處其蟲不療則子母相生无脊休

止長一尺則害人

胡分砂子 鶴虱 白礬 積腳

苦棟根 五錢

右為末麩糊圓如麻子大每服十五圓溫漿入生麻油

一两點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其虫細小

者化為水大者自下

虛證當歸建中湯治勞傷虛羸腹痛吸少氣小腹拘急

連腰背時自汗出不思飲食

當歸 二兩 桂心 一两半 楊芍藥 二兩 黃芩 壹兩半

右劉散每服水貳盞半薑三片棗二枚同煎食前溫服

通治大抵宜通塞則為痛九痛甚須通利臟腑乃愈隨冷

熱須用巴豆大黃牽牛此最要法

小理中圓治三脫氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化喫

物頻傷胸膈滿悶脇肋疔刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹腸
鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻煨

京三稜煨乘乾薑炮

青皮

陳皮洋洗去蒂

肉桂去麤皮各二兩

牽牛炒香熟

良薑炒各三斤

阿魏三兩

去沙石研化縮砂仁

蓬義木炒碎

紅豆各壹斤

右爲末用水煮麥糊圓如梧子大每服叁拾粒生薑橘

皮湯下溫湯亦得不拘時此藥無利性不損脾胃氣偏

虛寒者最宜服之與三稜煎圓和同服尤妙方見諸氣類

腹痛作嘔欲利大便諸藥皆吐惟蘇感圓用薑汁泡湯

吞服最妙蘇合香圓見中氣類感應圓見秘值類

氣滯腹痛神保圓柿蒂灯心湯下二七圓最爲捷效方

凡諸氣類藥入湯作煎以磁石數斤杵爲末滿壺碎
註其上再入磁石煎湯調小器氣散服效

○諸痺

風寒濕合痺治合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重

著四肢緩縱腰脚酸疼

生附子壹兩

白芍藥

官桂

甘草

白茯苓

人參半兩

白朮三錢

石劉散每服肆錢水二盞生姜七片煎至六分去渣食
前服惡甜者減甘草一半兼治瘦極筋脉氣虛倦怠偏

痺酸疼

烏頭湯治寒冷濕痺流於經絡牽縮不得轉側

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦光

附子

官桂

白芍藥

各七

川獨活 壹兩三錢半

右劉散每服三錢水一盞半棗二枝同煎至八分去滓
空心食前服

理中湯

治寒濕痺加附子天麻四分之一方見霍亂類

黃耆酒

治風濕痺身軀頑麻皮膚瘙癢筋脈挛急言語謇

澁手足不遂時竟不仁

黃耆 去芦

防風 去芦

官桂 不見火

天麻

萹藎

白芍藥

當歸 去芦

雲母粉

白朮

茵芋葉

木香 不見火

仙露皮

甘草

川續斷 各一兩

右劉散以生絹袋盛以酒一斗浸之春五日夏三日秋
七日冬十日每服一盞溫煖服之不拘時候常令酒氣
相續為佳

蒼耳散

治一切風濕痺四肢拘挛

蒼耳子三兩為散水一升半煎去滓分作三服或細末
水糊圓如梧桐子大每服五十圓溫酒吞下

白濁散

治久風濕痺正氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久

服輕身益氣

善治二一升為末以水作粥空心服

寒證麻痺

白續散

方見傷寒通治類

痰飲

茯苓湯

治支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯泡七次

桔梗去芦

赤茯苓去皮 橘皮各一兩

枳殼麸炒

右劉散每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去渣溫服不拘時候

服不拘時候

血氣滯三痛湯

治血氣凝滯手足拘挛瘰癧風痺氣痺等疾

川續斷

杜仲去皮切 防風

桂心

華陰細辛

人參 白茯苓

當歸

白芍藥

甘草各一兩 秦艽

生地黃

川芎

川獨活略半 黃耆

川牛膝各一兩

右劉散每服五錢水一盞薑二片棗一枚煎至一盞去渣熱服不拘時但腹稍空服

筋痺三痛湯

治筋痺肢節束痛

豨羊角

薄荷

附子

獨活各一兩

白芍藥

防風

芍藥各壹兩

右劉散每服叁大錢水一盞半生薑三片同煎至一盞

取消汁服日可一二服

熱發三痛湯

治熱痺肌肉熱極躄上如鼠走唇口反縱皮

色變兼諸風皆治

升麻叁兩

茯神去皮

人參

防風

犀角錢

豨羊角錢

羌活各壹兩

官桂半兩

右劉散每服四錢水貳盞生薑二片竹瀝少許同煎至一盞不拘時溫服

諸疸

風證文前注 治因傷風痰熱不解發為風疸身黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾試月採壹束搗 大黃蒸 黃連炒

桂接根 凝水石煨 苦參 苳藤紙隔分

右為末以艾膏和得所丸如梧子大初服六七圓漸加至二十九有熱加苦參渴加桂接根小便澁加苳藤小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃並倍加

麻黃去兩 治傷寒不解發為黃疸其脉緊以汗解之

石用水酒五升煎至二升每服一盞溫服汗愈青夏

暑證文前注 治伏暑一熱發黃小便不利煩渴茵陳煎湯調下一方治疸通用方見傷暑類

茵陳湯 治濕熱瘵黃小便秘澁頭汗而渴

茵陳蒿乾 切 大黃半 小紅梔子十枚

右劉散每服參錢水煎服五苓散亦治發黃二藥夾煎濕證文前注 治濕疸得之身盡瘵發熱面色黑黃

七八日後壯熱在裏有血下如純肝狀小腹滿者急下之身自盡黃小便不利其脉沉細

礬石煨 滑石各等分

右為末每服三大錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者飲或汗愈

時行陷子圓

治時行病急黃及瘡癩疫癘

茵陳

拖子

芒消

大黃蒸乙兩

杏仁去皮尖

豆豉煮分半湯

恒山

熬甲醋炙

巴豆油壳分

右爲末錫飴爲圓如梧子大每服三圓飲下吐利爲效

未知加一圓竟體氣有異急服之

黃汗白濁湯

治身軀洪腫發熱自汗如藥汁其脉沉

黃耆五月

芍藥

桂心參月

右剉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去渣

不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈

桂枝加黃耆湯治黃汗身腫汗出已輒輕久必身閑

胸中痛腰以下無汗腰臑死痛如有物在皮中劇者不能食煩燥小便不利

桂枝夫皮

芍藥

甘草炙

黃耆五月

右剉散每服四錢水一盞半姜五片棗三枚煎至七分

去渣溫服仍飲熱粥以助藥力覆取微汗未汗再服

黃疸

治黃疸食已即飢身軀面目瓜甲牙齒及小便

便悉黃寒熱或身軀多赤多青皆由酒食過度爲風濕所

搏熱氣鬱蒸而成

茵陳

木通

拖子仁略乙

大黃炒

瓜萎壹个

石膏炙

甘草炙

右剉散每服水壹盞半生姜五片葱白壹華煎至八分

去滓温服不拘時候大小便閉加枳實赤茯苓煮子
半夏湯 治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可
除熱去必嘔

半夏

右剉散每服叁錢水或饴姜十片煎至七分不以時服

聖藥 治黃疸身眼黃如金色不可使婦人鷄犬見修製

東引桃根 切細如筋若欲服者以下一服

右以水壳大升煎取一小升適温空腹頓服後三日其

黃離如薄雨散最發瘥百日方平復身黃後可時

飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食麪猪魚肉

殺疸苦大圓 治胃暑瘵熱氣濁食谷不消大小便不利張

滿不下食跌陽脉緊而數亦治因勞發熱熱鬱發黃

苦參 叁兩 龍膽草 壹兩 梔子 貳兩 人參 三分

右為末以猪膽汁入熱蜜少許搜和圓如梧子大以火

麥煑飲下五十圓日三服不知稍加之

脾疸 治胃中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜文

夫吐血婦人熱血崩並皆治

龍腦薄荷 五兩 淨葉 真蒲黃 壹兩 麥門冬 貳兩

阿膠 壹兩 甘草 壹兩 人參 壹兩 川當歸

黃耆 壹兩半 下通 壹兩 生乾地黃 叁兩

柴胡 好者半兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服二十圓上焦食後用熱

水吞下微嚼破更好病下焦空服小兒加減與之此藥大有奇効不可盡述

紅圓子 洽穀疸腹滿眩暈佛齋怔忡酒疸通用 **陳湯** 加

縮砂煎湯下 方見痰瘧類

酒疸膏根湯 洽酒疸因下後久久為黑疸目青面黑心中如啖非羸狀大便正黑小便亦或黑其脉微而數大抵五疸惟酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈石而不醉者有滯唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒淫入百脉為病則不待發黃溢于皮膚為黑為腫流於清氣道中則眼黃鼻腫種 不同故方中論酒疸外有肉疸黑疸 癆疸勞役疸

茵陳根 壹兩

枳實 貳錢

梔子仁

枝 文曰壹兩

甘草 半兩

右剉散每服四錢水煎半煎至八分去渣溫服不拘時

酒疸 洽酒疸

黃連去鬚淨四兩剉碎以酒酒醱一宿日乾為末粟米

糊為圓括桐子大每服參四拾圓以二陳湯加葛根茵

陳黃連煎湯送下

六物 洽酒疸肚脹

葶麥

荆芥穗

不蛀川練子 連皮後用

生薑黃母

軟烏梅

甘草

右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自已滿腹小便

去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星一宿辨明
飲其汁續用車前子山茵陳竹園萎煎湯乘熱調五苓
散服自覺黃水從小便出而肚不脹也

人參散 治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常

人參

白芍藥

括樓根

枳殼去穢炒

茯苓

酸棗仁

甘草炙

熟地黃去穢

右判散每服四大錢水壹盞煎至七分食後臨卧温服

辰砂妙香散 治飲酒行房酒熱厥於心經致成黃疸再加

辰砂末少許每服貳錢茵陳貳根煎湯日三服方見心

王瓜方 治酒疸熱疸土瓜搗汁取服任意

如神散 治酒毒不散發黃久入浸漬流入清氣道中具引

藥內鼻滴出黃水愈

苦瓠子去穢

苦葫蘆子各二七个

黃黍米參百

安息香貳臯 用子大

右為末以一字搗入鼻中滴尽黃水三升或過多則以

香穢燒灰麝香末各少許搗入鼻中立止

女勞疸石膏散 治女勞疸身黃額黑目腫發熱惡寒小腹

急足下熱其脉浮緊腹或滿者難治

滑石

石膏粉各等分

右為末大麥粥飲調下二錢匕日三四服小便利則瘥

熱疸清飲 治疸發熱諸熱通用

柴胡參兩

赤茯苓參兩 桑白皮製

川芎壹兩

甘草 炙 半兩

右劉散每服三錢生薑棗子煎服

虛勞瘡 治五瘡口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁

秦朮 去芦

當歸 酒浸 芍藥

白朮

官桂 去皮 不見火

赤茯苓 去皮 熟地黄 酒蒸 橘紅

小草

川芎 各壹兩 半夏 湯洗

甘草 炙 各半兩

右劉散每服肆錢水一盞半薑五片煎至七分去渣溫

服不拘時候

食藥湯 治諸同上 力見虛損類

艾黃 治人無故忽發振寒皮膚癢塵出小便赤澀

大便時秘氣無異飲食不妨諸藥湯不除因為艾黃

苦參

黃連

瓜蒂

黃蘗 去皮

大黃 蒸 各壹分

葶藶 炒 半兩

右為末每服一大錢米飲調服當吐下隨時消息加減

積黃 理脾胃退黃

針砂 醋煮 通紅

紫金皮 酒浸 香附子 炒

三稜 醋浸 炒

倉朮 米泔浸

陳皮

青皮 去白

厚朴 姜製

縮砂 各壹兩

右醋糊圓每服三十圓酒熱水下川椒湯服亦可立効

○五噎

五噎散 治五種噎食飲不下胃脘痛嘔噦不徹攻利疼痛

喉與涎俱出

人參

茯苓

厚朴

去麁皮 甘草炙

枳殼去穢

訶子去核

桂心

白木

橘皮

白薑

三棱炮

神麩炒

麥牙炒

各取兩木香

檳榔

蓬莪木炮

右劉散每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚煎至十分空心服為未鹽湯亦得

沉香散

治五噎五膈胸中久塞諸氣結聚嘔逆噎塞飲食

不化結氣不消常服寬氣通噎噎寬中進食

白朮

茯苓各半兩木通

當歸

橘皮

青皮

大腹子

檳榔

芍藥各壹兩甘草炙

白芷三兩

紫蘇葉四兩

枳殼剉炒去穢

右劉散每服水一盞薑三片棗二枚煎至六分空腹溫服

天七氣湯

治喜怒不節憂思兼併多生悲恐或時振驚致

臟氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如

炙鬱吐噦不下皆七氣所生

半夏湯洗七

白茯苓

四兩

厚朴

姜製炒 紫蘇 二兩

右劉散每服四錢水壹盞薑三片棗一枚煎空腹溫服

○五膈

寬中散

治因憂悲寒熱動氣成五種膈氣不進飲食

白豆蔻去皮

枳殼去穢

香附子

炒去毛 丁六兩

丁香四兩 木香三兩 青皮去白 四兩 甘草炙五兩

厚朴去皮 姜汁炙 一斤 陳皮去白 四兩

右為末每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯煎服不以時候諸冷氣用之亦効

五膈散 治五膈胃膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡心不進飲食

枳殼去穢 炒 木香不見火 青皮去白 大腹子

白木半夏 麩對炒 丁香不見火 天南星湯洗 去皮

乾薑炮 麥牙炒 草果仁略 甘草炙 半兩

右為末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分溫服不拘時候

五膈散 治憂悲思慮膈塞不進及食冷物即發其病苦心

病不得氣息引背痛如刺心下堅大如粉絮緊痛欲吐即差食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆者

麥門冬去心 甘草炙 各五兩 人參四兩 川椒炒出汗

遠志去心 炒 細辛去苗 桂心各三兩 乾薑炮 三兩

附子一枚

右為末蜜圓彈子大含化日三服夜二服胃中當熱七日愈亦可圓如梧子大米湯下二三十圓夏加麥門冬

甘草人參各一兩一方以吳茱萸代桂治遇寒冷則心痛咽中有物吐不出熱不入飲食減少並可服不拘時

寶氣丸 治氣不升降胸膈結痞

木香

京三稜

青皮

各半兩

半夏

三兩

大腹子 一分

右為末薑汁糊為圓如梧子大食後米湯下二三十圓

瓜蒌實圓

治胸中痛徹背喘急妨悶

瓜蒌實

別研枳殼去穢

半夏

湯炮七次

桔梗

去麩麩各一兩

右為末薑汁打糊圓如梧子大每服五十圓食後淡薑

湯送下

世醫得效方卷第三