

己



儒門事親論方目錄

卷之一

七方十劑繩墨訂一

立諸時氣解利禁忌三

小兒瘡疤丹嫖癰疹舊散記五

霍亂吐瀉死生如反掌說七

過愛小兒反害小兒說九

卷之二

偶有所遇厥疾獲瘳記十一

汗下吐三法該盡治病誼十三

凡在表者皆可汗式十五

推原補法利害非輕說十七

疝本肝經宜通勿塞狀十九

卷之三

喉舌緩急砭藥不同解二十一

五積五聚治同鬱斷二十二

斥十膈五噎浪分支派疏二十三飲當去水溫補轉劇論二十四

指風痺痿厥近世差互說二

瘧非脾寒及鬼神辯四

婦人赤白帶下錯分寒熱解六

目疾頭風出血最急說八

服藥一差轉成他病說十

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

凡在上者皆可吐式十四

凡在下者皆可下式十六

口眼喎斜是經非竅辨十八

五虛五實攻補懸絕法二十

卷之四

嗽分六氣母拘以寒述二十五
三消之說當從火斷二十七

蟲蟲之生濕熱為主訣二十八
九氣感疾更相為治衍二十六

補論二十九

水解三十

風一

濕三

燥五

解利傷寒七

痺九

厥十一

瘧十三

疳病十五

下痢膿血十七

痔漏腫痛十九

大便滯滯二十一

酒食不消散二十三

暑二

火四

寒六

中風八

瘧十

癰十二

泄痢十四

臟毒下血十六

水泄不止十八

霍亂吐瀉二十

五腫淋瀝二十二

酒食所傷二十四

沉積水氣二十五

諸積不化二十六

骨蒸熱勞二十七

虛積二十八

上喘中滿二十九

一切涎漱三十

咳嗽三十一

咳逆三十二

風痰三十三

咯血衄血嗽血三十四

消渴三十五

雷頭風三十六

頭痛不止三十七

兩目暴赤三十八

目腫三十九

病目經年四十

風衝泣下四十一

風疰牙疼四十二

口瘡四十三

喉閉四十四

癰四五十五

背疽四十六

瘰疬四十七

便癰四十八

惡瘡四十九

下疳五十

卷之五

瘡瘍瘤腫五十一

瘡腫丹毒五十二

凍瘡五十三

金瘡五十四

誤吞銅鐵五十五

蛇蟲所傷五十七

禁蝎五十九

婦人月事沉滯六十一

腰胯疼痛六十三

經血暴下六十五

月事不來六十七

小產六十九

產後心風七十一

產後潮熱七十三

妊娠大小便下利七十五

雙身傷寒七十七

懷身入難七十九

牙疳八十一

丹瘤八十三

身瘦肌熱八十五

魚刺麥芒五十六

杖瘡五十八

落馬墜井六十

血崩六十二

頭風眩運六十四

赤白帶下六十六

婦人無子六十八

大產七十

乳汁不下七十二

乳癰七十四

雙身病瘻七十六

雙身瘡痘七十八

眉煉八十

夜啼八十二

疳眼八十四

大小便不利八十六

久瀉不止八十七

發驚潮搐八十九

通身浮腫八十八
拗哭不止九十一

風熱涎嗽九十二

身熱吐下九十一
水瀉不止九十三

甜瘡九十五

瘡疾不愈七十七

赤瘤丹腫九十九

腰痛氣刺九十八

瘡泡癰疹一百

卷之六

十形三療目錄

風形

因驚風搐一

飧泄三

風痰五

手足風裂七

搐搦九

驚風十一

風搐反張二

因風鼻塞四

癩六

胃腕痛八

面腫風十

風溫十二

風水十三

腎風十五

中風十七

小兒風水十四

勞風十六

暑形

中暑十八

瘡瘍十九

火形

馬刀二十

伐指痛二十二

咽喉腫塞二十四

腰胯痛二十六

痰厥二十八

笑不止三十

目盲三十二

小兒手足搐搦三十四

熱形

沙石淋三十六

膏淋三十七

二陽病三十八

頭熱痛四十

勞嗽咯血四十二

嘔血四十四

肺癰四十六

口瘡四十八

心痛五十

失笑五十二

目暎五十四

熱厥頭痛五十六

血崩五十八

月閉寒熱六十

遇寒手熱六十二

痙癇六十四

淋六十六

牙痛六十五

口臭六十七

小兒面上赤腫三十九

勞嗽四十一

吐血四十三

因藥燥熱四十五

瘻四十七

虛勞四十九

傷寒極熱五十一

赤目五十三

胞後嘔吐五十五

產前喘五十七

婦人二陽病五十九

惡寒實熱六十一

嘔逆不食六十三

濕形

痘六十八

留飲七十

黃病七十二

水腫七十四

停飲腫滿七十六

屈膝有聲七十八

濕嗽八十 燥兒八十一

濕瘡瘍八十三

洞泄八十五

暑泄八十七

水痘六十九

黃疸七十一

病發黃七十三

涌水七十五

濕痺七十七

白帶七十九

濕癬八十二

泄瀉八十四

大便少而頻八十六

腹滿面腫八十八

卷之七

燥形

臂麻不便八十九

孕婦便結九十一

腰脅痛九十三

大便燥結九十

偏頭痛九十二

寒形

因寒腰強九十四

感風寒九十六

寒痰九十八

寒疝九十五
凍瘡九十七

瀉痢惡寒九十九

內傷形

因憂結塊一百

不寐一百二

兒寐不寤一百四

收產傷胎一百六

背疽一百八

咽中刺塞一百十

腸澼下血百十二

伏驚一百十四

外傷形

孕作病治一百十五

落馬發狂一百十七

足門脢痛一百十九

杖瘡一百十六
太陽脛腫一百十八
膝脢跛行一百二十

病怒不食一百一
驚一百三

孕婦下血一百五

懷恐脇痛一百七

肺癰一百九

誤吞物咽中一百十一

水腫羘丸一百十三

杖瘡入水一百二十一

卷之八

內積形

傷冷酒一百二十二

茶癖一百二十四

痰氣一百二十六

冷積一百二十八

肥氣積一百三十一

停飲一百三十二

沉積疑胎一百三十四

外積形

瘤一百三十六

癰一百三十八

膠瘤一百三十七

痔一百三十九

心下沉積一百二十三

腹脹水氣一百二十五

胸膈不利一百二十七

積塊一百一百二十九

伏瘕一百三十一

積氣一百三十三

是胎非積一百三十五

卷之九

雜記九門

誤中涌法

嗽

濟

赤目

感風寒

誤中寒涼

經閉

下血

痢

臨變不惑

涌法

涌嗽

當禁不禁

病愈犯禁而死

不忌反思

不忌口得愈

不可忌口

高技常孤

羣言難正

謗吐

謗三法

謗峻藥

病人負德愈後吝財

同類妬才

羣口誣戴人

撮要圖

四因氣動

卷之十

五鬱風暑濕燥寒主病

六氣主治

五氣主治濕燥寒主治

大寒初氣至終氣小雪為病

十二經是動為病

風暑濕火燥寒六淫為病并治

六門病治諸方

內經濕變五法

金櫃十全之法

金櫃十全五泄後論已上之圖改校為篇法

卷之十一

治法雜論

風論

論火熱二門

濕熱門

風門

濕門

寒門

內傷

外傷治法

婦人風門

火類門

濕門

寒門

半產

小兒風門

二火類

卷之十二

三法六門

吐劑

三聖散

瓜蒂散

獨聖散

稀涎散

蔚金散

茶調散

獨仙散

碧雲散

常山散

汗劑

通聖散

雙解散

浮萍散

麻黃散

升麻湯

桂枝湯

下劑

導水丸

禹功散

通經散

神祐丸

琥珀丸

益胃散

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

無憂散

玉井散

牛黃通膈丸

水煮桃仁丸

內托丸

泄水散

牛黃化癬散

丁香化癢散

四生丸

玉燭散

三和湯

神芎丸

進食丸

牛黃白朮散

十棗湯

除濕丹

利膈丸

三一承氣湯

抵當丸

大陷胸湯

小陷胸湯

握宣丸

風門

防風通聖散

防風湯

排風湯

防風天麻散

祛風丸

小續命湯

消風散

搜風丸

川芎散

當歸川芎散

愈風餅子

疎風丸

通頂散

胃風湯

香芎散

鐵彈丸

暑門

瘡附

白虎湯

化痰玉壺丸

桂苓甘露散

益元散

玉露散

石膏散

辰砂丹

溫脾丸

溫脾散

桂苓白朮丸

濕門

嗽病附

五苓散

葶藶木香散

白朮木香散

大橘皮湯

神助散

桂苓白朮丸

桂苓白朮散

白朮調中湯

甯神散

人參補肺散

薏苡仁湯

香連丸

甯肺散

白朮散

益黃散

火門

涼膈散

瀉心湯

調胃散

芍藥蘖皮丸

清涼飲子

犀角散

黃連解毒湯

八正散

三黃丸

大金花丸

黃連清心湯

黃連木通丸

燥門

神功丸

麻仁丸

脾約丸

潤體丸

寒門

薑附湯

四逆湯

二薑湯

末附湯

大已寒丸

附子理中丸

平胃散

養脾丸

兼治於內者

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡飲子

防風當歸飲子

白朮湯

兼治於外者

桂枝湯

麻黃湯

升麻湯

五積散

青金散

獨治於內者

陷胸湯

大黃丸

備急丸

枳殼丸

蓮殼散

木香檳榔丸

導飲丸

五香連翹散

四物湯

又方

定志丸

小欖榔丸

獨治於外者

青金散

水滸膏

金絲膏

赴筵散

化瘦丹

又方

煮肝散

小黃膏

木香檳榔散

又方

鉛白霜散

當歸散

葛根散

檳榔丸

瞿麥散 治氣積方

化斑湯
調治

無比山藥丸

香薷湯

妙功丸

茴香丸

人參調中湯

沉香降氣丹

卷之十三

劉河間先生三消論

神白散

胡粉散

三黃丸

經驗方

豬肚丸
葛根丸
人參白朮散
人參散

卷之十四

扁鵲華陀察聲色定死生訣要
診百病死生訣

病機

標本運氣歌

斷病人生死

辨十二經水火分治法
六陣十八反

運氣歌

治病
四因
五苦六年

卷之十五

世傳神效諸方目錄

瘡瘍癰腫第一

眼目疾證第三

解利傷寒第五

婦人雜病第七

心氣疼痛第九

腸風下血第十一

破傷風邪第十三

陰毒傷寒帶附

諸風疾證第十四

下痢泄瀉第十六

辟穀絕食第十八

水腫黃疸第十五
諸雜方藥第十七

太醫先生辭世詩仍附於後

儒門事親卷之十五

瘡瘍癰腫第一

治蠟姑瘡

良薑

白芨

瀝青

已上各等分

右為細末。嚼芝麻水同熬為膏。入冷水共定。用緋絹片火熨斗作膏藥貼瘡上。

又方千年石灰

茜根燒灰

右為細末。用水調雞翎塗上。

水沉金絲膏

貼一切惡瘡。

瀝青

白膠

已上各一兩

春秋宜用油

夏宜油蠟二錢半

冬宜用油蠟四錢

右件鎔開油蠟下瀝青白膠。用槐枝攪勻。綿子濾過。入冷水中扯一千餘遍。如瘡透了喫數丸作劑。于瘡口填者亦妙。攤紙上貼勿令火炙。

乳香散 治下疳。

乳香

沒藥

輕粉

黃丹

龍骨

烏魚骨

黃連

黃芩

銅碌

已上各等分

麝香許

右為細末。先以溫漿水洗過貼瘡上。

治蛇傷方

右用蒲公英科根作泥塗貼于傷處。用白麪膏藥貼之大効。

紫金丹

治疗瘡。

白礬

四兩

黃丹

二兩

右用銀石器內鎔礬作汁下丹使銀釵子攬之令紫色成也。用文武火無令太過不及。如有瘡先以周圍挑破上藥用唾津塗上數着無令瘡乾其瘡潰動取疔出也。兼瘡顏色紅赤為效。如藥未成就再杵碎炒令紫色。

治療瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡周圍用竹鍼刺破然後用瘡藥于瘡上攤之。用緋絹蓋覆如人行二十里。覺疔出然後熱醋湯洗之。

千金托裏散 治一切發背疔瘡。

連翹

二兩

黃耆

半兩

厚朴

二兩

川芎

一兩

防風

兩

桔梗

兩

白芷

一兩

芍藥

半兩

官桂

一兩

木香

三錢

乳香

半錢

當歸

兩

沒藥錢三

甘草兩一

人參兩半

右為細末。每服三錢。用酒一椀盛。煎三沸。和滓溫服。膏半貼之。

三聖散 治諸瘡腫。

黃丹兩二

白礬飛兩

右為細末。每服乾摻瘡口上。後用保生錠子。捏作餅子貼之。

保生錠子

巴豆四十錢另研

金脚信錢二

雄黃三錢

輕粉半錢

鋼砂錢二

右件為末。用黃蠍一兩半化開藥。將和成錠子。冷水浸少時取出。旋捏作餅子如錢眼大。將瘡頭撥破。每用貼一餅子。次用神聖膏藥封貼。然後服托裏散。若瘡氣透裏危者。服破棺散。用神聖膏貼之。

神聖膏藥 貼治一切惡瘡。

當歸半錢

沒藥錢三

白芨二錢半

乳香三錢

藁本半錢

琥珀二錢半

黃丹四錢

木鼈子五箇

膽礬錢一

粉霜錢一

黃蠍二兩

白膠三兩

巴豆二十五箇去皮

槐柳枝一百二十條長二把

清油一斤

右件一處先將槐柳枝下油內煮焦。取出。次後下其餘藥物。煮得極焦。亦撈出。却將

油澄清再熬成膏子。用緋絹上攤貼之。

破棺丹

大黃半兩

甘草二兩

荆三稜半兩

山梔子二兩

牽牛末二兩

右為細末。煉蜜為丸如彈子大。每服半丸。食後酒半盞研化服之。忌冷水。
三聖散 治臍瘡。疔瘡。搭手背疽等瘡。

葱白一斤 馬兜一斤 石灰一斤

右三味濕搗為團。陰乾為細末。貼瘡。如有死肉者。宜先用潰死肉藥。

潰死肉藥方

炊飯尖半兩各

一等半兩入巴豆三箇

一等半兩入巴豆二箇

一等半兩入巴豆五箇各

白錠子燃

右先用二巴豆納瘡如不潰。再用納三巴豆又不潰。用五巴豆者。更用丹砂炒紅色。摻瘡口。追出清水。其惡肉未盡。至追出赤水。是惡肉盡。更用三聖散貼之。用膏藥傅之。

治臍瘡久不愈者

用川烏頭黃藥各等分為末。用唾津調塗紙上貼之。大有効矣。

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之。或為細末貼之亦妙。

又方 用臘月人中白燒灰油調塗瘡疥上。

又方 以瓦松不拘多少陰乾為末先用槐枝葱白湯洗之過摻之立効。灸瘡久不斂者更妙。

又方 以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺。

替鍼丸

治一切惡瘡

川烏

錢二

草烏

錢二

五靈脂

錢二

輕粉

一分

粉霜

又方

加班貓

二十箇去翅足用

巴豆

二十箇去皮用

右將三件為末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班貓巴豆以水調糊為錠子。如是作

謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡。

懸蔓一箇

大黃兩

金銀花

兩一

當歸

半兩

皂角刺

兩一

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子治附骨癰及一切惡瘡。

當歸

兩半

甘草

一兩

山梔子

一箇

木鼈子

兩一

右為細末每服三五錢冷酒調服之。

治諸惡瘡

白殭蠶直者

大黃二味各等分

右為細末。生薑自然汁與蜜同和為劑丸如彈子大。每服一丸細嚼。

治惡瘡死肉錠子

巴豆一錢去皮油

五靈脂醋

黃丹二錢飛

加枯白礬錢

右為細末以糊和丸錠子入瘡內用之。

當歸活血散

治瘡瘍未發出。內痛不可忍。及婦人產前後腹痛。

當歸二錢

沒藥半錢

乳香半錢

白芍藥三錢

瘡瘍者加人參。木香。婦人加赤芍藥。

右為細末。每服一錢。水一中盞。煎至七分。和滓溫服。日二服。婦人酒煎。瘡既發不須用。

薰惡瘡方

紫花地丁

一名米布袋收

右取根曬乾用四箇半頭。壘成爐子燒着地丁。用絡塹壘一枚蓋了。使令壘眼內烟出。薰惡瘡出黃水自愈。

治蛇瘡

用蒲公英科眼作塗貼于傷處。用白膏藥封之。

接骨散 幷治惡瘡

金頭蜈蚣箇

金色自然銅半兩燒紅醋碎

乳香末用之

銅錢五文燒紅醋研碎細

金絲水蛭一錢半作三截每箇瓦上燙去氣道為度

沒藥研細

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛。如見得出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便効。如打折骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一大盞熱調連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方屢經效驗不可具述。服藥觀可以食前服食後服。又外用接骨藥。

陳蠶麻根

桑一把羊耳

亂絲一握多

右取肥松節劈碎約量輕重先放三兩根于新瓦上都於上外三味在上燒着存性就研為末如生再燒研為度後入五靈脂或半兩如疼入好乳香少許和藥如茶褐色為度用布條子約纏一遭先攤小黃米粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用軟帛三五重上又竹簍子纏勒得緊慢得中初三日換上一次再後五日換一次又七日再換上一次無有不接者。

赤龍散 消散一切腫毒。

用野葛桃根紅者去粗皮為末。新水調塗。腫上頻掃新水。

便癰方本名血癰

牡蠣

大黃

甘草

已上各半兩

懸蔓一箇

右酒浸露一宿服之。以利為度。

又方
冬葵子為末。酒調下三兩服。

又方
皂角不蛀者燒過陰乾為末。酒調服立効。皂角子七箇。水調服之亦効。

又方
胡桃七箇燒過陰乾研為末。酒調服之不過三服大効。

又方
生蜜米粉調服。休喫飯。利小便為度。

治瘡無頭者

蛇退皮于腫處貼之。

又方
皂角刺燒灰陰乾。

右為末。每服三錢。酒調嚼葵菜子三五箇。前藥送下大効。

生肌斂瘡藥

白斂

定粉

各等分

黃丹

許少川

右同為細末。洗淨瘡口乾貼之。

治諸瘡水度腫者

生白礮末水調塗之自消。

接骨藥

銅錢半兩醋浸淬
燒研為末

木香錢

自然銅錢

射香炒許

右為極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一枚乳香一粒無灰酒一小盞在下食前如不折其藥反出服罷其痛不可當勿疑待一日如骨未接再服如前老者十餘少者不過五七日。

萬聖神應丹出箭頭

莨菪科根名天仙子取着中一枝葉花實全者佳

右於端午日前一日持不語尋見莨菪科言道先生你却在這裏那道罷用柴灰自東南為頭圍了用木樣子攢取了根周迴土次日端午日未出時依前持不語用饅頭一隻取出土用淨水洗了不令雞犬婦人見于淨室中以石臼搗為泥丸如彈子大黃丹為衣以紙袋封了懸于高處陰乾如有人着箭不能出者用緋絹盛此藥訖放臍中用綿裹肚繫了先用象牙末于瘡口上貼之後用前藥如瘡口生合用刀子利開貼之。

治凍瘡

臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡口上。

又方 以正黃藥為細末。用乳汁調塗瘡口上。

又方 以山藥少許。生於新瓦上磨為末。塗瘡口上。

治手足裂

白芨不以多少為末。水調塗裂處。

治面上瘡

用鐵子底黑煤于小油中以匙打成膏子。攤在紙上貼瘡神效。

治金瘡血不止

用白薇末貼之立止。

善應膏藥

黃丹二斤

南乳香研另

沒藥研另

當歸

木鼈子生用

白斂生用

官桂三寸

杏仁生

白芷以上各一兩

新柳枝各長一斤

除黃丹乳沒等外。八件用芝麻油五斤。浸一宿。用鐵鍋內煎令黃色。藥不用。次入黃丹。鍋內柳條攪令黃色方可掇下。用柳枝攪出大煙。入乳沒勻令冷。傾在磁盆內。候藥硬。用刀子切作塊油紙裹。

接骨丹

五靈脂一兩

茴香錢一錢

右二味為細末。另研乳香為細末。于極痛處擦上。用小黃米粥塗了。後用二味藥末。摻于上。再用帛子裹了。用木片子纏了。少壯人二日効。老者五六日見効矣。

治癬如聖丸

黃藥 黃芩 黃連 防風 已上各半

白僵蠶一兩 全蝎三分 輕粉三錢

右為細末。羊蹄根汁浸蒸餅為丸。如梧桐子。每服二三十丸。嚼羊蹄根汁送下。隨病人上下分食前後。又羊蹄汁塗癬。

治小兒癬雜瘡

白膠香 黃藥 輕粉

右為細末。羊骨髓調塗癬上。

治療癰方

班貓去頭足 赤小豆 白僵蠶 苦丁香 白丁香 磨刀泥

右各等分。為細末。十歲已上服一錢。二十已上服二錢。五更用新汲水一盞調下。比至辰時見効。女人小便見赤白色三兩次。男子于大便中見赤色白色為効。當日服白粘粥。不得喫別物。大忌油膩。患三四年者。只一服。七八年者再一服。土餅子。治療癰。一切惡瘡軟瘍。

右用白膠一兩。磁器內鎔開去滓。再于磁開後以草麻子六十四箇作泥入膠內攪勻。入小油半匙。頭柱點水中試硬軟添減膠油。如得所量瘡大小以紺絹攤膏藥貼之。一膏藥可治三五癩。

又方治瘰癧

小龍肚腸

炮乾一條

鱉殼裙襬

炮 川練子

五箇

牡蠣

大黃

牛蒡子

燒存性

皂角子

五箇

右為細末。蒸餅為丸。如菉豆大。每服十五丸。食後。父湯下。日三服。

又方。將臘月貓糞用新瓦兩箇合在內外。用鹽泥固濟。燒成灰。以小油調塗瘡口上。又方。取小左盤龍。不以多少為末。陳米飯搜和得所。丸如梧桐子大。每服三五十丸。却用陳米湯送下。

治眉瘲頭瘡

小麥不以多少。燒冷黑色。存性為末。以小油調塗瘡上。

治小兒瘻瘡

羊糞熬湯洗去痂。用屋懸燥炒羅為末。以小油塗瘡上。

聖靈丹

治打撲脢損痛不可忍者。

另研

三錢

乳香

另研

烏梅

研細去核末

白萬華子

二兩八錢炒

令黃搗為末

白米

一念另

研細末

右再入乳鉢內研數百下。煉蜜為丸如粟大。細嚼熱湯下。病在上食後。在下食前。
出醫方

右用蕎麥殼一擔。不爛者燒灰存性。入石灰半斤。同灰一齊過令火滅。然後以熱水
霖灰。窩淋下灰水。用鐵器內煮。以獵起攬成膏子。于醫上點自出。或先以草莖刺破
亦可。

又方。桑柴灰石灰淋汁熬成膏。草莖刺破點。以新水沃之。忌油膩等物。
燒湯火方

多年廟上蜘蛛與走獸為末。小油調塗燒湯火瘡効。

又方。生地黃汁入小油蠅同熬成膏。磁器內盛。用雞翎掃盪處。

又方。牆上青苔燒灰。小油調塗燒湯處。

治燒燙方

生地黃旋取新者。爛搗取自然汁。入小油黃蠅少許。銀石器中熬成膏子。用雞翎
掃瘡上。

又方。血餘灰用臘豬脂調塗。

又方。寒水石燒過為細末。水調塗之。

枯瘤方

砒

乳香三錢

沒藥一錢

礀砂

黃丹

雄黃

粉霜

輕粉

以上各等一錢

同研為末。粥糊為丸。煌作碩子樣爆乾。先灸破瘤頂三炷為則。上以瘡藥餅蓋上用黃蘖末以水調貼之。數日自然乾枯落。下

又方。以銅碌為末。草刺破瘤。摻在上。以膏藥塗之。

治頭面生瘤子。用蜘蛛勒瘤子根。三二日自然退落。

乳香散 貼杖瘡腫痛

大黃

黃連

黃蘖

黃芩

已上各三錢

乳香研

沒藥另研

以上各一錢

腦子訥

右四味為末。後入三味。冷水調勻。攤于緋絹上。貼杖瘡上。

治瘡瘍

馬明退燒灰三錢

輕粉訥

乳香訥

右研為細末。先以溫漿水洗淨乾摻之。

治瘡瘍久不愈者

海浮石燒紅醋漬數次

金銀花

右海石二停。金銀花一停。同為細末。每服二錢半。如簽茶一般。日用二服。瘡在上食

後在下食前服。如病一年服藥半年即愈。

瀉肺湯 治肺癰喘 坐卧不安。

桑白皮剉燒 甜葶藶隔紙焙 各一兩

右二味粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服以利為度。

桔梗湯 治肺癰吐膿。

桔梗剉炒半兩 甘草炙剉兩

右為粗末每服六七錢水二盞煎至半盞去滓空心服須臾吐膿立愈。

黃芩散 治鵬窠微腰等瘡。

黃芩 白芨 白斂 已上各等分 黃丹沙

右為細末涼水調塗。

口齒咽喉第二

地龍散 治牙痛。

地龍去足

玄胡索

薑撥

已上各等分

右為細末每用一字用綿子裹隨左右痛于耳內塞之大効。

牙宣藥

薑撥

胡椒

良薑

乳香另研

麝香

細辛

青鹽

雄黃

已上各等分

右為細末。先以溫漿水刷淨。後用藥末于痛處擦。追出頑涎沫吐了。嗽數十次痛止。

忌油膩一二日。

仙人散
刷牙

地骨皮浸二宿二兩

青鹽一兩

黍粘子半兩

細辛一兩
酒浸

右為細末。入射香少許。每用一字。臨卧擦牙。茶酒嗽良久。吐出。

又方 石膏

細辛

柳根

已上各等分

右為末擦之。

治牙疳

米二停

鹽一停

盆碱

射香許少

白礬

右相合。水拌勻。紙包裹。燒黑焦為末。貼瘡上立愈。

治牙痛

口噙水水一口。用大黃末紙燃。隨左右痛處。鼻內任之立止。

又方

韶粉二錢

好朱砂一錢

右為末。每用少許。擦痛處。

又方 好紅豆錢

花碱許

右為末隨牙痛處左右鼻內噙之。

又方 華細辛去

不蛀兒角去皮黃皮

川升麻

華撥

青鹽

明石膏

川芎

已上各等分

右為細末早晚刷牙溫水漱之牙痛處更上少許。

又方

以巴豆去皮用針刺于燈焰上灸令烟出薰牙痛處薰三五上。

又方高良薑一塊

全蝎一隻

右為細末先用酸漿水嗽牙次用藥末擦之流下涎水即愈。

又方治牙疼

花

牙坑痛立止。

又方 枯白礬熱

之

治走馬咽痺

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞于鼻中立透如左右俱有者用二枚。

又方

用生白礬研細塗于綿針上按于喉中立破綿針以榆條上用綿纏作囊大是也。又一法如左右喉痺于頂上分左右頭髮用手挽拔之剝然有聲立効此法年幼時常

見鄭六嫂救人甚多。不得其訣。近與子正話及方。得其傳。

又一法。以馬勃吹咽喉中。立止。

治喉痺

大黃

朴硝

白僵蠶

右件同為細末。水煎量虛實用。以利為度。

口瘡方

白礬

一兩飛至半兩

黃丹

一兩炒紅色放下再炒紫色為度

右二味為細末。擦瘡上。立愈。

目疾證第三

治倒睫拳毛

將川山甲以竹算子刮去肉。用羊腰窩脂去皮膜。仍將川山甲于炭上炙令黃。用脂擦去山甲上。如此數遍。令酥為末。隨左右眼噙水。鼻內噙一字。一月餘見効。

又方

木蟹子

三箇乾炒

木賊

一百二十一節

地龍

二條去土

赤龍爪

一百二十箇財勾刺針也

右為細末。摘去倒睫。每日以紙燃蘸藥噙之。一日三五次。

又方

穿山甲

炮地龍皮去

蟬衣

五倍子

已上各等分

右為細末。如用藥時先將拳毛摘盡後用藥一字隨左右鼻內噙之。次日目下如線樣微腫是驗也。

貼赤眼

取青泥中蛆淘淨曬乾為末。赤眼上乾貼之甚妙。

貼赤暗

蘆甘石兩
蜜陀僧一
黃連
朴硝

右方先將黃連用水熬成汁。入童子小便再同熬。後下硝又熬少時用火煅蘆甘石紅黃連汁內淬七次。與蜜陀僧末同為末。臨卧貼之。

貼赤眼

銅碌
輕粉
牙硝
腦子許
麝香

右為細末乾貼之。

截赤眼方

黃連
碌礎
杏子
甘草
銅碌
各等分

右為粗末。水煎洗甚効。

碧霞丹 治赤眼暴發。并治赤暗。

銅碌

白土

芒硝

右件各分為末丸如皂子大。每用白湯研化一丸。洗之立効。

汾州郭助教家神聖眼藥

蕤仁一兩
金精石二兩

銀精石二兩
爐甘石四兩
赤石脂一兩
滑石二兩

密陀僧二兩
秦皮一兩

黃丹一兩
飛過

銅碌錢三錢
磚砂三錢
硼砂半錢

乳香錢一兩
盆硝許少

青鹽一兩
腦子

麝香

以上并少用之

右用東流水三升先入蕤仁次用餘味等白沙蜜一斤熬至二升以線絹細濾過澄

清入前藥攪之勻點大効

視星膏

白沙蜜一斤
擗去蜜滓可秤十四兩

密陀僧水淘可得六七錢
一兩金色者研極細

新柳筍子半乾半炒

右用臘雪水五升與蜜鎔調入藥與柳筍子同貯于磁瓶中以柳木塞瓶口油絹封
勒於黑豆鍋中熬從朝至暮仍用柳棒閼瓶防傾側用文武火另添一鍋豆水滾下
旋於另鍋中取水添之熬成用重綿濾淨却入瓶中用井水浸三兩日埋在雪中更

妙頻點為上。

復明膏 治外障

白丁香

臘月收者尤佳
水飛秤八錢

揀黃連一兩

防風去蘆根一兩

新柳枝粉一寸

右好四味用新水一升半。雪水更妙。春秋而三時。冬月一宿。以銀石器內熬至六分。
濾去滓。另用蜜一斤。蜜陀僧研極細末三字。入蜜攪勻。另熬。以無漆匙捺點下蜜
中急攪。候沸湯定。一人攪蜜。一人旋又攪藥汁都下在內。攪勻。再熬兩三沸。色稍
變。用新綿三兩。重濾去滓。盛器內點眼如常。本方每藥半合。用片腦一麥粒大。不用
亦可。

錠子眼藥

黃丹一兩

黃蘖去皮半兩

黃連去鬚半兩

枯白礬兩半

爐甘石半兩用

黃連製

銅碌半兩

硇砂三錢

川烏炮三錢

乾薑二錢

蝎梢錢

信火半錢

乳香少許

沒藥少許

右為細末。入豆粉四兩。澆蜜和就。如大麥許。錠子于眼大旨頭。待藥化淚出為效。

治冷淚目昏

密蒙花

甘菊花

杜蒺藜

石決明

木賊節

白芍藥

甘草

各等分

右為細末。茶清調下一錢。服半月後加至二錢。

又方 乾薑肥者為末。每用一字。浸湯點洗。

又方 貝母一枚。膩白者。胡椒七粒。為末點之。

單治目昏

荆芥穗

地骨皮

楮實

已上各等分

右為細末。煉蜜為丸。桐子大。每服二十九丸。米湯下。

治一切目昏

川椒

一斤微炒。搗取
約取四兩

甘菊花

四兩

生地黃

一斤取新
泥極爛

右將地黃泥與前藥末同和作餅子。透風處陰乾。再為末。以蜜為丸。如梧桐子大。每

服三十丸。食後茶清送下。

洗眼黃連散

當歸

赤芍藥

黃連

黃柏

各等分

右細剉。以雪水或甜水濃煎汁。熱洗。能治一切風毒赤目。

諸物入眼中

好墨清水研。傾入眼中。良久即出。

點攀睛瘀肉

黃丹

飛過涼乾
一兩二錢水

白礬

一兩化成
銀器汁

右將白礬于銀器內化成汁。入黃丹末在內。以銀匙兒攪勻。更入乳香沒藥各一錢。慢火不住手攪令枯乾為粉。候冷研極細。熟絹羅過。後入鷹條一錢半。血竭二分。射香少許。輕粉三分。粉霜二分。共研極勻。如粉。再以熟絹羅過。細末點之。大有神效。

青金散

芒硝一兩

螺青

沒藥

乳香

已上各少許

右為細末。每用少許鼻內噙之。

治雀目

炒黃色為細末

石油蠟就熟和為丸。如皂子納于猪腰子中。麻繻蒸熟食之。可配米粥。

頭面風疾第四

治黴增風刺方

苦參一斤

紅芍藥

冬瓜

二味各四兩

玄參兩

右為末。每用一字用手洗面上。

猪蹄膏洗面上。黑藥

右用猪蹄一副。刮去黑皮。切作細片。用慢火熬如膏粘。用羅子濾過。再入鍋內用蜜半盞。又用

白芷

黑豆去皮

瓜蔓草一箇

白芨

白斂

苓苓香

藿香

已上各一兩

鵝梨二箇

右將七味藥為末。同梨入藥一處再熬。滴水不散方成。以絹濾過。臨卧塗面。次日用漿水洗面。

治面風

益母草灰麪湯和燒七遍洗面用之。

治面黓黑斑點方

白附子兩 白芨 白斂 蜜陀僧 胡粉 白茯苓 各等分
右為細末洗淨臨卧以乳汁調一錢塗面但洗光淨牛乳亦可。

治頭風

苦丁香 川芎 藜蘆 各等分

右為細末噙水鼻內噙之

芎黃湯 治頭目眩運

大黃 荆芥穗 贊芎 防風 已上各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服之以利為度。

耳聾方 草麻子五十箇去皮

右與熟棗一枚同搗和丸如棗子大更入小兒乳汁就和每用一丸綿裹納于聾耳內覺熱為度一日一易如藥難丸日中曝乾

又方口噙甘草一枚耳中塞二塊用綿裹立通。

腦宣方

皂角不蛀者去皮弦子蜜炙搘碎水中揉成濃汁熬成膏子。鼻內噙之口中咬筋良久涎出為度。

治耳底方

以枯白礬為末填于耳中立効。

治鼻中肉蠻姑

赤龍爪

苦丁香

以上各三十箇

苦葫蘆子炒

射香炒

右為末用紙撲子點藥末用之。

腋臭方

烏魚膏

錢三

枯白礬

錢三

蜜陀僧

錢一

右為末先用漿水洗臭處後用藥末擦之。
又方蜜陀僧不以多少研細先以漿水洗臭處乾擦。

馬頭藥

細針沙炒

蕎麥炒

以上各一盞

大麥亦同

釀醋半升與前二味打糊。

凡用先使皂角水先洗淨時前二味糊稀稠得所于鬚髮上塗之均勻先用荷葉包次用皮帽裹之三五時辰用溫漿水洗了却收取元針沙其鬚髮淨後用黑藥塗之。

黑藥方

沒食子

石榴皮

乾荷葉另研旋

已上各一兩

五倍子

柯子皮

百藥煎

金絲磐

碌磬另研旋

間洗淨甚黑

右將七味為細末。炒熟麪五六匙入好醋打麪糊和藥末。再塗鬚髮。又用荷葉封裹。後用皮帽裹之。三五時間洗淨甚黑。若更要黑光。用猪膽漿水澤洗如鴉羽。

又方

酸石榴

五倍子

芝麻葉

右同杵碎用絹袋盛之于鐵器內。水浸掠髮自黑。

治大頭病兼治喉痺方歌曰

人間治疫有仙方

一兩殭蠶二大黃

薑汁為丸如彈大

井花調蜜便清涼

又法以砭針刺腫處出血立効。

治時氣

馬牙硝

寒水石

泰粘子

鬼臼

川大黃

鬼劍草

已上各等分

腦子計

右六味為細末。用新井花水一盞。藥末一二錢入腦子。喫外一半。留用新水得稠雞
翎掃在腫處。有風涼處坐。

解利傷寒第五

雙解丸

巴豆六箇去
天麻半錢

胭脂少許

右將巴豆天麻為末。滴水丸如米大。胭脂為衣。一日一丸。二日二丸。三日三丸。以外不解先喫冷水一口。後用熱水下。如人行十里。以熱湯投之。又一法。無藥處。可用兩手指相交。緊扣腦後風門穴。向前禮百餘拜。汗出自解。又一法。適於無藥處。初覺傷寒傷食。傷酒傷風。便服太和湯。百沸湯。是避風處。先飲半碗。或以薑汁亦妙。以手揉肚。覺恍惚。更服半碗。又用手揉至恍惚。更服。以至厭飮心無所容。探吐汗出則已。

不卧散

川芎半兩

石膏七錢

藜蘆去土半兩

甘草二錢半生

右為細末。口噙水。鼻內各噙之。少時喫白湯半碗。汗出解之。

川芎湯解利一切傷寒。

川芎

藁本

蒼朮

右三件為細末。沸湯點三錢。須臾覺嘔逆便解。如不解再服之。
諸腰脚疼痛第六

皂角膏

右用醇酒二大碗。皂角一斤去皮弦搗碎熬至一半。沸去滓。再用前汁入銀石器教為膏子。隨痛處貼之。

治腰脚疼痛方

天麻

細辛

半夏

巴上各二兩

牛黃白朮丸

治腰脚濕痛

黑牽牛

大黃

各二兩

白朮兩一

右為細末。滴水丸桐子大。每服三十九。食前生薑湯下。如要快利加至百丸。婦人雜症第七。

如聖丹 治婦人赤白帶下。月經不來。

枯白朮

蛇床子

各等分

右為末。醋作麪糊丸。如彈子大。以胭脂為衣。綿子裹納于陰戶。如熱極再換。

洗洗丸 治婦人無子。

當歸

熟地黃

巴上各二兩

玄胡索

澤蘭

巴上各一兩半

川芎

赤芍藥

白薇

人參

石斛

牡丹皮

巴上各一兩

右為末。醋糊為丸。每服五十九桐子大。空心酒下。

當歸散 治月經欲來前後腹中痛。

當歸
微炒以米醋

玄胡索用

沒藥
研

紅花
用

右為末溫酒調下二錢。

治產婦橫生 草麻子三十箇。

研爛婦人頂上剃去髮少許。以上藥塗之須臾覺腹中提正便刮去藥却于脚心塗之自然順生也。

治血崩 蟬沙不以多少。

右為末每服三五錢熟酒調下服。

又方 管仲去須判碎

或用酒醋煎三錢煎至七分去滓溫服一服立止。

當歸散 治血崩

當歸
兩

龍骨
燒赤

香附子
三錢

棖毛灰
兩

右為細末空心米飲調下三四錢忌油膩雞豬魚肉等物

蓮殼散

乾蓮蓬
燒灰存性

棖櫚皮及毛 各燒灰已上各半兩

香附子
二錢

右為細末每服三四錢空心米飲湯調下服之。

治婦人血枯

川大黃

右為末。醋熬成膏。就成雞子大作餅子。酒磨化之。

三分散 治產後虛勞不進飲食。或大崩後。

白术

茯苓

黃芪

川芎

芍藥

當歸

熟乾地黃

已上各一兩

柴胡

人參

已上各一兩六錢

半夏

半夏切洗

甘草炙

已上各六錢

右為粗末。每服一兩水一大盞。煎至半盞去滓溫服。日二服。
治產後惡物上潮痞結大小便不通。

芒硝

蒲黃

細墨

各等分

右為末用童子小便半盞水半盞調下服之。

治婦人產後虛弱和血通經。

當歸

芍藥

香附子

三兩

右為細末。每服一二錢。米飲調下。服之無時。

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝

竈底焦土研細

用酒調三五錢。瀉出惡物立止。

治娘婦下痢膿血及咳嗽。

白术

黃芩

當歸

各等分

右為末。每服三五錢。水煎去滓。食前加桑皮止嗽。

百花散

治婦人產中咳嗽。

黃芩

桑白皮

用蜜塗慢火
黃色為度

二味各等分

右為細末。每服一二錢。水一盞。入糯米二十粒同煎至六分。以欬冬花燒灰六錢攪在藥內。同調溫服之。

治婦人吹姦

以樺皮燒灰存性。熱酒調下三錢。食後服之。

又方

馬明退

燒灰
五錢

輕粉

三錢

射香

許

右為細末。每服二錢。熱酒調下服之。

又方

以皂角燒灰。蛤粉和熱酒將來調數字。下得喉嚨笑呵呵。

又方

以淘米木杓上砂子七箇酒下。以吹筆枝透乳孔甚妙。

欬嗽痰涎第八

九仙散

九尖草麻子葉

三錢

飛過白礮

二錢

右用猪肉四兩。薄批碁盤利開擦藥二味。荷葉裹文武火煨熟。細嚼白湯送下。後用乾食壓之。

止嗽散

半夏一兩半
洗七次湯

桔白礬四兩

右二味為末。生薑打麪糊和丸桐子大。每服三二十次。空心溫酒送下。

八仙散

欵冬花

佛耳草

甘草 鍾乳

鴉管石

白礬

官桂

井泉石

已上各等分

右為細末。每服三錢。水煎服之。喉中一兩方擦

三才丸 治嗽

人參

天門冬去心法

熟乾地黃

已上各等分

右為細末。煉蜜為丸。如櫻桃大。含化服之。

三分茶

茶二兩

蜜二兩

蕎麥麪四兩

右以新水一大碗。約打千餘數。連飲之。飲畢。良久下氣。不可停人。喘自止。

石膏湯

治熱嗽

石膏亂文者

人參半兩

甘草半兩

右為細末。每服三錢。新水或生薑汁。蜜調下亦可。

三生丸 治嗽。

胡桃仁一兩

生薑皮細切

杏仁兩

右二味同研為泥。就和作劑可得十三四丸。臨卧爛嚼一丸。可數服即止。

化痰延壽丹

天麻半兩

枸杞子半兩

白朮半兩半半

半夏一兩半湯

乾生薑半兩

人參一兩

右為細末。好糯酒拌勻如砂糖。用蒸餅劑蒸熟。去皮杵白搗四五十杵。便丸如乾入酒三點。丸如小豆大。每服三五十丸。生薑湯下。

半夏湯 治噦欲死者。

半夏洗一兩

生薑二兩

右二味細切。水二盞。煎至八分去滓。作二服食後。

治肺痿喘嗽。

漢防已

右為細末。每服三錢。漿水一盞。同煎至七分。和滓溫服之。

治年高上氣喘促。睡卧難禁。

右蘿蔔子搗羅為末。白湯浸調五七錢食後服之。或炒或用糖蜜作劑為丸服之。

麻黃湯

治因風寒衣服單薄致嗽。

麻黃

不去節

甘草

生用

杏仁

生用

右為粗末。每服三二錢。水煎食後溫服。

心氣疼痛第九

失笑散 治急心痛。并男子小腸氣。

五靈脂

半兩

蒲黃

炒半兩

右為末。每服三錢。醋半盞煎二沸。再入水半盞。再煎二沸。空心食前。和滓溫服之。

又方

醋一盞。加生白礬一小塊。如皂子大。同煎至七分。溫服立愈。

又方

高良薑

半兩

山梔子

半兩

蔚金

半兩

又方

以新嫩槐枝

一握

切去兩頭。水二盞煎至一盞。去滓分作二服。熟服之。

又方

沒藥

乳香

薑黃

玄胡索

已上各等分

右為末。每服三錢。水煎食後服之。

小腸疝氣第十

抽刀散

川練子

同炒黃破四分巴豆三箇

茴香

一兩鹽炒黃

右為細末。每服三錢。葱白酒調下。空心服之。

治陰痛不可忍。

吳茱萸二兩。焙乾微炒七遍

檳榔一兩

茴香一兩

右為細末。醋糊為丸。熱酒送下十九丸。食前服之。

治偏腫。茴香

甘遂

右二味各等分。為末。酒調二錢。食後服之。

又方 巴戟去心

川練炒

茴香炒

各等分。為末。溫酒調二錢服之。

治小兒疝氣腫硬。

地龍去土

為末。唾津調塗患處。

治小腸氣痛。

全蝎一兩

茴香炒黃

右為細末。醋糊和丸如梧桐子大。如發時。每服五七十九丸。溫酒送下。食前服之。

治小便渾濁如精之狀。

沒藥

木香

當歸

已上各等分

右為末。以刺棘心自然汁為丸。如梧桐子大。每服五七丸。食前鹽湯下。

治小便頻滑數不禁

知母

黃芩

已上各等分

右剉碎酒浸透炒微黃為末水丸梧桐子大如服藥前一日休喫夜飯來日空心立
服米飲湯下一百丸只見一服効後喫淡白粥一頓

蕩疝丹

川練子炒

茴香炒

破故紙炒

已上各半兩

黑牽牛錢

青皮

陳皮

已上各三錢

廣茂錢四

木香錢四

右八味為細末用好酒打麪糊為丸如梧桐子大空心溫酒食前下三十九
灸疝法放疝邊堅紋左右交弦灸七壯

腸風下血第十一

神應散 治腸風痔漏

牛頭角腮一隻中者酌

猪牙皂角

穿山甲

四方取或一寸取或

蝟皮一兩

蛇退皮條

右五味錘碎盛在小口磁器內鹽泥固定日中曝乾瓶口微露出烟用文武火燒紅
赤烟微少取出放冷為細末如服藥日先一日臨卧細嚼胡桃仁半箇如糊用溫
醇糯酒一盞送下不語便睡至次日交五更服藥驗病年月遠近或秤三錢五七

錢。用水半大碗。醇糯酒半大盞相合。熱和藥服之。至辰時再服。

又一服再依前服藥。不須用胡桃仁。久病不過七服。忌油膩魚鱉雞兔猪犬等物。大有神効。

溫白丸 治臟毒下血。

椿根白皮 飲引酒去粗皮
漬晒乾服

右為木棗肉為丸如梧桐子大。每服三五十丸。淡酒送。或酒糊丸。

治脫肛痔瘻

胡荽子一升 乳香少許 粟糠半升或一升

右先泥成爐子。留一小眼可抵肛門大小。不令透煙火薰之。

治脫肛

蔓陀羅花子 蓮殼對 橡椀十六箇獨

右搗碎水煎三五沸入朴硝熟洗其肛自上。

治痔漏下血不止

紫皮蒜十箇獨者妙 大椒六十粒 豆豉四兩

右搗爛為泥丸彈子大。空心細嚼一丸。鹽湯下。日進三服。効。

治痔漏

白牽牛頭末

四兩

沒藥錢

右同為細末。如欲服藥先一日不食晚飯。明日空心將犢豬精肉四兩燒令香熟。薄批薑藥末在內裹之。漸又細嚼食盡。然後用宿蒸餅壓之。取下膿血為効。量病大小虛實加減服之。忌油膩濕麪酒色三日外不忌。一服必効。或用淡水煮肉熟用上法亦可。又云服前一日不食午飯。并夜飯。明日空心服之。

又方 黑白牽牛一合炒黃為末。猪肉四兩切碎炒熟。與藥末攪勻。只作一服。用新白米飯三二匙壓之。取下白蟲為効。

又坐藥黑鯉魚鱗二三甲以薄編鹽裹如棗柱樣納乏痛即止。

淨固丸 治痔漏下血痒痛。

槐花

炒

枳殼

去穰

已上各一兩

右為細末。醋糊為丸。如梧桐子大。每服二十九米飲湯下。空心食前。十服見効。

黃連貫衆散 治腸風下血。

黃連

雞冠花

貫衆

大黃

烏梅

以上各一兩

甘草

三錢

枳殼

炮

荆芥

已上各一兩

右為細末。每服二三錢。溫米飲調服食前。

槐荆丸 治痔漏

荆芥槐花等分為末水煎一大椀服丸亦可為之。

又方 豆豉炒 槐子炒 各等分

右為末每服一兩水煎空心下。

薰潔藥

鳳眼草

赤皮葱

椒

三味搗粗同漿水滾過坐盆令熱氣薰痔。但通手潔之。如此不過三次愈矣。

小兒病證第十二

治小兒瘡痘

蘆薈

史君子

已上各等分

右為細末米飲調下一二錢服之。

玉筋散 治小兒馬脾風。

甘草

煎水

甘遂末

字

右同油蜜生薑銀釵兒攬調下後用冷水半盞調奪命散。

奪命散 治小兒胸膈喘滿。

檳榔

大黃

黑牽牛

白牽牛

各等分皆當各半生熟用之

右為細末蜜水調服之。

治小兒班瘡入眼

麸炒蒺藜炙甘草

羌活防風等分搗

每服二錢漿水下

撥雲見日直到老

治瘡疹黑陷

鐵脚威靈仙一錢炒末

腦子分

右為末用溫水調下服之。取下瘡痂為効。

治小兒黃瘦腹脹

乾雞糞一兩

丁香末一錢

右為末蒸餅為丸如小豆大。每服二十九米湯下。

黃連散 治小兒頭瘡。

川黃連

黃蘖去粗皮用

草決明

輕粉

已上各等分

治班瘡倒壓方

胡桃一箇燒灰存性

乾胭脂三錢

右為末用胡荽煎酒調下一錢服之。

又方 人牙燒灰存性研入射香少許。每服三錢。溫酒調下少許服之。不拘時。

又方 小猪兒尾尖取血三五點研入腦子少許新水調下。食後與服之。

又方 人中白臘月者最佳。通風處以火煅成煤水調三五錢。陷者自出。

消毒散 治瘡疹已未出咽喉腫痛。

牛蒡子

炒二兩

甘草

半兩

荆芥

分

右為粗末。每服三錢。水一盞半煎至七分。去滓溫服。不拘時。

治小兒班瘡入眼

猪懸蹄甲

二兩。固齶燒焦為末。用鹽泥取去土。

蟬殼

取去土。

羚羊角

研為細末。吃用。

右二味為末。研入羚羊角細末一分拌勻。每用一字。百日外兒服半錢。三歲已上服三錢。新水或溫水調下。日三四服。夜一二服。一年已外則難治之。

又方 透耳藥

朱砂

一錢

粉霜

八分

右研為細末。水調少許。用匙杓頭傾一兩點于耳內中後用。

白菊花

一錢

菜豆皮

一錢

穀精草

一錢

夜明沙

一錢

右四味為末。用米泔半盞。熬成去滓。入乾柿十餘箇。再同熬。每日喫兩三箇。仍飲煮乾柿湯。

又方 治小兒班瘡入眼。

朱砂

一錢

腦子

一錢

水銀

一錢

射香

一錢

已上各等分

右四味研為細末。用水銀調滴入耳中。
發班藥 珠子七箇研碎。用新水調勻服之。

破傷風邪第十三 陰毒傷寒亦附於此

辰砂奪命丹

鳳凰臺

川烏頭生

已上各二錢

射香計

朱砂計

右為細末。粟肉和為丸。如彈子大。朱砂為衣。鰻酒送下。量病人年甲虛實加減用之。小兒半丸。以吐為度。不止以葱白湯解之。

治破傷風

病人耳塞。并爪甲上刮末。唾津調塗。瘡口上立效。無瘡者難用。

治破傷風

烏梢尾箇

兩頭尖箇

全蝎箇

右三味為細末。另用石灰五升。柴灰五升。沸湯五升。淋灰水。澄清下藥熬之。鐵鍋器內攬成膏子。加稠。用唾津調。先用溫漿水洗淨瘡口。後塗藥。即時藥行。吐黃水一日。以新水漱口即愈。

又方

天南星半生半熟

防風去

二味各等分

右為末。清油調塗瘡上。追去黃水為驗。

又方

白芷用

草烏頭尖生用

二味等分

右為末。每用半錢。冷酒一盞。入葱白少許。同煎服之。如人行十里。以葱白熱粥投之。

汗出立愈。甚者不過二服。

又方。蜈蚣散。

蜈蚣頭

烏頭尖

附子底

蝎梢

四味各等分

右為細末。每用一字或半字。熱酒調下。如禁了牙關。用此藥幹開灌之。治陰毒傷寒破傷風。

草烏頭燒熟去皮取肉

麝香

朱砂

右為細末。每服一字。以熟酒調下。食前服之。汗出為度。忌猪兔魚鱉羶羶肉。

治陰毒病者

用芥末以新水調膏藥貼臍上。汗出為効。

又方。牡蠣乾薑末。新水調塗手心。握外腎。汗出為効。

諸風疾證第十四

不老丹 治一切諸風。常服烏髭駐顏。明日延年。

蒼朮四斤。米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子。內一斤用板三兩去白炒黃去殼。何首烏二斤。米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子。用瓦甑蒸先鋪黑豆三升乾棗二升上放何首烏上更鋪棗二升黑豆三升用炊單復着上用盆合定候豆熟取出不用

地骨皮去粗皮重一斤

右件於石臼內搗為細末。候用椹汁搜和如軟麪劑相似。磁盆內按平。上更用椹汁。

藥上高三指。用紗綿帛覆護之。晝取太陽。夜取太陰。使乾再搗羅為細末。煉蜜和丸如梧桐子大。空心溫酒下六十丸。忌五辛之物。

四仙丹

春甲乙採杞葉

夏丙丁採花

秋庚辛採子

冬壬癸採根皮

右為末。以桑椹汁為丸。每服五十丸。茶清酒任下。

起死神應丹 治癱瘓四肢不舉。風痺等疾。

麻黃去根節河水五升熬可成膏子五升研

白芷兩半

桑白皮兩半

蒼朮去皮二兩

甘松去土二兩

川芎三兩

苦參半兩

加浮萍二兩

已上各為細末。用膏子和丸如彈子大。每服一丸。溫酒一盞化下。臨卧服之。微汗出勿慮。如未安隔三二日再服。手足即時軟快。及治卒中風邪。涎潮不利。小兒驚風。服之立効。

愈風丹

芍藥

川芎

白僵蠶炒

桔梗

細辛葉去

羌活

已上各半兩

麻黃去節

防風去蘆

白芷

天麻

全蝎炙以

各一兩

甘草錢

南星半兩生薑製用

朱砂半兩

為衣

右為末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。細嚼茶酒吞下。

香芎散 治偏正頭風。

貫芎

香附子 炒

石膏

亂紋者良水飛

白芷

甘草

薄荷 已上各一兩

右為細末。每服二錢。溫酒或茶清調下服之。

妙功十一丸 治癰。

丁香

木香

沉香

乳香

射香

荆三稜

炮

廣茂

炮

黑牽牛

微炒

黃連

雷丸

炒

鶴虱

炒

胡黃連

黃芩

甘草

炙

大黃

倍

陳皮

青皮

雄黃

熊膽

以上各二錢半

赤小豆

三百六粒煮

白丁香

直尖者三十粒

輕粉

四錢

巴豆

粒

右二十三味為細末。赤小豆煮爛研泥。同蕎麥打糊。和作十一丸。朱砂為衣。陰乾。服時水浸一宿。化一丸。大便出。隨病各有形狀。取出為驗。或作化一丸。不可再服。曾經火灸者不治。遠年愈効。

朱砂滾涎散 治五癰。

朱砂

水 白礬

赤石脂

消石

以上各等分

右同為細末。研蒜膏如丸。菜豆大。每服三十九。食後荆芥湯下。

又方 朱砂不以多少水飛研為細末。

右用猪心血浸蒸餅為丸如菜豆大。每服二十九。空心金銀湯下之。

治諸風疥癬及癩

浮萍

兩一

荆芥

川芎

甘草

麻黃

半兩上各

或加芍藥

當歸

右為粗末。每服一兩水一椀入葱白根豆豉同煎至一半無時服。汗出為度。

治癩塗眉法

半夏

生用

羊糞

燒

已上各等分

右為末。生薑自然汗調塗。

五九散 治癩

地龍

去土

蟬殼

白僵蠶

凌霄

全蝎

已上各九箇

右同為末。只作一服。熱酒調下。浴室中汗出粘臭氣為効。

苦參散 治癩風

苦參

頭末

猪肚

一箇

右以苦參末摻猪肚內用線縫合隔宿煮軟取出洗去元藥先不喫飯五頓。至第二日先飲新水一盞後將猪肚食之。如吐了再食之。食罷待一二時用肉湯調無憂散五七錢。取出小蟲一二萬為効。後用皂角一斤不蛀者去皮弦及子搘碎用水四椀。

煮至一椀。用生絹濾去滓。再入苦參末。攪熟。稀麪糊膏子相似。取出放冷。後入餘藥。
相和藥附後。

何首烏

二兩

防風

一兩

芍藥

五錢

人參

三錢

當歸

一兩

培

培一兩

右為細末。入皂角膏子為丸如桐子大。每服三五十丸。溫酒或茶清送下。不拘時候。
日進三服。後用苦參荆芥麻黃煎湯洗冷。

水腫黃疸第十五

治通身黃腫

芥蒂焙乾三四錢

右為細末。每用半字。於鼻內吹。上日三度。併吹三日。如不愈。後用黃芩末之煎湯。五
錢服下。

治蠱氣

取環腸草。不以多少。曝乾水煎。利小便為度。

治黃疸面目遍身如金色

瓜蒂

四箇

母丁香

一箇

黍米

九粒

右先搗瓜蒂為末。次入二味同為細末。每用半字。夜卧令病人先噙水一口。兩鼻內各半字。吐了水。令病人便睡。至夜或明日。取下黃水。旋用熟帛搘了。直候取水定。便

服黃連散病輕者五日重半月。

黃連散 治黃疸大小便秘澁壅熱。

黃連

三兩

川大黃

一兩
拌炒過用之
剉碎醋

黃芩

甘草

各一兩

右為細末每服二錢食後溫水調下一日三服。

治水腫不利小便非其法也故內經云濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之。吐瀉後長服益元散加海金沙煎以長流水服之則愈矣。大忌脚膝上針刺出水取一時之效後必死矣。尤忌房室濕麪酒醋鹽味犯之必死。

木通散 治水腫

海金沙

舶上茴香

巴戟

大戟

甘遂

芫花

木通

滑石

通草

已上各等分

右為細末每服三錢以大麥麪和作餅子如當十錢大爛嚼生薑湯送下。

下痢泄瀉第十六

治痢

紫苑

桔梗

赤芍藥

白朮

已上各等分

右為細末每服三五錢細切羊肝拌之作麪角兒燒服之後用白湯送下食前。

治痢

杜蒺藜炒研為末。酒調下三兩服。

香豉丸 治痢

蒜為泥

豉為末

右二味相和作丸。如梧桐子大。米飲湯下五七十丸。食前服之。

治大人小兒吐瀉腹脹胸膈痞閼

五靈脂

青皮

陳皮

硫黃

芒硝

已上各等分

右將硝黃於銚子內。以文武火鎔開。用匙刮聚。自然結成砂子。取出研碎。與前三藥同末。麵糊為丸。如菉豆大。小兒麻子黃米大。每服二十九丸。量虛實加減。米飲湯送下。

無時。

又方治瀉 車前子不以多少。右為細末。每服二錢。米飲湯調下服之。水穀分吐瀉止。

諸雜方藥第十七

治消渴

棟黃連二兩八九節者良

右剉如哎咀。以水一椀煎至半椀去滓。頓服立止。

百日還丹

佛焰子

樟柳眼

已上各等分

為末。枸杞汁和丸如雞頭大。每服十九丸。新水送下。

酒癥丸

巴豆

箇十六

全蝎

箇十五

雄黃塊

白麵

兩五

右為末。滴水丸如豌豆大。每一丸如痛飲者二丸。
立應丸 治臟腑泄痢。膿血不止。腹中疼痛。

乾薑

炮炙末一兩

百草霜

一兩

巴豆

釀坡一兩

杏仁

一兩同巴豆和皮炒黑
色杵為泥後入霜研用

右用黃蠟四兩鎔開。臘次入前四味用鐵器攪勻。旋丸桐子大。每服三五丸。甘草湯下。白痢用乾薑湯下。食前若水瀉溫水下。

反胃 黃藥末。熱酒調三五錢。食後服之。

治小便多

滑數不禁

金剛骨為末。以好酒調下三錢服之。

又方

白茯苓

去黑皮一兩

乾山藥

去皮過慢火焙乾用之

右二味各等分。為細末。稀米飲調下服之。

治卒淋痛

芫花散

三錢

茴香

二錢微炒黃色

右為細末。水煎服之。

治酐方

以水調白麵稀稠得所。趼上以紙封之。明日便乾。如不曾破者。剥去麵便行。

治大便秘

生麻子不以多少研爛水調服之。

坐劑治大便久秘攻之不透者用之。

又用蜜不計多少慢火熬令作劑。稀則粘手。硬則脆。稀稠得所。堪作劑搓作劑樣。如棗核大粗如筋。長一寸許。蘸小油內于肛門中坐良久自透。有加鹽少許。以素問鹹以軟之。

交加飲子 治久瘧不已山嵐瘴氣。

肉豆蔻

十一箇

裹燒一箇

草豆蔻

二箇

同上

厚朴

二寸

一半

生薑

二塊

如棗紙裹

甘草

二寸半

一半

生用

用一兩

炙用

半生

熟用

一兩

裹

生薑

二塊

煨過

半生

半熟

右為末。每服分一半水一碗。銀石器內煎至一大盞。去滓溫服。發日空心。未愈則再服。

大真丸 補虛損

佛架柒。男用女。女用男。以新水四擔洗盡血水。以酒煮爛為泥。

歲靈仙

一兩

當歸

半兩

硝砂

一兩

蓮子肉

二兩

炒熟

乾地黃

一兩

廣茂

兩

甘草

二兩

牡丹皮

一兩

牛膝

一兩

酒浸

木香

半兩

炒熟

白朮

一兩

白茯苓

一兩

右為細末。與君主同搗。羅為細末。酒浸蒸餅為丸。如梧桐子大。每服三十九。三進。

日服

取雕青

水蛭取陰乾為末。先以白馬汗擦青處。後用白馬汗調藥塗之。

治蚰蜒入耳中

右用貓尿灌耳中立出。取貓尿用盆盛貓以生薑擦牙大妙。

又方 黑驢乳灌耳中亦出

又方 以濕生蟲研爛塗于耳邊自出。

辟穀絕食第十八

辟穀方

大豆五升 洗淨蒸三遍

糯米五升 去皮為細末

淘淨同白茯苓一處蒸熟用之

大麻子五升 湯浸一夜瀝出蒸三遍

白茯苓五兩 去皮同上糯米一處蒸熟為用

右將麻仁末一處搗爛如泥。漸入豆黃末同和勻。便團如拳大。再入甄蒸。從初更着火至半後夜住火。至寅時出甄。午時曝乾。搗為末服之。以飽為度。不得喫一切物。用麻子汁下。第一頓一月不飢。第二頓四十日不飢。第三頓一千日不飢。第四頓永不飢。顏采日增。氣力加倍。如渴飲麻仁汁轉更不渴。滋潤五臟。若待喫食時。分用葵菜子三合為末。煎湯放冷服之。取其藥。如後初間喫三五日白米稀粥湯。少少喫之。三

日後諸般飲食無避忌。此藥大忌飲事。

又方 蔴苓餅子

白茯苓四兩為末

頭白麵一二兩

右同調水煎餅麪稀調以黃蠟代油燶成煎餅蠟可用三兩飽食一頓便絕食至三日覺難受三日後氣力漸生熟果芝蔴湯米飲涼水微用些小潤腸胃無令涸竭開食時用葵菜湯并米飲稀粥少少服之。

又方 保命丹

人參五

兩

麻子仁二

兩炒去皮

乾地黃

瓜蔓子

炒酒

兔絲子

酒浸

已上各二

兩

生地黃

炮去皮生用一兩

乾大棗

各三兩

大豆黃

粗一升去沫煮

黑附子

炮去皮用一

杏仁去皮

去皮生用一兩

白茯苓

茯神

地骨皮

去粗皮煮

蔓精子

煮熟用

麥門冬

心用去火

天門冬

心用去火

車前子

蒸去火

地膚子

遍蒸七

黍米作粉

粳米作粉

白糯米作

粉

天門冬

車前子

側柏葉

蒸去火

已上各二

兩五錢

右同為細末各揀選精粹者臘月內合者妙他時不可合。如合時須揀好日淨室焚香志心修合勿令雞犬婦人見。又將藥末用蠟一斤半濾去滓白蜜一斤共二斤半一處溶開和勻入臼杵二千下微入酥油丸如梧桐子大每服十丸服至五日如來日服藥隔宿先喫糯米一頓粳米白麵皆可次日空心用糯米粥

飲送下如路人服遇如好食喫不妨要止便止如喫些小蒸餅爛爵喫或乾果子以助藥力不喫更妙忌鹽醋日後退下藥來於長流水中洗淨再服可百年不饑矣。

先生辭世詩一首

徘徊歲將暮我今者破番成羞青燈黃色已無用死生默定何怨尤倚闌無語笑西風書劍不成空白頭錯錯功名兩事自擔閣休休富貴榮枯非自由却以數事養愚叟我今說破君知否一張琴一壺酒一溪雪五株柳漫昂藏閑抖搜從今跳出是非叢雖然盡屬風浪口千年不復見菱花縱有那能照妍醜爭如拂袖傲林泉追退興衰幾常久紙窗土坑醉復醉日夕間醒吞五斗

又絕句四首

學劍功夫兩不成年來蹤跡愈如萍而今漁水無魚釣收拾漁竿海上行耽嗜醫經五十年野芹曾獻紫宸前而今憔悴西山下更比文章不值錢齒豁頭童六十三邇來衰病百無堪舊游馬上行人老不是當初過汝南幻化形軀事可悲遽罹災患數難移我應不達長生理汝莫將來免死期