

重修政和經史證類備用本草

寅 24

9 (7-12)

共 6 册

重修政和經史證類備用本草卷第十二

成都唐慎微續證類

心口古

審定總目

木部上品總七十二種

一十九種神農本經

白字

六種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

注云唐附



二種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附



一種新補



七種新分條

一種唐慎微續補

墨蓋子
下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂

桂桂

菌桂

松脂

寶葉根節等附松黃松
蕊唐注五粒松續注

槐實

枝皮根
等附
葉上蟲
窠續注

槐膠

新定

槐花

新補

拘杞

葉上蟲
窠續注

柏實

葉皮側柏
等附
元附琥珀下
今新分條

茯苓

附花
茯神

琥珀

生漆
等附

瑩

根
元附琥珀下
今新分條

榆皮

附花

酸棗

生漆
等附

欒木

根

楮實

葉皮莖白汁等
附穀帛續注

乾漆

生漆
等附

五加皮

牡荆實

蔓荆實

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂

皮附唐附

女貞實

拘骨冬青續注

木蘭

蕤核

丁香

今附母丁香續注

沉香

薰陸香

雞舌香

藿香

詹糖香

檀香

乳香

已上六種元附沉香下今各分條

蘇合香

獅子屎續注

金櫻子

今附自草部今移

降真香

八種海藥餘

藤黃

返魂香

海紅豆

落鴈木

莎木

柵木皮

無名木皮

奴會子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

舍水藤中水

臯蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛囉勒

靈壽木皮

綵木

斑珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

放杖木

石松

牛妳藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑

桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷
疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻衄能



墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏少服

神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

得人參麥門冬甘草大黃

黃芩調中益氣得茈胡紫石英乾地黃療吐逆

陶隱居

云按本經惟

有菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者

單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以

蕊涼合和雲母蒸化爲水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興

桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉

亦好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳

林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂

時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒湏之蓋禮所云薑

桂以爲芬芳唐本注菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏無毛而光

澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之

殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種桂皮稍不同若菌桂

老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名

筒桂其牡桂嫩枝皮名爲肉桂亦名桂枝其老者名木桂亦名大桂

得人參等良本是菌桂剝出單桂條陶爲深誤也

余按陳藏器本草

云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂爲名今

之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛

烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者爲一色以厚嫩

者爲一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也

以老大而名焉簡卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮

上甲錯取其近裏辛而有味王禹錫等謹按蜀本注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似批杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似

柏葉者乃云陶爲深誤剥出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂言者此云仙經有三桂以蕊涕合和雲母蒸化爲水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊爲諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶爲深誤何臆斷之甚也

抱朴子

云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之

藥性論

云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生蕊味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閨治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治臘息肉

日華子

云桂心治一

切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝破瘀癥瘕瘕消瘀血治風痺骨節攀縮續筋骨生肌肉生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者爲木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂

圖經曰菌

桂

心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也
今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別
名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小
枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於箇桂而長數倍其
嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮爲木蘭皮
肉爲桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心
赤今欽州所出者華密而細亦恐是其類但不作柏葉形爲疑耳皮
厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂爲一物亦未可據
其木俱高三四丈多生深山巖洞中人家園圃亦有種者移植於嶺
北則氣味殊少辛粹固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結
實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月八
月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西湖國
功用似桂不過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯
甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗乾薑一斗
桂一斗凡四物㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中
置馬矢搘中善封塗勿使泄氣五日五夜出布綿絮暴乾復瀆之以
盡其汁每瀆必瞬其目乃出布綿乾之并用滓與絮複布爲中其布
長六七尺爲六七巾即用之生桑炭灸巾以熨寒痺所刺之處令熱
入至於病所寒復炙巾以熨之三十編而止汗出灸巾以拭身亦三十
編而止起步內無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又
治臂筋急亦以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩
渴益氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入

新瓷瓶中後下二物攏二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七
重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人

亦多作故

雷公云

凡使勿薄者要紫色厚者去上鹿皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有

桂草元無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

聖惠方

治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩爲末以酒調如膏用傅頂上并額角

又方 治九種心

擣羅爲散不計時候痛妨悶用桂心一分爲末以酒一

熱酒調下一錢匕立効

又方 治寒疝心痛四肢逆冷全

不欲食用桂心二兩去皮

擣羅爲散不計時候熱酒調下二丸

外臺秘要 治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩擣羅爲散狗膽汁和丸如櫻桃大

不計時候用熱酒磨下二丸

又方 治小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分擣丸服如小豆大溫水下日三

千金方

治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心

汁故布蘸榆病上正即止左渴榆右右渴榆左常用大効

又方 大治失音未桂著舌下漸嚥汁

又方 以水四外煮取一升分二服

後方 治卒心痛桂心八兩㕮咀

水四外煮取一升分三服

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水一

外二合煮取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得

又方 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩㕮咀以水三外煮取二升

去庠適寒

又方

治反腰有血痛擣桂篩三升

許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛氏方 治卒吐

溫盡服

方寸匕晝夜含二十許服亦

又方 治產後腹中痕痛末桂溫酒

服方寸匕日三子母秘錄同

又方 治垂血取桂心

擣作末以水下

桂屑

方寸匕晝夜含二十許服亦

又方 治產後血泄不禁

服方寸匕日三子母秘錄同

又方 治產後血泄不禁

止餘血彌痛兼塊

桂心一兩去其麌皮

孫真人食忌

治中風失音方桂一尺以

水三升煎取一升服取汗

又方 治垂血取桂心

擣作末以水下

桂心乾薑等分爲末

梅師方 蜀椒閑口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體

冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升

外忽食飲吐漿煎

濃豉汁 又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂

心末和水調方寸匕塗之

又方 治中風失音用桂心一兩去其麌皮

斗門方 近人身體懷之至兩時辰許爲末分

空心酒調服方寸匕

為三服每服用水二盞煎取

一盞服之差大妙聖惠方同

姚和衆方 令熱熨之日可四五度

桂可以合蕊涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以

抱朴子云 龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙

他子服桂二十年足下毛

生日行五百里力舉千斤

寒表虛皆湏此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療

寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已

不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散爲陽故漢張仲景桂枝湯治傷

寒表虛皆湏此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療

寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已

不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問

寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已

不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問

甘發散爲陽之說尤知菌牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麤厚處亦不中用諸家之說固各執已見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世爲別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫

無毒主上氣欬逆結氣喉痺吸心痛

通神輕身不老生南海山谷

陶隱居

云南海郡即是廣州今

皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹爲復猶是桂生有老宿者爾亦所未究唐本注云爾雅云侵音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂又單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂

心出融州桂州交州甚良

臣禹錫等謹按蜀本

圖經云葉狹長於菌

桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此爲善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之爾雅疏云授一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺拔葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也

藥文具桂

性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經

條下

經驗

後方

治大人小兒與雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如菉豆大小兒熟水下五丸大人十九未產再服

菌桂味辛溫無毒

主百病養精神和顏色爲諸藥先聘

通使久服輕身不老面白生光華媚好常如意子生交

阤桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

阤屬交州桂

林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明

非今桂矣必當別是一物應更研訪

唐本注

云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三

道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州自禹錫等謹按蜀本圖經云葉似柿葉而尖狹光淨花白藥黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經

文具桂條下

列仙傳

閻河之桂實大如栗

得而食之後天而老別說云

謹按諸家所說


韓終采藥詩

范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又

曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本

經以菌桂養精神以牡桂利開節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者
枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小
枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味苦甘溫無毒主疽瘍瘻頭陽火癆瘡風氣安
五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白
其赤者主惡瘧久服輕身不老延年一名松膏一名松
肪生太山山谷六月採

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九

月採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延

年

目禹錫等謹按曰
華子云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

陶隱居云採鍊松脂法並在服食方
中以桑灰汁或酒煮軟搘內寒水中

數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如粟以水及麵飲服之亦有陰

乾搗爲屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松柏皆有脂潤又麥冬不凋理爲佳物但人多輕忽近易之

爾唐本注云松花名松黃拂取似蒲黃正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名

青白可愛也

目禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之主耳

齧牙有缺孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風癩病云又有五葉者一叢五葉如鉤名五粒松道家服食總粒

子如巴丘新羅往往進之

日華子云

松脂潤心肺下氣除邪煎膏治

癆爛排膿

又云

松葉暖無毒灸醫瘡風濕瘡佳

又云

松節無毒治

腳軟骨節風又云松根白皮

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有

之其用以通明如薰陸香顆

者爲勝道入服餌或合茯苓松柏實菊花作丸皆先鍊治其法用大

金加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布

松脂於上炒以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出

之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其

寶及根白皮古亦有服食法但个松實多作果品餘不聞堪入藥其

花上黃粉名松黃山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮

用寄遠燒其枝上下承取汁液名松脂音詣主牛馬瘡皮上綠衣名

艾納香用合諸香燒之其煙不散方書言松爲五粒字當讀爲驥音

之誤也言每五驥爲一葉或有兩驥七驥者松歲久則實繁中原雖

有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松

故附見

於此

聖惠方 絶穀昇仙不食法取松實搗爲膏酒調下三錢

五百

又方

服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀

里

二錢亦可粥汁服之

不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下

初服稍難久自便矣

又方

治牙斷歛齒根暗黑用松節燒灰揩之神妙

滿日三四度用之

收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服

神仙餉松實用七月取松實過時即落難

松脂未墮瘡孔令

治一切

滿日三四度用之

收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服

慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集

療刺
入肉

上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落

兒遺方

治疥癬
松膠香

研細約酌入少輕粉蜜令勻凡疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度

傷寒類要

治天行病
辟溫方切

松葉如米酒服方寸

抱朴子

趙瞿病癩歷年醫不差家乃賣糧

匕曰三辟五年瘧

抱朴子

弃送於山穴中瞿自怨不幸悲歎

涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘧愈顏色悅肌膚

列仙傳

偓佺好食松實能飛行健走及馬以

潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中

列仙傳

極多汝可鍊服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲

齒不墮髮不白夜卧常見有光大如鏡

列仙傳

松子遺堯堯不能服松者搘松也

野人開話

列仙傳

伏虎草師篇煉松脂法十斤松脂五度以水煮過令苦

味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水

列仙傳

下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰松黃一如蒲黃但其味差淡治產後壯熱頭痛頰赤口乾

列仙傳

唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎當歸石膏蒲黃五物

等同爲末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分去滓粥後溫溫細

列仙傳

呷松子多海東水今開右亦有但細小味薄與柏子仁同治虛祕

高郵軍槐實



槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止延嘔補絕傷
五痔火瘡婦人乳癰子藏急痛以七月七日取之擣取
汁銅器盛之日煎令可作丸大如蠶屎內竅中三易乃
愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭

景天爲之使陶隱居云槐子以

相連多者爲好十月已日採之新盆盛合泥百日皮爛爲水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁

周公注

云別錄

云八月斷槐大枝使生嫩孽煮汁釀酒療

大風瘻痺甚效

槐耳味苦辛平無毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐

樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止蝎毒

周易等謹按爾雅

云槐

槐葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕釋曰攘槐一也大葉而黑名攘不爾即名槐又曰槐葉晝合夜開者別名守宮槐聶合也炕張也

性

論云槐子主治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣痛槐白皮

味苦無毒能主治口齒風瘻血以前漿水煮含之又煎沐浴男子陰癰勿腫陳藏器云槐實本功外殺蟲去風合房折取陰乾煮服味一

如茶明日除熱淚頭腦心脣間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉養養如船車上者花堪染黃子上房七月收之染皂木爲灰長毛髮

自華云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒又云槐皮草治

中風皮膚不仁唯痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛

長肉消癰腫

槐盡合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有

別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十

月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅爲黑灰以揩齒去虫燒青枝取滬以塗癰取花之陳久者浸末飲服以治

圖經曰

槐實生河南平澤今處處有之其木有極高

大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名攘

槐盡合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有

別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十

月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅爲黑

灰以揩齒去虫燒青枝取滬以塗癰取花之陳久者浸末飲服以治

下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮汁以治口
齒及下血水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血及
五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月
上已日取槐子去皮內新釀中封口三七日初服一枚再二枚至十
日十枚還從一枚始大良劉禹錫傳信方著湖州王及郎中槐湯灸
痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充
西川安撫使判官乘驃入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜
貫於腸頑熱如塘灰火至驃僵仆主郵吏云此病某曾患來湏灸即
差及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道熱氣
入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驃而馳
雷公云 凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡
使用銅鉗搘之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

療 主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主癰瘍牙齒諸風疼
如棗許正發和水服若不止飲熱水一外蛔虫出

千金方

療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油

止飲熱水一外蛔虫出

一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研

之至暝止令仰卧以塗向眼眴曰三度差

成取鼠糞大內穀道中日三亦主癰瘍百種瘡

膽中清陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮黑百日內通神

又方

治九種心痛當太歲上

取新生槐枝一握去兩

外臺秘要

樹上木耳燒灰末

療蛔蟲心痛取槐

取槐木枝如馬鞭

作二段齊頭麻油

食

止飲熱水一外蛔虫出

一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研

之至暝止令仰卧以塗向眼眴曰三度差

成取鼠糞大內穀道中日三亦主癰瘍百種瘡

膽中清陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮黑百日內通神

又方

古方明目黑

取新生槐枝一握去兩

又方

古方明目黑

取槐子熟搗絞取汁

食

頭水三大外煮
取一升頓服

又方

治鼻氣窒塞以水五外煮槐葉
取三外下慈政調和再煎飲

千金翼

治蠻蠅瘡槐白皮醋浸

肘後方

治內癟用槐白皮擣丸
綿裹內下部中得効

又方

療腸痔每大便常下血
木耳取末飲服方寸匕口三服

百一方

治中風身直不得屈伸反
覆者取槐皮黃白者切之

以酒或水六外煮取二升
去滓適寒溫稍稍服之

經驗方

洗痔上便以艾灸之七壯
近取槐枝燒灰食前酒下方

寸又方 治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆

分為末酒調下一錢匕
坐湯之虛其穀道令更緩良久欲大便當出不過三度

即愈如用末
綿裹內下部

食醫心鏡

治野雞痔下血腸風明目方
斤熬如造炙法取藥碾作末如茶法煎

呻廣利方 治姪娠難產令易方
水吞槐子七枚即出

廣濟方

療牙齒疼痛取槐樹葉一
皮一握切以醋一外煮

去滓用鹽少許適寒
溫含之曰三易之

必効方

療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處
一大握水二外煮取一外洗之三五

偏冷復煖若涉遠恐衝
風即以米粉粉之即効

張文仲

療腸痔方槐樹上耳擣末米飲服
方才寸匕日三又槐白皮一擔剉以

水煮令濃脫衣入水中坐
冷更易不過三用虫出止

傷寒類要

大熱心悶者槐子
燒末酒服方寸匕

子母

秘錄

日月未足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把即易產

產寶

療崩中不止不間年月遠近方槐耳燒作灰爲未以

酒服方寸匕

太清草木方

槐者虛星之精以十月上已日採子服之去百病長生通神

言夾也夾中子大如豆堅而紫色者實也今本條不析出

衍義曰

槐實止言實本當分爲二實本出來中若擣夾作煎者當

槐實本當分爲二實本出來中若擣夾作煎者當

夾與夾中子蓋其用各別皆疎道風熱

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥

新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用

新補見日華子圖經文具

槐實
條下

簡要濟衆

治婦人漏下血不絕槐花鵝不以多少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

行義曰

槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之金中有所溢下稠黃澤滲潤爲餅染色更鮮明治腸風熱渴血甚

佳不可過劑

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下脣脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑

一名杞根一名地骨一名拘忌一名地轉一名羊乳一

名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

陶隱居云今出

堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云夫家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生啖亦蒸煮食也枸杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有百乎

高麗等譜按爾雅疏

云杞一名枸櫞郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云名苦杞否地骨春生作羹茹微苦其莖似荀子秋熟正赤莖葉及子服之輕身

性論

云枸杞

目子藥同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明

自安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲

代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解

之能消熱麵毒又根皮細剉麪拌熟煮吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾為末入乾地黃中為丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉搗汁注眼中妙

五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石

經曰

枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石

圖

榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其莖幹高三五尺作叢六月

七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨春夏採

葉秋採莖實冬採根謹按爾雅云杞拘櫞郭璞云今枸杞也詩小雅

四牡云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦

其莖似苺子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記著西

河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之三月上辰採莖

四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花

八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採

根十二月上丑治服之又有并花實根莖葉作煎及單笮子汁煎膏

服之其功並等今人相傳謂枸杞與拘棘二種相類其實形長而枝

無刺者真枸杞也圓而有刺者拘棘也拘棘不堪入藥而下品溲音

搜疏條注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形似空

疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今

注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別是三物相似而二物

又有刺溲疏亦有巨骨之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細

辨耳或云溲疏以高大爲別是不然也今枸杞極有高大者其入藥

乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根蟠結甚固故

其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州州寺大井傍生枸

杞亦歲久故土人目爲枸杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷

及田野丘墟地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞

一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是枯死竹竿之

色黑者一種是菜類并此爲三物而同一名也陳子昂觀王篇云余從

補闕喬公北征夏四月次于張掖河洲草木無他異惟有仙人杖往

往叢生子昔嘗餌之此役也息意茲味戊人有薦嘉蔬者此物存焉
因爲喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而甘心食之旬
有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦
怪其味甘喬公信是言乃譏子子因作觀王篇按此仙人杖作菜茹
者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘
當是拘棘拘棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦
仙人杖味甘設疑爲拘棘拘棘亦非甘物乃知草木之類多而難識
使人惑疑似之言以真爲偽失青黃甘苦之別而至於是宜乎子昂
論著之詳也

雷公云

凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾

食療

寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛

用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善益人代茶法煮汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜擣葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲者熟吞之去腎氣尤良又益精氣

健人能去勞熱用生枸杞子五分好

酒二斗研搗勿碎浸七日漉去滓飲之初

以三合爲始後即任性飲之外臺秘要同

千金方

治齒疼煮枸杞汁含之

又方

治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二升擣破內納袋置罐中以酒一斗浸詰密封勿泄氣三七日每日飲之

任性

又方

治虛勞客熱用枸杞根末調服有固疾人不得喪

肘後方

治大赫瘡此患急宜防毒氣

又方

療目熱生膚赤白眼擣枸杞汁

洗目五

又方

犬食馬肉生狂方勿鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞汁煮粥飼之即不狂若不肯食糜

以蓋塗其鼻既逕驗

驗方

金礮煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅紙之則欲食矣

淨器浸之須是瓮用酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣

候方

熟者去嫩蒂子揀令潔淨便以無灰酒於布濾過候研濾皆畢去滓不用即井前漬藥酒及濾過藥汁攬勻量

銀鍋內多少外斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攬恐粘底

不匀候稀稠得所待冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晚溫酒

經

下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

驗後方

治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以政汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

又方

癰

輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東摘生地黃汁三升以好酒二升於甕瓶內浸二十一日了開封添地黃汁同浸攬之却以紙

經

三重封其頭了更浸候至立春前三十日開瓶空心緩飲一盃至立春後驗續却黑勿食無羹葱服之耐老輕身無比

備急方

治滿口齒有血枸杞和根苗煎湯食後與又治骨臍風經驗後方同

兵部手集

療眼暴赤

痛神効枸杞汁點眼立驗

沈存中方

陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻桃全少

核暴乾如餅

外臺秘要

療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗
煮取三升去滓更內益一兩煎取二升

傳目或加
乾薑二兩

治疽

凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少
淨洗先刮上面鹿皮留之再刮取細白穰取鹿皮同

地骨一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立効有一朝土腹脅

間病疽經歲不差人燒灰傳貼之初淋洗出血一二升其家人輩懼

欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許
血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云

拘棘亦非甘物今按諸文所說名極多故使人疑然此物
用甚衆花小而紅紫色採時七月上申日圖經所說實形

長而枝無刺者真枸杞也此別是一種類必多根而致疑又用根去

上浮麌皮一重近白者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗

衍義曰

枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一

謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又為之拘棘茲強生名耳凡杞未
有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還
如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直為補
腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱用之

乾州
柏實



密州側柏



柏實味甘平無毒主
虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤
美色耳目聰明不飢不老輕身延年生天山谷柏葉
尤良○柏葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩中赤白
輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採

陰乾○柏白皮主火灼爛瘡長毛髮

牡蠣及桂瓜子爲之使
畏菊花羊蹄諸石及麵

翹閑隱居

云柏葉實亦爲服餌所重服餌別有法柏處處有當以太

山爲佳並忌取塚墓上者雖四時俱有秋夏爲好其脂亦入用此云

惡翹人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也

唐本注

云柏枝節煮

以釀酒主風痺歷節風燒取瀝療癰疥及癩瘡良今子人惟出陝州

宜州爲勝太山無復採者

目禹錫等謹

按蜀本圖經云此用偏葉者

今所在皆有八月收子葉餘採無時

藥性論

云柏子人君惡菊花畏

羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風

治百邪鬼魅主小兒驚癇

又云

側柏葉君與酒相宜止尿血味苦辛

性澁能治冷風歷節疼痛

目禹錫等謹

云柏子人治風潤皮膚此是側柏

子入藥微炒用

又云

柏葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤癩髮

又云

柏

白皮

圖經曰

柏實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月

無毒

開花九月結子候成熟收採蒸暴乾春礪取熟人子

功用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生

功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把

乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一

升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側柏然云性

寒止痛其方採葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人

及小兒湯湯火燒塗傳於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅癩

又取葉焙乾爲末與川黃連一味同煎爲汁服之以療男子婦人小兒

大腹下黑血茶腳色或膿血如淀色所謂蠱痢者治之有殊效又能

殺五臟蟲道家多作柏葉湯常點益人古柏葉尤奇今益州諸葛孔
明廟中有大柏木相傳是蜀壯所植故人多採收以作藥其味甘香
於常拍也

雷公云

凡使先以酒浸一宿至明渡出曬乾却用黃精自
水用瓶器盛柏子人著火緩緩煮成煎為度每煎三兩
度拍子人用酒五兩浸乾為度又云凡使勿用花柏葉并
有子圓葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若苑柏葉其
樹濃葉成朵無子叢柏葉其樹綠色不入藥中用若修事一斤先揀去
兩畔并心枝了用糯米浸七日後渡出用酒拌蒸一伏時却用黃精
自然汁浸了焙乾又浸又焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤
用黃精自

聖惠方

治時氣瘴疫用社中西南柏樹東南枝取曝乾
擣羅為末以水調下一錢七日三四服肘後方同

又方

治大風疾令眉鬚再生用側柏葉九蒸九曝擣羅為末煉蜜
和丸如梧桐子大曰三服夜一服熟水下五十九丸百日即生

又方

治憂恚嘔血煩滿少氣脣中疼痛用柏葉擣羅為散不計時候以粥飲調下二錢七日

經驗後方

治霍亂轉筋先以燙物裹脚然後以柏樹木細剉煮湯淋之

又方

小兒洞下痢不乳食大便青白色用柏子人末溫水調下二錢

梅師方

治中熱油及火燒瘡以柏白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

人食忌

生髮方取側柏葉陰乾作末和油塗之

孫真人枕中記

採松柏法嘗以三月四月採新

生松葉可長三四寸許并花藥取陰乾細擣爲末其柏葉取深山巖
谷中採當年新生可長三二寸者陰乾細擣爲末用白蜜丸如小豆
大常以月一十五日日未出時燒香東向手持藥八十九以酒下
服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲
心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添五藏六腑清明耳
目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃
呪曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同

姚氏方

治鼠癰腫核痛未成膿以

年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

抱朴子

漢成帝時獵者於終南山見一人

柏葉傅著腫上熬鹽著腫上熨令熱氣下即消
飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人開
東賊至秦王出降驚走入山飢無所食泊欲餓死有一老公教我喫
松柏葉實初時苦澁後稍便喫遂不復飢冬不列仙傳

赤松子好食柏實齒則乾州柏茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但

寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

別說云

謹按陶隱居說柏忌取冢墓上者今云出乾州者最佳

落生
則乾州柏茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但
其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之柏異於他處其木未有
無文理者而其文多爲苔蘚雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有益得一
株徑尺者可直萬錢關陝人家多以爲貴宜其子實最佳也又以其
枝節燒油膏傳惡瘡久不差有蟲者牛馬畜產有瘡亦名爲重病以

傳之三五次無不愈也

衍義曰

柏取謂以療焉癘疥今未見用松諸者老人虛祕柏子仁大麻子人松子人等分同研溶白臘丸桐子大以少黃丹


湯服二三十九食前葷官陝西每登高望之雖千萬株皆二西指蓋此木爲至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之

正氣所制故二向之

西京茯苓



兗州茯苓



茯苓味甘平無毒

主胃脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下

結痛寒熱煩滿發逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大

腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開腎腑調藏氣伐腎邪

長陰益氣力保神守中以服安魂養神不飢延年

究其有抱根者名茯神○茯神平主辟不祥療風眩虛

五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精

神生太山山谷大松下二月八月採陰乾

馬間爲之使得甘草防風芍藥紫石

英麥門冬共療五藏惡白錄畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲附隱存云按藥無馬間或是馬莖聲相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作

之形多小虛亦不佳自然成者大如三四外器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煮之兩三沸乃切暴乾白色者

補赤色者利俗用甚多仙經服食亦爲至要云其通神而致靈和鬼而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷

穀不飢爲藥無朽蛀嘗掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其貞全不朽矣其有銜松根對度者爲茯神是其次茯苓後結

一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌唐本草云季氏本草云馬刀爲茯苓使無名馬間者間字草書似刀字寫人

不識訛爲間爾陶不悟云是馬並謬矣今太山亦有棲參白寶而塊小而不復採用第一出華山形極巖大雍州南山亦有不如華山者

今注馬間當是馬蘭二注皆恐非也

禹錫等謹按蜀本圖經云生

林林林下形塊無定以似人氣黑
華山最多范子云淡答出萬萬三輔

雅南子者佳矣所在有大松處皆有惟

注云：茯苓千歲松脂也。菟絲生其上。

一名女蘿也。典故云：族

琴者松脂入地千歲爲埃及望松樹

廣志云葆神松汁

所作勝游或曰松根茯苓實著之
益忌米泔能開胃上區始善安心神

生朱振漢陽縣藥性論云茯苓

腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣又云

主脛癆瘍瘻治小兒驚癇瘻疔心

定志補勞之主心下急痛堅滿人虛

而小腸不利加而用之其心名

黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風
云蒸氣冷補五勞二陽寒胎暖

筋攀不語心神故寧虛而健志

接擦開心益智止健忘忌醋及酸物明

泰山生泰山止山谷之出

大松下附根而生無苗葉花實作壠

如舉在土底大者至數斤似人

形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或
或云假公氣終不復生人采

云是多年松脂流入土中變成
之去，山公不為所惑故我有

或云假木氣於本根上生之東人謂其枯折槎枒葉不復上生者謂之

之油山中古木久為人輒伐若
疾尋發見之即於四面丈餘地

內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固

不可拔於是掘土取之其撥大

者族繁亦大皆自作塊不附著根上

其抱根而輕虛者爲扶神然則

假氣而生者其說勝矣二月八月採靈在菟絲之不伏加蕤蕘之采新雨採

伏者良皆陰乾史記龜策傳云伏

菟絲去之即矯燭此地矯音矯籠也蓋然火而籠罩其上也少滅即
記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類
今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩
以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取
牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性
任飽服之則不飢如欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙又茯苓蘇法
云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸
之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升
相和內末其中并置大瓮攬之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五
日蘇自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅入如手掌空室中陰乾
色亦如粟飢時食一枚酒送之終日不湏食自飽此名神仙度世之法
又服食法以合白菊花或合桂心或合木丸散自任皆可常服補益
殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄
熟按去盡赤滓方可服若合他藥則不湏爾凡藥有茯苓皆忌米醋
舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥
珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨按南蠻地志云林
邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂爲之彼人亦不復知地中有琥
珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮初
如桃膠久乃堅凝其方人以爲枕然
古今相傳是松類故附於茯苓耳

雷公云

凡採得後去皮心

神了擣令細於水
產婦黑皚如

盆中攬令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之
令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方

雀卵色用白茯苓

和蜜和傳之

肘後方

姚氏療點茯苓末白蜜經年

和塗上滿七日即愈

經驗後方

延年養老

服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甕瓶

內以好酒浸以三重紙封其頭後一百日開其色當如錫糖可日食

一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物

久服百日百病除二百日夜晝不眠

父久食之腸化爲筋可延年耐老面若童顏

二年後役使鬼神四年後玉女來侍

抱朴子

任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能

彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤

客龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔

宋王微

茯苓讀皓苓下居形紛上蒼中狀雞鳴具

佩紅可神仙服茯苓法

白茯苓去皮酒浸十五日漉出

爲散每服三錢水調下日三

行義曰伏苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味壹鑿

未絕故爲是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方

發泄於外結爲伏苓故不抱根而成物既離其本體則有苓之義茯

神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故

曰伏神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚

能生物乎答曰如馬敦菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土

之上精英未渝安得不爲物也其上

有菟絲下有茯苓之說甚爲輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血

通五淋生永昌

閻隱居

云舊說

云是松脂淪入地千年所化今燒

之亦作松氣俗有琥珀中有峰形色如生博物

志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂為松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煮蛤雞子及青魚枕作者並非真惟以拾芥為驗俗中多帶之

辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨丹所湏以赤者為勝今並從外國來而出茯苓處永無不知出琥珀處復有茯苓以否今

按陳藏器本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鼈甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以

賜軍士傳金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉呂禹錫等按蜀本注云又據一說楓脂入地千年變為琥珀乃知非因燒蜂窠成

也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覩其事而言則琥珀之為物乃是木脂入地千年者所化也但齡木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也藥性論

云琥珀君治百邪產後血瘀痛

日華子

云療蠱毒壯心明目摩翳止

心痛癲邪

圖經曰

文具茯

苓條下

海藥後乃凝結溫主止血生肌鎮

心明目破癥瘕氣塊產後血量悶絕兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鱉甲一兩京三棱一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為

散空心酒服三錢七日再服校量神驗莫及產後即減大黃凡驗真假於手心熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

雷

公云珀凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀鑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁太脆文橫水珀多無紅色如淺黃多龐皮破石珀

如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象
珀其內自有物命動此使有神妙鑒珀其珀是衆珀之長故號曰鑒
珀琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中用水調劑
柏子末安於堯鍋子中安琥珀於末中了下火者從已至申別有異
光別擣如粉重篩用

外臺秘要

治魚體骨橫喉中六七日不出琥珀珠一物貫串着繩推令前入至體所又復推以

牽引出矣若水晶珠亦得更無堅物磨令滑用之

又方

療從高墜下若為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲

黃二三匕服研如粉以童子小便調一錢三服差

通典

治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差

通典

日四五服差鬼遺方謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅實光潔甚別說云所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當尋大松摧折或因斫伐而根癟不朽斫之津潤如生者則附近掘取之蓋松木折不再抽牙其根不死津液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蚊蟲之類此未入土時所粘着者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣

衍義曰

琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾爲物形若謂千年茯苓所化則其間有沾

着螺蠶蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說爲勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張

茂先又爲燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經

鑿

烏兮

味甘平無毒古來相傳云松脂千年爲茯苓又

千年爲琥珀又千年爲鑿然三物燒之皆有松氣爲用

與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來

而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大

則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名爲木鑿謂玄玉

爲石鑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀

同見風拆破不堪爲器量此二種及琥珀或非松脂所

爲也有此差舛今略論也

新見唐本陳藏器蘇於琥珀注後出鑿功狀按鑿本功

外小兒帶之辟惡
磨滴目翳赤障等

車輪末服之攻婦

人小腸癥瘕諸疾

太平廣記

梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有瑩珀黑逾純漆或大如指頭

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒

主大小便不通利水道除邪氣腸胃

邪熱氣消腫性滑利以服輕身不飢其實尤良療小兒

頭瘡癰疮

花主小兒癩便不利傷熱

一名零榆生頴川山谷二月採

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人

陰陽居云此即今榆

樹剥取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并擅皮服之即令人不飢

唐本注

云榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經

誤也

今按陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月

收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江

東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶鑄誤也

目禹錫等謹

按爾雅疏云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針

刺如柘其葉如榆瀟為蔬美滑於白榆詩云山有樞是也

藥性論云

榆白皮滑能主利五淋治不眠療鶴取白皮陰乾後焙杵為末每日

朝夜用水五合末二錢煎如膠服差

孟說

云生皮主暴患赤腫以皮

三兩擣和三年醋淬封之日六七易亦治女人妬乳腫服丹石人採

葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹

間惡氣卒心痛食之良

曰華

子云榆白皮通經脉涎傳癖

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有

榆白皮通經脉涎傳癖

之三月生莢人古人採以為

糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有十數種葉皆相

似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剥之刮去上麤

皮中極滑白即爾雅所謂榆白粉也此皮入藥今孕婦滑胎方多用

之小兒白禿髮不生擣末苦酒調塗之刺榆有針刺如柘則古人所

茹者云美於白榆爾雅所謂樞莢詩唐風云山有樞是也二月採皮

取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損

人

食療

生榆皮利小便主石淋又取藥煮食之時復食一頓尤

仙家長服服丹石人亦食之取利開節故也又榆人可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣

內消之塵者尤良又塗諸瘡癬妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癰小便不利

外臺秘要 治渴小便非淋方

榆皮二片去黑皮以水一斗煮取五升一服

千金方 五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和

雞子白傳之火灼爛瘡榆白皮熟嚼封之差備急方 治身體暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食

小便利子母秘錄 療姪娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升

楊氏產乳

療身體及頭悉生瘡取榆白皮炒令黃搗

皮末醋和塗當出即散以好苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲又方 小兒白禿

養生論云

娠臨月日三服方寸匕令瘥極

差謹按榆白皮焙乾爲末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令瘥極

嵇叔夜別說云 榆令人瞋

易產 下兒身尚皆塗之信其驗也又濕搗治如糊用粘

瓦石極有力京東西北人以石爲碓觜每用此以膠之

衍義曰 則乾磧爲粉當歉歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以

爲羨茹嘉祐年過豐沛

人關食鄉民多食此

酸棗



酸棗味酸平無毒。志腹寒熱並結氣聚四肢。酸疼濕痺煩心不得眠。膚上下痛血轉久洩虛汗。煩渴補中益肝氣。堅筋骨助陰氣令人肥健。服安五藏。輕身延年。生

河東川澤八月採實陰乾四十日成。

惡防已
東山間云即此山棗樹
陶隱居云今出

子似武昌棗而味極酸。東人啜之以醒睡。與此療不得眠正反矣。
唐本云此即揷音貳。棗實也。樹大如大棗實無常形。但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠。不言用人。今方用其人。補中益氣自補中益肝。已下此為酸棗人之功能。又於下品白朮條中復云用其實。今

醫以棘實爲酸棗大誤今注陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中人服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓

其核中人微偏大棗人大而長不類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云今

河東及滑州以其木爲車軸及匙筋等木甚細理而硬所在有之八月採實日乾藥性論云酸棗人主筋骨風炒末作湯服之陳藏器云

按酸棗既是棗中之酸更無忙異此即真棗何復名酸旣云其酸又云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲爲棗生文展轉

未離於棗若道棗中酸者棗條無令睡之功道棘子不酸今人有衆呼之曰棗棘一也酸甜兩焉縱令以棗當之終其非也嵩陽子曰余

家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其人稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市

之賣者皆棘子爲之又云山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其肉酸滑好食山人以當果五代史後唐刊石藥驗云酸棗人

睡多生使不得睡炒熟日華子云酸棗人治臍下滿痛

酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中人陰乾四十日成爾雅辨

棗之種類曰實小而酸曰櫟棗孟子曰養其櫟棗趙歧注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者爲真其木高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用爲車軸及匕飭其皮亦細文似蛇鱗其核人稍長

而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟生熟便爾頓異而胡治治振悸不得眠有酸棗人湯酸棗人二升疾苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠煩不可寧有酸棗人湯酸棗人二升蠻母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煮棗減三升後內五物煮取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗益生用療不得眠宜便以煮湯爲熟乎

取藥重拌酸棗人蒸半日了去尖皮了任研用

食療

酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

聖惠方治膽虛睡

雷公云

酸棗人凡使採得後曬乾

卧不安心多驚悸用酸棗人一兩炒令香熟搗細爲散每服二錢竹葉湯調下不計時候服

又方

治夜不眠睡
用酸棗人半

兩炒黃研末以酒三合浸汁先以粳米三合煮作粥臨熟下棗人汁更煮三五沸空心食之

又方

治骨蒸勞心
煩不得眠卧

用酸棗人二兩水二大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更漸煮過不計時候食之

外臺秘要

療刺在人肉中不出酸棗

療齒蟲腐爛轉鍼二百枚即是棗樹棘朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即差

又方

酸棗微熱經不言用人

人核燒末水服

簡要濟衆

治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸

人一兩生用金挺鴟茶二兩以生

薑汁塗灸令微熱擣羅爲散每服二錢水七分煎六分無時溫服

衍義曰

酸棗微熱經不言用人仍療不得眠天下皆有

之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此訛未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖巒則難生故棘多生崖巒上久不樵則成薪人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲壯所湏及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纏及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別爾



商州黃蘗



蘿木

也黃蘿

味苦寒無毒主五藏腸胃中積熱黃疸腸痔

主五藏腸胃中積熱黃疸腸痔

止洩痢女子漏下赤白陰傷瘡瘍驚氣在皮間肌

膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神根

名醫道主

心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中

山谷及永昌

惡乾漆

隨隱居

云今出邵陵者輕薄色深為勝出東

服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡

又一種小樹多刺皮亦黃亦主口瘡

唐本草

云子藥一名山石榴子

炮起蟲瘡痢下血殺蟲煎服主消渴

王建錦等語

本草圖經

云云

黃藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如松下茯苓今所

在有本出房商合等州山谷皮緊厚二三分鮮黃者上二月五月採

皮日乾

藥性論

云黃藥使平主男子陰痿治

下血如雞鴨肝片及男

子莖上瘡屑未傳之

日華子

云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口

乾心熱殺疳蟲治蛇心痛疥癬瘻久治臙洪腸風瀉血後分急熱睡

痛身皮力

微次於根

藥木黃藥也生漢中山谷及永昌今處處有之

經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麌暴乾用其根名擅桓淮南萬畢術曰藥令面悅取藥三寸土

圖經曰

以蜀中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿散葉

經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麌暴乾用其根名擅桓淮南萬畢術曰藥令面悅取藥三寸土

瓜三枚大棗七枚和膏湯洗面乃塗藥四五日光澤矣唐韋苗獨行
方主卒消渴小便多黃藥一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲
數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺藥不入藥用又下品有
小藥條木如石搘皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剗以涼黃今醫家亦
稀用

雷公曰

凡使用刀削上鹿皮了用生蜜水浸半日漉出擦乾

兩外臺秘要

口中及舌生瘡
爛剉黃藥含之

千金方

治小兒重舌以黃藥苦竹瀝浸瀝點舌上

肘後方

咽喉卒腫食飲不通黃藥搗傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方

傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲

斷亦治毒攻陰腫細剉黃藥五斤

以水三升煮漬之傷寒類要同

葛氏方

男子陰瘡損爛水煮黃藥洗白蜜塗之

方

卒喉痺取黃藥片切含之又黃藥一斤
㕮咀酒一斗煮三沸去滓恣飲便愈

又方

食自死六畜肉中毒黃藥末服方寸匕未

解再經驗方

治嘔血黃藥好者以蜜塗之乾杵為服之

末用麥門冬熟水調下二錢匕立差

梅師方

治癰疽發

背或發乳房初起微赤不急治之

即煞人擣黃藥末和雞子白塗之火上炙燒擣末每服

之

十九米深師方

治療傷寒熱病口瘡黃藥皮削去上鹿皮取裏好處

爲末用薄米飲爲丸如粟大每服

二錢溫糯米飲調下宿唯欲令濃含其汁良久吐

飲下

小藥條木如石搘皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剗以涼黃今醫家亦

稀用

凡使用刀削上鹿皮了用生蜜水浸半日漉出擦乾

用蜜塗文武火炙令蜜盡為度

凡修事五兩用蜜三

口中及舌生瘡

爛剉黃藥含之

千金方

治小兒重舌以黃藥苦竹瀝浸瀝點舌上

咽喉卒腫食飲不通黃藥搗傅

腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方

傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲

斷亦治毒攻陰腫細剉黃藥五斤

以水三升煮漬之傷寒類要同

葛氏方

男子陰瘡損爛水煮黃藥洗白蜜塗之

卒喉痺取黃藥片切含之又黃藥一斤

㕮咀酒一斗煮三沸去滓恣飲便愈

又方

食自死六畜肉中毒黃藥末服方寸匕未

解再經驗方

治嘔血黃藥好者以蜜塗之乾杵為服之

末用麥門冬熟水調下二錢匕立差

梅師方

治癰疽發

背或發乳房初起微赤不急治之

即煞人擣黃藥末和雞子白塗之火上炙燒擣末每服

之

十九米深師方

治療傷寒熱病口瘡黃藥皮削去上鹿皮取裏好處

爲末用薄米飲爲丸如粟大每服

二錢溫糯米飲調下宿唯欲令濃含其汁良久吐

小藥條木如石搘皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剗以涼黃今醫家亦

稀用

凡使用刀削上鹿皮了用生蜜水浸半日漉出擦乾

用蜜塗文武火炙令蜜盡為度

凡修事五兩用蜜三

口中及舌生瘡

爛剉黃藥含之

千金方

治小兒重舌以黃藥苦竹瀝浸瀝點舌上

更含若肾中熱有瘡時
飲三五合尤佳聖惠方同

子母秘要錄

小兒臍瘡不衍義曰
黃藥末塗之

今用

藥木

皮以蜜勻炙與青黛各一分同爲末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰
生瘡當摻瘡上有涎即吐又張仲景藥皮湯無不驗傷寒論中已著

滁州楮實



明州
楮實



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不
飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採
實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡

瘡生肉

樹皮主逐水利小便

莖主癰癧痒單煮洗浴

皮間白汁療癬

陶隱居

天此即今穀音構樹也仙方採擣取汁

和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦

爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾

樹有二種取有子者似葡萄者佳八月採實所在皆識也

藥性論

穀

木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末搜麪作餅飪

食之主水病

段成式酉陽雜俎

云構穀田久廢必生構葉有瓣曰楮

無曰構曰華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑

者是楮皮白者是穀

又云

楮葉涼無毒治刺風身痒此是斑穀樹

合朱砂爲團名曰五金膠漆

圖經曰

楮實生少室山今所在有之

謂之斑穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸

深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾篋末水服二錢七益久乃佳俗謂之穀一

說穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅云爰有樹檀其下
惟穀陸機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀江南人
績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜
茹主四脈風痺赤白下痢其葉主臯洪小品云鼻衄數升不斷者取
楮葉擣取汁飲三升不止再三飲神良久効亦差紙亦入藥見劉禹
錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案帛半張燒灰以清酒半升
和調服之頓定如冬月即煖酒服孽中血暈服之立驗已斃者去板
齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚効
楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁
塗癬甚效楊炎南行方治瘡瘍無問老少日夜百餘度者取乾楮葉
三兩熬擣爲末煎烏梅湯服方寸匕日
擣旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸
一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用
爛傳外臺秘要近効天行後兩脅脹滿臍下
癬上如水腫以穀枝汁隨意服愈
如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以
水一斗煮取六升去滓內米煮粥與
燒作灰待冷細研如麴每
點於腎上日三五度漸消又方木作枕六十日一易新者
後方治卒風不得語剉穀枝葉酒
煮熟皮中沫出隨多少飲之又方治少小鼻衄小勞輒出
楮樹葉取汁飲三升不

雷公云

凡使採得後用
水浸三日將物

聖惠方

治癬濕痒用楮
葉半斤細切擣

又方

積年氣上
合作一繩子如釘股大

止四五飲良此

經驗後方

煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煮取五升去滓微火煎

如餳即
方久効亦差

廣利方

治蝎蟻人痛不止方
穀樹白汁塗之立差

子母秘錄

小兒赤白痢渴及得水與

堪用

朴子

楮實赤者服之老者成少令人夜應微視見鬼神道士梁抱葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去木瓜使煖細服渴停抱

堯輔

說患人耽睡擣花穀葉服驗

修真秘旨

服楮實者輒

丹房鏡源

楊

爲骨軟疾

搗汁搜
藥砂子

峽州乾漆



乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安

五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛

疝瘕利小腸去蛇蟲

生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾

之半夏爲之使畏雞子今又忌油膾

陶隱居

云今梁州漆最勝益州亦

有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房

孔孔闊者爲佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有蝨腸胃者

畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之

爲水鍊服長生

目禹錫等註按蜀本

注云按漆性並急凡取時湏桂

油解破淳者難得可重重別制試之上等清漆色黑如墨若鐵石者

好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高三丈餘皮白葉似椿樗皮似槐

花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也

李本論

云乾漆味辛鹹能殺三蟲主女人經脉不通

目華子

云治傳屍勞

除風入藥酒擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發

飲鐵漿并黃櫞汁及

甘豆湯喫蟹並可制

圖經曰

襄陽州皆有之木高三丈皮白葉

似椿花似楓子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔

豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆

舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以
黑如鑿堅若鐵石為佳漆禁中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求
服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使
人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城
及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者
見仙人服之以告佗佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣
力強盛怪之以問所服食阿因醉妄誤說人服多驗其後無復有人
識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云

外臺秘要

(療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服)

經驗方

(治婦人不
曾生長血)

氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸
乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來
住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時
如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但幹牙關溫酒化一丸灌下必
安怕漆人不可服

簡要濟衆

(治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆
二兩擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如

梧桐子大每服五丸至七丸
熱酒下醋湯亦得無時服

杜壬

(治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癇
相似乾漆擣炒煙盡白蕪荑等分

為細末米飲調
下一字至一錢
一兩以生地黃汁一外入銀器中熬俟可丸丸如梧
子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利為度

抱朴子

(內篇
淳漆)

不枯者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲母水或
以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出一年六甲行局至也

淮南

子漆見蟹

而不乾

衍義曰

乾漆苦濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥
熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也

若露漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷
斷而急收起又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮

無爲軍五加皮



五加皮味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療

嬖小兒不能行瘡瘍陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝

女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老

一名狩漆一名狩節五

葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰乾

遠志爲之使畏蛇皮玄參閨隱居云今近道處處有東間弥多四葉者亦好煮根莖釀酒主益人道家用此作灰亦以煮石與地渝並有

秘法三禹錫等謂按蜀本圖經云樹生小叢赤蔓莖間有刺五葉生枝端根若荆根皮黃黑肉白骨硬今所在有之

藥性論

云五加皮有

小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚齧公對切腰主多年瘀血在皮肌治癰濕內不足主虛羸小兒三歲不能行用此便行走

日華子

云明目下氣治中風骨節痙急

圖經曰

五加皮生漢中及冤

句今江淮湖南州郡
補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食
皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五葉作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生二刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼爲木骨一說今所用刀有數種京師北地者大片類秦皮黃藥輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入用吳中乃剥野椿根爲五加皮柔韌而無味殊爲

失今江淮間所生乃爲真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺
類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如撤攬春時結實如豆粒
而扁青得霜乃紫黑吳中亦多俗名爲追風使亦曰刺通刺取酒
漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吳中往往以爲藩籬正似薔
薇金櫻葷一如上所說但北間多不知用此

雷公曰 今五加皮其樹本
者治眼瞼人擣末酒調服自正

是白櫟樹其上有葉如
是雄五葉花是雌剥皮
熟禁多旬令他卦又不

陰乾陽人使外臺秘要治附益藥石術或用陰陰人使陽外臺秘要得食諸熟麪酒等之

熟水加皮二兩以水四

外煮取二升半候石發 楊氏產乳 療癰丹心葉根燒作

從兩脚赤如火燒五加
作灰五兩取煅鐵家槽

中水和東華真人煮石經
舞常登舊櫓
用偃息正道也

此乃五加也。又異名曰

金盐昔西域真人王屋山人王常言何以得
母河以得長壽河不食五用玉破玉破者即此

長久何不食石蓄金鹽
地榆也五加地榆皆是

于董士固共相與言
他渝安用明月宝珠魯

定、五 母單服五加酒以致不死。臨隱去佯

此指穿月明月空照
託死時人自莫之悟耳

張子聲胡建始王叔才于世彦等皆
壽三百年有子二十人世世有得服五加酒消
可勝計或只爲散以代湯茶而餌之驗亦然

散而獲延年不死者不
也大王君謂五加云蓋

天有五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五車故青
精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南
方之光玄精入根則有北方之胎黃煙入皮則有戊己之靈五神
鎮生相轉育成用之者貞仙服之者反嬰也

蜀州牡荆



牡荆實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止咳嗽下氣生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾得木柏實青柏共療頭風防風為之使惡石膏陶隱居云河間冤句平壽並在北南

陽在西論蔓荆即應是今作杖搔之荆而復非見其子殊細正如小
麻子色青黃荆子實小大如此也牡荆子及出此方如烏豆大正圓
黑仙術多用牡荆今人都無識之者李當之藥錄乃注溲疏下云溲
疏一名陽櫨一名牡荆一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子亦
色味甘苦冬月熟俗仍無識者當此實是真非人離域陽櫨也按如
此說溲疏主療與牡荆都不同其形類乖異恐乖賣理而仙方用牡
荆云能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荆樹必枝枝相對此
是牡荆有不對者即非牡荆既為牡則不應有子如此並莫詳虛實
湏更博訪乃詳之爾唐本草云此即作捶杖荆是也實細黃色莖勁作
樹不為蔓生故稱之為牡非無實之謂也按漢書郊祀志以牡荆莖
為幡竿此則明蔓不堪為竿今所在皆有此荆既非本經所載按今
生處乃是蔓荆將以附此條後陶為誤矣別錄云荆葉味苦平無毒
主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠶薄脚主腳氣腫滿其根味甘苦
平無毒水煮服主心風頭風肢體諸風解肌發汗有青赤二種以青
者為佳出類聚方今人相承多以牡荆為蔓荆此極誤也

今本陳藏

圖經曰

牡荆生河間南陽冤句山谷或平壽

器本草云荆木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭
風旋目眩心頭癢癢欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰睡令人不睡
都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箒杖者
俗名黃荆是也枝莖堅勁作科不為蔓生故稱牡葉如蕓麻更疎瘦
花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荆也八月九月採實陰乾此
有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居登真隱說云荆木之華葉通

神見鬼精注云尋荆有三種直云荆木即是今可作筆杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荆牡荆子入藥北方人略無識其木者六甲陰符說一名羊櫨一名空疏理白而中虛斷植即生今羊櫨研植亦生而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勑論牡荆曰荆花白多子子龐大歷歷跡生不過三兩莖多不能圓或偏或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多採牡荆牡荆汁冷而甜餘荆被燒則煙火氣苦牡荆體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂不值猶用荆葉今之所有者云崔元亮集驗方便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得以差爲度又取此荆莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之主心悶煩熱頭風旋目眩心中養養欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡

臺秘要 頭風頭痛取荆瀝不限多少服集驗方同

聖惠方 治濕瘍瘡方用荆枝燒瀝塗之効

千金方 療九竅出血方荆葉擣取汁酒和服二合

千金翼 治喉腫瘡

又

方

治心虛驚悸不定羸瘦方荆瀝二升以火煎

肘後方

療目卒痛燒荆木出黃汁傳之

又方

姚氏下赤白痢五六

深師方

療瘡方荆木燒取汁傳之差

姚和衆

姚氏下赤白痢五六

兒

治喉腫瘡

荆葉袋上

兒

方

取荆瀝稍稍蘸之

即得差

又方

蛇毒荆葉袋盛薄瘡腫上

兒

兒

兒

兒

兒

兒

兒

兒

兒

通耳方取蟲食荆子中白
粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荆



蔓荆實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘
攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚
出益氣久服輕身耐老令人光澤脂綈音雉小荆實亦等

惡烏頭石膏陶隱居云小荆即應是牡荆牡荆子大於蔓荆子而反呼爲小荆恐或以樹形爲言復不知蔓荆樹若高大爾唐本注云小

荆實今人呼爲牡荆子者是也其蔓荆子大故呼牡荆子爲小荆實亦等者言其功用與蔓荆同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荆爲蔓荆遂將蔓荆子爲牡荆子也

目高鵠等譜

蜀本

注云今據陶雅惟不別蔓荆亦不

知牡荆爾以理推之即蔓生者爲蔓荆作樹生者爲牡荆蔓生者大

如梧子樹生者細如麻子則牡荆爲小荆明矣圖經云蔓荆蔓生者大

如演苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淡紅色葉黃九月有實黑籽大如梧子而虛輕冬則葉凋

蘇性論云蔓荆

子目治風能長驥騮

曰華子

云利關節治赤眼癆疾注云海鹽亦有大如碗豆帶有小輕軟蓋子六七八月採

蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小棟至夏盛茂有花作穗淺紅色葉黃白色花下有青蔓至秋結實班黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荆而今所有並非蔓也

注

長驥

雷公云

一伏時後蒸從已至未出曬乾用

衍義曰

蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆紛糾不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也既言牡荆則自是木上生者况漢書

郊祀志所言以牡荆莖爲幡竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉後條有欒荆此即便是牡荆也子青色如茱萸不合更立欒荆條故文

中云本草不載亦無別名但有欒花功用又別斷

無疑焉注中妄稱石荆當之其說轉見穿鑿

唐本

辛夷



辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面黑溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人歎一名辛矧一名侯桃一名房木生漢中川谷九月

採實暴乾芎藭爲之使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石膏黃芩附隱居云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離驗

所呼辛夷者

唐本注

云此是樹花未開時收之正月二月好採今見

用者是其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所

在皆有實莫不在藥也方云去毛用其心然難得而滋人面比用花

開者易得而且香也

公按

陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發

花時如小桃子有毛未折時取之所云用花開者及在二月此殊誤

爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆比人呼爲木筆

其花最早南人呼爲迎春

王禹鵠等謹

蜀本

圖經云樹高數仞葉

似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無子

夏杪復著花如小筆又有一種三月花開四月花落子赤似相思子

花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有

樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身徑二尺許去根三尺已來

便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還

生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至來年正月二月始

開初是興元府進來其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆花樹種

經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其

花開早晚應各隨其土風爾

藥性論

云辛夷臣能治面生黑斑面脂

用主光華

王華子

云通關脉明目治頭痛憎

寒體噤瘡痒入藥微炙已開者劣謝者不佳

川谷今處處

有之家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似

著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故比人呼

爲木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如

相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦

圖經曰

辛夷生漢中

隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或
云用花葉縮者良已開者劣謝者不佳

雷公云 凡用之去龜皮
拭上赤肉毛了

即以芭蕉水浸一夜漉出用漿水煮從已至未出
焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者
從文狸辛夷車芳結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入
乘赤豹從神狸結桂與辛夷以爲車旗言有香氣也

衍義曰

辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花
苞有毛光長如筆故取像曰木筆有紅紫二本一牛如挑
花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生



桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強

巨切

兩癰腫

安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內

傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄

屑一名寓木一名疣

音鳥又音弔

生弘農川谷桑

樹上三月三日採莖葉陰乾

陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於松上方家亦有

用楊上楓上者則各隨其樹名之形類猶是一般但根津所因處爲異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城爲勝俗呼爲續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑擣與此又不同唐本云此多生槲柳水楊楓等樹上子黃大如小棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚晚莖短江南人相承用爲續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆續斷不相開且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆

蓋陶未見也目連錫等謹按蜀本注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟湏桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者爲驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形

三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也

藥性論

云桑寄生臣能令胎牢固主懷姪漏血不止

日華子

云助

筋骨益血脉採人多在擗樹上收呼為桑寄生在桑上者極少縱有形與擗樹著亦不同次即楓樹上力同擗樹上者黃色七月八月採

圖經曰

桑寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是鳥鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三

四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡擗柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別

醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠

粘者為真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名蕡詩頌弁云蕡與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即

女蘿也詩所謂蕡與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰

凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅

刀和根莖細剉陰乾了任用勿令見火

衍義曰

桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處艱難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪抑方宜不同也若以為

鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自

是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得眞桑上者嘗得眞

桑寄生下嚥必驗如神向承乏吳山有求藥於諸邑者乃遍令人搜
摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄰邑有人僞以
之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨
強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕
身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上

黨漢中二月五月六月九月採皮

惡蛇蠆皮玄參陶隱居云
上虞在豫州虞虢之虞非

會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲爲佳用之薄削去上皮橫理切令絲斷也

禹錫等謹按蜀本圖經

云生深

山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有

藥性論

云杜仲味苦能治腎冷腰痛也腰病人虛而身強

直風也腰不利加而用之

目華子

云暖治腎勞腰脊攀入藥炙用

峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴

折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之錦初

生葉嫩時採食主風毒腳氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯

謂之錦芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚健中方主腰痛補

腎湯杜仲一大斤五味子半大外二物切分十四劑每夜取一劑以

細剉

水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再

煮三五沸如作羹法空腹頓服用益醉和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

削去龜皮用酥蜜和作一兩炙之盡爲度炙乾了細剉

用凡修事一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也

先湏卒

患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去龜皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒

薑醋等如作羹

喫空腹食之

腰背痛杜仲一斤切酒

安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾於木曰中擣爲末煮棗爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下

肘後方

腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合

勝金方

胎藏不

圖經曰

黨漢中今出商州成州


雷公云

凡使

聖惠方

治卒

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癰瘍風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山皆有

唐本草

云樹高大葉三角商洛之間多有五月研

楓香脂皮共三條主治稍異注云按王瓘廣輒蘇本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械於大荒之中宋山之上其械化爲楓木之林爾雅楓櫟似白楊而有歧其脂入地千年爲琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香爾雅疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云葉圓而歧有香今之楓香是也南

方草木狀

曰楓香樹子大如鵝卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有

之陳藏器云楓皮本功外性滻止水痢蘇云下水腫水腫非滻藥所療蘇爲誤爾又云有毒轉明其謬水煎止下痢爲最曰華子云楓皮止

霍亂刺風冷風煎湯浴之

圖經曰

楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及開陝多有之似白楊甚高大葉圓

而作歧有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月

熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之

物其脂爲白膠香五月研爲坎十一月採之其皮性滻止水痢水煎

飲之爾雅謂楓爲攝櫟言天風則鳴攝櫟也說文解字云楓木厚葉

弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉

述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤癰

也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉

香條有獨香云療風癱瘓痒毒與此相類即一物也

陶隱居云

楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

簡要濟衆

通

治吐血不止白膠香不以多少細研爲散每服二錢新汲水調下

九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠成乃堅

宋齊丘

典南蠻記楓脂爲之琥珀在地土傍不生草木深忽八

化書云老楓化爲羽人

衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真僞兼能治風癱瘓痒毒水煎熱渫洗

女貞寶

女貞實



女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾

少服肥健輕身不老生

武陵川谷立冬採

陽隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青肉

白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本注云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花

細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮甚浸酒補腰腳令健枝葉燒灰淋取汁塗白癩風亦可作

綢前傳之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子爲木童子可合藥木童在葉中卷葉如子羽化爲童

蜀州木蘭



春州木蘭



非木子冬青其葉堪染絳子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼爲凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青
目華子云冬青皮涼無毒去血補益肌膚
武陵川谷今處處有之山海經云泰山多真木是此木也其葉似拘骨及冬青木極茂盛陵冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗之治癰瘍殊效兼滅瘢痕又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也拘骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有拘陸機云山木其狀如櫨一名拘骨理白可爲函板者是此也皮亦堪浸酒補醫膝燒其枝葉爲灰淋汁塗白癩風亦可作煎傳之

韶州木蘭



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤炮酒
皺惡風癲疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水
腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵

山谷及太山十二月採皮陰乾

閨隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今

益州有皮厚狀如厚朴而氣味爲勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾圖

經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似蘭桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣

於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉

述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

要

療面上皺破肝鱗方木蘭皮一斤細切以三年釀漿水服方寸匕日三

錄

療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麌皮用醋一升漬取汁注重舌上

外臺秘

子母秘



并州蕤核

蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷

淚出自腫眞爛鼻破心下結瘀痞氣久服輕身益氣

不飢生函谷川谷及巴西

陶隱居云

今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆合殼用爲分兩此乃應取人秤之醫方惟以療眼

仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞

而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出雍州五月六月採日乾藥性論

云蕤人使一名曰堪能治鼻衄

蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而

生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚痒或生翳或赤眞一切皆

主之宣州黃連擣篩末蕤核人去皮碾爲膏緣此性稍濕未不得故耳與黃連等分和合取無蟲病乾棗三枚割頭少許留之去却核以

二物滿填於中却取所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿爲佳以大茶椀量水半椀於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿瀘

待冷點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效故附也

雷公云


凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒

消木通草二味和蕤人同水煮一伏時後瀝出去諸般藥取蕤人研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

陳

藏器蕤人足睡不眠

廣州丁香



丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫
齒疳齧能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二

月八月採

今本

按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似欒葉花圓細黃

中有鹿大如山茱萸者俗呼爲母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹

也又按陳藏器本草云丁香於其母丁香主變白以生薑汁研拔去

白髓塗孔中即異常黑也今附

目禹彤等譜

按蜀本注云母丁香擊

之則順理而折兩向療嘔逆其驗藥性論云丁香既能主冷氣腹痛日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣實氣陰痛壯陽暖腰

勝治冷氣殺酒毒

圖經曰

丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類

消痃癖除冷勞

桂高丈餘葉似櫟陵冬不凋花圓細黃

色其子出枝葉上如針子長三四分紫色其中有鹿大如山茱萸

者謂之母丁香二六月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

月方始成實大者如巴豆爲之母

丁香小者實爲之丁香主

風疳癩骨槽勞臭治氣烏騷髮殺蟲療五痔辟惡去邪治

疥頭花止五色毒荊正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云

凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫻棗核方中多使雌力

大膏煎中用雄若欲使雄須去丁蓋乳子發人背癰也

聖惠方

桑

蠅蠶人用丁香

千金方

治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末

梅

末蜜調塗之

以沸湯一升和之頓服不差更作服

治崩中

師方

治乳頭裂破癰

丁香末傅之

又方

治姤乳乳癰取丁香

丁香末水調方寸匕服

治崩中

止取丁香二兩以酒二升

取半分服外臺秘要方同

治傷寒咳意不止及噦逆

兩倍乾橘羅爲散每服

錢煎人參湯下無時服

治崩中

衍義曰丁香曰華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及

脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳爲末縫紗囊

如小指實末內陰中

主陰冷病中病便已

崖州沉香



廣州沉香



沈香微溫療風水毒腫去惡氣

陶隱居云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒

腫道方頗有用處唐本江云沉香青桂雞骨馬蹄前香等同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫟

柳目禹錫等謹按

陳藏器云沉香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也

其枝節不朽最緊實者爲沈香浮者爲煎香以次形如雞骨者爲雞骨香如馬蹄者爲馬蹄香細枝未爛緊實者爲青桂香其馬蹄雞骨只是前香蘇乃重云深覺煩長並堪薰衣去臭餘無別功又杜衡葉

一名馬蹄香即非此者與前香別也南越志云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者爲沈香浮水面

平者爲雞骨最鹿者爲棧香日華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨

節不任濕風皮膚

圖經曰

沈香青桂香雞骨香馬蹄香棧香同是本舊不著所出州土今惟海南諸國

及交廣崖州有之其木類椿櫟多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者爲青桂堅黑而沈水爲沈香半浮半沈與水面平者爲雞骨最鹿者爲棧香又云棧香中形如雞骨者爲雞骨香形如馬蹄者爲馬蹄香然今人有得沈香奇好者往往亦作雞骨形不必獨是棧香也其又鹿不堪藥用者爲生結黃熟香其實一種有精鹿之異耳並採無時嶺表錄異云廣管羅州多棧香如柏柳其花白而繁皮堪作紙名爲香皮紙灰白色有文如魚子牋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云與沈香雞骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又叙所出之地云竇化高雷中國出香之地也比海南者優劣不侔甚矣既所稟不同復售者多而取者速是以黃熟不待其稍成棧沈不待似是蓋趨利戕賊之深也非同瓊管黎人非時不妄翦伐故木無夭札之患得必異香皆其事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣志云南波斯國松木脂有紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香爲薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中邪氣五疳治血止

痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以繒袋掛於牕隙間良久取研之乃不粘又雞舌香出崑崙及交愛以南枝葉及皮並似栗花如梅老子似棗核此雌者也雄者著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沈香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省故事尚書郎口含雞舌香以其奏事荅對欲使氣芬芳也而方家用雞舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆於乳香中時時得木實似棗核者以爲雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚川百一方有治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞舌香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚乖謬又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者爲雞舌香擊破有解理如雞舌此乃是母丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知的否千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用雞舌香以此似近之抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎注之諸有百疹之在下蘇合香條云生中臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以爲是師子矢亦是指此膏油者言之耳然師子矢今內帑亦有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合

香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不大香也然

則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用膏油乃其合治成者耳或云師子矢亦是西國草木皮汁所爲胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香

木如檀生南海消風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華人間徧有之檀木生江淮及河湖山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然葉開當有大水農

人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

海藥

沈香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用當以水試

乃知子細沒者爲沈香浮者爲檀似雞骨爲雞骨香似馬蹄者爲馬蹄香似牛頭者爲牛頭香枝條細實者爲青桂麁重者爲歲香已上七件並同一樹梵

云波律亦此香也

雷公云

於水下爲上也半沈者父也夫入九散

中用湏候衆藥出

通典

海南林邑國秦象郡林邑縣出沈香沈木土人斷之積以歲年朽爛而心節獨在置水

即入拌和用之

中則沈故名曰沈香次不沈者曰棧香海南北嵩國出好棧香藿香及硫黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節

堅貞芬香獨存取以爲香

楊文公談苑

嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民斫採賣與人其一樹出香

三等曰沈香棧香黃熟香沈棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯
爛而得之生結者伐仆之久爛脫而剔取黃熟其破者爲黃散香夷
民以香樹爲槽以飼雞狗別說云謹按沈香種類極多除掌氏補注及圖經所
一二十品要之可入藥者唯沈而其中無空心者可用若雖沉水而
有空心則是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟嫩也

行義曰

(沈香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交幹連枝崗嶺

或以構茅廬或爲橋梁或爲飯甌尤佳有香者百無一二蓋木得水

方結多在折枝枯幹中或爲沈或爲煎或爲黃熟自枯死者謂之水

盤香今南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜

枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木

其香結爲斑點遂名鵝斑燔之極清烈沈之良者惟在瓊崖等州

俗謂之角沈黃沈乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青

桂氣尤清在土中歲久不待刊剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷

咀之柔韌者謂之黃蠟沈尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡

氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣爲上品藥湏極細爲佳今人
故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有

益無損餘藥不可方也薰陸香木葉類紫梨南印度界阿吒釐國出
今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香爲其垂滴如乳鎔塌

塌香皆一也

薰陸香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此合

入藥

唐本注

云形似白膠出天竺單于國

禹錫等詳按南方草木

此云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人

採取之賣與賈人注南方異物

志同其異者惟云狀如桃膠

文具沉

唐本

薰陸香微溫去惡氣惡瘡

出天竺國及邯鄲似松脂黃白色

天梅師方

治齒蟲痛不可忍嚼薰陸香咽其汁立差

雞舌香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

云此皆

合香家要用不正入藥

唐本注

云雞舌樹葉及皮並似栗花如梅花

子似棗核此唯樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香

王禹錫

樂生論

云雞舌香使味辛無毒

出崑崙及交愛以南入吹鼻散子中用殺腦癟入諸香中令人身香

王禹錫

樂生論

云俗人以

其似丁子故

圖經

文具沉

王禹錫

樂生論

云此皆

爲丁子香

外臺秘要

療齶齒方煮雞

舌香汁舍之差又方

療脣舌忽生瘡雞舌

抱朴子

雞舌香黃連乳汁煎治目中之病應

香末以綿裹舍之差

之沈存中筆談

子集靈苑方論雞舌香以爲丁香母蓋出陳氏

拾遺今細考之尚未然按齊民要術云雞舌香

世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也曰華子云雞舌香治口氣所以三省故事郎官日舍雞舌香欲其奏事對答其氣芬芳此

正謂丁香治口氣至今方書爲然又古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香此最爲明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之大如山茱萸剉開中如柿核略無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香



藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

臣禹錫等謹按南州

異物志

云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中

醫方草木狀

云味

辛擗生吏民自種之五六月採暴之乃芬爾出交趾九真諸國

日華

云藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而味辛

小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是栴檀節是沉水花

圖經曰

藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之

日華

是雞舌藥是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香捺生吏民自種之

正相符合也范曄和香方云麥藿虛燥古人乃以合薰香

本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆爲最要之藥

別說云

謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三

省故事及千金皆謂是母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及爲丁子香則可以爲母丁香

若抱朴子爲可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口中熱臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香味却得口

中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果

否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南

出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭難以土石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂

中亦皆如是者多矣

詹糖香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此香皆合香家要用不正入藥

惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其皮及蟲虫屎雜之惟軟者爲佳餘香無真僞而有精鹿爾唐本注云詹糖樹似

摘煎枝爲香似沙糖而黑出交廣以

南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安

圖經

文具沉
香條下

檀香

閩廣云白檀消熱腫

臣禹錫等謹按陳藏器云主心腹霍

霍亂氣殺蟲白檀樹如檀出海南日黑子云檀香熱無毒

治痛霍亂腎氣腹痛濃煎服
水磨傳外腎并腰腎痛處

圖經

文具沉
香條下

乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風癰癰痒毒

日華子云

味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛
疰氣前膏止痛長肉入丸散微微炒殺毒得不粘陳藏器云蓋董陸之
類也其性溫療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸洟澼療諸瘡令內消

圖經

文具沉
香條下

藥云

乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃
者爲上仙方多用辟穀兼療耳聾中風口噤不語善治婦人

血氣能發粉酒

紅透明者爲上取母猪血和令勻丸梧桐子大每服

五九博濟方

治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收
酒下猪心血相和研爲丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門

上如患者令

酒磨下一丸治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細

又方

治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細

酒磨

治甲疽肉裏甲膿血疼痛不差凡此疾湏剔去肉中甲不

苑方

治亦愈或已成瘡不差用此法乳香末膽礬燒研等分傳之

肉消
愈

沈存中

乳香即薰陸香也如乳頭者爲乳香榻地者爲榻香

丹房鏡源

乳香亞銅

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上海藥云徐表南州記云生南海山又云生大秦國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗又按仙傳云燒之或引鶴降齋星辰燒此香甚爲第一度鑑燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘡蠱毒癰瘍去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中

臺川谷

閩隱居云俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾唐本草云此香從

西城及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人謠言陶不悟之猶以爲疑也呂禹錫等謹按梁書云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦人採蘇合先前其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也陳藏器云按師子屎赤黑色燒之去鬼

氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國草木皮汁所爲胡人將來欲人貴之飾其名爾

圖經

文具沉香條下

唐本餘


除鬼魅

舒州金櫻子



子櫻金州泉

子櫻金州宜



金櫻子味酸澁平溫無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之

本云術多用言是
禹錫等謹按蜀

今之刺榆子形如榆子而小今醫家用之甚驗

雷公炮炙論云林檎

向裏子名金櫻子與此同名而已

醫方中亦用

金櫻花平止冷熱

痢殺寸白蛇蟲等和鐵粉研

者亦可染髮又云

拔白髮傳之再出黑

金櫻東行根平無毒治寸白蟲割二兩入糯米三

十粒水二升煎五合空心服湏臾瀉下神

驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴

十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所

供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也

今校諸郡所述與營

實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下

服食家用和雞頭實作水陸丹益氣補真甚佳

金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘

爲兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水

耗半取出澄濾過仍熏煎似稀餉每服取

一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅

熟則却失本性今取半黃時採用妙

衍義曰金櫻子經九月十月熟

時採不爾復令人利

沈存中金櫻子止遺泄

取其溫且滋壯

藤黃謹按廣志云出郢岳等州諸山崖其樹名海藤花

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出郢岳等州諸山崖其樹名海藤花

有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之
臍草酸澁有毒主蟬牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃
謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及
丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王
內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮
候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使
云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴
生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡
有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹

而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮野艷花瓣頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

雅州落鴈木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈嚙至代州鴈門皆放落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡

浮孢以椿木同煮之妙也。○圖經曰

落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血

氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

莎木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈閭四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餅之輕滑美好白勝桄榔麵味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼爲莎麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服

無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也

其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閨腹內血塊酒煎

服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云

按西域記云生

西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處

斷之得水可飲清羨去濕溽煩熱生嶺南葉似狗蹄
煮汁服之主天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮皸劉欣期
交州記亦載之也。○海藥云

謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路

行人乏水處便喫此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

臯蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海
諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新
平縣出臯蘆臯蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰
龍川縣出臯蘆葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過羅
或曰物羅皆夷語也。○海藥云

謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴

閑下痰通小腸淋止頭痛波人用代茶故人重之如蜀地茶也

蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異

物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃生着

已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香

蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香○圖經文

沉香
條下

海藥云

謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼刀注心氣生

南海諸山中種之
五六年便有香也

阿勒勒味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱

殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂

莢也

海藥云

按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用

羣藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰癆
小便數白益陽道除風氣補襄老好顏色取根及莖
細坐濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服

訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑
淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有
鼠咬痕者良但湏嚼嚥其汁驗也

海藥云

謹按廣州記云生南

海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥被人食之
如與甘蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎
服之亦取汁
浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺
和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劍
南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似
竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制
不湏削理也

綵木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒
生林漢山谷木文側故曰綵木

斑珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之
生山谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛溫澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生
西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也
不彫木味苦溫無毒主調中補襄治腰脚去風氣却老
變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莢赤有毛如

棠梨

曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年去皮敷出捷爲牙
門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云

蜀人謂之沉鷺藤亦云治癬

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喝手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以爲名採之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括躉叢山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名也

石松味苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高二尺也

牛膝藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中
粉食之如葛根令人髮落生好食之生深山大如樹
震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災
此霽靈木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服
令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以
用釀酒也

帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山。山海經曰
少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁
今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘
憂也

河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病未為散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也


朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中

如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注爲南
土無榆也

那者悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤癰毒
諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍
花也

黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主
酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者
並作屑染黃用之樹如檀

重修政和經史證類備用本草卷第十二



重修政和經史證類備用本草卷第十三

己酉新
增行義

成都唐慎微續證類

木部中品總九十二種

一十七種神農本經字白

三種名醫別錄字墨

1

十一種唐本先附

注云

一十四種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮

葉耳五木耳附桑根
桑灰唐注蕈菌續注

吳茱萸

根附葉并枝
子根續注

檳榔

梔子

根汁實瀝皮姑
第附竹黃續注

紫鉢

音礦

食茱萸

唐附皮
續注

蕪荑

枳殼

今附

枳實

厚朴

苦楂

秦皮

秦椒

山茱萸

紫葳

凌霄花也
等附根續注

胡桐淚

唐附自草
部今移

墨

今附

棘刺花

寶葉
針附

猪苓

今附

烏藥

今附

沒藥

今附

龍眼

今附

安息香

唐附

仙人杖

新補草仙
人杖附

松蘿

毗梨勒附唐

菴摩勒附唐

鬱金香今附

薦矛

思箭也

海桐皮

今附

大腹

今附

紫藤

今附

會叢

虎杖

白草部今移

五倍子

今附自草部今移

伏牛花

今附自草部今移

天竺黃

今附

蜜蒙花

今附自草部今移

天竺桂

今附

折傷木

附唐

桑花

新補

棕子木

唐附

每始王木

附唐

四十五種陳藏器餘

必栗香

櫚木

研藥

黃龍眼

箭筈

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊廬耳

故甑蔽

榦木

象豆

地主

腐木

石刺木

拂木

息王藤

角落木

鳩鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵柵柄

古櫬板

慈母

飯籮

白馬骨

紫衣

梳笪

倒掛藤

故木砧

古廁木

桃掘

梭頭

救月杖


地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷寒五勞六極羸瘦崩中
脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臍脹
利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心麻子爲之使

苦寒除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒墨者主女子漏下赤白汁血病癰瘕

積聚陰痛陰寒熱無子療月水不調其黃熟陳白

者止久洩益氣不飢其金色者治癬飲積聚腹痛金瘡

一名桑菌一名木麥

蜀本
麥作
麥
音
交誼荀切

五木耳名襦

軟音

益氣不飢輕身強志

生健爲山谷

六月多雨時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木

襦又呼爲桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生

爆耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥

用唐本云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此爲五耳軟者並

堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒水煎取濃

汁除腳氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁爲煎與冬灰等

同減誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傳金瘡止血生肌也今按

陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研

取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大盆中煎取如赤糖去老風及

宿血葉搘者名雞桑最堪入用搘利五藏開節通血氣久服不飢多

收暴乾搗末蜜和爲丸每日服六十丸變白不老取黑椹一升和科

斗子一升瓶盛封閑懸屋東頭一百日盡化爲黑泥涂白瘡如漆又

取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白瘡點孔中即生黑者目禹錫

水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝症後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血又云木耳赤可單用平孟說云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹蕭炳云桑葉灸煮飲止霍亂孟說云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉灸煎飲之止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色久不落染燒灰淋汁入鍊五金家用曰華子云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即出桑根皮又云家桑東行根暖無毒研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳鴟口瘡大驗又云家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血並蒸後置蛇蟲蜈蚣咬鹽投傅上春葉未開枝可作煎酒服治一切風又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛華子論云蕈耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈次柘木者良孟說云菌子寒發五藏風擁經脈動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰

用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初採得

以銅刀剥去上簾皮取其裏面白切焙乾其皮中青涎勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者爲上霜後採之

煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實根有白黑二種暴乾皆主癰白
皮上白蘚花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其
柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮
中白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刃所傷燥痛湏更血止更剥
白皮裹之令汁得入瘡中良久月用根皮皆驗白皮作線以縫金創
腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見
近効方云桑前療水氣肺氣腳氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤七
兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增加
先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無
禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療偏躄風痺乾燥脚氣
風氣四肢拘攣上氣眼暉肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明耳目
令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方
桑枝小升細切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前
後此服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉
又十月霜後三分二分已落時分在者名神仙葉即採取與前葉同
陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並令人
聰明安魂鎮神又灸葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金創及諸瘍
傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有葚與椹
同施郭璞云辨半也一半有葚半無名曰施又云女桑棲桑俗間呼

桑木之小而條長者爲女桑又山桑木椹弓弩
纏桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

考

雷公云 凡使十年已上

向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青
延者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力此藥

惡鐵并鉛也

聖惠方

治大風頭面脣脹脫落以桑葉灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用

熟水入菉豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要

治偏風及一切風桑枝剉一大升用桑枝剉一大升用

今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞毎日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方 脉極寒眩暎墮落令眩潤生桑白皮二升以外以水淹浸煮五六沸去滓洗沐眩自不落

又方

桑耳作五痔以八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內燒灰中炮令極熱

瘡白漫漫取桑樹汁先小豆各一升合搗作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方

治口瘡急裹之若有腫者更作用薤白佳

以髮拭口次以汁傅之 又方 人以桑枝三條內燒灰中炮令極熱破齒以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍

取薤白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳

肘後方

治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末

每衄發輒以杏人大塞鼻數度即可斷深師方同便多消渴入地三尺取桑根剉取白皮炙令黃黑坐以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

白皮煮血露不絕鋸截桑根取屑

水飲之又方

五指撮取酒服之目三

又方

因瘡而腫者皆因中水及中風寒所

作其腫入腹則殺人多以桑灰

淋汁瀆冷復易取愈梅師方同

又方

飲食中蠱毒令人腹內堅痛

取桑木心剉得一角著釜中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出

梅師

面黃青淋露骨立病變無常

方 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰研傳擦上佳

經驗方

治咳嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米

灰止痛取桑紫絏四兩焙乾一處搗爲末

治青盲此一法當依而用之視物如

極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所

不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方

治肺

二月晦每遇上件神日用桑紫灰一合以前湯沃之於甕器中澄令

過熟蒸一宿候日乾爲末水調二錢七服

治白皮五斤爲末水

過熟蒸一宿前成膏傳於損處便止已後亦無宿血終不發動

廣利方

治瀉血不止桑耳一大兩

一升前成膏傳於損處便止已後亦無宿血終不發動

又方

治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗

空心分溫三服

治蛇咬瘡桑樹

白皮汁傳之差

治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過

煎取六七大合去滓

勝金方

將線繫葉蒂上繡陰乾細切用

水煎服之

又

治蛇咬瘡桑樹

錢相公篋中方

治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之効

子母秘錄

治落胎下血不止以桑口

桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方

小兒重舌桑白皮煮汁塗乳飲之

又方

小兒鴟口桑白皮汁和胡

粉傅之

楊氏產乳

凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方

治小兒舌上生瘡如粥皮桑白

皮汁傅之三兩度差

仙方

桑椹熟時收之日乾爲末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良

史記

桑樹根旁

行出地者名爲伏蛇治心痛一絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪

毛詩

泮水篇云食我桑根懷我好音

珉詩

無食桑葚注甚桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源

桑灰結汞衍義曰桑根白皮

之用稍備然獨遺烏棋桑之精英盡在於此採摘微研以布瀝去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每抄三錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼

淡竹



苦竹



簾竹



竹葉簾音謹竹葉味苦平大寒無毒主發逆上氣溢筋

急惡癲殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痓

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱效逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺骨中大熱止煩悶

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍

蜀本作
諸筍

味甘無毒主消渴利水道益氣可食

閨隱居

云竹類甚多此前一條云是簋竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍爲佳於藥無用凡取竹

瀝惟用淡苦筆竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而填來斑斑有實狀如小麥甚可爲飯

陳藏器本草

云苦竹筍主不睡去面

目并舌上熱黃消渴明日解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣

淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱

田禹錫等詳說藥性論云淡

竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風

五痔

云淡竹并根末甘冷無毒消痰治熱狂

失音不語苦者治服亦

又云

青竹筍使味甘能止肺癆唾血鼻衄治

不語壯熱頭痛頭風并懶姪人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇治

天吊莖葉同用

云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩

熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同

云筍寒主逆氣除煩熱動氣發冷微不可多食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母筍雖美然發背悶腳氣

慈竹瀝療熱風和飲食

服之良

圖

經云竹節間黃白

圖

經曰

筆竹淡竹苦竹本經並

者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

不載所出州土今處處

有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜筆

字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可

爲笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用

桂竹作笛者有一種亦不名筆竹苦竹亦有二種一種出江西及閩

中本極麗大筍味殊苦不可取一種出江浙近地亦時有肉厚而葉

長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹

肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與

竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

序

久渴心煩

食療

淡竹上甘竹次主欲逆消渴痰飲疾癰鬼疰

惡氣殺小蟲除煩熱苦竹根細剉一斤水五升外煮取汁一升分三服

亞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升外煮取汁一升分三服

下心肺五藏熱毒氣苦竹不發瘡淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶

勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕

身益氣箠淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺秘要

療凡脫折

折骨諸瘡

腫者慎不可當風及多自扇若中風則發瘡口噤殺人若已中風覺頸

項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤以物強發內

之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可

合十許束併燒中央承取投之可活

千金方

凡飲酒頭痛以竹茹

三兩水五升外煮取三

升去滓令冷內破雞子三枚攬調更煮三沸飲之

又方

治齒斷間津液血出不止苦

竹茹四兩以酢漬一宿含之

又

方

治齒間血出以竹葉濃煮

與鹽少許寒溫得所含之

又方

齒血不止刮生竹皮酢漬之令其人解衣乃別令一人含

喚其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差

又方

治時氣五六日心神煩躁不解用竹瀝半盞新水半盞相和令均非

時服肘後方治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處

又方

傷寒五六日已上者作青竹瀝

小煎分減數數飲之厚覆取汗

又方

卒失聲聲噎不出濃煮苦竹葉服之

葛氏方卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈

又方

小兒身中惡瘡者苦竹葉和雞子黃傳

梅師方治產後身或強直口噤面青手足強反張飲竹瀝一二升醒

又方

主姪姪恒若煩悶不得開肝竇熱所

获苓三兩竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時時服竹瀝致或生障翳苦竹瀝五合黃連二分綿裹入

又方

此名子煩竹瀝湯理心煩

竹瀝內浸一夜以點目中數度令熱淚出力止渴苦笋熟煮任性食之又苦竹筍主消渴利水道下氣理風熱脚

氣取蒸食之又籜竹笋主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食

簡要濟衆頭瘡大筍竹葉燒爲灰量瘡大

小用灰調生油傅入少膩粉佳

兵部手集治發背頭

未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及掘地作坑貯水卧以

腫處就坑子上角之如葷豆大戢戢然出不止遍匝脣肋以

又方

治瘡慈竹筍籜
灰油和塗之妙

又方

治中風口噤服
淡竹瀝一升

又方

治湯火灼爛竹中
蟲蛆未傳之良

又

方

小兒口噤體熱者竹瀝二合燒之分三四服兒新生慎不可過
加鍼灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒任其自然皆無此疾

又方

治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大外微微緩服之

姚氏方

卒齒痛取苦竹燒一頭一頭得汁多揩齒上差

廣

傷寒類要

治交接勞復卯腫腹中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師方同

子母秘

錄

治胎動取甘竹根煮汁服

又方

安胎取竹瀝服之

又方

治妊娠八月九月若墮樹或牛馬驚傷得心痛

青竹茹五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之

又方

小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和

前一升去滓服一合兼治小兒

口噤體熱病

忽推築著疼痛新青竹茹二合以好酒一升煮第三五沸分作三度服

產

小兒癇刮青竹茹三兩醋三升

候有失

又方

治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微緩服之須臾再服

楊氏產乳

療瘡疥燒竹葉爲末以雞子白

和之塗上不過四次立差

又方

妊娠苦煩此子煩故也竹瀝不限多少細細服之

又方

胎方胎動安

根煮取濃
汁飲之

姚和衆

小孩夜後狂語竹瀝每一

李畋該聞集

云爆竹碎妖氣鄰人有仲叟家爲山魈所祟擲瓦石開戶牖不自安叟求禱之以佛經報謝而妖祟彌盛竅謂其叟曰翁曰夜於庭落中

若除夕爆竹數十竿叟然其

言爆竹至曉寂然安帖遂止

別說云

謹按舊稱竹實鸞鳳所食今

棗花亦結實如小麥子無氣味而溢江浙人号爲竹米以爲荒年之

兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘千人來言彼有竹

實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹

林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之

食必非常物也

行義曰竹葉凡諸竹與筍性皆微寒故知葉其用一致本

張仲景竹葉湯用淡竹筍難化不益脾鄰家一小兒方二歲偶失照

管壯熱喘羸不食多睡仰頭呻吟微嘔逆膜目多驚凡三五日醫作

慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有巴豆食藥作驚藥化五

丸如麻子大噏之良久大吐有物嘔於喉中乳媼以指摘出之約長

三寸麤如小指乃三日前臨階曝者乾箭筍是夜諸證皆定次日但

以和氣藥調治遂安其難化也如此經曰問而知之者謂之工小兒

不能問故爲難治

醫者當審慎也



吳茱萸味辛溫

大熱有小毒

主溫中下氣止痛效通

寒熱除濕血癰逐風邪開腠理

去痰冷腹內絞痛諸冷

實不消中惡心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲根白皮殺蟻蟲治喉痺效逆止洩注食不

消女子經產餘血療白癬

名毅

生上谷川谷及冤句

九月九日採陰乾

蓼實爲之使惡丹參消石白芷畏紫石英同

隱居云札記名蓼而俗中呼爲毅音殺子當

是不識蘿字似蘿字仍以相傳其根南行東行者爲勝道家去三尸

方亦用之唐本草

云爾雅釋木云椒般醜株陸氏草木疏云椒般屬

亦有搬名陶誤也臣萬錦等謹按

吳茱萸味苦辛大熱有毒

能止心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉腹

痛不可勝忍者可愈療遍身癰痺冷食不消利大腸擁氣削皮能療

漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲

博雅云梔般檳榔越椒茱

萸也梔音考證云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒痛又

患風癬痒痛者取茱萸一升清酒五升和煮取一升半去滓以汁煖

洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服

之半外日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又開目者不堪食又魚骨

在人腹中刺痛煮一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之骨當

爛出肺氣衝心可和生薑汁飲之甚良曰華子云建脾通關節治霍

亂瀉痢消痰破癩癧逐風治腹痛腎氣腳氣水腫下產後餘血又云

茱萸葉熱無毒治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛益研晉神

驗乾即又浸復晉霍亂脚轉筋和艾以醋湯拌晉妙也隱藏器云

子根濃煮浸痔有驗燒末服亦主痔病又爾雅云櫟實櫟也其子房

生爲櫟又赤爪草一名羊櫟一名鼠查此

乃名同耳狀似小柏而赤人食之生高原

句今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚

紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則

深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到

此日氣烈熟色赤可折其房以挿頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰

圖經曰

吳茱萸生上谷川谷及冤

句今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚
紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則
深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到
此日氣烈熟色赤可折其房以挿頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰

汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞大牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可爲服食之藥也張仲景治嘔而脣滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又甘南行枝主大小便卒閉格不通取之斷度如手第二指中節含之立下姚僧垣方根亦入藥用刪繁方療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服升取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲便下驗云凡使先去茱核并雜物了用大盆一口使盃水洗一百轉自然无斗中分作一百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡熟乾每用十兩使醋一盞爲度

聖惠方

治癰疽發背及發乳房茱萸

外臺秘要

集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨癥上冷更炒

熨之候消乃止也

又方

治癰疽發背及發乳房茱萸

外臺秘要

治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸

酒和煮熟布裹熨癥上冷更炒

熨之候消乃止也

又方

治癰疽發背及發乳房茱萸

外臺秘要

治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸

酒和煮熟布裹熨癥上冷更炒

熨之候消乃止也

雷公

濕痒茱萸一升水三升

千金方

治寸白蟲茱萸根洗去土四兩切
煮三沸去滓洗痒差

服凡茱萸皆用細根東北陰者良
若稍大如指已上者皆不任用

又方

治心腹內外痛茱萸升酒
三分煎取半升空心頓服之

千金翼

產後虛羸盜汗時齒齙惡寒茱萸
一雞子大以酒三升漬半日煮服

又方

主頭風沐頭茱萸二升水五升
煮取三升以綿涂拭緩根良

外帛染拭之

又方

咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣
風不

能語或茱萸各一升水五升

又方

治腸痔大便常血下部痒痛如蟲
咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣

茱萸二升內中乘熱板開小孔以下

又方

主大人小兒風癩茱萸一升酒
三分煎取半升空心頓服之

合黑豆湯

經驗方

治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一
兩和炒令茱萸燒黑後去茱萸取桃人去皮尖

研細葱白三莖煨熟

經驗後方

補水氣藥赤茱萸二兩米醋煮
爛細研爲膏丸如梧桐子大椒

以酒浸溫分三服

孫真人備急方

赤痢臍下痛茱萸一
兩桃人一

吞之効

兵部手集

治醋心每醋氣上攻如蠶醋茱萸一
合水三

研細研爲膏丸如梧桐子大椒

又方

益前七分頓服縱濃亦湧強服近有人心如

火灼瘡一名癰瘍瘡一名

楊氏產乳

療中惡心痛吳茱萸五合
以酒三升分三服

二十年不發

又方

外酒五升煎取二升分溫三服

火爛瘡用酒煎茱萸拭上

又方

兒

衍義曰

吳茱萸湏深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與生及注中藥法皆不言亦漏落也此物下氣最速腸虛人

檳榔



廣州 榴擯



檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸
療寸白生南海

閨隱居

云此有三四種出交州形小而味甘廣
者形大而味濃核亦有大者名猪擗擗

作藥皆用之又小者南人名蘿子俗人呼爲檳榔孫亦可食
云檳榔生者極大停數日便爛今入比來者皆先灰汁煮熟仍火熏
使乾始堪停久其中人主腹脹生癟末服利水穀道傳瘡生肌肉止
痛燒爲灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙巨禹錫等註按本性論
云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑擁滯破堅滿氣下水腫
治心痛風血積聚廣志云木實白檳榔樹無枝略如柱其頭生核而

秀生棘金重疊其下彼方珍之以爲口實

陳藏器云納子小檳榔也

生收火乾中無人者功劣於檳榔顧微廣州記云山檳榔形小而硬

細薑子土人呼爲檳榔孫

目華子

云檳榔味澁除一切風下一切氣

通開節利九竅補五勞七傷建脾調中除煩破癥結下五膈氣

南海

者味苦殺蟲兼補

圖經曰

檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如

節如桂竹葉生木巔大如榆頭又似甘蕉葉其實作房從葉中出傍

有刺若棘針重疊其下房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正

白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同叫嚼之則柔滑而甘美嶺南人

噉之以當果實其俗云南方地溫不食此無以祛瘴癘其實春生至

夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙熏乾始堪

停久此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者

名猪檳榔最小者名納子其功用不說有別又云尖長而有紫文者

名檳圓而矮者名榔擗力小榔力大今醫家不復細分但取作雞心

狀有坐正穩心不虛破之作錦文者爲佳其大腹所出與檳榔相似

但莖葉根幹小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔難得真者今賈

人貨者多

大腹也

海藥

謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹

小異耳又云如搜櫬也葉萬似芭蕉狀陶弘景

云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主資弛諸氣五鬲氣風冷

氣宿食不消脚氣論云以沙牛屎一盞磨一枚空心緩服治腳氣壅

熱搗末酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療多食發熱南人生食闌

中名撒攏子所來北者

毒水腫浮氣秦醫云檳榔二枚一生

者熟熏

雷公云

凡使取好存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦

擯與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文鰐者是擯擯力小榔力

大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用

聖惠方

治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傅之妙

又方

用一兩爲末非時水煮葱白

濃汁調下

外臺秘要

若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者擯榔人爲末以擯榔殼汁或茶飲或豉汁中調

一錢匕

經驗方

治金瘡白擯榔黃連少許爲末傅之即差

七甚利

孫真人食忌

治嘔吐以白擯榔一顆煨擯皮

散空心生蜜湯下方寸匕

梅師方

治醋心擯榔四兩橘皮二兩細橘爲

治腰重痛用擯榔

又方

治本藏氣以維心擯榔小便濃磨半箇服或用熱酒調一錢匕

門方

治諸蟲在藏腑久不差擯榔半兩炮搗爲末

簡要濟衆

治每服一錢至二錢葱薑煎湯調下空心服

治腳氣衝心白擯榔一箇雞心大者爲木用童子

又方

小便生薑斗溫酒共半盞調只作一服無時服

治脚氣衝心白擯榔十二分爲末分三

御藥院

治痰涎擯榔爲未白湯點一錢

治脚氣衝心白擯榔五合調服日再服

廣利方

治腳氣衝心致

悶亂不識人白擯榔一小便生薑斗溫酒共半盞調只作一服無時服

齊民要術

白蟲消穀痰飲擯榔下氣及宿食

衍義曰

擯榔二書所說甚詳今人又取尖長者入藥言

其速效屢試之果如其說

臨江軍施子



江陵府施子



建州施子



施子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣而赤酒炮

破鼻血癩赤癩瘡瘍瘻目熱赤痛腎心大小腸大熱心中

煩悶胃中熱氣

一名朱丹

一名越桃生南陽川谷九月採

實暴乾

陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者爲良經霜乃取之今皆入茶用於藥甚稀玉支即羊躑躅也

臣禹錫等謹按性論

云山梔子殺塵蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病

圖經曰

梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似橘蒲子二三月生白花花皆六出

甚芬香俗說即西域詹匐也夏秋結實如詞子狀生青熟黃中人深紅

九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云危芮千石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越

桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者爲佳其大而長者乃作染色

又謂之伏刀梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發

黃皆用梔子茵陳香或甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用

梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢挾

毒熱下者葛洪方以十四枚去皮搗蜜丸服如梧子三丸日三大効

又治霍亂轉筋燒梔子三枚未服立愈時行重病後勞發水煮十枚

飲汁溫卧微汗乃愈挾食加大黃別煮汁臨熟內之合飲微利遂差

凡使勿用顆大者号曰伏刀梔子無力須要如雀腦并

金匱公曰

鱗長有九路赤色者上凡使先去皮鱗了取人以甘草

水浸一宿漉出焙乾
擣篩如赤金末用

食療

主瘡疎紫癰風
黃疸積熱心躁

又方

治下鮮血施子
人燒灰水和一

錢七服之量其
大小多少服之

千金方

治火瘡未起施子人灰麻油和封厚

擣和水調

後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下

若轉筋燒施子二七枚研末熟水調服

梅師方

治火丹毒

傳之又方治熱毒下血或因食物發動以三

十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方

治傷寒差後交接發動

以十枚水三升煎取一升去滓服

卧令微汗若食不消加大黃三兩

又方

因欲死眼不開不能語

施子三十枚水三升煎取一升外服

同研爲末傳瘡上曰三二傳之差

博

治頭痛不可忍是多風痰所致

濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疔刺山

施子川烏頭等分生擣爲末以酒糊丸如梧子大每服十五丸炒生薑湯下如

勝

小腹氣痛炒茴香

葱酒任下二十九

兵部手集

治頭痛不可忍是多風痰所致

施子末和蜜濃傳舌上吐即止

勝

金方治婦人臨產痢不限多少燒灰細末

空心熟水調一匙頭甚者不過五服

孫尚藥

治傷寒下痢

後更煩按之

勝

心下熱者虛煩也施子十四枚擘破四合右二味以水四升煎施子

取二升半內服更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者

勝

不可服嘔

膿盡乃愈

古今錄驗

秦王散胃疽食多喜飲施子實主之

丹房鏡源

施子柔金


衍義曰

施子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊惱施子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒故也

施子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液府藏無潤養內生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮

山施子火炮大黃連翹甘草炙等分
末之水煎三二錢匕服之無不效

廣州駢驥竭



紫鉢音廣馬驥驥竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與駢驥竭二物大同小異

唐本云

紫色如膠作赤麋音京皮及寶鉢用爲假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中爲之紫鉢樹名渴廩駢驥竭樹名渴留喻如蜂造蜜所

取用之吳錄謂之赤膠者今按別本注云紫鉢駒驥竭二物同滌功効全
別紫鉢色赤而黑其葉大如盤鉢從葉上出駒驥竭色黃而赤味鹹平

木中出如松脂唐本先附玉石部今移

曰禹錫等謹按華子云紫

鉢無毒治驢馬蹄漏可鎔補又云

駒驥竭暖無毒得蜜陀僧良

治一切惡瘡疥癬久不合者傳此藥性急亦不可多使却引膿

駒驥竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木高數丈

婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如

膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹

而氣腥者是海母血不可用貞竭微鹹而甘作施子氣味舊說與紫

鉢大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉢

出真臘國國人呼爲勒怯亦出波斯國木高丈許枝幹繁鬱葉似橘

抽冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨濡其枝條則爲紫

鉢波斯國使人呼及沙利兩人訝如此而真臘國使人言是蟻運土

上於木端作窠蟻壤爲霧露所霑即化爲紫鉢又交州地志亦云本州

歲貢紫鉢出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫

方亦罕用惟

染家所湏耳

海藥

紫鉢謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤

又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又駒驥竭謹按南越志云是紫

鉢樹之脂也其味甘溫無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣攬

刺內傷血聚並宜酒服欲驗真

偽但嚼之不爛如蠟者上也

雷公云

駒驥竭凡使勿用海母血

并

腥氣其駢驥竭味微鹹甘似施子氣是也欲使先研作粉重篩

過臨使

安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同搗化作飛塵也

惠方

產後血暈不知人及狂語

駢驥竭一兩細研爲末非時溫酒調二錢匕

廣利方

治金瘡血兼痛駢驥竭未傳

聖

止之立

賈相牛經

牛馬有漏蹄以紫礦少許和猪脂內入漏處燒鐵篦烙之

西陽雜俎

紫鉗

煉靈妙法

駢驥竭出於西胡稟於焚惑之氣生於湯石之陰結而盛質紫鉗形若爛石其功亦能添益陽精消陰滯氣

則紅今人用造錦煙散遍來亦難得餘如經

衍義曰

紫鉗如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造錦煙散遍來亦難得餘如經

樹出真臘國使衝都尉沙門陀沙尼拔陀言蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦崑崙者善波斯次

太清伏

太清伏

廣州龍腦



龍腦香及膏香味辛苦微寒一云溫平無毒志腹邪

氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松

脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云

合糯一作梗米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾

唐本注云樹形似杉

本言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有錯甲香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以

國爲名即杉脂也江南有杉木未經試或方土無脂猶甘蕉無實唐本先附目禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云龍腦香樹出婆利國呼

爲箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香在木心中波斯

斷其樹剪取之其膏於樹端流出研樹作坎而承之入藥用有別法

南海藥譜云龍腦油性溫味苦本出佛誓國此油從樹所取摩一切

風陳藏器云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘

圖經曰

龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七

圍如積年杉木狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香

即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段

成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏於木端流出研木作坎而承之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼爲瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煖成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

藥

謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白膠香狀味苦辛微溫無毒主內外障眼三蟲治五痔明目鎮心秘精又有蒼龍

腦主風瘡黔黷入膏煎良用點眼則有傷名醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水調服立差又唐太宗時西海律國貢龍腦

香是知彼

經驗方

治急中風目瞑牙噤無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下

藥龍腦天南星等分爲末乳鉢內研自五月五日午時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方

治時疾發豌豆

瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一丸紫草湯下少時心神便定得

睡瘡復發透依

常將息取安

衍義曰

龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利開鬲熱塞其用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短呪國在南印度境有錫布

羅香齡如松株葉異濕時無香採乾之後折之中有
香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西方亦有

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少爲劣
爾療水氣用之乃佳

唐本草

云皮薄開口者是雖名爲食茱萸

黑乃是食茱萸顆粒緊小久色青綠即是吳茱萸

今按陳藏器本草

云食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐李先附目禹錫等

謹按藥性論云食茱萸畏紫石英治冷癰腰腳軟弱通身刺痛腸風

瘡疾殺腸中三蟲去虛冷

陳藏器

云樹皮殺牙齒蟲止痛本經已有

吳茱萸云是口折者日茱萸南北總有以吳地爲好所以有吳之名
兩處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳豈得云食與

不食其口折者是日乾口不折者是陰乾本經云吳茱萸
又云生宛朐宛朐既非吳地以此爲食者耳蘇重出一條

食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云即茱萸中顆粒
大經久色黃黑堪敵者是今南北皆有之其木亦甚高大有長及百

尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子爲枝子
蓋禮記所謂藪者藪艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可

多食多食衝眼兼
又脫髮採無時

食療

溫主心腹冷氣痛中惡除飲逆去藏腑
冷能溫中甚良又齒痛酒煎含之又殺

鬼毒中賊風口偏不語者取子一升美豉三升以好酒五升和煮四五
沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱
萸子半升煎取三升去滓微緩洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁
一盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉
不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名瞯子不堪食

孫真人食忌

六月七月勿食勝

金方

治蛇咬毒茱萸一兩爲末
冷水調分爲三服立差

圖經曰

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中溼溼

溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嘔嘔喘息

無姑一名藪

殿塘

唐音

生晉山川谷三月採實陰乾

居玄

今惟出高麗狀如榆莢氣臭如豕音信彼人皆以作醬食之性殺蟲置物中亦辟蛀但患其臭唐本注云爾雅云蕪荑一名蘂蕪今名藪舊字之誤也今延州同州者最好今注蕪荑河東河西處有之況經云生晉山川谷而陶以爲惟出高麗蓋是不知其元也臣禹錫等

謹按爾雅釋木

云

無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥

其味

辛香所謂蕪荑

藥性論

云蕪荑使味苦辛能主

積

冷氣心腹癥痛除肌膚節中風澑澑如蟲行孟說云主五藏皮膚肢

節邪氣又熱瘡擣和豬脂塗差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切

瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛爲辛故也秋天食之尤宜

人長食治五痔諸病不生

曰華子云

治腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖

經曰

蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦

無姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合瀆之其味辛香所謂蕪荑

也又釋草云蕪荑蕪藉注云一名白蕪而與本經一名蕪音破蕪音

唐相近蘇恭云蕪藉蕪蕘字之誤也然蕪荑草類無荑乃木也明是二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人又多取作屑以革五味其用陳者良人收藏之多以鹽瀆則失氣味此等不堪入藥但可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣

泄不止蕪荑五兩擣末以飯丸每日空心午飯前各用陳米飲下三十九增至四十九丸服去三尸益神駐顏云得之草鎌曾得力

陳藏器

作醬食之主五雜病除瘡癬

又

海藥

謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪

美也味辛溫無毒治冷痢心氣殺蟲止痛

婦人子宮虛孩子疳鴟得訶子豆蔻良

作醬甚香美功尤勝於榆人瘞者良又殺中惡蟲毒

外臺秘要

治膀胱氣急宜下氣蕪荑擣和食鹽末二物等分以

綿裹如棗大內下部或
下水惡汁并下氣佳

主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼

和麵炒令黃色爲末非

時米飲調二錢匕差

千金方

痛無時必効以石州蕪荑人二兩

行義曰 蕃荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也 摘取仁醞爲醬味尤
辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多假以外物
相和不可不擇去也 治大腸
寒滑及多冷氣不可關也

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣效
嗽背膊悶倦散留結脣膈痰滯逐水消脹滿大腸風

安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾

用當去蘿核乃佳此

與枳實主療稍別故特出此條今附

臣禹錫等謹

按禁性論

云枳殼

使味苦辛治遍身風癱肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩

脅脹虛開膈擁塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

日華子

云建脾開胃調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癩

結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小

腸皮膚痒痔可炙熨入藥浸軟剉炒令熟

藏器八月既厚且辛書曰江南爲橘江北爲枳今江南俱有枳橘

要塵久年深者爲上用時先去瓢以麩炒過待

千金方主口僻眼

要塵久年深者爲上用時先去瓢以麩炒過待

殼取辛苦腥并有隙油能消一切癆

刮取上青爲末欲至瓢土者得茹五外微火灼去

濕氣以酒三升漬微火煖令得藥味遂性飲之

食醫心鏡治水氣皮膚

一宿服五合至一升

得屈伸反覆者刮枳樹皮一升酒三升

一宿服五合至一升

身直不

濟一宿服五合至一升

治中風

身直不

茶法煎呷之

經驗後方治風癱痺不止以枳殼三兩麩炒微黃

去瓢爲末每服二錢非時水一中盞煎

至六分

治一切癰以水煮枳殼

風下血不止枳

去滓服梅師方爲煎金之乾即又塗之

博濟方治遠年日近腸

風下血不止枳

雷公云

凡使勿使枳實緣性効不同若使枳

殼取辛苦腥并有隙油能消一切癆

圖經

文具枳實條下

陳

殼燒成黑灰存性羊脛炭爲末枳殼末五錢炭末三錢和勻用濃米
飲一中盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當日見効

必効方

熨燒痔瘡頭出或痛不可忍枳殼於燒灰中煨熱微熨盡七枚立定發即熨之

杜壬方

瘦胎散昔胡陽

公主難產方士進枳殼四兩甘草二兩爲末每服空心大錢七枚如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高廁

衍義曰

枳殼文具枳實條下

成州枳實



枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦
痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除骨脅痰

癥逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安

胃氣止溏洩明日生河內川澤九月十月採陰乾

閨隱居
云今處

處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須

唐本注云

枳實日乾乃得陰便濕爛也用當去核及中瓢乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實須合核瓢用者殊不然也

今按陳藏器本草云枳實根

皮主痔末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自

是種別非關變也目禹錫等謹按藥性論云枳實苦味辛苦解傷寒結入陷膾湯用主上氣喘效腎內傷冷陰痿而有氣加而用之

圖經曰

枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江湖州郡皆有之以商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如枳多刺

春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為枳實大者為殼皆以橘肚如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用

張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實木湯主之枳實七枚木三兩以水一斗煎取三分外分三服腹中軟即稍減之又膾痺心中痞堅

留氣結膾滿脅下逆氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切栝樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈又有橘皮枳實湯

桂生薑枳實湯皆主肾痺心痛葛洪治卒肾痺痛單用枳實一物搗末服方寸匕日三夜一其根皮治大便下血末服之亦可煮汁常飲又

治卒中急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳焰

一外酒一外漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要

塗風癱取枳實以醋漬令濕火灸令熱適寒溫用熨上即消

千金方

治腎脾氣壅滿心膈不利枳實二兩炒微黃

為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

治積刺脫肛枳實石上磨令滑鑽著柄塗火灸令煖更易熨肛取縮即止

經驗方 治腸風下血枳實半斤炒去瓢綿黃者半斤洗剉為末

米飲非時下二錢匕若難服以糊丸湯下三五十九効

集驗方 治五痔不以年月日久新枳實為末

煉蜜丸如桐子大空心飲下二十九

濟衆方

治傷寒後卒腎

膈閑痛枳實一味剉麥炒黃為末

服二錢米飲調下一日二服

廣利方

治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分擣末以飲汁

調二錢匕二歲服一錢子母秘錄方同

子母鉢錄

治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之

衍義曰 枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故

張仲景治傷寒蒼卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其躁通泄泄破結實之義他方但導敗

風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此



厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸

氣血渾死肌去三蟲

溫中益氣消痰下氣療霍亂及

腹痛脹滿胃中冷逆脣中嘔不止洩痢淋露除驚去

留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名櫟其

子名逐折療鼠癟明目益氣生交趾冤句三九十月

採皮陰乾

乾薑爲之使惡澤瀉寒水石消石

陶隱居云今出建平

宜都極厚肉紫色爲好殼薄而白者不如用之削去上

甲錯皮俗方多用道家不湏也

今注

出梓州龍州者最佳

日禹錫等

謹按吳氏

云厚朴神農岐伯雷公苦無毒季氏小溫

孢子

厚朴出洪

氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛

大溫胃氣區吐酸水主心腹滿病人虛而尿白

日華子

云建脾主反

胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不安

調開節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入藥去鹿皮薑汁炙或薑汁炒用又名列朴

江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者爲上本高三四丈徑三尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皴而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮

方書或作厚皮張仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脉數厚朴半斤

枳實五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎取三升

溫服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚

朴半斤甘草大黃各三兩桑十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以

水一斗煎取四升去滓溫服八合日三溫者加半夏五合下利者去

大黃寒多者加生薑至半斤陶隱居治霍亂厚朴湯厚朴四兩炙桂

心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐

石泉公王方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆

療並須預排比也此方與治中湯等並行其方見人參條中

雷公

曰凡使要用紫色味辛爲好或丸散便去鹿皮用酥炙過每脩一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲中使用自然薑汁八兩炙一外爲度

聖惠方

治霍亂製之以薑汁火上炙令香
爲末非時新水調下二錢七佳

又方

治癰壅滯心脣滿悶不通厚

下飲食用一兩塗生薑汁炙令香

黃爲末非時粥飲調下二錢七佳

梅師方

治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩剉水三升煎

取一升斗明方

治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調空心服

子母秘錄

治月水不通厚

薑汁炙直待焦黑爲度擣篩如麪以陳米飲

調下二錢七日三服良亦治反胃止瀉甚妙

衍義曰

厚朴今西京伊陽縣及商州

朴三兩炙水三升煎取一升

爲三服空心不過三四劑差

衍義曰

亦有但蒲而色淡不如梓州

者厚而紫色有油味苦不以薑製則棘人喉舌平胃散中用最

調中至今此藥盛行既能溫脾胃氣又能走冷氣爲世所湏也

苦茶



茗苦捺茗味甘苦微寒無毒主癭瘍利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦捺主下氣消宿食作飲加茱萸薑等良

唐本注

釋木云檳苦捺注樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲茗一名舛蜀人名之苦茶生山南漢中山谷今按陳藏器

本草云茗苦捺寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰捺是茗嫩葉擣成餅並得火良久食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

圖經曰

茗苦捺舊不著所出州郡今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檳苦捺郭璞云木小似梔子冬生葉可煮作

羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲茗一名舛蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如爪蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檳三曰設音設四曰茗五曰旃又曰茶之別者有枳殼芽拘杞芽枇杷芽皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇貞茶性極冷惟雅州蒙山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五項項有茶園其中項曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老

父謂曰蒙之中項茶當以春分之先後多攜人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當限前無疾三兩固以搜骨四兩即爲地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病差其四頂茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷺獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性似不甚冷大都飲茶少則醒神思過多則致疾病故唐母景茶飲序云繹滯消壅一日之利暫佳脅氣侵精終身之累斯大是也

食療

云茗葉利大腸去熱解痰煮取汁用煮粥良又茶主下氣除好睡消壅宿食當日成者良蒸擣經宿用陳故者即動風發氣市人有用槐柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要

治卒頭痛如破

非中冷非中風其病是肖膈有痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之即差單煮茗作飲二三升適冷煖飲一二升湏臾吐畢又飲能如此數過劇者湏吐膽汁

主赤白痢及熱毒痢

好茶一片炙擣末濃煎一二盞與差

如久患痢亦宜服又主氣壅暨脣痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服

經驗方

治陰囊上瘡用蠟面茶爲末先以甘草煎

水洗後

兵部手集

煎湖州茶以頭醋和服之良

治心痛不可忍十年五年者

勝金方

治蠟

用貼妙

妙別說云

人成瘡初如米粟漸大如豆更大如火烙漿胞疼痛至甚

速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅上其痛藥至立止妙

治蠟

謹按唐本注引爾雅云藥可作羹恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老梗二者安可作羹是知恐非此圖經今閩浙蜀荆江湖淮


葉老者也

南山中皆有之然則性類各異近出蔡襄審學所述極備閩中唯建州北苑數處產此性味獨與諸方略不同今亦獨名臘茶研治作餅日得火愈良其他者或爲芽葉或爲末收貯微若見火便更不可久收其滋味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味略類建州今京師及河北京西等處磨爲末亦冒臘茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚效則餘者皆可比用信之其不同者多矣今建州上供品第備見茶經

衍義曰譜蔡宗頤茶山節對其說甚詳然古人謂其芽爲雀舌麥頸言其至嫩也又有新牙一發便長寸餘微麤如針惟牙長爲上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥頸又下品前人未盡識誤爲品題唐人有言曰繹帶消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉溫嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞曰早採爲茶晚採爲茗茗或曰芽足充切

河中府秦皮

成州秦皮



秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱

目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可

作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名

岑皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰

乾大戟爲之使惡吳茱萸陶隱居云俗云是樊楓音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不羸錯取皮水

漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名爲苦樹亦用皮療眼有効以華似櫟故名石檀也

禹錫等著本草論云秦白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱作湯浴差皮一外水煎澄清冷洗赤眼極効

曰華子

圖經曰生廬

云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂江川谷及冤句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆

青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根三月八月採皮除乾其皮有白點而不羸錯俗呼爲自得木取皮漬水便碧色書紙看之青色此爲真也

外臺秘要

治赤眼及睛上

瘡秦皮一兩清水一外於白栎中浸春夏一食特以上看碧色出即以筋頭纏綿仰卧點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久

三五節間即側目瀝却熱汁每
日十度已上着不過兩日差

又方

治眼因赤差後腎暈秦皮一
兩切水一外五合煮取七合

澄清用
漬目中淮南子

檉木色青翳而羸痛蝎院此皆治目之藥也。注檉苦歷木水浸皮青用洗眼効人被其蟄仍爲露水所濡乃成此疾遂煮汁一斗飲之差。

沈存中

越州秦椒



歸州秦椒



秦椒味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒
痺堅齒明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛

出汗利五藏

人服輕身好顏色耐老增年通神生大山

川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實

惡枯樓防葵畏雌黃陶隱居云今從西來

形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼爲大椒又云即今樛居虫切樹而樛子是猪椒恐謬

唐本注

云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但

味短實細藍田南秦嶺間大有也

禹錫等譜安息子詩

云蜀椒君味苦

出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善

雲中論

云秦椒君味苦

辛能治惡風遍身四肢癢痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治產

後惡血病多年痢主生

緩瘻腹中冷痛孟說云秦椒溫滅蟲長毛去

血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餅乾灰中燒之使熱斷

使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹

吞之以針壓之重者可再服以差爲度

圖經曰

秦椒生泰山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及明越金商州皆有之初秋生花

秋末結實九月十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭

爾雅云櫻大椒郭璞云椒叢生

云葉及莖子都似蜀椒但實細味短

爾雅云櫻大椒郭璞云椒叢生

生實大者名爲櫻詩唐風云椒聊且陸機疏云椒似茱萸有針刺莖

葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成臯諸山謂

之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞

豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似

橘皮島上麇鹿食其葉其肉自然作椒橘香而今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說正相當以實大者爲秦椒其云

蜀吳作茶茗皆者其葉今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故
苦茶與茶同條云作飲加茱萸薑等良是也相傳椒可以來水銀

又云椒氣好下言飮之益下不上衝也服食藥當用蜀椒

寒類要治膏癰其人飲少小便多方秦椒一分續十全方治蟲傷

入耳椒末一錢醋半盞浸

出汗瓜蒂二分末水服方寸匕日三服

肘後方

手足心風腫椒鹽末等分醋和傅之良

良久少少灌耳蟲自耳出

行義曰葉差大椒粒亦大而紋抵不若蜀椒皱纹高爲異也然秦

椒地亦有蜀種

如區別



充州山茱萸



山茱萸味酸平微溫無毒志下邪氣寒熱溫中逐寒

濕痺去蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來臯塞

目黃耳聾面炮溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九

竅止小便利以服輕身明日強力長年一名蜀葵一名

雞足一名貶音妓實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣

九月十月採實陰乾

蓼實爲之使惡桔梗防風防已陶隱居

云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色

目禹錫等謹按藥

如胡蘋子亦可取既乾皮甚薄當以合核爲用爾

性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不寐補腎氣興陽道

堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節曰華

子云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癩結治酒齧陳藏器云

云大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并大馬瘧瘡

圖經曰

山茱萸生漢中山谷及琅

耶冤句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘋子有核亦可取既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳

曹云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此小異也舊說當合核爲用而雷斂炮炙論云子一斤去核


取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒蘇別是一物不可用也

核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取肉

皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

衍義曰山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸補養腎臟無一不宜經與注所說備矣

紫葳



紫葳
威音

味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕

雷公云

凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸

核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取肉

皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

衍義曰山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸補養腎臟無一不宜經與注所說備矣

血闔寒熱羸瘦養胎

○莖葉味苦無毒主癩腫益氣

陶隱居

云李

一名陵苔一名芨華生西海川谷及山陽

云是瞿麥根

今方用至少博物志云郝晦行音杏華草於太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苔之華郭云凌霄亦恐非也

唐本生

云此

即凌霄花也

及莖葉俱用按爾雅釋草云苔一名陵苔黃花藥必曜

切白華芨郭云一名陵時又名凌霄本經云一名陵苔芨華即用花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫葳瞿麥皆

本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉體性既與瞿麥乖異生處亦不相開郭云凌霄此爲貞說也

臣禹錫等謹按藥性論

云紫葳

自一名女葳畏鹹味甘主熱風風癘大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝安胎

曰華子

云根治熱風身痒遊風風癰治療血

帶下花葉功用同又云凌霄花治酒皧

圖經曰西海川谷及山陽

熱毒風刺風婦人血脈遊風崩中帶下今處處皆有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苔之華郭

云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苔陵苔呂郭云又名陵霄按今爾雅注苔名陵時本草云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同邪又據陸機

及孔穎達疏義亦云苔一名陵時乃是鼠尾草之別名郭又謂苔為陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是

以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癰癧并行經脉方陵霄花不以多少擣羅爲散每服二錢溫酒調下食前服甚効

灌耳衍義曰

紫葳今蔓延而生謂之爲草又有木身謂之爲木又須物而上然繖不逐冬艸亦得木之多也故分入木部爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳爲花故可知矣

斗門方

治暴耳聾凌霄葉爛杵自然汁

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服

之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又爲金銀錙藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有灰爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹹音減鹹地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲

唐本先附草部今移
生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相染狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之曰華子

太治風蟲牙齒痛有二般木律不中入藥用石律形如小石片子黃土色者爲上即中入齒藥用兼殺火毒并麴毒

楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著冬月採得之狀如黃礬薑石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治口齒家爲最要之物一名胡桐律律淚聲近也然有一種木律極相類不堪用也

斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又有石淚在石上採也主風病齶齒牙疼痛骨槽風勞能軟切物多服令人吐也作律字非也

通海藥謹按嶺表記云出波

禹錫等謹按蜀本圖經云涼州以西有之初

太涼州以西有之初

即中入齒

典

西戎樓國多出檉柳胡桐白草牛馬所嗜也胡桐亦似蟲食其樹而津下流出者俗名爲胡桐淚可以鍛金銀俗訛呼淚爲律

墨味辛無毒止血生肌膚含金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主瞤目物共入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥鹿者不堪

今附

目禹錫等譜

按陳藏器云墨溫

方

如梧子用生地黃汁下一

二十丸

如人行五里再服

千金方

治物落眼中不出好墨
數升者取好墨末之雞子白丸

痛脹滿氣衝心肯不即治亦殺人擣墨水和服一錢匕

又方

治赤白痢

崩中漏下清黃赤白使人無子

好墨末一錢七服

水服之立產

又方

治赤白痢

薑墨末乾薑

好墨各五兩篩以醋漿和丸桐子大服三十九加至四十五丸米飲下日夜可六七服如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病痢垂死服之愈徐云但齶書墨一丸差

又方

治墮胎胞衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊痛用好墨細研每服非時溫酒調下二錢七梅師方

治鼻衄出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中

子母秘錄

治產後血暈心

閼氣絕以丈夫小便農研墨服一升又方

姓娠胎死腹中若胞衣不下上迫心墨三十末酒服

衍義曰

墨松之煙也世有以粟草灰爲者不可用湏松煙墨方可入藥然惟遠煙爲佳今高麗國每貢墨於中國不知

用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢嘗之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頤服熱多者尤相宜又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之

寶主明目心腹瘦痺除熱利小便生道傍四月採一名
棘蕡一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通

陶隱居

云此

一條又相違越恐俚言多是然復道其花一名棘蕡此

恐別是一物

不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗

乃是好作欲益人正自不可當棘刺爾唐本注云棘有赤白二種亦猶諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南無棘李云用棘針天

門冬苗一名顛棘南人以代棘針陶不許今用棘刺當用白者爲佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鈎者有直者補益宜用直者療

腫宜用鈎者又云棘在棗部南人昧於棗棘之別所以同用棘條中

也臣禹錫等謹按蜀本注云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野

間多有之叢高三尺
花葉莖實俱似棗也

圖經


文具、白
棘條下

聖惠方

治小兒一切疳用
刺針瓜蒂等分末

吹入鼻
中日二

龍州猪苓



施州猪刺苓



猪苓味甘苦平無毒主癆

音皆瘡解

不得利水

道以服輕身耐老一名猪屎

生衡山山谷及濟陰冤

句二月八月採陰乾

居云是楓樹苓其皮去黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳用之前去黑皮乃秤之

子云豕囊一名苓根似猪矢治渴

論云猪苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰

猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之舊說是楓木苓今則不必

楓根下乃有生土底皮黑作塊似豬糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕橐司馬彪注云一名苓根似猪矢治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四外煮四物取二外內膠每服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之爲水逆冬時寒嗽如瘧狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓木茯苓各三分澤瀉五分桂二分細搗篩水服方寸匕日三多飲緩水汗出即愈利水道諸湯劑無若此驗今人皆用之又黃疸病及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分杵末每服方寸匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏採根削皮焙乾彼土人用傅瘡毒殊效云味甘性涼無毒

去邪氣

雷公去刀削上鹿皮

凡採得用銅刀削上鹿皮

唐本餘

氣

治療大便不通者

治療大便不通者

唐本餘

氣

治療大便不通者

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛波刺結

療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名

棘刺生雍州川谷

高隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代之非是真也唐本草云白棘莖白如

粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦爲難得也

圖經曰

白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘小棗也叢高

三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦爲難得耳然有鉤直二種直者宜

入補藥鉤者入癰腫藥鍼採無時花久至後百二十日採實四月採又棗針療喉痺不通藥中亦用陳子昂觀玉篇云在張掖郡時有人

以仙人杖爲白棘同旅皆信之二物都不

相類不知何故疑惑若此其說見枸杞條

二百枚以水三升外煮取一升含之

外煮取二升分三服

治尿血棘刺三升水五升

治諸惡腫失治

又方外煮取二升分三服

蟲食齒根肉黑燒腐棘取瀝

外煮取二升分三服

千金方治諸惡腫失治

有膿燒棘針作灰

又方傳之十遍雄黃末傳之即愈

癰疽痔漏瘡及小兒丹水

煮棘根汁洗之出千金

錄小兒天風口噤乳不下

又方傳之十遍雄黃末傳之即愈

癰疽痔漏瘡及小兒丹水

煮棘根汁洗之出千金

衍義曰白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑

惑今掠不取求其經而可矣其白棘乃是取其肥盛紫色

枝上有皺薄白膜先剥起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺

花乃是棘上所開花也餘無他義今人燒枝取油塗垢使垢解

信州烏藥

潮州烏藥


外臺秘要治齒蟲



烏州台



衡州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒症忤鬼氣宿食
不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小
兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補
中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似
茶高丈餘一葉三桠葉青陰白根色黑褐作車轂形
狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁

其八月採根

今附

目禹錫等謹按日華子云治一切氣除一切冷

霍亂及反胃吐食寫痢癱瘓疥癩并解冷熱其功不

可悉載猫犬百病並可摩服

圖經曰

烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者爲勝木似茶擅高

五七尺葉微圓而尖作三棱面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極龐大者又似鈎樟根然根有二種嶺南者黑褐

色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

謹按本草圖經

方

中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差

別說云

謹按本草圖經

及世稱以天台者爲勝今比之衡州洪州者其香味唯天台者爲劣入藥功効亦不及但肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比試之


衍義曰

烏藥和來氣少走泄多但不甚

銅猛與沈香同磨作湯點

治胃腹冷氣甚穩當

廣州沒藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔

漏卒下血目中腫暈痛膚亦生波斯國似安息香其塊

大小不定黑色

今附巨禹錫等謹按藥性論

苦辛能主打搘損心腹血瘀傷折踐跌筋骨疼痛

金刃所損痛不可忍皆以酒投飲之

良曰薛子云

破癥結宿血消腫毒

生波斯國今海

之木之根之株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下

凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治婦人內傷痛

楚又治血暈及臍腹疗刺者

沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治

歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者

沒藥半兩研虎胫骨三兩塗酥

灸黃色先搗羅為散與沒藥同研

令細溫酒調二錢日三服大佳

如神香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳置新能生好血凡

服皆湏研爛以熱酒調服近効墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血

氣痛並宜丸散中服爾

衍義曰

沒藥大氣通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅淤氣壅淤則經絡滿急故痛且腫凡打撲着肌肉湏腫者經絡傷氣不行壅淤故如是

海藥

謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀

龍眼



眼龍



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒
少服強魂聰明轉舌不老通神明一名益智其大者似

檳榔生南海山谷

陶隱居

云廣州別有龍眼似荔枝而小非益

智恐被人別名今者爲益智爾食之並利人根與豆蔻無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼

樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘美堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益智子爾

王萬錫等謹按蜀

本龍眼除蟲圖

經曰

龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆

毒去三蟲

荔枝

圓如彈

形圓如彈

凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈
九核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三十枚

荔枝

纏過龍眼即熟故南人目爲荔枝奴

一名益智以其味甘歸脾

而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍

荔枝

十里一置五里一候奔馳險阻道路爲患孝和時汝南唐羌

爲臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其

眼荔枝

十里一置五里一候奔馳險阻道路爲患孝和時汝南唐羌

爲臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其

乾寄遠北中以爲佳果亞於荔枝

補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除爲果

之外別無龍眼若謂爲益智子則專調諸氣今爲果者復不能也矧

自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今

爲果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

自古以來

智條遠不相當故知木部龍眼即便是今

爲果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色爲塊新者亦柔韌

音刃唐本先附

目禹錫等謹按

蕭何云

燒之去鬼來

神段成式

酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼爲辟邪樹長三丈皮色黃
黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮
其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡曰華子
治邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛治婦人血噤并產後

血運

海藥

謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒薰

丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平

令云無毒主嘯氣嘔逆辟玷小兒吐乳

大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕此是筭欲成竹時立死者色

黑如漆五六月收之苦桂竹多生此

又別一種仙人杖味甘小溫無毒久服長生堅

筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劍南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀王篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味戊人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰

文具拘把條下

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療癰熱溫瘡可爲吐湯利水道一名女蘿生熊

耳山川谷松樹上五月採陰乾

陶隱居云東山甚多生雜樹
上而以松上者爲真毛詩云

葛音鳥與女蘿施于松上葛是寄生以桑上者爲真不用松上者此
玄有異同爾今詳經云松蘿當用松上者臣禹錫等謹按藥性論云

松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐屑中客痰涎去頭瘡主項上瘤癰

曰華子云令人得眠

圖經

文具系寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南

交愛等州戎人謂之三果

唐本注

云樹似胡桃子形亦似胡桃

唐本先附目禹錫等謹按藥性論核似

詞梨勒而圓短無核用亦同法

冷氣蓄中人以此作藥甚熱能治頭髮變黑色


曰華子云下氣止瀉痢

海藥

謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味苦帶澁微

溫無毒主烏蟲燒灰乾血效

戎州菴摩勒



菴

音摩

勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生

嶺南交廣愛等州

唐本注

云樹葉細似合歡花黃子似李柰

公按

陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣力合鐵粉用一斤變白不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其

子先苦後甘故曰

圖經曰

菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州

餘甘唐本先附

今二廣諸郡及四川蠻界山谷中皆有

之木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮歛如夜合而葉微小春生冬凋三月有花著條而生如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子噉之初覺味苦良久更甘故以名也

海藥

生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也

衍義曰

經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之

鑾金香味苦溫無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鴟鴞等

臭陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國

二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也

今附

錫等譜按陳藏器云麝金香平入諸香藥用之說文鬱香芳草也十
二葉爲貴將以者之用爲鬯爲百草之英合而釀酒以降神也以此

言之則草也不當附于木部

國花如紅藍花即是香也

陳藏器云

味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾

陶隱居云山野處處有其莖有

三羽狀如箭羽俗皆呼爲鬼箭而爲用甚稀用之削取皮羽今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等譜按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅曰華子云鬼箭羽味甘齒通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及產後血

咬肚痛

圖經曰

衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭羽葉

亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡症在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中

惡氣毒痛大黃湯亦

用鬼箭皆大方也

雷公云

凡使勿用石茹根頭真似鬼箭只使上葉不同味各別採得後只使

箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之

每修事一兩用酥一分炒酥盡為度

外臺秘要

治乳無汁鬼箭五兩水六升煮

取四外一服八合日三亦可

行義曰

衛矛所在山谷皆有之然未作灰水服方寸匕日三大効

莖黃褐色若檗皮三面如鋒刃人家多燔之遺崇方家用之亦少



雷州海桐皮

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘蠶疥

索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附目禹
鈎等謹按

曰華子

去溫治血脉麻
痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰

海桐皮出南海已南山谷今雷州
及近海州郡亦有之葉如手大作

三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方
多用浸酒治風癱南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃
年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療
因覽傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故錄之耳
海桐皮二兩牛膝芽蕪羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡
人二兩生地黃十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿
一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏七日候熟空心食後日午晚卧時一盃長令噙含時不用添減禁毒食

謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦溫
無毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍亂赤白瀉痢血痢疥癬

海藥

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心
並以薑鹽同煎入疎氣藥良所出與檳榔相似莖葉根

幹小異生南海諸國

今附目禹
鈎等謹按

曰華子

云下
切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中

圖

經文具擯
柳條下

孫真人云

擯柳皮鴉鳥多栖此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

種之以
飾庭池


紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花接碎拭酒醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼爲招豆藤皮著樹從心重重有皮

附今

陳藏器云

主水癩病
京都人亦

合歡



合歡味甘

無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂

以服輕身明目得所欲生益州山谷

陶隱居云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘

憂也詩人又有萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法人罕

敦尚亦爲遺棄

唐本注

云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅

白色所在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡

或曰合昏秋實作莢子極薄細爾

今按

陳藏器本草云合歡皮殺蟲

擣爲末和鑄下墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉並去垢葉至暮即合故

云合昏也

臣禹錫等謹按蜀本

音義云樹似梧桐枝弱葉繁互相交

結每一風來輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人不忿

日華子云

夜合皮殺蟲煎膏消癰腫并續筋骨藥可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰

合歡夜合也生益州山谷

家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密

玄相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名

合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採

皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘

一名志憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也韋宙獨行方宵心甲錯是爲肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一

枚水三分再服

子母秘錄 小兒撮口病夜合花 枝濃煮汁拭口并洗

又方

打搗搘

疼痛夜

合花末酒調
服二錢匕妙
謂之夜合花
陳藏器曰華子皆曰
皮殺蟲又曰續筋骨經中不言

衍義曰

合歡花其色如今之醜量線上半白下半肉
紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合又

虎杖

汾州虎杖

虎杖

滁州虎杖



虎杖根微溫主通利月水破留血癥結

陶隱居云

田野甚多

此狀如大馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘺酒漬根服之也今按陳藏器

本草云虎杖主風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之葉擣傅蛇咬一

名苦杖莖上有赤點者是臣禹錫等謹按蜀本圖經

云生下濕地作

樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之

閼雅

云蒼虎

杖注云似紅草而梗大有細刺可以染赤性論云虎杖使一名大

蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月

和甘草煎色如琥珀可愛堪看脊之甘美瓶置井中令冷徹如冰

白甕器及銀器中盛似茶啜之時人呼爲令飲子又且尊於茗能破

女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血

日華子

云治產後

惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癰癰毒婦人血運撲搘瘀血破風毒

結氣又名酸

杖圖經曰

虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有

之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生

便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色

破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云荼虎杖郭璞云似荭草而

梗大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼

諸惡瘡浙中醫工取根洗去皴皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下

治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎爲飲色如琥珀可愛瓶

盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染米作糜餅益美

凡使勿用天藍并斑油根其二味根形味相似用之

有誤採得後細剉却用上虎杖葉裹一夜出曬乾用外臺秘要

金匱公

治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾擣作末稌米五升外炊飯內攬之好酒五斗漬封候藥消飯浮可飲一升半勿食鯿魚鹽癥當出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

肘後方

治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水者適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方

治五淋苦杖不計多少爲末每服二錢用飴飲下不拘時候

衍義曰

虎杖根微苦經

藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖葉差大爲異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁爲飲不得甘草則不堪飲藥性論云和甘草煎甌之甘美其味甘即是甘草之味虎杖也論其政治則甚當矣

洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣疽蠅肺藏風毒流溢皮

膚作風濕癬瘡瘍痒膿水五痔下血不止小兒面鼻瘡瘍

一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百

蟲倉○圖經曰

五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中其實青至熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云

五倍子治腸虛泄痢熱湯

服博濟方

治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下臉皆赤爛浮腫瘀肉侵睛神妙驅風散五倍子一兩蔓荆子一兩

半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋先留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒

經驗後方

治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同搗末每服米泔調下半錢立差

丹房鏡源

五倍

子佐

衍義曰

五倍子今染家亦用口瘡以未摻之便可飲食

伏牛花

益州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所在皆有三月採○圖經曰

伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之

多生川澤中葉青細似蕷藥葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主兒驚風天吊鎮心明日去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及

葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得

之

今附目錄等語

日華子

去平治中風痰壅卒失音不

語

小兒客忤及癇瘈此是南海邊竹內塵沙結成者耳

衍義曰

天竹黃自是竹內所生如黃土著竹成片涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州竈蒙花



竈蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚醫亦澁多眵淚消
目中赤脉小兒皴豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘
葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花○圖經

曰

蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用

此木類而在草部不知何至於此

雷公云

凡使先揀令淨用酒浸一宿瀝出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾

如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色變用蜜半兩蒸爲度此元名小錦花
甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花
細碎數十房成一朶冬生春開此木也今居草部恐未盡

衍義曰

利州路

天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮

薄不過烈生西湖國

今圖經

文具桂

海藥

謹按廣州記云生南海山

衍義曰

天竺桂與牡蔴同但薄而已

谷補暖腰脚破產後惡血治血痢
腸風功力與桂心同方家少用

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生瀘州山谷

唐本注云藤生繞樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾濕腸止臚洪吐血腸風崩中帶下此

不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣力削取入藥

微炒使

新補見
日華子

圖經

文具桑根
白皮條下

掠

良音
日華子

掠子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎

止痛生肉

唐本注
云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟

黑其木堅重煮汁赤色爾雅云掠即來是也郭注云掠

持中車輞八月九月
採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒

水煮濃汁飲之生資州山谷

唐本注
云藤生繩樹木上生葉

似蘿摩葉三月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煮服之并燒爲香殺蟲魚葉搗碎置上流魚悉暴鯁一名化木香詹香也葉

如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也

海藥

主鬼

氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

擗木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也

海藥

謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲床坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並

割煎
服之

研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之

出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥

葉如椒主赤白痢蟲毒中

惡並剉
煎服之

黃龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥

功力勝解
毒子也

箭箙及鎧主婦人產後腹中痒安所卧席下勿令

婦人知

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡

血血痢下血婦人帶下明目去障翳風淚努肉生波斯

國似龍腦香

海藥

慈勒樹中脂也味甘平消翳破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作

飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如

捐取子及皮作飲極香美

海藥

謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒

主煩躁心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏

鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北揔有作柴亦云櫟音同也

千金方

治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把漬瘡當出膿日日為之差止

省藤味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去瘡生南地深山皮赤如指堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣以此樹為名也

楊盧耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊盧木

上耳也出南山

故覲蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又盍

汗書云止鹹味

治膀胱虛熱下砂石澁痛利水道
燒灰研食前溫酒調下一錢匕

梗木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦

洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江

東林蔓間

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子
中人碎爲粉微熬水服三匕亦和大豆藻面去黑生嶺
南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子
若雞卵皮紫色剖中人用之一名檻子一名合子主野

雞病爲上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐

爛者也

腐木主蜈蚣咬未和醋傅之亦漬取汁傅咬處良
石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者
煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箇已
江西人呼爲斬刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆
鈎也

拊木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如
桑出南方山中郭注爾雅云拊汝占大木葉如桑也

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服

之生嶺南山谷冬月不凋

谷似茱萸獨莖也

鴟鳥漿味甘溫無毒主風血羸老人浸酒用解諸毒故曰鴟鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫下瘻蛇虺蟲蟄狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荆樹似黃荆葉小無刺非田氏之荆也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝瘦弱小便白數陽道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也

枕杖味辛小溫無毒主效嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注
忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海
山谷作峒舡次於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸
酒去風血生江南林澗中葉如梨子如粗子山人亦名
鬼薄者也

木戟味辛溫無毒主老血瘕男子痃癖內痞取刺
梔子也

奴柘味苦小溫無毒主老血瘕男子痃癖內痞取刺
和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空
心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋

溫藤味甘溫無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷
不凋著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者
煮服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾

鐵柵柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴
鬼箭等丸服之

古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡
夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服
當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲
者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐
慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主

小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘或
並識之

飯糰燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南
方人謂筐也又籃耳燒作灰末傳狗咬瘡籃竹器也
白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮
黃荆等燒爲末淋汁取治療癰惡瘡蝕息肉白癩風
以物揩破塗之又單取莖葉者汁服之止水痢生江
東似石榴而短小對節

紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沈重下水瘻亦止
熱痢煮服之作灰淋取汁冰頭長髮此古木錦花也石
瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳筇無毒主蟲病者汁服蟲病是活蟲入腹爲病如癥
瘕者又梳筇垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血
上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉
尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來
參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和
砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又
卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柂几上
屑燒傳吻上嚙瘡

古廁木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所

在日時當戶燒薰之又薰杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之廁籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃掘同功也

梭頭失去音不語吃病者刺手心令痛即語勇左女右

救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖即月

蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡

瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之

大如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶

堪爲藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處

有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘
杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢
武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於
南土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食
不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故号地龍
藤遼樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦
有也

火糟頭主蠍蟻橫井上立愈上立炭主金瘡刮
取傅瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底
取得水銀著出

重修政和經史證類備用本草卷第十三

