



宸篤兒藥性論
八

ヤ 5
1029
4



○ 菲沃松子油
○ 菲沃松昆設爾弗

○ 雙木龜
○ 雙木龜子

○ 雙木龜
○ 雙木龜

○ 雙木龜
○ 雙木龜

○ 雙木龜
○ 雙木龜

宸篤兒藥性論卷七目次

宸篤兒藥性論卷八目次

○ 麻醉劑 下

○ 荳蔻 赤班熱治驗五方補說

○ 蔓陀羅華 蔓陀羅華越幾斯

○ 天鳩峇 天鳩峇越幾斯

○ 番木鱉 番木鱉越幾斯

○ 雙木龜 雙木龜越幾斯

○ 雙木龜 雙木龜越幾斯

○ 實吉塔利 實吉塔利

○ 青酸 實吉塔利斯



老利兒結爾私
煙草
麥奴 ○補說
羅實侃斯 ○羅實侃私丁幾

寢篤兒藥性論卷八目次

寢篤兒藥性論卷七

和蘭 漢侄 寢篤兒 著
小倉 洞海林 彊健卿 譯補
麻酔劑 ナルコチカ蘭 漢 補
神經及ヒ筋纖維ノ感觸過敏運動劇迅
ナルヲ直チニ奪却スルノ性アル者之
ヲ名クテ麻酔劑ト云ス之ヲ要スルニ
適宜ニ用ウヘバ生カヲ減殺シ大量ニ

用ウレバ全ク其生カヲ過絶スルノカ
能アル者ナリ○此劑ニ命ズルニ静息
止痛催睡鎮痙等ノ題目ヲ以テスル者
間之アリ此ハ是那ノ麻醉ノ餘功ヲ把
テ以テ標スルノ名ニメ固ヨリ其効ノ
真面目ニアラザルナリ○麻醉劑ノ効
ハ其神速ナルヲ歴々トメ目指スベシ
ト雖若シ誤テ多量ニ用ヰレハ人体ニ
於テ大害ヲ生シ間或ハ命期ヲ促スニ
至ルナリ然レ良工ノ手ニ在テハ甚喫

緊ノ良藥ニメ須臾モ欠クベカラサル
ノ品トス若シ夫劇甚ノ疼痛危險ノ搗
掣擊急等ニ因テ良能ノ妙用困厄セラ
レ患者將ニ死地ニ陥ラントスル者此
劑ニアラザレバ必其急ヲ拯フト能ハ
ズ其他百般ノ疾病ニ用井テ奇驗ヲ奏
スルヲ枚舉スルニ遑アラズ○然ト雖
此劑實ニ衝動ノ性ヲ具セルガ故ニ真
焮衝性ノ諸病多血質ノ者腸胃汚物積
滯セル者衰弱已甚ニメ知覺遲鈍ナル

阿芙蓉

オビウム ○ラウダ ヨム 蘭

者ノ如キハ大害アリ、用ウベカラズ

東方諸國ニ産スル罌粟球ノ未熟ナル者ニ刺シ得ル所ノ凝液ナリ○此液始メ刀口ヨリ滲出スルキハ、色乳汁ノ如シ、後風ヲ見テ乾固スルニ隨ヒ、漸ク變メ茶褐色或ハ黒色トナリ、味苦辛不佳ニメ麻酔ノ性ヲ生ス○藥舖ニ販ク者ハ大約大圓塊ニメ其質重ク其殻ノ裡膜ヲ以テ覆ヒ、罌粟子少許ヲ混ス○上好ノ品ハ塵土穢物ヲ混セズ、水ニ投メ九分ハ溶化ス、其質

輕ク乾固粘膠、黒色ニメ透亮ナラズ、破碎スレバ光輝アリ、研末スレバ黄色トナリ、昏憤スベキ烈臭アリテ焦臭ナク、嘔スヘキ不佳ノ苦味アリ、火ニ投ノ能ク燃エ、白紙ニ磨スレバ茶褐色ノ線條ヲ遺ス○阿芙蓉ノ性効諸説紛紜一定ノ成論アルナシト雖、然ルニ其固有ノ性効ニ於テハ諸家皆異同アルナシ、即興奮止痛鎮痙、催睡、其他皮表ノ蒸氣ヲ催發シ、大便及ヒ諸液ノ通泄ヲ減却スルノ効アリ○阿芙蓉ハ右ノ性能アルニ由テ、百般ノ疾患ニ用井テ偉

効ヲ奏スル峻カノ一奇藥タルト大明ナリ
神經熱腐敗熱不寐劇痛痙攣搐搦衰耗下利譫
妄休時ナキ者等ニ用ウ○昏睡鄭聲感觸遲鈍
腸胃汚物蓄積經久ノ便秘血液頭腦ニ輻湊ス
ル等ノ症アル者ニハ害アリ○大約阿芙蓉其
他麻醉性ノ藥物ハ感觸銳敏刺衝大過ノ神經
熱ニアラサルヨリハ之ヲ用ウルト得ス而
ノ感觸銳敏刺衝大過ノ神經熱モ尚慎戒ヲ加
ヘテ之ヲ用ウヘシ何者大抵神經熱ハ速ニ感
觸遲鈍刺衝不及ニ陥リ易キヲ以テナリ○此

故ニ神經熱ニ劇甚ノ疼痛若クハ搐搦若クハ
過度ノ漏泄等アリテ已トテ得ズメ之ヲ用井
バ、纒ニ其所望ノ効驗ヲ見ルニ至テ便後服ヲ
止ムヘシ

間歇熱居多ノ神經諸症若クハ暴勢ノ嘔吐溶
崩下利霍亂經久ノ大惡寒其他危險ノ諸症ヲ
兼發スル惡性ノ間歇熱ニ効アリ○其熱熾衝
性ナル者血液頭腦ニ激流スル者第一道汚物
滯積セル者大汗淋漓タル者ノ如キハ之ヲ禁
ス○間歇熱ニ阿芙蓉ヲ用ウル法甲ハ熱ノ發

作一二時前ニ於テシ、乙ハ免熱時ニ於テス、就中甲法ヲ以テ優レリトス

焮衝病純焮衝病ハ阿芙蓉大害アリ、然レ刺絡消焮劑、清涼劑等ヲ行フニ由テ、其盛勢已ニ減退シ、特、痙攣ノ景況ヲ遺ス者ニ要藥タリ○右ノ症ニ於テ阿片ヲ投ズルハ、通常發密而東トシノ方ニ從事シ、甘瀕若クハ中和鹽ヲ伍用スベシ、是、局處焮衝ノ末期、及ヒ假焮衝ニ用井テ、屢奇驗ヲ得ルノ方ナリ

焮衝性ノ瘡疹病、痘瘡、麻疹、赤斑、熱等、焮衝ノ時

期ニ於テハ、毫モ阿芙蓉ヲ用ウルヲ得ズ、然レ

氏舎電發謨名人トシテ名トシテ爸吉商同、勿爾洛夫同、蒲爾花協

同、穢歇蘭度同、其他古今名哲ノ說ニ從ヘバ、痘

瘡灌膿ノ期ニ方テ良膿ヲ釀サズ、却テ水様ノ

酷厲液ヲ生シ、或ハ瘡頂平塌、惡色ヲナシ、肌膚

蒼白ニメ且、知覺ヲ失シ、或ハ瘡、忽然トメ萎蕪

シ、片ヲトシテ顆粒ヲ分タズ、脉細疾、呼吸不利

且、呻吟聲、嘔、四支厥冷、居多ノ神經症、蜂起シ、惡

臭ノ衰耗、下利ヲ發スル者ニ、欠ヘカラサル要藥タリ○麻疹モ亦右件ノ諸症アル者、殊ニ變

急咳持久メ患者太困苦スル者。初頭劇勢ノ泄瀉ヲ發スル者。内陷スル者等ニ良効アリ。○右ノ諸症。焮衝劇勢ナルヨリ來ル者アリ。或ハ腸胃穢物ヨリ來ル者アリ。若シ此二因ヨリ來ル者ハ。之ヲ用井テ太害アリ。子細ニ檢査セズンバアルベカラズ。○赤斑熱ニ阿芙蓉ヲ用ウルハ。尤三思ヲ加フベシ。但此熱危劇ノ神經諸症。大煩悶。不寐譫妄持冬。變急性ノ嘔吐。衰耗下利等ヲ發スル者ノ要藥タリ。○發密爾東名曰夫阿芙蓉ハ赤斑熱ノ病者。不寐ノ後譫妄ヲ發ノ

殆ト振揚譫妄ノ如キ症ヲ發スル者ニ川井テ。其效夔ニ世間稱用スル所ノ刺絡寒菴法。滴浴法ニ勝レリ。
癩麻質斯癩麻質私病モ亦其性。焮衝ナル者ハ阿芙蓉ノ害アル。猶真焮衝病ノ如シ。但シ十分ノ消焮治法ヲ行フノ後。疼痛尚殘留メ。唯發熱。煩躁。苦悶等ノ症ノミ除カサルニハ。假ニ其疼痛ヲ鎮定センガ為ニ。阿芙蓉ヲ用井テ其驗アリ。○游走癩麻質斯若シ内部ニ轉移スル者ハ。阿芙蓉ニ他ノ衝動發汗藥。即羯布羅麝香等

天爲見生論 卷七

ヲ伍用メ殊効アリ○慢性ノ痲質私疼痛已甚ニメ少モ睡ルヲ能ハズ患部若クハ全体是ガ為ニ羸瘦スル者ハ阿芙蓉又ベカラザル要藥トス

下痢痢疾窘迫努張腹痛ヲ兼ル者肌膚乾燥ノ粗糙ナル者其因胃寒若クハ蒸氣閉塞ニ在ル者腸ノ感觸銳敏ナルニ因テ本病持又スル者ハ共ニ阿芙蓉ニ粘滑藥ヲ配用メ良ナリ然レ腸胃汚物アル者多血若クハ焮衝ノ徵アル者ハ太害アリ○腐敗様若クハ神經様ノ惡性痢

或ハ流行性ノ痢疾ハ速ニ阿芙蓉ト幾那トヲ伍用メ其惡症ヲ防キ患者ノ精カヲ保続スベシ

霍乱阿芙蓉ニ桂皮肉豆蔻等ヲ配伍メ霍乱ノ一良藥トス○亞細亞霍乱ノ血液沸騰筋肉奮起スル者ハ消酸毘私密荅規尼捏等ヲ伍用メ最良ナリ然レ急性霍乱ニハ此劑却テ害アリ

補 穆私薦醫學韻府曰真霍乱ハ先其發因ヲ除キ其病毒ヲ制シ次ニ其重症ヲ扼センカ為ニ極テ神速ノ効アル有力ノ鎮痙劑ニ

用ウルニアリ、其品ハ阿芙蓉ヲ以テ第一ト
 ス、其他鎮痙ノ峻藥非沃私子乳、菲沃私越幾
 斯、良莖根等ノ如キモ、亦皆良効アリト雖唯
 一品ノ阿芙蓉ニテ、全効ヲ收ルニ足レハ、每
 ニ此諸藥ノ効カラ須ニ及ハス。○左ノ方最
 峻効アリ 鎮吐飲 ○橙汁製者
 加密列花水 四勺 阿刺比亞越謨漿一
 忽布滿鎮痛液 一錢 橙皮舍利別 一
 右五味調勻、半時毎ニ一食匙兼テ一時或ハ
 一時半毎ニ、阿芙蓉丁幾十滴ヨリ二十五滴

ヲ用ウ、又鎮吐散、攝爾攝爾水、麻瘋涅天亞ニ
 橙汁ヲ和シタル者等モ良驗アリ、但酸敗苛
 厲ノ物ヲ吐スル時ハ、此三藥殊ニ良ナリ○
 吐劑ハ眞霍亂ニ害アリト雖比少量ノ吐根
 殊ニ吐根ニ阿芙蓉ヲ加ヘタル者ハ、鎮痙ノ
 良効アリ○外用モ亦忽ニスヘカラス、其法
 ハ香竈酒製ノ蒸溺劑ヲ肝胃ノ部ニ施シ、蒸
 餅、火酒、辛温藥等ヲ以テ製シタル巴布、或ハ
 香竈軟膏ニ阿芙蓉、竜腦、矢鳩、荅菲、沃私、矢亞
 密ヲ加ヘタル者ヲ、全腹ニ貼シ、硃砂加竜腦

揮發膏ニ菲沃私油香電華謨阿芙蓉液等ヲ
加ヘテ半時毎ニ腹部ニ塗擦シ粘滑藥ニ阿
芙蓉ヲ加ヘテ灌腸ヲ行ヒ微温香竄浴ヲ施
ス等ナリ○食物ハ粘滑ニメ消化シ易キ者
ヲ与ヘ脂油ノ食物ヲ禁スルヲ全ク下利病
ニ同シ○沙列布溶液阿兒魯沙谷米硬米大
麥等ノ汁中ニ桂少許ヲ加ヘ又新冷乳或ハ
酪餘ヲ与フヘシ○冷水飲服腹部水漬法良
鹽溶液漬法甘瀕内服等ハ共ニ熱帶地方ニ
於テ至重ノ症ニ必要ノ法タリ然レモ吾和蘭

如キ寒地ニアリテハ病症甚ク複雑セズ
又甚ク嶮惡ナラサルニ由リテ平常ノ霍亂
ニハ無用ニ屬ス○病治ニ向フ者ハ先忽布
滿苦味酒ニ阿芙蓉丁幾桂丁幾橙皮丁幾ヲ
加ヘ或ハ大黃水製丁幾或ハ小量ノ酒等ヲ
用井病全ク止ム者ハ強壯藥健質亞那括天
亞格崙僕葛私加栗刺等漸次ニ用井終ニ幾
那ヲ用ウヘシ

出血虛性ハ夫血煙攣ノ諸症ヲ兼ル者持ニ尿
血子宮血脉細ニメ煙攣状ヲ兼子面色蒼白四

肢厥冷スル者ニ良効アリ○然レ其因燃衝ニ
在ルカ。若クハ多血ノ人若クハ器械様ノ刺衝
ニ在ル者ハ。阿芙蓉功ナキノミナラズ却テ害
アリ

慢性神經病 神經病其因多血及ヒ其他ノ排除
スベキ者ニアラス。唯神經ノ感觸銳敏ナル
ニ係ル者ハ。阿芙蓉ヲ以テ其一良藥トス。子宮
病。依剥。昆。侄。兒。ノ諸症モ亦阿芙蓉ノ効アルヲ
其幾許ナルヲ知ルベカラズ。是其良藥タルヲ
証スルニ足レリ○是ヲ以テ一般ノ痙攣病若

クハ搐搦病論ハ強直牙關緊急恐水病癩癩
搐掣産婦ノ癩癩及ヒ搐掣等ハ多量ニ瀉血ノ
後之ヲ用ウベシ。又呃逆。痙攣。喘。首。日。咳。痙攣。性
ノ嘔吐。霍亂。胃。痙攣。急。疝。等。ハ偉効アリ。然レ此
等ノ病。脈。緊。實。面色。赤。盈。眼。彩。閃。發。呼吸。短。促。不
利。腸胃ノ汚物或ハ自餘排除スヘキ病因アル
者ハ。阿芙蓉ヲ禁ス。假令之ヲ用ウルモ慎戒ヲ
加ス。阿芙蓉ノ藥也。一藥也。一藥也。一藥也。
振揚譚妄 嘗テ阿芙蓉ヲ以テ此病ノ妙藥トナ
セリ。然レ爾後ノ發明ニ據レバ。必シモ然ル

ニアラズ。然、在方今穀製或ハ馬鈴薯製ノ火酒
ニ耽醜スルニ由テ、屢發見スル所ノ振惕譫妄
ニハ、阿芙蓉眞ニ緊要ノ一藥タリ。若夫病ノ初
頭ハ、阿芙蓉ノ的症ニアラズ。此時ニ方ツテハ
吐劑ヲ用ウルカ。若クハ温浴中ニアリテ寒水
滴浴法ヲ施スヲ良トス。而シテ後始メテ阿片ト
燒酒トヲ伍用スレバ、其效單味阿芙蓉ヲ用ウ
ルニ勝ル。列安名巴烏哩同云。晝間ハ火酒ニ水
若クハ糖若クハ其他無害ノ品ヲ加ヘ、數盃ニ
分チテ飲マシメ、晚ニ至リテ多量ノ阿芙蓉即

チ一ハヨリニハ至テ頻服セシムベシ。○病症
十分ニ發スル者ハ、殊ニ胃腸血管等ノ景况如
何ヲ檢査シ、胃若シ不淨ナルヲ見バ、其宜ニ從
ヒ、先、大量ノ下劑若クハ苦味藥殊ニ規尼捏ヲ
用ウベシ。若シ血管ノ刺衝機過大ナル者ハ、諸
酸殊ニ越栗矢爾赫篤立沃利等ヲ處シ、兼テ多
量ノ阿芙蓉ヲ用ウル。日ニ二三回ニ至ル。或
ハ阿芙蓉液十滴ヲ以テ灌腸劑トナシ、三時中
ニ二三回之ヲ行ヒ、睡眠ヲ催スニ至リテ止ム
補 穆私篤醫學韻府ニ云振惕譫妄ハ、トリ

痛嘔吐脉疾ニメ揺動シ易ク後緩慢トナリ
 舌苔アリ肌膚煩熱シ両手振揚スルヲ數十
 日ニメ卒然記性ヲ失シ神智錯亂メ漸ク謔
 語ヲ發シ喋々怪異ノ事ヲ言ヒ目ニ蚊蠅人
 面ノ類ヲ見或ハ鬼神來リテ譴責スルヲ覺
 へ甚キハ苦悶煩燥撮空摸床癩癩卒厥筋惕
 肉瞤冷汗淋漓手足振動ニ便失禁等ヲ發メ

竟ニ斃ル其療法輕症ノ者ハ醋水ヲ以テ頭
 部ヲ菴漬シ収欵亞的兒二錢舍電阿芙蓉液
 一錢越栗矢爾赫篤立沃利三錢右三味調勻
 每服三十滴日ニ三四次兼テ麥酒哥喜陳年
 酒ニ水ヲ加ヘタル者ヲ用井テ足レリ患者
 肥胖ニメ面赤呼吸短促血液頭部ニ輻湊ス
 ル者ハ小刺絡ヲ施シ以テ前方ヲ与フベシ
 其重症ニ至リテハ攝爾扁苔里亞根浸四弓
 民埵列利精三弓橙皮舍利別一弓忽布滿液
 鹿璫液舍電阿芙蓉液各一錢右六味調勻每

民埵列利精
 鹿璫液舍電阿芙蓉液

時一食匙兼テ精製阿芙蓉二匁ヨリ四匁吐
根半匁精製消石四匁白糖一匁右三味調勻
散トナシ六包ニ分テ每晚一包ヲ與フベシ
夫阿芙蓉ハ常ニ振惕譫妄ノ首藥ニ人其效
ヲ奏スルニ及テハ熟睡スル一九時ヨリ十
二時ニ至リ睡中身温常ノ如ク温汗ヲ發シ
寤ルニ及テ精神爽然平旦ノ如シ○善後ノ
療法ハ内臟膨脹スル者ニ先護謨安門亞幾
乳阿魏等ヲ用井次ニ苦味藥ヲ與ヘ最後ニ
幾那括天亞鍊劑ヲ用井身體ヲ勞動セズ大

氣中ニ逍遙スベシ然レ復耽飲スル者ハ再
此病ニ陷リ易ク阿芙蓉モ亦其效初ノ如ク
ナラズメ終ニ死ニ至ル故ニ譫妄治メ後ハ
漸々飲酒ヲ減少メ全ク斷ムニ至ルヲ要ス
疆按ニ振惕譫妄ハ古人未タ之ヲ知ラズ唯
認テ尋常癲狂トナシ治テ謬ル者比々之ア
リ方今ニ及テ鄰度名人我天同ノ輩始テ其因
飲酒ニアルヲ知り精診熟驗メ其療法漸明
ナリ予此書ヲ讀テ而メ知ル世ノ癲狂ト稱
スル者振惕譫妄甚タ多シ本年春予ニ狂者

本草綱目卷之七

ヲ見ル皆其因大酒ニアリ。此法ニ從テ之ヲ療ス其效響ノ聲ニ應スルカ如シ。實ニ醫家ノ大幸ナリ。嗚呼酒毒ノ人ヲ害スル。怕レサルベケンヤ

癩毒曾テ阿芙蓉ヲ以テ癩毒ノ妙藥トナス。アリ然レ阿芙蓉ハ癩毒ニ効アル者ニアラス。故ニ諸家ノ經驗說ニ曰阿芙蓉ハ癩毒ノ妙藥ト認ムベカラス。唯水銀ヲ続用スト雖氏病自若トメ善徵ヲ見ズ。亦惡候モ呈セサル者。癩瘰性ノ感傷ヲ兼ル者。胃腸虛冷ニ由テ水銀ヲ受

用スルヲ能ハザル者。煩燥不寐劇痛等ヲ併發スル者ノ要藥トス

標疽百爾西華兒名トボト其他ノ諸名家阿芙蓉ヲ以テ手指足趾ノ壞疽ニ大ニ稱用セリ。故

ニ之ヲトボト薦疽ト名ク。○惡性瘍腐敗瘍等劇痛アル者ニ概用メ大ニ捷効アル藥品トス

腺腫病阿芙蓉ハ腺腫病ヲ根治スルニハ太切要ノ品ニアラス。又年少ニメ体格嬌柔ナル者ハ通常劇甚ノ腺腫病ニ嬰ル易シ。此ノ如キ者ニ阿芙蓉ヲ投ズレバ太危險ノ症ヲ發ス。○然

氏疼痛アル結節腺腫及び腺瘍ニハ良効ヲ奏ス。又能ク此疾ノ痙攣諸症ヲ鎮靜シ頑固ノ硬結腺腫ヲ分解ス。○又點眼水ノ伍藥トシ療瘰癧性ノ焮衝ニ用井テ効アリ。又聖京屈性ノ眼焮衝ノ第二期ニ於テハ阿芙蓉丁幾ヲ以テ峻効アル一良藥トス。

黃疸水腫肝管若クハ胆管痙攣ノ為ニ牽縮セラレ。因テ發スル所ノ黃疸病ニ用井テ良ナリ。又水腫病吸収管攣急スルニ由リテ小便不利スル者ハ利尿ノ藥品ニ配用メ佳ナリ。

腐蝕性金石毒腐蝕性ノ金石毒ヲ服スル者。蓖麻油色豆油ヲ用井テ其毒十分下利シ去ルノ後尚腸管ニ淹滯セル知覺ヲ減損センカ為ニ阿芙蓉ヲ用ウルトアリ。

外用上ニ説ク所ノ諸病症ニ於テハ皆阿芙蓉ヲ外用スベシ。乃擦劑腎埜兒麻質私劑點眼水射注劑トナシ。尚處々痙攣疼痛用井テ劇シキ筋ノ攣縮肉臟ノ攣痛顔面痛耳痛齧齒痛癩毒性ノ骨痛強腫ニ種ノ焮衝ヲ兼ル眼痛ヲ鎮止スルカ如キニ皆稱用ス。○然此方今ハ右ノ

諸病ニ莫爾比。搗ヲ用井テ。賢堊兒麻質斯法ヲ
行ヲ最モ優レリトス

○方劑數種アリ。内用ハ散。丸。溶液。孟佺設爾外
用ハ灌腸塗擦軟膏硬膏等。宜ニ随テ撰用スベ
シ。○之ヲ用ウルノ量ハ自餘ノ峻力有毒藥ノ
如ク。少量ナルヲ宜シトス。但其患者ノ年紀男
女病症等ヲ商量シテ。四分ハヨリ半ハ一ハ至
ヲ以テ一劑トナシ。若クハ數劑トナシ。日ニ一
服シ或ハ數服ス。然レ其症危險ニ止ムコトヲ
得ザル者ハ。四分時若クハ半時毎ニ一服スベ

シ。故ニ角弓反張等關緊急ノ如キハ。徐々ニ十
分ヨリ尚多量ニ至ルコトアリ。○興奮ノ効ヲ得
ント要セバ。半ハヨリ一ハ至ヲ足レリトス。靜
息鎮痙催睡麻痺ノ効ヲ要セバ。一ハヨリ三ハ
至ヲ用ウベシ。是其大較トシ。○阿芙蓉少量ヲ
以テ頻々用ウルヲケリテハ。四分ハノ少量ヨ
リ始ムルモ。其總計早ク既ニ積テ一ハニ至ラ
ザルヤ。及ヒ其後服ヲ與フル毎ニ其前ニ與ヘ
シ所ノ效害如何ニ注意スベシ。何者若シ這ニ
件ヲ遺忘メ。妄意ニ長服セシムルニ至テハ。容

易ニ險症ヲ招キ、間亦患者ヲノ死地ニ陷井ラ
シムルニ至レバナリ。是故ニ之ヲ續用スルニ
當テハ、勉メテ患者ノ景况疾病ノ症候ヲ商量
メ、遽ニ其量ヲ加増スルノナク、其間隙ニ當テ
更ニ消毒劑ヲ兼用スベシ。○阿芙蓉ヲ持久シ
用ウレバ、患者漸ク之ニ慣レテ、尋常ノ分量ニ
テハ、毫毛其效ヲ見ルノナク、已ムトテ得ズメ
逐次ニ其量ヲ加倍スルニ至ルノアリ。能ク慎
戒メ其量ヲ進ムベシ。故ニ若シ目下ノ症之ヲ
休テ害ナクンバ、暫ク後服ヲ停ムベシ。○灌腸

劑ハ内服常量ノ一倍ヲ用ウベシ。多シト雖ニ
倍ニ過クベカラズ。是、他ノ腸管ニ甚ル阿芙
蓉ニ感動シ易キヲ以テノ故ナリ。○
○阿芙蓉ハ上工ノ匙上ニ在テハ、右件諸説
如ク、其効較著ニメ、出群ノ偉カク、他藥所得
テ比スベキニアラズ。故ニ時宜ヲ省セズメ之
ヲ漫用シ、若クハ大量ヲ以テ暴處スルハ、其
害勝テ言ベカラズ。間亦人自斃スに至ル。○阿
芙蓉瞑眩ノ徵ハ、昏憤、譫妄、昏睡、頑固ノ便秘、大
汗淋漓トメ、阿芙蓉臭ヲ帶ヒ、顔面赤盈、呼吸短

促不利。中風。搐搦。如キ是ナリ。○上説ノ諸症。此ニ一ニテ發露シ。是阿芙蓉。瞑眩タルヲ。覺得シ。其毒尚胃中ニ在。ニ値テ。速效アル峻吐劑ヲ与ヘテ。之ヲ拔除スヘキ。是至當ノ良法タリ。○又此毒ヲ消スルニハ。内外共ニ植物酸ヲ稱用ス。華涅滿名動設羅兒同阿爾比羅同其他諸名家皆羯布羅名動砂吐根。阿魏。哥喜濃浸等ヲ以テ消毒藥トス。血液盛ニ腦ニ灌注スル者ハ。刺絡メ大ニ放血シ。又顛顛ニ蟻鍼ヲ貼スル等。共ニ欠ベカラサル療法トス。



○阿芙蓉ハ精製粗製二品ノ外。尚許多ノ製劑アリ。則据據メ左ニ掲ク。
○阿芙蓉越幾斯エキスタラクキスタラクエムオピ○エシムギムモ水ヲ以テ阿片ヲ溶シ。水氣ヲ蒸散メ越幾斯ノ稠トカス。○内用ハ散丸。溶液トナス。三分ハノ一ヨリニハ。尚多量ヲ頻服ス。外用ハ半錢ヲ以テ。四弓ヨリ六弓ノ液ニ溶シ。射注劑トシ用井。又其液ニ蜜ヲ加ヘテ含漱劑トシ用ウ。

○阿芙蓉酒ヒシムオピヒシムオピヒノ○チンキサロ阿芙蓉

本草綱目卷之七

精製者 葡萄酒 燒酒者十五度
 右三味 三滴ヨリ五滴十滴至ヲ單用
 シ、若クハ孟屈設爾ニ和シ用ウ ○此液十滴ニ
 阿片一匁ヲ含ム ○外用ハ點眼水若クハ射注
 劑ニ加用シ、或ハ角膜翳ニハ單味一滴ヲ取テ
 眼中ニ點スル一日ニ一二次
 ○舍電華謨阿芙蓉液 〇三ム、オ、ヒ、ロ、マ、チ、キ、
 ロ、カ、タ、〇、ラ、ウ、ダ、ミ、ム、リ、
 キ、イ、ダ、ム、シ、ラ、ウ、ダ、ミ、ム、リ、
 阿芙蓉 雜腹蘭 桂 丁子 研末
 一錢 葡萄酒 〇是 斑牙 產者 小石五味 〇此液

十二滴ニ阿芙蓉一匁ヲ含ム ○四滴ヨリ八滴
 十六滴尚多量ヲ服ス
 ○托歇爾私發汗散 ス、ヒ、ス、オ、ピ、ト、コ、ン、ホ、シ、
 キ、ム、オ、ピ、オ、〇、ヒ、ス、オ、ピ、ト、コ、ン、ホ、シ、
 ル、ヒ、ス、ド、ヘ、リ、
 一 霸王鹽 右三味合メ研末ス ○此
 散 十一匁 鹽 二錢 中ノ阿片吐根各一匁ヲ霸王
 原書ニハ、一、誤、リ、ナ、ラ、ン、中、ニ、阿、片、吐、根、各、一、
 ハ、ヲ、含、ム、〇、諸、病、ニ、用、井、テ、發、汗、ノ、一、良、藥、タ、リ、
 故ニ發汗劑篇ニ說明セリ
 ○阿芙蓉硬膏 オ、エ、ム、ア、ラ、ス、
 越列密華爾

私乳香 鵝栗拔奴謨各六
安息香 二

右五味水ニ混合シ 阿芙蓉 極末者 拔爾撒

謨百爾非亞尼ヲ加ヘテ膏トナス

○阿芙蓉軟膏 オピウム アグエンチム

黃蠟 各ニ 右合メ溶化シ 阿芙蓉 錢ニ

加ヘテ子細ニ煉和ス

○莫爾比捏 舍密家幾那及ヒ其他植物ヲ分析

シ其最効分ヲ探索スルガ如ク阿芙蓉モ亦之ヲ免ル、一ヲ得ザルナリ ○牒洛斯涅 名人設爾

去能兒 同 魯昆 杭 蕪 同 私訛羅 震 哈 同 繆兒 侄 兒

同 又輓 近ニ至テ 哥烏 歐列 弊 名 就捕 蘭 同 百而

列室 兒 同 洛昆 杭 蕪 同 等ノ 舍密家 阿芙蓉ヲ分

析メ子細ニ之ヲ檢索シ 許多ノ 原質アル一ヲ

發明セリ 而メ其最ナル者三アリ 即莫爾比捏

納爾 哥 低 捏 韋 德 乙 捏 ナリ ○此元素ヲ得ルノ

法ハ繁長ニメ此ニ略載シ難シ 縱令之ヲ略載

スルモ必シモ治療ニ益アリトセズ 唯疾醫ニ

在テハ其元素ノ何者タルヲ知ルヲ以テ足レ

リトス ○夫莫爾比捏ハ植物ノ灰汁鹽ニメ其

質太白ク。鍼状ニメ直角ノ結晶ナリ。臭ナク。味
 苦烈。風ヲ見テ毫モ變敗スルナシ。然レ温ヲ
 得レハ則テ溶ク。但シ溶クト雖レ分析セズ。水ニ
 溶化シ難シ。亞爾箇兒四十二倍亞的兒八倍ニ
 ハ能ク溶解ス。○莫爾比捏ハ革德乙捏ト相合
 メ。阿芙蓉ノ麻醉分ヲナス者ナリ。而シテ此物諸
 酸ト相合スル所ハ殊ニ善ク其麻醉ノ効ヲ峻
 發シ。又能ク水ニ溶解ス。故ニ酸化莫爾比捏ヲ
 以テ多ク藥用ニ供ス。即醋酸莫爾比捏モルヒ子
ヒ子○アセヒ子子硫酸莫爾比捏ヒ子○ズモル
ヒ子○モルヒ子子

フルヒ子子鹽酸莫爾比捏ヒ子○ソウラスモ
ルヒ子子鹽酸革德乙捏ヒ子○ソウラスコデイ
ルヒ子子鹽酸革德乙捏ヒ子○ソウラスコデイ
子等是ナリ。就中諸厄利亞國ニ於テハ。方今特
 ニ鹽酸莫爾比捏ヲ以テ藥用ニ供シ。之ヲグレ
 コリ人ノ莫爾比捏鹽ト名ク。○此新藥ハ經驗
 未タ博カラザルカ故ニ。其當否ヲ確定スルコ
 能ハズト雖レ其大概ヲ云バ止。麻醉ノ効ノミヲ
 要メ。衝動ノ効ヲ兼テ須ク其位地ニ用井テ
 殊効アリ。又其性太猛烈ナルヲ以テ。用ウルニ
 臨ンテ警戒ヲ加ヘ。其用量必ス小ナルヲ要ス。

醫藥性論 卷七

則ハ分ハヨリ四分ハ半ハ至テ散在孟僂
 設爾等トナシ與フ○外用賢垓兒麻質斯法ハ
 醋酸莫爾比捏或ハ鹽酸莫爾比捏四分ハヨリ
 半ハ一ハマデヲ撒擦スル一日ニ一二回善ク
 百日咳顔面痛角弓反張慢性癱瘓質斯痛及ヒ
 吐劑ノ瞑眩ニ由リテ發スル暴吐ヲ治ス○又
 此鹽ヲ以テ製スル劑アリ左ニ掲ク
 ○莫爾比捏舍利別シリビロ子羅 舍利別 一北
 醋酸莫爾比捏四ハ 右ニ味ヲ以テ製ス
 ○此劑ハ白嬰粟殼舍利別及ヒ實亞格日温ニ

代用メ其効最優ナリ何者嬰粟殼舍利別實亞
 格日温ノ二劑ハ共ニ其製精密ナラザルニ因
 テナリ○一時若クハ一時半毎ニ一茶匙ヲ與
 フ
 ○硫酸莫爾比捏舍利別シリビロ子羅 硫酸莫爾比捏四ハ ○主治
 効能同前
 ○莫爾比捏鎮痛液ギラ、アノ、ヂナ、ロ、ベ、ス、イ、ン
 ○醋酸莫爾比捏或硫酸莫爾比捏十六ハ 蒸餾水一
 右混合スルニ乗メ醇精醋八滴若クハ九滴亞

爾箇兒一錢ヲ加ヘテ莫爾比捏ノ溶解ヲ助ク
 ○其滴ヨリ漸ク増加シ二十四滴ニ至ル○是
 性効舎電華謨阿芙蓉液及ヒ阿芙蓉丁幾諸劑
 二同シ
 ○納爾哥低捏 是モ亦其性効莫爾比捏ニ匹
 敵ス其質ハ火ニテドロク子鹽ト名ク
 白色ノ結晶ニシテ氣味俱ニナク冷水ニ溶化
 セズ四百倍ノ温湯油亞的兒諸酸等ニ能ク溶
 化ス○是阿片ニアル所ノ興奮衝動發汗昏瞶
 等ノ性効ナリ

○革德乙捏 是モ亦阿片ヨリ發明セル強力
 ノ一元素ナリ
 補 莫爾比捏ヲ得ル輕易簡便ノ法
 墨林騏舎密書ニ曰莫爾比捏ヲ得ル輕易簡
 便ノ法ハ、閤耳列爾門上名ノ創法ナリ其法
 阿芙蓉二比ヲ極末シ亞爾箇兒三十度者三
 比ヲ以テ冷浸シ時々振盪シ四日ヲ經テ上
 清ヲ分チ取り殘滓ヲ絞リ液ヲ取り又其滓
 ニ亞爾箇兒二比ヲ加ヘテ浸出スル一日
 上清ヲ分チ取り殘滓ヲ強ク絞リテ液ヲ取

本草見藥性論 卷七

リ。前後ノ兩液ヲ合メ漉過シ。十分清澄トナ
ルニ至リテ。碓砂精ニ弓ヲ注加スレバ。其液
茶褐色ニ變メ微ク濁ル。之ヲ清定スル。兩
三日ニメ。其液ヲ篩子上ニ漉シ去レバ。壘子
内面ニ茶褐ノ芒ヲ結フ。之ヲ乾セバ其量四
弓四錢ヲ得ル。此芒未清潔ナラザルヲ以テ
再清水ヲ以テ精密ニ淋洗スレバ。色分ト莫
爾比捏酸安母尼亞ノ二物水中ニ溶化シテ。
莫爾比捏獨赤色ノ芒ヲ結フ。再此芒ヲ乾セ
バ。其量二弓四錢ヲ得ルナリ

○莫爾比捏ヲ得ル新法
同書ニ曰。私答百爾西名莫爾比捏ヲ得ル一
新法ヲ創ム。其法阿芙蓉四分細剉シ。醋酸三
分水三分ヲ合シタル者ヲ注キ加ヘ攝氏ノ
二十一度ノ温ニテ。浸出スル。十二時。其後
拔太貯亞局方ノ驗水器三十五度ノ亞爾箇
兒八分ヲ加ヘ。攝氏ノ七十一度ノ温ヲ以テ。
浸出スル。十二時ニ入。浸液ヲ分子取り。其
滓渣ハ再浸出分取スル。前法ノ如クニメ。
兩液ヲ合シ漉過シ。安母尼亞加列亞爾箇兒

強按^強亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒加^加列^列爾^爾門^門士^士以^以法^法亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒浸^浸液^液二^二安^安
 母^母尼^尼亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒加^加列^列爾^爾門^門士^士以^以法^法亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒浸^浸液^液二^二安^安
 和^和亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒者^者十^十ラ^ラ合^合ヲ^ヲ和^和ス^ス但^但安^安母^母尼^尼亞^亞加^加列^列亞^亞
 爾^爾箇^箇兒^兒ノ^ノ度^度ハ^ハ浸^浸液^液ニ^ニ加^加ヘ^ヘテ^テ直^直ニ^ニ膠^膠濁^濁セ^セザ
 ル^ルノ^ノ強^強ニ^ニ至^至ル^ルベ^ベシ^シ○[○]兩^兩液^液和^和合^合ノ^ノ後^後一^一二^二時^時
 ヲ^ヲ經^經レ^レバ^バ莫^莫爾^爾比^比捏^捏壘^壘子^子内^内面^面ニ^ニ結^結芒^芒ス^ス結^結芒^芒
 止^止ン^ンテ^テ後^後上^上液^液ヲ^ヲ分^分テ^テ去^去リ^リ其^其芒^芒ヲ^ヲ篩^篩子^子上^上ニ^ニ
 置^置キ^キ亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒ノ^ノ稍^稍稀^稀キ^キ者^者ヲ^ヲ以^以テ^テ淋^淋洗^洗シ^シ強^強
 亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒ヲ^ヲ以^以テ^テ煮^煮テ^テ熱^熱ニ^ニ乘^乘メ^メ漉^漉過^過シ^シ放^放冷^冷
 ス^スレ^レバ^バ潔^潔白^白ノ^ノ莫^莫爾^爾比^比捏^捏ヲ^ヲ得^得ル^ルナ^ナリ^リ○[○]夫^夫亞^亞
 爾^爾箇^箇兒^兒ヲ^ヲ浸^浸液^液ニ^ニ加^加フル^ルニ^ニハ^ハ必^必長^長管^管漏^漏斗^斗ヲ^ヲ

用^用ウ^ウベ^ベシ^シ否^否ラ^ラザ^ザレ^レバ^バ亞^亞爾^爾箇^箇兒^兒獨^獨上^上浮^浮メ^メ浸
 液^液ニ^ニ混^混和^和シ^シ難^難シ^シ
 嬰^嬰粟^粟殼^殼ス^スカ^カビ^ビス^スパ^パバ^バヘ^ヘリ^リス^ス蘭^蘭
 白^白嬰^嬰粟^粟ノ^ノ未^未熟^熟球^球ヲ^ヲ採^採リ^リ子^子ヲ^ヲ去^去テ^テ乾^乾シ^シ貯^貯ス^ス性
 効^効阿^阿芙蓉^{芙蓉}ニ^ニ同^同ト^ト雖^雖其^其力^力甚^甚微^微ナ^ナリ^リ○[○]癩^癩痛^痛ヲ^ヲ治^治
 シ^シ又^又和^和胸^胸藥^藥ニ^ニ伍^伍用^用メ^メ癩^癩急^急性^性ノ^ノ咳^咳嗽^嗽ヲ^ヲ鎮^鎮定^定シ^シ
 灌^灌腸^腸藥^藥ト^トメ^メ下^下利^利ノ^ノ窘^窘迫^迫拘^拘痛^痛ヲ^ヲ兼^兼ヌ^ヌル^ル者^者ヲ^ヲ停^停
 ム^ム○[○]琶^琶布^布若^若ク^クハ^ハ蒸^蒸漏^漏劑^劑ト^トシ^シ用^用井^井テ^テ痛^痛腫^腫痛^痛瘍^瘍
 痔^痔痛^痛ヲ^ヲ治^治ス^ス○[○]煎^煎劑^劑ハ^ハ二^二錢^錢ヨ^ヨリ^リ四^四錢^錢至^至テ^テ以^以テ^テ
 煎^煎メ^メ四^四弓^弓ヨ^ヨリ^リ六^六弓^弓ノ^ノ液^液ヲ^ヲ取^取ル^ル蒸^蒸漏^漏劑^劑或^或ハ^ハ灌

本草綱目卷之七
 卷七

腸劑ニハ半弓ヨリ一弓至ヲ以テ煎メ六弓ヨ
リハ弓ノ液ヲ取ル

○嬰粟殼舍利別リシユ。アルビ。ハ。ハ。或云此舍

利別一弓ヲ以テ阿芙蓉一瓜ノ効カアリトス

○一錢ヨリ二錢一弓至ヲ服ス

底テ里リ荅ダ幾キ私ステラク。左カ。ム。ム。

哈列カ扭ニ私ス早ハクク已ビニニ園ラ生ク高カ苳カ

テテ催チ睡ハ藥カトカシカ用カウカ又カ園カ生カ高カ苳カ蒸カ餹カ水カ真カ高カ苳カ

ヒヒロロササ羅カ蒸カ餹カ水カ及カヒヒ野カ生カ臭カ高カ苳カノカ越カ幾カ私カ共カ

ニニ已ビニニ久クシシクク世セニニ行キハハルル○輓カ近カニニ至シテテ箇カ幾カ

泄シ名名準準幹幹同同等等尋尋常常高高苳苳ノノ乾乾液液ヲヲ以以テテ阿阿片片ニ

代代用用シシ之之ヲヲ羅ラ僂ク忝チ加カ留リ謨ム又又高高苳苳阿阿芙芙蓉蓉トト名

クク○魯ロ荅ダ蔑メ兒エ名。底。里。荅。幾。私。以以テテ三三種種トトナ

スス其其第第一一ハハ高高苳苳ノノ花花莖莖ヲヲ鑽ズ刻キシシテテ得ドルル所所ノ

液液ヲヲ曝ハ乾カセセルル者者之之ヲヲ精精製製底底里里荅荅幾幾私私トト云云其

第第二二ハハ高高苳苳ノノ花花莖莖ノノ外外皮皮ヲヲ絞ズ搾ズシシタルタル液液ヲ

曝ハ乾カシシ若若ククハハ重重湯湯煎煎ヲヲ以以テテ寬寛々々地地ニニ乾乾固固セ

シシムムルル者者之之ヲヲ巴バ里リ斯ス底底里里荅荅幾幾私私或或ハハトトリリタ

ゲゲトト云云其其第第三三ハハ全全莖莖ノノ搗ダ汁汁若若ハハ絞ズ汁汁ヲヲ取クリ

重重湯湯煎煎ニニテテ稠チウ凝ネイセセシシムムルル者者之之ヲヲ園園生生高高苳苳越越

幾私ト云○以上三種中ニ於テ第一種ノ効力
尤峻ナリ故ニ其量半ハノ効第二第三種ノ二
ハニ敵スベシ○第二種ハ之ヲ用ウルニ臨ン
テ溶解メ孟屈設爾ニ伍スルヲ良トス但散劑
トナシ用ウルハ麻屈涅矢亞若クハ亞刺比亞
護謨ヲ加ヘテ其渙流ヲ防グヘシ○此新發明
ノ品ハ其効阿芙蓉ト同クメ而メ阿芙蓉ノ如
キ損害ナシ故ニ諸家最之ヲ稱用ス○殊ニ園
生萵苣ハ夥シク和蘭ニ生植シ且年間幾回モ
下種スベキガ故ニ價廉ニメ且得易シトス○

底里荅幾私ハ止催睡止痛鎮痙ノ性ノミアリ
テ絶テ熱ト麻酔ノ性ナシ故ニ熱病焮衝病等
ニ於テ静息催睡定咳止嘔鎮痙等ノ効ヲ要ス
ル者ハ其効反テ阿芙蓉ニ優レリ之ヲ要スル
ニ其症阿芙蓉ヲ用ウベキノ位地ナレ氏熱ノ
景况アルカ故ニ阿芙蓉ノ刺衝性ニ嫌アル者
ニ之ヲ用井テ殊效アリ○慢性諸病ニ良驗ア
リ殊ニ痙攣性ノ胸痛及ヒ咳嗽ニハ實萵苣利
私ヲ伍用シ腹痛ニハ阿芙蓉ノ如ク便閉ヲ起
サズ小兒ノ搐搦生齒ノ時ニ方テ發スル者不

寐神經性ノ昏瞶、癱瘓、麻痺、私痛、胸水病ニ屢發ス
ル所ノ癱瘓性ノ煩悶、子宮病家及ヒ依剥、昆垠
児家ノ恐憂、煩悶、勞瘵家ニ發スル煩悶、疼痛、癱
瘓性ノ咳嗽等ニ奇効アリ、又眼焮、衝感、觸過敏
ニメ大ニ羞明、劇痛、粘液ヲ分泌スル一過多
ナル者ニハ之ヲ以テ點眼水若クハ菴貼劑ト
メ妙ナリ○烏底爾名ハ之ヲ以テ製シタル軟
膏、硬膏、或ハ此新絞汁ヲ以テ劇甚ノ膿瘍、瘰癧
性瘍等ニ外用シテ、治驗太多シト云

補

予四年前越而實吉醫事日札ノ某卷ヲ

讀ム、月經痛ヲ治スルノ一章アリ、其畧ニ曰
ク、婦人毎月經水將ニ來ラントスルカ、或ハ
既ニ來リテ后、小腹疼痛、内股攣引、惡寒、發熱、
眩暈、頭痛、甚キハ卧メ事ヲ操ルテ能ハサ
ル者多ク之ヲ加メ、此症ニ稱用スル藥劑世ニ
多シト雖多クハ皆一時即効ヲ見ルルニシテ
メ、再發ヲ防ク不能ハス、特的里答幾私越幾
斯藥、單味丸トナシ、每服一分、宛日ニ三次用
スル、予三十日ヨリ六十日ニ至レハ、十中八
九ニ全治ヲ得、此說ニ據リテ試用スルニ實

ニ其言ノ如ク全効ヲ収メ今ニ至リテ再發
セサル者甚多シ之ヲ坪井信道ニ語ル信道
曰鹽谷甲藏ノ妻某氏每ニ此症ニ苦ム予藥
ヲ与ヘテ輒効アリト雖未全治ヲ得ス自今
後此方ヲ試用セシ其後又メ予ニ告テ曰鹽
谷妻某氏ニ此方ヲ用ウル一二月餘經痛治
メ復發セスト云フ今予此書ヲ校正スルニ
方リテ此說ヲ補入セント欲ス遽ニ其章ヲ
索ムレ氏未之ヲ得ス故ニ略記憶スル所ヲ
記ス

菲沃私矢亞母斯 ロイルド蘭

白黒ノ二種アリ黒色ノ者ヲ藥用トス○歐羅
巴諸洲殊ニ獨乙蘭土ニ於テ荒涼膏腴ノ地ニ
産ス其苗二年ニメ枯ル莖葉皆毛茸アリテ其
毛茸ヨリ粘垢ヲ分泌ス氣味不佳ニメ微苦且
昏曠スベシ花ハ淡黄色ニメ居多ノ黒理ヲ以
テ織綜ス葉ハ莖ヲ抱キテ生シ實ハ小ニメ圓
灰黒色ナリ○全州皆効アリト雖恃實ト葉ヲ
以テ藥用ニ供ス○菲沃私矢亞母斯ノ麻醉性
ハ殆ト阿芙蓉ト一般ニメ契ト衝動ノ性ナク

天馬見極生論

又便秘スルヲナシ○若大量ニ用ウレバ、惡心、嘔吐、眼暗、耳聾、昏睡、瞳子散大、顏筋、腠動、脈細、疾ニメ、震惕シ、紅血皮下ニ滲溢シテ、終ニ斃ル、ニ至ル○然レ、獸類ニ之ヲ試用スルニ、少シモ、瞑眩スルヲナシ、其性効此ノ如ク、悍烈ナリト、雖、謹慎メ之ヲ用ウル、其ハ、實ニ不凡ノ要藥タリ

熱性病 神經病、居多ノ、痙攣症、或ハ、神經症、或ハ、大頭痛、譫忘、不寐、搐搦、急性ノ、咳嗽、若クハ、嘔吐、ヲ、夾ム者ニ、良驗アリ○**痙衝熱**、已ニ、十分ノ

消焮療法ヲ行フノ後、唯衝動、痙攣、疼痛ノ、模様ノ、遺留スル者ニ、偉効アリ、殊ニ、呼吸器ノ、痙衝病、痙攣性ノ、咳嗽ヲ、發シ、患者、頻ニ、之ヲ、厭惡スルニ、ハ、鎮嗽劑トナシ、用井テ、奇効アリ

胸腹諸臟痙攣、感動、痙攣性ノ、喘息、百日咳、密爾、羅、而、喘息、病、麻疹ノ、咳嗽、癆瘵病ノ、咳嗽、甚シクメ、危、險ニ、進ム者、痙攣、急性ノ、嘔吐、痙攣、急症、霍亂、小便、不利、及ヒ、小便、閉等、其、因、止、ニ、痙攣ニ、在ル者、等ヲ、治ス

本註

勃斯、治癆書ニ、曰、嘗テ、烏、多、歷、吉、多

本草記、生論、卷七

國ニ於テ瘧瘵咳及ビ百日咳大ニ流行セリ。
 予之ヲ療シテ百方セシニ、**穢歌蘭度**カ創ム
 ル所ノ**菲沃私矢亞母**越幾私ト安質母泥酒
 トノ方劑持リ多ク治驗ヲ得タリ。加之此方
 劑ハ不分皂白ノ嬰兒ト雖氏太服シ易キヲ
 以テ殊ニ之ヲ撰用ス。凡**菲沃私矢亞母**ノ量
 ハ一歳ノ兒一日ニ二匁ヲ服シ尚其年紀ニ
 從漸ク倍加メ四匁ヨリ六匁至。○予屢經驗
 スルニ百日咳ヲ治スルハ白頭翁越幾斯ヲ
 以テ**菲沃私矢亞母**良若等ニ勝レリトス

搐搦性神經病及ヒ經久慢性神經病嬰孩ノ搐
 掣阿片ヲ用井難キ者癲癇舞蹈病子宮病依刺
 昆堙兒ニ良効アリ
 劇甚ノ僕麻質私痛痛風痛顔面痛齧齒痛等ノ
 如キ皆効アリ
 硬結腫閉塞殊ニ瘰癧質ノ硬結腫若クハ閉塞
 等ニ良ナリ○**菲沃私矢亞母**ハ特緩和鎮瘵ノ
 効ノミナラズ又能ク硬結閉塞ヲ分解スルノ
 効アリ故ニ瘰癧性ノ頑固木節腫若クハ閉塞
 ヲ分解スルニ極メテ良ナリ○殊ニ肺ノ瘰癧

性硬結腫及ヒ其ヨリ続發スル咳嗽ニ効アリ
 外用療瘰癧性硬結腫癌腫性硬結腫瘰癧性ノ疼
 痛潰瘍及ビ眼焮衝其他癌腫等ニ用井テ軟和
 分解鎮瘧止痛ノ偉効アリ
 ○内用ハ必ズ越幾私ヲ以テ散丸溶劑トナス
 小兒ハ一匁ヨリ四匁至ヲ以テ極トス大人ハ
 三匁ヨリ五匁至若之ヲ加増スルニ漸ク以テ
 スル片ハ尚多量ニ至ルベシ但一頓ニ多量ヲ
 用ウベカラズ○外用ハ葉ヲ以テ芭布藥囊乾
 膏灌腸劑等トナシ用ウ○越幾斯ハ是非沃斯

尋常ノ製劑ニメ其他尚菲沃斯子油菲沃私油
 ノ二劑アリ

○菲沃斯子搾油エキレウム、ヒオ、シス、シ、ア、ミ、
 是非沃斯子ヲ搾メ得ル者ナリ毫毛麻醉ノ性
 ナシ或云微シク麻醉ノ効アリ効能脂油質藥
 粘滑藥緩和藥ニ同シ
 ○菲沃斯油クオレウム、ヒヨ、シ、ア、ミ、コ 新鮮ノ
 菲沃私葉ヲ上好阿列襪油ニ浸シ微火ヲ以テ
 浸出セシマル者ナリ○静息鎮瘧止痛ノ効アリ
 リ内外共ニ用ウベシ

○菲沃私昆設爾弗 毘斯骨布曰久大凡菲沃私
 天亞密莨菪矢鳩荅等ヲ貯藏シ透竈麻醉ノ性
 ヲ脱失スルヲナカラシムルハ昆設爾弗ニ
 如クハナシ又藥用ニ供スルモ之ヲ以テ尤便
 ナリトス○昆設爾弗ヲ製スルニハ生鮮ノ莖
 葉或ハ根一分精製糖五分ヲ用ウ

家篤兒藥性論卷七終

家篤兒藥性論卷八

和蘭

小倉

漢臣家篤兒補著

母湯武普勒歇枝補

洞海林彊健卿譯補

麻酔劑

ナルコチカ羅
フルドヘン
ミッデレン
蘭

莨菪

アドロシハベラト
ナドナ
ドナ
レベッセン
蘭

莨菪ハ麻酔藥中ノ一大毒草ナリ丘山林下ニ
 生ス○葉ト根トヲ以テ藥用ニ供ス葉形卵圓
 或ハ鉞ノ如ク楮色ニメ背面毛茸アリ根

長大ニメ硬ク筋條ヲナシ。且結節アリテ黯黃色ナリ。葉根共ニ臭氣不佳ニメ昏冒スヘク。味辛嘔スベシ。且根ハ微ク瀝ナリ。○之ヲ多量ニ頓服スレバ、泣地ニ昏冒シ、血液頭腦ニ輻湊シ、咽喉乾燥腫痛シ、大渴引飲、乾嘔、瞳子散大、瞤カス、頰腫脹メ黯赤色ヲナス。○其發スルヤ全軀先寒戰シ、尋テ忽劇甚ノ頭痛、謔言妄語、内部大熱堪フヘカラサル等ノ症ヲ發シ、而メ後全身頑麻不遂、搐掣ヲ發シ、下肢厥冷シ、脉細疾ニメ攣縮シ、竟ニ斃ル、ニ至ル。○碩學訶爾的楞

名曰予之ヲ用非テ屢身体上部殊ニ胸部羸瘦スルヲ見ル。然レ後服ヲ休レハ輒必又回復ス。○此毒ニ中テ死スル所ハ屍ハ速ニ腐敗メ、鼻耳口ノ諸孔ヨリ稀薄ノ敗血流出シ、肌膚速ニ剥脫シ、腸胃多ク焮衝シテ、寒壞疽状ノ斑ヲ現シ、惡臭近ツクヘカラス。○此毒ヲ消スル法ハ峻速ノ吐藥多量ノ植物酸若クハ乳汁若クハ哥喜若クハ下劑灌腸法、脚湯等是ナリ、血液頭腦ニ灌注スルハ甚タシキ者ハ、大ニ瀉血ヲ施スヘシ。但導泄法ヲ行フハ二十分ナル片ハ。

少量ノ阿芙蓉及ヒ羯布羅ヲ頻用スベシ○往昔已ニ之ヲ恐水病ノ預防藥ト稱セリ。即密母古名ハ常ニ之ヲ用テ良効ヲ得タリト云。然ルニ斯ス篤ト兒ル窟ク名人ハ毎用必シモ効ヲ奏スル者ニアラズト云。穢ヘ歇ト蘭ト度ト之ヲ恐水病ニ用ウルノ方アリ。其法患者臨卧ニ先ッ一ハヲ服シ。而后患者ノ年紀ニ從ヒ。毎日四分ハノ一ヨリ一ハ至テヲ以テ初服トシ。十四日ノ間漸ク増加シ。第十五日ニ至テ。乃チ前法ニ反メ。漸ク其量ヲ減スヘシ。然レ其間少ク眩暈耳聾ノ徵アルヲ見ハ

速ニ後服ヲ停ムベシ。但此方ヲ行フ間ハ。創口治法モ亦怠ルヘカラス○慢性ノ癩麻質私病若クハ神識ノ諸病。諭ヘバ鬱憂病癲狂病子宮病。依剥イ昆コ侄デ兒ル等ニ良効アリ。殊ニ此諸病其因皮膚病ノ内陷。或ハ居恒漏泄スヘキ血ノ閉塞。或ハ腹内諸臟ノ壅閉ニ在ル者ニ奇効アリ。然レ此衝ノ景况高處ノ充血及ヒ血液ノ輻湊腹部ノ神經感觸銳敏等ヲ兼ル者ニハ。共ニ害アリ○癲急搖掣ノ諸病。即癲急性ノ喘息及ヒ咳嗽。殊ニ百日咳ノ癲癲時期第ニ時ニ稱用シ。咳

嗽ノ勢劇シキ者或ハ藥食共ニ受ル_レ能ハス。
嚥下スル毎ニ即吐出スル者ニ末トシ糖ヲ和
シ用井テ神效アリ。且此藥ハ小兒ニ用井易キ
ヲ以テ尤妙トス。俱之ヲ用ウルニハ切ニ小心
メ。咽喉乾燥昏憤等ヲ發スル至與_フベカラス。
又肥胖多血ニメ善ク長育スル兒此病ニ嬰レ
バ。太約初頭衄血スルカ。若クハ血頭腦ニ輻迫
スル者ナリ。此_ノ如キ症ニハ用井テ害アリ。凡
百日咳ニハ葉根共ニ用_ウベシト雖氏殊ニ根
末ヲ良トス。初生ノ兒_ニハ先始_メニ朝夕八分

ハヨリ四分ハ至_テ與_ヘ。一歳ヨリ二歳ノ間ニ
四分ハノ一ヨリ半ハ至_テ其他小兒ノ年紀ニ從
ヒテ。一晝夜ニ三ハヨリ尚多量ニ至ルベシ。但
其量ヲ増加スルニハ徐々ニメ且彼此ニ注意
セ_ント_テ要シ。必速ニ増ス_トテ禁ズ。已ニ此ノ
如ク百日咳ニ稱用スト雖予ハ之ヲ用井テ効
アル_ト其說ノ如クナルヲ見ス。却テ白頭翁越
幾斯ニ硫酸規尼_ニ捏_テ加_ヘ用井テ効ヲ得ル_ト
多シ。又罕ニ華澄茄ヲ用井テ奇驗ヲ見ル_トア
リ。○療癰腫ヲ分解スルノ一良藥タリ。故ニ其

腫頑固ニシテ、殆ト癌腫性木節腫ハ如キニ至ルモ亦殊効アリ。然正真ノ癌腫性木節腫及ヒ癌腫ニ於テハ、諸説紛然トメ一ナラズ。或ハ効アリトシ、或ハ害アリト云○臧歌蘭度ハ之ヲ腺腫ニ用ウルトキ、其毒ヲ制センガ為ニ、葡萄酒醋若クハ屋施蔑兒オキシノルヲ加フト云。又外用ハ腺腫破潰スル者ニノ、偉効ヲ見ル○諸名家多クノ經驗ニ因テ、此物能ク赤斑熱ヲ預防スル妙効アリト云。輒近ニ至テハ此ノ如ク太稱用セサレ氏、此ニ赤斑熱ニ効アル藥劑五方ヲ掲

ク
 ○第一方 莨菪越幾私三々 蒸餾水ニ三マ
 燒酒一マ 右混和シ、患者ノ年紀ニ從
 ヒ、一滴ヨリ二滴至テ、美味ノ液ニ和シ、一時
 或ハ一時半或ハ二時毎ニ與フ
 ○第二方 莨菪根極末 白糖十錢
 右二味研和シ、分テ四十包トナス、三歳ヨリ
 五歳至ノ兒ハ、日ニ一包ヨリ一包半至、六歳
 ヨリ九歳至ハ、二包ヨリ二包半至、十歳ヨリ
 十二歳至ハ、三包ヨリ三包半若クハ四包至

○第三方 莨菪根極末 白糖三錢

右二味研和シ、分テ二十四包トナス

○第四方 莨菪根極末 白糖三錢

右二味研和シ、分テ三十包トナス、一歳ヨリ

四歳至ハ、一晝夜ニ此劑十五包、五歳ヨリ七

歳至ハ、三十包、八歳ヨリハ、第三方ノ劑十二

包ヲ用フ

○第五方 莨菪越幾私ニ 桂枝水一

右二味混和シ、一歳ヨリ二歳至ハ朝夕二滴

宛三歳ノ兒ハ三滴ツ、餘ハ之ニ準メ、其年

紀ニ從ヒ、毎服六滴ヨリ八滴至用ツ

○莨菪越幾私ハ、外用メ能ク鎮痙ノ効ヲ奏ス、

故ニ眼ノ内部ノ疼痛、子宮口ノ攣急、肛門括約

筋ノ攣縮ニ良効アリ

補 越而實チキ 醫事日札ニ曰、胆液質ノ人胆

液過多トナリテ、胃痙嘔吐、便秘、頭痛、神志鬱

憂等ヲ發スルヲ治ス

莨菪新根末一 大黃末五

右二味調勻、每晚頓服ス、○強曰、予此方ヲ日

札中ニ得テ、屢之ヲ試ルニ、其效甚タ峻ナリ、

故ニ此ニ附載ス
蔓陀羅華トモラ、ストラモ
是モ亦有毒藥中ノ一要藥タリ○亞墨利加洲
ノ暄地及ヒ歐羅巴ノ南地ニ野生シ、方今ニ至
リテハ和蘭ニ於テモ亦藥圃ニ培植ス、是ヲ以
テ新子葉共ニ藥用ニ供スルヲ得ルナリ○
葉大ニメ形茄葉ノ如ク、色深緑ニメ昏冒スヘ
キ臭氣アリ、實ハ卵圓大ノ球ニメ綠色ナリ、外
面丁拐アリテ周附シ、内無數ノ子ヲ胎ス○子
ハ形腎ノ如ク、黑色ニメ毛茸アリ、臭氣ナク、嘔

スヘキ麻酔ノ味アリ○戒歇蘭度ハ之ヲ峻麻
ノ一藥トス、是乃其服後發スル所ノ惡症ヲ見
テ、以テ證トスルニ足レリ○蔓陀羅華ヲ服ス
レバ、直ニ沈鬱苦悶シ、外來ノ諸物一切感覺ス
ルトナク、四支頑麻大渴、口中乾燥、眼前光芒ヲ
見、瞳子散大、腹肚膨脹等ノ諸惡症ヲ發ス、若シ
其用井シ量大ナル時ハ、則チ搐搦、狂乱、麻痺不
遂、肛門若クハ子宮疼痛、脫血暴吐、大昏睡ヲ發
メ終ニ斃ル○消毒藥ハ峻カノ吐劑、醋、油、乳等
是ナリ○蔓陀羅華ハ其効殆ト、莨菪ノ如シ、故

二慢性ノ神經病。神識病。乃鬱憂癲狂。峻重ノ搐
 掣及ヒ痙攣癩癇。呼吸器ノ攣急病。痙攣性ノ喘
 息。痙攣性ノ咳嗽。百日咳等ニ良ナリ。又輓近ニ
 至テ慢性ノ癱瘓質私病。其性。神經様ニ劇痛
 ヲ兼ル者ニ殊効アリト云○此葉ニ二倍ノ尋
 常煙艸ヲ配伍シ喫セシメテ。痙攣性ノ喘急ニ
 良驗アリ

○蔓陀羅華越幾斯 エキス タラク 五ム
 散。丸。孟。偃。設。爾。ト。ナシ。十二時中ニ半匁ヨリ一
 匁。漸ク加ヘテ五匁。尚大量ニ至ル。

○蔓陀羅華丁幾 チンキ 五ム
 蔓陀羅華子 極末者 二匁

燒酒 一匁 右三味合シ。浸出スル。一。二
 日○穢歇蘭度殊ニ是ヲ催睡鎮痛ノ良藥トス

○六滴ヨリ二十滴至ヲ服ス○外用ハ面痛ニ

摩擦スル。一日ニ一二回ニメ良効アリ
 天鳩峇 シキダ オヒシナリ スケ

丘墟道傍陰濕ノ地ニ生シ。絶テ水澤ニ生セズ。
 二年ニメ枯ル。一種水天鳩峇○

シグリト云者アリ。水澤ニ生ス。○大葉ハ柄アリ。莖本ヨリ生ス。其形魚鱗ノ如キ不同ノ小葉ヲ排成シテ。重羊齒或ハ再重羊齒ヲナシ。宛モ手指ヲ開クガ如ク。表面ハ深綠色。背面ハ淡綠色ニシテ。紋理アリ。莖ハ稜角ヲナシ。斑點アリテ内空ナリ。氣。猫尿ノ如ク。味ハ甘ニ辣。○外白殆ト矢鳩荅ニ彷彿タル草數種アリ。一々其矢鳩荅ト異ナル所ヲ列舉メ。以テ混淆スルイナカラシム。○毒矢鳩荅チヘシキダヒロサ○ギフト云者アリ。一六之ヲ水矢鳩荅ト名ク。其莖斑點

ナシ。瞑眩園生矢鳩荅ベアエエカセ。セト。トヒム。シケリ。テリ。ング。○井ル。ト云者アリ。葉ノ表面深緑ナレド。背ニ光澤アリ。野矢鳩荅カエロベ。ルペ。ステ。レシ。ボス。ペイ。フコ。ロイ。ドト。云者○ガラ。ドル。トド。ウル。デケ。ルフ。ル蘭。ト云者アリ。其莖斑點ナク亦方稜ナシ。大野矢鳩荅エカ。ロペ。ルム。トシ。ムム。ロイ。ドト。云者アリ。其莖粗大ニメ。葉ニ毛茸アリ。○古人既ニ矢鳩荅ヲ以テ麻醉藥トシテ藥用ニ供ス。若シ之ニ慣レサル者ニ多量ニ用ウレバ。苦悶眩暈嘔吐。呃逆譫妄。搐掣等ヲ發ス。○矢鳩荅ハ麻醉ノ功

ノ外兼テ又刺戟分解ノ峻效アリ。其木節腫痛
 腫等ニ稱譽アルハ。特ニ刺戟分解ノ效ニアリ
 ○沕涅爾東拂里斯蘭ノ醫斯篤兒窟名已ニ之
 ヲ此病ニ効アリト唱フレドモ。輒近ノ諸家ハ
 未。此ノ如キ鼻病ニ。妙効アルヲ實見セズト云。
 予屢試驗スルニ。破潰セル癌腫ニ。此生草ヲ
 布トナシ用井テ。唯姑息ノ効アルノミ。○然氏
 療瘰諸病ニ於テハ。諸藥此右ニ出ツル者ナシ。
 故ニ此性ノ諸病。閉塞。結核。潰瘍。皮膚病等ニハ。微
 熱アリト雖之ヲ恐ル。一ナク。内外共ニ用井

テ効アリ。○又胸腹諸臟ノ學急病。乃。百日咳。瘰
 瘰。學性ノ喘急。殊ニ其肺臟ノ結核ヲ兼ル者。胃瘰
 瘰。學急性ノ嘔吐等ニ稱用ス。○水銀瘰瘡。木。羯布
 羅。其他衝動發汗ノ品ニ伍メ。遷延。癩。質。私。及
 ビ痛風。慢性經久ノ癩毒等ニ稱用セリ。○新鮮
 絞汁ハ。十滴ヨリ六十滴至。越幾私ハ。二ハヨリ
 漸ク加ヘテ。二十ハ尚多量ニ至ルヲ服スベシ。
 乾州ハ。性力耗失メ効ナシ。又矢鳩。苔子。丁幾ヲ
 以テ最峻カノ製劑トス。○外用ハ。生草ノ搗爛
 者一弓ヨリ四弓至。琵琶布若クハ蒸漏劑トナシ。

破潰セル腺腫及ヒ癌腫疼痛アル潰瘍等ニ用

補

越而實吉醫事日札ニ曰酒客胃ノ上口

若ハ下口ノ膜頑硬トナリ因テ以テ嘔吐ヲ

發スル者強按ニ漢ニ所ヲ治ス

矢鳩答越幾斯一錢 苦扁桃水半ヲ

右二味調勻シ。每時三十滴ヲ服シ。漸ク多量

ニ至ル○又方 青酸莨菪液ト名ク

莨菪越幾斯二人 老利兒水二錢

右二味調勻シ。每服三十滴ヨリ四十滴至日

ニ三四次予三十年ノ間毎ニ此方ヲ試ニ用

ウルニ唯酒客ニ發スル嘔吐ノミナラズ慢

性嘔吐ノ將ニ胃癌ヲ發セントスル者ニモ

亦効ヲ奏スルト甚タ多シ強按ニ此一予ト

謂瘵囊ノ類ナリ○又方

石鹼藥用者 甘瀕一錢 阿芙蓉刃

右三味調勻シ。三ハヲ一丸トナシ。毎朝二丸

每晚三丸ヲ服シ。流涎スルニ至リテ。後服ヲ

停メ。苦味越幾斯ヲ用井テ之ヲ調理ス。此方

ハ上ノ二方ニ比スルニ。其力最峻ナリ。余毎

ニ此方ヲ用非テ必效ヲ得

番木鱈

ミキス、ホミカ樹ノ子ナリ
一ゲンス、ホミカ樹ノ子ナリ
一カレン

是ステレニキス、ホミカ樹ノ子ナリ

此樹錫倫名國麻刺拔同等ノ砂地ニ産ス、子圓

厚ニメ扁平灰白色、外面ハ銀光ノ縷縮毛アリ

テ被覆ス、中心一面ハ凸ヲナシ、一面ハ凹ヲナ

ス、味苦クメ嘔スヘク、且眩暈ヲ發スヘキ一種

ノ氣アリ○強按ニ大掩生獸猫鼠ノ類之ヲ食ヘハ條忽

ニ斃ル、人ニモ亦少量ト雖氏害アリ、其甚キニ

至リテハ、惡心暴吐、苦悶、語言蹇澁、四肢搖動等

ヲ發シ、終ニ斃ル、ニ至ルコトアリ○番木鱈ハ

其性殊ニ脊髓及ヒ脊髓ノ神經ニ走リテ、其力

ヲ逞シウスルノ功アリ、故ニ佛郎察ノ醫ノ經

驗ニ曰ク、番木鱈ハ局處若クハ全身ノ麻痺、乃

四肢ノ麻痺、膀胱ノ麻痺、且麻痺ニ因テ發スル

小便閉、小便失禁、黑障眼、眼瞼下垂及ヒ中風後

ノ麻痺、鉛毒疝等ニ最要ノ藥物ナリ、患者之ヲ

服スル后、大約小半時許ニメ、其麻痺セル部ニ

觸ルレバ、殆下瓦爾華尼ノ如キ疼痛、攣縮、搖動

ヲ發ス、而メ後漸ク其量ヲ增加シテ、久ク其搖

動ヲ奮起セシメ、竟ニ患部意ノ如ク運轉スル
 ニ至ル者屢之アリト云、然、氏之ヲ用ウルニハ
 努カテ戒心スベシ、諸名家又頑固ノ間歇熱、
 亞細亞霍亂痢病遷延下利經久慢性ノ神經病、
 痙攣病強直、搐搦等ニ稱用ス、○之ヲ用ント欲
 七八、嚴ニ其量ヲ定メ、先、小量ヨリ始メテ、漸ク
 大量ニ至ルヘシ、若シ已ムトヲ得サルノ夏件
 アリテ、中間姑、服ヲ停メバ、再之ヲ用ウルニ臨
 シテ、必、其初メニ准シテ、復少量ヨリ始ムヘシ
 ○番木鱉末ハ、三匁ヨリ十五匁至ヲ服ス、然、氏

研末スルニ太難シ、故ニ多ク水製番木鱉越幾
 斯ヲ用非、二匁ヨリ十匁至、又白耳義局方ニ舉
 ル所ノ亞爾固兒製番木鱉越幾私ハ、其性力太
 峻烈ナリ、故ニ多ク丸劑トシ用非テ、一匁ヨリ
 二匁至、之ヲ用ウルハ、先、十二時中ニ一丸ヨリ
 二丸至ヲ服セシメ、漸ク加ヘテ筋肉搐動スル
 ニ至ルベシ
 ○私的列幾泥捏、番木鱉質中最著シキ効分
 之ヲ私的列幾泥捏ト云、舍密家字盧列室爾
 葛賢托同等番木鱉子及ビ木鱉子
 名ハ、サシク
 子ハ、イグナチ

ヨリ得ル所ノ植物加里ナリ。其形微細ノ芒ヲ結ビテ、粉末ノ如ク。白色ニメ臭ナク。味頗苦シ。○服量太少ナルヲ貴フ。大人ト雖氏十二時中ニ四分ハノ一ヨリ半ハ至ニ過キズ。丸トシテ用ウルヲ最佳トス。其丸一箇ニ私的列幾泥捏ヲ含蓄スル。一十二分ハノ一ヨリ八分ハノ一ニ至ルベシ。○賢埜兒麻質私法ハ單純私的列幾泥捏日ニ四分ハノ一ヨリ半ハノ一ハ至ラテ。創傷ニ撒スベシ。○アフリカチノ法ハ局處ノ麻痺殊ニ外部局處ノ麻痺。手腕麻痺。鉛毒症

ヨリ發スル所ノ麻痺。癩癩質私ヨリ發スル所ノ食味ヲ覺エザル症等ニ殊稱アリ。又是ヲ以テ丁幾ヲ製ス。則其方ヲ左ニ列ス。○私的列幾泥捏丁幾 亞爾箇兒三十六度者一弓 私的列幾泥捏三ハ 右ニ味○六滴ヨリ徐々ニ加ヘテ二十四滴至ヲ取リ。適當ノ液ニ和シ与フ。雙鸞菊アゴニキムハ羅 數種アリ。林氏ノ所謂エクテ。アグニキム。ナペル。此ヲ以テ藥用ニ供ス。此物南歐羅巴ノ山

岡ニ自生ス。方今和蘭ニ在テモ亦藥圃ニ培植
 ス。葉ヲ以テ越幾私ヲ製ス。其葉五叉ニメ。形手
 掌ノ如ク。臭氣ナク。嚙メハ口舌ヲ刺戟シ。舌之
 カ為ニ腫起ス。性辛粹ニメ昏瞶スベシ。○多量
 ニ用ウレバ。其害殆ト他ノ麻醉性ノ植物ノ如
 ク。胃中寒ヲ覺ヘ舌及ヒ食道ヲ刺戟シ。惡心嘔
 吐。腹痛煩悶。下利。大汗多尿。眩暈昏睡及ヒ神經
 諸症ヲ發ス。○植物酸殊ニ醋揮發衝動藥少量
 ノ阿芙蓉等最善ク其毒ヲ解ス。○痛風慢性ノ
 痺麻質私等微モ熱狀ヲ見ザル者。經久ノ癩毒

痺麻質私ヲ兼ル者ニ殊稱アリ。然モ方今之
 ラ用ウルハ。往時ニ比スレハ稀ナリトス。○越
 幾私ハ十二時中ニ二ハヨリ四ハ八ハ十ハ尚
 多量ニ至ルベシ。其毒ハ
 實^デ芟^キ荅^リ利^ス私^ロキ^トリス。五^ルル^グレ^ア羅
 和蘭ノ山岡樹陰ニ生ズル草ナリ。二年ニ枯
 ル。藥用ニ供スルニハ。其二年草ノ花未開カス
 ヲ。葉ノ深綠色ナル者ヲ採収スルヲ良トス。葉
 ノ形楕ニシテ卵圓ヲナシ。末尖リテ皺紋アリ。
 葉ノ邊緣刺缺々毛茸アリ。臭氣ナク。味苦ク。

大刺戟ス。過用スルバ惡心頭痛昏冒ヲ發シ
 萬象皆綠色ノ看ヲナス。脈搏大ニ減シ尿ノ分
 利夥シク冷粘汗出テ終ニ呃逆痛掣等ヲ發ス
 稽留熱間歇熱肌膚乾燥ト太灼熱シ脈疾譫妄
 煩渴舌乾燥失血ノ恐アル症及小便吝瀦ノ者
 實ニ之ヲ與フレハ脈管ハ抗拒カノ太過ヲ減シ
 疾ナル者漸徐トナルヲ見バ直下ニ其量ヲ減
 シ脈搏六十至若クハ七十至ニ至ラバ乃後服
 ヲ止ムハシ
 焮衝性諸病焮衝ノ時期ニ必害アリ然レ消

焮方法ヲ行フコト十分ナルニ由テ焮衝ノ時期
 已ニ消過スレハ血液尚焮熱ヲ帶ヒ脈管尚刺
 衝ノ景況アリテ是カ為ニ其部終ニ新肉ヲ生
 スヘキ列印巴液ヲ滲出スルハ怕レアル者ハ
 水銀ヲ配伍シ用井テ奇効アリ○殊ニ意太里
 亞ニ於テハ昆多羅私低繆洛學強按揚私馬
醫學韻府ニ曰
 昆多羅私低繆洛學利不發明ニ據ル
醫私羅私低繆洛學ナリ其見偏倚ニ據ル
 徒熱病焮衝病等ニ實莖荅利私ヲ稱用
 ス

失血熱性ノ諸失血病血脈管痙攣刺衝ノ状ヲ

醫記藥性論 卷八

帯ル者殊ニ咯血崩漏及ビ妊婦脱血メ流産ニ
陥ラントスル者等ニ之ヲ用井テ可ナリ

利尿利尿ノ劑トシ、赤斑熱後屢生スル熱性水
腫小兒ノ腦焮衝腦水腫等ニ、瀉劑及ヒ清涼劑
ヲ伍用メ効驗アリ、又慢性諸病殊ニ胸水病ニ
偉効アリ、夫胸水病ハ必擧急諸症ヲ兼併ス、此
故ニ此品ヲ此病ニ用ウルハ、利水ヲ主トスル
ニアラズメ、痙攣ヲ鎮定スル事アリ、世人モ亦
利尿ハ本効ニアラズ、列印巴液及ヒ苛烈
療癰諸病療癰腫ヲ分解シ、

液ノ滲出セルヲ分解疏泄シ、呼吸器ノ癰癰病
論ヘハ、癰癰性喘急ヲ治スル等ニ最烈効アリ
○小兒惡液質ノ容貌アリテ、肚腹硬滿スル者
ニ太効アリ、但是モ亦此物直ニ此病ヲ治スル
ニアラスメ、其血液ノ運行ヲ理スルニ由テ効
ヲ奏スルナリ

肺勞肺勞就中花顏勞

強按ニ、鉛糖條下ノ人患
奔馬勞即是ナリ

者其質知覺銳敏ナル者若クハ其病ニ嬰ルノ
前咯血セル者若クハ此病ヲ發スルキ遺因ア
ル者ニ効アリ、又感冒時ナク胸部刺痛ヲ覺ユ

ル者ニ驗アリ。但官能遲怠シ、夥ク腐膿ヲ咯出シ、若クハ衰耗下利ヲ發スル者ハ、共ニ害アリ。心臟及ヒ大脉管ノ器械缺損此症ニ發スル劇甚ノ心悸動ヲ鎮靜スル姑息劑トシテ奇效アリ。

○散若クハ丸トシ、年紀ヲ較計メ、八分以下ヨリ三匁至、服スル一日ニ二回若クハ三回煎浸兩劑ハ、并々ヨリ一錢至ヲ以テ、六匁ヨリ十ニ匁ノ液ヲ取ル。○之ヲ久服セシムルニハ、屢一二ノ揮發衝動芬芳ノ品ヲ加ヘ、努カテ其害

ヲ制スルニシテ、
○實菱荅利私丁幾キチンギ五匁、ナシ十滴ヨリ二十滴至。

○實菱荅利私醋キアセ五匁、ナシ十滴至。製法海葱醋ニ同シ。那私泄シ名此劑

青酸アシシ五匁、ヒドロシニキ五匁、○アシシル五匁、○バルシ五匁、
是酸ハ雪際シ亞ノ舍密家齊結呼シ名始テ洋錠ル

噎露雜古シ益其製ヲ極メ、精品ヲ得テ、其藥性

ノ何者タルヲ子細ニ檢索セリ○青酸一名水
素青酸ヲトウルシトルノ藥用ニ供スル者ハ
澄明無色揮發ノ液ナリ氣烈ニメ苦扁桃ノ如
ク味苦クメ且刺衝ス○此物大毒アリ故ニ純
酸一滴ヲ以テ犬ニ与レバ、暫地ニ斃ル人モ亦
然リ○但之ヲ稀薄ニシテ、謹テ用ウレバ、肺ノ
知覺非常ニ銳敏ナル者胸ノ攣急諸症又咳百
日咳勞咳等ニ効アリ又或ハ肺勞ノ初起ニ驗
アリト云然氏今世ニ至テハ、當初ノ説ノ如ク
驗アルトナシ○白耳義局方ニ據テ製シタル

青酸ノ服量ハ一滴ヲ以テ足レリトス○日光
大氣温氣ニ觸ル、一ヲ忌ム、又羅掘鹽土類、硫
肝酸化鑛金屬鹽等ニ配伍スルヲ禁ズ○青酸
ヲ稀釋スルニハ、大約芳香水ノ冷ナル者ヲ用
ウ○方今又橄欖度ノ説ニ從フテ、精青酸ニ
代用スルニ、老利兒結爾斯水シア名、ラウロト、アラ
ウルヂス、ブラヲ以テス、又青酸加里ヒド、ホト
ウルヂス、ラヲ以テス、又青酸加里ヒド、ホト
ア溶液ヲ以テ、止痛ノ劑トシ外用ス、又青酸亞
鉛リシ、エ、シ、ハ、シ、ト、キ、エ、シ、ト、ハ、ル、キ、ル、ス、フ、コ、イ、シ、ス、
一名青酸銕ヘシ、ル、リ、○エ、ム、ハ、ラ、ル、ウ、ス、ト、フ、エ、イ、ス、

〇ソイヘレハ青酸ヨリ製スル緩性ノ
 製劑ニメ今時開歇熱家ノ脾臟閉塞ヲ兼ル者
 ニ用ウ其方免熱時ニ於テ三ハヨリ五ハ至一
 時毎ニ與フ
 老利兒結爾斯ラウロケ
 林氏ノ所謂「ラウロケ」ニミスラウロケラシ区ノ新葉
 ヲ蒸餾メ得ル者之ヲ老利兒結爾斯水ト云其
 水亞的兒性ノ重油アリ此油中ニ青素ヲ含ム
 是老利兒ノ効分ナリ又苦扁桃仁ノ亞的兒油
 モ青素ヲ含蓄ス故ニ苦扁桃水ヲ以テ老利兒

水ニ代用メ可ナリ〇老利兒水ハ氣味苦扁桃
 ノ如クニメ麻酔ノ峻性アリ故ニ誤用スレバ
 劇甚ノ胃痛嘔吐搐掣麻痺等ヲ發シ或ハ人ヲ
 斃スニ至ル然レ十滴若クハ二十滴ノ少量ヨ
 リ漸ク加ヘテ六十滴或ハ八十滴ニ至ル片ハ
 次ニ列スル所ノ諸病ニ用井テ烈効アリ
第一 肚腹閉塞就中門脈閉塞及ヒ其ヨリ続發
 スル所ノ諸病ノ痙攣症ヲ兼併スル者ニ殊効
 アリ〇黒胆液ノ閉塞ニ由テ發スル所ノ依剥
 昆堙兒子宮病鬱憂病等ニ驗アリ〇蓋其人ノ氣

大鷲記 卷八

卷八

象毎ニ沈重ニシテ顔色紫黒腹軟ニシテ膨脹シ且
毎ニ重キヲ覺ヘ大便屢溇泄シテ其色異狀脉
モ亦整齊ナラザルヲ以テ門脉閉塞ノ患者タ
ルヲ知ル

第二瘰癧病腸間膜壅塞等ニ効アリ殊ニ小兒
腹肚緊脹シ多ク食メ却テ羸瘦シ稀涼惡臭ノ
大便ヲ多泄スル者ニ良効アリ。戒歇蘭度ハ這
般ノ症ニ鹽酸重土ヲ伍用セリ○其他瘰癧性
ノ硬結腫頸瘰癧肺ノ結核木節腫癌腫等ニ用
井テ驗アリ

第三呼吸器ノ瘰癧諸病諭ヘハ百日咳瘰癧咳
等ニ偉驗アリ

第四點眼水トノ瘰癧性眼焮腫ニ用井洗劑ト
メ經久ノ剥脫顔ノ小疹ヲ洗ス又方今意太里
亞國ニ於テ神經性眼窩痛神經性膀胱痛等ニ外
用メ鎮痛ノ峻効アルヲ稱ス即チ一片ノ毛布ヲ
之ニ蘸シ痛處ニ外敷ス

煙草ニコチアナタバキム羅
往昔ハ亞墨利加ニ産シ而今ハ北亞墨利加拂
郎察和蘭等ニモ培植シ葉ヲ藥用トス○煙草

ハ麻酔刺衝ノ性猛烈ナルヲ以テ之ニ習慣ザ
ル者ハ慎ンテ其瞑眩ヲ避クベシ。毎ニ其烟ヲ
喫シ或ハ鼻嗅シ或ハ咀嚼シテ已ニ之ヲ熟セ
ル人タモ尚時トシテハ瞑眩スルヲアリ○溺
死ニ灌腸劑トメ太効アリ但シ烟草ハ其性麻酔
ナルカ故ニ多量ニ用ウルハ佳ナリトセス又
灌腸劑トシ用井テ劇勢ノ變急痙攣性ノ箱
頓腸墜ニ良効アリ然レ焮衝脱疽等ノ畏アル
者ハ切ニ警戒ヲ加フヘシ○喫烟方ヲ以テ止
腐ノ効アリトス假令止腐ノ効アラザルモ時

黙兒勃爾屈名ハ傳染病ヲ預防スルノ効アリ
ト云大病院ノ醫多クノ傳染病者ヲ診スル時
ニ方リテ烟ヲ喫スルハ成シ難キ事ニアラズ
宜ク之ヲ用ウベシ予嘗テ軍卒病院ニアリテ
實驗スルニ絶テ弟扶斯ノ傳染ヲ防ク效ナシ
ト雖レ患者ノ近傍腐敗氣アル處ニ於テ烟ヲ
喫スレバ多ク津唾ノ唾出ヲ催スヲ以テ用井
テ益アリ○散トシ頭ノ聖京キン偃グ黒障眼等ニ嘔
藥トナシ用ウ○方今ハ烟草ヲ以テ吐下利尿
ノ劑トナシ用ウルヲ稀ナリ○散浸煎ノ諸劑

トナシ。又其烟ヲ吹喫ス。浸煎ノ兩劑ハ一錢ヨ
リ二錢至ヲ以テ煎メ十二寸ノ液ヲトル

麥奴ハセカド、ルニシテハ蘭

一名「ゲホーレン」テ、ロフハ又「ハ」子スホーレ
ト稱ス。是時氣冷濕ノ年。穀類殊ニ裸麥ニ生
スル病穂ナリ。其粒長サ大約六分強云佛蘭西
ハ無分七厘一毛六七列能ヨリ八分ニ至リ。幅二分
ヨリ三分ニ至ル。微ク曲リテ圓ク。若クハ尖リ
若クハ直ク。一片凸ニ一片凹ナリ。外面ハ青黒
色。或ハ紫黒色。内面ハ蒼白色。組質ハ軟柔ニメ

氣味微ク辛ク。惡心ヲ發スヘシ。然レ乾枯スレ
バ多ク其毒性ヲ脱失ス。○人畜共ニ之ヲ食ヘ
ハ大害アリ。故ニ大量ニ用ウレバ。寒戰。惡心。嘔
吐。泄瀉。胃痛。胃瘳。善飢。嗜眠。顔色黯赤。腫脹。煩躁。
万般ノ痙攣。麻痺。羸瘦。局處ノ乾燥。若クハ壞疽。
乃至惡性ノ諸病殊ニ痒狂。傳染性ノ寒脫疽病
等ヲ發ス。○故ニ慮リナク之ヲ用井。或ハ持久
シ用ル片ハ。危險ノ諸症ヲ將出シ來ル。然レ其
量ヲ少ニシ。注意メ用ウル片ハ。又一良藥トナ
ルナリ。○麥奴ハ往昔和蘭國獨乙同波羅泥亞

同等ノ一隅ニ於テ。産婆賣藥兒ノ輩。家常藥ト
 ナシテ。以テ産婦ノ陳痛ヲ提起スルニ良効ア
 ルヲ稱セシヨリ。俗家其害ヲ知ルヲナク。亂投
 胡處メ人ヲ誤ルヲ算ナク。終ニ亦醫輩ヲシテ
 此良藥ヲ用ウルヲ禁スルニ至ラシム。○一
 二年前ニ至リテ。北米利幹州ノ扱約基地ノ私
 的亞倫斯名勃斯名遜名地ノ昆厄魯名烏名ノ内家始
 メテ再麥奴ヲ用ウ。爾後拂郎西諸厄利亞獨乙
 國以上ノ醫及ヒ和蘭ノ都府洛各侄兒名曹名ノ醫亞那
 爾質兒名等相繼テ産科ニ供用セリ。是ニ於テ

其理未明。數ナラスト雖也。善ク陳痛ヲ提起シ。
 子宮ヲ攣縮シ。胎兒ノ産出ヲ催起スルノ一異
 良性アルヲ發明セリ。然レ發明ノ後。未多時ナ
 ラサレハ。後賢相承テ切試明驗メ。以テ其性ト
 カ能トヲ併セテ講究明辨セン。ヲ庶幾スル
 ノミ。○其効大槩次條ノ如シ
 第一産ハ順ナリト雖也。全身若クハ子宮ノ衰
 弱ニ因テ。陳痛微弱怠慢ナル者ニ効アリ。○夫
 臨産ニ麥奴ヲ用ウルハ。子宮口開哆メ。已ニ達
 爾德兒強按二麻爾丁字書二達爾德兒ハ和蘭
 幣貨ノ名其質ハ銀造直三十斯多乙弗

本草記藥性論

卷八

爾科書云其大小記セズ予嘗テ一
 示當三牛爾讀ム其書中宮口ノ開
 當三牛爾向ヲ用ウ然ハ則建爾
 ノ幣貨其大分五厘許尺ノ大ニ至
 シ之ヨリ早ク用ウルハ産婦ヲ徒ニ
 フ費耗セシムルヲ以テ子宮斂縮
 得ス長ク胎兒ノ娩出ヲ防碍ス終
 裂ヲ起ス至ルナリ是臨産ノ諸症
 奴ヲ用ウル大喫緊ノ用心タリ
第二分娩怠慢ノ者及ヒ其怠慢ニ由リテ陳痛
 續々發來スルヲ得ザル者ニ用以此症ハ筋

骨強實ニメ且粘液質ノ婦或ハ過房ノ婦ニ多
 ク之アルモノナリ
第三死胎甚久ク子宮ニアル者ハ勉テ諸徵ヲ
 考定シ胎兒死メ後時ヲ經ルハ已ニ久シキノ
 徵ヲ得バ乃麥奴ヲ用井テ子宮ノ攣縮カヲ提
 起シ其分娩ヲ催發メ母体ノ危險ヲ拯フベシ
第四胞衣宮底ヲ離ルハ一太早キニ因テ分娩
 ノ間失血止マザル者ニ用ウ是胞衣未宮口ニ
 落ザル者ニ之ヲ用ウレバ子宮斂縮シテ胞衣
 ヲ壓スルヲ以テ出血即チ已ムカ故ナリ

天壽堂
 婦科
 論

卷八

第五產後ノ失血其因子宮機能ヲ失スルカ或
ハ胞衣子宮ノ歛縮ヲ妨クルニ在ル者ニハ胞
衣ノ全落半落ニ論ナク之ヲ用ウレバ子宮ノ
歛縮力ヲ再發シ胞衣ヲメ全ク脫離娩出シ子
宮ヲメ十分縮収セシメ以テ危險ノ症ヲ續發
スルヲ防クナリ

第六善ク胞衣ヲ下ス○夫胞衣ハ自ラ能ク脫
下シテ醫ノ手ヲ借ルニ及ハザル者多シ然レ
産科書ニ言ヘルカ如ク間亦醫術ニアラスン
バ下ルヲ得ザル症アリ此ノ如キハ之ヲ用

井テ其効ヲ試ムベシ

第七臨産ノ始メ擧急劇甚ニメ産科手術ヲ施
スヘキ症ヲ發スル者ニ効アリ但醫手術ヲ用
井テ子宮口ヲ開キ胞膜ヲ破裂スルニ及ンテ
胎児ヲメ生下セシメンカ為ニ之ヲ用ウルナ

○麥奴害アルノ症第一子宮未開カサル者第
二多血質ノ者子宮ニ血液輻湊スル症但此症
ニ先適度ノ瀉血ヲ施シテ后之ヲ用ウベシ第
三胞衣子宮ノ別囊ニ包在スル者第四纖維狀

膜胞衣ト子宮ト相結着スル者**第五**神經
 症癰癰症搐掣癰病胃癰癰急性嘔吐**第六**子
 宮ノ痿麻質私子宮ノ癰急**第七**水漿太微子
 者**第八**子宮焮衝**第九**子宮脫子宮翻轉子宮倚
 斜**第十**孟骨狹窄殊ニ横骨狹窄ナル者**第十一**
 嬌脆ニメ知覺過敏ナル人**第十二**身体大ニ弛
 緩セル者若クハ惡液質ノ者**第十三**畸胎殊ニ
 頭水ノ兒等是ナリ者ニ
 又輓逆ニ至テ經閉者クハ崩漏其因子宮ノ
 弛緩ニアル者蒼白病其因月經不來ニアル者

咯血白帶下尿血衄血等ニ殊稱セリ○散劑六
 斗ヨリ三十斗至頻服セシム浸劑ハ二錢ヲ以
 テ浸出シ漉メ四斗ノ液ヲ取り小半時毎ニ一
 食匙ヲ用ウ煎劑ハ一錢ヨリ二錢至煎ノ三斗
 ヨリ四斗ノ液ヲ取り小半時若クハ八分時毎
 ニ一食匙ヲ服サシム
補 強按ニ麥奴害アル症ノ第三章ニ所謂
 子宮ノ別囊トイヘル者ハ未其何ヲ以テ別
 囊ト為ストテ詳ニスルヲ能ハズ由テ穆私
 篤醫學韻府ヲ閱スルニ癰急或ハ陣痛齊整

ナラザルニ由テ。胞衣子宮内ニ箱頓セラレ。娩下スルヲ得サル症アリ。其症分娩後腹部ヲ按スルニ。子宮堅クメ宛。娩隨自然ニ下出セントスル状ノ如クナレバ。産婦ハ反テ腰間ニ痛ヲ覺ルノミニ。數時ヲ費セトモ下出セス。子宮異状ニ攣縮メ兩室ヲナス。故ニ醫手ヲ宮内ニ入ルレバ。直ニ胞衣アルヲ觸知スルト雖。尚深ク之ヲ探レバ。復一小口アリテ。恰第二子宮口ト名クベキ者ノ如シ。是異状攣縮ノ致ス所ニ。胞衣半。此狭口

ニ掛リ。緊急壓迫セラレテ。出ルヲ得サルナリ。○療法ハ。鎮痙藥ヲ内用シ。小腹ヲ撫摩シテ。其景況ヲ伺フ。一二時ヲ經テ尚效ナクシバ。手ニ阿芙蓉膏ヲ塗リテ。宮内ニ入レ。胞衣ノ前部ニ沿クテ上行シ。手指ヲ狭口ニ挿入シテ。其口ヲ開擴シ。緩々輕々ニ振引スレバ。胞衣容易ニ下ルト云。此說ニ由テ之ヲ考フレハ。則第三章ノ子宮ノ別囊ト云者。恐クハ此症ナラン

補

穆私篤醫學韻府附錄ニ曰。產婦痙病クエ

一、病源候論ニ曰、妊婦瘧候、体虚受風、停滯經絡、發則口禁、皆強名之、為瘧、妊而發者、悶胃不識人、須臾醒、々復發、亦是風傷大陽之、醫經作瘧也、亦名于癩、ト云者、即是ナリ、ハ、醫術效ヲ得難キ至危ノ病ナリ、其症全ク癩癩ノ如ク、血液頭部ニ輻湊シ、大煩躁、顔筋惕動、四肢瘧攣、搐搦呼號、人事不省等ヲ發ス、○此症發スレバ、其稽留ニ分時ヨリ十分時ニ亘リ、時ニ醒覺スルイアルモ、暫時ノ間ニ五六發ニ及ヒ、全ク人事不省トナリ、終ニ昏睡ニ陥リテ、母子共ニ救活スヘカラザルニ至ル

ナリ

識別

瘧病ハ韋愚蘭土名之ヲ産婦ノ重症

搐搦ト名ク、其重症ト輕症ノ別左ノ如シ、**其**

一、重症ハ、妊娠ノ末期、陳痛未微モ發セザル

前ニ發ス、○輕症ハ、産中或ハ産後直ニ發ス

○**其二**重症ハ、發作ノ初頭早ク既ニ鬱冒ノ

全ク人事ヲ省セズ、其醒回ノ時モ、精神爽然

トメ、蘊醒セス、○輕症ハ、鬱冒此ノ如ク甚シ

カラズ、且發作ノ初、婦ノ頭偏倚セズ、○**其三**

重症ハ、顔筋甚ク、睨動シ、両眼開ヒテ閉チズ、

眼球突出シ、面色赤青ニメ腫脹シ、唇舌モ亦青赤色宛モ縊死ノ状ノ如シ、此症ハ搐搦ニアラズメ瘧瘵ナリ強按ニ本文○輕症ハ其顔蒼白ニメ眼常ニ閉テ、眼球旋轉シ時ニ又少ク上竄ス強按ニ本文○其四重症ノ發作ハ必ス毎ニ陳痛ノ終リニ發シ、輕症ハ必ス毎ニ陳痛ノ初頭ニ發ス○重症ハ子宮屢強直メ難産ニ至レトモ、輕症ハ分娩ヲ障碍セズ○須斯的耳名ノ説ニ據レバ、重症ハ真ノ瘧瘵病ニメ殊ニ連感大神經苦惱ヲ受ルノ致ス所

ナリ、輕症ハ全ク臨産初頭ノ機能ニ關ル者ニメ、唯神經卒然ノ傳感ヨリ發スル者ナリ

處置 予施療ノ間、多ノ瘧瘵ヲ見ルニ、此症ハ殊ニ瘧瘵質ノ婦ノ初産及ビ嘗テ胃瘧癩癩等ヲ患ヘシ者ニ多シ○予ハ尺澤ノ放血ヲ以テ第一藥トシ、次ニ麝香葛私多縷謨鎮吐散ヲ與ヘ、頭部ニ水漬法ヲ行フ、此法ヲ行フト雖氏嶮惡ノ諸症退カズ、陣痛ノ後毎ニ發作スル者ハ、斷然トメ千斤術、翻轉術ヲ施シ分娩セシムベシ、子宮ヲメ空虚ナラシム

ルハ、痙攣ヲ攔住壓止スルノ一方ナレバナ
リ、沃耳屈名葛縷私名モ亦此説ニ左袒セリ
此術ヲ以テ分娩セシムル時ハ、十中八九ハ
母命ヲ活スベシ、然氏兎命ヲ救フハ甚タ難
シ○手術ヲ以テ分娩セシムル下、此ノ如ク
利アリト雖氏、必先刺絡ヲ施シ、而ノ後此術
ヲ行フヘシ、子宮同時ニ強直スル者ハ殊ニ
然リ、且臨産ノ第三際ニ至ラハ、大凡此術ヲ
行フヘシ○須私的耳名ノ説ニ、臨産ノ第三
際ハ、未術ヲ施ス期ニアラスト云ヘルハ惑

ヘルナリ、予之ヲ親驗スルニ、其的確ノ法ハ、
速ニ子宮ヲメ空虚ナラシムルノ右ニ出ル
者ナシ、若夫宮内ニ物アリテ實スル時ハ、彼
カ称セシ所ノ醋酸莫爾比捏ノ賢捏爾麻質
斯法モ、必ス效ナカルベシ、須私的耳名ノ説
錢ヲ以テ心下ノ皮ニ印○若夫須私的耳名
ノ説ノ如ク、術ヲ以テ分娩セシメザレバ、實
ニ母子共ニ鬼録ニ上ルベシ○輕症ハ小量
ノ托布爾私散、怒布滿液、鹿璠液、勃魯私局方
ノ鎮吐散、詳末ヲ良トス、就中鎮吐散ハ、清凉鎮

瘰ノ良藥ナリ

羅實侃カリス、トキシフコゲンドロンシバクスラヂ

是北亞墨利加ニ産シ、又和蘭ノ藥圃ニ植スル

灌木ノ葉ナリ、性竄透辛辣、肌膚ニ貼メ能ク瘡

疹ヲ發ス、又麻醉ノ性アリ○往時麻痺病ニ殊

稱アリト雖今時用ウルイナシ

○羅實侃私幾キシシコテラドロイスト

輓近此劑療瘰質ノ眼焮腫ニ、面部ノ瘡疹ヲ兼

發スル者ニ用井テ妙効アリト稱ス、生乾ノ新

葉ヲ以テ製シタル丁幾十滴ヲ以テ、淨水ニ可

ニ溶和ス、大人ハ日ニ一哥喜匙、小兒ハ丁幾四
滴ヨリ五滴至

家篤兒藥性論卷八終



