

Körper- und Galoistheorie

Vorlesung 11

Zerfällungskörper

Wir wollen zu einem Polynom $F \in K[X]$ einen Körper konstruieren, über dem F in Linearfaktoren zerfällt. Dies beruht auf einer recht einfachen Konstruktion. Zu jedem Körper kann man sogar einen Körper $K \subseteq \bar{K}$ konstruieren, der algebraisch abgeschlossen ist, was wir aber nicht ausführen werden. Eine erste Anwendung ist die Konstruktion und die Charakterisierung von endlichen Körpern.

LEMMA 11.1. *Sei K ein Körper und F ein Polynom aus $K[X]$. Dann gibt es einen Erweiterungskörper $K \subseteq L$ derart, dass F über L in Linearfaktoren zerfällt.*

Beweis. Sei $F = P_1 \cdots P_r$ die Zerlegung in Primpolynome in $K[X]$, und sei P_1 nicht linear. Dann ist

$$K \longrightarrow K[Y]/(P_1(Y)) =: K'$$

eine Körpererweiterung von K nach Satz 7.6. Wegen $P_1(Y) = 0$ in K' ist die Restklasse y von Y in K' eine Nullstelle von P_1 . Daher gilt in $K'[X]$ die Faktorisierung $P_1 = (X - y)\tilde{P}$, wobei \tilde{P} einen kleineren Grad als P_1 hat. Das Polynom F hat also über K' mindestens einen Linearfaktor mehr als über K . Induktive Anwendung von dieser Konstruktion liefert eine Kette von Erweiterungen $K \subset K' \subset K'' \subset \dots$, die stationär wird, sobald F in Linearfaktoren zerfällt. \square

Wenn F quadratisch ist, so ist man nach einer einzigen Körpererweiterung fertig, da aus der Existenz einer Nullstelle direkt folgt, dass das Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Aber schon ab Grad 3 ist es eher eine Ausnahme, dass über $K[X]/(F)$ das Polynom bereits in Linearfaktoren zerfällt, und dann muss man wie im Lemma beschrieben induktiv weitermachen.

BEISPIEL 11.2. Das Polynom $X^3 - 3X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ ist irreduzibel nach Aufgabe 3.16 und definiert daher eine Körpererweiterung

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}[X]/(X^3 - 3X + 1) =: L$$

vom Grad 3. Die Restklasse von X in L sei mit α bezeichnet. Es gilt also

$$\alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0.$$

Nach Aufgabe 11.7 sind auch die Elemente aus L

$$\beta = \alpha^2 - 2$$

und

$$\gamma = -\alpha^2 - \alpha + 2$$

Nullstellen der definierenden Gleichung und daher zerfällt das Polynom bereits über L . Der Zerfällungskörper des Polynoms $X^3 - 3X + 1$ ist also L .

DEFINITION 11.3. Es sei K ein Körper, $F \in K[X]$ ein Polynom und $K \subseteq L$ eine Körpererweiterung, über der F in Linearfaktoren zerfällt. Es seien $a_1, \dots, a_n \in L$ die Nullstellen von F . Dann nennt man

$$K[a_1, \dots, a_n] \subseteq L$$

einen *Zerfällungskörper* von F .¹

Es handelt sich hierbei wirklich um einen Körper, wie wir gleich sehen werden. Häufig beschränkt man sich auf Polynome vom Grad ≥ 1 , bei konstanten Polynomen sehen wir einfach K selbst als Zerfällungskörper an. Über dem Zerfällungskörper zerfällt das gegebene Polynom in Linearfaktoren, da er ja nach Definition alle Nullstellen enthält, mit denen alle beteiligten Linearfaktoren formuliert werden können.

LEMMA 11.4. *Es sei K ein Körper, $F \in K[X]$ ein Polynom und $L = Z(F)$ der Zerfällungskörper von F . Es sei $K \subseteq K' \subseteq L$ ein Zwischenkörper. Dann ist L auch ein Zerfällungskörper des Polynoms $F \in K'[X]$.*

Beweis. Das ist trivial. □

LEMMA 11.5. *Es sei K ein Körper, $F \in K[X]$ ein Polynom und $L = Z(F)$ der Zerfällungskörper von F . Dann ist $K \subseteq L$ eine endliche Körpererweiterung.*

Beweis. Es sei $K \subseteq M$ eine Körpererweiterung, über der F in Linearformen zerfällt und $L = K[a_1, \dots, a_n] \subseteq M$, wobei $a_i \in M$ die Nullstellen von F seien. Es liegt eine Kette von K -Algebren

$$K \subseteq K[a_1] \subseteq K[a_1, a_2] \subseteq \dots \subseteq K[a_1, \dots, a_n] = L \subseteq M$$

vor. Dabei ist sukzessive a_i algebraisch über $K[a_1, \dots, a_{i-1}]$, da ja a_i eine Nullstelle von $F \in K[X]$ ist. Daher sind die Inklusionen nach Satz 10.1 endliche Körpererweiterungen und nach Satz 2.8 ist dann die Gesamtkörpererweiterung ebenfalls endlich. □

SATZ 11.6. *Es sei K ein Körper und sei $F \in K[X]$ ein Polynom. Es seien $K \subseteq L_1$ und $K \subseteq L_2$ zwei Zerfällungskörper von F . Dann gibt es einen K -Algebraisomorphismus*

$$\varphi: L_1 \longrightarrow L_2.$$

¹Der Sprachgebrauch ist nicht ganz einheitlich. Manche Autoren nennen jeden Körper, über dem das gegebene Polynom in Linearfaktoren zerfällt, einen Zerfällungskörper, und bezeichnen den von den Nullstellen erzeugten Zerfällungskörper als minimalen Zerfällungskörper.

Insbesondere gibt es bis auf Isomorphie nur einen Zerfällungskörper zu einem Polynom.

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch Induktion über den Grad $\text{grad}_K L_1$. Wenn der Grad eins ist, so ist $K = L_1$ und das Polynom F zerfällt bereits über K in Linearfaktoren. Dann gehören alle Nullstellen von F in einem beliebigen Erweiterungskörper $K \subseteq M$ zu K selbst. Also ist auch $L_2 = K$. Es sei nun $\text{grad}_K L_1 \geq 2$ und die Aussage sei für kleinere Grade bewiesen. Dann zerfällt F über K nicht in Linearfaktoren. Daher gibt es einen irreduziblen Faktor P von F mit $\text{grad}(P) \geq 2$ und $K' = K[X]/(P)$ ist nach Satz 7.6 und nach Proposition 7.9 eine Körpererweiterung von K vom Grad ≥ 2 . Da P als Faktor von F ebenfalls über L_1 und über L_2 in Linearfaktoren zerfällt, gibt es K -Algebrahomomorphismen $K' \rightarrow L_1$ und $K' \rightarrow L_2$. Diese sind injektiv, so dass K' sowohl von L_1 als auch von L_2 ein Unterkörper ist. Nach Lemma 11.3 sind dann L_1 und L_2 Zerfällungskörper von $F \in K'[X]$. Nach Satz 2.8 ist

$$\text{grad}_{K'} L_1 < \text{grad}_K L_1,$$

so dass wir auf K', L_1, L_2 die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Es gibt also einen K' -Algebraisomorphismus

$$\varphi: L_1 \longrightarrow L_2.$$

Dieser ist erst recht ein K -Algebraisomorphismus. □

Konstruktion endlicher Körper

DEFINITION 11.7. Sei R ein kommutativer Ring, der einen Körper der positiven Charakteristik $p > 0$ enthalte. Der *Frobeniushomomorphismus* ist der Ringhomomorphismus

$$R \longrightarrow R, f \longmapsto f^p.$$

Endliche Körper mit der Anzahl p^e konstruiert man, indem man ein in $(\mathbb{Z}/(p))[X]$ irreduzibles Polynom vom Grad n findet. Ob ein gegebenes Polynom irreduzibel ist, lässt sich dabei grundsätzlich in endlich vielen Schritten entscheiden, da es ja zu jedem Grad überhaupt nur endlich viele Polynome gibt, die als Teiler in Frage kommen können. Zur Konstruktion von einigen kleinen endlichen Körpern siehe Aufgabe 9.22 und Aufgabe 11.23. Generell kann man einen Körper mit $q = p^e$ Elementen als Zerfällungskörper des Polynoms $X^q - X$ über $\mathbb{Z}/(p)$ erhalten.



Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917)

LEMMA 11.8. Sei K ein Körper der Charakteristik p , sei $q = p^e$, $e \geq 1$. Es sei

$$M = \{x \in K \mid x^q = x\}.$$

Dann ist M ein Unterkörper von K .

Beweis. Zunächst gilt für jedes Element $x \in \mathbb{Z}/(p) \subseteq K$, dass

$$x^{p^e} = (x^p)^{p^{e-1}} = x^{p^{e-1}} = \dots = x$$

ist, wobei wir wiederholt den kleinen Fermat benutzt haben. Insbesondere ist also $0, 1, -1 \in M$. Es ist $z^q = F^e(z)$ und der Frobeniushomomorphismus

$$F: K \longrightarrow K, x \longmapsto x^p,$$

ist ein Ringhomomorphismus nach Aufgabe 11.10. Daher ist für $x, y \in M$ einerseits

$$(x + y)^q = F^e(x + y) = F^e(x) + F^e(y) = x^q + y^q = x + y$$

und andererseits

$$(xy)^q = x^q y^q = xy.$$

Ferner gilt für $x \in M$, $x \neq 0$, die Gleichheit

$$(x^{-1})^q = (x^q)^{-1} = x^{-1},$$

so dass auch das Inverse zu M gehört und in der Tat ein Körper vorliegt. \square

Im Beweis der nächsten Aussage werden wir die Technik des *formalen Ableitens* verwenden. Ableiten ist eigentlich eine analytische Technik, und bekanntlich ist die Ableitung eines Monoms X^m gleich mX^{m-1} , und die Ableitung eines Polynoms ergibt sich durch lineare Fortsetzung dieser Regel. Da der Exponent der Variablen zum Vorfaktor wird, und da man jede ganze Zahl in jedem Körper eindeutig interpretieren kann, ergeben solche Ableitungen auch rein algebraisch für jeden Grundkörper Sinn. Wir definieren daher.

DEFINITION 11.9. Sei K ein Körper und sei $K[X]$ der Polynomring über K . Zu einem Polynom $F = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in K[X]$ heißt das Polynom

$$F' = na_n X^{n-1} + (n-1)a_{n-1} X^{n-2} + \cdots + 3a_3 X^2 + 2a_2 X + a_1$$

die *formale Ableitung* von F .

Man beachte, dass, insbesondere bei positiver Charakteristik, das algebraische Ableiten einige überraschende Eigenschaften haben kann. In positiver Charakteristik p ist beispielsweise

$$(X^p)' = pX^{p-1} = 0.$$

Für einige grundlegende Eigenschaften des Ableitens siehe die Aufgaben. Wichtig ist für uns, dass man mit der formalen Ableitung testen kann, ob die Nullstellen eines Polynoms einfach oder mehrfach sind (eine Nullstelle a heißt *mehrfach*, wenn das zugehörige lineare Polynom $X - a$ das Polynom mehrfach teilt, d.h. wenn es in der Primfaktorzerlegung mit einem Exponenten ≥ 2 vorkommt).

LEMMA 11.10. Sei K ein Körper der Charakteristik $p > 0$, sei $q = p^e$, $e \geq 1$. Das Polynom $X^q - X$ zerfällt über K in Linearfaktoren. Dann ist

$$M = \{x \in K \mid x^q = x\}$$

ein Unterkörper von K mit q Elementen.

Beweis. Nach Lemma 11.8 ist M ein Unterkörper von K , und nach Korollar 19.9 (Lineare Algebra (Osnabrück 2017-2018)) besitzt er höchstens q Elemente. Es ist also zu zeigen, dass $F = X^q - X$ keine mehrfache Nullstellen hat. Dies folgt aber aus der formalen Ableitung $F' = -1$ und Aufgabe 11.28. \square

SATZ 11.11. Sei p eine Primzahl und $e \in \mathbb{N}_+$. Dann gibt es bis auf Isomorphie genau einen Körper mit $q = p^e$ Elementen.

Beweis. Zur Existenz. Wir wenden Lemma 11.1 auf den Grundkörper $\mathbb{Z}/(p)$ und das Polynom $X^q - X$ an und erhalten einen Körper L der Charakteristik p , über dem $X^q - X$ in Linearfaktoren zerfällt. Nach Lemma 11.10 gibt es dann einen Unterkörper M von L , der aus genau q Elementen besteht.

Zur Eindeutigkeit. Wir zeigen, dass ein Körper mit q Elementen der Zerfällungskörper des Polynoms $X^q - X$ sein muss, so dass er aufgrund dieser

Eigenschaft nach Satz 11.6 eindeutig bestimmt ist. Sei also L ein Körper mit q Elementen, der dann $\mathbb{Z}/(p)$ als Primkörper enthält. Da L^\times genau $q - 1$ Elemente besitzt, gilt nach Korollar 4.17 die Gleichung $x^{q-1} = 1$ für jedes $x \in L^\times$ und damit auch $x^q = x$ für jedes $x \in L$. Dieses Polynom vom Grad q hat also in L genau q verschiedene Nullstellen, so dass es also über L zerfällt. Zugleich ist der von allen Nullstellen erzeugte Unterkörper gleich L , so dass L der Zerfällungskörper ist. \square

NOTATION 11.12. Sei p eine Primzahl und $e \in \mathbb{N}_+$. Der aufgrund von Satz 11.11 bis auf Isomorphie eindeutig bestimmte endliche Körper mit $q = p^e$ Elementen wird mit

$$\mathbb{F}_q$$

bezeichnet.

Für $q = p$ ist $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/(p)$. Dagegen sind für $q = p^e$, $e \geq 2$, die Ringe \mathbb{F}_q und $\mathbb{Z}/(q)$ verschieden, obwohl beide Ringe q Elemente besitzen. Dies liegt einfach daran, dass \mathbb{F}_q ein Körper ist, $\mathbb{Z}/(q)$ aber nicht.

Abbildungsverzeichnis

- Quelle = GeorgFrobenius.jpg , Autor = unbekannt (hochgeladen von Benutzer Furfur auf Commons), Lizenz = CC-by-sa 3.0 4
- Erläuterung: Die in diesem Text verwendeten Bilder stammen aus Commons (also von <http://commons.wikimedia.org>) und haben eine Lizenz, die die Verwendung hier erlaubt. Die Bilder werden mit ihren Dateinamen auf Commons angeführt zusammen mit ihrem Autor bzw. Hochlader und der Lizenz. 7
- Lizenzklärung: Diese Seite wurde von Holger Brenner alias Bocardodarapti auf der deutschsprachigen Wikiversity erstellt und unter die Lizenz CC-by-sa 3.0 gestellt. 7