

新刊  
醫  
學  
集  
成

醫學集成卷之八

後學 義烏 傅滋 續註

牙病六十七

丹溪云 牙疼或出血屬熱胃口熱有風有寒有虫有濕

熱矣

按東垣云齒者腎之標骨之餘上觀練於脾土以陽明之脈貫絡也手陽明悲寒飲而喜熱足

陽明喜寒飲而悲熱也甚則齒動脫作痛不已有惡寒者有惡熱痛者有惡寒惡熱痛者有惡熱飲

火寒飲多痛者有動搖痛者有齒和則痛者有齒齲為疔所蝕血水而痛者有齒齲腫起痛者有脾胃有

風邪但者風而痛者有為虫所蝕其齒缺少而色變為虫牙痛者有痛而臭不可近者蓋齒為關門腎之

榮骨之餘也賢衰則齒豁精固則齒堅大腸虛則齒露大腸壅則齒浮熱風則攻於頭面眼目痺則齒

脫為痔亦有氣鬱而致者學者誠能求其本而察之厥疾弗廖者未之有也

實熱腫痛調胃乘氣加黃連又方升麻白芷防風荆

芥蒲苛桔梗甘草之類或為未綿又方胡桐液射香

擦之。上引牙痛灸足三里下引牙痛灸三間一名

在小大指次指本牙火痛胡椒華撥升麻寒水石薄

奇。走馬牙疳乾姜棗燒存性枯礬為末行

節療云牙床腫痛動搖或黑爛脫落世人皆作賢虛治

此屬陽明經溫熱蓋齒雖屬賢而主於牙床上下床

屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚

味膏梁目滑之物致溫熱上攻則牙床不清而為腫

為痛或出血或生虫故齒不得安而動搖黑爛脫落

也宜瀉明之濕熱則牙床清寧而齒自安固矣

東垣治一婦人齒痛甚口吸涼風則暫止閉口則復作  
乃濕熱也用黃連胡桐淚苦寒消苛荊芥辛涼治濕  
熱為主升麻行陽明為使牙者骨之餘以旱蝮骨灰  
鋪之為佐射香少許入肉為引用細末擦之痛減半  
又以調胃承氣去硝加黃連治其本二三行而止

附

寒印 風邪客腦則腦痛項筋急袒露則痛

虫蝕色變痺痛 用蟾酥又方巴豆烟熏之

牙疼 生草烏尖芒硝等分為末擦之又方蒲葇荊



芥細辛為末擦漱又方蟾酥塗綿上陰乾如米粒許  
寒牙縫。牙齦腫須針刺出血如血汚難刺者烙鐵  
物烙其齒又灸頰車二穴

治胃散

治牙痛

川歸

黃連

二分

生地

三分

升麻

牡丹皮

五分

右剉姜水煎服

卷滑散

麻黃

去根節

卷滑

半錢

防風

半錢

細辛

升麻

芫胡

蒼朮

各五分

白芷

三錢

黃連

骨灰

二錢

桂

為末漱淨擦之

牙疼

土茯苓五分青蘞三錢水二椀煎一椀熱

漱又方烏頭熱艾葉二株川椒十粒濃煎漱出爽效

治玉巖氣

草薺後木鱉子為末搗鼻

風氣走注痛

藁本剪草細辛熱漱

骨槽風

皂角不蛀者去子入杏仁一放在原子上

位燒存性為末入青鹽少許搗之

牙痛

巴豆一粒大蒜一瓣杵爛為丸綿裹一丸塞

鼻中左右半時即去之久則藥汁入耳內二次剋

一方

倒摘刺取刀柄綿蘸塞痛處即止

在馬牙疔一時腐爛即死以婦人泥桶中白垢火煨一

錢銅綠三分射香一分半再研付

風神牙

此藥一校去核入巴豆一粒合起灰煨出

火毒研細以紙捲入孔中十數次効又方天仙子燒  
 灰以竹筒抵牙熏之即死或韭菜子如法熏之皆可  
 取牙 草烏草撥各一兩半 川椒細辛各三兩 右末每少許  
 搽之牙自落

一方 皂角槲上蚘子或白蛆或草烏川椒細辛

**白芷散**

治大寒犯腦牙疼

草豆蔻 麻黃各半 黃芪 升麻各一錢 吳茱萸

白芷各四分 川歸 熟地各五分 藁本三分 桂枝二分

羌活各二分 為末線之

牙痛出血不止 調胃承氣室心服之

腎虛痛

八味丸

浮腫虛壅而痛

三因安腎丸

擦牙方

去風生血黑髮滋腎

川歸

川芎

地黃

青鹽

石膏各

細辛

半兩

為末擦之

牙縫出血者

槐穠嫩葉杵爛付牙關

牙疼

萊豆六粒胡椒七粒韭菜根一錢右同杵

爛用綿裹如巨大咬牙上痛甚者先用燒酒漱後付

○鼻病六十八

丹溪云鼻為肺之竅因心肺上病而不利也有寒有熱



寒邪傷於皮毛無不利而壅塞熱壅清道寒則表之  
熱則於連。面鼻紫黑而為陽中之陽鼻居面中一  
身之血運到面鼻者為至清至精之血多酒之人酒  
氣熏蒸面鼻得酒血為極熱。血得冷污濁凝結不  
行故也治宜化滯血生新血四物加酒炒片芩酒拌  
紅花茯苓陳皮甘草生薑煎調五靈脂未服氣弱加  
菖酒制

酒釀鼻乃血熱入肺 治同前方 或用桐油入黃連以天

吊藤燒油熱付之又方礞黃入羅筒內煨乳香輕粉  
烏頭尖麻調付或鴨嘴膽藥付或以一拖為末蜜蠟

已彈子大空心糖一丸白湯下

或曰酒渣者皆在熱所治抑氣也於鼻內

或出久之通路或因改兩氣血壅滯於鼻內熱氣

伏留不散為鼻齋矣或肺素病風熱氣入鼻內自

經鼻塞肉乃肺氣盛

枯礬末脂綿裹塞鼻數日自

消或瓜蒂末綿裹塞或木通細辛附子蜜丸綿裹細

鼻中或吹風通聖散加三稜山茱萸海藻並酒浸炒

末服之

鼻淵

腦移熱於腦則辛頰鼻淵通聖散

一兩兩奇黃連各二

錢

雜著云鼻塞不開香臭或但寒月多塞或畧感風寒便

塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表開利辛  
溫之藥不効殊不知此是肺經素有火邪鬱甚則喜  
得熱而惡先寒故遇寒使塞過感便發也治法清肺  
降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭  
者再審平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥  
湯化或未藥輕調緩服久服無不効矣此予所親見  
而治驗者其平素原無鼻塞舊證一特偶感風寒而  
致窒塞聲重或流清涕者作風寒治之

鼻尖微赤及生瘡

辛夷研末入腦射少許綿裹納

之或以批把蕪去毛煎湯調消風散或半耳內右位

之或白鹽常擦之

麝澤通氣散

治鼻不聞香臭

羌滑

剉滑

防風

升麻

葛根

各二錢

炙甘草

蒼朮

各二錢

川椒

白芷

各一錢

麻黃

留節

冬加

黃連

黃柏

右剉加姜棗煮水煎服

防風湯

治鼻淵

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

防風

半斤

右為末湯

調下

治鼻淵并臭

俗名粉腦沙

沉香

少許

宿砂

二斤

雄黃

皂角

各火

白牛毛

磁葉

各二

右為末吹

治鼻淵并臭

俗名粉腦沙

沉香

宿砂

磁葉



入有少血加花子

驗方

絲瓜藤七蒂三尺燒為末酒下或殼亦可

鼻赤又生瘡

白龍丸末逐日洗面如澡豆法更甚

以時以湯洗去又宜間服龍虎丹一貼又方黃柏苦

參攢柳末付或青黛槐花杏仁研付或乳汁調杏仁

未付

治紅影

治風熱上攻面鼻紫赤刺癢疹俗呼肺風

船上硫黃白礬各半

為末黃丹少許染與病面色同

每上半錢津液塗之兼服升麻湯下瀉青丸

○ 嬰血六十九

諸血證辨法

瀉瀉弱為亡血細弦瀉按之虛為

脫血浮弱按之絕為下血煩數者吐血沉弦必便沉

為吐血太陽大而浮必衄吐血脈輕在肌肉及自滑

睛暈黃衄未止莖為失血瀉為少血脈來懸鉤為衄

血常脈至而搏血衄身熱者死腸澀下膿血弦絕

則肝冷大則生吐血唾血脈滑小弱者生弦強者死

血溫身熱脈躁者死熱則血氣脈沉小留連或微者

易治浮大洪數者難治

凡血證身熱脈大者難治大邪也身涼脈靜易治正氣也

衄血大抵與吐血同火載血上錯經妄行衄血者血出於鼻也河間

云切者陽熱拂鬱於足陽明而上熱則血妄行為衄  
經云怒氣逆甚則吐血暴障內逆射肺根隨血逆臺  
一取天府穴又足太陽腎之脈從腎上貫肝入肺中  
循候龍其病則飢不欲食面如土色咳唾則有血夫  
氣者陽也血者陰也氣主煦之血主濡之今血妄行  
上出於口鼻者皆是陽虛陰虛有升無降其血逆火  
上感  
故也

涼血行血為主犀角地黄湯入樽金蓋犀角能解上時又

花代之又云○內經謂身熱則死寒則生亦是大  
物加即金亦可

槩言之豈無熱生而寒死者乎必兼症詳之可也

一方

荊芥穗研服或用羅蔔上半截杵汁服又滴鼻孔并

灸大椎穴

在頂後第一推上  
針入五分灸隨年啞門穴  
在頂後又髮際  
針入三分

二穴俱能止或用寒水紙於腦脇大椎三處貼之

本草以萱草根研汁一盞入姜汁半盞細呷之治衄

衄血吐血上行

山茶花為末入童便姜汁好酒調

服加鬱金充妙又方鬱金末童便姜汁酒調服

經血逆行或血腥或吐血或唾血服韭汁最好

雜著云凡酒色過度損傷肺腎真陰咳嗽吐痰衄吐咳

咯血等證誤服參芪等日溫之藥則病日增世人不

識性上服之致不效者多矣

東垣云傷寒衄血者仲景言不可發汗為脈微也若浮

緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯已微者二藥俱不可用



宜黃芩芍藥湯雜病見血多責其熱如衄血出於肺  
以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地紫生丹參阿膠主  
之或曰實者犀角地黃湯虛者小續命湯加黃連主之吐血衄血皆可治

治一貧者虛弱氣促精神短少衄血吐血以麥門冬二  
分人參歸身二分黃芪甘草各一錢五味五枚作一  
服水煎熱服愈繼而至冬天居大室卧大熱坑而吐  
血再求治此又盛而有太熱在內上氣不足湯氣外  
虛當補表之陽瀉裡之熱夫冬寒衣薄是重虛其陽  
表有大寒墜過裡熱火邪不得舒暢故血出於口憶  
仲景傷寒論有云太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不

愈遂成衄却以麻黃湯立愈此法相同予遂用之以  
麻黃桂枝湯人參益上焦元氣而實其表麥門冬保  
肺氣各三分桂枝以補表虛當歸和血養血各五分  
麻黃去根節甘草補脾之虛實表益衛白芍藥各一  
錢五味五枚安其脈氣一服而愈

朱

治一婦人貧而性急忽衄作如注倦甚脈浮數重

取大且芤此陽滯於陰病雖重可治急以葶草根葶  
汁各半飲之就以四物加香附側柏子四服覺渴仍  
以四物十餘貼而安

消

治一婦人肥而氣實因無子多服煖子宮藥積火

通血上行為衄面赤脉躁疾神恍上如癡又以治上  
盛下虛丹刺鎮墜予曰衄云上者下之今血氣俱盛  
瀦而上行法當下導與桃仁承氣湯三四下積穢既  
去繼服既濟湯十二劑而安

項

治一婦患衄三年許醫以血得熱則導瀉服瀉心  
涼血之劑益因衄數滴而昏六脉微弱寸為甚曰肝  
藏血而心主之寸口脉微知心虛也不能司其血故  
妄行法當養心補脾實其子也實則心不虛也以琥  
珀諸補心藥遂安

臣

治一人衄血決旬不止時天暑眾以氣虛不能統

血且進艾歸茸附而此尤甚求治脉兩手皆虛乳右  
關滑數而浮躁其鼻赤查而色白曰此得之酒酒  
毒暴悍而風暑乘之熱蓄上焦故血妄行彼曰嘗因  
飢走赤日又醉酒風臥以地黃汁三升許服防風湯  
即愈

附方

麻黃湯

治傷寒大寒壅內熱火氣不伸成衄脉浮緊

為寒

桂枝湯

治證同上脉浮緩為風

已上二方並見傷寒門

五苓散

治伏暑熱流入經絡

方見燥門



黃芩芍藥湯

治傷風傷寒二證脈微衄血

黃芩

芍藥

甘草各一分

右剉水煎

人參飲子

治脾胃虛弱衄血吐血

麥門冬一分

人參

歸身各三分

黃芪

芍藥

甘草

各一分

右水煎服

黃芪芍藥湯

治衄多面黃眼流多眵手麻木

黃芪

三兩

甘草

各二分

升麻

葛根

芍藥

各兩

羌活

半兩

右剉每服三錢水煎

益陰散

治陽浮陰翳咯血衄血

黃柏

黃連

黃芩

並竇水

芍藥

各兩

人參

白朮

乾姜 三錢

炙甘草 二錢

吳兩茶 一兩二錢

香油炒

右為末紅米飯丸下三四錢

四生丸

治吐血衄血

方見咯血門

三黃丸

治衄血不止大便結者下之

大黃 半兩

地黃 三錢

梔子

芩連 各一錢

煉蜜為丸

湯下一百丸

血汚血衄

人中白

即濁白鹽

瓦上火逼乾

入射香

細末酒下

犀角地黄湯

犀角 一兩

生地 八兩

芍藥 二兩

牡丹皮 二兩

右剉每服四錢水煎服

一方用生地黃黃芩黃連以火

黃為君與  
此不同也

內傷病似傷寒汗下後衄血大出不止者真武湯

龍骨散

治衄血下止

龍骨為末吹之

射香散

枯礬龍骨射香為末吹或蒲黃炒黑吹之

一法

治衄不止以紙一張作八摺水濕置頂上耐火乾

即止

又法

左鼻出以線扎左手中指右扎右俱出並扎

○吐血七十

脉法

詳見衄血門可參看

丹溪云

因火載血上錯經妄行脉必大而乾

大為火邪  
勝乾為失血

血從上出皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出

上竅宜補陰抑陽氣降則血歸經

大法四物湯加酒炒梔子童便姜汁一本有柳金非

行濕積痛是氣嘔血用韭汁童便姜汁鬱金飲之其

血自清如無抑金以山桑花代吐血用良方四生丸

甚妙亦治又方童便調香附末服又方側柏葉研細

童便加少酒調服

肥入咳軟寒熱而吐者瓊玉膏

吐血亦有因怒氣而得者經曰怒則氣逆甚則嘔血

怒則陽氣逆上而肝木乘脾故也其証必暴而甚治以柴胡黃連黃芩黃芪地骨皮生熟地黃白芍桑麻



者以得命集生地黃散加  
天門冬枸杞甘草等分

東垣云嘔吐血出於胃也實者犀角地黃湯虛者小建  
中湯加黃連又云凡血證上行皆逆也若變而下行  
為惡利者順也上行為逆其治難下行為順其治易  
吐血不止用乾姜泡為末童便調服此從治之法山梔子最  
清胃腕之血○有先吐血後見疾者是積熱降疾火  
為急○有暴吐紫血成塊者是熱傷血結於中吐出  
為好用四物湯加清熱之藥調之

朱

治一少年貧勞患惡寒證吐血三日

一人咳嗽吐血四物加貝母瓜蒌五味桑白皮杏仁

欵冬花柿霜。一人年五十勞嗽吐血人參白朮  
蒼百合白芍藥紅花細辛黃芪半夏桑白皮杏仁甘  
草阿膠呵子青黛瓜蒌海石五味天門冬。一人年  
三十八咳嗽吐血四物換生地加桑白皮杏仁欵花  
五味天門冬桔梗知母貝母黃芩

滑

治一人嘔血甚至盈盆二年素勞役致中氣損先

與八寶散一二日服黃芩芍藥湯少有動作即進犀  
角地黃湯加挑仁大黃稍間服寧神散有疾用蒙石  
丸其脈始訖大后漸平三月而愈屢試屢驗

一人乘暑往途中吐血拒痛體熱頭眩脈洪而滑曰

此必大醉冒暑血壅過為暑迫上行先與犀角地黃湯繼以桃仁承氣湯去瘀血後治暑而安

滄洲翁治一憲使出道病察色切脈面戴陽氣口皆長而弦蓋傷寒三陽合病也以方涉海為風濤所驚遂血菴而神懾為熱所搏故吐血脇痛煩渴謔言一醫以左尺脈不應為腎已絕泣告左右俱其子曰今年歲運左尺當不應此天和脈無憂也以小苾胡減參加生地黃半劑俟胃氣實以桃仁承氣下之得利遂安

附方

人參救肺湯

治吐血咳血

甘草

蘇木

陳皮

各五分

升麻

柴胡

蒼朮

各一錢

歸梢

熟地

白芍藥

黃芪

人參

各二錢

右水煎服

吐血疾血酒色過度

枇杷葉

欬冬花

紫苑茸

杏仁

鹿茸

桑白皮

木通

各一兩

大黃

半兩

右為末煉蜜九彈子大卧時白湯下

羅麵丹

治內損吐血

飛羅麵

炒京墨磨下

二錢

吐血咳嗽

紅花

杏仁

枇杷葉去毛



紫苑茸 鹿茸各一 木通各一 大黃 蜜丸為化

嘔血 黃栢蜜灸為末麥門冬湯下二錢

又方 側柏葉為末來飲下二錢

三黃補血湯 治面赤善驚上熱六脈大按之虛乃

手少陰心之脉也此氣盛而亡血瀉火補氣以墜氣

浮 生地 熟地各三錢 柴胡 川歸各一錢

升麻 黃芪 牡丹皮各一錢 白芍五錢

川芎二錢 右水煎服

三茸丸 治吐血衄血 鹿茸 紫苑茸

紅花 杏仁 大黃煨 桑白皮 木通

批把葉

為細末塞丸彈子大每服一匙

吐血不愈

三稜針刺氣沖出血

門冬清氣湯

治脾胃虛弱氣弱吐血衄血

紫苑

一錢

黃芪

白芍藥

甘草

各一錢

人參

麥門冬

歸身

五味

各三分

右作二服水煎服

麥門冬飲子

黃

綾川歸

麥門冬

生地

人參

各五分

五

十粒

右剉水煎

歸脾湯

治思慮傷脾不能統攝心血致妄行

方見

健忘門

批把葉散

治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷 二錢 厚朴 半錢 甘草 各 麥門冬 乾木瓜

茅根 各一錢 枇杷葉 陳皮 丁香 各五分 為末 每二

錢姜水煎

生地黄散 治鬱熱衄血咯血吐血 枸杞

芫胡 黃連 黃芩 地骨皮 天門冬

白芍藥 甘草 黃芪 生地 熟地 各

水煎下血加地榆

治吐血之方極多驗者甚少此方極効 苧麻灰

棕間灰 髮灰 茅花灰 詩研細茶清下二錢 血

止後以四物各一錢加炒蒲黃炒梧灸甘草各四分

茯苓遠志麥門冬栢子仁貝母各八分熱盛加柴胡  
地骨皮八分阿膠七分五味七粒燈心十五莖水煎  
服愈

咳血七十一

咳血者數出  
痰有血也

脈法

見切血門

丹溪云

曰痰盛

痰火傷  
血也

身熱多是血虛出于腎青黛瓜

薤白呵子海石山施為末姜汁蜜丸噙化

一云四物  
若虛善汗

便化嗽盛加杏仁後以八物加減調理

痰盛加  
痰

詳見咳嗽并吐血門

附方

清心蓮子飲治嗽



腎虛咳血 天門冬 麥門冬 紫苑 遠志

知母 熟地 澤瀉 貝母 牡蠣

桔梗 黃柏 乾姜 桂 百部

水煎服

咳血 白朮半錢 川歸 芍藥 牡丹皮

桃仁一錢 梔子炒黑八分 甘草三分 青皮五分

水煎服

寫蘇散 治勞傷肺經咳嗽內有血

苜蓿 黃芪 生地 阿膠炒 貝母

甘草 茅根一兩 桔梗 天門冬 蒲黃等分

右姜水煎服

黃芪散

治咳血成勞

黃芪

麥門冬

熟地黃

桔梗

芍藥各半

甘草四分

水煎服

嗽血

治因肺損意沙仁為細末煮熟猪肺白蘸食之

或以猪心一箇竹刀刮開勿令相雜以沉香一錢半

夏七箇入在縫中紙裹蘸小便內令溫煨熟去半夏

只吃猪心亦治吐血

人參救肺散

見前

王氏方

見勞察門

○唾血七十二

血隨唾而出也

丹溪云

嗽血出於腎亦有瘀血內積肺氣壅遏不能下

降用天麥門冬知母貝母桔梗黃柏熟地遠志或加  
乾姜 一本有百部寒加干姜肉桂

鷄蘇散

治勞傷肺經喘內有血咽喉不利

王氏方

見勞察門

咯血七十三 各出血疔瘡也

丹溪云用姜汁童便青黛入血藥中用如四物湯地黃

膏牛膝膏之類

有咯血痰帶血絲者同治俱宜加痰藥

一壯年患嗽而咯血發熱肌瘦鑿用補藥數年而病  
甚脈滿此好色而多怒精神耗少又因補塞藥榮衛  
不行瘀血內積肺氣壅不能下降治肺藥非吐不可

精血耗非補不可惟例舍法二者蒸滯但夜吐多  
瀉耳蒸灸肺膈乃愈。一壯年因勞倦不得眠欬痰  
如膿声不出時寒醫與小青龍湯喉中有血絲腥  
氣逆上漸多有血線自口右邊出晝夜十餘次脉弦  
大微弱左大為甚此勞倦感寒強以辛甘燥熱之劑  
動其血不急治恐成肺痿以參芪歸身白朮芍藥陳  
皮生甘草帶根麻黃煎入藕汁服之二日而欬止去  
麻黃與四日而血除但脉散未收食少倦甚前藥除  
藕汁加黃芩砂仁半夏而愈

附方



七珍散

治勞察咯血

四君子湯加山藥黃芪粟米炒姜棗煎一本加阿膠

四生丸

治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉

生艾汁

生地黄

生栢葉

等分

右彈子

大每盞湯下一丸

腎餅子

治咯血

青黛一錢

杏仁

四十五粒去皮尖黃炒黃色

右研杏仁細入青黛捏作餅子用時以布一被破開以餅置其中合定濕紙裹煨研末飲下

生地散

治咯血

方見

王氏方

見勞察門

甘露飲

治血妄流溢或且或咯血齒齦鼻出血

○痰涎血七十四 附

東垣云痰涎血出於脾用

葛根黃芪黃連芍藥川歸甘草沉香

○膈中出血七十五

**陰洲翁**治一人偶搔膈中瘡或出血汨汨如湧泉竟日

不止困甚脈二尺如蛛絲他部皆無予曰夫脈血氣之先也今血妄行故榮氣暴衰然二尺尚可按當益榮以瀉陰火以四神湯加荊芥防風連進脈漸出更服十全大補湯等藥遂愈

○下血七十六

膠法洪數而疾餘見衄血門

丹溪云屬熱與虛

熱則流通虛則下滯三因論便血或清或濁或鮮或黑或便前或便後或

與泄物並下由內外有所感傷凝滯於胃隨氣下通亦妄行之類或云清者屬榮虛有熱渴者屬熱與濕

鮮者屬火黑者火極與泄物並下為積或絡脉傷也宜詳審之

熱用四物加炒梔子升麻秦艽阿膠

一本有白芷

加連如寒藥用辛升溫散一行一止

虛用四物加乾姜升麻不可純

用寒涼藥必加辛味為佐久不愈者後用溫劑必兼

升舉藥中加酒浸炒涼藥如酒煮黃連丸之類寒因

熱用故也。凡用血藥不可單行單止。下血用白

芷五倍為末糊丸桐子大每服五十丸米湯下。有

通邪下陷者蓋風傷肝心主血故也宜升提之。有  
溫傷血者行溫清熱。因積熱下血者用蒼朮陳皮  
各一兩半連翹半兩黃連黃芩黃柏各七錢半為末  
生地黄膏丸服又方生地黄蒼朮等分為末丸服。  
脾經云先見血後見屎是近血先見屎後見血是遠  
血。有血脫甚色白而夫不澤脉濡此大寒也乃始  
同而末異以辛溫益血甘熱溫經乾姜泡是也

丹溪云一人嗜酒因逐難下血而痔痛脉沉濇似數此  
陽滯於陰也以抑金芎芷蒼朮香附白芍藥乾葛炒  
麵生薑半夏陽調服



一老婦性沉多怒大便下血十餘年食減形困心搖  
動或如烟薰早起面微浮血或暫止則神思清忤意  
則復作百法不治脉左浮大虛甚久取帶澹而不勻  
右沉澹細弱寸沉欲絕此氣鬱生涎上鬱胸中清氣  
不升經脉壅遏不降心血絕少不能自養故也非開  
涎不足以行氣非氣升則血不歸隧道以杜脾之藥  
為君諸藥佐之二陳加酒紅花生麻歸身酒連青皮  
貝母澤瀉黃芪參朮酒芍藥每貼附子一片煎服四  
貼後血止去附加乾葛壯丹皮施子而烟薰除乃止  
所加之藥再加欬曲砂仁地黃木香倍參芪朮服半

月愈

一人虛損大便下血每日三二碗身黃瘦以四物加藕  
節汁一合紅花蒲黃一錢白芷升麻槐花各半錢服  
之愈

寶鑑治一人年四十二形骸本瘦因強飲酸酒少時腹  
痛次傳下利無度待十餘日便後見血或紅或紫腹  
鳴時痛諸醫以為血熱用芍藥藥皮丸未効仍不欲  
飲食則嘔酸形體愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷  
物口乾有時煩躁不安脉弦細而微遲手足稍冷經  
曰結陰者便血一升再結二升三結三升又邪在五

臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣  
內結不得外行無所稟滲入腸間故便血也其脉虛  
瀉非腸風藏毒也外灸中脘三里氣海等穴內服平  
胃地榆湯

附方

越桃散

治下血及血利

梔子

槐花

大棗

乾姜

燒等分

為末米飲下三錢

平胃地榆湯

治結陰便血

白朮

陳皮

茯苓

厚朴

葛根

各半

地榆

七分

乾姜

五分

甘草

當歸

炒曲

白芍藥

人參

益智

各三分

蒼朮

附子

升麻

姜水煎服

黃連香薷飲

治伏暑下血

身見暑時

伏龍肝散

治便血內外有感凝停在胃隨氣下通

甘草

伏龍肝半斤白朮

阿膠

黃芩

乾地黄

三兩右水煎服

赤豆當歸散

治先血後便為近血

赤豆

風芽出晒干

為末水下

五靈脂散

治下血 五靈脂炒為末芎歸湯調下

結陰便血

生地黄

汁小蘗

汁砂糖熬膏

地榆

阿膠

栝葉



一云下血以蓮蓬散又若內蘊熱毒七氣入腸胃或因  
飲酒過多及啖糟穢灸燔引血入大腸故下鮮紅血  
宜黃連九或一味黃連煎服若大下不止者四物加  
黃連槐花仍以血見愁少許姜汁和米飲服或加側

栝葉生姜同搗汁有毒腸胃下血者亦宜加黃連

內經云下血為內傷絡脉所致一云用枳殼一味服之  
又方黃連二兩枳殼二

兩以枳殼八兩燒二味  
煎服以解絡脉之結也

一方血餘灰鞋底灰皂角灰等分酒下三錢匕

劫藥百藥煎一兩一  
半燒灰為末糊丸桐子大米湯下每服

六十九

一方

治下鮮血

梔子燒灰酒下一錢匕

○瀉血七十七 小便出血也

丹溪云

屬熱

一云因心腎氣虛房勞發熱精氣

用山梔

子炒水煎服或用小蘗琥珀

小蘗治下焦熱血淋飲

○血虛者

四物加牛膝膏

一本加生地

或生地黃四兩小蘗滑石通

草蒲黃淡竹葉藕節川歸炒梔子炙甘草各半兩水

煎服

小兒尿血

甘草升麻煎湯調益原散

尿血

髮灰

清來血通

每服二錢米醋下

五苓合四物煎服或米飲調棕蘭灰亦可

三汁丹

治小便出血

水楊樹腦

老鴉飯草

赤脚馬蘭

各取自然汁飲之

又方

蒼朮

夫曲

側柏葉

活石

各半

川芎

三升

香附

四升

右為末服

或曰痛者為淋不痛者為溺血若好色者屬虛以五苓

和膠艾湯下鹿茸丸或辰砂炒香散或四物加黃連

棕灰又六味地黃丸為要藥

莖中痛甘草梢血藥中少加地榆陳皮白芷棕灰

初痛用炒蒲黃炒故紙古石灰為末調服或單用蒲黃

或芎湯調金玉末服或文蛤灰入煎劑亦炒大抵小

便出血則小腸氣秘氣秘則小便黃忍以油髮灰水  
下或車前子末以車前草湯下二升或生地汁姜汁  
和服

玉屑膏

治尿血

黃芪人參等分為末大羅葡切

一指厚四五片蜜燻火特醴蜜炙乾尽二兩為度鹽  
湯點下

○痔漏七十八

附 腸風藏毒

丹溪云因火就燥也木乘火勢而侮燥金歸於大腸為

病皆風熱燥濕也

主氣通天論云因而飽食筋脉截

飽食用力房勞脾胃濕熱之氣下迫大腸致併裂勞  
出其肉如櫻桃雞心等狀贅於肛門而成蓋為病者



聽方治痔  
 疔腫腐及下  
 血如神  
 槐角 妙防丰  
 皂角 地蘇  
 二聖膏 加头仲  
 秦光 各四反  
 匠糊 力存格  
 子米 飲也心  
 下 字 抄

皆溫熱風燥四氣所傷而熱為最多也四氣者非六  
 淫之邪乃內五藏之氣擾動故其發因於憂怒如飲  
 食勞倦動乎脾憂恐動乎肺慮怒動乎肝之類諸動  
 屬陽故火多也其腫而後重者溫熱也大便結者  
 燥熱也腸頭成疔者溫也大有者風熱也此皆  
 藏氣為病而显其形也治宜行氣和血瀉火疎風流  
 溫潤燥以調於內淹洗塗付以治其外腫痛雖定而  
 痔猶存也若不去其本振遇觸即發以枯榮消去其  
 痔而絕其源亦須調飲食戒房勞慎憂怒內觀自  
 養使火不起可保全安否則雖服良藥難獲効也

治血為主以苦寒瀉火辛溫和血潤燥疎風止痛

用條芩涼大腸人參黃連生地黃槐角涼血生血當歸和血

升麻川芎枳殼寬腸一云八物湯如

洗藥 五倍朴硝桑寄生蓮蓬煎湯熏洗一方天仙子

煎洗

腫者

木鱉子五倍子為末調付

洗之

一方胡麻子煎

漏瘡先須服補藥以生氣血參芪歸朮為主大劑服之

外以附子為末和作餅子如錢厚以艾灸之隨漏大

小令微熱不可令痛乾則易之再和再灸如困且止

直至肉平為度或仍前用補氣血藥作膏貼之經云

為漏而連肉腫以其先陷血脈次陷肌肉陰逆是氣

不能管運遂作死肌經久不愈瘡口不收風寒襲之

血脈內腫水腫或為管之狀大抵漏瘡多生於戶門

之畔始起如豆忽便腫長如梅李五六日潰膿而  
止稍可而不能收口過半月或一月後腫而痛貴藥  
發散無定修補膿水不乾終不能愈集驗治法或灸  
百餘次令開或用針開之一日三次付藥不兩夜者  
一日二次付之取之死肌驚管令尽次用鹿毛松香

燒烟熏之北艾煎湯洗之聚香膏貼生肌藥付之即  
愈矣病深者又不同也用麥草心頂替針孔深八釐  
毛管屈曲住處用針去死肉驚管路尚未斷又依前法  
稻草葉熬雜之取去死肉驚管路尚未斷又依前法  
治之亦愈但穿處不能完補耳

附方

一法治瘡久成滿膿水不乾其膿不臭內無歹肉用附  
子浸透厚切厚三二分於瘡上灼艾灸之仍服內托  
之藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣  
至有膿水惡物漸潰根深者用白麩硫黃大蒜同并  
爛作餅子厚約三分於瘡灸二十一壯一灸一易後  
隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互相用之紅

入瘡肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服  
病之劑調理即差矣大批始發宜先要補養之藥至  
炎冷瘡亦須內托之藥調理一二愈者

塞藥

爐甘石

煨童便淨

牡礪煨

又方

馬蘭根付上片時着肉平去藥稍遲恐肉

反出

痔瘡

臘茶為末入腦子同研津調紙花貼上後以

白礬

四各半

和半生乳香

香油同研為膏紙貼大便秘用

枳殼川歸湯下三黃丸

皂角散

黃牛角一斤

煨

蛇退

一條

皂角

五枚

醫集卷八



川山甲七片

右並切入礮研泥固濟候乾先以小

燒烟出火方以大火煨紅冷研細胡桃酒下臨卧引

出虫五更却以酒下二錢

淋痔

血自肛門另作一竅

黃連

烏頭

泡去皮各一兩

又方

荆芥槐花石昌蒲又方絲瓜連皮子燒灰為

末酒下二錢治酒痔

酒痔

黃連酒浸酒煮酒丸米飲下

腐痔核為水

朋破殼

炒甘石煨輕粉

汝朴硝洗淨辰砂或加信煨付外四圍點核上

貼痔 射腦子朱砂 田螺內 將成水不拘遍以乾收為

度

痔血不止 檢滾根燒灰空心下

木槿散 治痔專封口能乾

木槿花 八九月採除下 芥葉亦可

金寶膏 治漏瘡去腐朽肉不傷良肉

桑柴灰 五地用沸湯十梳計用草紙一層 山甲 二地

信 如指頭 杏仁 去皮七枚同信 生地黄 二兩 辰砂 一字

粉霜 一半 射香 半 右將灰汁澄清下鍋煎滾下甲

末候煎乾一半下射香次下粉霜乾及九分下辰砂

候成膏下石灰以成塊為則收罐內不可見風

枯痔法 凡欲枯去其痔先調令痔不腫痛小便如常

有血先當止血並兼用煎藥必用護藥勿令侵好肉

或用生絲綿於痔根上縛定內痔用番痔藥取出方

用枯藥如法治之

番痔藥 草烏一味為末津液調付肛門內其痔即

番出

護肛膏

凡用枯藥先以此藥護四邊好肉

白芨

石膏假

黃連等分

為末鷄子清調如膏

搽上剪油紙如月樣圈痔護四畔好肉一次洗一次

換藥

粘疔方

信

二升用錐  
內炒烟尽

礪砂

二升辰砂

江子

五立  
去殼

蝎梢

五介

射香

一字

明礬

二錢

輕粉

石灰

一錢  
加黃丹

末

津

調

搽

疔上

日三次

加腦子然胆  
凡三味則不

痰而  
効速

秦艽蒼朮湯

秦艽

一錢

澤瀉

二分

蒼朮

七分

防風

五分

大黃

少許

桃仁

一錢

皂角仁

一錢

煨

存性

檳榔

一分

歸尾

二分

黃栢

炒五分

右除

桃仁

皂角

檳榔

外作

一服水

五盞

煎至

一盞

半入

檳榔

等分

三味再

煎一盞服



秦朮防風湯

治痔漏大便時痛

秦朮

防風

白朮

甘草

當歸

各一分

黃栢

五分

紅花

少許

桃仁

二十枚

大黃

製三分

升麻

三分

芫胡

二分

澤瀉

六分

右剉作一服水煎空心熱服

當歸郁李仁湯

治痔漏大便硬大腸頭努出多血而

痛者

郁李仁

一分

麻子仁

秦朮

各一分

蒼朮

歸尾

生地

各半

澤瀉

三分

大黃

製二分

枳實

七分

皂角仁

一分

研煎成調服

右作一服水煎

秦朮薤活湯

治痔漏成塊下垂極痒

秦朮

黃芪

各一分

薤活

二分

防風

七分

升麻

炙甘草

麻黃

訖胡

各半錢

藁本

三分

細辛

紅花

少許

右作

一服

水煎

一法

治痔瘡

韭菜煎湯

盛盆內

用器具

蓋之

留

一竅

熏患處

將韭菜

輕

洗

數次

自脫

後將

生韭

菜手

揉熟

貼患處

竅中

出膿

水者

用草

麻子

枯礬為

末

搽之

一法

端午前

蜈蚣

一條

浸香油

一酒盞

滿月

常付

自

愈亦

治頭上

白花癩

先剝去

茄川

椒湯

洗淨

以此

油

擦數

次効

腸風臟毒

丹溪云獨在胃與大腸出用條苓秦芫槐角升麻青黛

一云魚風者蒼木  
藥芫芍藥木香又方大黃煨桃仁去皮當歸檳榔

皂角仁黃栢荆芥枳殼各半兩蝟皮炙黃連炒秦芫

槐角子各一兩為末麵糊丸桐子大每五十九白湯

下七鮮血加棕灰蓮房灰

東垣治一人宿有陽明血症因五月大熱吃杏腸僻下

血唧遠散漫如篩腰沉沉然腹中不和血色紫黑病

名濕毒腸僻陽明少陽証也以芍藥一盞半升

麻羌活黃芩各一錢生熟地黃獨活牡丹皮炙甘草

芫胡防風各五分歸身葛根各三分桂少許作二服

水煎

附方

加減四物湯

治腸風下血不止

生地黃

側柏葉

川芎

川歸各一兩

枳殼

荆芥

槐花

甘草半兩

右剉每服四錢姜水煎服

煎服

留歸和血散

生地

槐花

青皮各六分

歸身

升麻各一錢

川芎五分

荆芥

白朮六分

石為末飲下

湯虛陰之入久年便血面皆黃白灰色



理中湯加附子百草霜丸服

涼血地黃湯

見崩中

治下焦濕熱大盛起居不節為殮

世符

酒蒸黃連丸

黃連十二兩酒五斤蒸乾為末曲丸下湯

驗方

黃連吳茱萸等分同炒轉色各擇各礮為末糞

前見血酒下茱萸末一錢糞後見血酒下黃連末一

錢不過一兩

椿皮散

治血利脹風下血

椿根皮三兩槐角四兩

明礬

二兩

甘草半兩

為末每三錢米飲下

烏梅丸

治登瀝見血

烏梅肉一兩 姜蚕一兩 為末 糊丸 白湯下

**保命集**

治腸風痛痒 不仁 大便不血

蒼朮

四兩 地榆 二兩 右剉水煎食前多服除根

**熟地黃丸**

治血虛久痔

蒼朮一斤 熟地黃一斤

乾姜

冬一兩 夏半兩 北五味 八兩 右末 棗肉丸 桐子大 酒下一

百丸

**又方**

歸身 一兩 葶豆粉 一兩 烏梅肉 燒存性 二兩

栝葉

一兩 地榆 一兩 槐花 一兩 荆芥 一兩 右末 醋糊

丸 早未飲下 七十丸 臟毒加黃連一兩 婦人加艾葉

半兩

○脫肛七十九

丹溪云屬氣血虛與熱。氣虛參芪芎歸升麻。血虛加黃栢外以五倍為末托而上之一次未收至五七次必收又方陳壁土泡湯先熏後洗或理省桑白皮白礬煎洗

東垣治一老人面塵脫色神氣弱脫肛日久服藥未驗復下赤白利裡急後重白多赤少不任其苦求治曰此必飲食不節天氣註寒衣蓋猶薄不禁而脫下者寒也真氣不禁形質不收而血滑脫此乃寒滑氣泄不固故下脫也當以益去其脫而除其滑散之

固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥  
陽益氣以御米殼蜜炒橘皮各五分乾姜六分訶子  
煨七分為末作一服水煎服

附方

一方以擇其主栗燒灰付不再玉其主又方用螻蛄燒

在邊出火毒研細入冰片再研勻搽臍上托之即上其主

涼又方冬瓜藤煎湯洗送上即收

一方以赤皮葱帶根韭葉帶根二味煎湯入大風子防  
風末熏洗立上再灸百會一壯次服

吊腸丸

白朮

甘草

黃連

白芍藥



桔梗

人參

白茯苓

各等分

右為末醋糊丸湯下五十九立効

香荆散

治肛門脫出

香附荆芥等分為末每

服三錢水煎淋洗服亦可。又方五倍子三錢為末

煎洗

一方加白礬

又方木賊燒灰摻肛門上按入。又方

浮萍杵細乾貼患處。又方龍骨半兩煨木賊

二錢半燒

性為末摻托。又方木鱉子肉枳殼燒烟熏之。又

方五倍燒濃煎二桑葉湯洗香油搽末于付上。又

方櫻桃葉濃煎入白礬末在內洗之拭乾輕上送上

頂上剃去少髮以草麻搗貼用益菜煨熟坐肛門

○前陰病八十

鑿按

舟溪云

一少年玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股不

能行二脇氣上冲手足倦弱先以小茈胡加黃連大

劑行其濕熱少加黃柏降其逆上之氣挺腫漸收及

半但莖中有一堅塊未消遂以青皮為君佐黃散風

藥為末服之外以絲瓜子汁調五味末一作倍付之而

愈。一入年近三十舊有下疳瘡常求治因其不守

禁忌而却之忽一日頭痛發熱自汗眾作傷寒治之

病反劇脉之弦甚七三重按則濡予曰此病在厥陰

而與症不相應遂以小茈胡湯加草龍膽黃連胡黃  
連帶熱服四貼安

東垣治一人前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求治  
曰夫前陰者足厥陰肝之脉絡循陰器出其挺末凡  
臭者心之所主散入五方為五臭入肝為臊當於肝  
經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少冲乃治其  
標如惡針當用藥除之酒者氣味俱陽能生裡之濕  
熱是風燥熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云  
在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰以去  
之治以龍膽瀉肝湯又治陰邪熱痒茈胡稍二錢

馮二錢車前子木通各五分生地黃當歸柏草龍膽  
各三分右作一服水煎服以羨膳壓之 該入後

陰脛痛是厥陰經氣滯煎熱用甘草梢蓋欲緩其氣耳  
若病淋而作痛似難一槩論之必須清肺氣而清濁  
自分矣氣虛六君子血虛四物等各用黃柏知母滑

石七葦琥珀之類 該入前

雜著云陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有  
之矣然亦鬱火甚而致者經云壯火食氣譬如人在  
夏暑而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予見一二人腎  
經鬱火而致令服黃柏知母堅腎之藥而效宜審之



囊脫 腎胞腫爛丸欲脫者月日蘇一云白紫蘇葉為末香

油調付

附方

清震湯

東垣

治小便溺黃臊臭淋瀝二丸如水陰汗多

羌活

酒柏錢一

升麻

蒼朮

黃芩

各五分

澤瀉

四分

麻黃根

猪苓

防風

各三分

炙甘草

歸身

藁本

各二分

紅花二分

作一服水煎忌酒麵

固真湯

治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有

餘滴尻醫并前陰冷惡寒而喜熱膝下亦冷

升麻

羌活

芫胡各一錢

炙甘草

龍膽草

澤瀉冬一錢半 黃栢

知母冬二錢 作二服水前服美膳

壓之

清魂湯

治外腎冷兩脚陰汗前陰痿囊濕痒噪氣

柴胡

生甘草 酒栢冬二錢 升麻

澤瀉冬一錢半

歸梢

羌活 麻黃根 防已

草龍膽

茯苓冬各錢

紅花冬許 作二服水煎

清肝散

治前陰有汗如水方見瘦門

椒粉散

治前陰二丸溫痺痛

肉桂 二分

小椒

歸梢 猪苓冬各分 蛇床子

黑狗脊冬各分

麻黃根 輕粉

紅花冬許 斑毛 二枚

為末搽上

陰囊腫脹大小便不通

白丑 二兩 桑白皮

白朮 木通

陳皮各半 為末每二錢姜湯下

未覺時服

陰瘡 射香杏仁研末以小袋貯繫納陰中

陰胞疝 大甘草濃煎冷浸洗後以海蝶蛸末付

陰虫蝕 狗脊不去 黃連 黃柏 黃丹

水銀 光粉 赤石脂 為末乾付

腎臟風 乃濕也陰脛腫痛不可忍 苦參

大黃 荊芥 皂角 熏洗

小兒玉莖熱腫纏轉如螺蛸肉狀小便難者伏龍肝

汗調付

○汗八十一

丹溪云東垣有法有方

自汗屬氣虛屬溫與熱云一

屬陽虛後東垣云人之汗循天地之雨也陰茲其濕  
 則為霧露為雨也陰溫下行地之氣也汗多則六陽  
 陽去則陰勝也其則寒中濕勝則者声如從寒中出  
 言其壅也不出也以明其濕雷矣經曰氣虛則外寒  
 雖見熱中蒸上為干終傳大寒知始為熱中表虛亡  
 陽不任外寒中傳寒中多成閉塞矣色以候天脉以  
 候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形  
 無形之可見者也大抵心之所藏在內者為血發外  
 者為汗盖汗乃心之夜而自汗之症未有不由心腎  
 俱虛而得之故陰虛陽必倭發熱而有汗陽虛陰必  
 乘發厥而自汗皆  
 陰陽偏勝所致也

自汗宜入參黃芪少佐桂枝陽虛者附子亦可用



撲法

牡礪

麩皮

麻黃根

藁本

糯米

防風

白芷

為末周身撲之

有痰亦自汗濕能自汗熱亦自汗虛則盜汗

火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之

盜汗睡中出也屬血虛陰虛小兒不須治宜當歸大黃湯

四炒白朮散治盜汗 白朮四兩一兩用黃芪同炒一兩用石斛同炒一兩用牡

石同炒一兩用夫皮同炒余去止用白朮為末每服三錢米湯調服

頭額汗

陰陽俱虛枯燥頭汗亡津液也熱入血室頭汗傷溫

額上汗因下之微喘者死胃上熱薰額汗發黃頭汗

小便不利而渴此瘀血在裡也心下懊懣頭汗傷寒  
結胸無大熱以水結在胸脇間頭汗往來寒熱頭汗  
東垣治一人二月天寒陰雨寒濕又因飲食失節勞役  
所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣  
心胸間特煩熱頭目昏憤上壅食少減此乃胃中陰  
火熾盛與外天雨之濕氣峻然二氣相合濕氣大作  
汗出不休兼見風邪以助東方甲乙風藥以去其濕  
甘寒泄其熱羌活勝濕湯

滑先生治一婦暑月身令自汗口乾煩燥欲卧泥水中  
脉浮而類按之豁然虛散曰素問云脉至而從按之

不鼓諸陽皆然此為陰盛格陽得之飲食生冷坐卧  
當風以真武湯冷飲之一進汗止再進燥去三進全

安

飲食汗出

東垣云飲食胃厚得之氣不循常度故汗出也

附方

調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

麻黃根

黃芪

又

羌活

七分

生甘草

歸梢

黃芩

半夏

各五分

蘇木

紅花

各一分

五味

七分

麥門冬

生地

各三分

猪苓

二分

右剉水煎

羌活湯

甘草

生苓

生苓

人參 羌活 防風 藁本 獨活

細辛 蔓荊子 川芎各三分 黃芪 生甘草

升麻 柴胡各二分 茵苒一分 右作一服水煎

當歸六黃湯 當歸 黃連 黃柏

黃芩 生熟地等分 黃芪加倍 每服五錢水煎

正氣湯 治盜汗 黃柏 知母各半 甘草五分

右水煎服

牡蠣散 治諸虛不足津液不固自汗

麻黃根 牡蠣 黃芪 或加羌胡秦老浮麥

同煎服



大補黃芪湯

治虛弱自汗

黃芪

防風

川芎

山茱萸

川歸

白朮

肉桂

炙甘草

人參

白茯苓

熟地

肉蓯蓉

右每服五錢加棗水煎

黃芪建中湯

黃芪

肉桂

甘草

白芍藥

右每服五錢姜棗少錫水煎

別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多病在用

心名曰心汗宜養心血以艾煎湯調茯苓末服之

又方

二桑葉焙乾為末米飲下止盜汗

八十二

脉洪長伏為風癇弦細緩為諸癇浮為陽癇沉為陰癇

虛弦為驚沉數為實熱若沉小急實者虛而弦急者

皆不治也

大率屬痰火與驚不必分五等

按內經止言癇而不及癇古方以癇癇或併言

或言風癇七狂驚癇風癇命名不一何以衣據蓋癇病歸於五藏故有五癇之分癇病止屬於心又癇與瘈畧相似而實不同若時作時止身軟時醒者或如猪犬牛羊而鳴者則謂之癇也身強直反張如弓不時醒者謂之瘈也此癇為甚為虛而癇則隨其痰火上潮故有時而醒癇則失心妄作痰結胃腑妨礙於心故經文不差若大開月與人語所未嘗見之事者謂之狂也考之諸書所論不一河間以熱甚而風燥為其兼化涎溢腎蒸燥燥而氣壅昏胃置仆也三因以驚動藏氣不平澹而生涎閉塞諸經厥而乃成或在母腹中受驚或感六氣或飲食不節逆於藏氣而成蓋件氣得之外驚恐得之內飲食屬不內外所因

不自同治法亦其如驚者安神丸以下之痰者三聖散以吐之火者承氣湯以下之故云尋火尋痰分多火而治之無不効也

治法行痰為主黃連南星瓜蒌半夏尋火尋痰分多少而治無有不愈有熱者以涼藥清其心有痰者必用吐法吐後用東垣安神丸及平肝之藥青黛龍胡川芎之類

一方取入蟄大端蝮一介用大粒硃砂三錢裱入腹內以新瓦盛火炙令皮焦酥為末每一分分作四服氣弱及少弱作五服空心調服

方

黃連

辰砂

二味

瓜蒌

南星

半夏

三味  
行痰

青黛

范胡

川芎

三味  
平肝

子和云癩病不至目瞪如愚者以三聖散更用火盆於暖室中令汗吐下三法並行次服通聖散百餘日則愈矣此疾乃肝經有熱吐後宜瀉青丸下之

難知云驚癩發狂惡人與火灸第三第九推服局方妙香丸諸癩似狂以李和南五生丸

千金云病先身熱瘧音至瘧音至驚啼而後發者脉浮洪為

陽癩在六府外在肌膚猶易治也先身冷不驚掣不

啼叫病發脉沉者為陰癩音在在五臟內在骨髓者難

治也



梁古云 晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻音喬又脚

不治證 目瞪如愚者神亂者尋衣縫者五癩重者病

後甚者脉虛而弦急者皆不治

丹溪治一婦有孕六箇月發癩手楊直面紫黑合眼流

涎昏瞶而涎鹽與鎮靈丹五十貼時作時止至產自

愈其夫疑丹毒發求治脉舉弦按瀉至骨則沈帶數

予意其癩必於五月復發至則果作皆巳午時乃製

通聖散其甘草生用加桃仁紅花或服或吐四五劑

愈

一婦久積怒與酒病瀰目上視楊手擲足筋牽喉聲

流涎定則昏昧腹脹痛冲心頭至胸大汗癩瘼痛間  
作此肝有怒邪因血少而氣獨行脾受刑肺胃間尤  
有酒痰為肝氣所侮而為痛酒性喜動出入升降入  
內則病出外則癩用竹瀝姜汁參朮膏等藥甚多癩  
痛間作無度乘痛時灸大敦行間中腕間以陳皮芍  
藥甘草川芎湯調膏與竹瀝服之無數又灸太冲然  
谷巨闕及大指半甲肉且言鬼怪怒罵巫者曰氣因  
血虛亦從而虛邪乘虛入理或有之與前藥佐以荆  
瀝防痰又用秦承祖灸鬼法灸之哀告我自去遂安  
一少年夏間因羞怒發昏手搐如狂面黑羣丸能動

左右相過一醫以金箔鎮心丸等藥不効脉微弦六  
至此素有溫熱因激起厥陰相火與令火不宜射香  
之藥况肝病先當救脾諸藥多燥血壞脾者遂以黃  
連為君人參為臣酒浸芍藥和白陳皮為佐甘草為  
使姜一片煎服八貼而安

一女子八歲病癰陰兩及驚則作羊鳴吐涎知其胎  
受驚也但病深難愈乃以燒丹丸繼以四物湯入黃  
連隨時令加減且令淡味以助藥力半年而愈

一產婦左脚右手發搐

見婦人門

一少婦氣實多怒事不發一日大叫詳見厥門

附方

東垣升陽湯

治腸躄痲疾足大陽寒惡則氣下行

甘草

炙半

麻黃

節不去

防風

各八錢

羌活

半

每服五錢

水煎

治痲

川芎

防風

皂角

麝香

各一兩

蜈蚣

黃赤足者各一條

明礬

一兩

餅餌丸

桐子

大茶清

下十五丸

又方

黃丹白礬

各八兩

研細

楊樹火

煨過

曲丸服

錢氏五色丸

朱砂

珍珠

各半兩

水銀

二兩

上一兩

雄黃

一兩

三兩

鉛

三兩

水銀

同



大金銀箔奇湯下每服三錢

三癩丸 治小兒一百二十種驚癩

荆芥 兩 白礬 一兩半 石為末而糊丸黍米

大朱砂為衣姜湯下二十九知慢驚用末復丹急驚

三癩丸食癩醒脾丸

治癩 川芎 川歸 熟地 茯神

遠志 柏子仁 南星 半夏 石菖蒲

宿砂 各一 人參 桂 厚朴 龍腦 各半

酸棗仁 各二兩 琥珀 沉香 錢 右姜汁為

丸服

經鑑治一小兒四歲因驚懼發搐痰涎有聲目多白睛  
 項背強一時許方醒後遇驚則發多服犀珠腦射鎮  
 墜之藥已四年餘此證尚在又加行步動作神思如  
 痴診其脉沉細而急針經云心脉滿大癰瘰筋挛病  
 又氣弱多服鎮墜寒涼之劑復損正氣攻添動作如  
 痴先灸二躄各二七壯服此藥又肝脉小急蓋小兒  
 神氣尚弱因而被驚神思無依又動於肝七主筋故  
 癰瘰筋挛治以

沉香天麻湯

沉香

益智

川芎

各二錢

天麻

防風

半夏

附子

各二錢

羌活

半兩

甘草

當歸

姜蚕

錢各一

獨活

四錢

經云恐則氣下精怯而上焦閉以羌活獨滑苦温引  
 氣上行又入太陽為引用為君天麻防風辛温以散  
 之當歸甘草辛甘温以補氣血之不足又養胃氣為  
 臣附子川烏益智大辛温行陽退陰又治客寒傷胃  
 腎主五液入脾為涎以生姜半夏燥温化痰沉香辛  
 温体重氣清去怯安神為使每五錢姜水煎服三劑  
 即安

當歸龍會丸

方見脇痛門

手和朱砂滾涎散

朱砂

生白礬

赤石脂

硝石 等分 右為末 蒜膏丸 如菴豆 大荆芥下 每服三

十九

五生丸

李和南

南星

半夏

川芎

白附子

各兩

右末滴水為丸 每服二丸至五丸 不過七丸

○癩狂八十三

脈法

虛者可治 實者難治 大而堅實者 癩病若大

而滑者 自已

丹溪云 原病式所論甚精 蓋為世以重陰為癩 重陽為

狂也 大槩皆是熱耳

按素問註云 多喜為癩 多怒為狂 原病式云 五志所發 皆為熱

心熱甚則多喜 火實制金不能平木 則肝實而多怒 也 又發熱于中 則多干 陽明經謂陽明厥則癩疾 又



謂服青梁芳草石藥則熱氣際作發為顛疾此河間  
本素問之論以明癲狂俱是熱病而重陰之說非也

大率多因痰結於心胸間宜開痰鎮心神亦有中邪

者則以治邪法治之。神不守舍狂言妄作經年不

差如心經蓄熱常清心除熱痰迷心竅當去痰寧心

。宜大吐下則愈三化湯衄痰丸等下之梨芒散瓜  
蒂散三聖散吐之火刺情之安神

九平之通  
聖調之

滑 治一僧病發狂謔妄視人皆為鬼診其脉累七如

薏苡子且喘且搏曰此得之陽明胃實素問云陽明

主肌其經血氣俱盛則棄衣登高踰垣妄罵遂以三

化湯三四下後進以火劑即愈

一妓心痴狂歌痛哭裸裎妄罵瞪視默上脉之沈堅而結曰得之憂憤沉鬱食再痰交積胸皮湧之皆積痰裹血復與火劑

滄洲翁治一人因恐惧遂驚氣入心疾作如心風爰作奔走不避水火語則自賢自貴或泣或笑脉上部皆弦滑左倍勁於右蓋痰溢膈中灌心胞因驚而風經五臟耳即投以湧劑湧痰涎效極徐以驚氣丸服之一劑而安

一入方飯間坐甫定即補中灰雜飯猛噬且爾上罵入令左右掖而脉之皆弦直上下行而左手寸口尤

浮滑蓋風痰留心胞證也法當湧其痰而凝其神湧  
出痰沫四五耳即熟睡次日乃寤上則病已去矣徐  
以治神之劑調之如舊

附方

寶鑑龍腦安神丸

治五般癩癩

茯神

人參

地骨皮

甘草

麥門冬

桑皮

各一兩馬牙硝二錢龍腦

射香

牛黃半兩

朱砂二錢

犀角一兩

金箔三十片

右為細末蜜丸彈子

大金箔為衣二三歲者日進二服小者一九分二服

湯下

礬丹

治五癩五癩

魏丹

晉礬各一

右用磚鑿一窠，容二兩許。先炙丹在下，礬在上。以炭五斤煨令炭尽，取出研猪心血丸。菜豆大，陳皮湯下，每服十五丸。

控涎丹

治癩癩久不愈，頑涎散聚無時。

川烏生

半夏各半

姜蚕不炒姜浸汁

全蠍去尖

鐵粉

三錢

甘遂

二錢半

為末，姜汁打薄糊丸。菜豆大，硃砂為衣，姜湯下十五丸。忌甘草。

硃砂為衣，姜湯下十五丸。忌甘草。

○瘞八十四

脈法



太陽病發熱脉沉而細痙為難治按之緊如弦直上  
下行痙脉伏堅直上下○腹暴脹大為欲解脉反伏  
弦者痙發汗已脉澹亡如蛇沉細者溫

丹溪云因氣血內虛四氣外散不可作風治大率與痙

相似比痙為甚為虛帶補多是氣虛有火蕪痰用人

參竹瀝之類不可用風藥仲景云太陽病發熱無汗

不惡寒曰柔痙病身熱足寒頭項強急時頭熱面赤

獨頭動搖卒口噤背反張者痙也又云太陽病發汗

太多發痙風病下之則痙復發汗必拘急又云血氣

內虛外為風寒濕熱之氣所中則痙以風散氣故有

汗而不惡寒亡血故無汗而惡寒原具所利多因

與天蒼口未合風入之為破傷風風寒之為破傷溫

與產但多頭項強急餘症相似及至后大病之后致

此疾者槩可見矣然有別感者有內虛者有因虛而受外邪與與火熱溫及怒氣或瘡家發汗而痊者所因不同諸書只為別感者立方但見今之以此屬虛者為多其可以別藥施治之乎大抵痲病身較轉醒痲病身強直反張不時醒甚有昏胃而遂亡者尤宜審之

**內經云**諸瘧項強皆屬於濕或曰寒濕同性故濕可傷太陽熱病因於濕而

反見見此者何也方則害承乃制故濕計

反熱風化制之然濕化者虛象矣非風也

項強亦有痰者

一少年豆瘡醫謝后忽口噤不開四肢強直時遠臍

痛一陣則冷汗如雨痛定汗止脉極緊強如真弦知

其勤若勞倦傷血瘡後血愈虛感風寒當用溫藥養血辛涼散風以芍藥當歸為君川芎青皮鈎鈎藤為

臣白朮甘草為佐桂枝木香黃連為使加紅花煎服  
即愈

子和治一婦年三十病風搖目眩角弓反張數日不食  
諸醫作驚風暗風痼治之以南星雄黃為附不效予  
曰諸風掉眩皆屬肝木陽主動陰主靜由火盛制金  
不能平木故也先湧風痰二三升次以寒劑下之又  
以銖針刺百會出血而愈

附方

葛振湯

治瘧無汗而小便少或惡寒名剛瘧

桂枝

芍藥

甘草

炙各二錢

葛根

四錢

麻黃

三錢

水煎服取汗

桂枝加葛根湯

治有汗不惡寒名柔瘧

葛根 四錢 桂枝

芍藥 各二錢

甘草 一錢

右姜棗水

煎服

大承氣湯

方見傷寒門

治瘧胸滿口噤交牙脚挛難睡

或曰此湯明結聚也湯明結聚以風寒溫熱之邪入於胃中津液不行宗筋无所養故急宜此湯下溫熱行津液故宜明云在病且口噤背強如弓則搖動手足高起宜三一水氣湯下之亦此意也然非察證之明則有寒熱者亦不可輕用也

全匱瓜蒌桂枝湯

治太陽病其證身體兀上然脉沉

遲此為瘧

瓜蒌

甘草

各二兩

桂枝



芍藥 生姜各三兩 大棗十二枚 分作三服水煎取微

汗如未出熱仍發之

神木湯 海藏 治剛痊 加羌活獨活麻黃

白朮湯 治柔痊 加桂枝黃芪白朮

新產血虛痙者汁後中風發搐亦然

荆芥炒為末大瓦黃卷炒熟以酒沃之取汁調末三

五錢服之酒調亦可

防風當歸散 難知 治發汗過多發熱頭面搖卒口噤背

反張者宜去風養血

防風 當歸 川芎 地黃各一兩 每服一兩

水煎服

○厥八十五

脉法

沉微不數為寒厥沉伏而數為熱厥細為氣虛大如  
葱管為血虛浮實為痰弦數為熱浮者外感脉至如  
至如喘為氣厥寸沉大而滑沉為實滑為氣實氣相  
搏血氣入臟唇口青身冷死炷身和汗自出為入腑  
此為死厥

丹溪云有陽厥有陰厥有痰有氣虛有血虛有外感有  
寒有熱原病式詳矣陽衰於下則寒陰衰於下則熱

○厥當分兩種次分五臟寒厥為手足寒也陰氣勝則寒其由乃恃壯縱慾於秋冬之時則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽衰精竭陰氣獨行故為寒厥熱厥為手足熱也陽氣勝則熱其由乃醉飽入房氣聚於脾胃陰氣壅陽氣入則胃不和則精竭精氣竭則四肢不營酒氣與新氣相搏則內熱而溺赤腎氣衰陽獨勝故為熱厥○厥亦有腹滿不知人者一二日稍知人者皆卒然悶亂者皆因邪氣亂陽氣逆是少腎脈不至也腎氣衰少精血奔逸使氣促迫上入胸脇宗氣反結心下陽氣退下熱滯股腹與陰相助

令身不仁又五絡皆會於耳五絡俱絕則令人身脉  
皆動而形体皆無知其狀如尸故曰尸厥正由藏氣  
相刑或與外邪相忤則氣鬱不行閉於經絡諸脉伏  
匿昏不知人

厥有涎潮如拽鋸聲在咽中為痰厥手足搐搦為風  
厥因酒而得為酒厥暴氣而厥為氣厥骨枯爪痛為  
骨厥身直如椽為肝厥喘而強為陽明厥此由氣逆  
也治法痰者竹瀝白朮熱者承氣下之外感解散藥  
中加姜酒氣虛補氣四君子血虛補血四物降心火

益腎水通血和氣必  
先瀉之以瓜蒂散



一少婦氣尖多怒而不發一日大叫而欲厥蓋痰閉  
於上火起於下而上冲用香附五錢生甘草三錢川  
芎七錢童便姜汁炒煎服又用青黛入中白香附丸  
服稍愈后用吐法乃安再用導痰湯加姜炒黃連香  
附生姜下龍會丸遂安○滑伯仁一條見心痛方

附方

四逆湯

治寒厥表熱裏寒下利清芟食入即吐沉脈  
手足冷

白朮湯

治熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫語遺溺  
與冷自汗脈沉滑方並見傷寒門

蘇合香丸

治不問何厥先灌此醒後隨證議論下

藥方見諸氣門

瓜蒂散

吐之口噤者或先用搗鼻藥

追魂湯

三四方治卒厥暴死及客忤鬼擊飛尸氣絕不

覺口噤

八味順氣散

治氣厥 見中風門 平胃散 見濕門

調氣散

丁香 檀香 白豆蔻 木香 各二錢

霍香

甘草 各八錢 砂仁 四錢 為末每服二錢鹽湯

點服

四七湯

厚朴 三兩 茯苓 四兩 半夏 五兩 紫蘇 二兩

右劉每服四錢姜棗煎服

○卒屍八十六

脉法

寸口沉大而滑沉則寒滑則氣尖氣相搏入藏則死

汗自出入府緊而急者遺尸厥呼之不應脉絕者死當大

反小者死

丹溪云因心氣盛有恐精神不全有熱其證萬端如醉

如狂如為邪鬼所輔世所謂冲惡是也宜鎮心神降

火。中惡之病心腹脹滿吐利不行如乾霍亂或罵

詈或登高悲泣呻吟不欲見人為中惡也。若因風

寒暑温中人之虚而卒然晕倒自依風寒暑湿法治  
之有痰隨氣所使亦然宜辨之

附方

還魂丹

治中惡已死

麻黄

三兩 桂 二兩

杏仁 百二

右剉水煎服

挑奴丸

治心氣有熱尸注醫變驚癇

挑奴

七枚 另刊

辰砂

半兩

挑仁

十四

玳瑁

一兩

牛黄

龍腦

射香

各一

雄黄

各一

琥珀

玳瑁

犀角

石上

半兩

安息香

一兩

雄黄

一兩

琥珀

玳瑁

犀角

石上

右為末以前膏充鷄頭子大陰乾人參湯下



宋垣法

參膏補之

蘇合香丸亦治

驚死

半夏末吹鼻中

追魂丹亦治

○邪崇八十七

脉乍大乍小乍短乍長脉狀多變與病相違者是

卅溪云血氣首身之神也神既衰乏邪因而入理或有

之若夫血氣兩虛痰客中焦方碍升降不得運用以

致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之

其人必死○外臺秘要有禁咒一科乃移精變氣之

小術耳可治小病而謂內有虛邪外有實邪能治之

乎

治一少年熱月因大勞而渴恣飲梅漿又連得大驚  
病似邪鬼脈多弦而帶沉數為有熱虛弦是驚又  
梅漿鬱中脘補虛清熱導痰滯乃可遂與參朮陳皮  
茯苓連入竹瀝姜汁未効加荆瀝旬餘而安

一人醉飽後妄語妄見知其痰所為也灌鹽一大椀  
吐痰一二升大汗而愈

一婦暑月因愧而病言語失倫脈弦數當導痰清熱  
補脾其家不信用巫治之旬餘而死此婦痰熱殆甚  
乃以法尺驚其神使血不寧法水密其肌膚使汗不  
得泄不死何俟

一條見癘門

陳易簡治一人得異疾與神佛遇不省人事神志恍惚  
或食或不食以蘇合香丸服之遂愈

醫子集成卷之八