

煎シ竹管ニテ肛門ニ吹入レバ必速効アリ可也

○傷寒熱結大便不通者ハ枳實大黃湯養氣湯ノ類ノ方後ニ詳也方考ニ載ス諸書ノ傷寒門ニテ可也

○老人常ニ大便結スルニハ八物湯ニ桃仁麻仁柳李仁紅花ヲ加テ服スベシ

大小便閉

○大小便不通者ハ急症也枳實大黃湯養氣湯ノ類ニテ速ニ下スベシ或ハ鐵脚丸顛倒散羅ノ類ヲ用ベシ

○大小便不通ニ蝸牛膏最妙也蝸牛ヲ殼共ニ研碎スキ泥トナシ麝香少許入テ臍中ニ填ウミ紙ニテ上ヲ貼ス田螺ヲ以テ右ノ如クスルモ

桂也共ニ有神効 ○枯荖小許麝香小許臍ニ入ルモ吉 ○琥珀ノ

細末ニ麝香ヲ加ヘ糊ニラシマゼテ臍中ニ填ウマセヨ其効如神以上ノ臍ニ入ル藥小便不通ニ用モ亦可也

○夏月伏熱ニ因テニ便不通者ニ白虎湯ヲ以テ益元散ヲ用ベシ有神効

○冬月寒ニ中リテニ便不通者ニ五積散ヲ以テ木通ノ細末ヲ服スレバ其効如神

○疝氣ニ因テ大小便不通者ニハ行氣香薷散ニ疝氣ノ加減ノ方ヲ用ヨ有神効神通丸ヲ兼用スルモ桂也方考ニ載ス可也

痔漏



○痔ハ多ハ酒色過度厚味ノ人必腸澀メ痔トナル也先ツ萆薢防風湯萆薢菴活湯ノ類ヲ見合テ用ヨ蘭室秘藏ノ中ニ妙方多シ考テ可用

○新久ノ諸痔肛邊腫痛シ或ハ瘡ヲ生ジ痒キ時膿血ヲ出ス者ニ管飯連翹湯四卷ヲ用ヨ有効

○痔疼痛シ不可忍者ニ加味道遙散ニ萆薢連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

○脾胃虛弱ノ者ノ痔疾脱肛ノ類ノ病ハ下陷ニヨル升提スベシ提肛散補中益氣湯ニ防風萆薢連翹益智ヲ加テ用ヨ其効如神

○痔瘡久ク漏トナツテ肛邊穴ヲ生ジ膿血ヲ出ス者ニハ平臙丸四卷

ヲ用ヨ外ハ驅毒神應膏外科ヲ貼スベシ有神効

○痔漏膿血ヲ出スニ神雪湯類聚ヲ用ヨ有神効

脱肛

○脱肛ハ肺ノ藏ノ虛寒スル故也參芪湯四卷ヲ用ヨ有神効

○脱肛ノ病新久ヲ不問提肛散ヲ用ヨ有神効

○氣虛及ヒ脾胃ノ氣虛シテ脱肛スルニハ補中益氣湯ニ防風益智

連翹茯苓酒芍萆薢ヲ加テ有神効

○久痢久泄ノ後必脱肛スル者也補中益氣湯ニ防風茯苓益智山藥

ヲ加テ用ヨ其効如神

○小兒泄痢ノ後必脱肛ス錢氏白朮散ニ升麻防風ヲ加テ其効如神



疴疾アラバ家傳保童圓ヲ兼用ヨ有奇効

○老入血氣虛メ脱肛セバ大補湯ニ防風升麻附子ヲ加テ用ヨ有奇効  
効ハ味丸モ佳也

○臨産努カメ産シ畢テ脱肛スル者アリ尿産湯ニ升麻防風ヲ加テ用ヨ氣弱キ産婦ニハ補中益氣湯ニ川芎防風酒芍藥ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

婦人部

○婦人ノ病外患内傷共ニ男子ノ病ニ不異只月經アルヲ以テ其品種々ニ別アリ婦人ノ病ヲ治セバ先ツ月經ノ事ヲ能ク問テ治ヲ施スベキ也

○室女ハ其病多ハ氣鬱ヨリ発スレバ鬱ヲ開キ氣ヲ順スベシ正氣天香湯ノ類ノ方ニ加減メ用ヨ

○寡婦ハ其病欲鬱メ氣順セザルヨリ発スルナリ分心氣飲正氣天香湯ノ類ニ加減メ用ヨ

○虚弱ナル婦人ハ逍遙散ニ加減メ用ヨ

○脾胃虚穢ニメ疾アリ常ニ頭痛眩暈スル婦人俗ニ血ノ道煩ト云



半夏白朮天麻湯ニ加減シ六君子湯ニ當飯酒芍藥天麻ヲ加テ有  
効

○婦人産後ハ氣血ヲ補フベシ産後大抵氣色モ能ク赤ニツク事モ  
ナクブラツキアリテ不足シ血ノ道持トテ生涯病者ナル者アリ道  
通散ニ加減シハ物湯ニ加減シ六君子湯ニ加減シ或ハ家傳蒼朮湯  
ノ類ヲ用ベシ

○心脾ノニ藏常ニ婦人ハ虚鬱スル者ナレバ加味歸脾湯ヲ用テ効  
アリ上ニ載スル所ノ數條先ツ婦人平生ノ病也此等ノ藥ヲ用テ通  
治ノ方トナスベシ餘ハワレノ門ニテ可參考

### 調經

○婦人ノ諸病ノ起ハ月經ノ不調ニヨル也經水或ハ前ニ或ハ後或  
ハ多ク或ハ少ク或ハ月ヲ踰テ未來或ハ一月ニ兩ヒ來類是皆不調  
ノ故也調氣養血湯千金調經湯ノ類ニ加減メ用ヨ有奇効

○調經ノ主方ハ道通散ニ加減スベシ經水期ニ先テ來者ハ血熱也  
本方ニ酒黄芩山梔子莎草川芎生地黃阿膠艾葉ヲ加ヨ經水期ヲ過  
テ未來痛ヲナス者ハ血虚有寒也本方ニ川芎莎草肉桂菝葜朮烏藥木  
通紅花蘇木ヲ加テ經水來ントメ痛ヲナス者ハ血實氣滯也本方ニ  
川芎生地黃莎草黃連桃仁紅花玄胡索牡丹皮菝葜朮ヲ加ヨ經水來時  
ニ心腹疼痛腰肢ニ牽引スル者ハ瘀血也本方ニ川芎生地黃桃仁玄  
胡索菝葜朮青皮ヲ加ヨ經水行テ後ヲナス者ハ本方ニ川芎熟地黃人



參白朮黑炒ノ乾姜ヲ加ヨ經水期ヲ過テ來リ色紫黑ニメ塊ヲナス者ハ氣鬱血滯也本方ニ川芎芍草牡丹皮青皮紅花玄胡索生地黃ヲ加ヨ經水期ヲ過テ來リ色淡者ハ痰多シ本方ニ陳湯ヲ合シ川芎生地黃ヲ加ヨ以上ノ加減調經ノ通治也共ニ有奇効

經閉

○經閉ノ症ハ多ハ氣滯リ血凝ル故也室女寡婦ニ多也先ヅ鬱氣ヲ開クベシ正氣天香湯ニ四物湯ヲ合シ菝朮青皮紅花蘇木玄胡索ヲ加テ用ヨ其効如神

○經閉ノ症腹脹滿スル者ハ治シ難シ壯盛ノ婦素ヨリ實症人ナラバ回春ノ通經丸甘露丸等ノ峻劑ニテ押下スベシ此等ノ藥ハ峻急

ニメ毒藥ナレバ容易ニ用ヒ難シ能脉症ヲ詳ニメ此方ヲ用ベシ虛弱ナル婦人ニ用ル事ナカレ然レ有故無損ト云テ病ニ中テ元氣ニ妨ナキ者ナレバ能病入ヲ診シ得テ峻劑ヲ用ル時ハ其効速疾也ヨクヨク工夫ノ可<sub>レ</sub>用事ナリ

○婦人虛弱ニメ經閉スルハ血脉枯竭スル故也通經調氣湯滋陰百補丸<sub>四藥</sub>ノ類ヲ用テ有効加味道遙散ニ桃仁紅花ヲ加ルモ亦有効

○室女經閉メ咳嗽發熱スル者ニハ牡丹皮湯<sub>四藥</sub>ヲ用ヨ滋陰至室湯加味道遙散ニ川芎芍草陳皮貝母紅花ヲ加テ用ベシ有奇効

○婦人經閉積塊アル者ハ四物調經湯<sub>四藥</sub>ヲ用ベシ有効

○婦人經閉ノ者加味道遙散ニ芍草川芎紅花ヲ加テ家傳神通丸ヲ



用ニ其効如神

血崩

○血崩ノ症ニ虛實新久ノ不同アリ初テ発メ實症ナラハ清熱解毒ノ劑ヲ用ヨ四物湯ニ黃連解毒湯ヲ合シ或ハ四物湯ニ涼膈散ヲ合メ用ヨ有奇効

○崩血不止者ニハ膠艾四物湯ヲ用ヨ其効如神

○崩血不止者血暈メ人事ヲ不知類ニハ先ヅ蒼朮湯ヲ振出メ用ヒ甚キ者ニハ獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無何有ノ地ニカヘシ其後ニ膠艾四物湯ヲ用或ハ逍遙散ニ阿膠艾葉地榆側柏葉ヲ加テ用ベシ其効如神

○崩血ノ勢ヒ緩々タラバ益母湯ニ用ヒ或ハ逍遙散ニ地榆阿膠

ヲ加テ用ヨ或ハ八物湯ニ黑炒ノ莎草阿膠地榆ヲ加テ其効如神

○崩血ノ症面黃ミ四肢困倦腰痛痛ミ煩熱メ不安者脾氣不行血ヲ

統スル事アタワザル故也補中益氣湯ニ防風川芎酒芍藥酒黑炒ノ黃

柏ヲ加ハ或ハ加味飯脾湯ニ阿膠地榆ヲ加ハ或ハ異功散ニ當歸芍

藥阿膠地榆側柏葉ヲ加テ有奇効共ニ見合テ可用

帶下

○帶下赤白共ニ月經不調房欲過度ニ因テ発ス或ハ産後血虛メ胃中ノ濕痰下流スルノ故也先ヅ逍遙散ニ沢瀉地榆ヲ加テ用ヨ或ハ八物湯ニ阿膠黑炒ノ乾姜ヲ加テ用ヨ共ニ神効アリ



○帶下赤白共ニ氣血ノ虛ニ属スル者ハ加減ハ物湯四卷ヲ用ヨ其効如神

○帶下ハ濕寒ニ属シ及ビ濕痰下流ノ者ハ五積散ニ莎草小茴香吳茱萸ヲ加テ其効如神

○帶下白キ者ニハ加味道遙散ニ白雞冠花ヲ加テ用ヨ帶下赤キ者ニハ加味道遙散ニ赤雞冠花ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

○帶下アツテ羸瘦シ四肢無力困倦スル者ハ脾胃虛弱ニメ濕下流スル也補中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヘ加味歸脾湯ニ半夏沢瀉ヲ加ヘ六君子湯ニ升麻柴胡川芎當歸ヲ加テ用ベシ共ニ有神効

○帶下ノ症ニハ腰眼脾俞腎命門穴天樞痞根ノ諸穴ヲ灸スベシ

薰脐ノ法モ可也出干八門可考

虛勞

○婦人ノ虛勞ハ七情ノ氣鬱結ノ相火熾盛或ハ經水不調變テ虛勞

トナル始ハ晝熱自汗盜汗咯血漸々ニ羸瘦シ咳嗽吐紅メ不救ニ至ル又產後脫血シ或ハ產後百日ノ中ニ房事ヲ過シ氣血耗散メ前症

ニ至ル是ヲ產後ノ羸勞ト云難治先ツ道遙散ニ加減シ滋陰至宝湯滋陰降火湯大補湯ノ類ニ加減メ用ヨ共ニ有神効委方考ニ載可參

方

○先風寒ニ感シ咳嗽不止日久メ勞咳ノ症トナルニハ先ツ茯苓補心湯ヲ用ヨ無効時ハ黃芪鱉甲湯ヲ用ヨ共ニ有神効加減委方考



ニ載ス可参考

○婦人ノ虚勞咳嗽發熱ノ者ニ滋陰ノ劑ヲ用テ効ナキニハ蔡朮扶  
瀉湯ヲ用ヨ有神効此方蔡朮薄メ病人滋補ノ味厚キ蔡ニ飽タル時  
アレバ飲ヨキニ因テ多ハ驗ヲトルナリ

○室女寡婦徳壽氣鬱メ虚勞ノ症ニ似テ紛マシタル類多シ分心氣飲ニ  
テ家傳神通丸ヲ下セバ胸膈ノ氣舒暢メ其病自ラ愈ル也可秘

○脾胃虚弱ナル婦人虚勞ノ如ク煩テ大便不調ハ脾胃虚勞也補中  
益氣湯ニ貝母山藥五味麥門益智ヲ加テ有神効參苓白朮散ニヨシ  
六君子湯ニ蔡朮桔梗山藥ヲ加ルモ尤ヨシ

○産後ノ尊勞ニハ六補湯ニ貝母桔梗五味子鯨甲蔡朮ヲ加テ其効

如神八味丸ヲ常服スヘシ有効

### 求 嗣

○求嗣ノ論及藥方諸書ニ載ストイヘ凡多ハ虚妄ノ事ノミ也啓益  
豊前ニ在シ時婦人古土冒貴草ト云双紙ヲ作テ印行ス今世間ニ行  
ル此書ニ求嗣ノ説委ク論ヲ載ス此書ヲ見テ求嗣ノ事ヲ知覺スヘ  
シ故ニ爰ニ略ス

○婦人求嗣ノ事ヲ欲セバ先ツ己ガ心行ヲ慎ミ第一ニ嫉妬ノ情ヲ  
發セズ夫婦共ニ和合シ病アラバ藥ヲ服シ虚損ヲ覺ヘバ夫婦共ニ  
上手ノ医師ニ診セラレテ其藏府ノ虚損ヲ補ヒ平日無病ナル時交  
合スベシ姪セズト云事ナシ



○下部虚寒スル婦人ハ妊ム事ナシ温泉ニ浴メ子宮煖マリ妊ム者多シ其國々ノ温泉タル所ニ行テ湯治スベシ其効多シ温泉ナキ所ニテハ當飯湯トテ當飯四五竹ヲ大釜ニテ煎シ居風呂桶ニ入テ浴スベシ此方奇々妙々

○陰虚シタル婦人ハ六味丸ヲ服シ妊ム事多シ

○精血清冷稟賦薄弱ナル夫婦共ニ固本健陽丹ヲ服シテ効ヲ得ル事多シ四卷

○求嗣ノ藥方諸書ニ載スル事夥シ考合テ用ベシサリナガラ多ハ損アリテ益ナシ只房室ヲミタリニ貪ルベカラズ夫婦ノ氣血充實スル時交合スレバ多ハ子ヲ生ズ子ナヤ者仕官ノ人ハ江戸詰ヲシ

商人ハ他國ヘ行テ數日逗留シ飯國メ交合スレバ夫婦共ニ氣血充實スル故ニ必ず壞妊ス是ヲ以テ知覺スベシ

### 妊 娠

○妊娠ハ多ハ脉ニ見ル、者也其脉狀諸書ニ詳也可参考惣テ若キ婦人一兩月モ經水不來時ハ妊娠アリヤト心ヲ付テ診脉スベシ妊娠ナレバ多ハ脉平和ニメ脉狀不疾者也ニ三ヶ月ニナレバ惡阻ノキガシアリテ惡心嘔吐万ノ食物ニ臭アリテ好惡ノ差別アル者也如是脉症共壞胎ニ窮リタラバ大藥ノ病ニハ服藥スベカラズ妊娠ノ疑似時ニ驗胎ノ方ヨリ逐月ノ護胎ノ方五ヶ月ノ帶ノ叟總テ産前諸病ノ議論婦人壽艸ノ中ニ委ク載タリ可参考



○妊婦ノ諸病ハ服藥ヲナサズメ可也サレニ大家富貴ノ人強テ服藥ノ事ヲ望ム者ニハ異功散ニ當飯砂仁黃芩ヲ加テ用ヨ或ハ回春ノ安胎丸ヲ用ベシ共ニ奇効アリ

○妊婦素ヨリ虛弱ニメ胎孕ヲ榮煖シ難者ニハ補中益氣湯ニ芍藥川芎砂仁黃芩ヲ加テ有奇効

○妊婦惡阻ノ症トテ月經止ルト其儘胸心惡ク臭ニ物ノ臭ウツリ甚キ者ハ嘔吐惡心ス多ハ三ヶ月マデノ煩ニメ其ヲ過レバ治セザレニ必ズ止ム者也人ニヨリテ五ヶ月ノ比マデモ止ヌ者モアリ多ハ藥ヲ用テモ効ナク或ハ煎藥ナドハウケツケズメ其マ、吐スル者アリ如是ナルニハ砂仁ヲ押シテ碎スリテ粒トナシテボツクトト

ツマスレバ藥ノ如クナクシテ能惡阻ノ症ヲ治スル也○惡阻ハ多ハ痰胸膈ニアル故也ニ陳湯ニ黃芩砂仁連翹ヲ加テ用ヨ有神効甚キ者ニハ前藥ニ黃連姜製少許ヲ加ヨ其効如神惡阻ノ藥ハ一點ヲ七分ホドノ分量ニメ一番煎バカリヲ用ベシ一度ニ少々ツ、與テ可也薑香ナドノ類惣テ臭ノアル藥ヲ用ユベカラス

○子煩ノ症ハ心神悶亂スル也ニ陳湯ニ半夏ヲ去テ麥門冬黃芩砂仁竹葉ヲ加テ有効

○子癩ノ症ハ產婦ノ大由症也口噤クシムミ眼目吊釣スル也羚羊角散ニ出ツ子癩ヲ用ベシ子癩ノ催アル時ニ此方ヲ用レバ多ハ收ル也○子癩ノツヨキ症ハ癩癩ノ病ノ如ク反吊シ疾喘急促類ニ齒ヲ咬ミ口



嗽眼目吊釣スル類ニハ光ツ其標ヲ治スベシ家傳神通ノ振葉ヲ用  
ヒニ疎湯ニ姜製ノ黃連釣藤釣ヲ用ベシ其効如神疾喘退キ其病勢  
少ク收リタル時ニ羚羊角散ヲ用ベシ子癩ノ治方ニハ種々手皴多  
シ口授心傳ノ大秘也子癩ノ症ニ類ニ齒ヲ鼓シ牙ヲカミ舌ヲ出  
シ病勢ツヨキ者舌ヲカミ切テ死スル事アリ如是キビシキ症ニハ  
木綿ノ小手拭ヲカマセテ置ベシ必ズ舌ヲクヒ切ノ患ナシ何程勢  
ツヨキ子癩ノ症モ子産ルレバ必收ルモノナレバ何トゾシテ子ヲ  
生ズル手皴ヲナスベシ是ニ至テ口授心傳アリ其人ニ非ザレバ傳  
ル事ナカレ可秘

○子懸ノ症トテ胎動ニヨツテ心胃脹痛スル也紫蘘和氣飲ヲ用ヨ

惣テ産前ノ諸病ニハ此方ニ因テ可加減

○子腫ノ症ハ妊婦ノ面目虛浮スル也多ハ脾胃虛弱ニ屬スル也補  
中益氣湯ニ黃芩沢瀉砂仁ヲ加ヘテ用ヨ或ハ六君子湯ニ黃芩砂仁  
沢瀉ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

○子氣ノ症ハ兩足浮腫スル也夏月ノ妊娠ハ十ニメ八九ハ腰足必  
腫ル者也皆脾氣虛弱ナル故也補中益氣湯ニ車前子沢瀉ヲ加ヘ或  
ハ異功散ニ當歸升麻車前子ヲ加ヘ或ハ回春子氣ノ主方モ可也共  
ニ有効

○子淋ハ小便澁少也ニ味安飴飲白朮ニ赤茯苓木通車前子麥門冬淡  
竹葉ヲ加テ有奇効此方ヲ四五貼用テモ効ナクンハ紫蘘和氣飲ヲ



用ベシ是ニテモ効ナクンバ胎氣下墜ノ膀胱ヲ妨ゲル故也升提ノ劑ニ宜シ  
補中益氣湯ニ唐防風茯苓車前ヲ加ヘ或ハ升陽益胃湯ニ加減シ或  
ハ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ此胡山梔子防風ヲ加テ用ヨ元氣  
ニ升メ小便自ラ快通スル也是大秘事也議論委ク方考ノ升陽益胃湯ノ條ニ載ス可參考  
○胎動スルニ因テ妊婦ノ諸病ヲ生ズ紫蘇和氣飲ヲ用テ胎ヲ安ン  
ズレバ諸病自ラ愈ルナリ

○轉胞ハ卒ニ小便スル事ヲ得ザル也ニ味、安胎飲ニ冬葵子木通  
滑石ヲ加テ用ヨ其効如神回春ノ轉脬ノ主方モ可也如是ニモモ通  
ジ難ニハニ陳湯ニ瓜蒂ヲ加テ煎服シ鳥羽ヲ喉ニ入テ搜レバ痰ヲ  
吐出メ小便自ラ通ズ此法尤妙也如是ニモモ通ジ兼ハ補中益氣湯

ニ防風羌活ヲ加テ中氣ヲ上提スレバ其効如神

○妊婦ノ崩漏ハ産ニ屬ス血卒ニ漏下スル也芎藭湯ヲ用ベシ或ハ  
膠艾四物湯ノ類ヲ用ヨ共ニ有神効甚キ者ハ人衰ヲ不知口噤スル  
也獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無可有ノ地ニカハスベシ此手段ニ口授心  
傳ノ秘アリ其人ニアラズンバ傳事ナカレ可秘

○妊婦ノ諸病夫々ニ因テ治スベシ但胎禁ノ藥物ニ心ヲ付テ治ヲ  
施スベシ妊婦ノ傷寒妊婦ノ瘧妊婦ノ食傷ノ類ハ剛暴ノ病ナレバ  
胎禁ノ藥ヲ厭テ治ヲ緩々ニスレバ却テ邪熱ノ爲ニ胎ヲ落サルハ  
衰ナレバ其門々ノ藥方ノ條ヲ考テ治スベシ素問ニ故アレバ無損  
トアリ能々此理ヲサトリテ治スベシ妊婦五ヶ月マデ胎落チ安キ



若ナレバ必ズ胎禁ノ藥物ヲ斟酌スベシ六ヶ月ノ後ハ胎モ健ナレ  
バ胎禁ノ藥ニ中テモ墮胎ノ患ナシ殊ニ元ヤ産月ノ時ニハ胎禁ノ  
藥ト云フ事ハナシ然レ大毒ノ類ノ藥物ハ斟酌スベシ是口授心傳  
ノ秘也

### 小産

○小産ハ五ヶ月マデノ中ニ必ズ保養ノ法ニ背キ或ハ虛弱ノ人其  
胎ヲ保ツ支アタハズメ墮ル也古人云小産ハ大産ヨリ重シ大産ハ  
粟ノ熟メ自脱スルガゴトシ小産ハ生栗ヲ採テ其皮壳ヲ破リ其根  
蒂ヲ断ガ如ク自然ノ支ニアラズト云テ大切ノ支トナセリ保銀將<sup>キツ</sup>  
息大産ヨリ十倍スベシ

○小産氣虛シ血下支不止モノハ回春補氣養血湯ヲ用ベシ此其大  
概也

○小産瘀血アツテ心腹疼痛惡寒發熱スルニハ補血定痛湯ヲ用ベ  
シ此ニ方小産ヲ治スルノ常法也

○小産血下スル事過多ナレバ入支ヲ不省口噤<sup>ケイ</sup>痰<sup>ヒョウ</sup>癱<sup>クワ</sup>搦<sup>クワ</sup>天<sup>クワ</sup>吊<sup>クワ</sup>ノ<sup>クワ</sup>瘞<sup>クワ</sup>  
病ノ如ク破傷風ノ如シ如是ナル時ハ先ツ蒼朮湯龍王湯白朝散十  
五味湯ノ類ニ入参ヲ倍加シ見合テ用ベシ血暈ヤミ痰癱ヤミテ補  
氣養血湯ヲ用ベシ虛甚クメ前証ヲ見サバ獨參湯ヲ用ヒ蒼朮湯ト  
互ニ用レバ正氣服メ其効如神

○小産ノ後血熱アツテ不止或ハ寒熱往來セバ增損四物湯ヲ用ヨ



其効如神

○小産下血四五日モ不止者ニハ膠艾四物湯ヲ用ベシ其効如神

○誤テ毒物ヲ食シ或ハ毒藥ヲ服メ胎ヲ墮ス者腹痛メ不可忍或ハ

其胎未墜者口噤手強自汗痲痲似中風者毒物ノ致ス所也九死一生

ノ病也世医多ク不識風トナシテ之ヲ治スレバ必ス死スル也白扁

豆一味濃煎メ用レバ其病立処ニ愈ル也是大秘藏ノ事也榕益經歌

ノ靈方ニメ世医ノ不知処ナリ此一味ノ應驗微妙ノ義理存ス口授

心傳ノ大秘事也

○小産後諸症退キテハ氣血ヲ補フベシハ物湯大補湯ノ類ニ加減

メ用ヨ又ハ逍遙散ニ加減メ用ヨ脾胃虚弱ノ婦又ハ毒藥毒物ニヨ

ツテ小産シタル後ハ補中益氣湯ニ白扁豆ヲ加テ調理スベシ

○小産後腹痛泄瀉スルニハ六君子湯ニ白扁豆砂仁ヲ加テ用ヨ又

ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ヨ其効如神

産 育

○産育ハ臨産ノ事諸書ニ詳也婦人壽艸ニ委ク其手ぬヲ書載タリ

常ニ此書ヲ讀テ其事ヲ究メ置ベキナリ

○産婦ヲ医ニ委子頼時ハ臨月ニ入ラバ預メ藥ヲ調合メ病家ニ畜

ヘサセ置ベシ芎藭湯紫蘇和氣飲蒼朮湯安神散等ノ藥方ニソレソ

レノ用ヒマウ又ハ用ル時節ヲモ上包ニ書付置ベシ出産ノ夜ハ昼

夜ヲ不弁者ナレバ頼委子タル医在宿ヒザル時モ此藥ヲ用ヒ其間



ニ医モ飯来テ其手ツカヒ能アリ朝鮮ノ好人参ヲ病家ニ調ヘ置スベキ也

○産婦臨月ニ腰腹痛ム事アラバ先ツ紫蘇和氣飲ヲ用テ見合スヘシ脉六至已上ニメ胎谷道ノ邊ニ來リ疼痛頻ニメ漿水破レ下ラバ芍飯湯ヲ用ヨ即産下スル也是平産也

○催生ノ方ハ産セントメ胎産門ニ來リ至リ兎ノ頭ヲ見ハメ少時モ出難キ時ニ平胃散ニ滑石冬葵子ヲ加テ用ヨ忽ニ産下スル也和俗ハ産ノ氣付クト其マ、医ニ催生藥ヲ乞ヘ厄卒爾ニ催生ノ劑ヲ用ル事無シ催生ノ方ハ兎ノ頭産門ニ至ラズンバ用ル事ナカレト姑婆ノ類類ニ催生ノ方ヲ乞望ナラバ紫蘇和氣飲ヲ用テ見合スベシ

口授心傳ノ秘也

○妊婦産セント必メ痛蹙カニメ三四日モ産セズ破水先ヅ下リテ産スル事ナケレバ産門乾キ決リテ難産トナル破水下テ一日モ産スル事ナケレバ實体ナル者ニハ五積散ニ加減メ用ベシ破水大分下ルハ多ハ氣脱ナレバ補中益氣湯ニ酒芍藥川芎木香ヲ加テ用ヒ何日ニテモ産ノアルヲ待ベシ如是レバ漿水又滋生メ産道潤ヒ出テ産シ易キ也此大秘要也

○生産十症ト云フ事諸ノ医書ニ詳ニ載タリ可参考

○難産ニ變ジ横産側産ノ類ニハ紫蘇和氣飲ニ人參ヲ倍加メ用ヨ蛇脫衣一錢焙テ細末メ酒ニテ可用有効



○難産死胎不下者ニ麝香五分官桂三分細末ニ黄酒ニテ用ベシ其効如神

○胎腹中ニ死テ疼痛メ母死ント欲スルニ鹿角ノ黒燒ヲ酒ニテ服メ其効如神○又一方熊胆五分水煎服スベシ其効如神

○難産ニ伏龍肝百草霜滑石冬葵子甘草細末メ芍飯湯ニテ服スレバ其効如神

産後

○産後ノ脉ハ緩滑沈細ニ宜シ實大弦牢瀯疾ハ皆厄也

○産後ノ症先虚實ヲ不問古芍飯湯ヲ用ベシ陳皮人参ヲ加ハ紅花少許ヲ加テ用ヨ其効如神産後ハ何ホト容易ノ産ニテモ血脫スレ

バ産落スト其マ、芍飯湯ヲ用ベシ人参ヲ加ヘテ氣ヲ補フベシ陳皮ヲ加テ藥滯ヲメグラシ紅花少許ヲ加テ用レバ瘀血ヲメヲイ順スニ因テ此方ノ藥驗如神

○産ニハ芍飯調血飲ヲ用ベシ古芍飯湯ヲ用ル事一日許ニメ後ニ芍飯調血飲ヲ用ユベシ加減委ク方考ニ載ス可参考

○産弱ノ婦人ノ産後ニハ飯水保産湯ニ加減メ用ユベシ方考ニ載ス可参考

○産後ノ血暈ニハ先ツ虚實ヲ不問蒼菜湯ヲ振出テ用ヨ或ハ白朝散十五味湯龍王湯ノ類ヲ見合テ振出メ用ベシ又ハ東垣ノ全生活血湯ヲ煎テ用ヨ此五種ノ藥方ハ用ニ口傳多シ産後ノ血暈ニ世医



多ハ童便ヲ用テ血熱ヲ下スト云テ推ナベテ童便ヲ用也血熱實ニ  
属スル者ハ可也虚熱ニ属スル者ニハ全生活血湯ヲ用ベシ奪ク此  
議論方考ニ載ス可参考

○産後大ニ脱血スレバ血暈メ不知人事者ハ必死ス急ニ救ベシ大  
料ノ獨參湯ヲ用ベシ若口噤テ牙齒不開藥汁不入ハ獨參湯ヲバ鼻  
ノ穴ニ吹入ルベシ咽ニ通テ則甦ルナリ緩々ニスレバ必ズ死スル  
ナリ是故ニ産前ヨリ獨參湯ヲ煎シ置ベキ也産下メ一時ニ時ノ間  
ニ大ニ脱血スレバ必ズ血暈メ多ハ言語シナガラ即死メ不救者多  
シ此時ハ大料ノ獨參湯三カヨリ五カニ至ル  
ベシ分量多少口嚼ナラデハ別ニ治方アラズ陽旺  
バレバ陰長シ氣ニ因テ血生ス口授心得ノ議論アリ其人ニ非ズン

バ磚ル事ナカレ可秘

○産後胞衣不下ノ症ハ急症也産下スルト半時ホド過テ下ルヨシ  
一時ノ茶モ不下時ハ芎藭飯湯ニ肉桂ヲ加テ用ヨ有効半日或ハ一兩  
日モ不下モアリ一時ノ余モ不下ハ芎藭飯湯ニ平胃散ヲ合シ滑石百  
霜草冬葵子ヲ加テ押下スベシ如是メモ不下時ハ先ツ臍帶ヲ断ニ  
服藥スベシ此治法緩々ナレバ腹脹滿シ心胸ニ冲上テ喘急メ急ニ  
至ル也臍帶ヲ断テ後モ不下者ハアレヒソレハ急ニ度症出ル事ナ  
シ産婦ニヨリテ胞衣不下事數日ニメ瘀血下ニ從テ水母ナトヲ刻  
ミタル如クニナリテ下ル者アリ産母ニヨク教ヘサトシテ心安事  
ト知シメテ補氣養血ノ劑ヲ用テ置時ハ自然ニ下ル也



○胞衣不下心腹疼痛シ叫喚メ隣ヲ動ス類ノ者ニ熊胆五分或一錢水煎服スベシ立チ死ニ下ル也奇々妙々可秘

○産後ノ児枕痛ニハ失笑散ヲ温水ニテ服スベシ或ハ菘菜湯ニ紅花蘇木乳香沒藥玄胡索ヲ加テ用ヨ有神効

○産後惡露不盡腰腹少腹疼痛スル者ニハ芎藭飯湯ニ玄胡索蒲黃乳香沒藥五靈脂烏藥紅花ヲ加テ用ヨ其効如神

○産後崩漏不止者ハ膠艾四物湯ヲ服スベシ有神効

○産後寒熱往來シ其寒如氷其熱如烘ナルニハ增損四物湯ヲ用ヨ其効如神

○産後血熱不止者ニ增損四物湯ヲ用テモ不止者ハ當飯補血湯ヲ

用ベシ其効如神如是方ヲ用テモ効ナキ時ハ全生括血湯ヲ一匙服スレバ其効如神可秘

○産後或ハ小産後四五日ノ後寒熱往來謔言妄語病知氣ニ似タル者ハ熱入血室ノ症也四物湯ニ小茈胡湯ヲ合シ桃仁紅花ヲ加ヘテ用ヨ其効如神

○産後血熱ノ症ニ增損四物湯全生括血湯一名當飯補血湯ノ類ヲ見合

テ用ヒ其熱大半退キ余熱アツテ薄勞トナラント欲スル者ニハ加味逍遙散ヲ用ヒヨ咳嗽アラバ滋陰至宝湯ヲ用ヨ其ニ有神効

○産後ノ腹痛ハ多ハ瘀血也瘀血ヲ追退クルノ劑ヲ用テモ不止時ハ當飯建中湯ヲ用ヨ其効如神外ニハ陳艾ヲ土器ヲ以テ焙乾シ絹



ニ包ミテ臍ノ上ヲ熨スベシ艾ノ氣口中ニ通ジテ其痛止処ニ止ム也  
也經方此方類ニ試テ有効可秘

○産後泄瀉ハ脾胃虚也芍薬湯ニ六君子湯ヲ合シ白扁豆乾姜ヲ加テ用ヨ有奇効無効ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ユベシ其効如神

○産後中風口眼喎斜手足牽引セバ氣血虚メ風ニ中ルナリ四物湯ニ烏藥順氣散ヲ合メ用ベシ蕪花地黄湯ヲ用ル亦有効○産後小産後血虚シ産病トナルモ又前ノニ方ニ加減メ用ヨ有神効

○産後血虚竭メ大便秘結スル者ハ四物湯ニ枳殼麻仁桃仁厚朴紅花烏藥黃芩ヲ加テ用ヨ其効如神

○産後尿秘メ不通ニ去白ノ陳皮ノ細末ヲ温酒ニテ一ニ錢ヲ服ス

レバ即通ス奇々妙々可秘強不思ガ方ナリ

○産後ノ浮腫ハ多ハ脾胃中ノ血虚也補中益氣湯艾苓草前子木香砂仁ヲ加テ其効如神補中治濕湯モ可也如是ノ方ヲ用テモ効ナキ時ハ加減金匱腎氣丸ヲ用ヨ其効如神

○産後十九症ト云事アリ四本此其ヲ常ニ能考ヘ讀覽テ議論ヲ極ムベシ又ハ婦人壽草ノ産後ノ卷ヲ常ニ讀覽テ諸ノ手段ヲ能心得テ産後ノ療治ヲナスベシ不可忽也

○産後ノ諸病ハ丹溪ノ説ノ如ク氣血ヲ補ヲ以テ本トメ余ノ雜症ハ標ヲ以テ治スベシ是故ニ芍薬調血飲ニ加減メ用ベシ回春ニ委ク加減ヲ載タリ飯木保産湯モ亦有効壽世保元ニ加減ヲ委ク載タ



リニ方共ニ龔氏ガ方ナレニ其中ニ保產湯ハ虛弱稟賦ノ婦人ニ宜シ調血飲ハ實体ノ婦人ニ宜シ此ニ方加減メ用ユル時ハ雖不中不遠ノ義也余ノ雜病ハソレノ門ニ因テ見合テ可施治也

### 乳病

○婦人ノ乳病ハ多ハ肝經ノ怒火ヨリ發スル也乳汁不通ハ結核自成也此結核久ク不消ハ結ノ乳癰トナル初メ結核ヲナシテ寒熱ヲ發セバ速カニ揉ヤワラゲテ散ズレバ乳汁亦通テ結核自ラ消スル也

○乳汁不通メ寒熱往來メ結核ヲ生ゼバ小茈胡湯ニ白芷青皮木通赤芍藥連翹貝母天花粉ヲ加テ用ヨ其効如神

○乳汁不通ニ先ツ不問虛實木梳ヲ以テ頻ニ乳房ヲカキ刮リ湧泉散ヲ服スベシ四尋

○乳病結核アツテ乳癰トナラント欲スル者ニハ白芷貝母各ニ味細末メ温酒ニテ送リ下スベシ其効如神

○乳癰初發ニ青蘗葉白芷防風黃芩連翹生甘草節各等分水煎温服メ外ニハ生天南星黃柏ノ細末ヲ糊ニ押マゼテ貼クベシ其効如神

○乳吹ノ症トテ小兒ノ口氣ニ吹レテ腫痛スル也貝母ノ細末ヲ服シ又ハ鼻中ニ吹入レバ立効ニ効アリ○半夏ヲ細末酒ニテ服スレバ立効ニ効アリ鼻中ニ吹入レ可也外ニハ葱白ヲ搗テ餅トナシ一指ノ厚サ乳ノ上ニヒロゲテ灰火ヲ用テ葱ノ上ヲ熨ス煖更ニメ汗



出テ腫痛立処ニ消ス

○婦人ノ乳汁不出ニ露蜂房熟地黄各等分黑燒ニメ糊ニテ丸梧桐子ノ大サニメ毎服五十九大麥ノ煮タル湯ニテ用レバニ七日ノ中ニ乳汁出テ如湧奇々妙々可秘此方啓益常ニ用テ取驗也紫陽ノ野人ノ所傳也

○婦人氣血マサニ盛ニメ乳房腫痛シ或小兒死メ乳ヲ飲事アラズ或ハ乳母ヲ置テ寶母ノ乳ヲ小兒飲事ナケレバ陽明實メ乳房腫痛スル也麥芽一味每一錢五分水煎メ服スレバ其乳腫立処ニ消スル也奇々妙々

○婦人小産後或ハ産後ニ其兒死スレバ乳汁ヲ斷ン事ヲ欲ス必其時ハ腫痛ヲナス也乳汁ヲアゲン事ヲ乞時ニ麥芽一味ニ分木煎シ服スレバ長ク乳汁ヲ斷也

○乳癰乳岩ノ症初発ニハ十六味流氣飲ヲ用ベシ多ハ消散スル也破テ後岩<sup>石</sup>四ノ如ナルニハ加味逍遙散ニ連翹青皮ヲ加テ用ヨ或ハ清肝益榮湯芪胡耆肝湯ヲ用ヨ或ハ五積散ヲ用ヨ共ニ有奇効無効時ハ加味飯脾湯ニ連翹青皮ヲ加テ有奇効

婦人陰病

○婦人ノ陰中ニ瘡ヲ生ズルハ男子ノ下疳瘡ニ同ジ多ハ龍胆泻肝湯ニ加減メ用ベシ甚キ者ハ防風通聖散ニ加減メ用ユベシ  
○血海類ニ疼痛スル者アリ東垣ノ烏藥湯ヲ用ヨ其効如神



○陰門腫痛スル者ニハ龍胆泻肝湯ヲ用ヒ外ニハ小麥朴硝白礬五倍子葱白等分水煎シ頻ニ洗ベシ其効如神

○陰門痒者濕熱ニメ虫ヲ生テ陰戸ヲ蝕ム也小茺胡湯ニ山梔子龍胆連翹ヲ加テ有効外ハ蛇床子白礬ヲ水煎メ頻ニ洗ベシ或ハ沢蘭

枯礬ヲ用テ水煎メ洗ベシ有効又加味飯脾湯ヲ用ルモ有奇効

○陰門痒メ痛ミ不時水ヲ出スニハ加味飯脾湯ニ宜シ有奇効

○陰門寒冷ニメ帶下ヲ生ズル者ニハ八味丸料ヲ用ヨ有神効

○陰門ヨリ一ツノ肉ヲ挺出スル病アリ陰挺ノ證ト名ク先ツ龍胆泻肝湯ヲ用テ濕熱ヲ去リ後ニ加味飯脾湯ヲ用ヒ或ハ補中益氣湯ニ山梔子牡丹皮茯苓川芎黃柏ヲ加テ用ヨ其肉自ヲ消スル也

○婦人交接スル毎ニ血ヲ出シ痛ヲナス症アリ此肝經ノ虛火解ヲ動メ血ヲ投スル事アタワズノ血ヲ出ス也補中益氣湯ニ芍藥川芎防風ヲ加テ用ヒ或ハ加味飯脾湯ヲ用ヨ共ニ有神効

○婦人陰門時々有聲轉失氣ノ如クナルヲ陰吹ト名ク此症ハ久ク帶下ヲ患ヒ或ハ産後血脫ノ後ニ必多キ症也加味飯脾湯ニ用ベシ有神効啓益常ニ此症ヲ治スルニ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ當飯川芎遠志防風黃芪ヲ加テ用奇効アリ大秘製也医按委ク遊豊司命録ニ載ス可参考

○婦人陰風ノ症アルニ男子交接スレバ其風男子ノ陰毛ニ傳染ノ身中ニハビコリ鬢毛眉毛マデノ喰ヒ落メ大風ノ形ノ如クニ到ル



者也婦人此症アラバ草烏頭一味水煎ノ類リニ陰門ヲ洗ヒ雄黃ノ細末ヲ綿ニ包ミテ陰門ノ内ニ入テ半日許ホドヅ、置幸一七日ナレバ其虱多ハ死スル也男子痔瘡シタルニモ草烏頭ノ煎湯ニラ洗ベシ其後ニ沉香<sup>キヤウ</sup>奇南香ノ類ニテ薰ズベシ其虱忽死スル也奇妙ノ事也

### 小兒總論

○小兒三歲ヨリ以下ハ脉ヲ診スル事アラズ病アラバ男子ハ左女子ハ右ノ手ノ虎口ノ三關ヲ見テ其病ヲ知ルベシ三關トハ手ノ第一指ヲ見ルニ第一節ヲ風關ト名ク第二節ヲ氣關ト名ク第三節ヲ命關ト名ク此三關ニ見ル、所ノ筋ノ紋ノ色ヲ見テ病ヲ知ル也紫

ナルハ熱ニ属シ紅ナル者ハ寒ニ属シ青者ハ驚風白キ者ハ疳黒キ者ハ中惡黃ナル者ハ脾胃ノ困也若風關ニ見ル、者ハ其病輕シ氣關ニ見ル、者ハ其病重シ命關ヲ過ル者ハ治シ難シト知ルベシ

○小兒三歲以上ハ医ノ一指ヲ用テ寸關尺ノ三部ヲ按シ診スベシ常ニ六七至ヲ以テ法トス小兒ハ純陽ノ者ナレバ其脉至テ急速ナル者也六七至ヨリ増スル時ハ熱トシ減ズル時ハ寒トシ浮洪ハ風熱盛也數ナル時ハ驚風沉遲ヲ虛トシ沉實ハ積トスル也此其大概也諸ノ方書ノ小兒門ニテ可考

○初生ノ小兒ニハ黃連甘<sup>クセントウ</sup>枳<sup>キノチ</sup>冬根<sup>トウ</sup>各等分紅<sup>モミ</sup>ノ綿ニ包ミテ煎湯ニヒタシ其汁ヲ飲シメ乳マメノ如クニノスワシムベシ委ク予ガ著



所ノ小兒育艸ニ詳ニシルス也平日此書ヲ讀テ初生ノ小兒ノ艱育ノ法ヲ知ルベシ

○小兒ノ初生十四五日ノ後吐乳スル事アラバ病ノキザスト知テニ味湯ニ黄連丁子連翹ヲ加テ用ベシ

○小兒ハ大小便サヘ滞リナクヒタト通ズレバ病ナシト知ルベシ少ニテモ大小便ノ通ジ滞ルナラバ病アリト知ルベシ小兒科ノ家傳ニハ時々下シヲ用テ大便ヲ通ズル者アリ是モ亦一術ナリ

○小兒大小便通ズル事カタク腹脹ル者ニハ升發ニ陳湯ニ加減ノ用ヨニ陳湯ニ升麻芪胡ヲ加ヘタル方也此漢ノ妙方也

○小兒吐乳セバ先ヅニ陳湯ニ砂仁連翹黃連ヲ加テ用ヨ吐乳ニ連

翹ヲ加ル事大秘密ノ事也其理意味深長ナル事也其入ニ非ンバ傳ル事ナカレ

○小兒ノ諸病ハ多ハ乳食ヨリ發スルト知ルベシ小兒ノ情ハ別ニナク飲食ノ事ヨリ外他ノ事ナシ是故ニ皆食ニ破ル病ト心得ベキ也

○小兒ニハ無病ナレ凡家傳ノ保童圓ヲ用ル事一ヶ月ニ十日カ十五日カ用レバ食ヲ化シ疳虫ヲ除キ滞ル所ノ臟垢ヲ除キテ病ナキナリ

○小兒ノ病ニハ始ニ論ズル如ク食ヨリ發ノ疾ヲ兼ル事多ケレバニ陳湯ニ加減ノ用ヒ或ハ神通丸保和丸等ヲ用ユベキナリ



○小兒諸病多ハ大人ニ同ジケレバ其門々ニ依テ見合テ治ヲ施ス  
ベシ祖劑ノ多少アリ加減アリ是ニ口授心傳多シ可秘

### 驚風

○驚風ノ症ニ種アリ急驚風アリ慢驚風アリ急驚風ノ症ハ牙關  
緊急熱甚ク頬赤ク上竄直視シ涎潮ノ如ク涌出ル痰喘急速ニメ手  
足搐搦反張シ顫動シ唇口紅ヒニ眉根引ツリ口中燒ガ如ク大小  
便閉結シ其脉浮洪數緊也是陽症ニメ内ニ實熱アリ風ヲ扶ム者ハ  
先ヅ敗毒散四春急驚風方ノ加減ヲ用テ風ヲ驅テ搐搦自ラ收ル也痰熱ニ因  
テ急驚ヲ見サバニ陳湯ニ牛胆南星天麻釣藤鉤ヲ加テ用ヨ或ハ靈  
砂丹四春ヲ用或ハ万應丸ヲ用テ下メ利ヲ得ル事多シ小兒科其家々

ニ傳ル所ノ下ノ方ニ奇妙ナル多シ万應丸ハ四春小兒ノ通治ニ見  
ヘタリ

○瘡疹或ハ痘瘡出ント欲スル前ニ必ズ大熱ヲ發シ搐搦反張スル  
事度々ナラハ下ノ利アリ下時ハ熱鮮利ノ其痘其疹自ラ出テ熱鮮  
メ搗定ル也

○下ノ方ニ蜈蚣全蝎巴豆牛胆南星朱砂牛黄麝香龍腦姜蚕夜明砂  
ヲ細末メ錠子トナシ或ハ丸トナシ金箔ヲ衣トメ用其効奇々妙々  
ニメ言難シ分量口傳アリ

○急驚下ノ後或ハ風ヲ驅テ後急症退ハニ陳湯ニ南星砂仁扁豆ヲ  
加テ用ベシ葱ヲ毒藥ヲ用テ病ヲ退タル後ノ調理ニハ必扁豆ヲ用



ベシ此我家ノ大秘也

○慢驚風ノ症ハ或ハ病後吐瀉シ或ハ藥餌ニヨツテ脾胃虚損シ四肢逆冷口鼻ノ氣微ニメ手足痲痺シ昏睡メ晴ヲ露ス此脾虚ノ風ヲ生ズ無陽ノ症ニメ中氣虚損不足ノ病也故ニ急驚風ハ急危ノ症ナレバ實ニ属スレバ治シ安キナリ慢驚風ハ緩々タル症ニメ急ニ変症ハナケレバ不足ニ属スレハ治シ難キ也

○慢驚風ヲ治セバ醒脾散醒脾散ニ加減メ用ヘシ

○慢驚風ヲ治スルニ啓益常ニ錢氏白朮散ニ陳皮砂仁扁豆天麻釣藤鈎ヲ加テ此煎湯ニテ家傳保童園ヲ送り下セヨ大麻鈎藤鈎ヲ加ルニ妙アリ脾胃甚弱キ者ニハ四君子湯ニ黄耆天麻ヲ加ヘ甚虚弱

ナラバ補中益氣湯ニ天麻鈎藤鈎ヲ加テ共ニ家傳保童園ヲ用ヨ奇々妙々也

○惣テ急驚風ニテモ慢驚風ニテモ病退テ後ハ調理スベシ六君子湯ニ天麻砂仁當歸ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯或ハ異効散ヲ用ベシ小兒ノ調理ニハ四君子湯異効散ノ類ニ宜シ藥味ノ品スクナキガヨキ也小兒ノ藥ハ少服ナレバ藥品多キ方ハ藥氣ウスクシテ効ヲ取リ難キ也是極秘ノ方也京師ノ一リノ大医或公家衆ノ小兒ノ服滿ヲ治スル時ニ二十四味流氣飲ヲ用ヒラレタルアリ可笑

疳疾

○小兒ノ疳疾ニ五種アリ皮黃肌瘦髮直尿白肚大ニメ青筋アリ好



テ食ヲ欲シ泥土炭茶生米ノ類ヲ好ミ食シ或ハ吐シ或ハ泄シ或ハ  
大便堅硬秘塞シ腹内ニ積塊アツテ諸虫トナツテ怪キ病ヲナス也  
是皆乳母ノ搗糲法ニソムキ其熱乳ヲ飲シムレバ疳虫ヲ生テ怪キ  
症ヲナス也又ハ久ク吐乳ヲナシ久泻久痢ノ後久瘡久咳下血久瘡  
後皆津液亡テ燥熱ヲ生ジ其濕熱ニ依テ虫ヲ生ノ怪キ病トナル  
ナリ漸ク飲食ヲナス時ニ至リテ酒肉油膩アブラノ物生冷硬物凉水西瓜  
甜瓜红柿糯米砂糖饅頭ノ類ヲ過食シ脾胃ニ積テ久キ時ハ濕熱ト  
ナツテ疳虫ヲ生ズルナリ先ヅ大槩ハ回春ノ消疳湯ニ加減ノ用ヒ  
消疳丸回春家傳保童圓ヲ用ユベシ其効如神

○小兒ノ疳疾ニハ多ハ肥兒丸回春味肥兒丸ヲ用ベシ多ハ煎湯ヨ

リ丸藥ニ利アリ

○疳疾ハ多ハ脾胃ノ實熱ナレバ如何ホトニ瘦ツカレタリ疳積菜

ニ益アラズ只虫ヲ殺ス劑ヲ用ベシゴウソウ赤セキ蘇ソ枏マノ虫常山ノ虫山

蠶漆菜此毒菜製法口傳三稜菝葜木胡黃連牛黃此製法山查肉丁子人參使君子

ヲ調合口傳瓦罏ニ入テ黑燒ニメ塩屋ノ煤スヲ加テ細末シ丸ジ用ヨ或

ハ土用烏ノ黑燒ヲ加ルモヨシ此方ハ奇妙ノ方也去レ疳虛症ノ小

兒ニ用ヒガタシ能々見合テ用ユベシ村上一味膏ガ傳也

○疳疾ニハ多ハ保童圓ヲ用テ吉也眼ニ疳氣アラワレ赤腫驗赤キ

類ニ保童圓ヲ異功散ノ煎湯ニテ用レバ神効アリ

○疳疾咽渴ノ湯水ヲ多ク飲者ニハ錢氏白木散ニテ保童圓ヲ用ヨ



有神効

○疔疾形体紫瘦シ眼赤ク或ハ白膜眼ヲ遮ル者ニハ保童圓ヲ細末ノ鱈魚ノ肉ヲ炙テ此細末ニ鱈魚ニツケテニ切ホドツ、食スベシ或ハ鱈魚ノ腸ヲ香油ニテ煎テ食セシムルモ其効如神

癰疾

○癰疾ハ乳哺慎マザルニ因テ積聚ノ致ス所也此症初ニハ河脇ニ積癰ノ寒熱往來シ飲食減少ス淨府湯ニ加減メ用ベシ有神効

○此症ニ治法大瘰疬疾ニ同ジ肥兒丸磨積圓保童圓消疳九千金消疳丸ノ類見合テ可用

○總テ癰疾ニハ小兒科其家々ニ傳ル所ノ消癰ノ藥アリ多クハ峻

急ノ毒藥也全蝎斑猫蟻虫礞砂紅娘子水蛭ナドノ類ヲ用ル也是ホドノ症ニ小兒科ニ委テ若スベシ加減ナル症ヲ虛實ヲ不問此等ノ類ノ強劑ヲ過服シ脾胃虛損メ救ハザルニ至ル如是ノ強劑ニテ脾胃虛損セバ朝ニ補中益氣湯六君子湯ノ類ニ加減メ用ヒ夕ニハ保童圓千金消癰丸ノ類ヲ用ベシ有神効或ハ強劑ヲ過服メ泄瀉スルニハ錢氏白朮散ニ陳皮白扁豆砂仁ヲ加テ其効如神  
○小兒ノ癰疾寒熱アツテ或ハ間日ニ發シ或ハ毎日發スル者アリ是ヲ和裕カタカイト名ク淨府湯或ハ七味清脾湯ニ加減メ用ヨ其効如神家傳神通丸ヲ用テ奇々妙々

小兒雜病



○小児ノ病弄舌トテ頻ニ舌ヲ出ノピロツカスル事有皆心熱ノ致  
ス所也ニ陳湯ニ黃連薄荷ヲ加テ用ヨ或ハ錢氏白朮散ニ黃連栝  
ヲ加テ用ヨ有神効

○小児時アツテ發熱シ天吊スルニ釣藤鈎散四春小兒  
新病ニ出ヲ用ヨ有神効

○小児ノ夜啼不止ハ心熱ニ属ス黃連朱砂ノ細末ヲ水ニテ用ヨ或  
ハ乳頭ニ右ノ細末ヲツケテ児ノ口ニテ吮スシメヨ有奇効小児ノ夜  
啼ハ夜啼鬼トテ鬼崇アルニ似タリ必祝由科ニ因テマジナハバ即  
止也不可疑諸ノ匠書ニモ其術ヲ載タリ和俗ニモ種々ノ術ヲ覺テ  
祝由スル也匠書ニ載タリト雖匠醫師タラン者必ス祝由ノ術ヲナ  
スヘカラス祝由ニ本朝ニモ一科アツテ主之可慎也

○驚口瘡ハ和俗舌シトギト云小児ノ口中白ノ驚ノ口ニ似タレバ  
也是胃熱也清胃散ニ加減メ用ヨ又ハ牛黃散和ニ宜シ或ハ升麻葛  
根湯ニ栝棟黃連連翹ヲ加テ其効如神又小児ノ口瘡ヲ治スルニ黃  
連ノ細末ヲ蜜ニ調テ貼之或ハ黃連ノ細末ヲ寒中ノ雪水ニテ餅テ  
付レバ其効如神寒中ニ雪降時其雪ヲ磁ツ器ホニ押付テ入テ口ヲ封メ  
畜レバ水トナル其水ヲ取テ用ル事多シ匠師タラン者必畜ヘ置ベ  
キ也

○重舌ノ症ハ和俗小舌ト云舌ノ下ニ又舌ノ形ノ如クナル肉ヲ生  
ズル也是病ハ心脾ノ熱也重舌出來レバ必唇口ノ兩側ニ瘡ヲ生ズ  
ル事アリ又木舌ノ症トテ舌硬ク腫テ柔和ナラザルアリ是亦心脾



ノ實火ナリニ病共ニ當飯連翹湯ヲ用ヨ細甚キ者ハ黃連解毒湯防  
風通聖散ヲ用ヨ共ニ有神効或ハ黃柏ノ末ヲ竹瀝ニテ解テ重舌ノ  
上ニヌルベシ或ハ黃連石羔ノ末ヲ雪水ニテ解キヌルベシ或ハ蒲  
黃ノ末ヲヌルベシ或ハ百草霜滑石芒硝ノ末ヲヌルベシ或ハ紫雪  
ヲ舌ノ上ニヌルベシ何レモ手ヲ不停メヌルベシ一術アリ腮ノ下  
ノ真中ニ艾灸スル事四五壯スレバ即重舌縮也穴ノ点スルニ口傳  
アリ可秘

○小兒ノ牙腫テ涎ヲ流シ口臭ノ鼻ヲ掩フニ至ル甚キ者ハ齒齲脫  
落シ頰腫腐爛メ不救ニ至ル其速カナル事如走馬故ニ走馬牙疳ト  
名ク和俗ハクサト云清胃升麻湯和東垣ノ神効散ニ宜シ香薷葉ヲ

煎テ類ニ口中ニ含ムベシ其効如神

○小兒好テ泥土炭生米ノ類ヲ食スルハ脾胃也清胃瀉胃湯和ヲ用  
ヨ或ハ平胃散ニ黃芩砂仁ヲ加テ煎服シ保童圓ヲ送リ下スベシ其  
効如神

○小兒丹毒ノ症トテ遍身所々ニ赤腫車アリ其丹毒アナタコナタ  
ト所ヲカヘテ赤ヲ見ス者アリ此火外ニ行ル也和俗赤クサト云犀  
角消毒飲和黃連解毒湯升麻葛根湯ニ犀角連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

○赤遊丹毒トテ身ノ内ヲ走リ廻リ赤ク腫ル、症アリ伏龍肝ヲ  
鷄子清ニ解テツクベシ其効如神

○小兒咽喉腫痛スルハ風熱ノ毒也會エ厭ニノ両方腫ハ雙乳鴛ト云治



シ易シ一傍腫ル、ハ單乳鷲ト云治シ難シ皆喉痺也甘桔湯ニ宜シ  
回春小兒雜門ニ出ス所ノ甘桔湯ノ方モ吉

○小兒眼目腫痛スルニハ熟地黄一兩ヲ新汲水ニ浸シ搗爛ラシ脚  
心ニ貼テ布ニテ包ミ置ケバ有奇効○小兒ノ眼ノフチ赤キ者ハ虫  
氣ノ症也保童圓ヲ錢氏白朮散ノ煎湯ニテ送リ下セヨ其効如神

○小兒耳腫痛セバ藿香正氣散ニ烏葉細辛ヲ加テ用ユベシ頭痛耳  
鳴耳聾ハ陽胃ノ生ズル所ナレバ陽明ヲ發スレバ自ラ愈也家傳玉  
樞丹ヲ刻用ルモヨシ○停耳ノ病耳中ヨリ膿ヲ出シ或ハ水ヲ出ニ  
藿香正氣散ヲ用ヨ外ニハ五倍子ノ細末ヲ耳中ニ吹入ヨ五倍子ノ  
黒燒尤妙也鷄ノ子ヲア、メテ出タル卵ノ壳ヲ炒テ黃色ニノ香

油ニテ調テ貼タルモ吉也

○耳聾ハ多ハ停耳ノ後ニ發ル者也棗ヲ食燒タル上ニ置テ蒸シ其  
肉ヲ取テ木綿ニ捻リツケテ長カラシメ其ヲ耳中ニサシテ半時一  
時ツ、一日ニ兩三度スレバ其効如神可也

○大人小兒共ニ耳聾ノ症ニ鷓鴣ノ油ニ磁石麝香少許ヲ入テ煉合  
テ銀子トナシテ耳内ニ入テ口中ニ生鐵少許ヲ含ム事ニ五度ナレ  
バ其効如神方ノ銀子ヲ綿ニ裹ミタルモ吉シ右ノ方ハ本草綱目ノ  
鷓鴣ノ條ノ發明ニ見タリ鷓鴣ノ脂日本ニナシ中華ヨリ長崎ニ來  
ルサレモ甚稀也河内國ニ鷓鴣アリト云人アレドモ其實否ヲシラ  
ズ此方耳聾ヲ治スルニ十ニノ八九ヲ治ス先師元益老人此油ヲ畜



ヘテ耳聾ヲ治スルノ名ヲ得其後此油ヲ求得ズ石龜ノ尿ヲ取テ麝香ヲ加ヘ右ノ方ノ如シテ口中ニ鐵ヲ含スレバ其効如神是亦一奇方也可秘

○小兒ノ頭瘡ハ熱毒ナリ或ハ胎毒ニヨツテ也和俗クサト云多ハ下シテ利ヲ得ル也保童園ヲ用テ吉也荆防敗毒散ヲ用モ吉虛ニ屬スル者ハ四君子湯ニ升麻葛根湯ヲ合シテ連翹ヲ加ヘテ用ヨ有奇効胎毒ニヨツテ瘡痕遍身ニ出來者ニモ右方右ノ如用テヨシ○小兒科ノ家々ニ胎毒下シクサノ類ノ妙方多シ秘メ不出紫陽ノ野人一方ヲ傳フ白屈菜クハクヲ陰乾ニメ黑燒ニメ貼之甚有奇効○脂瘡ハ風濕也小兒脂帶ヲ断トキ不慎バ浴スルゴトニ其斷目ヨ

リ水混入テ脂瘡トナル甚時ハ脂風撒口ノ症トナツテ不救ニ至ル也又脾胃ニ濕熱アツテ腑中ヨリ水ヲ出シ膿ヲ出シ臭氣掩鼻モノアリ錢氏白朮散ニ連翹酒苓ヲ加テ用ヨ外ニハ黃柏ノ末龍骨ノ末ヲ腑中ニ入テ填シメヨ有奇効○諸ノ虫痛ハ胃氣ノ傷テ濕熱ニヨリ虫ヲ生テ痛也快君子袞柳ノニ味水煎シ用ヨ家傳保童園神通丸肥兒丸ノ類及魂丹玉樞丹ノ類ヲ用ベシ其効速ナリ○小兒蛔虫ヲ吐シ或ハ穀道ヨリ蛔虫ヲ下スニ練陽湯ヲ用テ有効○冬月蛔虫ヲ吐スルハ多ハ是胃寒胃虛ノ症也錢氏白朮散ニ丁子ヲ加テ用ヨ有神効



○小児ノ仙氣陰囊腫痛ノ不可忍者ハ此寒氣ニ贅セラル、也五倍子ノ黒燒ヲ酒ニテ方寸セヲ用ヨ其効如神○小児陰囊腫大ナルニ蟬退半両水一大碗煎湯ニテ腫処ヲ洗フ事度々ナレバ其腫立処ニ此也腫ノ類ニ咬レテ腫痛スルニモ前方甚妙也

○小児ノ脱肛ハ大腸ノ氣虛也提肛散ニ宜シ痢後ナドニ必ズ肛門脱スル事多シ補中益氣湯ニ藜朮防風ヲ加テ用ヨ

○小児ノ遺尿失禁或ハ睡中不自覺メ尿スル類ハ多ハ虛寒也破故紙散桂肝丸共ニヲ用ヨ多ハ小児夜起ル事ヲ懶ク思テ床ニ直ニ直ニシ其事習テクセトナリテ此症ニナル事多シ腰眼ノ穴命門ノ穴尾骶骨ニ灸ヲスレバ此症愈ル也

○小児尾骶骨痛ム者アリ此陰虛也補陰降火湯或ハ右飯丸左飯丸ヲ用テ其効甚多シ

○小児鮮紅ハ顛門トケテ頭ノ縫ノ不合也此元氣ノ虛也ハ物湯ニ加減ノ用ヒ六味丸左飯丸補中益氣湯ノ類ニ加減ノ用ヒ其間々ニハ保童圓ヲ用ヒヨ相奇効

○行違ノ者ハ元氣不足也調元散ニ宜シ或ハ補中益氣湯ニ芍薬蒲ヲ加テ用ヨ髪違者齒違者共ニ此方ニヨツテ加減スベシ

○語違者ハ和氣心也蒲黃丸ニ宜シ

○涎多キ者皆脾濕也涎出テ不止涕出不止其鼻涕涎沫ニヨツテ鼻ノ下口ノ両傍赤ク爛ル者アリ和俗コレヲ赤口ト云又ハヨダト云



多ハ無病ノ小兒ニアリセハ歳ニナレバ自愈ル者也平胃散ニ連翹  
車前子ヲ加テ用ヨ外ニハ黃連ノ細末ヲ寒ノ露水ニテ貼セヨ其効  
如神

○小兒ノ龜胸ハ胸タカクメ掌ヲ覆ガ如シ龜胸丸宜細

○龜背ハ和浴ニセムシト云龜背丸ニ宜シ細○龜胸龜背共ニ腎氣

ノ虧損タリ左飯丸ニ加減メ用ヨ有効

○鶴節ハ血氣不充ノ症也必大病ノ後或ハ病後瘧疾後ニ足胛瘦テ

如鶴膝當飯也黃丸細或ハ大防風湯ヲ用テ其病愈也大人モ必有此

症後ニハ難治ニ至ル可慎

### 痘 瘡

○小兒ノ痘瘡ノ症ハ發熱甚メ風邪ノ病ニ紛ル者也疑似ノ間ニハ

先ヅ升麻葛根湯或ハ香積散ニ葛根ヲ加ヘ或ハ藿香正氣散參蘇飲

ノ類ヲ見合テ可用痘瘡ノ熱ハ柯程甚シキトテモ耳ノ尖又ハ手ノ

中指冷ル車水ノ如ク腮赤ク眼ノ内赤ク時々欠伸シ驚怖シ搐搦ス

ルヲ以テ此症ト知ルベシ其見ヤワ委クハ小兒養艸ニ着シ置也可

考

○痘瘡發熱アラワシ三日ヲ過テ痘瘡額ノアタリニ致ノ口ノゴ

トク色好アラハルヲ最上ノ好痘瘡ト知ベシ發熱ヲ覺ルト其マ

マ痘出見レ或ハ半日一日ノ中ニ痘出ルハ後ニハ必惡症ニ変スル



者也油断スベカラズ加味敗毒散痘毒或ハ升麻葛根湯ニ加減ノ用ベシ共ニ山查子ヲ加ヨ山查子ハ治痘毒ノ聖藥也

○痘瘡ノ序病ニ發熱甚ク眼天吊スル者多シ或ハ指搦上竅ノ驚風ニ似タル者アリ是佳兆也似痘少ク出テ其後ハ苦ナシ升麻葛根湯ニ連翹蟬脫山查子ヲ加テ用ヨ或ハ和解毒保赤ニ加減ノ用ベシ

○痘出テ毒氣甚ク血紅一片ニシテ地界ヲ不分者ニハ神効散保赤ヲ用ベシ熱甚者ニハ芩連ヲ加ヘ驚怖ノ心アラハ蟬脫連翹ヲ加テ用ベシ山查子ヲ加フ妙トス又解毒疎痘湯ニ山查子ヲ加テ有神効或ハ

人參羌活湯ニ有奇効共ニ見保赤全書也

○痘出テ三日ノ内ニ痘頭黑陷スル者ハ虛ニアラザル也火盛ユヘ

也九味神効散ヲ用テ其火毒ヲ退クベシ有神効

○痘瘡起服ノ時節ニ瘡勢弱ク瘡色白メ頂陷者ハ虛症也十全内托散ニ丁子肉桂穿山甲ヲ加テ用ベシ有神効或ハ保元湯保赤丁子肉桂

川芎當歸穿山甲ヲ加テ有神効共ニ見保赤全書

○痘瘡出テ後ハ胸中ニ乳香ヲ燒多ベシ奇妙也

○痘出音ノ後三日ヲ大事ノ時分ト知ベシ好痘ハ膿漿十分ニ満テ山ヲ上ル也其次ハ六七分膿漿也凡ソ痘ハ膿漿ノ有無ニテ生死判ル者也膿有ル時ハ毒外ヨリ散ズ故ニ生ル也膿ナキ時ハ毒内ニ攻ム故ニ死スル也扱扱膿引テ瘡痂厚者ハ好痘ナリ痂薄者ハ其次ナリ

○痘色紅紫乾枯シ焦黒ナル者ハ毒熾ニメ血凝也清毒活血湯ニヨ



シ痘色淡白ニメ尖圓ナラズ根ニ紅暈ナキ者ハ氣虛メ血縮ル也參  
芪鹿茸湯或ハ保元湯ニ宜シ其方共ニ活幼心法ニ出タリ可考

○痘瘡大便實スル者ハ宜シ大便秘スル者ハ脾氣虛シ肌肉ノ瘰ツブナ  
キ故ニ多ハ惡症ニ疫ズル者ナリ加味四苓散參朮散錢氏白朮散ニ  
扁豆砂仁山查子ヲ加テ可用活幼法ニ出ス

○痘瘡寒戰咬牙ノ見ル、ヲ惡症トス虛ニ屬スル也建中湯活幼保元  
湯補中益氣湯ニ加減ノ用ヨ

○痘瘡吐逆スル者ニハニ陳湯ニ合升麻葛根湯加連翹山查子其効  
如神

○痘毒咽喉中ニ出テ腫痛シ飲食通リガタキニハ利咽解毒湯活幼

ニ連翹山查子ヲ加テ其効如神

○痘瘡ノ餘毒必腕股等ニ滯リ膿血ヲ生ジ骨ノ中ニ腐リ入テ手足  
不寧類ノ者多シ大連翹飲ヲ用ベシ或ハ千金內托散ヲ用ヨ共ニ活  
幼心法ニ出タリ

○痘瘡甚痒キ者ハ表症ト知ルベシ保元湯ニ加減シ或ハ黃耆實表  
湯活幼ヲ用ベシ其効如神

○九痘瘡ハ瘡疥ノ類ヲ始ニ煩ヒ又ハ疥癬ノ類未愈ニ痘瘡ヲ患ル  
者ハ多ハ痒癩ノ危症ニ疫ズル者也和俗ニ之ヲクサケ交ルト云テ  
甚惡症トス大連翹飲ニ宜シ

○痘瘡ニ麻疹ヲ夾ム者アリ甚危症也玄參升麻湯活幼ヲ用テ其効如



神

○惣テ痘瘡ノ次第俗用ノ手故予ガ著ス所ノ小兒育神ニ詳ナリ可

考

○痘瘡ニ和俗ベイカン米泔水シヨミツヲ沸湯トナシテ落痂ノ時ニ沐浴スル事アリ

中華ノ書ニ此事アル事ヲ未得考痘瘡色悪クナル時ニ水揚ノ煎湯

ニテ瘡ヲ洗ヒ三豆湯ニテ浴スルノ類諸書ニ見ハタリサレドモ日

本人ノ如ク推シナベテ俗習トスル事ナシ多ハ十五六日ノ後ニ洗

フベシ危症ノ痘瘡ハ日數ニカハハルベカラズ三十余日或ハ五十

日ヲモ通テ洗ベシ是日本ノ俗習ナレバ之ニ從ベシ朝鮮國ノ医鄭

萬里ニ此事ヲ朝鮮ニテモナスヤト筆談シケレドモ朝鮮ニテハ此

事ナシト答タリ爰且ト同事ト見タリ

○惣メ痘瘡ノ治方ヲ考ルニハ保赤全書痘疹全書花幼心法ノ三書

ニ委ク備ル也之ニテ考テ己ガ識分次第ニ治ヲ施スベシ

○今時痘瘡ノ治方寒熱虛實ヲ不問始ヨリ多ハ參耆ノ類ヲ用ル者

多シ虚ニ屬スル者ニハ甚効アリ然レモ痘瘡初發ハ熱毒甚シ風藥

ノ類ヲ以テ發散スル時ハ痘毒發出メヨシ補藥ヲ用テ補住其和熱

メ實ヲ實スル事ナカレ近代補藥ノ人ノ命ヲ失フ事カギリナシ可

慎事也

麻 疹

○大麻疹ハ痘瘡ニ比スレバ甚カロキ者ナレモ其症六府ヨリヲコ



ツテ陽症ニノ暴急ノ症也夫ニヨリテ和俗ノ諺ニ痘瘡ハ美目定メ  
麻疹ハ命定メト云テ甚大切ノ事トスル也其子細ハ急病ナルヲ以  
テ療治ノ法少ク怠ル時ハ其變掌ヲ返ガ如クナレバナリ

○麻疹ハ發熱スル事ニ三日出脈共ニ三日ニメ出テ没スル也没シ  
テ又出ルモアリ其發リハ傷寒感冒ノ熱ノ如シ去レテ此症ハ咳嗽  
甚クテ咽喉ノ間呼吸短息ニメ不利之ニ因テ咽ノ中ハシカキニ因  
テ和俗ハシカノ病ト名ツクル事也升麻葛根湯ニ宜シ咳甚クバニ  
陳湯ヲ合シ桔梗茯苓ヲ加ヘ或ハ參蘘飲ニ連翹ヲ加ヘ或ハ葛根湯  
ニ小茈胡湯ヲ合シ或ハ黃連解毒湯ヲ用ヒ或ハ涼膈散ヲ用テ見合  
テ療治スベシ

○麻疹ノ症ハ多ク咽不利咽渴スルニ因テ飲水多キ故ニ必痢病ニ  
變ズル者也又ハ麻疹ノ毒内ヨリ下ル者モアリ何ノ道ニテモ大方  
ハ麻後ニハ必痢病トナル者也升麻葛根湯ニ山查子扁豆砂仁ヲ加  
ヘ虛スル者ニハ錢氏白朮散ニ連翹白扁豆砂仁升麻ヲ加テ其効如  
神

○麻疹ノ毒氣流注ノ痢トナル者ニハ清熱導痰湯ニ宜シ方ハ活幼  
心法ニ出也

○麻疹ノ症四ノ大忌アリ是ヲ犯ス事ナカレ一ニハ葷腥生冷ノ物  
ヲ食フ事勿レ風寒ニ中ル事勿レニニハアワテ、寒涼ノ藥劑ヲ用  
ル事勿レ黃連解毒涼膈ノ類是也三ニハ多ハ辛熱ノ藥劑ヲ用ベカ



ラズ桂枝湯ノ類又羌活麻黄ノ類是也四ニハ補遺ヲ用ベカラズ泄  
痢ノ症アラバ加味四苓散ニ加減ノ用ヒヨ訶子肉豆蔻參芪ノ類ヲ  
禁ズベシ此四大忌ヲ犯セバ其禍如反掌可慎

補遺

○宝永戊子ノ秋ヨリ冬ニ至リ明ル己丑ノ歳ノ春マデ日本六十餘  
州ヲシナメテ麻疹流行ノ男女老少ヲ不問一般ノ疫麻也貴トナク  
賤トナク此患ニテ死スル者多シ予京師ノ高倉ノ旅館ニアツテ此  
病ヲ治スル事五百三十余人也其内一人モ死スル者ナシ皆之ヲ治  
スルノ医或ハ寒涼ヲ過シ或ハ辛熱ヲ用ヒ或ハ補藥ヲ用テ其害夥  
シ予一方ヲ製ス葛根連翹湯ト名ツク葛根連翹升麻白芍藥酒芪胡

酒黄芩當歸桔梗山查蘇椶山梔子各等分甘草減半水煎シ服ス紅点  
出ガタキ者ニハ防風牛房子ヲ加ヘ泄痢アル者ニハ扁豆砂仁木通  
車前子ヲ加ヘ咳嗽甚キ者ニハ桔梗甘草ヲ倍シ前胡桑白皮ヲ加フ  
熱甚キニハ酒黄柏酒黄連少許ヲ加ヘ或ハ淡竹葉ヲ加ヘ口甚渴ス  
ル者ニハ麥門冬石羔ヲ加ヘ血乾テ大便秘スルニハ川芎生地黃紅  
花大黃少許ヲ加フ此方ヲ用ユルニ百發百中奇々妙々其効不可言  
也



外科

瘰癧

○瘰癧ノ症ハ多ハ四十已上ノ人ニ發スル者也先ツ灸ヲナスベシ  
外ハ外科ノ専門ニ任スベシサレモ毎度腫物ノ善惡ヲ見テ知ベシ  
初發ニハ荆防敗毒散追風通氣散ノ類ヲ用ベシ漸漬テ膿血出テハ  
千金内托散ニ加減メ用ベシ

○瘰癧膿血多脱去スレバ氣血甚虚耗ス或ハ八物湯或ハ十全大補  
湯補中益氣湯ニ加減メ用ベシ

○瘰癧ヲ治スルニハ經絡ヲ分テ治スベシ頭瘰ノ類ニハ此胡清肝  
湯清肝益榮湯ノ類ヲ可用

○瘰癧ノ治方ハ追風通氣散ニ悉ク加減ス<sup>四味</sup>之ヲ見合テ用ヨ其効  
多キ也

○瘰癧ノ外治ハ腫物ノマワリヲ<sup>ヒキ</sup>關藥ニテフセグハシ此關藥家々  
々ノ秘方多シ外科ニモ關藥ヲ膏藥ニテセクアレモ惡キ也子細ハ  
膏藥ハ身ニ貼テ温マリワタレバ膏藥ヲ持テ起ノセキ、カヌ者也  
黄栢榆皮犬山椒ノ葉ヲ陰乾シ右三味細末ノ等分水ニテ解腫物ノ  
マワリヲセキテ上ニハ杉原紙ヲサキテ覆フベシ或ハ酢ヲ解タル  
モヨシ此關藥ヲ用レバ一夜ノ内ニ腫物腫レ起ルナリ奇々妙々ノ  
事ナリ

○外治ノ艾南虫流鷹取流ハ針ヲ以探開スル也其上ニ艾灸ヲスル



切りテ血ヲ出シ膿ヲ出スガ故ニ治スル事早シサレハ虚弱ナル人  
ハ元氣ヲ撲也阿蘭陀流ハ切ル事ヲ不用艾灸ヲバカリニノ木綿ヲ  
以テ腫ヲ巻テ温ル也膏藥モ專温散ノ劑ヲ用ルニ因テ老人虚人ニ  
宜シサレハ實症ノ腫物ヲ木綿ニテ巻ハ實熱ヲ包ミ籠テ悪キ也勿  
論瘰癧ハ氣血ノ虚ヨリ生ズレバ實ニ属スル者ハ稀ナレドモ其内  
熱毒ノ深キ腫物アル也經曰諸實者病邪ノ實也ト是ヲ以テ可悟

瘰癧馬刀

○瘰癧ノ症肝經ニ生ズル者也耳後ニ累々トメ生ズ多ハ肝鬱ノ症  
ニメ痰結ノナス所也或ハ氣鬱ヨリ生ズルナレバ十六味流氣飲加  
味道通散芪胡清肝湯清肝益榮湯分心氣飲加味飯脾湯益氣蝦菜湯

廣茂黃堅湯ノ類ニ加減メ用ベシ其効如神

疔瘡

○疔瘡ハ手足面部ニ生ズル者也皆多ハ厚味ノ人ニ生ズル者也殊  
外ナル急症也先ツ灸火ヲ用ベシ痺キハ灸ノ痛ムニ至ル痛ムハ灸  
ノ痺キニ至ルト云テ灸ニ宜キ也内藥ハ追疔奪命湯ニ加減メ用ベ  
シ外ニハ蟾酥丹ヲ貼ヨ又ハ疔ヌキト云ヌハ郡藥ト云榮ヲ數クベ  
シ郡上大夫家ノ藥五八霜櫻木皮黑燒熊胆各葦分ニメ  
細末シ猪ノ油ニテトキ火ニアタメテ疔ノ上ニ貼レバ汗出其マ  
マ治スル也其効如神

○疔瘡ノ類ニ青筋ノ症トテ急症アリ知ラズンバ有ベカラズ青筋



出テ胸咽ノ間ニ攻入ナリ日本ノ俗ハ曰腫ト云此症ヲ治セバ先ツ  
病人ノ尺澤ノ穴ヲ見テ針ヲ以テ筋ヲ断切ル時ハ黒血ヲ出テ神効  
アリ又紙燭ヲ以テ脊及手足ヲ見ルニ粟粒許ノ赤点アラバ針ヲ以  
テ断破スレバ有神効此ニツノ手敏奇々妙々也

便毒

○便毒ハ和俗ニ横根ト云フ両腿ノ合縫ノ間ニ生ズルノ腫物也袖  
奇散龍胆泻肝湯本条ニ加減ノ用ベシ

○初発ノ時ニ實スル者ニハ蕎麥麩ソバ大黃各等分細末ノ酒ニテ毎服  
ニ炙ヲ用ベシ小便ヨリ毒下ル也奇々妙々

○便毒潰テ後ハ實スル者ハ防風通聖散ニ加減スベシ虚スル者ハ

加味道遙散ニ加減ノ用ベシ何レモ釣藤鈎ヲ加テ妙トス可秘又苳  
胡清肝湯ニ加減ノ用ベシ

下疳瘡

○下疳ハ多ハ蟻乱ナル人娼妓ノ類ニ交接ノ其臭穢ノ氣ニ撲テ生  
ズル者也初発ニハ消疔敗毒散本条ニ加減ノ用ヨ或ハ龍胆泻肝湯防

風通聖散ノ類ヲ見合テ用ベシ虚セバ清肝益榮湯苳胡清肝湯道遙  
散ヲ見合テ用ヨ或ハ八物湯ニ小苳胡湯ヲ合シ連翹金銀花ヲ加氣

虚スル者ニハ補中益氣湯ニ連翹防風青皮ヲ加テ用ベシ痛甚ク何  
ノ方ヲ用テモ不止痛苦難忍者ニハ黃芪連中湯ヲ一ニ貼用レバ其

効如神



○外ヨリ蒼朮紫葳黃芩蛇床子艾葉當歸ヲ等分水煎ノ瘡ヲ洗ヒテ  
其上ニ三白散ヲスリヌルベシ三白散ハ予家ノ秘方ナリ牡蠣ノ白  
燒着板天花粉ノ三味各等分極細末メ用ル也平田道仙ガ家ノ秘方  
ノ白藥ト云ハ三白散ニ龍腦ヲ加ヘタル者也傳曰此白藥ヲ娼妓ノ  
類ニ交リタル時ニ自己ノ小便ニテ陰莖ヲ洗ヒ其上ヲ温水ニテ洗  
ヒテ貼レバ瘡毒ニ中ル事ナシ因テ此藥ヲ瘡毒ヨケト名ヅクル也  
可秘

○下疳ノ藥ヲ外治ノ匠ハ洗フ事ヲ禁ズル者多シサレニ瘡愈兼ル  
時ハ洗藥ニテ洗テ粉藥ヲ貼クベシ膏藥ノ類ハ瘡ヲ蒸シテ惡シ痛  
強ク瘡口大ナラバ三白散或ハ白藥ヲ乳香没藥ヲ加テ麻油ニテ煉

テ貼クベシ下疳ノ貼藥ハ隨分極細末スベシ粉藥危末ナレバ害多  
シ陰頭ハ其皮薄クアマ肌ナレバ粗キ粉ニテハ思ヒアハヌ者也此  
大秘夏也

### 楊梅瘡

○楊梅ハモト下疳瘡ヲ傳染シタル人之ヲ耻テ治スル事遲滞ノ一  
變ノ便毒トナリ便毒一變メ楊梅瘡トナル京都江戸大阪等ノ都會  
ノ所ニ多キ煩也鄙野ノ地ニハアル莫少シ京ニテハ濕氣ト云也何  
レモ娼妓ニ交遊メ傳染スルノ病也初發ニハ荆防敗毒散消風敗毒  
散四時ニ不二十四味風流飲上ニ加減メ用ベシ

○楊梅瘡經日不愈者ハ或ハ鼻爛レ鼻柱朽落シ口臭ク唇皸ケ或ハ



腕ノ折目胸中ニアツマリ毒氣膿ヲナシ或ハ惣体ノ瘡乾キ惣身疼  
 痛シ或ハ骨ウヅキニナリ或ハ眼ニ毒入り或ハ耳聾シ種々ニ変化  
 スルニ因テ其人終ニ瘰人トナル者ナリ之ニ因テ人之ヲ惡ミ嫌フ  
 事大風ニ類スル也此等ノ類ニハ回春ノ通仙五寶丹ヲ用ベシ此方  
 王范泉ガ廣東ヨリ傳來ル妙方也此瘡中華ニモ古ハアル事ナシ  
 近世廣東ヨリ傳染スルニ因テ廣東瘡ト名ヅクルト痘疹金譜卷了九  
 ニ見ヘタリ和俗此瘡ヲ唐瘡ト云モ廣東瘡ト云事ナルベシ唐ト東  
 ト音同キ故カ此五寶丹ニモ家々ノ秘方多シ何ノ方ニテモ真珠ノ  
 真ヲ用ヒザレバ其効ナシ  
 〇楊梅瘡日久ク不愈ニ防風通聖散ヲ五匁ガケホトニメ用効ヲト

ル事多シ又奇驗方トテ近來阿蘭陀外科ノ用ル方アリ何モ山飯來  
 ノ入タル大料也是モ紅毛流ヨランダ其家々ノ秘方多シ可考合又傳來ノ方  
 ヲ諸医ニ送テ秘方ヲ談ズベシ互ニ交易ノ習フベキ事也予ガ家ニ  
 傳所ノ奇驗方ノ秘方 土茯苓五匁 當飯 皂角刺 皂夾子  
 薏苡仁 白芷各一匁半 木瓜 木通 白鮮皮 金銀花 連翹 防風  
 甘草各一匁 茯苓 芍藥 何首烏 黃芪 人參 川芎 生  
 地黄 沉香各一匁 右調合ノ一劑五匁或ハ七匁或十匁或十五匁ニ  
 シ煎法次第アリ口傳用ヒ様モ口傳アリ又山玄湯トテ予ガ家ノ名  
 方アリ 山玄五匁日本ノ山飯來イバラノ莖也  
三三月ノ比ニ三又ホド有ヲトルナリ 山飯來一斤 黃連 黃芩  
 人參 當飯 防風 桔梗 川芎 生地黃 芍藥 羌活 荆芥



木通右一匁

蝮蛇陰干五分無時ハ  
白花蛇ヲ用ル也

津蟹ノ黒焼五分

右調合ノ七貼ニ分テ

蝮蛇陰干津蟹ノ黒焼ハ後ニ一貼ニ分テ入ル也一日ニ一貼ツ、用  
ル也飲毎ニ鶏ヲ炙リタルヲ一切ツ、喰テ藥ヲ服スベシ煎法用法  
口傳アリ

○楊梅瘡年經テ愈カヌルニ涎藥トテ丸藥アリ輕粉五分 上茶一匁

梅干黒焼五分 土茯苓一匁 辰砂五分 右細末シテ丸スル事ニ梧桐子  
ノ大サニノ碾茶ヲ衣トス用ル時ニ齒ニ中ラザルヤウニメ用レバ  
齒根ヨリ血出テ咽爛テ病人死スルホドニ苦ムト雖凡七日ヲ過レ  
バ食氣出テ本復スルモノナレ凡多ハニ三日ニメ病人所トクヲツブシ  
テ飲得ル事ナシ虛弱ナル人ハ使ズ死スル者也容易ニ用ヒ難キ方

也又輕粉ノ毒ニ中リ内ニ滯リ骨ウヅキニナル者アレバ能々瘡毒  
ノ深キ事ヲ見分テ用ベシ用ルト其夜ヨリ爽ヲ出シ咽爛レ痛ニ飲  
食不入言語不聞者也生死ニツ者ガケト思ハズンバ不可用

○楊梅瘡年久ク臭藥ト云フ方アリ予ガ家ノ秘方ニ 水銀二分

光明米一匁 紅二分 百草霜見合ニ 右ノ藥効ヲ細末シ百草霜ノ細末ニ

入テマゼ合セテ厚紙ニテ袋ヲコシラヘ其袋ノ中ニ右ノ藥ヲ入テ  
隨分カタクツメテ長サ七寸ニノ一日ニ一寸宛カギ申マウスヤウニ上  
ニ刻キヤヲ付テ置キ此藥ニ火ヲ付テ其煙氣ヲ鼻ニ嗅グナリ眼ヲ塞ギ  
口中ニ冷水ヲ含テ嗅グ也煙ノ外ニ出ヌヤウニ覆ヒヲカクベシ其  
コシラヘヤウ嗅ヤウ口傳多シ一方ニ沈香一匁ヲ加フ尤好シ此方



ハ奇々妙々靈方也又涎藥ナドノヤウニ中ラル、事モ無キナリ惣  
ノ揚梅瘡ハアヤシキ瘡治ニテナケレバ治シ難シト知ルベシ故ニ  
諸ノ紋方ヲ此ニシルスナリ

臙瘡

○臙瘡ハ和俗ニハ、キ瘡ト云ヒ又雁瘡ト云毎年ハ九月ヨリ發リ  
テニ三月ニ愈ルヲ以テ雁ノ飯來ニ因テ名付ル也愈カヌル者也此  
瘡ヲ治セント思ハ、三年ホドカ、レバ根ヲ切ル者也次第ハ瘡發  
スルト其マ、荆防敗毒散ヲ四五貼用テ後白芷升麻湯ニ雁來紅  
ヲ加テ用テヨシ其辨方考ノ白芷升麻湯ノ条下ニ有リ可考如是ス  
レバ來歲ハ前歲ノ半分ホド發スル也又次ノ年モ如是スレバ又其

次歲三分ノ一ニナル也三年ホド療治スレバ根ヲ切ル也初年ハイ  
ツモヨリツヨク發スル者也扱又三年モ治スレバ病根ヲ斷ト云事  
ヲ病人ニモトクト云聞セテ後可治事也外治ハ少シ瘡ノカワキメ  
ニナリタル時ニ平胃散ノ粉藥ニ葛根輕粉三分一ヲ加テ上ヨリ毎  
度スリヌルベシ惣テ汁ノ多ク出ル瘡ハ濕瘡ナレバ平胃散ノ粉ヲ  
用ル事是予ガ家ノ秘傳也可秘

○臙瘡四五月ノ比愈テ後足ノ三陰交ニ灸スベシ奇々妙々

疥瘡癬瘡

○疥癬ハ分テ云バ疥ハ皮膚ニアリテ浮淺ナリ多ハ熱ニ屬ス癬ハ  
深沉ニ多ハ濕ニ屬ス故ニ痒クノ濕ナク斑赤点ヲ生ズル也癬ハ



痒ノ血膿アリ共ニ血熱ノ症也血分熱燥ノ風毒ヲ挾ム也和俗ノ云  
肥癬瘡也初発ニハ荆防敗毒散ヲ用テ発散スベシ久キ時ハ荆防敗  
毒散ニ四物湯ヲ合シ酒芍酒連ヲ加テ用ベシ年久キニハ防風通聖  
散ニ宜シ

○風疥癬ニハ去熱搜風湯四卷ヲ用ベシ

○皮膚鱗ノ如ク立テ痒ヤ者ニハ浮萍散四卷ヲ用ヨ

○鷲掌風癬トテ手ノ内剛カクク成テ鷲ノ掌ノ如ク成ル症アリ多ハ虫  
ヲ生ズル者ナリ和俗ハザク、口ト云諸ノ方書ニ洗藥ヲ出ス考合テ  
用ベシ内藥ハ防風通聖散或ハ荆防敗毒散ニ宜シ病人虛弱ナラバ  
白芷升麻湯ニ宜シ

○鷲掌風ニハ朝腦種枯藜明各等分石灰半分酥ニテトキ貼テ宜シ  
又川芎ヲ香ノ如ク焼テ毎日三度掌ヲ烘ルベシ川芎焼トキ煙ヲ鼻  
ニ入ラヌヤウスベシ鼻ヲ紙ニテ塞グベシ

### 疥 瘡

○疥瘡ハ和俗シラク、モト云小児ニ多キ症也陰事ヲ知レバ多ハ治  
セズシテ愈ル也純陽ノ熱毒也荆防敗毒散又ハ防風通聖散ニ加減  
メ用ヨ多ハ内藥ナシニ貼藥ニテ愈ル也回春ノ掃雪膏本ヲ貼テ其  
効如神又一ノ奇方アリ松ノ青キ松笠ノ黒焼アセミシバ馬乾テ  
各等分細末ノ雄黄大黃半分ヲ加テ麻油ニテ解テ瘡ヲ刺カ刀ニテコ  
ソゲテ其上ニ貼ル奇々妙々



○瘡瘡アル小児ニ足ノ腫ノ折目ノ横文ノ内瘡ニ灸スル事十壯或ハ十五壯スベシ其効如神紫陽ノ身ノ傳也

### 癩風

○癩風ハ和俗ナマヅト云白癩風ハ治シ難シ和俗ハ白癩ト云テ天刑病ノ中ニスル也汗斑ハ治シヤスキ也多ハ夏ノミ生ズル也癩シツ僧ヲ酢ニテ餅貼テ宜シ又一奇方爐灰硫黄雄黄樟腦各等分酢ニテトキ貼ベシ其効如神

### 癩風

○癩風一名癩風又名大風和俗カツタイト云此病人間ノ中天道ニ放タレタル病ニ佛氏所謂過去ノ因果ノ悪キ故ニ今病ヲ生ズ

ト云フ孫真人曰癩風ハ天刑ノ病ニシテ治方ナシトアレバ其根ヲ切ル事難キ病也其人色慾ヲ断チ魚肉塩味ヲ断テ保養スレバ生淫見悪ニ不至類ツキ少シイナ者ト人ノ云ホドニテマギル者也三黄湯トテ黄芩黄連黄柏ノ煎湯ニテ雷丸苦辛ヲ粉ニメ右ノ飲汁ニテ用ル者アリ其効如神

○癩風ノ藥多ハ奇怪ナル藥物ニテ治スル者多シ此一筋ノ療治ヲヨク覺ヘタル者アリ或ハ下シテ虫ヲ取り或ハ手足面部ニ針ヲ立テ血ヲ出シ或ハ灸治ヲ用ナドシテ治スル事多シ多ハ中古南蠻人渡海ノ時習傳ヘタル家傳ノ人多シ妙方アル者也諸ノ醫書ニモ藥方ヲノス考合ベシ大抵ハ防風通聖散ニテ藜金大黃苦辛皂角子連



翹雷丸各等分ニノ粉薬トナシテ一度ニニ匁用テ治ス其効如神

### 折傷

○折傷ハ打身ノ類多シ皆瘀血凝滯スル也打身重キ時ハ大小便不

通心腹ヲ攻テ死ニ至ントス先ツ通導散打傷ヲ用テ大小便ヲ利スル

ヲ以テ度トスベシ又一奇方芎藭湯ニ茯苓紅花ヲ加テ用ベシ又一

奇方當飯ニ匁大黃一匁水煎服ス何モ右ノ方孕婦小兒虛人ニハ勿

用

○打撲打傷ニハ光ツ菘菜湯方考龍王湯同ヲ振出メ用ユベシ又青指

子トウ陰子シテ花共ニ一匁人參ニ分ヲ加テ振出シ用ヨ其効如神

○諸ノ方書ニ接骨ノ治方多シ考合テ用ベシ外ヨリハ揚梅皮木瓜

各等分粉ニメ紺屋糊ニテ推マゼ痛處ニ貼スベシ其効如神又一奇

方鯽魚クダマヲスリ碎テ貼モヨシ何モ上ニ杉原紙ヲ引サキテ覆フベシ

○打身ノ妙薬ニ石見川ト云フ方アリ川骨荅菜赤小豆半生各ニ兩

石見川ソバト云神也小石アル川ニ生シタルガヨシ陰干ニ一匁人參一兩白芍藥蒲黃石菖蒲百草川芎五味

子各一兩右細末ノ一度ニニ匁ツ、酒ニテ用ユ之ヲ打身ノアイズ

ト和俗ニ云也産後ノ血暈ウツ金瘡ニモ用ル也香月兵部少輔經考ノ家

方ナリ予ガ家ニ傳來スルナリ

○高ヨリ墜下ノ打撲甚ク瘀血流胸下疼痛不可忍ニ復元活血湯ヲ

用ユ酒大黃芪胡當飯各一匁桃仁紅花各三分天花粉穿山甲各七分甘艸五分

水煎ノ服ス其効如神此方古今医統ニ出タリ啓益常ニ用ヒ取驗多



シ可秘

金瘡

○金瘡ハ先菴菜湯龍王湯石見川芎飯湯ノ間ヲ見合テ疵ノ多少病  
 入勇怯ヲハカツテ治スベシ血脱ル事多キ時ハ先ヅ大料ノ獨參湯  
 用ベシ陽長ズレバ陰長ズルノ義ナレバ先ヅ元氣ヲ無河有  
 ノ御ニ引返スベシ隨分手早く取廻スベシ渴スル共飲水ヲアタフ  
 ル事勿レ外治ノ医手負ナント切々見付タル者ナラデハ治スル事  
 アタワズ之ニ因テ外科ノ医ハ氣勇剛ノ者ニ宜シ  
 ○金瘡ハ先ヅ燒酒或ハ温酒ヲ以テ洗フベシ其後鷄子清ヲ又リテ  
 縫合スベシ馬ノ膏アテラヲスリタルガヨシ血不止バ酒ニテヒタト洗フ

ベシ小疵ハ血留ニテ止ベシ大ナル手負ハ血留ニテハ血止ル者ニ  
 テハナシ能々可心得也

○血留ノ方土用ノ中ノハシブト鳥四季天ニヨシヲ取テ首羽毛足ヲ去テ腸  
 ヲ出シ其中ニ當飯川芎蒲黃各二兩人參ニ兩紅花一兩入テ糸ヲ以テ  
 スイ合セテ黑燒ニノ一度ニ一奴服スレバ血止ル也

○回春ノ止痛生肌散本条ニモ妙ナリ

○少キ切疵ノ血留ニハ鉄蕉ソラツノ水ノ綿ニ蒲黃ヲミ入テ疵口ニ貼  
 テヨシ草屋ノ革ノカンナクズニ蒲黃ヲミ入テモヨシ石腸ト云  
 者モヨシ海鯨ノ鱗ヒケモヨシ刻烟艸ヲ貼モヨシ何レモ常ニアルモノ  
 ニノ急ニ備ヘ易シ重宝ナル事也何モ可秘



破傷風

○破傷風トハ金瘡ノ口ニ膏藥ヲ不貼其瘡ヨリ風邪入テ經脈ニ中  
リ善テ行テ數々變ズルニ因テ反張痙瘓ノ狀瘵病ノ如ク其生死在  
頃刻急々ニ治スベシ先ヅ菴活防風湯本回春ニ加菴ノ可用又ハ菴菜  
湯龍王湯ノ類ヲ可用

○破傷風裏ニ邪氣入時ハ疎導ノ劑ヲ用ヨ大芎黃湯和春ニ加菴ノ  
用ヨ

湯火傷

○湯火傷ニハ蛤蜊壳ハカキノカラヲ炙リ焦シ黄色ニシテ細末ノ麻油ニテ貼ベシ  
其効如神

○湯火ニテ焼タルニハ蜜水ヲヌレバ痛立ト止也

○湯火傷共ニ石羔黃丹黃柏檢白皮桐木ノ甘皮アノカワ各等分末ノ麻油ニ

テ貼ヨ其効如神

○湯火傷共ニ痛甚ク大小便不通者火毒下焦ニ傳フ四物湯ニ黃連

木通山梔子赤茯苓連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

○湯火傷共ニ肉壞テ痛甚キ者ニハ四物湯ニ人參黃芪白芷連翹甘

艸ヲ加テ用ヨ數劑ニシテ新肉生ズ

蟲獸傷

○狗ノ咬傷ニハ杏仁甘枙ヲ口ニテ咬碎テ痛處ニ貼ヨ又一方銀杏  
ヲ研碎テ貼ヨ又一方草麻子ヲ新吸木ニスリテ貼ヨ甚有効又一方



蒼茸葉ヲ煎ノ洗ヒ甘草ノ細末ヲ貼ヨ

○狗咬タルニ倉卒ニ無藥時ハ小便ヲ以洗ヒ百草霜ヲ麻油ニトキテ貼ヨ或ハ牛糞ヲ以貼之

○馬ニ咬レタルニハ寒水石雄黃ヲ細末ノ之ヲ貼ヨ其効如神又一方馬齒莧ヲ杵キ爛シ煎服ス外ニハ益母草ヲ杵テ貼ヨ

○猫ノ咬タルニハ薄荷ノ煎湯ニテ洗ヒ紫金錠万金丹玉樞丹ノ類ヲ用ヨ

○鼠ノ咬タルニハ猫ノ毛ヲ燒テ貼ヨ麝香少許加テ妙也又一方茄葉ヲ煎メ洗テ妙也又一方紫葳ノ煎湯ニテ洗テ妙ナリ

○蛇ノ咬タルニハ雄黃五靈脂等分細末メ貼ヨ又一方貝母ヲ好酒ニテ服シタル佳去心細末メ用也又一方白芷ノ細末ヲ麥門冬湯ニテ服スベシ

○蛇ノ咬タルニ日本ニ云所ノ椿ノ葉燒テ灰汁ニタレテ其汁ヲモツテ洗フベシ腫漸々ニ引ナリ扱蛇ノ咬タル所ニ蠅ヲ殺シ五ツ頭糊ニヲシマゼテ貼レバ咬タル口目ヨリ汁出テ痛止腫消スルナリ

奇々妙々

○蛇ノ咬タルニ葉ナキ所ニテハ蒜ノ實ニテモ又ハ葉ニテモ又白莖ニテモ杵爛シ咬口ニ貼テ錠子ノ如クニメ其上ニ艾灸スベシ下

ニ火氣通ズルホドスベキ也

○蜘蛛ノ咬タルニハ雄黃細末ノ麝香ヲ加テ貼テ宜シ



○蜈蚣ノ咬タルニハ雄黄南星半夏ヲ細末ノ貼テ宜シ又一方五倍子阿仙藥細末ノ津液ヲ以テ潤ノ貼ヨ其効如神又一方ニ先ツ塩湯ニテ痛処ヲ洗ヒ吳茱萸嚼爛ノ貼之或ハ井底ノ泥ヲ貼モ宜シ

○蜂ノサシタルニハ小便ヲ以テ洗ヒ拭ヒ乾ノ香油ヲ塗テ宜シ又一方雄黄末ヲ貼テ吉シ又蜂房ノ末ヲ搽テ其効如神

○蜥蜴壁虎ノ咬タルニハ大雄黄ノ細末ヲ醋ニ磨ノ貼ヨ又白礬ヲ又リタルモヨシ

○蚯蚓ノ毒ニ中リ或ハ此物ニ小便ヲ仕カクレバ陰莖腫痛シ或ハ大風ノ狀ノ如ク眉落ルニ至ル也石灰ヲ熱湯ニ炮シテ冷ノ患ル所ヲ洗ハバ治ス浸之久クノ佳也小兒多ク此毒ニ中リテ陰莖腫囊共

ニ腫テ水疱ノ如クニナル者アリ鴨ノ血ヲ塗レバ立処ニ消ス一方ニ塩湯ニテ洗テ其効如神

○蚕ノ咬タルニハ苧葉ヲ搗テ貼之奇々妙々

○惣テ虫獸ノ咬タルニハ雄黄ヲ貼タルガヨシ或ハ紫金錠玉樞丹万金丹錦袋子ノ類ヲ貼ベシ山家又ハ野陳ノ時ハ雄黄麝香ヲ畜テ身ニ帶ベシ邪惡ノ虫獸ノ毒ヲ避ル莫奇々妙々可秘

中毒 付魚骨鯁

○諸ノ毒ニ中リタルニハ先ツ白扁豆一味ヲ煎服スベシ多ハ解ス

○中毒ニハ紫金錠玉樞丹錦袋子万金丹等ノ藥ヲ服スベシ五倍子阿仙藥雄黄ノ類毒ヲ解スルノ聖藥也



○諸ノ中毒ニハ甘草黑豆リョウヲ用テ解スベシ万金丹モヨク毒ヲ解スルノ藥也

○砒石ノ毒ニ中リタルハ黄丹水銀青黛菘豆エンシヨウ煇硝各等分細末ノ調下ス

○誤テ針ヲ吞ム者ニハ蚕豆一名ヲ煮熟シ菘菜ト同ク吐下セバ針菜ト同ク大便ヨリ出ル也

○誤テ金銀銅鉄ノ物ヲ吞テ不能化者ニハ砂仁濃煎湯ヲ服スベシ其物自ラ下ル

○誤テ水煙ヲ吞者ニハ蜜ヲ食フベシ即化ノ水トナル也又濃茶ヲ多服スレバ又効アリ

○誤テ木屑ヲ吞ミ咽ニアツテ不下ハ死有須臾鉄斧ヲ用テ磨水灌ギ下セバ立処ニ効アリ

○誤テ麥稻ノ芒針刺木屑金銀銅鉄ノ類或ハ鷄魚ヲ食テ骨咽喉ニ取スレバ腹痛シテ死在須臾回春中毒門ノ白衣丸ヲ用ヨ其効如神

○河豚魚惣テ魚毒ニ中リタルニハ橄欖ノ煎湯ヲ服スベシ山查砂仁ノ煎湯モ奇妙也玉樞丹紫金錠ノ類ヲ用ユレバ其効如神

○茸毒ニハ黑豆オヲ用テ奇也紫金万金玉樞丹尤有効

○諸魚ノ骨骸ニハ神仙釣骨丹和氣ヲ用ベシ効ヲ取ル事多シ

○骨骸ニハ砂仁甘草ヲ縮ニ包ミテ含ミタルガヨシ

○骨骸ニハ胃鳥ト云フ鳥深山ノ川ニ有ル鳥也頭ノ毛ワカレテ胃



ノ如シ羽毛ハ山鳥ノ如シ山家ノ獵士ハヨク知也鉄鉈ニテ殺ス也  
此鳥ヲ腸ヲ出シ羽毛ニニ黒燒ニメ咽ニ吹入ル竹ノ管ヲ用ルナリ  
服ノモ佳也奇妙ノモ也啓益初メ中津候小笠原君ニ仕ヘテ量  
前ニ住セシ時此鳥ヲ取ルニ假君命山川ノ獵士ニ命ノ取畜ヘタル  
ガ寶永戊子ノ京師ノ火災ニ燒失ス惜ムベシ

救急

○暴死卒死五絶ノ類ニハ半夏ノ末黄豆大許鼻中ニ吹入レバ即蘇  
生スル也  
○自ラ縊テ死スル者ハ俄ニ繩ヲ断ルベカラズ衣物ニテ頂ト谷道  
トヲキビシク厚ク包ミ抱ヘ起テ後繩ヲ解ヘシ扱長頂痕ヲ採ミ和

ゲ鼻ヲヒ子リ其両耳ヲ吹テ氣微ク回ラバ鷄冠ノ血ヲ刺テ口中ニ  
滴レバ即蘇生スル也

○水ニ溺ル、者ハ竈中ノ灰ヲ取り兩垣ニ埋之從頭足ニ至ル如是  
スレバ水七竅ヨリ出ル也又皂角ノ末ヲ搗テ下部ニ入レバ須臾ニ  
メ水出テ甦生スルナリ又急ニ溺人ノ衣帶ヲトキ臍中ニ矢スルモ  
又即術也

○冬月凍死ノ者又ハ水ニ墮テ凍死スル者ハ先ヅ火ヲ用テ炙ルベ  
シ或ハ布袋ニ熱灰ヲ盛リ心頭ニ放ヲキ冷ヘバ即熱スルニ換テ眼  
ヲ閉ヲ待テ温酒姜湯ヲ用ベシ

○夏月暑ヲ扶テ死スル者ニハ冷水ヲ以テ冷サシムル事ナカレ熱



湯ヲ以テ其心腹ヲ摩リ洗ベシ即甦生スル也或ハ旅遠ノ中ニテ急切ノ事アラバ路上ノ熱土ヲ取テ腹臍ノ間ニ置テ其中ニ穴ヲナシテ人ヲカルク更々其臍中ニ小便セシムベシ忽甦生スル也  
○カス麩ニカス麗レテ死スル者ハ皂角ノ末大豆バカリ許鼻中ニ吹入レバ即蘇生スル也

牛山先生活套卷之下終

### 牛山先生 活套後叙

夫醫之爲道也大而其書亦博矣香月先生尤爲醫林瓊枝也嘗著數篇書其聲益於世術亦神焉茲有活套方考二書繕寫而未朶一日書肆何某過予曰贈灸人口久矣不若與衆嗜之乎請校正而以公之予愧短才以固辞之強猶不許夫以如庸醫不能哀論文意則不知奏其功也值片言隻字而難曉則失其病可救也絲此加國字以使易解而便于昧者也若博覽士覽之而有魚魯之差則非先生罪予肉袒以謝焉皆安永戊戌冬泉州後學木村桂菴書於平安第  
五街之家塾

印



工部局  
 取于内野人...  
 本以...  
 公...  
 日...  
 海...  
 夫...  
 牛山...

昭和十年十一月十七日 印刷  
 昭和十年十一月廿三日 發行

牛山活葉會  
 領價金三四六十錢



著者 法 香 月 塔 茲  
 發行者 東京市牛込區富久町七十一番地  
 宮 水 守 太郎  
 印刷者並 昭文堂  
 印刷所 宮 本 守 太郎

發行所 東京市牛込區富久町七十一番地  
 漢方珍書頒布會  
 振替東京七五〇五四番







302  
190



終